

錢氏小兒直訣卷四

門人閻孝忠集

後學薛鎧校註



瀉青丸 治肝經實熱急驚搐搦

羌活

大黃

川芎

山梔仁

龍膽草炒

當歸

防風各等分

右為末煉蜜丸芡實大每服半丸煎竹葉湯

入砂糖化下

薛按前方足厥陰肝經解散肌邪踈通內臟

之苦寒藥也若大便秘結煩渴飲冷飲食如
常屬形病俱實宜用此瀉之若大便調和煩
渴飲冷屬病氣實而形氣虛宜用抑青丸平
之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦
怠屬形病俱虛宜用地黃丸補之若肝經血
虛生風先用四物湯加釣藤鈎以生肝血繼
用四君子湯以補脾土若因肝經血燥生痰
用地黃丸生腎水益肝血若土不能培木用
四君子湯加當歸以補中用地黃丸以滋腎
若因肺金尅肝木用六君子湯加芍藥木香
實脾土以平肺金若因心虛奪母之氣或腎
水虛不能生肝木者並用地黃丸主之若屢
服峻劑而脾胃虛寒者必用六君子湯加丁
香木香補脾胃以培陽氣若因乳母恚怒肝
火妄動致兒爲患者母服加味小柴胡湯若
因乳母肝脾血虛發熱致兒爲患者母服加
味逍遙散子亦服數滴

抑青丸即前方去山梔大黃

抑肝散 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚
悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹膨少食睡

臥不安者

軟柴胡分五

川芎分八

當歸

白朮炒

茯苓

釣藤鈎各一

甘草分五

右水煎子母同服

瀉心湯 治心經實熱

黃連

右為末每服五分臨卧溫水化下

薛按前症若叫哭發熱作渴飲水抽搐有力仰面而睡者屬心經實熱宜用瀉心湯或導

赤散若發熱飲湯抽搐乏力驚竄咬牙合面而睡者屬心經虛熱用補心散若喘嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散若頭搖目劄身熱抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若竄視驚悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸若因乳母致症亦用前藥以治其母

導赤散 治小腸實熱小便秘赤

生地黃

木通

甘草

各等分

右為末每服一錢入淡竹葉水煎

薛按瀉心湯導赤散瀉心小腸實火之劑蓋心為脾母脾為心子然心既病則脾土益虛矣用者審之

生犀散 治心經虛熱

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛

各一兩

甘草

五錢

犀角

二錢

右為末每服一二錢水煎

薛按前方云治心經虛熱然其所用多屬瀉心瀉肝脾之劑蓋虛熱二字恐傳寫之誤假如心經自病而血虛熱者用秘旨安神丸脾

虛奪心之氣而熱者

旨補脾湯肝木不

能生心火而虛熱者用地黃丸

秘旨安神丸

治心血虛而睡中驚悸或受驚

嚇而作

人參

半夏

湯泡

酸棗仁

炒

茯神

各一錢

當歸

酒洗

橘紅

赤芍藥

炒各七分

五味子

五粒

甘草

炙三分

右為末姜汁糊丸芡實大每服一九生薑湯

下

瀉黃散

治脾胃實熱

藿香葉

甘草

各七錢五分

山梔仁

兩

石膏

錢五

防風

兩二

右用蜜酒微炒為末每服一二錢水煎

薛按前症若作渴飲冷卧不露睛手足熱甚

或遍身發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作

渴飲湯卧而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜

用異功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也

用秘旨補脾湯若面赤驚悸身熱昏睡心乘

脾也用秘旨安神丸若面白喘嗽肢體倦怠

肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足

指為腎乘脾也用益黃散病後津液不足口

乾作渴宜用七味白朮散若乳母膏粱厚味

七情鬱火所致當審其因而治其母

五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食

人參

茯苓

白朮

甘草

炒

陳皮

各等分

右為末每服三錢姜棗水煎

薛按前方補脾胃之聖藥也况人之一身以

脾胃為主若小兒乳食失節寒涼失宜或乳

母六淫七情失調兒飲其乳諸病頓起當專

以此藥治之其應如響

益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄瀉

陳皮

青皮

訶子肉各五錢

丁香二錢

甘草灸三錢

右為末每服一二錢水煎

薛按前症若因脾土虛弱而吐瀉者用五味異功散若因肝木侮脾土而吐瀉者用六君子加柴胡如不應或手足指冷屬脾胃虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾土虛而肝木侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前症母

那加味歸脾湯

參安胃散

治因服峻劑脾胃虧損或成慢

驚泄瀉嘔吐或腸胃有熱以致前症

人參錢一

黃芪錢二

生甘草

炙甘草各五分

白芍藥七分

白茯苓四分

黃連二分

右為末每服二三錢水煎

七味白朮散

治吐瀉或病後津液不足口乾

作渴

人參

白朮

木香

白茯苓 甘草 炙 藿香葉 各一錢

乾葛 二錢

右為末每服二三錢水煎

薛按胃傷則嘔脾傷則瀉故用前藥調補胃氣以化生津液如無他症只因胃氣虛而津液不足者用四君子湯尤效

秘旨補脾湯 治久病面黃肌瘦咬牙目劓頭

髮稀少誤藥所致

人參 白朮 各一錢 白芍藥 酒炒

白茯苓 各八分 陳皮 川芎 各六分

甘草 炙 黃芪 炙 蜜 當歸 酒洗 各四分

右每服二三錢薑水煎

瀉白散 治肺經實熱咳嗽痰喘

桑根白皮 炒 地骨皮 各一兩 甘草 炙 五錢

右為末每服一二錢入粳米百粒水煎

薛按活人方云喘者肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣盛者乃肺中之火盛也有餘者肺中之邪有餘也故用前

藥以瀉之若土虛不能生肺用補中益氣湯火來尅金用人參平肺散腎水奪母之氣或

陰火上炎用地黃丸若肺虛肝木乘侮先用
阿膠散後用瀉青丸若因乳母感冒風寒肺經
兒為患母服前散若因乳母感風寒肺經
鬱熱致兒為患用十味參蘇飲若因乳母膏
梁醇酒積熱致兒為患用加味清胃散

阿膠散 治肺虛咳嗽口乾作渴

明阿膠 一兩 麩炒 馬兜鈴 五錢 甘草 炙一錢

杏仁 七箇去皮尖 糯米 一兩 鼠粘子 二錢五分

右為末每服二錢水煎

薛按前症若因脾胃弱而肺氣虛者宜用補

中益氣湯若肺金自虛者宜用四君子湯

地黃丸 治腎虛解顛或行遲語遲等症

熟地黃 八錢 酒洗 山茱萸肉 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三錢

右地黃杵膏餘為末加煉蜜九桐子大每服

二三十丸空心白湯下

薛按前丸治腎經虛熱作渴小便淋秘痰氣

上壅或肝經血虛燥熱風客滯氣而患癰瘰

結核或四肢發搐眼目瞶動或肺經虛火咳

嗽吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或

心經血虛有火自汗盜汗便血諸血或脾虛
濕熱下刑於腎腰膝不利或疥癬瘡毒等症
並用前藥為主而佐以各臟之藥大抵此藥
為天一生水之劑若稟賦不足肢體瘦弱解
顱失音或畏明下竄五遲五軟腎疴肝疴或
早近女色精氣虧耗五臟齊損凡諸虛不足
之症皆用此以滋化源其功不能盡述

四君子湯 治脾氣虛弱飲食不化腸鳴泄瀉
或嘔穢吐逆

人參

白茯苓

白朮

甘草

炙各五分

右水煎服

四物湯 治肝經血虛發熱日晡益甚或煩躁
不寐

當歸

熟地黃

各二錢

白芍藥

一錢

川芎

五分

右作二劑水煎服

八珍湯 治氣血俱虛或因失血過多或因尅
伐元氣以致內熱發熱肢體瘦瘁即四物四
君子二湯合服

十全大補湯 治氣血虛熱或因病後惡寒發熱或自汗盜汗食少體倦或發熱作渴頭痛眩暈等症即八珍湯加黃芪肉桂
六君子湯 治脾胃虛弱體瘦面黃或久患瘧痢不思乳食或嘔吐泄瀉飲食不化或時患飲食停滯或母有前症致兒為患

人參

白朮

茯苓 各二錢

陳皮

半夏

甘草 各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

補中益氣湯 治中氣不足困睡發熱或元氣

虛弱感冒風寒諸症或乳母勞役發熱致兒為患

黃芪 灸

人參

白朮 炒

甘草 灸

當歸

陳皮 各五分

升麻

柴胡 各二分

右薑棗水煎

香砂助胃膏 治胃寒吐瀉乳食不化

人參

白朮 炒

白茯苓 各五錢

甘草 灸

丁香 各一錢

砂仁 四十箇

白荳蔻 十四箇

乾山藥 一兩

肉荳蔻 四箇

右為末煉蜜丸芡實大每服二三丸米飲磨化

人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷寒熱如瘧或嘔逆惡心

人參

厚朴

姜製

蒼朮

製

半夏

湯炮

藿香

草菓仁

茯苓

各五錢

甘草

炙二錢

橘紅

二錢五分

右每服二三錢薑三片烏梅一箇水煎

大蕪荑湯 治小兒脾疳少食發熱作渴大便

不調髮黃脫落面黑便清鼻下生瘡能乳嗜

等症

蕪荑

山梔

各五分

黃栢

甘草

炙

黃連

防風

各二分

麻黃

羌活

柴胡

各三分

白朮

茯苓

當歸

各四分

右作二劑水煎

肥兒丸 治食積五疳頸項結核髮稀成穗發

熱作渴等症

黃連

炒

神麩

炒

木香

各一兩五錢

檳榔

二十箇

肉荳蔻

二兩炮

史君子

酒浸

麥芽

炒各四兩

右為末麩糊丸麻子大每服三五丸米飲

下良久用五味異功散一服以助胃氣

九味蘆薈丸 治小兒肝脾疳積體瘦熱渴大

便不調或瘰癧結核耳内生瘡等症

蘆薈

胡黃連

黃連

木香

蕪荑

青皮

白雷丸

鶴虱草

麝香

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一二錢空心

白湯下

黃連丸 治疳勞

黃連

五錢膽汁浸晒

瓜蒌根

烏梅肉

杏仁

浸去皮焙

石蓮

各二錢

右為末牛膽汁浸糊丸麻子大每服一二十

丸煎烏梅薑蜜湯下

木香丸 治冷疳

木香

青黛

檳榔

肉荳蔻

麝香

各一錢五分

續隨子

去油

蝦蟆

三箇燒存性

右為末蜜丸菜豆大每服三五丸煎薄芎湯

麥芽炒各四兩

右為末麩糊丸麻子大每服三五丸米飲下良久用五味異功散一服以助胃氣

九味蘆薈丸 治小兒肝脾疳積體瘦熱渴大便不調或癭瘰結核耳内生瘡等症

蘆薈 胡黃連 黃連

木香 蕪荑炒 青皮

白雷丸 鶴虱草各一兩 麝香三錢

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一二錢空心白湯下

黃連丸 治疳勞

黃連五錢 瓜蒌根 烏梅肉

杏仁浸去皮焙 石蓮各二錢

右為末牛膽汁浸糊丸麻子大每服一二十丸煎烏梅薑蜜湯下

木香丸 治冷疳

木香 青黛 檳榔

肉苳蔻各一錢五分 續隨子去油

蝦蟆三箇燒存性

右為末蜜丸棗豆大每服三五丸煎薄荷湯

下

愚按前方消疳清熱逐水破氣之劑然云冷疳者乃陽氣虛而脾胃冷也其檳榔續隨子恐導損真陰尅伐陽氣治當審之

胡黃連丸 治熱疳

胡黃連 黃連各五錢 朱砂二錢

右為末填入猪膽內以線扎懸掛銚中淡漿水煮數沸取出研入蘆薈麝香各二錢飯和丸麻子大每服一二十九米飲下
愚按前症當以本方為主佐以四君子加蕪

蕪脾胃虛甚者以四君子加蕪蕪為主以前丸為佐

如聖丸 治冷熱疳瀉

史君子取肉一兩 胡黃連 川黃連

白蕪蕪炒各二兩五錢 麝香五分

乾蝦蟆五箇酒煮杵膏

右為末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十丸煎人參湯下

薛按疳之為患乃肝脾虛熱津液乾涸之症前方乃專於治疳清熱之劑若脾胃虛弱者

當佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退庶可收全功也

蘭香散 治鼻疳赤爛

蘭香葉 二錢 燒灰 銅青

輕粉 各五分

右為末乾貼

白粉散 治諸疔瘡

海螵蛸 三分 白芨 二分

輕粉 一分

右為末先用漿水洗拭乾貼

薛按前二方治表之藥如未愈用四味肥兒丸以治其內

四味肥兒丸 治食積脾疳目生雲翳口舌生

瘡牙根腐爛發熱瘦怯遍身生瘡又治小便

澄白腹大青筋一切疔症

黃連 炒 蕪荑 炒 神麩

麥芽 炒各等分

右為末水糊丸桐子大每服一二十九空心白滾湯下

蟾蜍丸 治無辜疔症一服虛熱退二服煩渴

止三服瀉痢愈

蟾蜍 一枚 夏月溝渠中取腹大不跳不鳴身多癩者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍
跌死投與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流
中一宿取出瓦上焙乾為末入麝香一字粳
米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效
如神

蕪荑散 治蟲動口內流涎

白蕪荑 乾漆炒各等分

右為末每服五六分米飲下

安蟲散 治蟲動心痛

胡粉炒黃 檳榔 川練子

鶴虱各三錢 枯白礬二錢五分

右為末每服五六分痛時米飲調下

薛按蟲動之因多屬胃氣虛弱或聞飲食氣
味而動前二方乃化蟲之劑若因脾胃虛弱
者須當調補中氣

史君子丸 治臟腑虛滑及疝瘦下利腹脇脹

滿不思乳食

史君子肉一兩 麵煨 甘草炙

厚朴薑汁炙 訶子肉半生 煨 青黛各五錢

陳皮二錢五分

右為末煉蜜丸芡實大每服三五丸米飲化下

白玉散 治丹瘤

白土 二錢五分 寒水石 五錢

右為末用米醋或新水調塗

薛按前方性味寒涼六腑受患毒發於表二便調和乳食如常固為可用若胃氣虛弱者反凝滯瘀血益增其患重者須吮毒血各聚於一處砭出以泄之遍身者當隨其患處各吮聚砭之更服仙方活命飲大便不通者更

加六黃如不應用大連翹飲治法雖多無如砭法為良百日内患者難治

神功散 治瘡瘍腫骨作痛未成者敷之即散已潰者敷之即愈丹瘤用之尤妙但砭縫作痛

黃栢 炒 草烏 炒 血竭 各等分

右為末津調敷患處

柳華散 治熱毒口瘡

黃栢 炒 蒲黃 青黛 真正者

人中白 煨各等分

右為末敷之

仙方活命飲 治一切瘡毒未成內消已成即潰此消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者元氣虛也當補之

川山甲

白芷

防風

沒藥

甘草

赤芍藥

當歸尾

乳香

天花粉

貝母

各一錢

金銀花

陳皮

各三錢

皂角刺

二錢

右每服二三錢酒水各半煎

劫氣丸

治肚腹虛脹

胡椒

一兩

蝎尾

五錢去毒

右為末麩糊丸粟米大每服一二十九丸陳米

飲下

薛按前症屬脾肺虛水氣泛而喘急浮腫必兼溫補脾土以生肺金而氣自運行矣但前藥性屬辛熱雖能祛散寒邪而恐真氣反傷不可過劑

消積丸

治食積大便酸臭發熱

丁香

九箇

縮砂

十二箇

巴豆

二粒去皮心膜

烏梅肉

三箇

右為末麩糊丸黍米大每服五七丸溫水下
薛按前症若食積既去而熱不退或作嘔少
食宜用五味異功散以補胃氣或用四君子
加藿香半夏以安中氣若兼泄瀉用六君子
湯如不應加升麻柴胡以升補脾氣若久瀉
不已宜用補中益氣湯以升補陽氣若虛寒
加炮薑木香如不應兼以四神丸以補脾腎
若體瘦潮熱口渴大便不調宜用肥兒丸以
消疳積

保和丸 治食積

山查

二兩

神麩

二兩

半夏

茯苓

各一兩

陳皮

連翹

蘿蔔子

各五錢

右為末粥糊丸桐子大每服一二十九白湯
下

清中解鬱湯 治脾氣虛弱飲食停滯鬱熱生

痰或身發赤暈

白木

茯苓

陳皮

山梔

山查

神麩

麥芽炒

川芎

桔梗

甘草灸各五分

右每服二三錢水煎

四神丸 治脾腎稟虛泄瀉不食或不時去後不實或乳母患此致兒為患

肉苳蔻二兩 補骨脂四兩 五味子二兩

吳茱萸一兩

右為末用水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟收棗肉和末丸麻子大每服二三十丸空心食前白湯下子母並服

香連丸 治赤白痢疾并水瀉暑瀉

黃連淨二兩 吳茱萸去梗十兩

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸如麻子大每服四五十九白滾湯下

五苓散 治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利

澤瀉五錢 豬苓 官桂

赤茯苓 白朮各三錢

右為末每服一二錢白湯調下

薛按前症若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥門五味虛火上炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水也用地黃丸加麥門五味

大黃丸 治風熱便秘飲水

川芎

五錢

甘草

炙二錢五分

黑牽牛

五錢半生半炒

大黃

一兩酒洗蒸晒

右為末糊丸麻子大每服數丸溫蜜水下

薛按前方乃內疎之峻劑審其因果屬臟內

實熱方可用

白虎湯

治傷暑煩躁身熱痰盛頭痛且燥大

渴

知母

一兩五錢

石膏

四兩

白粳米

八錢

甘草

炙五錢

右為末每服一二錢水煎

羌活散

治風邪所傷頭目昏眩痰涎壅滯肢

節煩疼

羌活

前胡

麻黃

白茯苓

川芎

黃芩

甘草炙

蔓荊子

枳殼炒

細辛

石膏另研

菊花

防風各一兩

右為末每服一二錢水煎

地骨皮散 治壯熱作渴

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

半夏

人參

知母各等分

右為末每服一二錢水煎

大羌活湯

羌活

獨活

防已

防風

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

甘草炙

川芎

細辛各二錢

知母

生地黃各一錢

右為末每服一二錢水煎熱服

人參羌活散 治傷寒時氣頭疼發熱

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

茯苓

枳殼

川芎

天麻

地骨皮

甘草

右入薄荷三葉水煎

薛按前方乃解肌發表化痰利氣之劑然元

氣虛者宜用清肺散

秘旨清肺散 治感冒發熱鼻流清涕或咳嗽

吐痰輕者勿藥自愈重者用此輕和之劑

橘紅

半夏

桔梗

川芎

白茯苓

桑白皮

甘草

防風

薄荷

枯黃芩

白朮

右每服二三錢薑水煎

薛按前症若風邪退而痰熱不止但徧中氣

則痰自化而病自愈若專用化痰利氣則中

氣愈虛痰熱愈甚矣

敗毒散 治傷風時氣寒熱咳嗽

人參

茯苓

甘草

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

等分

右為末每服一二錢生薑薄苛水煎

薛按秘旨云小兒雖有感冒傷風鼻塞流涕發熱咳嗽以降痰為主畧加微解凡散利敗毒非幼稚所宜或胃輕者不必用藥候一二日自愈竊謂前症若手足冷或腹脹脾虛也用六君子湯加柴胡升麻若腹脹或氣喘肺虛也用四君子湯加柴胡升麻蓋肺虛則腠理不密外邪易感發表之後其邪既去即補脾肺以實其表庶無變症矣

百部丸 治肺寒壅嗽微喘

百部

炒

麻黃

各三分

杏仁

四十箇微炒水煮

右為末用蜜丸皂子大每服一二丸薑湯化下

麻黃湯 治傷風發熱無汗咳嗽喘急

麻黃

去節三錢水煮去沫漉出曬乾

肉桂

二錢

甘草

炙一錢

杏仁

七箇去皮尖麩炒黃研膏

每服一錢水煎服以汗出為度自汗者不宜服

薛按前方乃發表出汗之劑審其寒邪在表宜用若邪既去宜補脾肺以實其表庶風邪

不能再入往往表散之後熱嗽不退復行發表多變壞症

地黃清肺飲 治肺疴咳嗽痰唾稠粘

阿膠 一錢 麩炒 鼠粘子 二分 炒 馬兜鈴

甘草 五分 炙各 杏仁 七枚 去皮尖 去 糯米 十粒 炒

右每服一錢水煎

葶藶丸 治傷風咳嗽面赤身熱痰盛喘促

甜葶藶 隔帛 畧炒 黑牽牛 炒 杏仁 炒黃 研膏

漢防已 各一 兩

右為末入杏膏蒸棗肉搗丸麻子大每服十

九薑湯下

薛按前方行氣導濕之峻劑若脾肺虛熱而致諸症者當調補中氣為主若果係前症宜用惺惺散參蘇飲清肺丸茯苓半夏湯選用之

惺惺散 治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽

桔梗 細辛 人參

甘草 炙 白茯苓 白朮 炒

瓜蒌根 各等分

右為末每服二錢入薄荷五葉水煎

參蘇飲 治感冒風寒或腹脹少食泄瀉嘔吐
或手足並冷喘促痰涎

人參

紫蘇

陳皮

半夏

茯苓

枳殼炒

桔梗炒

前胡

乾葛

甘草炒各五分

木香三分

右為末每服一二錢水煎

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱痰涎惡心或飲食

不化嘔吐發搐或睡卧不寧口流痰涎或乳

母脾胃虛弱飲食不節以致兒患前症亦宜

用此藥主之

白朮炒

茯苓

半夏

神麴炒各一錢

大麥炒五錢

陳皮

天麻各三錢

右每服一二錢水煎

甘桔散 治咳吐熱涎咽喉不利

甘草炒二兩

桔梗一兩米泔浸焙

右為末每服二錢入炮阿膠半片水煎服

薛按前症若風熱蘊於肺而咳膿血用桔梗

湯若心火尅於肺而吐痰涎用人參平肺散

桔梗湯 治咳嗽吐膿痰中有血已成肺癰症

桔梗 炒

貝母

當歸 酒浸

瓜蒌仁

枳殼 炒

薏苡仁

桑白皮 炒

百合 蒸各一分

五味子 炒

甜葶藶 炒

地骨皮

知母 炒

甘草節

防已

黃芪 炒

杏仁 各五分

右每服一二錢水煎

人參平肺散 治心火尅肺咳嗽喘嘔痰涎壅

盛胸膈痞滿

人參

橘紅

甘草 炙

地骨皮 各五分

茯苓

知母 炒各七分

五味子 炒

青皮

天門冬 各四分

桑白皮 炒一錢

右每服一二錢水煎

小柴胡湯 治傷寒溫熱患身熱惡風頭痛項

強四肢煩疼寒熱往來嘔噦痰實及治中暑

病瘡

柴胡 八錢

半夏 湯炮

黃芩

人參 各三錢

甘草 炙二錢

右每服一二錢薑棗水煎

加味小柴胡湯 治乳母肝火發熱等症致兒

為患即小柴胡加山梔牡丹皮水煎子母並

服以下做此

加味道遙散 治乳母肝脾氣血虛弱發熱致

兒為患

當歸

白朮

茯苓

芍藥

炒黃各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔

炒

甘草

炒各五分

右水煎服

柴木參苓湯

治肝火血熱遍身瘙痒或起赤

暈或筋攣結核

白朮

炒

人參

茯苓

各一錢

柴胡

川芎

山梔

芍藥

炒

甘草

炒五分

熟地黃

自製

當歸

各八分

右水煎服

芍藥參苓散

治肝木剋脾土目劄面青食少

體倦

芍藥

炒

人參

茯苓

白朮 陳皮各七分 柴胡

山梔炒 甘草炒各五分

右薑水煎

梔子清肝散 治三焦或足少陽經風熱耳內

作痒生瘡或出水疼痛

柴胡 梔子炒 牡丹皮各一錢

茯苓 川芎 芍藥

當歸 牛蒡子炒各七分 甘草

右水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱或囊癰便毒小便

滯滯

龍膽草酒沙五分 車前子炒 木通

當歸尾 澤瀉各三分 甘草

黃芩 生地黄 山梔各三分

右水煎服

茵陳湯 治身熱鼻乾汗出二便赤瀉濕熱發

黃

茵陳六錢 梔子二箇 大黃二錢

右每服一錢水煎

大連翹飲 治積熱大小便不利或痘後餘毒

肢體患瘡或丹瘤遊走不止

連翹

藿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬腿

甘草各一錢

山梔炒

黃芩炒各五分

右每服一二錢水煎

清涼飲

治消中能食而瘦口乾自汗大便結

燥小便頻數

羌活

柴胡

炙甘草

知母酒製

黃芪

黃芩酒製各一錢

生甘草

防已

生地黄酒製

防風各五分

當歸六分

紅花少許

桃仁五箇

杏仁

升麻四分

石膏

黃栢

草龍膽各一錢五分

右每服一二錢水煎入酒少許服

四順清涼飲

治臟腑有熱頰赤作渴四肢驚

掣大便秘瀯或風熱結核頭面生瘡目赤咽

痛一切有餘之症

赤芍藥

當歸

甘草

家醫金
大黃各等分

右每服一錢水煎

黃連香薷飲

香薷四兩

厚朴二兩

黃連一兩

右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入

香薷水酒各一盞煎冷服

金匱加減腎氣丸 治脾腎虛腰重脚腫小便

不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已

成蠱者此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣

復傷而變者非此藥不救

白茯苓三兩 附子炮五錢

川牛膝

肉桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮各一兩

熟地黄四兩 搗碎酒拌杵膏

右為末和地黄膏加煉蜜杵丸桐子大每服

一二十九丸空心米湯下

五色丸 治五癩

朱砂

真珠各五錢

水銀

雄黃各一兩

黑鉛三兩 同水銀結成砂

右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀

薄苛湯下

愚按前症有因驚因風因食之不同雖痰迷心竅然當補脾氣為主

斷癇丹 治癇差後變症不止

黃芪

蜜炙

釣藤鈎

細辛

甘草

炙各五錢

蛇腿

三寸酒炙

蟬蛻

去土四箇

牛黃

一字另研

右為末煮棗肉為丸麻子大每服五七九人

參煎湯下

宣風散 治驚風

檳榔

二箇

陳皮

甘草

各五錢

牽牛

四兩半生半炒

右為末每服三五分蜜湯調下

愚按肝氣為陽為火肝血為陰為水故肝氣熱則生風風熱搏則驚搐而肝血必損也然有餘當認為不足若屢服利驚宣風之劑未免虧損脾胃以成慢驚矣慎之

漏銀丸 治風涎膈熱及乳食不消腹脹喘促

巴豆

水銀

各五錢

京墨

八錢火燒醋淬研

黑鉛

二錢半

麝香

五分另研

右為末陳米粥丸菴荳大每服二三丸煎薄
苛湯下

愚按前方治癩癩驚搐消積下痰之藥也其
用牽牛巴豆等蓋以痰飲癖積結聚堅固非
此不能除故潔古張先生云為斬關奪旗之
將形病俱實者用之誠有回生起死之功必
須詳審不可輕率

牛黃丸 治驚熱消疳積

雄黃研水 牽牛各一錢 天竺黃二錢

右為末麩糊丸粟米大每服五七丸薄苛水

紫霜丸 治驚積

代赭石二錢 杏仁廿一箇 巴豆二十一粒

右為末飯丸粟米大每服五七丸煎皂角仁
湯下

利驚丸 治急驚

天竺黃二錢 輕粉 青黛各一錢

黑牽牛炒五錢

右為末煉蜜丸豌豆大每歲一九薄苛水化
下

白餅子 治腹中有癖但飲乳嗽而吐痰涎

滑石 輕粉 半夏湯浸

南星各一錢 巴豆二十四粒去皮

右為末糯米飯丸菘豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯下

薛按前四方乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之恐至失手命在反掌經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實實者病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實者當瀉不當補形病俱虛者

當補不當瀉治者審焉

涼驚丸 治驚疳

龍膽草炒焦 防風 青黛各二錢

釣藤鈎二錢 黃連炒一分 龍腦一錢

牛黃各二分 麝香各二分

右為末麩糊丸粟米大每服十九煎金銀花湯下

薛按前丸心肝二經清熱祛風化痰散氣之寒劑蓋疳者津液乾涸之症不宜多服恐傷胃氣無以滋腎水生肝血也

家九醫錄
卷中
羗活膏 治脾虛肝熱熱盛生風或吐瀉或悞藥變為慢驚之症

羗活

川芎

人參

白附子 炮

赤茯苓 各五錢

天麻 一兩

白僵蚕 酒炒

乾蝎 炒去毒

白花蛇 肉酒浸焙乾

雄黃

辰砂 各另研一分

附子 炮

防風

麻黃 去節

肉豆蔻

鷄舌香

藿香葉

沉香

木香 各二錢

輕粉

真珠

牛黃 各一錢五分

龍腦 二分

麝香 一錢各另研

右為末煉蜜丸豆大每服一二丸薄苛湯化

下

薛按前方藥味雜亂果脾氣虛而成慢驚者當審用之恐發散真氣重損陰血故也

抱龍丸 治傷風溫疫身熱昏睡風熱痰實壅

嗽又治驚風潮搐及蠱毒中暑

雄黃 二錢五分

辰砂 另研五錢

天竺黃 一兩

牛膽南星 四兩

麝香 另研五分

右為末甘草湯丸皂子大每服一九白湯化

下

薛按前丸化痰祛邪清熱之功居多屬肝心
實熱而致者用之殊效若脾肺虛弱而見昏
睡痰嗽當用寶鑑天麻散以調補元氣
小續命湯 治中風不省人事涎鳴失音肢體
反張或時厥冷

麻黃節去

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草炒

杏仁去皮尖研

漢防已

官桂各五錢

防風七錢五分

附子炮去皮臍二錢

右各另為末和勻每服一錢薑棗水煎有熱

減桂附

寶鑑天麻散

治急驚脾胃虛弱或變慢驚者

半夏七錢

天麻二錢五分

甘草炙

白茯苓

白朮各二錢

右入生薑三錢磁器內水煮候乾為末每服

一錢五分薑棗湯調下

釣藤鈎飲

治吐利脾胃虧損虛風慢驚

釣藤鈎三分

蟬殼

防風炒

人參

麻黃

白僵蚕炒

天麻

蝎尾去毒炒各五錢

甘草炙

川芎 各二錢五分 麝香 一錢另研

右為末每服一二錢水煎

薛按慢驚之症屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥而無調補之功須審用之

大青膏 治傷風吐瀉身溫涼熱

天麻 青黛 各一錢 白附子

乾蝎 去毒 烏梢蛇 肉酒浸焙 朱砂 五分

天竺黃 二錢 麝香 二分

右為末生蜜和膏每服一豆粒許月中兒用半粒薄苛湯化服

愚按大青膏乃表散之劑也必外邪蘊結於肺而肺氣之未損者乃可施之况前症屬脾肺氣虛而邪之所湊必以固脾胃為主否則虛虛之禍恐不能免矣

溫白丸 治泄瀉瘦弱冷疝洞利及久病而成慢驚

天麻 五錢 白僵蚕 炮 白附子

乾蝎 去毒 天南星 湯炮焙各二錢五分

右為末麩糊丸菉豆大每服十九米飲下

愚按前症屬脾氣虛寒無陽之症無風可散

家醫錄 小兒直論卷中
無痰可逐當兼用六君子湯十二味異功散

木香散

參芪四聖散 治痘瘡已出至六七日不起發

不成膿

人參

黃芪炒

白朮炒

茯苓

當歸

芍藥炒

川芎各五分

紫草

木通

防風各三分

糯米二百粒

右作二劑水煎服

陳氏木香散

木香

大腹皮

人參

桂心

赤茯苓

青皮

前胡

訶梨勒

半夏薑製

丁香

甘草炙各等分

右每服二三錢薑水煎

薛按前方若痘瘡已出未愈之間其瘡不光

澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚

腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷

或身熱作渴或驚悸腹脹或汗出不止或寒

戰咬牙瘡不結痂此皆脾胃虛寒津液衰少

急用此藥治之若誤認為實熱用寒涼之藥及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

十二味異功散

木香 二錢半

官桂 二錢

當歸 三錢半

茯苓

白朮 各二錢

人參

陳皮

厚朴 製姜

半夏 製姜

丁香

肉豆蔻 各二錢半

附子 炮一錢半

右每服二三錢薑棗水煎

薛按前方若痘瘡不光澤不起發不紅活不結靨謂之表裡俱虛宜用此藥治之若悶亂

煩渴吐瀉不食腹痛腹脹痰喘氣急謂之表

裡虛寒急用此藥送豆蔻丸或十日至十一

日當靨不靨煩渴咬牙手足並冷飲沸湯而

不知熱此陽虛脫陷急用此湯救之亦有復

生者

百祥丸 治痘瘡黑陷及嗽而吐青綠水

紅牙大戟

陰乾漿水煮軟去骨復入元汁中煮

右焙乾為末水丸粟米大每服十九赤脂麻

湯下

薛按前方治痘瘡黑陷耳聾冷咬牙吐瀉者

乃脾土虛敗寒水反侮歸腎之惡候也用百
祥丸瀉之急以四君子加丁香陳皮木香厚
朴炮薑以溫補脾土身熱飲水黑陷復起十
救一二蓋此症因脾土虛敗寒水乘侮陳文
秀先生云若治寒水於既侮之後何不保脾
土於未敗之先此發前人之未發况前藥必
籍脾胃之氣運及於腎而纔瀉之吾恐胃氣
先傷而莫能及然非錢公之明見不敢投非
古昔之元氣不敢用治者慎焉

牛李膏

治痘瘡黑陷

牛李子

右杵汁石器內熬膏每服皂子六煎杏膠湯

化下

雄黃散

治痘後牙齦生疳蝕瘡

雄黃

錢一

銅綠

錢二

右同研細量瘡大小乾糝其上

化毒丹

治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

玄參

甘草

甜硝

各二兩

青黛

一兩五錢

右為末煉蜜丸芡實大每服一九白湯化下
薛按前方生血涼血解毒寒中之劑用之得
宜殊有良驗

括萋湯 治慢驚

括萋根錢二 白甘遂錢一

右慢火炒黃為末每服二三分煎薄芎藭香
湯下

薛按徐用誠云錢氏治慢驚用括萋湯恐傳
寫誤耳蓋驚主風木甲木屬陽病急易治乙
木屬陰病緩難治况小兒五臟之氣未實神

氣未完而自病慢驚之症非病後及吐瀉脾
胃虛損而得者慎勿用此峻厲之劑

溫驚丸 治慢驚風症

牛膽南星四兩 朱砂一分 天竺黃五分

龍腦錢一 紫臘脂錢一

右各另為末用黃牛膽汁丸芡實大每服半
丸砂糖湯化下

薛按慢驚屬脾胃無陽肝木所勝之寒症故
用溫驚丸以溫之但所用之藥乃辛散陽氣
祛逐痰涎治者審之

人參理中丸 治中氣虛熱

人參

白朮炒

甘草炙各等分

右為末姜汁糊丸棗豆大每服二三十九白湯下

調中丸 治脾胃虛寒

白朮

人參

甘草炒各五錢

乾薑炮四錢

右為末用蜜丸棗豆大每服二三十九白湯下

薛按前二方本經自病之藥即人參理中丸

也若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

張氏溫脾散 治脾胃虧損腹脇虛脹乳食不

進困倦無力

訶子肉

人參各七錢

白朮

木香

桔梗

茯苓

藿香

陳皮

黃芪各五錢

甘草炙二錢半

右每服二三錢姜棗水煎

薛按前方治脾肺虛弱之症若肺病已去前

症未已但用六君子湯以調補脾胃
歸脾湯 治乳母脾經氣鬱致兒為患

人參 白朮 茯苓

黃芪 龍眼肉各二錢 遠志一錢

酸棗仁 木香 甘草炙三分

右姜棗水煎服加柴胡山梔名加味歸脾湯
越鞠丸 治乳母六鬱傳兒為患或胸滿吐酸

齒痛瘡疥等症

蒼朮 神麴炒 香附子

山查 山梔炒 撫芎

麥芽炒各等分

右為末水調神麴糊丸桐子大每服二三三十
丸白滾湯下子母並服

清心丸 治驚熱煩躁

人參 茯苓 防風

朱砂 柴胡各二錢 金箔三十片

右為末煉蜜丸桐子大每服一二丸竹瀝調
下

安神丸 治邪熱驚啼心肝壯熱面黃頰赤

麥門冬焙去心 牙硝 白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草各五錢

朱砂兩一

龍腦二分

右為末煉蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下

薛按前方降火化痰辛散寒涼之劑不宜過服恐反傷脾胃也若睡中驚悸不安宜用秘旨安神丸若因乳母脾氣鬱熱致兒為患者宜用加味道遙散若因乳母怒氣肝經發熱致兒為患者宜用加味小柴胡湯若因乳母飲酒胃經發熱致兒為患者宜用葛花解醒

湯

葛花解醒湯 治乳母酒後乳兒遺熱為患

白豆蔻

砂仁

葛花各五錢

乾生薑

白朮

澤瀉

神麴

炒黃各二錢

白茯苓

陳皮

人參

猪苓各一錢半

木香五分

青皮

三錢

右為末每服二錢白湯調服

薛按前湯氣味辛散不得已而用之耳蓋酒病服之雖效頻服則陰損元氣折人長命可

不慎哉

花大膏 治夜啼

燈花 一類

右塗乳上令兒吮之

薛按前症有因停乳腹痛者有因陰盛發躁者有因寒盛腹痛者有因乳母鬱悶怒氣傳兒者有因乳母停滯傳兒者治法以既見本論

釣藤散 治夜啼

釣藤鈎

茯神

茯苓

川芎

木香

當歸

各一錢

甘草 五分

右為末每服二錢姜棗水煎

六神散 治面青啼哭口出氣冷或泄瀉不乳

人參

山藥

白朮

各五錢

甘草 二錢

白茯苓

扁豆

各一兩炒

右為末每服一錢姜棗水煎

當歸散 治夜啼不乳

當歸

白芍藥

人參

各二錢半

甘草 一分

桔梗

陳皮

各一錢

右為末每服一二錢水煎灌之

蟬蛻釣藤散 治肚疼驚啼

釣藤 天麻 茯苓

川芎 白芍藥 甘草

蟬蛻 各一錢

右每服一錢燈心水煎

羚羊角丸 治行遲

羚羊角 虎脛骨 生地黄

酸棗仁 白茯苓 肉桂

防風 當歸 黃芪

右為末煉蜜成劑每服一皂子大白湯化下

治心氣不足不能言語

石菖蒲 赤石脂 人參

丹參 天麥門冬

右為末蜜丸菘豆大每服十九丸若病後腎虛

不語宜服地黄丸

止汗散 治睡而自汗

故蒲扇 燒

右為末每服三錢温酒調下

香苾丸 治遍身汗出

胡黃連 川大黃 煨 柴胡

鱉甲 醋炙

黃栢

黃連

蘆薈

青皮 各等分

右為末將黃瓜一箇去穰納藥煨熟杵和麩糊丸菉豆大每服三五丸新水下

薛按自汗屬陽虛盜汗屬陰虛若心經血虛用團參湯腎經虛熱用地黃丸血氣虛用人參養榮湯之類胃氣虛用六君子湯或用一味白朮炒為末以浮麥炒濃煎湯調服
當歸六黃湯 治血氣不足虛火內動盜汗不止

當歸

熟地黃

黃芪 炒

黃栢 已下俱炒黑

黃芩

黃連

生地黃 各等分

右每服二錢水煎

團參湯 治心血虛熱自汗盜汗

人參

當歸 各等分

右用猪心一片每服三錢水煎服

芪附湯 治稟賦氣虛陽弱自汗不止肢體倦

怠或大病後陽氣虧損並急服之多有生者

黃芪 蜜炙

附子 炮等分

右每服一錢薑水煎

參附湯 治稟賦不足上氣喘急自汗盜汗或

病久陽氣脫陷急宜服之

人參錢五 附子炮一兩

右每服一錢姜水煎

人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦

倦食少作瀉或久病虛損口乾食少欬而下

痢驚熱自汗

白芍藥錢五分 人參 陳皮

黃芪炙蜜 桂心 當歸

白朮炒 甘草炙各一錢 熟地黄

五味子杵炒各七分 遠志五分

右每服二三錢薑棗水煎

玉露散 治傷熱吐瀉黃色

石膏煨 寒水石各五錢 甘草二分

右為末每服五分白湯調下

薛按前症若飲食如常作渴飲冷屬胃經實

熱宜用此藥若食少體倦或善噫瀉黃此脾

虛色陷也宜用六君子加柴胡升麻若瀉而

變青更兼腹脹或善怒此脾虛肝所乘也宜

用前湯更加木香

木瓜丸 治生下吐

木瓜

麝香

膩粉

木香

檳榔 各等分

右為末麩糊丸黍米大每服一二丸甘草湯化下

薛按前症多因妊娠胃經有熱或鬱痰所致當審其母而兼治之

塗顛法

麝香

牛黃

青黛 各二分半

蝎尾 去毒一分半

薄荷 二分

右為末生棗肉杵膏塗帛上貼顛中以手烘熱頻熨之

薛按前法辛涼發散開竅祛風之劑當審用之余每以葱頭三五莖細切搗攤帛上以兩掌護熱貼顛門良久其邪即解諸病自退乃去其葱却以段帛寸餘塗糊仍貼顛門護之春夏常用絹帛秋冬用紵絲以護貼之永無傷風之患亦因有母病致兒發搐者治驗見前

浴體法 治胎肥胎熱胎怯

烏蛇肉酒浸 白礬 青黛各三錢

天麻二錢 蝎尾去毒 朱砂各五分

麝香二分

右為末桃枝一握水煎浴之勿浴背

薛按前法乃開發腠理疎泄陽氣若小兒所

稟虛怯或妊母所致各說見本論

神效當歸膏 治跌撲湯火等瘡不問已潰未

潰

當歸 黃蠟 生地黄各一兩

煎油六兩

先將當歸地黄入油煎黑去渣入蠟融化

候冷攪勻即成膏矣

砭法 治丹毒赤色遊走不定以口吮毒聚在

一處用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋

劈開頭尖夾之用線縛定兩指輕撮筋稍令

磁芒正對聚處懸寸許再用筋一根頻擊筋

頭令毒血遇刺皆出毒入腹者不救症輕者

止用口吮出毒用藥敷之如患在頭額不用

砭法止宜用卧針倒挑患處以出毒血其亦