

效

世

方

醫



得

元危亦林編著

世醫得效方

上海科学技术出版社

出版說明

本書編者危亦林，字達齋，元代江西南豐人，生于一二七七年，卒于一三四七年，官南豐醫學教授。家世業醫，各科都傳授有自：高祖雲仙大方脈科，伯祖子美婦人科，正骨、金鏃科，祖父碧崖小方科，伯父熙載眼科、瘰疾，編者本人瘡腫科、咽喉口齒科。編者想到先代受授方術的不易，和自己心得的不應守秘，從天歷元年（一二二八）開始，將五世累積的經驗方劑，用「依按古方，參之家傳」的方法，按照元代所定醫學科目編纂，到後至元三年（一二三二）撰成本書，於至正五年（一三四五）刊行。

昔人有云：「方雖傳自古人，藥必出於己手。」這是說明醫者辨證施治時，運用成方，必須憑藉臨床經驗，量裁適應，纔能加強療效。本書中所纂述的古方，有經危氏斟酌損益的，以及自己制訂的方劑，往往可以考見其用意所在，應與一般完全因襲成方的輯集有所區別。

古代方劑的輾轉流傳，因為抄寫或版刻上的關係，而漸失真相的，其例很多。

世醫得效方
元危亦林編著

上海科学技术出版社出版（上海瑞金二路450号）
上海市书刊出版业营业新可証出003号

商务印书馆上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 34 26/32 插页 6 排版字数 508,000
1964年9月第1版 1964年9月第1次印刷
印数 1—8,500

統一書号 14119·1135 定价(科六) 4.40元

四庫全書提要稱：本書「所載古方至多，皆可以資考據，」不為無見。例如：卷五反胃門香牛飲的服法，明代普濟方收錄危氏此方云：「服藥時先對病人說：袁白粥共服之。」本書「共服」作「惱煩」，意謂如果病人聞醫者言，而起「惱煩」作用，纔更可能有利於施治，這是掌握病機的啓示，有類此等的出入處，似不宜忽略。又如：卷九冷水腫的秘傳八方，卷十九冷癩疽的秘傳十方，這是危氏家傳的兩套秘方，賴本書尚存，而知其流傳有緒。所以無論為先後行世約有關方書提供了考據資料，以及保存了瀕於失傳的古代驗方，都可引起讀者的注意。

本書卷十八的正骨兼金鏃科，即現代通稱的傷科。溯尋我國傷科源流，元代的發展，最為顯著，危氏所介紹的治療手術，經驗方劑，有一定貢獻。例如：整復骨折脫臼的創用麻醉法，迄今為專業者所祖述。又如採用懸吊復位，以治療脊柱骨折，已經證實比現代醫學家達維氏在一九二七年開始使用這一方法，早了六百年，這是本書的一個突出點。

本書編列各科方劑，計十九卷，不但是古典醫籍中的重要編著，還有史料參考作用，故初刻書時的牒文以及四庫全書提要等，一併附錄書末。惟原屬附編的千金方養生書一卷，為醫家所習見，不再附入。書內附圖，如卷九癆瘵的六代傳病諸蟲形狀，卷十六眼科的五輪八廓圖，卷十九瘡腫的五發形圖，亦一概省略。

本書也攙雜一些封建迷信與荒誕不經的糟粕。例如：宣揚因果報應（王序），認為鬼魅邪祟可以致病（四一六、四一九頁），符咒禱祝可以治病（一五、三八九、七〇一、七七一至一頁），及合藥製劑的擇日避忌（四四一、五〇七頁），相兒命短長（五四五頁），轉女為男（七二〇頁），胎殺避忌（七二一至一頁），久服輕身，漸入仙道（三九四頁），甚至荒誕不經的怪疾（一六、五二二至五三〇頁）及尸蟲游食日辰及其形狀（四三三至四三九頁）等。希望讀者以正確對待文化遺產的態度，有批判地閱讀本書。

本書從初刻到現在，僅見各家醫籍引用本書中的方劑或治驗，而原書不見流傳。考之書目，國內刻本凡兩種：一為元至正五年初刻，一為明初書林魏家覆刻。抄本則有清乾隆時的四庫全書本。國外則有朝鮮據元刻重刊本。目前國內惟明初魏刻本，尚見其全，四庫本則文津、文瀚兩閣本未散佚。我們這次的排印，是用四庫全書本（攝影文津閣的）與魏刻本互校為主本，旁證校讀之書，則元以前方劑書而外，明

代的普濟方借助為多，詳書後所附校勘記。

在本書的校勘工作中，我們對文津閣本中的脫落、錯誤、顛倒、竄改之處盡可能作了校正，但限於我們水平，謬誤必多，敬請讀者多多批評指教。此外，向協助進行工作的北京圖書館、上海圖書館致謝。

世醫得效方卷第一

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫學教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提舉余

賜山

校正

○大方脈雜醫科

●集脈說

人之有生血氣順則周流一身脈息和而諸疾不作氣血逆則運動滯澀脈息亂而百病生然脈之精微心中了了指下難明故西晉上叔和猶為切慮凡診之際須澄神靜慮以呼吸息數定病人之脈候兩手各一脈分為寸關尺

(明初書林魏家刻本書影)

危氏世醫得效方序

語云、醫不三世。不服其藥。醫何以貴。世業也。謂其更嘗多。而險危劇易皆得之耳。聞目見。較之臆決。嘗試者。得失何啻倍蓰。且藥進醫手。而方傳古人。古方之行于世者何算。一證而百方。其將焉所適。從哉。夫病者懸命醫師。方必對脉。藥必療病。譬之抽關啓鑰。應手而決。斯善之善者矣。若中無定見。姑徐徐焉。取古方歷試之。以庶幾一遇焉。雖非有心殺人。而人之死於其手者多矣。醫所以貴專門。方所以貴經驗也。南豐危亦林先世遇古名醫董奉遠孫京受醫術。其後世業之。且徧參諸科。至亦林五葉。而學益備。技益工。所全活者益衆。乃取平時所用古方。驗而無失者。并與其祖父以來得之師授者。類萃成書。倣聖濟總錄以十三科編次。名曰世醫得效方。將鈔梓以廣其傳。余觀世之人。得一方。輒靳靳焉。莫肯示人。往往以肘後千金爲解。今危氏以五世所得之秘。一旦盡以公諸人。其過人遠矣。昔許叔微未達時。人勸以樹陰德。許念貧而樹德。惟醫爲可。乃攻醫以活人。其後訖致顯宦。造物之報施如此。然余以爲以身種者有限。以書種者無窮。今危氏能公其術於人。使家有其書。卽無夭死。其所種者不已多乎。陰德之報。在其身在其子孫。余知其必有過於許氏者矣。後至元四

年八月承事郎同知永新州事王充耘與耕書。

月既望嘉禾後學達齋危亦林拜手謹書。

世醫得效方目錄

卷一

大方脉雜醫科

集脉說	一	麻黃湯	一九	藿香正氣散	二七
集病說	五	升麻葛根湯	二〇	四逆湯	二六
集證說	九	金沸草散	二二	四逆散	二九
集治說	三	小柴胡湯	二二	順元散	二九
傷寒撮要	一八	大柴胡湯	二三	三建湯	二九
發汗法	一八	小承氣湯	二三	瓜蒂散	三〇
轉下法	一八	大承氣湯	二三	茯苓甘草湯	三〇
取吐法	一八	調胃承氣湯	二四	麻黃升麻湯	三〇
水瀆法	一八	三拗湯	二四	灸法	三〇
葱熨法	一九	敗毒散	二四	和解	
蒸法 <small>附煎煮藥法</small>	一九	陰證		香蘇散	三一
陽證		治中湯	二五	香葛湯	三一
		五積散	二五	參蘇飲	三一
		人參養胃湯	二七	冲和散	三一

小柴胡湯	三四
神朮散	三五
二香散	三五
相類	
〔痰證〕金沸草散	三六
大半夏湯	三六
瓜蒂散	三六
稀涎散	三七
〔食積〕治中湯	三七
五積散	三七
人參養胃湯	三七
香蘇散	三七
〔虛煩〕竹葉石膏湯	三七
橘皮湯	三七
溫膽湯	三六
〔脚氣〕加減小續命湯	三六

、通治	
交加散	三六
雙解散	三六
麻黃桂枝湯	三六
白虎湯	三六
大青龍湯	四〇
小青龍湯	四〇
溫粉	四一
真武湯	四一
桂枝二越婢一湯	四一
小建中湯	四二
梔子升麻散	四二
解肌湯	四二
漢防己湯	四二
白虎加蒼朮湯	四三
葛根湯	四三

小續命湯	四三
大承氣湯	四三
敗毒散	四四
附朮散	四四
附子防風散	四四
八物白朮散	四四
竹葉石膏湯	四四
麻黃細辛附子湯	四四
附子湯	四四
四逆湯	四四
人參養胃湯	四四
葛根湯	四四
脾約圓	四七
附子散	四七
返陰丹	四七
四逆湯	四六

當歸四逆湯	四四
升麻湯	四四
梔子仁湯	四四
大陷胸湯	四四
小陷胸湯	四四
大陷胸圓	四四
治結胸灸法	四〇
枳實理中圓	四〇
桔梗枳殼湯	四〇
三黃湯	五一
半夏瀉心湯	五一
近效方	五一
丁香柿蒂散	五一
百合知母湯	五一
滑石代赭湯	五一
鷄子湯	五一

百合洗方	五三
玄參升麻湯	五三
知母麻黃湯	五三
黑奴圓	五三
無憂散	五四
桃仁湯	五四
白頭翁湯	五五
黃連阿膠圓	五五
黃連解毒湯	五五
黃連犀角湯	五五
雄黃兌散	五五
四逆湯	五五
白虎湯	五五
大承氣湯	五五
黃連阿膠湯	五五
文蛤散	五五

三物白散	五七
十棗湯	五七
抵當湯	五七
吳茱萸湯	五八
苦酒湯	五八
牡蠣湯	五八
陰旦湯	五九
大白朮散	五九
回陽丹	五九
正陽散	五九
肉桂散	六〇
陽毒升麻湯	六〇
大黃散	六〇
五柔圓	六一
葛根橘皮湯	六一
知母桂心湯	六一

增損四物湯	三	大方脉雜醫科	冷香飲子	七四
化斑湯	三	傷風	潑火散	七四
黃連橘皮湯	三	桂枝湯	枇杷葉散	七四
陽旦湯	三	杏子湯	香薷散	七五
竹皮湯	三	柴胡加桂湯	小黃龍圓	七六
乾薑湯	三	桂枝芍藥湯	來復丹	七七
青竹茹湯	三	桂附湯	小柴胡湯	七七
當歸白朮湯	三	八物湯	竹葉石膏湯	七七
知母麻黃湯	三	傷暑	二陳湯	七七
應手方	三	五苓散	濯熱散	七七
白朮散	三	縮脾飲	通苓散	七七
又方白朮散	三	却暑散	傷濕	
蜜煎導法	三	香薷圓	香蘇散	七六
豬膽汁方	三	桂苓甘露散	黃耆建中湯	七六
蜜漬柏皮	三	六和湯	不換金正氣散	七六
灸法	三		朮附湯	七六

茵陳湯	七	五苓散	桂枝附子湯	八五
腎著湯	七	香薷散	防己黃耆湯	八六
滲濕湯	七	小柴胡湯	白朮茯苓乾薑湯	八六
瓜蒂搐鼻法	七	白虎加人參湯	茯苓白朮湯	八六
中寒		中濕	萎蕤湯	八七
附子理中湯	八〇	加味朮附湯	痲瘡	
薑附湯	八〇	白朮酒	〔風證〕加減桂枝湯	八七
中暑又名中喝		甘草附子湯	白朮散	八七
大黃龍圓	八〇	四氣兼中	〔寒證〕五積散	八八
益元散	八一	附子湯	養正丹	八八
消暑圓	八一	防風湯	薑附湯	八八
皂莢湯	八一	生附白朮湯	附子理中湯	八八
來復丹	八二	附子麻黃湯	〔暑證〕香薷散	八八
白虎湯	八二	苓朮湯	小柴胡湯	八八
橘皮竹茹湯	八二	四氣相感	清脾湯	八八
竹葉石膏湯	八二	麻黃白朮湯	消暑圓	八九

〔濕證〕朮附湯……………八九
 除濕湯……………八九
 五苓散……………八九
 〔食證〕二陳湯……………八九
 小清脾湯……………八九
 紅圓子……………九〇
 〔七情〕四獸飲……………九〇
 〔痰瘧〕枳梗半夏湯……………九一
 半夏圓……………九一
 〔瘴瘧〕附子湯……………九一
 小柴胡湯……………九二
 地龍飲……………九二
 觀音圓……………九二
 〔勞瘧〕芎歸鱉甲散……………九二
 〔瘧母〕消癰圓……………九三
 〔熱瘧〕八正散……………九三

白虎湯……………九三
 〔虛瘧〕分利順元散……………九三
 四將軍飲……………九三
 七棗湯……………九四
 理脾飲……………九四
 果附湯……………九四
 黑錫丹……………九五
 冷附湯……………九五
 〔久瘧〕丁香煮散……………九五
 大已寒圓……………九五
 橘皮煎圓……………九五
 〔通治〕草果平胃散……………九五
 人參養胃湯……………九六
 加減清脾湯……………九六
 藿香正氣散……………九六
 柴苓湯……………九六

柴胡桂薑湯……………九六
 加味二陳湯……………九六
 〔截瘧〕勝金圓……………九七
 又方……………九七
 露星飲……………九七
 辰砂圓……………九七
 又方……………九八
 灸法……………九八
 針法……………九八
 痰厥
 順元散……………九九
 星香飲……………九九
 單方……………九九
 眩冒
 白薇湯……………九九
 倉公散……………九九

卒厥尸厥

追魂湯……………一〇〇
 內鼻散……………一〇〇
 硫黃散……………一〇〇
 又方二……………一〇一
 灸法……………一〇一
 沙證
 艾湯……………一〇一
 又方……………一〇一
 鹽湯……………一〇二
 又法二……………一〇二
 時疫
 十神湯……………一〇二
 不換金正氣散……………一〇三
 桂枝黃芩湯……………一〇三
 敗毒散……………一〇三

大柴胡湯……………一〇四
 五苓散……………一〇四
 五積散……………一〇四
 柴胡石膏散……………一〇四
 蘇合香圓……………一〇四
 又方……………一〇四
 傷寒遺事
 戰汗四證……………一〇五
 急下兩證……………一〇五
 傷寒傷風誤下成痞……………一〇五
 三陰可汗……………一〇六
 差後昏沉……………一〇六
 飲酒復劇……………一〇六
 循衣摸床……………一〇六
 傷寒別名……………一〇七
 傷寒戒忌……………一〇七

卷三

臨治警省……………一〇八
 傷寒篤證……………一〇八
 大方脉雜醫科
 諸氣
 縮砂香附湯……………一一一
 沉香降氣湯……………一一一
 木香檳榔圓……………一一二
 歸氣湯……………一一二
 木香流氣飲……………一一二
 秘傳降氣湯……………一一三
 蘇子降氣湯……………一一四
 分心氣飲……………一一四
 推氣圓……………一一五
 神保圓……………一一五
 導氣枳殼圓……………一一六

三稜煎圓	二七
三和散	二七
五香連翹湯	二七
神仙九氣湯	二七
賺氣散	二六
參附正氣散	二六
破塊圓	二九
灸法	二九
中氣	
蘇合香圓	二九
獨香湯	三〇
朮附湯	三〇
回陽湯	三二
八味順氣散	三二
諸疝	
〔風寒證〕烏頭桂枝湯	三二

〔寒證〕倉卒散	三三
生料木香勻氣散	三三
〔七情〕聚香飲子	三三
〔熱證〕加味通心飲	三三
八正散	三三
〔虛冷〕五積散	三三
蟠葱散	三四
〔通治〕荆芥散	三四
礪砂圓	三四
奪命散	三四
五苓散	三四
青木香圓	三五
又法	三五
三茱圓	三五
失笑散	三五
葫蘆巴圓	三六

女附湯	二六
立效散	二六
金鈴圓	二六
去鈴圓	二七
三增茴香圓	二七
消堅圓	二六
川練子圓	二六
海藻圓	二九
敷法	二九
灸法	二九
腰痛	
獨活寄生湯	三〇
五積散	三二
腎著湯	三二
薑附湯	三二
敗毒散	三三

舒筋散	三三
人參順氣散	三三
木香流氣飲	三三
小七香圓	三三
神麩酒	三三
安腎圓	三三
青娥圓	三三
八味圓	三三
二至圓	三三
牽牛圓	三三
趁痛圓	三三
熟大黃湯	三三
二效方	三三
又方趁痛圓	三四
導引法	三四
針灸法	三四

眩暈	
〔風證〕川芎散	三四
〔感寒〕三五七散	三五
〔傷暑〕消暑圓	三五
〔中濕〕芎朮散	三五
〔七情〕茯神湯	三五
〔痰證〕加味二陳湯	三五
〔失血〕芎歸湯	三五
〔下虛〕增損黑錫丹	三六
身疼	
〔風證〕烏藥順氣散	三七
〔寒證〕香葛湯	三七
〔濕證〕除濕湯	三七
五苓散	三七
〔血滯〕當歸建中湯	三七
舒筋散	三七

〔冷痰作〕二陳湯	三七
〔勞倦〕秦芫熬甲散	三七
〔虛損證〕十補湯	三八
臂痛	
〔風證〕烏藥順氣散	三八
五靈脂散	三八
〔寒證〕五積散	三八
〔濕證〕活絡湯	三八
〔七情〕白芥子散	三九
流氣飲子	三九
〔痰證〕茯苓圓	三九
芎活湯	三九
控涎丹	四〇
〔氣滯〕神保圓	四〇
〔血氣滯〕舒經湯	四〇
〔熱證〕防風通聖散	四一

敷貼藥……………一四
針法……………一四

脇痛

〔傷寒〕小柴胡湯……………一四
〔氣滯〕神保圓……………一四
〔七情〕枳殼煮散……………一四
〔通治〕推氣散……………一四
枳芎散……………一四
枳殼散……………一四

腹痛

〔風證〕胃風湯……………一四
〔寒證〕五積散……………一四
藿香正氣散……………一四
〔暑證〕香薷散……………一四
五苓散……………一四
〔濕證〕香蘇散……………一四

不換金正氣散……………一四
〔熱證〕四順清涼飲……………一四

大柴胡湯……………一四
小三黃圓……………一四
八正散……………一四
大麻仁圓……………一四
〔冷證〕椒附圓……………一四
蟠葱散……………一四
〔氣證〕嘉禾散……………一四
木香勻氣散……………一四
木香流氣飲……………一四
分心氣飲……………一四
青木香圓……………一四
三和散……………一四
木香檳榔圓……………一四
〔積證〕香蘇散……………一四

神保圓……………一四

諸癩

〔風寒濕合癩〕附子湯……………一四
烏頭湯……………一四
理中湯……………一四
黃耆酒……………一四
蒼耳散……………一四
薏苡粥……………一四
〔寒證麻癩〕五積散……………一四
〔痰飲〕茯苓湯……………一四
〔血氣滯〕三癩湯……………一四

諸疔

〔筋癰〕羚羊角湯……………一四
〔熱證〕升麻湯……………一四
麻黃酒……………一四
〔暑證〕五苓散……………一四
茵陳湯……………一四
〔濕證〕礬石滑石散……………一四
〔時行〕梔子圓……………一四
〔黃汗〕苦酒湯……………一四
桂枝加黃耆湯……………一四
〔黃疔〕茵陳散……………一四
小半夏湯……………一四
單方……………一四
〔穀疔〕苦參圓……………一四
〔脾疔〕龍腦圓……………一四

紅圓子……………一四

〔酒疔〕葛根湯……………一四
酒蒸黃連圓……………一四
六物飲……………一四
人參散……………一四
辰砂妙香散……………一四
土瓜方……………一四
如神散……………一四
〔女勞疔〕石膏散……………一四
〔熱疔〕一清飲……………一四
〔虛勞疔〕秦朮飲……………一四
養榮湯……………一四
〔久黃〕苦參散……………一四
〔積黃〕無忌紫金圓……………一四
五噎……………一四
五噎散……………一四

〔蟲證〕化蟲圓……………一四

〔虛證〕當歸建中湯……………一四

〔通治〕小理中圓……………一四

蘇威圓……………一四

神保圓……………一四

神保圓……………一四

〔風寒濕合癩〕附子湯……………一四

烏頭湯……………一四

理中湯……………一四

黃耆酒……………一四

蒼耳散……………一四

薏苡粥……………一四

〔寒證麻癩〕五積散……………一四

〔痰飲〕茯苓湯……………一四

〔血氣滯〕三癩湯……………一四

沉香散……………一四

嘉禾散……………一四

大七氣湯……………一四

五膈

寬中散……………一四
五膈散……………一四
五膈圓……………一四
寬膈圓……………一四
瓜萸實圓……………一四

卷四

大方脉雜醫科

諸積

〔肉積〕三棧煎圓……………一四
阿魏圓……………一四
〔血積〕抵當湯……………一四
〔氣積〕木香流氣飲……………一四

分心氣飲……………一六三
〔水積〕十棗湯……………一六三
青木香圓……………一六三
〔涎積〕炒粉圓……………一六三
控涎丹……………一六三
〔魚蟹積〕香蘇散……………一六三
〔果菜積〕平胃散……………一六三
阿魏圓……………一六三
〔酒積〕平胃散……………一六三
香蘇散……………一六三
麩藥圓……………一六三
〔茶積〕磨積圓……………一六三
粉片索粉積方……………一六三
〔麵積〕阿魏圓……………一六三
〔糞傷積〕加味青木
香圓……………一六三

〔虛人沉積〕盧氏感應
圓……………一六四
〔通治〕大乙神明再造
感應圓……………一六五
紅圓子……………一六五
縮砂香附湯……………一六五
五積散……………一六五
握藥宣積……………一六五
利藥蕩積……………一六六
萬金圓……………一六六
五積
〔肝積〕肥氣圓……………一六七
〔心積〕伏梁圓……………一六七
〔脾積〕痞氣圓……………一六七
〔肺積〕息賁圓……………一六八
〔腎積〕奔豚湯……………一六八

灸法……………一六六
六聚
散聚湯……………一六九
荆蓬煎圓……………一六九
息積
磨積圓……………一六九
化氣湯……………一七〇
導引法……………一七〇
癥瘕
大消石圓……………一七一
小三棱煎……………一七一
三聖圓……………一七二
一握七圓……………一七二
妙應丹……………一七三
灸法……………一七三
心痛 脾疼附

〔風證〕蜜附湯……………一七四
分心氣飲……………一七四
〔寒證〕加味麻黃湯……………一七四
加味四七湯……………一七四
〔七情〕七氣湯……………一七五
沉香降氣湯……………一七五
分心氣飲……………一七五
〔食傷〕香蘇散……………一七五
感應圓……………一七五
〔熱證〕氣針圓……………一七五
通心飲……………一七五
〔虛證〕却痛散……………一七五
大已寒圓……………一七六
紫沉煎圓……………一七六
加味小建中湯……………一七六
〔卒痛〕鷄舌香散……………一七六

玄胡索散……………一七七
又方二……………一七七
木香勻氣散……………一七七
蘇合香圓……………一七七
倉卒散……………一七七
〔蟲痛〕蕪荑散……………一七七
真心痛……………一七六
〔通治〕手拈散……………一七六
香附散……………一七六
訶子散……………一七六
九痛圓……………一七六
撞氣阿魏圓……………一七六
失笑散……………一八〇
浮椒圓……………一八〇
附朮湯……………一八〇
九氣湯……………一八〇

三和散……………一八〇
神保圓……………一八〇
奪命抽刀散……………一八〇
參朮散……………一八一
加味烏沉湯……………一八一
單方……………一八一
大理中圓……………一八二
神效散……………一八二
茴薑湯……………一八二
單方……………一八三
灸法……………一八三
嘔吐
〔風證〕藿香散……………一八三
〔寒證〕理中湯……………一八三
枳梗半夏湯……………一八四
〔暑證〕加味香薷散……………一八四

五苓散	一八四
消暑圓	一八四
〔濕證〕加味治中湯	一八四
〔七情〕大藿香散	一八四
〔痰證〕大半夏湯	一八四
半夏圓	一八五
養正丹	一八五
加味治中湯	一八五
〔食證〕二陳湯	一八五
治中湯	一八五
〔血證〕茯苓湯	一八五
當歸湯	一八六
〔氣嘔〕茱萸人參湯	一八六
藿香正氣散	一八七
加減七氣湯	一八七
〔熱嘔〕竹茹湯	一八七

通心飲	一八七
小柴胡湯	一八七
三乙承氣湯	一八七
〔冷證嘔吐〕四逆湯	一八八
金液丹	一八八
〔通治〕藿香正氣散	一八八
香白圓	一八八
炮附子圓	一八八
快氣湯	一八九
勻理湯	一八九
人參散	一八九
丁香煮散	一九〇
灸法	一九〇
霍亂	
〔風證〕桂枝湯	一九〇
〔寒證陰經〕理中湯	一九〇

〔陽經〕香蘇散	一九一
〔暑證〕香薷散	一九一
〔濕證〕除濕湯	一九一
〔七情〕七氣湯	一九二
胃氣圓	一九二
〔食傷〕紅圓子	一九二
理中湯	一九二
〔轉筋〕木瓜湯	一九三
〔煩渴〕茯苓澤瀉湯	一九三
麥門冬湯	一九三
水浸丹	一九三
又方	一九四
〔乾霍亂〕鹽湯	一九四
〔通治〕藿香正氣散	一九四
訶子散	一九四
加味薑附湯	一九四

養正丹	一九四
胡椒湯	一九五
奇方	一九五
又方	一九五
熏洗法	一九五
鹽熨方	一九五
灸法	一九五
痰飲	
〔懸飲〕十棗湯	一九六
五苓散	一九六
〔支飲〕防己桂枝湯	一九六
茯苓五味子湯	一九六
〔溢飲〕大青龍湯	一九七
小青龍湯	一九七
〔痰飲〕參蘇飲	一九八
丁香五套圓	一九八

〔氣痰〕四七湯	一九九
二陳湯	一九九
〔風痰〕加味壽星圓	一九九
蝸麝白圓子	一九九
星香飲	一九九
〔熱痰〕芎辛散	一九九
枳殼半夏湯	二〇〇
〔虛證〕順元散	二〇〇
黑錫丹	二〇〇
靈砂丹	二〇〇
八味圓	二〇〇
暖胃圓	二〇〇
靈白圓	二〇〇
〔通治〕二賢湯	二〇一
茯苓圓	二〇一
快活圓	二〇一

茯苓圓	二〇一
倍朮散	二〇二
桂辛湯	二〇二
丁香半夏圓	二〇二
二陳湯	二〇三
控涎丹	二〇三
二生湯	二〇三
破痰消飲圓	二〇三
破飲圓	二〇四
導痰湯	二〇四
二陳湯	二〇四
荊蓬煎圓	二〇五
理中湯	二〇五
咳逆	
〔冷證〕丁香柿蒂散	二〇五
木香勻氣散	二〇六

沉香降氣湯……………二〇六
 橘皮乾薑湯……………二〇六
 羌活附子湯……………二〇六
 葶澄茄散……………二〇六
 〔熱證〕小柴胡湯……………二〇六
 橘皮竹茹湯……………二〇六
 灸咳逆法……………二〇七

卷五

大方脉雜醫科

脾胃

〔虛證〕丁沉透膈湯……………二〇九
 穀神嘉禾散……………二〇九
 四君子湯……………二一〇
 附子建中湯……………二一一
 參苓白朮散……………二一一
 千金養脾圓……………二一二

治中湯……………二二二
 平胃散……………二二二
 胃丹……………二二二
 補真圓……………二二三
 進食散……………二二四
 〔熱證〕瀉黃散……………二二四
 枳殼圓……………二二四
 橘皮竹茹湯……………二二四
 翻胃
 安脾散……………二二五
 薤白粥……………二二五
 熟水草果飲法……………二二六
 桂苓散……………二二六
 三棱煎圓……………二二六
 正胃散……………二二六
 粉靈砂……………二二六

青金丹……………二二七
 大掌中金……………二二七
 丁附散……………二二七
 大倉圓……………二二七
 小半夏圓……………二二八
 六丁圓……………二二八
 香牛飲……………二二八
 鹽滾圓……………二二九
 溫胃散……………二二九
 治翻胃……………二二九
 又方……………二三〇
 治吐逆不止……………二三〇
 灸法……………二三〇
 導引方……………二三〇
 乾食方……………二三〇
 咳嗽

〔風證〕神朮散……………二二二
 三拗湯……………二二二
 杏蘇湯……………二二二
 人參荆芥散……………二二三
 〔寒證〕金沸草散……………二二三
 小青龍湯……………二二三
 華蓋散……………二二三
 〔暑證〕六和湯……………二二三
 〔濕證〕白朮散……………二二三
 不換金正氣散……………二二三
 〔七情〕團參飲子……………二二三
 分心氣飲……………二三四
 〔熱證〕枳殼半夏湯……………二三四
 貝母散……………二三四
 紫苑膏……………二三四
 玉芝圓……………二三五

金沸草散……………二三五
 黃連阿膠圓……………二三五
 小柴胡湯……………二三五
 洗心散……………二三五
 〔冷證〕藿香正氣散……………二三五
 理中湯……………二三六
 杏子湯……………二三六
 丁香半夏圓……………二三六
 胡椒理中圓……………二三六
 黃耆建中湯……………二三七
 養榮湯……………二三七
 皺肺圓……………二三七
 〔時行〕人參飲子……………二三七
 一服散……………二三八
 敗毒散……………二三八
 〔勞嗽〕蛤蚧散……………二三八

〔風痰嗽〕白圓子散……………二三六
 〔損嗽〕當歸飲……………二三九
 〔通治〕澄清飲……………二三九
 青金丹……………二三九
 人參清肺湯……………二四〇
 蠟煎散……………二四〇
 神效散……………二四〇
 參蘇飲……………二四一
 寧肺散……………二四一
 杏仁煎……………二四一
 二陳湯……………二四一
 款冬花散……………二四二
 單方葶藶散……………二四二
 又方三……………二四二
 嚼藥防己散……………二四二
 星砂圓……………二四三

捷徑方……………二二三
 滴油散……………二二三
 灸法……………二二三
 喘急……………

〔風證〕麻黃散……………二三四
 溫肺湯……………二三四
 金沸草散……………二三四
 〔寒證〕加味三拗湯……………二三四
 香葛湯……………二三五
 參蘇飲……………二三五
 藿香正氣散……………二三五
 〔七情〕四磨湯……………二三五
 四七湯……………二三五
 紫蘇子湯……………二三五
 〔熱證〕洗心散……………二三六
 八正散……………二三六

葶藶散……………二三五
 小柴胡湯……………二三五
 金沸草散……………二三五
 枳殼半夏湯……………二三五
 加味控涎圓……………二三六
 〔虛證〕蘇子降氣湯……………二三七
 鍾乳圓……………二三七
 胡椒理中圓……………二三七
 安腎圓……………二三七
 紅椒圓……………二三七
 〔通治〕人參定喘湯……………二三六
 九寶湯……………二三六
 杏參飲……………二三六
 分心氣飲……………二三九
 秘傳降氣湯……………二三九
 加味白朮散……………二三九

水煮木香圓……………二三九
 神保圓……………二三九
 玉液散……………二三九
 神應丹……………二三九
 胡桃湯……………二四〇
 葶藶圓……………二四〇
 炙肝散……………二四〇
 人參清肺湯……………二四一
 清膈散……………二四一
 灸法……………二四一
 泄瀉……………
 〔風證〕香薷香蘇散……………二四一
 不換金正氣散……………二四一
 胃風湯……………二四一
 火炊圓……………二四一
 〔寒證〕風下湯……………二四一

加味治中湯……………二四一
 〔暑證〕香薷散……………二四一
 胃苓湯……………二四三
 通苓散……………二四三
 六和湯……………二四三
 水浸丹……………二四三
 〔濕證〕藿香正氣散……………二四三
 胃苓湯……………二四三
 白朮附子湯……………二四三
 麴芎圓……………二四四
 〔七情〕加味藿香正氣散……………二四四
 木香散……………二四四
 〔熱證〕黃連香薷散……………二四五
 五苓散……………二四五
 黃連阿膠圓……………二四五

升麻葛根湯……………二四五
 藥皮湯……………二四五
 調胃承氣湯……………二四五
 〔冷證〕去麻黃五積散……………二四六
 豆附圓……………二四六
 薑附湯……………二四六
 大已寒圓……………二四六
 加味四柱散……………二四六
 加味三建湯……………二四七
 來復丹……………二四七
 茱萸斷下圓……………二四七
 豬臟圓……………二四七
 豬肚圓……………二四八
 椒艾圓……………二四八
 茱萸湯……………二四九
 大理中圓……………二四九

六君子湯……………二四九
 養正丹……………二四九
 〔冷熱不調〕參連圓……………二四九
 戊己圓……………二五〇
 〔腎泄〕安腎圓……………二五〇
 震靈丹……………二五〇
 金鎖正元丹……………二五〇
 〔脾泄〕炙肝散……………二五〇
 和氣散……………二五一
 朴附圓……………二五一
 〔脾腎泄〕木香散……………二五一
 二神圓……………二五一
 〔積證〕香蘇散……………二五一
 縮砂香附湯……………二五一
 〔酒泄〕香茸圓……………二五二
 酒蒸黃連圓……………二五二

平胃散	二五三
〔晨泄又名瀉泄〕香薑散	二五三
五味子散	二五三
〔滑泄〕大斷下圓	二五三
豆蔻飲	二五三
乳豆圓	二五三
藜撥圓	二五四
固腸圓	二五四
〔暴瀉〕硫黃散	二五四
車前散	二五四
針頭圓	二五五
神麩圓	二五五
肚蒜圓	二五五
粟殼圓	二五五
單方	二五六

附子理中湯	二六四
朮附湯	二六四
薑附湯	二六四
玉華白丹	二六四
震靈丹	二六四
橘皮煎圓	二六四
鐘乳建脾圓	二六四
木香散	二六四
五積散	二六五
椒艾圓	二六五
四柱散	二六五
赤石脂散	二六五
〔冷熱不調下痢〕真人養臟湯	二六五
香連圓	二六五
駐車圓	二六五

卷六 大方脈雜醫科

灸法	二五六
〔通治〕真人養臟湯	二五六
香連圓	二五六
人參散	二五七
下痢	
〔風證〕神朮散	二五九
露宿湯	二五九
胃風湯	二五九
〔寒證〕人參敗毒散	二五九
不換金正氣散	二六〇
〔暑證〕六和湯	二六〇
五苓散	二六〇
藥皮湯	二六〇
酒蒸黃連圓	二六〇

〔氣痢〕牛乳湯	二六六
木香流氣飲	二六六
五膈寬中散	二六六
異香散	二六六
木香勻氣散	二六六
〔積痢〕盧氏感應圓	二六六
蘇合香圓	二六六
蠟匱圓	二六六
〔禁口痢〕敗毒散	二六七
眞料參苓白朮散	二六七
又方二	二六七
煨鯽魚方	二六七
〔休息痢〕加味養臟湯	二六七
神效散	二六八
炒五積散	二六八
駐車圓	二六八

〔濕證〕加味除濕湯	二六〇
艾薑圓	二六〇
苦散	二六〇
〔熱證〕小承氣湯	二六一
小柴胡湯	二六一
敗毒散	二六一
烏梅圓	二六一
地榆散	二六一
藥皮湯	二六一
芍藥藥皮圓	二六一
三黃熟艾湯	二六一
酒蒸黃連圓	二六一
白頭翁湯	二六一
〔冷證〕當歸圓	二六一
水煮木香圓	二六一
豆蔻散	二六三

秘方養臟湯	二六八
大已寒圓	二六八
薑茶圓	二六八
〔毒痢〕茜根圓	二六九
魚鮮湯	二六九
〔蠱注痢〕羚羊角圓	二六九
參附湯	二七〇
〔腹痛不止〕薑茶方	二七〇
香連圓	二七〇
木香勻氣散	二七〇
〔瘡痢〕六和湯	二七〇
〔痢風〕加味敗毒散	二七一
大防風湯	二七一
郁李圓	二七一
又方	二七一
〔通治〕木香散	二七一

黑豆散	二七三
當歸散	二七三
獨神圓	二七三
神應散	二七三
又方	二七三
秘方養臟湯	二七三
大阿膠圓	二七四
四物湯	二七四
駐車圓	二七四
九聖圓	二七四
立效散	二七五
大斷下圓	二七五
沒石子圓	二七五
荊芥湯	二七五
香茸圓	二七六
平胃散	二七六

樗白皮散	二七六
百中散	二七六
酸石榴皮散	二七七
乳香散	二七七
加減木香煮散	二七七
加味四君子湯	二七六
蒲黃散	二七六
又方二	二七六
灸法	二七九
秘澀	
〔小便不通熱證〕八正散	二七九
五苓散	二七九
通心飲	二七九
瓜蒌散	二七九
〔虛證〕八味圓	二八〇

附子散	二八〇
琥珀散	二八〇
利氣散	二八〇
參耆湯	二八〇
〔轉胞〕滑石散	二八一
八味圓	二八一
葱白湯	二八一
洗方	二八一
又法	二八二
葱熨法	二八二
〔大便不通風秘〕脾約丸	二八二
麻仁圓	二八二
皂角圓	二八二
又方皂角圓	二八二
疏風散	二八三
枳殼圓	二八三

又方	二八三
順氣圓	二八三
搜風散	二八四
二仁圓	二八四
〔氣秘〕三和散	二八四
四磨湯	二八四
蘇子降氣湯	二八五
橘杏圓	二八五
蘇麻粥	二八五
小通氣散	二八五
〔積滯秘結〕脾積圓	二八五
木香逐氣圓	二八六
感應圓	二八六
〔虛秘〕半硫圓	二八七
金液丹	二八七
威靈仙圓	二八七

五仁圓	二八七
潤腸圓	二八八
又方	二八八
葱白散	二八八
胃氣圓	二八八
黃耆湯	二八八
〔熱秘〕神功圓	二八九
檳榔圓	二八九
四順清涼飲	二八九
小三黃圓	二八九
小柴胡湯	二九〇
〔濕秘〕檳榔散	二九〇
香蘇散	二九〇
〔通治大小便不通〕甘遂散	二九〇
又方四	二九〇

八正散	二九〇
推車散	二九一
又掩臍法	二九一
〔通治大便不通〕大潤腸圓	二九一
獨棗湯	二九一
敷藥	二九一
蜜兌法	二九二
煨蒜方	二九二
熏方	二九二
老人臟腑秘方	二九二
脹滿	
〔風寒暑濕脹〕大正氣散	二九二
平肝飲子	二九三
五膈寬中散	二九三

木香流氣飲……………二九三
 附子粳米湯……………二九三
 溫胃湯……………二九三
 沉香降氣湯……………二九四
 〔穀脹〕大異香散……………二九四
 葶澄茄圓……………二九四
 〔水脹〕大半夏湯……………二九五
 青木香圓……………二九五
 〔血脹〕人參芎歸湯……………二九五
 〔熱脹〕七物厚朴湯……………二九五
 推氣圓……………二九六
 〔寒脹〕朴附湯……………二九六
 順氣朮香散……………二九六
 〔食脹〕強中湯……………二九七
 溫中散……………二九七
 桂香圓……………二九七

獨聖散……………二九七
 感應圓……………二九八
 北亭圓……………二九八
 溫白圓……………二九八
 〔鼓脹〕嘉禾散……………二九八
 四柱散……………二九八
 厚朴橘皮煎……………二九八
 三棱煎圓……………二九九
 四炒枳殼圓……………二九九
 氣針圓……………二九九
 丁沉透膈湯……………三〇〇
 導氣圓……………三〇〇
 熨法……………三〇〇
 敷藥……………三〇〇
 〔通治〕沉香飲……………三〇一
 小檳榔圓……………三〇一

灸法……………三〇一
 卷七
 大方脉雜醫科
 疔渴
 〔肺疔〕澄源丹……………三〇三
 眞珠圓……………三〇三
 菴蓉圓……………三〇四
 生地黄膏……………三〇四
 〔脾疔〕薑粉散……………三〇五
 附子豬肚圓……………三〇五
 白朮散……………三〇六
 茯神圓……………三〇六
 〔腎疔〕加減八味圓……………三〇六
 天王補心丹……………三〇七
 鹿茸圓……………三〇七
 雙補圓……………三〇八

〔丹石毒〕瓜萋散……………三〇八
 石子薺苞湯……………三〇八
 黃連豬肚圓……………三〇九
 罌粟湯……………三〇九
 加減三黃圓……………三〇九
 〔甜飲〕烏梅木瓜湯……………三二〇
 枳椇子圓……………三二〇
 三神湯……………三二〇
 龍鳳圓……………三二一
 蠶連圓……………三二一
 朱砂黃連圓……………三二一
 酒蒸黃連圓……………三二二
 〔通治〕玄兔丹……………三二二
 清心蓮子飲……………三二二
 六神湯……………三二三
 子童桑白皮湯……………三二三

梅花湯……………三二三
 文蛤散……………三二三
 羊乳圓……………三二四
 益元散……………三二四
 生地黃飲子……………三二四
 栝樓粉……………三二四
 降心湯……………三二五
 蠟苓圓……………三二五
 辰砂妙香散……………三二五
 神效散……………三二五
 三疳圓……………三二五
 浮萍圓……………三二六
 又方……………三二六
 白朮散……………三二六
 參耆湯……………三二六
 鷄蘇圓……………三二七

麵餅圓……………三二七
 忍冬圓……………三二七
 牡蠣散……………三二八
 單方……………三二八
 繭絲湯……………三二八
 煞蟲方……………三二八
 游濁
 〔心濁〕瑞蓮圓……………三二九
 加味清心飲……………三二九
 寧志膏……………三二九
 十四友圓……………三二九
 香苓散……………三三〇
 桑螺蛸散……………三三〇
 蠟苓圓……………三三〇
 遠志圓……………三三〇
 心腎圓……………三三一

(腎濁)秘精圓……………三二
 震靈丹……………三一
 鎖精圓……………三一
 芡實圓……………三一
 固精圓……………三一
 地黃圓……………三一
 四精圓……………三一
 蒜圓……………三一
 入藥靈砂圓……………三一
 小兔絲子圓……………三一
 四五湯……………三一
 安腎圓……………三一
 (脾濁)蒼朮難名丹……………三一
 (七情)四七湯……………三一
 芡實圓……………三一
 (通治)還少丹……………三五

分清飲……………三五
 蠟茶圓……………三五
 玉鎖固真丹……………三五
 小溫金散……………三六
 子午圓……………三六
 旋多
 川方五子圓……………三七
 又方二……………三七
 兔絲子圓……………三六
 橘皮煎圓……………三六
 草薺圓……………三六
 縮泉圓……………三六
 遺溺
 家韭子圓……………三九
 鷄內金散……………三九
 又方……………三九

秘元丹……………三九
 桑螵蛸散……………三〇
 補胞飲……………三〇
 遺精
 桑螵蛸圓……………三〇
 仙方固真丹……………三〇
 鎖陽丹……………三一
 辰砂妙香散……………三一
 三仙圓……………三一
 清心圓……………三一
 豬苓圓……………三一
 理脾圓……………三一
 失血
 (風證)桂枝栝樓根湯……………三一
 胃風湯……………三一
 (寒證)麻黃升麻湯……………三一

犀角地黃湯……………三四
 小柴胡湯……………三四
 (暑證)五苓散……………三四
 枇杷葉散……………三四
 (濕證)除濕湯……………三四
 (七情)木香勻氣散……………三四
 蘇合香圓……………三五
 止衄散……………三五
 歸脾湯……………三五
 天門冬湯……………三五
 (虛證)加味理中湯……………三五
 又方……………三六
 桂附湯……………三六
 加味四物湯……………三六
 (熱證)大薊散……………三六
 犀角地黃湯……………三六

茜根散……………三六
 萬金散……………三七
 龍腦鷄蘇圓……………三七
 三黃圓……………三七
 白朮散……………三六
 (勞傷)鷄蘇散……………三六
 蓮心散……………三六
 大阿膠圓……………三六
 (傷損)奪命散……………三九
 花蕊石散……………三九
 鷄鳴散……………三九
 加味芎藭湯……………四〇
 茯苓補心湯……………四〇
 (通治)立效散……………四一
 單方……………四一
 麝香散……………四一

黑神散……………四一
 川芎三黃散……………四一
 敗毒散……………四一
 蘇子降氣湯……………四一
 衄血方……………四一
 又方四……………四一
 天門冬圓……………四一
 龍骨散……………四一
 白及散……………四一
 黃耆建中湯……………四一
 葎草汁……………四一
 側柏散……………四一
 特效方……………四一
 灸法……………四一
 (大便下血熱證)酒蒸
 黃連圓……………四一

槐角圓	三四四
人參敗毒散	三四五
防風散	三四五
黃連阿膠圓	三四五
加減四物湯	三四五
〔虛證〕腸風黑散	三四五
黑玉丹	三四六
加味雙和湯	三四六
卷柏散	三四六
聖金圓	三四七
神丹	三四七
小烏沉湯	三四七
震靈丹	三四八
理中湯	三四八
香梅圓	三四八
斷紅圓	三四八

〔冷熱不調〕黃連香薷散	三四八
香連圓	三四九
芎歸湯	三四九
真人養臟湯	三四九
消風散	三四九
〔通治〕單方	三四九
又方三	三四九
灸法	三四九
〔小便出血〕酒蒸黃連圓	三五〇
五苓散	三五〇
茯苓調血湯	三五〇
薑蜜湯	三五〇
鹿角膠圓	三五〇
髮灰散	三五〇

鏡面散	三五二
單方	三五二
又方四	三五二
脫肛	三五二
文蛤散	三五二
木賊散	三五二
槐花散	三五二
釣腸圓	三五三
蝟皮散	三五三
香荊散	三五三
灸法	三五三
諸痔	三五三
〔冷證〕釣腸圓	三五三
黑玉丹	三五四
橘皮湯	三五四
立效圓	三五四

黑圓子	三五四
〔熱證〕逐瘀湯	三五五
白玉丹	三五五
黃連阿膠圓	三五五
槐角圓	三五五
乾葛湯	三五五
寬腸圓	三五五
〔通治〕秘方	三五五
又方	三五五
五灰膏	三五六
熏方	三五七
洗方	三五七
又方	三五七
蓮子散	三五八
木鱉散	三五八
〔敷法〕熊膽膏	三五八

卷八	
大方脉雜醫科	
諸淋	
〔冷證〕生附湯	三六一
八味圓	三六一
〔熱證〕八正散	三六一
地膚子湯	三六一
石韋散	三六一
清心蓮子飲	三六一
火府丹	三六一
枯礬散	三五六
消石散	三五六
葱青散	三五六
又方二	三五六
蝸牛散	三五六
灸法	三五六

〔膏淋〕鹿角霜圓	三六二
海金砂散	三六三
〔氣淋〕沉香散	三六三
〔血淋〕髮灰散	三六三
柿灰散	三六四
犀角地黃湯	三六四
乳石散	三六四
小薊飲子	三六四
導赤飲	三六四
白薇散	三六五
通秘散	三六五
〔沙石淋〕石燕圓	三六五
又方乳石散	三六五
瞑眩膏	三六五
苦杖散	三六六
〔通治〕透膈散	三六六

地髓湯	三六六
豬苓湯	三六六
五淋散	三六七
通草湯	三六七
品方	三六七
淡竹葉湯	三六七
葵子湯	三六八
虛損	
養榮湯	三六八
參香散	三六八
黃耆益損湯	三六九
正元散	三七〇
萬安圓	三七〇
增益歸茸圓	三七一
增損樂令湯	三七一
黃耆圓	三七二

茴香圓	三七二
還少丹	三七三
天真圓	三七三
地仙丹	三七四
補骨脂散	三七四
宮方瑞蓮圓	三七五
無名丹	三七五
大建中湯	三七五
黃耆建中湯	三七六
人參黃耆散	三七六
安腎圓	三七七
雙和湯	三七七
十四味建中湯	三七七
青娥圓	三七八
十全大補湯	三七九
秦芎鱉甲散	三七九

沉香鱉甲散	三八〇
小安腎圓	三八〇
橘皮煎圓	三八一
生犀散	三八一
北亭圓	三八二
鹿茸大補湯	三八三
養腎散	三八三
巴戟圓	三八三
十補圓	三八四
白圓	三八四
黑圓	三八四
芡實圓	三八四
天地煎	三八五
石刻安腎圓	三八五
青鹽圓	三八六
無比山藥圓	三八六

拱辰丹	三六七
兔絲子圓	三六七
大固陽湯	三六八
又方二	三六八
正氣補虛湯	三六八
痼冷	
金粟黃芽丹	三六九
聚寶養氣丹	三九〇
黑錫丹	三九〇
靈砂	三九一
歲丹	三九二
三建湯	三九二
金液丹	三九二
附子理中圓	三九三
震靈丹	三九三
來復丹	三九四

養正丹	三九五
玉華白丹	三九五
金鎖正元丹	三九六
四柱散	三九六
薑附湯	三九七
斂陽丹	三九七
沉附湯	三九七
耆附湯	三九七
參附湯	三九八
茸附湯	三九八
桂附湯	三九八
元陽秋石丹	三九八
<small>陰煉法</small>	
<small>陽煉法</small>	
灸法	四〇〇

芎桂散	四〇一
藿香養胃湯	四〇一
積熱	
三黃圓	四〇二
荊黃湯	四〇二
涼膈散	四〇二
洗心散	四〇三
八正散	四〇三
甘露飲	四〇四
消毒犀角飲	四〇四
青金丹	四〇五
薄荷煎	四〇五
玄明粉	四〇五
天竺黃散	四〇六
神芎圓	四〇六
四順清涼飲	四〇六

大三黃圓	四〇七
解毒雄黃圓	四〇七
牛黃涼膈圓	四〇七
防風通聖散	四〇八
灸法	四〇八
心恙	
〔熱證〕朱砂圓	四〇八
洗心散	四〇八
瀉心湯	四〇九
甘遂散	四〇九
辰砂妙香散	四〇九
〔虛證〕引神歸舍丹	四一〇
茯神圓	四一〇
驚氣圓	四一〇
鎮心圓	四一〇
〔通治〕鐵粉散	四一一
十四友圓	四二一
寧志圓	四二二
抱膽圓	四二二
一醉散	四二三
又方蕊珠圓	四二三
鬱礬圓	四二三
朱雀圓	四二四
陳艾湯	四二四
歸神丹	四二四
平補鎮心丹	四二五
獨效苦丁香散	四二五
灸法	四二六
怔忡	
益榮湯	四二六
龍齒丹	四二七
茯苓飲子	四二七
排風湯	四二七
加味壽星圓	四二七
棗肉靈砂	四二八
薑朮湯	四二八
五苓散	四二八
驚悸	
十味溫膽湯	四二八
遠志圓	四二九
十四友圓	四二九
驚氣圓	四二九
加味四七湯	四二九
怔忡	
還魂湯	四二九
桃奴圓	四三〇
蘇合香圓	四三〇
灸法	四三〇

卷九 大方脈雜醫科

健忘

小定志圓	四三三
菖蒲益智圓	四三三
加味茯苓湯	四三四
朱雀圓	四三四
虛煩	
淡竹茹湯	四三四
溫膽湯	四三四
酸棗仁湯	四三五
小草湯	四三五
地仙散	四三五
清心蓮子飲	四三六
自汗	
〔風證〕桂枝湯	四三六
〔暑證〕五苓散	四三六
消暑圓	四三六
却暑散	四三六
〔濕證〕朮附湯	四三六
防己黃耆湯	四三六
〔體虛〕牡蠣散	四三六
黃耆湯	四三七
撫芎湯	四三七
建中湯	四三七
防風散	四三六
白朮散	四三六
茯苓湯	四三六
大建中湯	四三六
止汗溫粉	四三六
止汗紅粉	四三六
〔虛脫〕正元散	四三六
三建湯	四三九
耆附湯	四三九
桂附湯	四三九
〔虛勞〕麥煎散	四三九
青蒿散	四三〇
〔陰汗〕大蒜圓	四三〇
青娥圓	四三〇
治陰汗濕癢方	四三一
治陰汗不止方	四三一
洗方	四三一
宿食	
香蘇散	四三一
盧氏感應圓	四三一
縮砂香附湯	四三一
穀神圓	四三一
紅圓子	四三一

三棱煎圓……………四三三

癩瘡……………四三二

總說……………四三二

尸蟲游食日辰及治法……………四三三

觀尸蟲色知病淺深法……………四三三

六代傳病及諸蟲形狀……………四三四

取蟲防護法……………四四〇

〔神效取蟲〕青桑枝飲……………四四〇

雄黃圓……………四四一

神授散……………四四一

〔虛證〕凝神飲子……………四四一

劫勞散……………四四二

黃耆飲子……………四四二

十全大補湯……………四四三

養榮湯……………四四三

黃耆益損湯……………四四三

〔陽經表散〕二香散……………四五三

神秘左經湯……………四五三

〔熱證〕生犀散……………四三三

枳殼半夏湯……………四四三

溫金散……………四四三

鯨甲地黃湯……………四四三

阿膠圓……………四四四

地仙散……………四四四

黃連飲……………四四四

四美圓……………四四五

〔通治〕太上混元丹……………四四五

蘇合香圓……………四四七

青蒿散……………四四七

加減黃耆建中湯……………四四七

清骨散……………四四八

團魚散……………四四八

蛤蚧圓……………四四八

灸法……………四四九

陰癩

茶萸內消圓……………四四九

大戟圓……………四五〇

煉陰丹……………四五〇

兼金圓……………四五〇

應痛圓……………四五二

三白散……………四五二

金鈴子散……………四五二

金鈴圓……………四五二

牽牛圓……………四五二

荔枝散……………四五二

橘核圓……………四五二

牡丹散……………四五三

竹皮湯……………四五三

灸法……………四五三

脚氣

淋洗方……………四六四

脚氣蒸法……………四六四

脚氣塗法……………四六五

捲柏散……………四五九

大腹皮散……………四五九

秘方換腿圓……………四六〇

石南圓……………四六〇

檳榔湯……………四六一

木瓜茶萸湯……………四六一

三將軍圓……………四六一

杉木節湯……………四六一

木瓜牛膝圓……………四六一

木通散……………四六三

蒼朮散……………四六三

透骨丹……………四六三

烏藥酒……………四六四

三和散……………四六四

朮附湯……………四六四

敗毒散……………四六四

腫滿

〔虛證〕復元丹……………四六七

禹餘糧圓……………四六七

實脾散……………四六八

加味腎氣圓……………四六九

木香流氣飲……………四六九

〔熱證〕神助散……………四六九

加味控涎圓……………四六九

疏鑿飲子……………四七〇

通荅散……………四七〇

赤小豆湯……………四七〇
 三仁圓……………四七〇
 分心氣飲……………四七〇
 三和散……………四七一
 塗臍膏……………四七一
 五皮散……………四七一
 麻黃甘草湯……………四七一
 〔秘傳八方〕芫花圓……………四七一
 牽牛湯……………四七二
 菴蓉散……………四七二
 烏鯉魚湯……………四七二
 郁李仁散……………四七二
 川活散……………四七三
 紅豆散……………四七三
 紫金圓……………四七三
 防風散……………四七四

茯苓散……………四七四
 治腳腫方……………四七四
 背腫方……………四七四
 烏梅醋法……………四七四
 腮腫方……………四七五
 陰腫方……………四七五
 治婦人陰腫堅硬方……………四七五
 灸法……………四七五

大方脈雜醫科
 頭痛
 〔風證〕芫芷香蘇散……………四七七
 消風散……………四七七
 〔寒證〕連鬚葱白湯……………四七七
 葛根葱白湯……………四七七
 〔暑證〕茵陳散……………四七八

〔濕證〕小芩辛湯……………四七八
 〔熱證〕防風散……………四七六
 太陽丹……………四七六
 洗心散……………四七九
 茶調散……………四七九
 芎犀圓……………四七九
 神芎圓……………四八〇
 萊菔汁……………四八〇
 加減辛夷散……………四八〇
 〔虛證〕大芩辛湯……………四八〇
 如聖餅子……………四八〇
 消風散……………四八一
 大附圓……………四八一
 四川圓……………四八一
 硫黃圓……………四八二
 葫蘆巴散……………四八二

又方點頭散……………四八二
 附子湯……………四八二
 葦撥散……………四八三
 至靈散……………四八三
 一字經金散……………四八三
 川烏散……………四八三
 天香散……………四八四
 白附子散……………四八四
 備急圓……………四八四
 四柱散……………四八四
 二陳湯……………四八五
 瓜蒂散……………四八五
 都梁圓……………四八五
 灸法……………四八五
 眞頭痛……………四八五

柏連散……………四八六
 治面上肺風瘡……………四八六
 硫黃膏……………四八六
 指爪破面……………四八七
 治粉刺……………四八七
 玉盤散……………四八七
 滑石散……………四八七
 得法染鬚方……………四八七
 又方四……………四八八
 洗面藥……………四八九

耳病
 秘傳降氣湯……………四九〇
 小清肺飲……………四九〇
 排風湯……………四九〇
 塞耳丹……………四九〇
 治耳卒風腫毒起……………四九〇

蠟彈圓……………四九〇
 乾蝎散……………四九一
 解倉飲子……………四九一
 羊腎圓……………四九一
 安腎圓……………四九二
 黃耆圓……………四九二
 清神散……………四九二
 菴蓉圓……………四九二
 犀角飲子……………四九三
 八味圓……………四九三
 小柴胡湯……………四九三
 雄黃圓……………四九三
 地黃圓……………四九四
 芷芎散……………四九四
 芍藥散……………四九四
 治耳久聾……………四九五

耳鳴方	四九五	蟻入耳	四九八
耳熱出汗方	四九五	蜈蚣入耳	四九八
久聾方	四九五	治耳中有物不可出	四九八
又方	四九五	鼻病	
耳痛方	四九五	茶調散	四九六
又方	四九六	辛夷散	四九六
驢膏	四九六	川椒散	四九六
立效散	四九六	南星飲	四九九
麝香散	四九六	細辛膏	四九九
治耳內痛方	四九七	治久患鼻膿	五〇〇
百蟲入耳	四九七	芎藭散	五〇〇
耳中出血	四九七	人參順氣散	五〇〇
蒼蠅入耳	四九七	白芷散	五〇〇
通耳法	四九七	白龍圓	五〇〇
透耳筒	四九七	大風油	五〇一
惡蟲入耳	四九七	又方	五〇一
		凌霄花散	五〇一
		又方	五〇二
		硫黃散	五〇二
		白圓散	五〇二
		梔子仁圓	五〇二
		治酒瘡	五〇二
		〔鼈鼻〕細辛散	五〇二
		通草膏	五〇三
		雄黃散	五〇三
		〔鼻瘡〕甘露飲	五〇三
		黃連阿膠圓	五〇三
		又方敷藥	五〇三
		瓜丁散	五〇三
		消鼻痔方	五〇四
		灸法	五〇四
		衄血方	五〇四

腋氣

蜘蛛散	五〇四	獨勝散	五〇九
六物散	五〇五	〔挑生毒〕升麻湯	五〇九
中毒		又方	五〇九
石刻方	五〇五	奇方	五〇〇
解毒圓	五〇六	〔解砒毒〕稀涎散	五〇〇
泉僧方	五〇六	雄黃圓	五〇〇
礬灰散	五〇六	參苓白朮散	五〇〇
保靈丹	五〇六	又方四	五〇〇
萬病解毒圓	五〇七	解射罔毒	五〇一
青黛雄黃散	五〇七	解巴豆毒	五〇一
丹砂圓	五〇八	解天雄附子烏頭毒	五〇一
單方	五〇八	解丹毒	五〇一
薺萆湯	五〇八	解一切菌毒	五〇一
國老飲	五〇八	又方	五〇一
解諸毒	五〇九	又解諸毒	五〇一
		中諸藥毒	五二二
		解鼠莽毒	五二二
		又方二	五二二
		治獾犬傷	五二二
		又方	五二二
		蜈蚣毒	五二三
		又方	五二三
		蜂蠶毒	五二三
		斑貓毒	五二三
		鱧鯊蝦蟆毒	五二三
		河豚魚毒	五二三
		蛇傷毒	五二三
		又方四	五二三
		虎傷	五二四
		蜘蛛咬	五二四
		狗咬	五二四

又方	五二四
狗咬涎文瘡	五二四
又方	五二四
馬咬	五二四
蚯蚓咬	五二四
貓咬 <small>蠶咬 壁虱</small>	五二四
鼠咬	五二四
壁鏡咬	五二五
蝸咬	五二五
八脚蟲傷方	五二五
灸法	五二五
諸蟲	
烏梅圓	五二五
集效圓	五二六
化蟲散	五二六
貫衆酒	五二六
下寸白蟲	五二六
救急	
救自縊法	五二七
救溺水	五二七
又法	五二七
又方	五二七
又法三	五二七
救凍死	五二八
又法	五二八
救斃死	五二八
灸法	五二八
破棺散	五二八
又方二	五二九
單方三	五二九
備急散	五二九
雄朱散	五二九
又方二	五二九
朱犀散	五三〇
又方三	五三〇
骨鯁入喉	五三〇
又方二	五三二
玉屑無憂散	五三二
蜜綿法	五三二
又方三	五三二
神效解毒圓	五三二
魚骨鯁	五三二
又方	五三二
獸骨鯁	五三二
備急圓	五三二
誤吞蜈蚣	五三二
誤吞銅物	五三三

怪疾 得效四十六方 五二三

卷十一	
小方科	
活幼論	五三二
初生	
拭穢法	五三六
刺泡法	五三七
回氣法	五三七
通便法	五三七
貼顯藥	五三七
奇方	五三七
又方二	五三七
噤風	
辰砂膏	五三八
益脾散	五三八

單方 五三九

臍風

天麻圓	五三九
立聖散	五三九
麝香散	五四〇
治臍腫	五四〇
安臍散	五四〇
撮口	
僵蠶方	五四〇
天麻圓	五四一
蝸梢散	五四一
不乳	
奇方	五四二
又方	五四二
茯苓圓	五四二
川白薑散	五四二

變蒸

惺惺散	五四一
紫霜圓	五四一
人參散	五四三
當歸散	五四三
調氣散	五四三
通治	
乳哺法	五四四
護養法	五四四
相兒命短長法	五四四
四君子湯	五四五
驚候 <small>附天癆</small>	
〔治驚〕大安神圓	五四六
星香散	五四七
來復丹	五四七
又方安神圓	五四七

奪命丹	五四九
〔涼驚〕小驚圓	五四九
通心飲	五四九
大青膏	五四九
〔利驚〕蟬退散	五四九
利驚圓	五四九
人參湯	五五〇
涼肝圓	五五〇
胎驚方	五五〇
急驚	
通心飲	五五〇
涼肝圓	五五〇
大青膏	五五二
加味壽星圓	五五二
芎活湯	五五二
釣藤飲	五五二

塗額法	五五三
浴體法	五五三
慢驚	
白朮散	五五三
益黃散	五五三
安神圓	五五三
南星飲	五五三
防風圓	五五三
觀音散	五五三
五苓散	五五三
小釣藤飲	五五三
南附湯	五五四
丁附湯	五五四
蘇合香圓	五五四
灸法	五五四
慢脾	

黑附湯	五五五
川烏散	五五五
金液丹	五五五
生附四君子湯	五五五
蝎附散	五五五
靈砂	五五六
震靈丹	五五六
截風	
蛇頭圓	五五六
大風膏	五五七
奪命散	五五七
防風溫膽湯	五五八
人參羌活散	五五八
銀白散	五五八
開關散	五五九
嚏驚散	五五九

諸癩

人參羌活散	五五九
牛黃清心圓	五六〇
蛇頭圓	五六〇
小驚圓	五六〇
南附湯	五六〇
紫霜圓	五六〇
得效方	五六〇
養正丹	五六〇
豬膽南星散	五六〇
肥兒圓	五六一
外感	
麥湯散	五六一
惺惺散	五六一
香葛湯	五六一
參蘇飲	五六一

柴胡散

柴胡散	五六二
人參羌活散	五六二
〔傷暑〕香薷散	五六二
五苓散	五六三
〔傷濕〕香蘇散	五六三
不換金正氣散	五六三
理中湯	五六三
平胃散	五六三
諸熱	
〔潮熱〕通心飲	五六三
甘露飲	五六三
天竺黃散	五六四
通苓散	五六四
〔驚風熱〕大青膏	五六四
小驚圓	五六四
通心飲	五六四

涼肝圓

涼肝圓	五六四
〔傷積熱〕葱湯圓	五六四
白朮散	五六四
盧氏感應圓	五六四
〔麻豆熱〕參蘇飲	五六四
惺惺散	五六四
變蒸熱方	五六四
〔疳熱〕白朮散	五六四
蟾酥圓	五六四
〔瘧毒熱〕人參羌活散	五六四
〔胎熱〕釀乳方	五六五
生地黃湯	五六五
〔骨蒸熱〕生犀散	五六五
又方	五六六
〔實熱〕導赤散	五六六
瀉白散	五六六

瀉黃散	五六六
涼肝圓	五六七
寒水石散	五六七
豆卷散	五六七
八正散	五六七
洗心散	五六七
皂角膏	五六八
葱涎膏	五六八
(虛熱)地骨皮散	五六八
甘露飲子	五六八
人參黃耆散	五六九
痰嗽	
半夏圓	五六九
蕩皮圓	五六九
參蘇飲	五六九
秘傳降氣湯	五六九

金沸草散	五六九
華蓋散	五六九
人參清肺湯	五六九
澄清飲	五七〇
靈白圓	五七〇
紫蘇飲	五七〇
疹瘡	
(表解虛證)參蘇飲	五七一
惺惺散	五七一
(熱證)如聖湯	五七一
人參羌活散	五七一
香葛湯	五七一
三豆飲	五七一
(發出)紫草飲	五七二
加味四聖散	五七二
紫草木香湯	五七二

紫草木通湯	五七三
快斑散	五七三
人參羌活散	五七三
活血散	五七三
薑附湯	五七三
黃芩甘草湯	五七三
萬金散	五七四
奇方	五七四
又方	五七四
(發脹)調解散	五七四
藿香正氣散	五七五
龍腦膏子	五七五
(救陷)加味宣風散	五七五
獨聖散	五七五
五福化毒丹	五七六
人齒散	五七六

靈砂酒	五七六
民望方	五七六
(催乾)犀角地黄湯	五七六
如聖湯	五七七
(護眼)神應膏	五七七
加減四物湯	五七七
蟬菊散	五七七
決明散	五七八
羌菊散	五七八
奇方	五七八
治豌豆瘡入目方	五七八
密蒙花散	五七九
決明圓	五七九
又方	五七九
通聖散	五七九
決明散	五七九

熏藥	五七九
洗方	五八〇
塞耳丹	五八〇
(消毒)加味犀角飲	五八〇
射干湯	五八〇
連翹飲	五八〇
五福化毒丹	五八一
甘露飲	五八一
瘡爛成片方	五八一
活血散	五八二
敗草散	五八二
樛方	五八二
(通治)木香散	五八二
異功散	五八三
白朮散	五八三
人參麥門冬散	五八三

消風散	五八四
五苓散	五八四
四順清涼飲	五八四
大如聖湯	五八四
枳殼桔梗湯	五八四
二陳湯	五八四
理中湯	五八五
豆蔻圓	五八五
蘇合香圓	五八五
捷效化毒散	五八五
二參飲	五八五
木筆花散	五八六
滅癩散	五八六
又方	五八六
綿繭散	五八六
瘡疾	

〔表解〕香蘇香薷散	五七	枳實理中圓	五九〇	又方	五九四
十神湯	五七	桔梗枳殼湯	五九〇	螞針法	五九四
五苓散	五七	客忤			
人參湯	五七	蘇合香圓	五九〇	大安神圓	五九五
草果平胃散	五七	雄麝散	五九一	益黃散	五九五
爭功散	五七	犀角散	五九一	生熟地黃湯	五九五
〔截瘡〕勝金圓	五八	黃土散	五九一	清肺湯	五九五
蕩脾圓	五八	卷十二		地黃圓	五九五
通神餅	五八	小方科		胡黃連圓	五九六
參苓白朮散	五八	瘴毒		五福化毒丹	五九六
癍氣		平血飲	五九三	至聖圓	五九六
紅圓子	五九	內托散	五九三	銅青散	五九六
又方	五九	敗毒散	五九三	下蟲圓	五九七
木鱉膏	五九	〔通治〕平血飲	五九四	大蘆薈圓	五九七
灸法	五九〇	又方四	五九四	龍腦圓	五九七
痞結		洗方	五九四	保童圓	五九八

白朮散	五九八	敷藥	六〇三	史君餅	六〇七
木香圓	五九八	針法	六〇三	四君子湯	六〇七
褐圓子	五九八	丁奚哺露	六〇三	化蟲圓	六〇七
黃耆湯	五九八	十全丹	六〇三	碧金散	六〇七
鯨血圓	五九九	魃病		安蟲散	六〇八
蚶蚊圓	六〇〇	龍膽湯	六〇四	嘔吐	
又方	六〇〇	積滯		〔驚吐〕安神圓	六〇八
〔通治〕蟾酥圓	六〇〇	葱湯圓	六〇五	硫黃散	六〇八
肥兒圓	六〇一	消積圓	六〇五	〔冷吐〕益黃散	六〇九
六神圓	六〇一	化鐵丹	六〇六	〔熱吐〕通心飲	六〇九
五珍圓	六〇一	盧氏感應圓	六〇六	〔涎吐〕半夏圓	六〇九
小黃連阿膠圓	六〇二	紅圓子	六〇六	〔積吐〕益黃散	六〇九
疳啞不能發聲方	六〇二	蘇感冒	六〇六	〔風吐〕大青膏	六〇九
豬肚黃連圓	六〇二	異香散	六〇六	吐乳	
洗方	六〇三	縮砂香附湯	六〇六	理中湯	六〇九
又方	六〇三	殺蟲		掌中金	六二〇

丁香散……………六二〇

金液丹……………六二二

〔冷熱不調瀉〕和安散……………六二四

藿香正氣散……………六二〇

單方……………六二二

枇杷葉散……………六二四

〔濕熱不時暴嘔〕香葛

灸法……………六二三

來復丹……………六二四

湯……………六二〇

泄瀉

養臟湯……………六二四

香蘇散……………六二〇

〔驚瀉〕安神圓……………六二三

香連圓……………六二四

〔交精吐奶〕四君子湯……………六二〇

小驚圓……………六二三

〔腎泄〕震靈丹……………六二四

吐乳不止恐成脾風方……………六二〇

白朮散……………六二三

〔梅月天時行瀉〕香葛

霍亂

〔疳瀉〕白朮散……………六二三

下痢

又方……………六二一

蟾酥圓……………六二三

湯……………六二四

總說……………六二一

史君餅……………六二三

地榆散……………六二五

白朮散……………六二一

〔積瀉〕消積圓……………六二三

又方……………六二五

五苓散……………六二一

〔熱瀉〕五苓散……………六二三

小黃連阿膠圓……………六二五

又方……………六二二

通心飲……………六二三

四生散……………六二五

六和湯……………六二二

冷瀉方……………六二三

大柴胡湯……………六二六

香薷圓……………六二二

理中湯……………六二三

木香散……………六二六

來復丹……………六二二

豆蔻散……………六二四

朴附圓……………六二六

香連圓……………六二六

六神湯……………六二九

當歸散……………六三二

養臟湯……………六二六

益黃散……………六二九

釣藤膏……………六三三

小駐車圓……………六二六

醒脾散……………六二九

魏香散……………六三三

罌粟飲……………六二七

勻氣散……………六三〇

吐衄

石蓮散……………六二七

觀音散……………六三〇

蒲黃散……………六三三

眞料參苓白朮散……………六二七

腹痛

生地黃汁方……………六三三

等住圓……………六二七

四順清涼飲……………六三〇

鼻衄方……………六三三

小駐車圓……………六二七

七氣湯……………六三〇

腫滿

炒鷄子……………六二七

蘇合香圓……………六三〇

五苓散……………六三四

感應圓……………六二八

枳殼桔梗湯……………六三二

香薷散……………六三四

靈砂圓……………六二八

疝氣

分氣飲……………六三四

牛乳湯……………六二八

金鈴散……………六三二

五皮散……………六三四

脾胃

紅圓子……………六三二

奇方……………六三四

白朮散……………六二八

小檳榔圓……………六三二

三黃散……………六三四

阿膠散……………六二八

又方金鈴子圓……………六三三

單方……………六三五

史君子圓……………六二九

五苓散……………六三三

盜汗

白朮散…………… 六五
 安神圓…………… 六五
 小驚圓…………… 六五
 又方…………… 六五
 黃耆建中湯…………… 六五
 牡蠣散…………… 六五
 奇方…………… 六五
 又方…………… 六六
 項軟
 天柱圓…………… 六六
 五加皮散…………… 六六
 健骨散…………… 六六
 生筋散…………… 六六
 語遲
 菖蒲圓…………… 六七

明礬散…………… 六七
 月蝕耳瘡方…………… 六八
 又方…………… 六八
 重舌
 傅藥…………… 六八
 木舌
 紫雪…………… 六八
 又方二…………… 六九
 滯頤
 (冷證)溫脾圓…………… 六九
 (熱證)通心飲…………… 六九
 口角瘡爛方…………… 六九
 咽喉
 射干湯…………… 七〇
 喉痺腫痛方…………… 七〇
 夜啼

導赤散…………… 七〇
 六神散…………… 七〇
 蒜圓…………… 七一
 安神圓…………… 七一
 黃土散…………… 七一
 觸犯禁忌夜啼方…………… 七一
 顛陷
 單方…………… 七一
 顛填
 集說…………… 七二
 解顛
 地黃圓…………… 七二
 三辛散…………… 七三
 又方二…………… 七三
 手拳不展
 薏苡圓…………… 七三

脚拳不展
 海桐皮散…………… 七四
 行遲
 地黃圓…………… 七四
 又方虎骨圓…………… 七四
 五加皮散…………… 七四
 鶴節
 地黃圓…………… 七五
 龜胸
 百合丹…………… 七五
 龜背
 松蕊丹…………… 七六
 灸法…………… 七六
 髮不生
 菴蓉圓…………… 七六
 不生

芎黃散…………… 七七
 單方…………… 七七
 瘡毒
 平血飲…………… 七七
 犀角消毒飲…………… 七七
 五福化毒丹…………… 七七
 小牛黃圓…………… 七七
 角無辜瘡毒…………… 七六
 諸般惡瘡…………… 七六
 鯽魚方…………… 七六
 如聖黑膏…………… 七六
 癩瘡方…………… 七六
 魚臍瘡方…………… 七六
 蠅蝮瘡方…………… 七六
 癬方…………… 七六
 濕癬瘡方…………… 七六

炙甲散…………… 七九
 漏瘡方…………… 七九
 白斂散…………… 七九
 三物散…………… 八〇
 生附散…………… 八〇
 陰瘡方…………… 八〇
 胎毒瘡方…………… 八〇
 卽效方…………… 八〇
 疣目瘡方…………… 八〇
 諸惡瘡方…………… 八〇
 口瘡
 瀉心湯…………… 八四
 連翹飲…………… 八四
 洗心散…………… 八四
 敷藥…………… 八四
 貼藥…………… 八四

軟癰	又方二	六四二	遺尿	灸法	六四四	蟬退散	六四八
豬頭散	六四三	雞腸散	六四五	傳藥地龍膏	六四八	又方	六四八
又方三	六四三	又方	六四五	牡蠣散	六四八	又方	六四八
斂瘡口方	六四二	〔尿白〕茯苓散	六四五	又方	六四八	遇仙方	六四八
脫肛	六四二	又方	六四五	淋閉	六四九	卒暴	六四九
釣腸圓	六四三	葵子散	六四六	導赤散	六四六	捷方	六四九
瓜萘圓	六四三	導赤散	六四六	尿血方	六四六	又方三	六四九
痢頻脫肛黑色生殼方	六四三	順經散	六四六	大便秘	六四七	斷乳	六四九
龍骨散	六四三	沒藥散	六四七	陰腫	六四七	畫眉膏	六四九
洗方	六四四	三白散	六四七	桃仁圓	六四七	論雜風狀	六五一
又方二	六四四	又方	六四七	星香飲	六六〇	中風惡證	六五二
貼方	六四四	防風通聖散	六六一	三黃湯	六六一	中風要說	六五二
水聖散子	六四四	小省風湯	六六一	小省風湯	六六一	解語湯	六六六
紫葳膏	六四四	洗心散	六六二	四順清涼飲	六六二	加味壽星圓	六六六
又方	六四四	小通聖散	六六二	清神散	六六二	排風湯	六六六
虛證		茶調散	六六三	川芎石膏湯	六六三	蝎麝白圓子	六六七
通氣驅風湯	六五三	消風散	六六三	透冰丹	六六四	救急稀涎散	六六八
加減續命湯	六五四	解毒雄黃圓	六六四	大秦芫散	六六五	苦丁香散	六六八
大省風湯	六五五	通關散	六六五	通關散	六六五	禹功散	六六八
順元散	六五五	通治		星香飲	六六〇	又方二	六六八
二香三建湯	六五五	人參羌活散	六六〇	防風通聖散	六六一	神柏散	六六九
一粒金丹	六五五	金沸草散	六六〇	三黃湯	六六一	去風丹	六六九
萬金湯	六五七	虎骨酒	六五九	小省風湯	六六一	豆淋酒法	六七〇
八寶回春湯	六五八	熱證		四順清涼飲	六六二	枳皮酒	六七〇
眞珠圓	六五八	人參羌活散	六六〇	清神散	六六二	萊菔膏	六七〇
禦風膏	六五九	通關散	六六五	茶調散	六六三	一得散	六七〇
又方三	六五九	通治		川芎石膏湯	六六三	又方	六七〇
獨行散	六七〇	通治		透冰丹	六六四	獨行散	六七〇

又方	六七一
趁風膏	六七一
乳靈圓	六七二
追風獨活散	六七二
仙桃圓	六七二
奇方	六七三
治暗風倒地方	六七三
神應方	六七三
烏蝎圓	六七三
四神圓	六七三
腎瀝湯	六七三
乳香尋痛圓	六七四
牛黃清心圓	六七五
烏荊圓	六七五
青州白圓子	六七六
蘇青圓	六七六

蛇黃散	六七六
琥珀圓	六七六
辰砂圓	六七七
妙應圓	六七七
大九寶飲	六七七
烏附圓	六七八
威靈仙圓	六七八
茯神圓	六七八
皂角六一圓	六七九
金汞靈丹	六七九
香附湯	六八〇
正舌散	六八〇
仙茅散	六八一
活絡丹	六八一
黑龍圓	六八二
左經圓	六八三

川芎散	六八三
枳實酒	六八四
貼藥芫花散	六八四
天仙膏	六八四
洗方	六八四
燒竹瀝法	六八四
灸法	六八五
又法	六八五
痛風	
得效第一方	六八五
仙方	六八六
解毒雄黃圓	六八六
浴法	六八六
換骨丹	六八六
遇仙丹	六八七
疏風散	六八七

佛手膏	六八七
去毒丹	六八八
甘草散	六八八
解毒圓	六八八
福神丹	六八九
水膏藥	六八九
通天再造散	六八九
三濟圓	六九〇
八葉湯	六九〇
瘰癧風	
排風湯	六九一
加減續命湯	六九一
蘇合香圓	六九一
不換金正氣散	六九一
一粒金丹	六九一
大鐵彈圓	六九一

大四斤圓	六九二
歷節風	
羌活湯	六九二
趁痛圓	六九三
附子八物湯	六九三
烏頭湯	六九三
虎骨散	六九三
麝香圓	六九四
獨活寄生湯	六九四
麻黃散	六九四
神授圓	六九四
歷節癩風方	六九五
白虎風走注癢痛方	六九五
又方二	六九五
攝風酒	六九五
癩風	

何首烏散	六九六
如聖膏	六九七
又方三	六九七
灸法	六九七
卷十四	
產科兼婦人雜病科	
濟陰論	六九九
護胎	
驗胎法	七〇三
參蘇飲	七〇三
香蘇散	七〇三
石膏湯	七〇三
加減安胎飲	七〇四
桑寄生散	七〇四
治漏胎	七〇五
治胎動	七〇五

急救方	七〇五
黃芩湯	七〇五
小安胎飲	七〇五
加味二陳湯	七〇六
小紫蘇飲	七〇六
木香圓	七〇六
白朮散	七〇七
紅圓子	七〇七
保生圓	七〇七
參苓白朮散	七〇七
杜仲圓	七〇八
歸涼節命散	七〇八
內補圓	七〇八
竹茹湯	七〇九
竹葉湯	七〇九
知母圓	七〇九

榆白皮散	七〇九
知母飲	七一〇
保氣散	七一〇
冬葵子散	七一〇
大腹皮散	七一一
鯉魚湯	七一一
八味圓	七一一
赤小豆湯	七一一
腎著湯	七一一
安胎和氣散	七一二
紫蘇飲子	七一二
安榮散	七一二
桑螵蛸散	七一三
二白散	七一三
當歸芍藥散	七一三
蒙薑黃連圓	七一三

鷄黃散	七二四
生料平胃散	七二四
百合散	七二四
羚羊角散	七二四
人參養胃湯	七二五
清脾湯	七二五
消風散	七二五
天門冬飲子	七二六
治傷寒熱病護胎方	七二六
單胎散	七二六
治好娠咳嗽方	七二七
又方	七二七
苦參圓	七二七
八味圓	七二七
治好娠大便秘方	七二七
治好娠洞泄寒中方	七二八

八正散	七二八
治好娠失音不能言方	七二八
產前軟胯方	七二八
大聖茯苓散	七二九
救生散	七二九
枳殼散	七二九
治兒在腹中哭方	七三〇
治鬼胎方	七三〇
轉女爲男法	七三〇
胎殺避忌	七三二
保產	
收生法	七三二
補中湯	七三三
神妙佛手散	七三三
神應黑散	七三三
龍蛻散	七三三

遇仙雄黃丹	七三四
加味芎歸湯	七三四
勝金散	七三四
應急方	七三四
催生湯	七三五
催生丹	七三五
烏金散	七三六
香桂散	七三七
奪命圓	七三七
養正丹	七三七
備急圓	七三七
蛇蛻散	七三七
七聖散	七三六
乳珠丹	七三六
神驗散	七三六
如意散	七三六

一字神散	七三九
療難產方	七三九
又方	七三九
治橫逆方	七三九
治死胎不下方	七三九
治產難胞衣不出方	七三九
單方	七四〇
如聖膏	七四一
奪命丹	七四一
牛膝湯	七四一
花蕊石散	七四一
灸法	七四一
方產戒忌	七四二
產後	
黑神散	七四二
黑龍丹	七四二

血竭散	七三三
芸藿散	七三三
奇效方	七三三
半夏茯苓湯	七三四
牡丹散	七三四
芎歸湯	七三四
又方四	七三四
加味五積散	七三四
玉露散	七三五
逍遙散	七三五
知母湯	七三五
增損四物湯	七三五
五苓散	七三六
黃耆益損湯	七三六
竹葉防風湯	七三六
陽旦湯	七三六

柴胡地黃湯	七三六
神效白散子	七三七
大調經散	七三七
枳朮湯	七三七
奪魂散	七三六
小調經散	七三六
大聖散	七三六
蘇合香圓	七三六
妙香散	七三六
又大聖散	七三六
大豆紫湯	七三九
獨活寄生湯	七三九
濟危上丹	七三九
麻黃根散	七三九
立效方	七四〇
七珍散	七四〇

孤鳳散	七四〇
愈風散	七四〇
交加散	七四一
趁痛散	七四一
如神湯	七四二
五香連翹湯	七四二
抵聖湯	七四二
產後嘔逆不止方	七四二
產後霍亂三方	七四二
芎附散	七四二
川芎茶調散	七四三
芎烏散	七四三
二母散	七四三
旋覆花湯	七四三
小參蘇飲	七四三
大料煮芎藭湯	七四四

四物湯	七四四
牡蠣散	七四四
延胡索散	七四四
又方	七四四
紫金圓	七四四
羊肉湯	七四五
經效方	七四五
人參當歸散	七四五
蒲黃散	七四六
熟地黃湯	七四六
當歸芍藥散	七四六
草果飲子	七四六
生熟飲子	七四六
石子湯	七四七
人參蟹甲散	七四七
人參散	七四八

黃耆散	七四八
小調經散	七四八
丁香散	七四八
石蓮散	七四九
固經圓	七四九
加味五積散	七四九
四君子湯	七五〇
的奇散	七五〇
黃連阿膠圓	七五〇
理中湯	七五〇
真人養臟湯	七五〇
阿膠枳殼圓	七五〇
又方二	七五〇
蘇麻粥	七五一
木通散	七五一
灸法	七五一

茅根湯	七五一
桑螵蛸散	七五二
蒲黃散	七五二
當歸散	七五二
硫黃散	七五二
熨法	七五三
桃仁膏	七五三
硫黃湯	七五三
樗枝散	七五三
又方二	七五三
當歸養血圓	七五四
四神散	七五四
當歸黃耆湯	七五四
四順理中圓	七五四
當歸建中湯	七五五
濟陰丹	七五五

人參養血圓	七五六	芎歸湯	七六四	三黃圓	七七二
單方	七五六	通真圓	七六五	喘嗽	
捷徑方	七五八	白薇散	七六五	人參散	七七三
內灸散	七五六	大烏鷄煎圓	七六六	噲化圓	七七三
下乳汁		大效內補圓	七六七	貝母湯	七七三
奇效方	七五七	小嘉禾散	七六八	金不換散	七七四
漏蘆散	七五七	大聖散	七六九	千縉湯	七七四
成煉鍾乳粉	七五六	大玄胡索散	七七〇	調經	
母猪蹄湯	七五六	灸法	七七一	煮附圓	七七四
青桑膏	七五六	感冒		滋血湯	七七五
卷十五		麻黃湯	七七一	涼血飲	七七五
產科兼婦人雜病科		解肌湯	七七一	紫石英圓	七七六
通治		人參湯	七七一	當歸散	七七六
四物湯	七五九	桂枝紅花湯	七七二	通經圓	七七七
莪朮散	七六二	海蛤散	七七二	茱萸鹿茸圓	七七七
加味五積散	七六三			三稜圓	七七八

治經脉不利方	七七八	手拈散	七八二	葱白散	七八六
沒藥散	七七八	煮附圓	七八二	腸單	
撞氣阿魏圓	七七九	三稜煎圓	七八二	烏喙圓	七八七
艾煎圓	七七九	血瘦		食積	
濟陰丹	七七九	桃仁煎圓	七八二	三稜煎	七八七
杜牛膝散	七七九	琥珀圓	七八三	紅圓子	七八八
大油煎散	七七九	通經圓	七八三	膈氣	
血氣		黑神圓	七八三	五膈寬中散	七八八
抽刀散	七八〇	血蠱		分心氣飲	七八八
二神圓	七八〇	木香散	七八四	沉香降氣湯	七八八
沒藥散	七八〇	溫白圓	七八四	血風	
玄胡索湯	七八〇	血癖		人參荊芥散	七八八
琥珀散	七八一	紅圓子	七八五	單方	七八九
三神圓	七八一	大麝香圓	七八五	小黑神圓	七八九
失笑散	七八二	神效方	七八五	大芎藭散	七八九
奇方	七八二	小烏鷄煎圓	七八六	羚羊角散	七八九

歷節風	七九〇
麝香圓	七九〇
血虛	七九〇
加味補虛湯	七九〇
靈砂丹	七九一
薤白湯	七九一
桂香散	七九一
顛狂	七九二
加味逍遙散	七九二
小柴胡湯	七九二
煩熱	七九二
油煎散	七九二
逍遙散	七九三
清心蓮子飲	七九三
春雪膏	七九三
朱砂膏	七九三
敗毒散	七九四
黃耆散	七九四
心痛	七九四
九痛圓	七九四
奇方	七九四
又方	七九五
腹痛	七九五
北亭圓	七九五
奇方	七九五
脇痛	七九五
木通散	七九五
賺氣散	七九六
風痺	七九六
三痹湯	七九六
臂痛	七九七
舒經湯	七九七
交加散	七九七
神保圓	七九七
四物湯	七九七
搗搦	七九八
白薇圓	七九八
澤蘭圓	七九八
洪濁	七九八
二豆散	七九八
勝金圓	七九八
餘糧散	七九九
烏金散	八〇〇
又方	八〇〇
白濁	八〇〇
金鎖正元丹	八〇〇
秘精圓	八〇〇
四七湯	八〇〇

崩漏	八〇一
鎮宮圓	八〇一
柏子仁湯	八〇一
秘方龍骨圓	八〇一
平胃散	八〇一
滋榮圓	八〇一
加味四物湯	八〇一
熟附圓	八〇二
金華散	八〇二
黃芩湯	八〇三
又方二	八〇三
梅飲子	八〇三
又方	八〇三
五倍子散	八〇三
奇效四物湯	八〇四
豆花散	八〇四
帶下	八〇四
灸法	八〇四
又方	八〇四
白斂圓	八〇五
當歸煎	八〇五
卷柏圓	八〇五
紫金散	八〇五
香附散	八〇六
白芷圓	八〇六
白芍藥散	八〇六
秋霜丹	八〇七
求嗣	八〇七
溫經湯	八〇七
暖宮圓	八〇七
抑氣散	八〇八
小溫經湯	八〇八
秦桂圓	八〇八
陽起石圓	八〇九
濟陰丹	八〇九
灸法	八〇九
雜方	八〇九
厚朴圓	八〇九
芎歸湯	八〇九
橄欖圓	八〇九
橘歸圓	八〇九
八味圓	八〇九
鹿茸圓	八〇九
芍藥湯	八〇九
虎骨散	八〇九
補心湯	八〇九
狼牙湯	八〇九
雄黃兌散	八〇九

洗湯湯	八二二
養香養胃湯	八二二
奶癰瘡	八二三
又方	八二三
治茄子疾	八二三
又方二	八二三
傳藥	八二三
下疳病方	八二四
又方	八二四
磁石圓	八二四
鐵粉散	八二四
熏洗方	八二四
托藥	八二四
糝藥	八二四
敷藥	八二四
治陰腫不收	八二五
卷十六	
眼科	
膏髮煎	八二五
治脚赤腫	八二五
治陰瘡	八二五
又方三	八二五
治疔瘡	八二六
治陰中生瘡	八二六
黃芩散	八二六
治陰門腫方	八二六
月經不行說	八二七
洗心散	八二七
三茱圓	八二七
一捻金圓	八二八
四物湯	八二八
又方	八二八
總論	八一九
五輪八廓	八二〇
七十二證方	八二三
〔內障〕補肝散	八二三
補腎圓	八二三
通肝散	八二四
八味還睛散	八二四
涼膽圓	八二六
羚羊角散	八二七
瀉肝散	八二七
〔外障〕大決明散	八二八
地黃散	八二九
二黃散	八二九
定心圓	八三〇
清涼散	八三一
磨翳膏	八三一

消毒飲	八三一
白薇圓	八三一
五退散	八三三
天門冬飲子	八三四
瀉肝散	八三四
地黃膏	八三五
經效散	八三五
通血圓	八三五
白僵蠶散	八三七
驅風一字散	八三七
犀角飲	八三六
牛黃膏	八三九
柴胡散	八三九
虛證	
加味磁朱圓	八四〇
大補腎圓	八四〇
養肝圓	八四一
錦鳩圓	八四一
駐景圓	八四二
青鹽圓	八四二
巴戟圓	八四二
花草膏	八四二
椒目圓	八四二
黑神散	八四二
加味參附正氣散	八四三
熱證	
八珍散	八四三
聖效散	八四三
地黃圓	八四四
決明散	八四四
敗毒散	八四五
羊肝圓	八四五
五行湯	八四五
地黃膏	八四五
又方	八四五
黃連湯	八四六
蔓荊散	八四六
春雪膏	八四六
穿針散	八四七
又方二	八四七
石決明散	八四七
食治方	八四七
貼藥	八四七
又方	八四八
風證	
消風散	八四八
菊花散	八四八
白蒺藜散	八四八

蟬花無比散……………八四九
 流氣飲……………八四九
 菩薩散……………八四九
 驅風散……………八五〇
 聖草散……………八五〇
 偶得方……………八五〇
 洗方……………八五一
 又方二……………八五一
 氣證
 木香流氣飲……………八五一
 分心氣飲……………八五一
 石膏羌活散……………八五二
 翳障
 退翳散……………八五二
 搗藥……………八五二
 觀音夢授方……………八五三

羊肝圓……………八五三
 點藥……………八五三
 呂仙翁方……………八五三
 單方……………八五三
 重明散……………八五四
 小五退散……………八五四
 麥門冬圓……………八五四
 還睛圓……………八五四
 龍膽膏……………八五五
 神仙照水膏……………八五五
 照水丹……………八五六
 通治
 點眼膏子……………八五六
 洗方湯泡散……………八五六
 水淋法……………八五七
 明上膏……………八五七

治赤眼後生翳膜方……………八五六
 洗眼方……………八五六
 小決明散……………八五八
 浮萍散……………八五八
 黃連膏……………八五九
 滌昏膏……………八五九
 通天散……………八五九
 飛絲入眼腫痛方……………八六〇
 運墨法……………八六〇
 灸法……………八六〇
 針法……………八六一
 拾遺十六方
 開明圓……………八六一
 當歸圓……………八六一
 明眼地黃圓……………八六二
 菊花散……………八六二

貼藥……………八六二
 搗鼻藥……………八六二
 決明圓……………八六三
 洗藥……………八六三
 點藥……………八六三
 密蒙花散……………八六三
 點眼藥……………八六四
 洗眼碧霞散……………八六四
 敷藥瞿麥散……………八六四
 陰翳圓……………八六四
 磨翳散……………八六五
 空青圓……………八六五
 卷十七
 口齒兼咽喉科
 總說……………八六七
 口病……………八六七

洗心散……………八六六
 四順清涼飲……………八六六
 甘露飲……………八六六
 鷄蘇圓……………八六六
 黃連阿膠圓……………八六六
 秘傳降氣湯……………八六八
 龍石散……………八六八
 綠雲膏……………八六九
 升麻散……………八六九
 碧雪……………八六九
 換金散……………八六九
 赴筵散……………八六九
 傅方……………八七〇
 杏粉膏……………八七〇
 青黛散……………八七〇
 芎芷膏……………八七〇

益智散……………八七〇
 鵬砂圓……………八七一
 又方……………八七一
 遠志散……………八七一
 又方二……………八七一
 獨勝散……………八七一
 立效散……………八七一
 茱萸散……………八七一
 貼足方……………八七一
 濯足法……………八七二
 唇病
 菊花圓……………八七二
 瀉黃飲子……………八七二
 薏苡仁湯……………八七三
 橄欖散……………八七三
 白灰散……………八七三

灸法	八七四
舌病	
升麻柴胡湯	八七四
金沸草散	八七四
正舌散	八七四
五福化毒丹	八七四
礬石散	八七四
治木舌方	八七五
又方二	八七五
黑散子	八七五
薄荷蜜	八七六
文蛤散	八七六
必勝散	八七六
酣飲喉舌生瘡方	八七六
治重舌方	八七六
又方	八七六

舌無故出血方	八七七
治舌腫脹方	八七七
治舌強腫起	八七七
烙腫法	八七七
治失音	八七七
齒病	
安腎圓	八七七
八味圓	八七七
嘉禾散	八七七
玉池散	八七八
蟾酥圓	八七八
蝸附散	八七八
細辛散	八七八
二陳湯	八七九
靈脂醋	八七九
甘露飲	八七九

荊槐散	八七九
鬱金散	八七九
治牙宣三方	八七九
搐鼻方	八八〇
塞耳方	八八〇
揩牙方	八八〇
治牙齒痛方	八八〇
治風蝨牙疼方	八八〇
乳香膏	八八一
治牙痛方	八八一
逡巡散	八八一
牢牙散	八八一
莽草散	八八二
防風散	八八二
消風散	八八二
又法	八八二

香椒散	八八二
川芎散	八八二
秘方揩牙散	八八三
牙痛四證	八八三
取蟲方	八八三
揩漱方	八八三
已驗方	八八四
甘松香散	八八四
秘方	八八四
小薊散	八八四
芫花散	八八四
治蛀牙疼	八八五
治風蛀牙痛	八八五
治血風蛀牙	八八五
又方二	八八五
治蟲蛀牙痛	八八五

敷藥退腫方	八八六
常用齒藥方	八八六
牙齒日長方	八八六
齒間肉壅方	八八六
灸法	八八六
又法	八八七
又方	八八七
導引方	八八七
輔車開方	八八七
又法	八八七
灸法	八八七
喉病	
秘傳咽喉科一十八種	
喉風證	八八八
針灸法	八八九
實熱	八九〇

虛熱	八九一
虛實灌漱藥	八九一
咽喉生瘡方	八九一
勝金散	八九一
防風散	八九二
玄明粉	八九二
追風散	八九二
死候	八九三
重舌木舌方	八九三
帝鍾風方	八九三
煮針法	八九三
合瘡口方	八九三
又方	八九三
破毒妙方	八九四
雄黃散	八九四
又方二	八九四

取喉中涎方	八九四	用藥加減法	九〇二	鷄鳴散	九一〇
開關潤喉蓬萊雪	八九四	腸肚傷治法	九〇三	活血丹	九一〇
開喉關方	八九五	又用藥加減法	九〇三	大嶽活血丹	九一〇
去涎方 併碎法	八九五	用麻藥法	九〇四	當歸散	九一一
又開喉關方	八九六	傷破肚皮用藥法	九〇五	花蕊石散	九一一
宣利方	八九六	打攪及樹木壓遍身痛者	九〇五	內損	
通後補助方	八九六	去惡血法	九〇五	大紫金皮散	九一二
乾喉風方	八九六	用藥湯使法	九〇六	沒藥圓	九一二
噎食風方	八九七	通治		打撲傷損	
潤關住痛方	八九七	攪撲刀傷接骨方	九〇六	加味芎藭湯	九一三
治誤吞銅鐵方	八九七	又方二	九〇七	木香勻氣散	九一三
卷十八		清心藥方	九〇八	麝香散	九一三
正骨兼金鐵科		自然銅散	九〇九	平胃散	九一三
秘論	八九九	又方	九〇九	雙烏散	九一三
正骨金瘡脉候	九〇一	導滯散	九〇九	救急方	九一四
十不治證	九〇二			洗心散	九一四

黑神散	九一四	消煩		又方七	九二〇
墜馬方	九一四	四聖散	九一八	活血聚皮不破方	九二一
蘇合香圓	九一四	傅藥		滅痕方	九二一
接骨散	九一四	活血散	九一八	又方	九二一
刀斧棒杖傷		治刀傷方	九一八	洗方	
禁聲飲子	九一五	治傷損方	九一八	荊葉散	九二二
龍骨膏	九一五	治折骨傷筋方	九一八	破傷風	
奪香散	九一六	地黃膏	九一九	玉真散	九二三
單方	九一六	單方	九一九	香膠散	九二三
取箭鏃		又方	九一九	急風散	九二三
天牛散	九一六	斂金瘡方	九一九	破傷濕	
神仙刀箭藥	九一六	又方	九一九	牡蠣散	九二三
又方	九一七	鉛粉散	九一九	舒筋法	
治箭鏃入骨方	九一七	白灰散	九一九	舒筋法	九二四
針灸傷		又方	九二〇	退腫	
內托黃耆圓	九一七	黃丹散	九二〇	蒼朮散	九二四

紫金皮散……………九四

麻藥……………九四

草烏散……………九五

合瘡口……………九五

松皮散……………九六

又方三……………九六

太乙膏……………九六

止血收瘡口方……………九七

又方二……………九七

乳香膏……………九七

斷筋……………九七

小香膠散……………九六

止痛……………九六

乳香散……………九六

應痛圓……………九六

尋痛圓……………九六

卷十九

瘡腫科

總說……………九三一

五發形圖……………九三四

秘傳十方……………九三六

前鋒正將……………九三六

引兵先鋒……………九三六

四面楚歌……………九三七

水師晶明……………九三七

替針丁香圓……………九三六

固壘元帥……………九三六

護壁都尉……………九三六

生肉神異膏……………九三九

止痛拔毒膏……………九三九

斂瘡口黃丹散……………九三九

通治……………九三九

車螯散……………九四〇

單煮大黃湯……………九四〇

五香散……………九四〇

五香連翹湯……………九四一

平補散……………九四一

加味十全湯……………九四一

眞方不換金正氣散……………九四二

阿膠飲子……………九四二

忍冬酒……………九四二

蠟礬圓……………九四三

粉乳托裏散……………九四三

五味子湯……………九四四

神白膏……………九四四

乳香膏……………九四四

追毒丹……………九四五

太乙膏……………九四五

善應膏……………九四六

玄武膏……………九四七

金絲膏……………九四七

貼膏法……………九四七

蜈針正法……………九四八

追毒餅……………九四八

內追毒丹……………九四八

〔雜證〕乾葛飲……………九四八

蘇子降氣湯……………九四九

縮砂香附湯……………九四九

人參敗毒散……………九四九

參苓白朮散……………九四九

六一湯……………九四九

八味圓……………九四九

嘉禾散……………九四九

乳香圓……………九四九

黑附圓……………九五〇

禁腫法……………九五〇

乳癰……………九五〇

瓜萋散……………九五〇

又方二……………九五〇

乳勞癰……………九五〇

又方三……………九五〇

吹乳……………九五二

又方二……………九五二

奶頭裂方……………九五二

灸法……………九五二

心癰……………九五二

涼血飲……………九五三

內托散……………九五三

加味十奇散……………九五三

腎癰……………九五三

八味圓……………九五三

加味十奇散……………九五三

肺癰……………九五三

桔梗湯……………九五三

葶藶散……………九五四

牡丹散……………九五四

補肺散……………九五五

理肺膏……………九五五

加味敗毒散……………九五五

〔內護〕排膿散……………九五五

葦葉湯……………九五六

五香白朮散……………九五六

雲母膏……………九五六

加味十奇散……………九五六

灸法……………九五七

腸癰……………九五七

敗醬散……………九五七
牡丹湯……………九五七
薏苡湯……………九五六
蠟礬圓……………九五六

附骨疽

蟾蜍膏……………九五八
黑鯽膏……………九五八
赤朮圓……………九五九

便毒

雙解散……………九五九
五香連翹湯……………九五九
復元通氣散……………九六〇
五苓散……………九六〇
蠟礬圓……………九六〇
四順清涼飲……………九六〇
木香流氣飲……………九六〇

增益四物湯……………九六六
五香連翹湯……………九六七
五苓散……………九六七
敷藥合掌散……………九六七
〔通治〕多年惡瘡方……………九六七
赤小豆方……………九六八
殺蟲方……………九六八
惡瘡方……………九六八
又方……………九六八
菖蒲末……………九六八
葵花散……………九六八
松脂散……………九六九
一掃散……………九六九
殺疥藥……………九六九
眞平胃散……………九六九
二黃膏……………九六九

護壁都尉方……………九六〇
傳藥……………九六〇
又方二……………九六〇
灸便毒法……………九六一

偏癰

秘方……………九六一
又方……………九六一

癰疹

清肌散……………九六一
加味羌活散……………九六一
加味烏荊圓……………九六一
麩朮散……………九六二
消風散……………九六三
茶調散……………九六三
胡麻散……………九六三
治遍身癰疹方……………九六三

神異膏……………九七〇
淨肌散……………九七〇
又方……………九七〇
烏梅膏……………九七〇
苦練膏……………九七一
青黛散……………九七一
洗方苦參湯……………九七一
驅風散……………九七一
指縫搔癢成瘡……………九七一
火氣入瘡……………九七一
漆毒……………九七二
〔癰瘡〕神降散……………九七二
凍瘡……………九七二
又方……………九七二
人面瘡……………九七二
白癩瘡……………九七二

傳藥……………九六三
又方……………九六三
洗方……………九六四

諸瘡

〔熱證〕平血飲……………九六四
小牛黃圓……………九六四
牛黃清心圓……………九六四
天麻煎……………九六五
酒蒸黃連圓……………九六五
荊黃湯……………九六五
當歸飲……………九六五
連翹飲……………九六五
赤小豆湯……………九六六
蟬蛻散……………九六六
〔虛證〕四生散……………九六六
黃耆圓……………九六六

〔甲疽瘡〕綠礬散……………九七一
〔月蝕瘡〕胡粉散……………九七二
癩頭瘡……………九七三
頭上風屑……………九七三
〔腎臟風癢瘡十方〕活
血驅風散……………九七三
青木香圓……………九七四
小牛黃圓……………九七四
烏荊圓……………九七四
神授圓……………九七四
不換金正氣散……………九七四
莖物腫爛淫汁方……………九七四
腎臟風發瘡疥……………九七四
又方……………九七四
外腎疳瘡……………九七五
陰莖瘡……………九七五

陰囊上瘡	九七五	膿瘡	又方	九八二
陰頭生瘡	九七五	牛黃金虎丹	黃蠟膏	九八三
妬精瘡	九七五	得效三聖散	傅藥	九八三
又方	九七五	又方七	漏瘡	九八三
津調散	九七六	檳榔散	蠟礬圓	九八三
痲子滑石粉	九七六	單方	溫解散	九八三
蛇纏瘡	九七六	粉麝散	豬腎酒	九八四
痲子癢痛方	九七六	牡蠣散	食治方	九八四
洗方	九七六	秘方二	桂附圓	九八四
癬瘡		洗藥	乳香雲母膏	九八四
胡粉散	九七七	熏藥	安腎圓	九八四
烏頭圓	九七七	手足裂腫	代赭石圓	九八五
遍身牛皮癬方	九七七	白及膏	雄黃膏	九八五
又方二	九七六	秘方	黑靈散	九八五
昨葉荷草散	九七六	又方	又捷效方	九八六
灸法	九七六	治久行脚心腫痛	血竭散	九八六

洗漏瘡方	九八六
久冷漏瘡方	九八六
瘰癧	
白花蛇散	九八六
四聖散	九八七
牽牛圓	九八七
連翹圓	九八七
三聖圓	九八八
必勝圓	九八八
旱蓮子圓	九八八
破毒雄黃圓	九八九
已驗方	九八九
海棠圓	九八九
經效方	九九〇
立應散	九九〇
皂角散	九九一

粉乳托裏散	九九一
蠟礬圓	九九一
蝸牛散	九九一
燒灰散	九九一
洗傅方	九九二
又傅方	九九二
斂瘡口方	九九二
灸法	九九二
瘤贅	
南星膏	九九三
治小瘤方	九九三
蠟礬圓	九九三
繫瘤法	九九三
黃丹末	九九四
丁瘡	
秘方二	九九四

酒煎散	九九五
通利藥	九九五
大通藥	九九六
連翹散	九九六
角瘡口方	九九六
蟬蛻散	九九七
蟾蜍膏	九九七
水沉膏	九九七
灸法	九九七
竅刺瘡	
單方	九九七
又方	九九七
敷藥	九九七
湯火瘡	
傅方	九九八
又方	九九八

湯潑火燒方	九九六	近效方	九九九	破結散	九九九
又方	九九六	四黃散	九九九	灸法	1000
黃柏散	九九八	摻藥	九九九		
至聖膏	九九九	項瘻			

世醫得效方卷第一

南豐州醫學教授危亦林編集

大方脉雜醫科

集脉說

人之有生。血氣順則周流一身。脉息和而諸疾不作。氣血逆則運動滯澀。脉息亂而百病生。然脉之精微。心中了了。指下難明。故西晉王叔和猶爲切慮。凡診之際。須澄神靜慮。以呼吸息數。定病人之脉候。兩手各三部。分爲寸關尺。左三部正臟心肝腎。小腸膽與膀胱爲腑。右三部正臟肺脾命。大腸胃與三焦爲腑。每部浮按消息之。次中按消息之。又沉按消息之。浮以診其腑。見六腑之盛衰。沉以診其臟。見五臟死生盈虛。中則診其胃氣。蓋胃爲水穀之海。人以食爲命。有胃氣則生。無胃氣則死。每三部三三如九。乃爲九候。復有七表八裏九道脉。風寒暑濕中傷之脉。七情虛損寒熱之脉。當析而論之。七表屬陽。浮芤滑實弦緊洪。浮如指按葱葉。芤則中空有兩頭。滑似流珠。實則健而有力。弦

如琴絃。緊如弓弦。洪則舉指極大。八裏屬陰。微沉緩澀遲伏濡弱。微於指下如細絲。沉若爛綿。尋之至骨。緩則來往不急不慢。澀如刀刮竹狀。遲則尋之隱隱。伏潛於骨。重指乃得。濡湊指邊似怯弱。而去來無力。九道之脉。長短虛促結代牢動細。長促屬陽。短虛結代牢動細爲陰。長脉三關通度。促脉尋之極數。短脉按之不及。虛脉尋之不足。舉之有餘。結脉指下聚而却還。代脉動中一止。停久乃還。有疾見之難治。若氣逆得之則無憂。牢脉固結不移之狀。三部若見。皆死候也。動脉再再尋之。不離其處。細脉細細如絲。來往極微。凡此二十四脉。分別錙銖。總而括之。浮沉遲數也。至於傷寒。寒泣血。其脉緊。傷寒復見風。則浮而緩。兩感之脉。沉大者太陽。少陰。沉長者陽明。太陰。沉弦者少陽。厥陰。陽病見沉澀弱弦微者死。陰病見浮大數動滑者生。陽毒之脉極浮洪。陰毒之脉。附骨取之方有。按之即無。陰陽二厥脉皆沉。所以使人疑之。陰厥脉沉遲而弱。陽厥脉沉伏而滑。發熱下利。脉沉弦者下重也。脉大者爲未止。脉微弱者自愈。雖發熱不死。中寒之脉亦緊。但肝中加弦。心中加洪。脾中加沉。肺中加遲澀。腎中加沉滑。傷風則風散氣。其脉浮。復見寒則浮而緊。中風之脉亦浮。五臟所中。脉與中寒類也。大抵遲浮則吉。實大弦數則難治。傷暑氣血消散。脉虛弱無力。中則陽弱陰虛。微遲似扎。傷濕之脉濡而弱。若沉而細微。中之明矣。七情。喜怒哀思悲恐驚。喜則脉散。怒則脉促。悲則脉結。恐

思則脉俱沉。憂則脉澀。驚則脉顫。皆生於氣也。虛損者脉來或浮大而無力。或沉細而微弱。實熱者見於指下。弦數殊甚。或細數異常。總而說之。春弦、夏鈎、秋毛、冬石。濡弱而長曰弦。來疾去遲曰鈎。輕虛以浮曰毛。沉澀而弱曰石。此四時之常脉也。其有太過不及。有覆有溢。有關有格。太過者氣有餘。寸脉本浮。又加實大。是爲陽太過也。尺脉本沉。又加實大。是爲陰太過也。不及者氣不足。浮之損小者。是陽不及也。沉之損小者。是陰不及也。覆溢二脉者。溢自關前進。上於魚際。爲外關內格。陰乘之脉也。覆脉自關後退。下入於尺澤。爲內關外格。此陽乘之脉也。見如此者。乃諸臟相乘。四時相剋。雖有病。病即死。不可治也。又曰三關通度。過於洪大。則或風或痰。設若沉細。則爲之不療。六部相貫。按之不及。極浮微者殂。再再尋之。至骨不絕者。天年有永矣。至於衆病生死之脉。若諸氣脹滿。浮大可療。虛小難保。下痢宜微小。不宜洪大。恍惚顛狂者。實大爲順。沉細爲逆。瘡渴數大者生。虛小難愈。水氣浮大則宜。沉細則愈而復作。霍亂浮洪可救。微遲不語。氣少難瘥。鼻衄吐血。利於沉細。不利於浮大。心腹痛宜見沉細。不宜見浮大。頭痛浮滑易除。短澀不愈。上氣浮腫。浮滑可安。微細難療。中惡緊細易治。浮大難瘥。金瘡出血。虛細則宜。實大則傾。中毒洪大則存。細微則亡。十怪脉者。釜沸、魚翔、彈石、解索、屋漏、蝦游、雀啄、偃刀、轉豆、麻促、釜沸如湯涌沸。息數俱無。乃三陽數極無陰之候。且見夕死。

夕見且死。魚翔脉浮膚泛泛。三陰數極。又曰亡陽。當以死斷。彈石脉來辟辟。湊指急促而堅。乃腎經真臟脉現。遇戊己日則不治。解索脉散散無序。腎與命門之氣皆亡。戊己日篤。辰巳日不治。屋漏之脉。如水下滴。濺地貌。胃氣榮衛俱絕。七八日間危矣。蝦游狀如蝦游水面。杳然不見。須臾又來。隱隱然不動。依前又去。醒者七日死。沉困者三日不治。雀啄之脉。指下來三去一。如雀啄食之狀。脾元穀氣已絕於內。醒者十二日死。困者六七日亡。偃刀之脉。尋之如手循刀刃。無進無退。其數無准。由心元血枯。衛氣獨居。無所歸宿。見之四日難療。轉豆形如豆周旋展轉。並無息數。臟腑空虛。正氣飄散。象曰行尸。其死可立待也。麻促之脉。應指如麻子之紛亂。細微至甚。蓋衛枯榮血獨澀。輕者三日。重者一日殂矣。又論四十五動止脉。以二十四氣七十二候。應死期之准的。孟春立春日。十五動一止。明年東風解凍。蟄蟲始振。魚陟負冰時。二十動一止。二年雨水獺祭魚。候雁北時。三十動一止。三年草木萌動。驚蟄桃始華時。四十動一止。四年倉庚鳴。鷹化為鳩時。且如仲春驚蟄桃始華日。脉二十動一止。明年春分玄鳥至。雷乃發聲時。三十動一止。三年春分始電。桐始華時。四十動一止。四年春清明田鼠化為鴽。虹始見。穀雨萍始生。鳴鳩拂其羽。戴勝降於桑時。以下做此。孟夏立夏蟻蟬鳴。蚯蚓出。至。仲夏芒種蟻蟬生。助始鳴。反舌無聲。夏至鹿角解。半夏生。綢始鳴。季夏小暑溫風至。蟋蟀居壁。鷹始擊。大暑腐草為螢。土潤溽暑。大雨時行。孟秋立秋涼風至。白露降。寒蟬鳴。處暑鷹乃祭鳥。天地始肅。禾乃登。仲秋白露鴻雁來。玄鳥歸。羣鳥養羞。秋分雷乃收聲。蟄蟲咸俯。水始涸。季秋寒蟄閉塞。雀入大水化爲雉。雉入大水化爲蜃。菊有黃華。霜降豺乃祭獸。草木黃落。蟄蟲咸俯。孟冬立冬水始冰。地始凍。雉入大水化爲蜃。小雉始鳴不見。天氣上升。地氣下降。閉塞成冬。仲冬大雪鷓且鳴。雉始雊。鶡始交。冬至蚯蚓結。麋角解。水泉動。季冬小寒雁北鄉。鶡始雊。雉始雊。大寒雞乳征鳥。鷹疾。水澤腹堅。若時疫之脉。則無定據。隨時審思乃得。未可輕議。欲知崇害。心脈虛散。肝脉洪盛。或浮沉長短。大小無定。或錯雜不倫。尤宜加意。凡此諸脉。固鄙見莫之敢遺。然其或逆或順。猶在詳審而消息之。毋固執而有變通。則可得之矣。

集病說

傳曰。名不正則言不順。病之名狀。其類至多。原其所由。似是而非者尤多。若體認之。明辨其所因之的。則何患其多也。夫傷寒六經之病。足太陽膀胱經。頭項強。腰脊痛。無汗。足陽明胃經。身熱。目疼。鼻乾。足少陽膽經。胸脇痛。耳聾。足太陰脾經。自利不渴。腹痛。足少陰腎經。口燥舌乾。背惡寒。足厥陰肝經。煩滿寒熱。甚則囊縮。傳變不一。或愈或死。愈者多出旬日之外。死則在六七日之間。獨寒獨熱亦治。世號爲大病。陽毒之爲病。乃陽氣獨盛。陰氣暴絕。陰毒之爲病。本因腎氣虛寒。或因冷物傷脾。內既伏陰。外又感寒所致。陽厥初病。身熱頭痛。至二三日。四五日方發厥。半日却身熱。蓋熱深方能發厥。陰厥初得病。便四肢厥冷。乃陰勝於陽也。厥者陰陽不相順接。厥少熱多者。其病當愈。厥多

熱少者。其病爲進。或加以上氣腳縮。則爲六腑氣先絕於外也。至於下利清穀。不可攻表。汗出必脹滿。下利有微熱而渴自愈。中之者。皆因下虛氣弱。凌犯霜露。及冒風雪中行所致。傷風之病在表。在經絡中循經流注。以日傳變。中之者。非正順長養萬物之風。乃八方偏邪之風。肥偉人多得之。蓋風性緊暴。善行數變。其中人也卒。其眩人也暈。激人涎浮。昏人神亂。所以推爲百病長。傷暑乃三伏時月。炎熱大行。草萎河涸。血消氣沮之人。偶或傷之。病在頃刻。中之則名中暈。輕則爲傷。重則爲中。傷濕乃坐臥卑濕。或爲雨露所襲。或汗出衣裏。漸漬染之。其中有中者。乃脾元久虛。或爲泄疾。土不制水。因茲而得。復有四氣伏於人身。隱微而不知覺。作爲百端之病。綿延歲月不已。必須深思。求其所以爲病之因。然人之平居。神靜則寧。情動則亂。故喜則氣緩。怒則氣上。悲則氣下。憂則氣沉。思則氣結。恐則氣怯。驚則氣亂。故有所謂七情之病也。若真氣既微。胃氣不實。復啗生冷冰雪之屬。致腸胃虛寒。或大病未復。便合陰陽。或疲極筋力。飢飽失節。或刻意苦思。盡神度量。叫呼走氣。而虛損病所由生也。精血既衰。臟腑多燥。三焦煩壅。復餌丹石酒醢炙搏。致腸胃蘊毒。而實熱病所由生也。以諸病總而論之。中氣有類中風。中風而以中氣治之。亦無所傷。中氣而以中風藥投之。莫不旋踵告斃。先代醫師許學士、張子和。以親故。痛念醫之不明。所以懲其弊而見於著述也。若瘵瘧之病。未有不由

隔季所感風寒暑濕。及飲食勞役瘴癘之氣爲之。赤白痢疾。古人所謂滯下者是也。究疾之原。無非外感五邪之氣。內傷生硬冷熱之食。不能剋化。致令積滯而成。亦有久虛傳變而成。下之不禁。甚者手足不仁。則五臟氣將絕於內也。失血之病十種。走失莫重於此。皆因四氣所傷。或調養失宜所致。時疫流行。則當審其春合暖而寒。夏合熱而冷。秋當涼而熱。冬當寒而暖。是皆六氣愆和。而生斯疾。大則流毒天下。小則蔓延一鄉一家。必辨其各季所因。不可以尋常微病目之。故重則禍至滅門。輕則病至危篤。外此。觀形候聽聲。而知病之可治不可治。經中所謂視精明者。蓋五臟精明聚於目。目精全則目明。神定則視審。審視不瞭。精明敗矣。又云。目赤色者病在心。白在肺。黑在腎。黃在脾。青在肝。黃色不可明。病在胸中。所謂五色者。乃氣之華也。赤欲如帛裏朱。不欲如赭。白欲如白璧之澤。不欲如堊。青欲如蒼玉之澤。不欲如藍。黃欲如羅裏雄黃。不欲如黃土。黑欲如漆重澤。不欲如炭。五臟精敗。壽不久矣。五聲者。臟之音。中之守也。中盛則氣盛。中衰則氣衰。聲如從室中言者。氣澀也。言微終日乃復言。是氣之奪也。譫妄不避善惡。神明之亂也。鄭聲言意不相續。陰陽失守也。得守者生。失者死。六府強弱。以候形之盛衰。頭者。精明之府。頭傾視深。精神奪矣。背者。胸之府。背曲肩隨。胸將矣。腰者。腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。膝者。筋之府。屈伸不能。筋將憊矣。骨者。髓之府。行則振掉。骨

將憊矣。倉廩不藏者。腸胃不固也。水泉不止者。膀胱不藏也。得強者生。失強者死。必兼而明之。又如五臟已奪。神明不守。聲嘶身冷。循衣譫語撮空。面赤如衄血。白如枯骨。黑如烟煤。面青目白。面黑目白。面黃目青。面赤目白。耳鼻有黑色起入口。耳目顴頰赤者。黑色出於額上髮際。直鼻脊兩顴上。黑色出天中。下至鼻上顴上。面忽如馬肝色。望之如青。近之如黑。目直視。惡風。面黑唇青。面青唇黑。面黑。兩脇下滿。不能自反轉。頭目久痛。卒視無所見。陰結陽絕。目精光脫恍惚。陰陽竭絕。目眶陷。口如魚口。不能復閉。氣出不返。唇反。齒齲乾枯。天柱骨倒。指拳攣縮。汗出不流。舌卷黑。髮直。髮如乾麻。善怒。髮與眉衝起。爪甲青。大腑自遺不覺。身熱喘息。臍下硬如鐵。唇裂鼻黑。舌根焦。四肢逆冷。汗出如油不流。尸臭不可近。目睛直視不回。一日。病人健人黑色或白色起入目及口鼻。二日。陰陽俱絕。失音不能言。三日半。口張唇青。人中滿。三日。目無精光。面若土色。不受飲食。四日。面赤目青。六日。面黑目白。爪甲下黑。八日。齒忽變黑。十三日。肝病皮黑庚辛日。心病目黑壬癸日。脾病唇青甲乙日。肺病頰赤目腫丙丁日。腎病面腫唇黃戊己日。以上俱不可治也。面目黃色起。其病方愈。面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑。面黑目青。面黑目白。均可治也。大抵言病。動以百計。雖積萬言。莫能盡述。但當留心殷勤學之。博通乃得。不可以粗解一二爲是。果某疾而正某名。庶不誤投湯劑。則何患病之不瘳矣。

集證說

古之醫者有云。外病自經絡入。內病自五臟鬱發。然當求所以證驗。庶無差失。如傷寒有陰陽表裏。陽證多語。陰證無聲。陽證則晝劇。陰證則夜爭。陽證似陰。糞黑而脉滑。陰證似陽。面赤而脉微矣。身重背疼煩悶。狂言奔走咽痛。身斑斑若錦文。或下利赤黃。多因妄服燥藥熱味。陽毒是也。背強腹中絞痛。身如被杖。燥渴嘔泄冷汗。鄭聲。多因脾胃虛寒。重感於寒。陰毒明矣。陰陽二厥。若陽厥則指爪時溫。或畏熱。或飲水。或揚手擲足。躁煩不得眠。大便秘。小便赤。外證多昏憤。陰厥則指爪常冷。足多攣臥。惡寒。自引衣蓋覆。不飲水。或下利。或清便如常。小便數。外證惶惶而靜。表證多惡寒不渴。發熱而身體痛。裏證多渴。只惡熱而喘滿。口燥咽乾。手心腋下澀澀汗出。大便鞭。涎赤譫語。復有傷寒初證。發熱惡寒無汗。其色悽慘。復見風則多寒。手足微厥。發熱下利。手足溫暖者生。手足厥逆灸不溫。證之極矣。中寒則口噤。四肢強直。失音不語。或卒然暈倒。吐逆涎沫。手足攣搐。狀如暗風。或復燥熱傷風。有汗惡風。面色光而不慘。復見寒。手足微溫。發熱多煩。其或中者。半身不遂。手足癱瘓。涎潮昏

塞。口眼喎斜。肌膚麻痺。歸於六腑者。特爲偏緩。猶可苟延歲月。歸於五臟者。眼閉口開手散。聲如鼾睡。遺尿。惡證迭出。朝不及夕。傷暑身熱。惡寒頭痛。或煩而渴。肢暈。背寒面垢。或嘔或泄。其中入心。使人噎悶。昏不知人。入肝則眩暈頑痺。入脾則昏睡不覺。入肺則喘滿痿躄。入腎則消渴利小便。至於傷濕身重。關節重疼。發熱惡寒。大便泄而小便澀。腰脚冷而腿膝浮。或自利不渴。若氣不平。中之亦使人半身不遂。口眼喎斜。涎潮昏塞。又如七情喜傷心者。不可疾行。不可久立。怒傷肝者。上氣不可忍。熱來盪心。短氣欲絕。不得息。憂傷肺者。心系急。上焦閉。榮衛不通。夜臥不安。思傷脾者。氣留不行。積聚中脘。不得飲食。腹脹滿。四肢怠惰。悲傷心胞者。善忘。不識人。置物在處。還取不得。筋攣四肢浮腫。恐傷腎者。上焦氣閉不行。下焦回還不散。猶豫不決。嘔逆惡心。驚傷膽者。神無所歸。慮無所定。說物不意而道。凡此七者。證雖不同。本乎一氣。臟氣不行。鬱而不舒。結成痰涎。隨氣積聚。堅大如塊。在心腹間。或塞咽喉。如粉絮梅核樣。咯不出。嚥不下。每發欲絕。逆害飲食。若諸虛損證。則眩暈眼花。鼻多清涕。漩濁遺精。冷滑洞泄。水穀不化。洒淅自汗。嘔吐清痰。皆陽虛陰盛也。諸實熱則五臟積熱。口苦咽乾。唇裂生瘡。腸胃乾澀。煩躁喜冷。涎唾稠實。眵淚眼赤。或遍體癰瘍。至於總說。則疹瘧證惟多。先寒後熱名寒瘧。先熱後寒名溫瘧。但熱不寒名暑瘧。寒熱身重煩疼脹滿名濕瘧。寒多不熱名牝

瘧。若一日一發則易愈。二日一發猶可。三日一發則難痊。且斯疾俗在忌醫之列。然得其所因。何忌其難。時疫證惟發熱腰痛強急。腳縮不伸。脘中欲折。目中生花。或濇濇增寒復熱。名曰溫疫。身體顛掉。不能自禁。或肉熱口乾舌破。咽塞聲嘶。名曰燥疫。頭重頸直。皮肉強癢。或蘊而結核。起於咽喉頸項之側。布熱毒於皮膚分肉之中。名曰寒疫。乍寒乍熱。損肺傷氣。暴嗽嘔逆。或體熱發斑。喘咳引氣。名曰濕疫。四時之感。其證百端。皆當因其時而詳辨則得之。喘急爲患。吐痰續續則生。自汗譫語。目直視則亡。失血諸證。有暴吐鼻衄。泄出或一二升至斗餘者。因感四氣。流傳經絡。陰陽相勝。或怒氣傷肝。風入腸胃。故血得寒則凝泣。得熱則淖溢。各隨臟腑經絡涌溢。凝停胸胃。因卽滿悶。或吐或衄。或泄下。復有咳嗽中見紅絲者。爲難愈。無故忽然瀉下黑血名心絕。癆瘵之證。得之者多諱而未肯求醫。殊不知其根有蟲嚙其心肺。可不深憂。中蠱毒之候。令人心腹絞痛。如物嚙狀。吐下血如爛肉。若欲驗其證狀。先令病人唾於水中。若沉卽其實矣。瘡渴與漩濁爲隣。慎莫作疔瘡等證。鮮有安之日矣。至於下痢身涼能食。小便通易安。體熱多汗渴甚。小便不利。或手足厥冷灸不溫。兼微喘不食者死。二便秘澀之證。暫秘。小漩還有點滴利者。易愈。若秘日久。膨上心胸切痛。氣促身冷。面色黑。前後俱無。名曰氣實。轉盼而殂。脹滿得之未久。或脹或消。腹皮稍軟。不泄不喘。隨治隨瘥。若臍心突起。

利後復脹急。久病羸乏。喘息不得安。名曰脾腎俱敗。無有愈期。腫滿善證。男從上腫下。女從下腫上。所患未久。利漩退腫定喘則愈矣。若證不善。則手足盤骨腫。臍與掌心俱凸。咳嗽失聲。青筋紋橫肚上。及爪甲卒腫。頭面蒼黑。嘔吐頭重。豈復能救。霍亂一證。猶爲卒暴之最。蓋人之起居無常。攝調不善。揮霍之至。便至變亂。悶絕不救。甚爲可畏。臨深履薄。縱蹈虎尾。不足以諭其危。其如厲風名大風惡疾。故其色敗皴裂。瘍潰眉面。白皮如蛇蛻。久則鼻梁關壞。又名風癩。十無一生。若癰瘰之爲病。癰者堅也。堅則難破。瘰者假也。假物成形能動者是。至於蛟龍蛇螫肉髮蝨米之證。初非定名。偶因食物相感。而致斯患。夢寐不祥。多生恐怖。爲崇惑證矣。吁。內外之證。其發萬端。皆須細辨。且頃刻之變無定。一有所作。其可忽諸。

集治說

嘗謂用藥如用刑。一有所誤。人命繫焉。故書曰。言之非艱。行之維艱。如張仲景傷寒一百一十三方。猶缺其一。三百九十七法。僂指未卽周知。蓋謂此也。夫處方大法。則有七方十劑。七方者。奇方偶方大方小方緩方急方復方十劑者。宜通補瀉輕重澀滑燥濕。然積學而用之則可矣。傷寒之病。太陽屬膀胱。非發汗則不愈。必用麻黃之類。蓋其性能通陽氣却外寒也。陽明屬胃。非通泄不能愈。須用大黃芒消以利之。少陽屬膽。無出入道。柴胡半夏能利能汗。佐以黃芩則解矣。太陰屬脾。性惡寒濕。非乾薑白朮不能燥。少陰屬腎。性畏寒燥。非附子不能溫。厥陰屬肝。藏血養筋。非溫中之藥不能潤。外此有汗下吐三法。毫釐不可差誤。經云。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛以亡。故在表宜汗。在裏宜下。在胸宜吐。半表半裏宜和解。表裏俱見。隨證滲泄。無表裏證。則宜下之。下利清穀。身體痛。急當救裏。身體疼痛。清便自調。急當救表。身熱不渴。爲表有熱。渴而煩悶。爲裏有熱。傷寒見風。大青龍湯爲治之最。陽毒內外結熱。輕則白虎湯。重則承氣湯之屬。陽厥亦用。舌卷焦黑。鼻中如烟煤。非水漬法不可。陰毒疾勢困重。面黑四肢厥冷。則理中湯四逆湯投之。未效則灼艾法惟良。復以葱熨法佐之。陰厥同此法治之。發熱下利。白頭翁湯黃連阿膠圓最爲的切。中寒則急擗置暖室。燃以薪火向之。令通身暖透。或置於熱炕上。令有力人扶策。仍以手附火。或人懷令熱。亟摩病人手足胸腹間。續用薑附湯併服。若猶未省。則依上法灸。傷風主治之法。汗出惡風者。當解其肌。裏證雖具。惡風未罷。亦須先解其外也。傷風見寒。大青龍湯均爲調理。中風昏悶。先須通關散探鼻令噴嚏。次以蘇合香圓行其氣。傷風分辯冷熱爲治。不可混濫。五臟正中者。迅雷不及掩耳。手足偏中者。但徐服順氣。

疏風豁痰等藥。不宜用大風藥。急治則不得盡其天年。其有牙關緊閉。亦用通關散搐鼻。噴嚏即開矣。傷暑者暑氣耗血。消氣生痰。速用解暑之劑。仍啜熱湯。得汗即甦。若中之者。急扶在陰涼處。不可與冷。當以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海。以湯淋布上令透徹。臍腹暖即漸醒矣。如倉卒無湯處。則掬道上熱土置臍上。以多爲佳。冷即易之。古法。道途無湯。即掬熱土於臍中。仍撥開作窩。令人溺其中。以代湯淋。續與解暑毒藥。併急嚼生薑一大塊。冷水送下。如已迷悶。則嚼大蒜一二瓣。冷水送下。如不能嚼。即用水研。灌之立甦。但遇無湯處。則嚼生葱二寸許。津嚥下。可抵飲水二升。傷濕中濕。只宜利小便。忌不得以火攻。并轉利之。若濕家下之。額上汗出微喘。小便不利者死。下利不止者亦死。治濕不利小便。非其治也。七情之患。惟當利氣豁痰。寬中進食。仍須怡養。以溫平之藥調之。如宿血滯氣停凝。結爲癥瘕。腹中痞塊。堅硬作楚。當以破氣藥伐之。或以類相從。如敗梳可治蝨瘕。銅屑治龍瘕。麩藥治米瘕。石灰治髮瘕等類。所謂醫者意也。氣積膨痛至甚。或有熱痞結聚。須宣泄之。虛損爲治。宜大作湯劑峻補者。烏附天雄薑桂之屬不可無。潤補者鹿茸當歸菴蓉之類安可缺。清補則天門冬麥門冬人參地黃之類宜用也。至於諸熱爲治。有泛熱。有實熱。泛熱者荊芥薄荷梔子黃芩等投之。正其所宜。實熱者非大黃芒消則不能效。若夫總說爲治之備要。如南北風土之殊。人物厚薄之異。北方土厚水深。水性沉下。人體多實而少虛。且所食無非肉麵。寒則衣重裘。坐暖炕。若有所治。則宜多以清涼之劑。如南方用大黃巴豆之屬。其分兩皆當倍而用之。或用水漬法。或尋甜水一二甌飲之即甦。間有所稟稍弱。不自保惜。勞役致虛。則亦但當潤補之。無有不愈。南方屬火。火性輕炎。人體多虛而少實。况所食不過蔬食而已。必須投以溫和之藥以調之。其有習尚北方之風。置酒終日。非至醉不已。燒博肥鮮。恣其厭飫。偶有所患。亦須以平昔所稟。施以涼劑。然虛者亦不可妄施。痰瘧熱多者。投以半涼半熱解散。分陰陽減寒熱之劑。度其所作之日。先一時進以抵截之藥。去其痰水。則收效矣。寒多者投以半生半熟壯脾進食之劑。次以抵截之藥。則痰癖去而疾愈矣。猶須令其戒慎飲食。謹起居。則無復攻之患。若久瘧而復作。虛浮不食者。未之有瘳。時疫之治。須以時斟酌。不可偏執。治之者須辨其所因。而投之以藥。不可以日滿自差。遂至枉亡。良可太息。至於病愈。必須湯食競進。折其毒勢。不可令病氣攻人。則屏息矣。或有云斯疾之召。或溝渠不泄。穢惡不修。熏蒸而成者。或地多死氣。鬱發而成者。或官吏枉抑。怨讟而成之者。可於州治六合處。穿地深至三尺。闕亦如之。取淨沙三斛實之。以醇酒三升沃其上。俾使君祝之。斯亦消除疫癘之良術。故併記之。喘急虛者升降鎮墜。熱者清心涼肺。未有不愈。下痢感於四氣者。先須隨其所感解散。分利陰陽。次須辨

其冷熱手足和暖則爲陽中和之劑可用手足厥冷則爲陰溫燥之藥可行無不切效。大法虛者補之。實者瀉之。滑者澀之。閉者通之。有積者推之。熱則涼之。冷則溫之。冷熱不調者平之。失血明其所因。辨其冷熱。如血下鮮紅。則治以清和。純下瘀色。則當溫養。二便秘則須潤滑以行之。脹滿則須正氣。以虛實平治之。腫滿實者利水。虛者壯脾元兼用消浮等劑。自有奇效。仍須戒鹹斷慾。庶不再復。霍亂須明辨虛實所因。亟治無遲。遲則殞命。至於乾霍亂。則猶爲難治也。三瘡治法。滋腎爲主。抑心火兼之。然須多服湯圓。俾水升火降。而引飲無度。莫之見矣。真心痛者。手足青至節。不在治療之數。眞頭痛者。上穿風府。陷入泥丸。非藥能愈。金瘡主治。備見後科。用藥之工。誠可嘉嘆。中蠱毒之法。以敗鼓皮燒灰爲末。飲服一匕。則病人自呼蠱家姓名。可語令呼喚將去則愈矣。瘵疾一染人。當其未深入之時。則宜先取其蟲。不爾則損於心肺。蓋心主血。肺主氣。人身舍氣血之本。其能生乎。取蟲而後相忘世慮。和以潤養藥食。庶幾可瘳。傷晚則不及也。魘寐產乳自縊壓溺諸暴絕。須平時熟記後所載治法。併產蓐一科。臨用庶不倉惶。應驗在頃刻間。不然則世無良醫。枉死者半是也。厲風初發。則宜宣泄。風毒去而病漸愈。長久之。惟當幽隱林泉。依法亟治。庶乎可愈。不惟愈疾。亦或可因此而至仙道矣。或爲崇害。若移精變氣。祝由不可。則宜外尋禁避厭禳法以除之。外此病有六不治。驕恣

不論於理。一不治也。輕身重財。二不治也。衣食不能適。三不治也。陰陽并。臟氣不定。四不治也。形羸不能服藥。五不治也。信巫不信醫。六不治也。生候尙存。形色不改。病未深入腠理。針藥及時。能將息調理。委以良醫。病無不愈。至於五味。亦可對治五臟之病。肝酸心苦。肺辛腎鹹。用之中病則止。過則酸走筋。鹹走血。辛走氣。苦走骨。甘走肉。則無益矣。又如以所宜而治者。肺燥咳嗽。嚼芝麻。陷油餅。瘧疾脾冷。糟鯉魚。糟藏瓜。久冷痢。野鷄餛飩等類是也。瓜果亦可隨冷熱施之。愈疾必矣。若夫炮製之法。又當以相需相合相反相惡。相需者。以桂得葱而軟。相合者。磁石引針。相反者。大戟芫花等反甘草之類也。相惡者。如牛黃忌龍骨是也。且方中各有禁忌。此亦舉其略。或以甘草擊起芫花之性而用者。猶在斟酌。更須甄別藥味新陳。選擇州土所生。採取時月。分君臣佐使。俾分兩無差。炙燂炮熅。精虔不苟。斯爲治之善也。其有自恃己長。不肯訪問。以意臆度。攻寒以寒。療熱以熱。妄施一二。邀爲己功。偶或中之。實非的見。不過僥倖於萬一。其或不中。則十手所指。十目所視。所謂一甌之藥。誤入於咽。五臟俱裂。生可再復。可不戒之。况醫者人之司命。有病急召。慎勿以遠近暑寒而拒之。若至病家。尤須敬謹。勿爲他務。以敗正事。給藥亦量其多寡。表汗宜四。吐下宜一。加二極矣。補藥愈多愈效。餘則隨證爲之輕重。明批湯引。病若未愈。囑其再來。庶病可瘳。而治有方矣。僕少而學之。長而行之。

所謂治病之道。盡在是矣。古云。凡日治病。推其所因。生死預定。方爲醫人。敬之。

傷寒撮要

發汗法 凡發汗。欲令手足俱周。濺濺然一時許爲佳。不欲如水淋漓。服湯中病卽已。不必盡劑。然發汗須如常覆腰以上。厚衣覆腰以下。蓋腰以上淋漓。而腰以下至足心微潤。病終不解。凡發汗病證仍在者。三日內可二三汗之。令腰脚間周遍爲度。

轉下法 凡轉下。須體認得合下之證明白。在陽明胃經。則不拘日數。過時失下。則氣血不通。四肢便厥。不識返疑是陰厥。復進熱藥。禍如反掌。若少陰腎經。太陰脾經。下證悉具。湯已更衣者。止。不須盡劑。陽明病得利瘥。慎不中服補藥。熱氣得補復成。更復下之。是重困也。宜消息安養之。

取吐法 凡取吐。服吐藥後。不大吐。則當以手指擣之。便吐矣。不吐。稍增藥。以吐爲度。若吐少。病不除。明日再服吐藥。可至再三。但虛人宜少吐。藥力過時不吐者。啜熱湯一升。以助藥力。不必盡劑。吐訖便可食。無復餘毒。若服藥過多者。飲水解之。

水漬法 以疊布數重。新水漬之。稍揆去水。搭於胸上。須臾蒸熱。又漬令冷。如前用之。仍數易新水。

日數十易。熱甚者置病人於水中。熱勢纔退則已。亦良法也。

葱熨法 以葱一束。以索纏如餅。去根葉。惟存白三寸許。先以火熅一面令通熱。勿至灼人。乃以熱處著病人臍下。上以熨斗盛火熨之。令葱餅熱氣透入腹中。更作三四餅。遇一餅壞不可熨。則易一餅。候病人醒。手足溫。有汗乃止。

蒸法 以薪火燒地良久。掃除去火。可以水洒之。取蠶沙柏葉桃葉糠。麩皆可用。相和鋪燒地上。可側手厚。上鋪草席。令病人當上臥。溫覆之。夏月熱。只布單覆之。汗移時立至。俟周身至脚心自汗。熱熱。乃用溫粉撲止汗。移上床。最得力者。蠶沙桃葉柏葉也。無蠶沙亦得。單桃單柏葉亦得。蒴藋葉亦可用。麩糠乃助添。令隨多少。不用亦得。此極急則可。如治病得愈。明年斯時。慎莫再作。再作或不治矣。

凡煎煮藥之法。須用銀石器。微火熟煮。不可太猛。表汗下之藥。每服煎至八分。對病藥煎至七分。滋補藥煎至六分。不可極乾。亦不可猛火驟乾。恐傷藥力。去滓。服後留滓再煎。

陽證

麻黃湯治足太陽膀胱經發熱頭痛。身疼惡風。無汗而喘。陽明合病。喘而胸滿。太陽病八九日不解。

以此發汗。必衄乃解。及治不得汗。發衄。陽明脉浮。無汗而喘。宜服。脉但浮。無餘證者。與服。若不瀧。腹滿加噦者。不治。

麻黃三兩去節

桂枝二兩

甘草一兩

杏仁

七十個去皮尖

右不時用。服五錢。水盞半。煎八分。去滓。食前服。覆取微汗。夏至欲加知母半兩。石膏一兩。黃芩一分。或汗出後無大熱而喘者。去桂加石膏一兩。春冬只依正方。

升麻葛根湯治傷寒時疫頭痛。增寒壯熱。肢體痛。發熱惡寒。鼻乾。不得睡。小兒大人瘡疹。已發未發。皆可服。兼治寒暄不時。人多疾疫。乍暖脫衣。及暴熱之次。忽變陰寒。身體疼痛。頭重如石。及解傷酒。膈熱。口瘡咽疼。

升麻一兩

白芍藥一兩

甘草一兩

葛根二兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。不拘時。潮熱頭痛。生薑三片。葱白二根煎。咳嗽涎盛。生薑三片。桑白皮七寸煎。上膈熱。薄荷黃芩各少許煎。斑瘡未出。加紫草槿根各半錢。葱白二根煎。挾熱酒後傷風感寒。痰盛氣促。金沸草散方見後。合和。生薑三片。薄荷七葉。桑白皮七寸。烏梅一個煎。小兒量度多少。老人加人參倍。白芍藥各五錢。大段寒即熱服。熱即溫服。近人以藥性寒涼。不肯輕服。然治證相對。服之何妨。

金沸草散治風壅痰盛。頭目昏痛。頸項強急。往來寒熱。肢體煩疼。胸膈滿悶。痰涎不利。咳嗽喘滿。涕唾稠粘。時行寒疫。壯熱惡風。有寒則汗出。風盛則解利。

金沸草去梗三兩

荆芥穗四兩

麻黃去根節三兩

甘草一兩

半夏湯洗七次一兩

赤芍藥一兩

前胡三兩

右剉散。每服三錢。水一盞半。入生薑三片。桑白皮七寸。烏梅一個煎。頭疼。柚葉半皮。牙疼。熱煎。灌漱。諸風及大腑風秘。左脇刺痛。每料加枳殼一兩去穢。風熱結在臟腑。煩躁。氣壅腹痛。大便秘。以葱白研爛。微火炒過。布巾盛。熨臍。後加大黃朴消薄荷各五錢。服速效。諸風發散。並用。妊婦傷寒。頭痛旋疼。壯熱心躁。加白朮人參黃芩生石膏各一兩。熱嗽加甜葶藶馬兜鈴薄荷生桑白皮各半兩。烏梅四錢。仍就吞半夏圓。方見後咳嗽類。咽喉焦燥。加朴消五錢。食後服。

小柴胡湯治傷寒四五日。寒熱胸脇滿痛。默默不欲食。心煩。或嘔渴。或腹痛。或脇下痞。或心下悸。小便不利。或不渴。易有微熱。或咳。或過經未解。潮熱未除。半表半裏。非汗非下之證。瘥後勞復昏熱。婦人傷風。經水適斷。此為熱入血室。故便如瘧狀。產後傷寒。頭疼發熱。小兒寒熱亦治之。

柴胡二兩去蘆

半夏湯洗七次六錢

黃芩

人參去蘆

粉草各三分

右剉散。每五錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎至六分。食前服。腹痛去黃芩。每料加芍藥三分。心下悸。小便不利。去黃芩。加茯苓一兩。不渴。外寒裏熱。去人參。加桂三分。溫服。覆取微汗。愈。咳嗽。加五味子。潤者三錢。胸中煩。加栝藂五錢。渴。加人參。栝藂各五錢。脇下痞。去棗。加煨牡蠣粉。枳實各五錢。過經不解。日晡發熱。已而微利。加芒消五錢。引飲有汗。加茯苓。桂枝各五錢。身熱。臟腑微滯。加厚朴五錢。煩熱。每服加白茅根二根。白竹青一塊。如大指頭大。麥門冬半錢。熱腹疼。加白竹葉七皮。赤芍藥。枳殼各一錢。鼻衄。加生地黃二錢。白茅花一握。痰盛或喘。加桑白皮七寸。烏梅一個。煎服。裏熱外寒。加桂半錢。

大柴胡湯治傷寒十餘日。邪氣結在裏。寒熱往來。大便秘澀。腹滿脹痛。語言譫妄。心中痞硬。飲食不下。或心下急。鬱鬱微煩。或口生白胎。或不大便五六日。繞臍刺痛。時發煩躁。及汗後如瘧。日晚發熱。或發熱汗出。或六七日目中不了了。睛不和。無表裏證。身微熱者。裏實也。凡臟腑實。脉有力者。可服之。輕則柴胡。重則承氣。

枳 實去穢炙 半兩 柴 胡去毛蘆 半斤 大黃 二兩 赤芍藥 三兩 半 夏 湯洗七次 二兩半 黃 芩 三兩 去心

右五味勻散。入半夏拌勻。每服三大錢。水一盞半。入生薑三片。紅棗一枚。或加苦竹葉十皮。煎至

一中盞。去滓溫服。食後臨睡服。大熱用苦竹瀝一合。此藥治傷寒內熱裏實。若身體疼痛。表證未解。不可服之。春合溫而清涼。夏發燥疫。此方妙。

小承氣湯治傷寒日深。恐有燥屎。腹中轉失氣。乃可攻之。不轉失氣者。必初硬後溏。未可攻之。攻之則腹滿。不能食。飲水而嘔。其後熱。大便復硬。若腹大滿不通。或陽明多汗。津液外出。腸胃燥熱。大便必硬。而譫語脉滑。吐下微煩。小便數。大便結。或下利譫語。自得病二三日。脉弱。無太陽證。柴胡證。煩躁心下結。至四五日。雖能食。少少與承氣湯和之。令小安。

大黃 四兩 厚 朴 去粗皮 炙二兩 枳 實 炙去穢 五錢

右剉散。每服五錢。水二盞。煎至八分。去滓溫服。以利為度。未利再服。

大承氣湯治表裏俱熱。病勢更甚者。陽明脉遲汗出。不惡寒反惡熱。身重短氣。狂語如見鬼狀。劇者發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。陽明裏熱。或吐下後不解。大便五六日不利。日晡潮熱。心胸煩熱而懊惱。復如瘧狀。脉沉實。或小便不利。或腹滿實痛而渴。脉實數而沉。腸胃燥甚。留飲不散。胸腹高起。痛不可忍。但嘔冷液。大渴反不能飲。強飲不能。上喘急悶者。

大黃 四兩 酒洗 芒 消 三合 厚 朴 半斤 炙 去粗皮 枳 實 一兩 炙

右剉散。每服五錢。水二盞。先煮厚朴枳實至一盞餘。下大黃。煮取八分。去滓入消。再煎一沸温服。以利爲度。未利再服。

調胃承氣湯治諸發汗和解。不惡寒。但發熱。蒸蒸然者。或日深心下温温欲吐。胸中痛。大便澹。腹滿。鬱鬱微煩。先此時吐下者。或日深裏熱譫語。法當下之。以銀粉巴豆燥熱大毒圓藥下之。致真陰損虛。邪熱轉甚。因而協熱下利不止。及表裏熱下之太早。乘虛而入。不成結胸。但爲熱利不止。心下滿。鞭或痛。煩渴咽乾。脉滑數而實。諸腹滿實痛者。煩渴譫妄。小便赤。大便鞭。脉滑實緊。

大黃 芒消 甘草各等分

右剉散。每服五錢。水二盞。煎至六分。去滓下消。再煎一沸。温頓服之。

三拗湯治感冒風寒。鼻塞。語音不出。頭痛拘倦。方見咳嗽類

敗毒散治傷寒時氣。頭痛項強。發熱惡寒。肢體煩疼。咳嗽。鼻塞聲重。風痰頭痛。嘔噦寒熱。

人參去蘆 赤茯苓去蘆 甘草 前胡去苗 川芎 羌活去蘆

北柴胡去苗 枳殼去穢炒 桔梗去蘆已上各等分

右剉散。每服四錢。水一盞半。生薑三片。薄荷葉五皮同煎。熱服。不拘時候。傷濕腰疼。加白朮木瓜

各等分。胸痛加天麻一兩。脚氣壅盛。多熱赤腫。加大黃炒蒼朮各等分。不過一二服立愈。瘟疫傷寒。頭痛目昏。發熱增寒。脚腰疼甚。多風多痰多氣。或處卑濕。脚弱亦效。傷寒鼻衄。加白茅根生地黃各一兩。瘡癩癰疹。加蟬蛻十個去足翅。防風五錢。癰疽初發。赤腫寒熱。用升麻葛根湯方見前合和。加生地黃紅內消麥門冬去心各一半煎。熱服立散。尋常風寒濕氣。流入經絡。腰脚疼痛或痺弱。五積散方見後對合。加木瓜川牛膝去苗檳榔切碎各一半煎。立效。冬合寒而温暖。春發温疫大效。

陰證

治中湯治太陰傷寒。手足温。自利不渴。腹滿時痛。咽乾。其脉尺寸俱沉細。

人參 乾薑炮 白朮 甘草炙 陳皮 青皮各等分

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。去滓食前服。

五積散調中順氣。除風冷。化痰飲。治脾胃宿冷。腹脇脹滿。胸膈停痰。嘔逆惡心。或外感風寒。內傷生冷。心腹痞悶。頭目昏暈。肩背拘急。肢體怠惰。寒熱往來。飲食不進。及婦人血氣不調。心腹撮痛。經候

不調。或閉不通。及口中冷。背心惡寒。並宜服之。除麻黃又名異功散。

白芷一兩

陳皮三兩

厚朴去粗皮切薑汁炒乾三兩

桔梗去蘆六兩

枳殼去蘆三兩

川芎

甘草炙

白茯苓去皮各一兩半

朮十二兩米泔浸去皮汁炒赤

當歸去蘆尾一兩半

麻黃去根節三兩

揚芍藥一兩半

乾薑二兩

半夏湯洗七次一兩半

肉桂去粗皮一兩半

右除白芷肉桂二味。為散另入外。一十三味同為剉散。慢火炒令色轉。攤冷。次入肉桂白芷令勻。

每服三錢。水一盞半。入生薑三片。煎至一中盞。去滓稍熱服。如冷氣奔衝心脇。膈腹脹滿刺痛。反

胃嘔吐。泄利清穀。及痲癩癥瘕。膀胱小腸氣痛。即入煨生薑三片。鹽少許同煎。如傷寒時疫。頭痛

體疼。惡風發熱。項背強痛。入葱白三寸。豉七粒同煎。若但覺惡寒。或身不甚熱。肢體拘急。手足厥

冷。即入炒茱萸七粒。鹽少許同煎。如寒熱不調。咳嗽喘滿。入棗二枚煎。風寒濕氣交互。頸項強直。

或半身偏疼。或復痲痺。及卒中風重者。多加麝香末。寒濕腰痛。每服加桃仁七枚去皮尖。滿身疼

加白膠香。太陰經傷寒。手足逆冷。或積聚腹痛。及虛汗不止。脉細疾。面青嘔吐。加熟附子數片。炒

茴香一捻。冷氣。煨薑三片。鹽少許煎。婦人經候不調。或腹中血塊。加酸米醋一合。難產亦加米醋

一合。脚氣冷者。每服加茱萸十粒。木瓜三片。大便秘加大黃二錢。脚氣下疰。蒸然赤腫。增寒壯熱。

亦加大黃一錢利之。久虛脾泄。傷食腹痛。冷瀉不止。每用略炒過。加陳米一撮。烏梅一個煎。名和

氣散特效。心腹膨脹不食亦效。乳癰初作。加川牛膝生地黃各二根。產後或尋常血氣痛。並加木

香玄胡索半錢。醋炒陳艾葉七皮。烏藥半錢。婦人體虛脚疼。加生川烏去皮臍切四片。麝香少許。

夏合熱。寒氣折之。秋發寒疫大效。

人參養胃湯治外感風寒。內傷生冷。增寒壯熱。頭目昏疼。肢體拘急。不問風寒二證。均可治療。須令

漉漉微汗。自然解散。若先有汗則溫服。不須更汗。兼治飲食傷脾。或外感風寒濕氣。發為痲瘧。及山

嵐瘴疫。常服尤佳。

厚朴去粗皮切薑汁拌炒乾

蒼朮米泔浸切炒黃色

半夏湯洗七次各一兩

白茯苓去皮

甘草二錢

人參去蘆

藿香去土各半兩

橘紅去白七錢半

肉桂去粗皮

附子各一錢

草果煨去皮

香薷去土各半兩

橘紅去白七錢半

肉桂去粗皮

附子各一錢

肉桂

炮附子

各一錢

兼紅圓子

每服三十五粒方見後痲瘧類

右剉散。每服三錢。水一盞半。生薑三片。紅棗二枚煎。空心熱服。虛寒加炮附子數片。體虛寒瘧加

藿香正氣散治傷寒頭疼。增寒作熱。上喘咳嗽。五勞七傷。五般風痰。五般膈氣。心腹冷痛。反胃嘔惡。

氣瀉霍亂。臟腑虛鳴。山嵐瘴瘧。遍身虛腫。婦人產前產後血氣刺痛。小兒疳傷。並宜服之。

大方脈雜醫科 陰證

二七

大腹皮洗去土 藿香洗去土 厚朴去粗皮切 白朮去蘆各 陳皮去白 白芷一兩
 苦梗去蘆 白茯苓去皮 甘草炙二兩 半夏湯洗七次 紫蘇去土各二兩
 右剉散。每服三錢。水一盞半。生薑三片、紅棗一枚同煎。熱服。如欲出汗。加葱白二根。以衣被蓋。再煎服。冷嗽喘滿。每服加人參一錢、鹽梅一個、杏仁七粒去皮尖、北五味子十粒。就吞青州白圓子三十五粒。效。氣促氣壅。加人參一錢、沉香半錢。心腹痛。加木香半錢、玄胡索七粒切碎。嘔惡甚。加生薑五片、木瓜二片。痰嘔加烏梅一個。寒濕腰痛。腹心膨滿。加生薑三片、木瓜二片、蒼朮切炒。枳殼煨去穢切各半錢、檳榔半個切片。一方治憂怒鬱氣。流走遍體。刺痛緊滿。加木香一錢、縮砂五粒。名增減順氣木香散。

四逆湯治陰證傷寒。自利不渴。嘔噦不止。吐利俱作。小便或澀或利。脉微欲絕。汗出過多。腹痛脹滿。手足厥冷。或咳或悸。內寒外熱。下利清穀。四肢沉重。汗出熱不去者。一切虛寒厥冷。傷寒病在表誤下。藥下利不止。雖覺頭疼體痛。發熱惡寒。四肢拘急。表證悉具。未可攻表。先服此藥助陽救裏。少陰病背惡寒。口燥咽乾。此主之。

甘草一兩 乾薑二兩 附子大者一枚生用去皮臍

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎六分。去滓溫服。服此藥利止而無脉者。加人參半兩。面赤加連根葱白九莖。臨煎熟旋入。腹痛去葱白加芍藥二兩。嘔者加生薑二兩。咽痛。去芍藥加苦梗一兩。利止脉不出者。去苦梗加人參二兩。霍亂吐瀉後亦宜服此。大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。下利厥逆。惡寒。大下利厥冷者主之。

四逆散治少陰病四逆。其人或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。此主之。

甘草炙 柴胡 枳殼去白臍炒黃 芍藥各一兩

右爲末。米飲調下二錢。日三服。咳者加五味子乾薑各半兩。下利悸者加桂半兩。小便不利者加茯苓半兩。腹中痛者加附子半枚炮裂。泄利下重先濃煎薤白湯。內藥末三錢匕。再煮一二沸溫服。

順元散此藥能溫內外感寒。脉遲細沉伏。手足冷。毛髮慄。傷寒裏證。大噉數杯。手足溫。汗出乃愈。治氣亦效。通血脉。和一切氣。無出此藥。冒風濕。手足緩弱。不能動轉。倒頭須數人扶策。三服後。次日能步履脫然。方見後風科虛證類

三建湯方見痢冷類 脉微。身體冷重。自汗嘔吐。加丁香胡椒各半兩。

瓜蒂散治手足厥冷。脉乍緊。邪結在胸中。心中滿而煩。飢不能食。病在胸中。當須吐之。方見後
茯苓甘草湯治厥而心下悸。宜先治水。却治厥。不爾。水漬入胃。必作利。

茯苓 桂枝各二兩 生薑三兩 甘草一兩各細切

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。溫分三服。

麻黃升麻湯治傷寒六七日。大下後。寸脉沉而遲。手足厥逆。下部脉不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止。為難治。此方主之。

麻黃二兩 升麻一分 當歸一分 知母 黃芩 芍藥各十

石膏 白朮 乾薑 芍藥 天門冬去心 桂枝

茯苓 甘草各六銖細剉

右十四味。以水一斗。先煮麻黃一兩。沸去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。相去如三斗炊米頃。令盡汗出愈。

灸法 治陰證傷寒。於臍下一寸半氣海穴二七壯。小作艾炷。於臍心以鹽填實。灸七壯立效。二寸丹田。三寸關元皆可灸。

和解

香蘇散一方加沉香。名沉香飲子。治四時傷寒傷風。傷濕傷食。大人小兒皆可服。

香附子五兩炒去毛 紫蘇去根二兩半 陳皮二兩 甘草二兩 蒼朮二兩切片米泔浸炒黃

右剉散。每服四錢。水盪半。生薑三片。葱白二根煎。不拘時候。得汗為妙。頭痛加川芎白芷北細辛。荆芥穗每服各半錢。咳嗽聲重。痰多涕稠。加半夏苦梗烏梅各半錢。桑白皮七寸。心疼加石菖蒲。半夏各半錢。泄瀉。木瓜藿香各半錢。傷濕自汗。時行暴瀉。生薑三片。車前子一撮。或用香附子陳皮各一兩。以石器滴酒炒黃色為散。煎熱服。感寒濕日久。腰脚疼。行步難。酒煎服。或濕氣久留脾疼。身體與手足倦怠。腹脹滿或有氣上衝。有類虛損。實非虛損。此主之。食積腹痛泄瀉。葱白二根。烏梅一個。併吞服。盧氏感應圓菘豆大三七粒。方諸積類脚氣每服檳榔木瓜大腹皮枳殼木香各少許。鹽酒水煎。空心服。感風宿食不化。潮寒腹痛作瀉。惡風四肢拘急。生薑三片。烏梅一個。葱白二根。就服盧氏感應圓。瘧疾桃柳枝七寸。薤白二個。頭痛作惡。加鹽少許。男女冷氣。加茱萸一撮。食鹽少許。婦人血氣。加莪朮茴香烏藥當歸。所加量病人虛實增減。除香附子紫蘇加厚朴桔梗藁

本各四兩。名和解散。乃平和之劑。隨病用之。

香葛湯治四時感冒不正之氣。頭痛身疼。項強寒熱。嘔惡痰嗽。腹痛泄瀉。不問陰陽兩感。或風寒濕瘴。服之大效。

紫蘇去根

白芍藥

香附子炒去毛

川升麻

白乾葛

薄陳皮各一兩

白芷

大川芎各半兩

蒼朮米泔浸切炒黃色一兩

大甘草半兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。生薑三片煎熱服。不拘時候。如發熱無汗。遍體疼痛。加葱白二根。豆豉七粒煎熱服。得汗即解。嘔去蒼朮。加白朮數片。藿香數葉。中脘脹滿。大便秘。加枳實檳榔各半錢。有痰加半夏半錢。咳嗽加五味子七粒。鼻塞加桑白皮三寸。腹痛加枳殼半片去穢切。泄瀉加木瓜二片。老人產婦嬰兒皆可服。如傷寒不分表裏。以此藥導引經絡。不致變動。其功非淺。如熱多。口渴心煩。臟腑堅。或加前胡。無汗可加麻黃。汗太過加麻黃根。時行寒濕泄瀉。頭疼發熱自汗。大效。

參蘇飲治一切發熱。頭疼體痛。服之皆效。不必拘其所因。小兒室女。尤得其宜。用藥致和而且平故也。痰飲停積。中脘閉塞。眩暈嘈煩。怙悻惕慄。嘔逆不食。有如氣隔。痰氣停滯。關節不利。手足痺曳。筋

脉攣急。類乎中風。食已即吐。發熱頭痛。百節煩疼。狀似傷寒。但連日頓進此藥。以病退為期。不可預止。蓋本方乃集二陳湯半夏茯苓湯枳實半夏湯也。

人參去蘆

白茯苓去皮

紫蘇葉

半夏湯洗七次

乾葛去皮

前胡去蘆各七錢半

枳殼去穢麩炒

陳皮去白

桔梗去蘆

粉草炙各半兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。生薑三片。紅棗二枚同煎。熱服。不拘時候。發熱頭疼。每服加川芎半錢。葱白二根。咳嗽加五味子七粒。桑白皮七寸。煩躁麥門冬二十粒去心。痰嘔口燥咽乾。烏梅一個。男子婦人虛勞發熱。加麥門冬二十粒去心。氣盛或氣虛人痰氣上壅。咽喉不利。哮喘有聲。氣息短急。上盛下虛。加木瓜半錢。北五味子五粒。乾桑白皮七寸。尋常感冒風寒。鼻塞流清涕。頭目昏重。加川芎白芷各一錢。葱白二莖。疝氣初發。必先增寒壯熱。甚者嘔逆惡心。每用此藥加木香半錢。寒熱必退。腹痛加揚芍藥一錢。

冲和散治寒温不節。將理失宜。乍暖脫衣。甚熱飲冷。坐臥當風。居處暴露。風雨行路。衝冒霜冷。凌晨早起。呼吸冷氣。久晴暴暖。忽變陰寒。久雨積寒。致生陰濕。如此之候。皆為邪厲侵傷肌膚。入於腠理。使人身體沉重。肢節酸疼。項背拘急。頭目不清。鼻塞聲重。伸欠淚出。氣壅上盛。咽渴不利。胸膈凝滯。

飲食不入。凡此之證。若不便行解利。伏留經絡。傳變不已。

右剉散。每服三錢。水一盞半。煎至八分。去滓熱服。不拘時候。并滓再煎。纔覺傷寒及覺勞倦。亦須服之。不問虛實老幼。悉皆治之。

蒼 朮 六兩

荆芥穗 二兩

甘 草 一兩一錢半

小柴胡湯爲用最多。而諸家屢稱述之。蓋以柴胡半夏。能利能汗。凡半表半裏之間。以之和解。皆可用也。抑不知小柴胡非特爲表裏和解設。其於解血熱。消惡血。誠有功焉。蓋傷寒發熱。一二月間解散。不去其熱。必至於傷血。不問男女皆然。此藥內有黃芩柴胡。最行血熱。所以屢獲奇功。但藥性差寒。用之貴能加減。今推明活法。凡表發熱。裏又有燥渴糞鞭熱證者。是爲內外俱熱。小柴胡加大黃。裏無熱證。但發熱在表者。小柴胡加桂枝主解表。可以溫血。所謂陰盛惡寒。甘辛發散者此也。大黃主攻裏。可以蕩滌血熱。所謂陽盛內熱。酸苦涌泄者此也。是又別其解表以溫。攻裏以寒之義。若遇少陽本證。及無表裏證。或表裏不分之證。但依本方用之。並不須加減。此爲正訣。虛者少與。尤在酌量。治療傷寒。輒用當歸。其意蓋爲調血。既不思一滯中脘。二佐痰飲。三泥胃氣。而血熱又非當歸之所能除。惑之甚矣。否則熱入血室。張氏特以小柴胡主之何哉。雖然。均是和解耳。局方以和解散平

穩之劑爲和解。張氏以小柴胡差寒之劑爲和解。意安在哉。蓋局方和解散。爲尋常感冒和平解散設也。若夫熱在半表半裏。既不可汗。又不可下。非小柴胡一劑。孰能內和而外解之乎。淋家衄血家。法不可汗。亦可以此和解。然而學者僅以小柴胡收效。不遵格法。輕用大柴胡。立意一差。禍不旋踵。吁。可畏哉。又今人但聞小柴胡之藥。多見棄而不服。殊不知陰證似陽。浮熱於外用之。則誤人多矣。的是陽證。或半表半裏用之。無不伐病。所愧者醫之不審陰陽。致使病家之惑。聞者但當責之於醫。不當輕議於藥。方見前

神朮散治四時瘟疫。頭痛項強。發熱增寒。身體疼痛。傷寒鼻塞聲重。咳嗽頭昏。並皆治之。

藥 本 去土

羌 活 去蘆

甘 草 炙

香白芷

細 辛 去葉及土

川 芎 各一兩

蒼 朮 五兩米泔浸一宿切炒

右剉散。每服三錢。水一盞。生薑三片。葱白三寸。煎七分溫服。不拘時候。傷風鼻塞。爲末。葱白茶清調下。

二香散治四時感冒冷濕。寒暑嘔惡。泄利腹痛。瘴氣。飲冷當風。頭疼身熱。傷食不化。

紫 蘇

陳 皮

蒼 朮 各一兩

香 薷 去根二兩

香附子 二兩半炒去毛

厚

朴 去粗皮薑汁拌炒

甘草 扁豆各一兩、
右剉散。每服四錢。水一盞半。生薑三片、木瓜二片、葱白二根煎熱服。外感腫滿。先以此多加車前子、木瓜煎效。

相類

〔痰證〕金沸草散治增寒發熱。惡風自汗。寸口脉浮。胸膈痞滿。氣上衝咽不得息。頭不疼。項不强。見方前

大半夏湯治膈間有寒痰。

半夏湯洗如法薄切焙乾 白茯苓 生薑各一兩

右剉散。水二盞半。煎至一盞。去滓。臨睡温呷。如有熱痰。加炙甘草一分。脾胃不和。去甘草。入陳橘皮一分。

瓜蒂散治胸有寒痰。當吐之。諸亡血虛家。不可與服。

瓜蒂熬黃 赤小豆各半兩

右爲末。取二錢匕。豉一合。湯七合煎。去滓取汁。和末頓服。藥下咽便臥。欲吐且忍。良久不吐。取三錢匕。湯二合和服之。立便吐。倉卒無藥。糟瓜頓吃亦吐。

稀涎散治涎結胸膈。作爲寒熱。飲食減少。

豬牙皂角 圓白半夏各一兩

右剉散。每服三錢。水一盞半。煎至七分。去滓温服。入咽便吐去涎即愈。

〔食積〕治中湯治頭疼脉數。發熱惡寒。滿身不痛。左手脉平和。名食積。方見前

虛人五積散人參養胃湯均可服。方見前

重者香蘇散取五錢。水一盞半煎。去滓。併吞服感應圓二七粒。未效再服。感應圓方見秘鑑類

〔虛煩〕竹葉石膏湯治惡寒身不痛。頭不疼。脉不緊。但煩熱。名虛煩。凡有熱不宜大攻之。熱去則寒起。止宜服此。方見後

橘皮湯治動氣在下。不可發汗。發之反無汗。心中大煩。骨節疼痛。目暈惡寒。食則反惡。穀不得入。宜服此。

橘皮一兩半 甘草炙半兩 人參一分 竹茹半兩

大方脉雜醫科 相類

右剉服。每服五錢。水一盞半。薑三片、棗一枚煎。食前服。

溫膽湯治虛煩。方見雜病類

〔脚氣〕加減小續命湯治身熱肢節痛頭疼。大便秘。或嘔逆。但卒起脚弱為異耳。名脚氣。方見風科虛證類。餘諸方見

脚氣類

通治

五積散性溫。敗毒散性涼。凡人遇些感冒。對半雜和煎服。名交加散。亦多驗。小小感冒。因風雨寒冷所襲。猝然得之。正氣未耗。邪氣未深。用此先以助其正氣使益壯。則邪氣自當屏散。若倉卒藥未能辦。只以葱白連鬚數莖、豆豉一捻、生薑數片。水煎熱啜。連進三兩盞。亦能發散。若邪氣已入經絡。及時行疫癘。則須依經按法。表裏汗下。不可差殊。戒之。二方見前

雙解散治風寒暑濕。飢飽勞役。內外諸邪所傷。無問自汗汗後雜病。但覺不快。便可通解得愈。小兒生瘡疹。使其出快。亦能氣通宜而愈。

益元散 方見中暑類三兩半

防風通聖散 方見風科熱證類三兩半

右一處和勻。名雙解散。每服三錢。水一盞半。生薑三片、葱白五寸、豉二十粒。煎至一盞。溫服。北方此藥大效。

麻黃桂枝湯治厥陰傷寒煩滿。發熱惡寒。往來如瘧。或囊縮。其脉尺寸俱微緩者主之。若脉沉短。其囊必縮。急以承氣湯下之。可保五死一生。承氣湯乃利陽明藥耳。若病到厥陰。其勢已甚。蓋陽明養宗筋。為熱毒所攻。乃以承氣湯瀉其能養。故利陽以救陰。此猶假虞以伐虢、圍魏救趙之意也。太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便可。一日三二度發。脉微緩者。為欲愈也。脉微惡寒者。此陰陽俱解也。以其不能得少汗出。身必癢。宜服。

桂枝 四錢一字

芍藥

麻黃 去節

杏仁 十二個去皮尖

甘草 炙各半兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。入生薑三片、紅棗二枚。煎八分。去滓。食前服。

白虎湯治傷寒大汗出後。表證已解。心胸大煩。渴欲飲水。及吐或下後七八日。邪毒不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。宜服之。又治夏月中暑毒。汗出惡寒。身熱而渴。及治口中不仁。背上惡寒效。三陽合病。腹滿身重面垢。譫語遺溺。並不可汗下。但少與服之效。

石膏 一斤

知母 六兩

甘草 二兩

右剉散。每服三大錢。水一盞半。加入粳米五十餘粒。同煎至一盞。去渣溫服。小兒量力少少與之。或加人參少許同煎亦得。食後服。此藥立夏後。立秋前可服。春時及立秋後並亡血虛家。並不可服。不惡寒反惡熱。大便不秘者亦服。

大青龍湯治太陽中風。傷寒脉緊。發熱惡寒身疼。不汗出而煩渴。或脉浮緩。身不疼但重。乍有輕時。或傷寒見風脉。傷風見寒脉。榮衛俱傷。煩躁則用。若脉微弱。汗出惡風者。不可服之。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。

桂枝一兩 去皮

甘草一兩 炙

石膏如半個 雞子大碎

杏仁二十枚 去皮尖

麻

黃三兩 去節 湯泡 去黃汁 焙乾 秤

右剉散。每服五錢。水一盞半。生薑四片。棗子一枚。煎至八分。去滓溫服。取汗為度。若汗周身潤。止後服。未周身潤。可停待相次服盡。不欲汗。汗多恐亡陽故也。若汗多不止。用溫粉撲之。方見後

小青龍湯治傷寒表未解。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。或渴或利或噎。或小便利。小腹痛滿而喘者。

麻黃去節

細辛去苗

乾薑炮

甘草炙

桂枝

芍藥各三兩

半夏湯去滑

五味子各二兩 半

右剉散。每服五錢。水二盞煎。食前溫服。虛噎去麻黃。加熟附子一錢。小便利。小腹痛滿。加茯苓一

錢。喘加杏仁七枚去皮尖。

溫粉凡發汗不欲多。多則亡陽。宜用此粉撲之即愈。神效。

白朮

藁本

川芎

白芷

右為末一兩。入米粉三兩。均和撲之。

真武湯治傷寒數日以後。發熱腹疼。頭目昏沉。四肢疼痛。大便自利。小便或利或澀。或嘔或咳。並宜服之。已經汗下解。仍發熱者。心下悸。頭眩暈。肉瞤動。振振欲躓地者。此由渴後飲水。停留中脘所致。

白茯苓

白芍藥

白朮各一兩

熟附子一枚 炮

右剉散。每服四錢。水一盞半。生薑五片。煎六分。食前溫服。小便利者去茯苓。大便利去芍藥。加乾薑二兩。咳者加五味子三分。細辛乾薑各一兩。嘔者去附子。每服加生薑五片。又云。水飲內蓄。上乘於肺。為喘為咳。因水而咳。病在陽明。則用小青龍湯主之。病在少陰。此藥主之。

桂枝二越婢一湯治太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜服之。屬太陽

桂枝

芍藥

甘草

石膏六錢 錘碎

麻

黃牛兩 湯洗去 黃汁 焙乾 秤

右剉散。每用五錢。水一盞半。生薑四片。棗子一枚。煎八分溫服。

小建中湯治陽脉澀。陰脉弦。腹中急痛。服此不差者。小柴胡湯主之。方見前

芍藥三兩 甘草一兩 桂枝去粗皮一兩半

右剉散。每服五錢。水一盞半。生薑三片。棗子一枚。煎八分。去滓。下膠飴一兩許。再煎化。溫服。兼治熱多寒少。尺脉遲。榮氣不足。血少故也。加黃耆一兩半。尺脉尚遲。再作一劑。寒傷榮。甚至尺弱。倦乏昏沉。加人參黃耆各一兩半效。

梔子升麻散治晚發傷寒。三月至夏為晚發。

梔子十枚擘碎蒸 升麻一兩半 生地黄半斤切碎 柴胡 石膏各二兩半

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎八分。頻服。病不解更作。頭面赤去石膏。入乾葛二兩。無地黃以竝代之。

解肌湯治傷寒溫病天行。頭痛壯熱。

葛根一兩 黃芩 芍藥各半兩 甘草一分

右剉散。每服五錢。水一盞半。棗子一枚。煎八分。日三服。三四日不解。脉浮者宜重服發汗。脉沉實者宜下之。

漢防己湯治風濕。脉浮身重。汗出。

甘草炙 黃耆蜜炙各二兩 漢防己四兩 白朮三兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。生薑四片。棗子一枚。煎一中盞。飲訖乃坐被中。汗出如蟲行。或被臥取其汗。

白虎加蒼朮湯治濕溫多汗。

知母六兩 甘草二兩炙 石膏一斤 蒼朮三兩 粳米三兩

右剉散。每服五錢。水盞半。煎至八分。取六分清汁。溫服。

葛根湯治傷風頭項強急。身體反張。屬太陽經。先因傷風。又感寒濕。名瘧病。外證發熱惡寒。與傷寒相似。但其脉沉遲弦細。項背反張。強硬如發癩之狀。無汗惡寒名剛瘧。有汗不惡寒名柔瘧。此藥主之。方見後。有汗桂枝湯加葛根。方見傷風類。

小續命湯治剛柔二瘧。有汗去麻黃加葛根。方見風科虛證類

大承氣湯治剛瘧。仰目胸滿口噤。其人臥不著席。脚攣急咬齒。與服得利則減。極熱作瘧者難治。方見前

敗毒散治剛瘡。加防風天麻黃芩全蝎各五錢、生薑三片、薄荷七葉煎。方見前仍用加味壽星圓。薑汁竹瀝湯服。累用有效。方見風科通治類

附朮散治傷寒手足逆冷。筋脉拘急。汗出不止。項強直。搖頭口噤。時發時止。不食下瀉者難治。

附子炮 白朮各一兩 川芎三錢 獨活半兩 桂心二錢

右剉散。每服三錢。水一中盞。棗子二個。煎至五分。溫服。不拘時候。

附子防風散治傷寒柔瘕。閉目合面。手足厥冷。筋脉拘急。出汗不止。

白朮 五味子 白茯苓 川芎 乾薑炮裂 甘草炙微

附子炮裂去皮臍 防風各三分 桂心半兩 柴胡一兩半

右剉散。每服三錢。水一盞。生薑四片。煎至六分。去滓。溫服。不拘時候。

八物白朮散治傷寒柔瘕。三日不瘥。手足厥冷。筋脉拘急。汗不出。恐陰氣內傷。

白朮 白茯苓 麻黃去節湯泡沸焙 五味子 羌活各半兩 良薑一分

附子炮去皮臍 桂心各三分

右散。每服四錢。水一盞。薑四片。煎至五分。不拘時溫服。

竹葉石膏湯治傷寒時氣。表裏俱虛。遍身發熱。心胸煩悶。得汗已解。內無津液。虛羸少氣。胸中煩滿。氣逆欲吐。諸虛煩熱。與傷寒相似。但不惡寒。身不疼。頭不痛。脉不緊數。不可汗下。宜服。

石膏一兩六錢研碎 半夏二錢半湯泡七次 人參二錢去蘆 麥門冬五錢半去心 甘草炙二錢

右剉散。入石膏末停勻。每服四錢。水兩盞。入青竹葉生薑各五片。煎至盡半。入粳米一百餘粒再煎。米熟湯成。去米溫服。不拘時候。

麻黃細辛附子湯治少陰傷寒。口中和。而背惡寒反熱。倦怠。自汗而渴。其脉尺寸俱沉而緊者。

麻黃去節 細辛 附子各半兩炮去皮臍

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓。食前服。手足厥者。去麻黃細辛。加乾薑半兩、甘草一分。或口燥舌乾而渴。宜急下之。

附子湯治少陰病得之一二日。口中和。背惡寒者。即當灸之。少陰病身體痛。手足寒。骨節痛。脉沉者。並宜服之。

茯苓 芍藥各一兩半 人參一兩 白朮二兩 附子一枚炮

右散。每服四錢。水盞半。煎至七分。去滓。溫服。日進三服。

四逆湯治傷寒表裏俱病名兩感。一日太陽與少陰俱病。頭痛口乾。煩滿而渴。二日陽明與太陰俱病。腹滿身熱。不食譫語。三日少陽與厥陰俱病。耳聾囊縮而厥。兩病俱作。治有先後。先宜救裏。臟氣內正。急宜攻表。救內固宜急。而表亦不可緩也。救裏宜四逆湯。身體疼痛。清便自調。急當救表。宜桂枝湯。兩感傷寒。古無治法。惟證治論并活人書解仲景治有先後之說。皆云治有先後者。宜先救裏。內纔溫則可醫矣。然後救表亦不可緩也。以上所論。並先救裏。然後救表。如下利不止。身體疼痛。則先救裏。如不下利。身體疼痛。則先救表。此亦謂之治有先後也。兩感病亦有可治之理。而不可必也。

方見前

人參養胃湯方見前 每用四錢。生薑三片。棗子二枚煎。吞服來復丹方見前 五十粒。調和陰陽。其病頓瘳。

世無不可治之病。醫不善醫。信乎。
葛根湯治太陽病項背強几几然。無汗惡寒。并治三陽合病自利。

葛根一兩 麻黃去節三分 桂心 甘草炙 芍藥各半兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。煎七分。去滓食前溫服。三陽合病不下利。但嘔者。加半夏六錢。

脾約圓治太陽陽明脾約是也。大便堅。小便利者。其脾為約。

大黃二兩酒浸 厚朴去粗皮 枳殼去穢 白芍藥各半兩 麻子仁三分另研 杏仁一兩半另研

右為末。煉蜜和杵一千下。圓如梧桐子大。每服二十圓。溫水下。不拘時候。未效加五圓十圓至五十圓止。利後服糜粥將理。

附子散治陰毒傷寒為病。手足冷。腰背強。頭疼腹痛。或煩渴。精神恍惚。額與手背時出冷汗。聲鄭重。爪甲昏面色青黑。多因脾腎虛寒伏陰。重感於寒所致。或因服冷藥過多。心腹脹滿。昏不知人。

附子炮去皮三分 桂心 當歸去尾 白朮各半兩去蘆 半夏湯泡去滑 乾薑各一分炮

右剉散。每服三錢。水二盞。生薑三片。煎至六分。不以時熱服。衣覆取汗。

返陰丹治陰毒傷寒。心神煩躁。頭痛。四肢逆冷。面青腹脹。脉沉伏者。

硫黃通明五兩別研 消石別研 太陰玄精各二兩別研 乾薑炮 桂心各半兩

附子炮半兩

右用鐵銚。先鋪玄精。次下消末各一半。中間鋪硫黃末。又將二石餘末蓋上。以小盞合著。熟炭火三斤。燒令得所。勿令烟出。急取瓦盆合著地上。四面灰蓋。勿令烟出。候冷取出研細。入後藥為末。

同研勻。米糊圓。梧桐子大。每服二三十圓。煎艾湯下。頓服汗出爲度。未退。乃大著艾炷灸臍下丹田氣海。更不退。則以葱餡熨之。其法亦治氣虛陽脫。體冷無脉。氣息欲絕。不省人事。及傷寒陰厥。百藥不效。其法見前。

四逆湯治陰毒要藥。方見前

當歸四逆湯治手足厥寒。脉細欲絕者。亦陰毒要藥。

- 當歸去尾
- 桂枝
- 芍藥
- 細辛各三兩
- 大棗二十枚
- 甘草炙
- 通草各二兩

右剉散。以水八升。煮三升。去滓温服一升。日三服。內有久寒者。加吳茱萸生薑主之。

升麻湯治陽毒。傷寒一二日便成陽毒。或服藥吐下後變成陽毒。腰背痛。煩悶不安。面赤。狂言或走或見鬼。或下利。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。下膿血。脉浮大數。五日可治。七日不可治。大抵宜早發汗。

- 升麻二兩
 - 犀角屑
 - 射干
 - 黃芩
 - 人參
 - 甘草炙各一分
- 右剉散。每服五錢。水一盞。煎至七分。熱服。併進三四服。温覆汗出爲度。甚者大承氣湯。除厚朴加木通甘草大腹皮桃仁各一兩。以利爲效。方見前

梔子仁湯治陽毒傷寒壯熱。百節疼痛。

- 梔子
- 赤芍藥
- 大青
- 知母各一兩
- 升麻
- 黃芩
- 石膏
- 杏仁
- 柴胡
- 甘草各半兩

右剉散。每服四錢。水一盞。薑三片。豉二十粒。煎至七分。不拘時候服。

大陷胸湯治傷寒表未解。醫反下之。膈內拒痛。兩手不可近。短氣煩躁。心中懊懣。心下硬。大便不通。舌燥而渴。熱實。脉沉而緊。又治身無大熱。有水結在胸脇間者。

- 大黃牛兩
- 芒消四兩
- 甘遂半兩

右剉散。用水三盞。先煎大黃至一大盞。入芒消煮鎔。下甘遂末煮一沸。分二服。得利止。

小陷胸湯治結胸病正在心。按之則痛。脈浮滑者。

- 黃連一分
- 半夏湯洗去滑六錢
- 栝樓實四分之一

右剉散。水二盞。先煎栝樓至一盞半。入前藥煎至六分。去滓分二服。利黃涎沫即安。一方加枳實。去穰黃芩各一分。苦梗六錢。累用有效。

大陷胸圓治熱實結胸。病發於陽。而反下之。熱入。因作結胸。以下之太早故也。其病項強如柔痙狀。

下之則和。

大黃二兩 葶炒 杏仁去皮尖炒 芒消各三分

右前二味爲末。將杏仁芒消合研爲脂。和藥。取如彈子大一枚。別研甘遂末一錢。白蜜一大匕。水二盞。煎至七分頓服。一宿乃下。如不下更服。取下爲效。甘遂性猛。宜斟酌虛實入之。

治結胸灸法

巴豆十四粒 黃連七寸連皮用

右爲末。用津唾和成膏。填入臍心。以艾炷其上。腹中有聲。其病去矣。不拘壯數。病去爲度。纔灸了。便以溫湯浸手帕拭之。恐生瘡。

枳實理中圓治寒實結胸。及傷寒諸吐利後。胸痞欲絕。膈高起急痛。手不得近。

枳實去穢 茯苓 人參 白朮 乾薑炮 甘草各等分

右爲末。蜜和。一兩作四圓。熱湯化下。渴加栝樓根。下利加牡蠣粉各等分。爲末服亦可。

桔梗枳殼湯治傷寒氣痞。胸滿欲死。

枳殼去穢 桔梗去穢 甘草各等分

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎七分。食前服。痰多加半夏生薑。有熱加黃芩。

三黃湯治傷寒陰證。下之太早。致心下痞。按之軟。其脉關上浮者主之。若未解。未可攻。宜先隨風寒

二證投桂枝麻黃湯。表解已。卽服此。

大黃蒸 黃連 黃芩去心

右剉散。每服五錢。沸湯二盞熱漬之一時久。去滓分二服暖服。或汗出惡寒。加附子別煎汁。入一合同服。

半夏瀉心湯治心下痞滿而不痛者。

半夏一兩一錢 黃芩去心 人參去蘆 甘草炙 乾薑炮各兩半 黃連牛兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎七分溫服。或傷寒中風。醫反下之。下利日數十行。

穀不化。腹中鳴。心下痞。乾嘔心煩者。加甘草半兩。人參一兩。名甘草瀉心湯。或汗出解後。胃中

不和。心下痞硬。乾噎食臭。脇下水鳴。下利者。加生薑一兩。減乾薑一兩。餘如正方。名生薑瀉心湯。

一方治痰熱。心胸煩痞。半夏圓。酒蒸黃連圓合和。每服三十五圓。米飲下。特效。方見痰瀉及下痢類

近效方治陽證結胸。死無可藥者。曲鯨活者十一條。卽蛇也 搗爛。用蜜半盞。水半碗灌服。無蜜用沙糖。

丁香柿蒂散治咳逆。諸方並見後第四卷

百合知母湯治病人欲食復不能食。常默默欲臥。復不能臥。欲行復不能行。有寒如無寒。有熱如無熱。飲食或美或不美。如強健人。而臥不能行。口苦小便赤。藥入口即吐利。此因虛勞大病之後不復。變成此疾。名百合候。此主之。發汗後者服。

百合七枚 知母三兩

右先以水洗百合漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母。每取一升。去滓後合和。煎取一升五合。分溫再服。

滑石代赭湯治百合病下之後者。

百合七枚 滑石三兩碎 代赭如彈子大一枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。另以泉水二升。煎滑石代赭。取一升。去滓後合和。重煎取一升五合。分溫服。不拘時候。

鷄子湯治百合病吐之後者。

百合七枚 鷄子黃十枚

右先以水洗百合漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。內鷄子黃攪勻。五分溫服。

百合洗方治百合病一月不解。變成渴者。

百合

水一斗。漬一宿。以洗身。已。食煮餅。勿以鹽豉。

玄參升麻湯治傷寒失下。不當下而下之。熱毒在胃。發斑如錦紋。甚則煩躁譫語。兼治喉閉腫痛。

玄參 升麻 甘草各半兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎七分。溫服。溫毒亦能發斑也。

知母麻黃湯治壞傷寒。以傷寒差後。經久精神不守。言語錯謬。或潮熱頰赤。寒熱如瘧。皆由汗下不止。毒在心胞絡間所致也。

知母一兩半 麻黃去節 甘草炙 芍藥 黃芩去心 桂心各半兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎七分。溫服。日三四服。若心煩欲飲水。稍稍與之。

黑奴圓治傷寒調理失序。醫所不治。及時行疫病。七日不汗。脉洪數。面赤目瞪。身熱煩躁。狂言欲走。

大渴或口噤。精魄已散。但心下暖。鞞開口灌藥下咽即活。亦治陽毒發斑。

麻黃去節

大黃各二兩

芒消

釜底煤別研

梁塵別研

小麥奴

竈突墨各一兩別研

右爲末。煉蜜爲圓。彈子大。新汲水研下一圓。渴者與冷水盡飲之。須臾當寒。寒竟汗出便瘥。若日移五尺不汗。依前法服一圓差。須病人大渴乃可與之。不渴者勿服。

無憂散治傷寒調理失序。毒氣內結。胸腹脹滿。坐臥不安。日久不瘥。狂言妄語。大小便不通。或復吐逆。

臆月黃牛膽

以天南星爲末入膽內縛令緊當風避日懸之候乾取用

右爲末。以人參半兩。煎湯七分。調末二錢。乘熱服。遲頃更以熱人參湯投之。或睡便溺。下黃黑惡物是效。

桃仁湯治狐惑默默欲眠。目不瞑。惡飲食。面目乍赤乍白乍黑。齒無色。舌上白。聲啞咽乾。此因大病後腸胃虛空。三蟲求食。食人五臟。食其喉則爲惑。其聲啞。食下部則爲狐。其咽乾。當看上唇有瘡。蟲食其臟。下唇有瘡。蟲食其肛。

桃仁去皮尖

槐子碎

艾各一兩

右剉散。每服五錢。水一大盞。薑三片。棗二枚。煎七分。食前服之。
白頭翁湯治熱利下重。及欲飲水者。

白頭翁二兩

黃連

黃柏

秦皮各三兩

右剉散。水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。不愈。更飲一升即效。

黃連阿膠圓治同上。方見咳嗽類

黃連解毒湯治時疾三日已汗解。或因飲酒復劇。苦煩悶。乾嘔口燥。呻吟錯語。不得臥。

黃連三分

黃蘗牛兩

梔子四枚

黃芩一兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎取一湯盞。去滓服。未知再服。進粥。以此漸差。外臺云。凡大熱盛。煩嘔。呻吟譫語。不得眠者。傳此方。諸人用之亦效。此直解毒熱。除酷熱。不必飲酒劇者。

黃連犀角湯治傷寒及諸病後。內有瘡出下部。

黃連半兩

烏梅七個

犀角無則以升麻代

木香各一兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎七分。食前服。

雄黃研 青箱子 苦參 黃連各二分 桃仁去皮尖

右爲末。以生艾搗汁。和如棗核大。綿裹納下部。扁竹汁更佳。無艾只用綿裹散子納下部亦得。四逆湯治傷寒寒厥。或表熱裏寒。下利清穀。食入則吐。或大汗大吐大下之後。四肢冰冷。五內拘急。舉體疼痛。不渴脉沉者。方見前

白虎湯治熱厥腹滿。身重難以轉側。面垢。譫語遺溺。手足厥冷。自汗脉沉滑。裏有熱也。方見前 大承氣湯亦治熱厥。當觀病淺深。量多寡飲之。方見前

黃連阿膠湯治少陰病得之二三日已上。心中煩。不得臥者。

黃連一兩 阿膠三分 鷄子黃半個 黃芩一分 芍藥半兩

右剉散。每服四錢。水二盞。煎取一盞。去滓。內膠消盡。內鷄子黃攪令和。溫服。日二服。

文蛤散病在陽。應以汗解之。反以冷水噴之。熱被寒水入裏。却不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。宜服。若不差者。與五苓散。寒實結胸無熱證者。與三物白散。

文蛤一兩

右爲散。沸湯和服方寸匕。湯用五合。

三物白散治寒實結胸。無熱證者。屬太陽

貝母三分 桔梗三分去蘆 巴豆去心皮熬黑研如脂一分

右爲散。內巴豆研和。以白飲和服。強人半錢匕。羸人可減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利。進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。身熱皮粟不解。欲引衣自覆。若以水噴之洗之。益令熱。却不得出。當汗而不汗則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥三兩如上法。

十棗湯太陽中風。下利嘔逆。表解者乃可攻之。其人漿漿汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞭滿。引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。宜服。方見痰飲類

抵當湯太陽病六七日。表證仍在。脉微而沉。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。小腹鞭滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀熱在裏故也。或太陽病身黃。脉沉結。小腹鞭。小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。或傷寒有熱。小腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。當下之。不可餘藥。並宜服。屬太陽 陽明證其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞭。大便反易。其色必黑者。宜此藥下之。或病人無表裏證。發熱七八日。雖脉浮數者。可下之。假令

已下。脉數不解。今熱則消穀喜飢。至六七日不大便者。有瘀血。宜服。屬陽明

大黃一兩去皮酒洗

蠶十枚去翅足熬

桃仁七枚去皮尖搗碎

水

十枚熬去子碎水蛭入腹再生化為害尤甚須剉斷用石灰炒再熬

右為散。作二服。水二盞。煎七分。去滓溫服。

吳茱萸湯食穀欲嘔。屬陽明也。此主之。得湯反劇者。屬上焦也。屬陽明少陰病吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。或乾嘔吐涎沫頭痛者。此並主之。屬少陰

人參一兩去蘆

吳茱萸一兩六錢半湯洗三遍

右為散。每服四錢。生薑四片。棗子一枚。水二盞半。煎八分。去滓分二服。

苦酒湯苦酒。米醋是也。治少陰病咽中傷。生瘡不能語言。聲不出者。

半

夏洗碎如棗核十四枚

鷄子一枚去黃內苦酒著鷄子殼中

右內半夏著苦酒中。以鷄子殼置刀環中。安火上。令二三沸。去渣。少少含嚥之。不差再服。

牡蠣湯治發汗多。頭眩汗出。筋惕肉瞤。

白朮

牡蠣粉炒黃

防

風獨莖者去蘆頭各等分

右為末。每服二錢。以酒調下。米飲亦可。日二三服。汗止便服小建中湯。方見前

陰旦湯治傷寒肢節疼痛。內寒外熱。虛煩。

芍藥二兩

甘草二兩炙

乾薑三兩炮

黃芩三兩

桂四兩

右剉散。每服五錢。棗二枚。水一盞半。煎八分。去滓溫服。日三夜二。覆令小汗。

大白朮散治陰毒傷寒。心間煩躁。四肢逆冷。

白朮

附子炮裂去皮臍

川烏頭製同上

桔梗去蘆頭

細辛各一兩

乾

薑牛兩炮裂剉

右為末。每服二錢。水一中盞。煎至六分。不拘時。稍熱服。

回陽丹治陰毒傷寒。面青。手足逆冷。心腹氣脹。脉候沉細。

葶澄茄

木香

乾蝎

附子炮裂去皮臍

硫

黃細研

吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各半兩

乾薑一分

右為末。酒煮麵糊圓。如梧子大。每服三十圓。不計時候。生薑湯下。頻服三服。復以熱酒一盞投之。

厚衣蓋取汗。

正陽散治陰毒傷寒。面青。口張出氣。心下硬。身不熱。只額上有汗。煩渴不止。舌黑多睡。四肢俱冷。

甘草一分炙

麝香一分細研入

附子一兩炮裂去皮臍

乾薑一分炮裂剉

皂

莢一挺去皮塗酥炙令黃色去子

右爲末。每服二錢。水一中盞。煎至五分。不拘時熱服。

肉桂散治傷寒服冷藥過度。心腹脹滿。四肢逆冷。昏沉不識人。變爲陰毒。

肉桂去粗皮

高良薑剉

厚朴去皮薑汁炙令香熟

白朮

木香各三分

人參去蘆頭

赤芍藥

陳橘皮

附子炮裂去皮鱗

前胡去蘆頭

當歸各一分

吳茱萸牛兩炒黃

右剉散。每服四錢。水一中盞。棗三枚。煎六分。去滓。不拘時。稍熱頻服。

陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒。或服藥吐下之後變成陽毒。腰背痛。煩悶不安。面赤。狂言或走。或見鬼。或下利。脉浮大數。面赤斑斑如錦紋。喉咽痛。下膿血。五日可治。七日不可治。

升麻二分

犀角屑

射干

黃芩

人參

甘草各一分

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎至一盞。去滓飲半盞。食頃再服。溫覆手足出汗。出汗則解。不解再

服。

大黃散治陽毒傷寒未解。熱結在內。恍惚如狂。

甘草炙微赤

木通剉

大腹皮各一兩剉

桂心三兩

川芒消二兩

川大黃兩半剉碎

桃仁

二十一枚湯浸去皮尖雙人麩炒令微黃

右剉散。每服四錢。水一中盞。煎至六分。不拘時候溫服。通利爲度。

五柔圓老人虛人脚氣。亡津液。虛秘大便結。調補三焦。

大黃四兩

前胡一兩

半夏洗七次

菴菴浸酒

芍藥

茯苓去皮

細辛

當歸

葶藶炒各半兩

右爲末。煉蜜爲圓。如梧桐子大。溫水下二十圓。以通爲度。

葛根橘皮湯療冬溫未卽病。至春被積寒所折不得發。至夏得熱。其寒解。冬溫始發。肌中斑爛癰瘡

如錦紋而咳。心悶。但嘔吐清水。服此湯卽靜。

葛根

橘皮

杏仁去皮尖研炒

知母

黃芩

麻黃去湯泡

甘草炙各半兩

右剉散。每服五錢。水一大盞。煎至一中盞。去滓溫服。

知母桂心湯治傷寒後不差。朝夕有熱如瘧。

麻黃一兩去節

甘草一兩炙

知母二兩或作一兩

芍藥

黃芩各一兩

桂心二兩或作一兩

右爲散。每服四錢。水一盞半。生薑四片。煎一盞。去滓。取八分清汁。溫熱服。日三。覆令微汗。若心煩

不眠其人欲飲水當稍稍與之令胃中和則愈。
增損四物湯治少陰下利手足冷無熱候者。

甘草二兩

人參

龍骨各二兩

黃連

乾薑各一兩

附子一枚炮去皮

右剉散每服三錢水一盞煎七分日三服不差復作下利腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩。
化斑湯治斑毒。

人參

石膏各半兩

麥麩

知母

甘草各一分

右剉散每服五錢匕水一盞半入糯米一合煎八分取米熟為度去滓溫服。

黃連橘皮湯治溫毒發斑。

黃連四兩去毛

陳橘皮

杏仁去皮尖

枳實炙

麻黃去節湯泡

葛根各二兩

厚朴薑汁炙

甘草各一兩炙

右剉散每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服下利當先止。

陽旦湯治中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風項強鼻鳴乾嘔。

桂心

芍藥各三兩

甘草

黃芩各二兩

右剉散每服五錢水一盞半棗子一枚生薑三片煎至一盞取八分清汁溫服自汗者去桂心加附子一枚炮渴者去桂心加栝樓三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳若脉浮緊無汗發熱者不可與。
竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕。

刮竹青皮一升

右用水三升煮取一升半絞去滓分服立愈。

乾薑湯療婦人得溫病雖差未復未滿一百日不可與交合為陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以傷婦人名為陽易速當療之可瘥滿一百日不可療也宜服此藥。

乾薑一分炮

右剉散水二盞煎六分溫服汗出得解止手足伸遂愈。

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搐搦如中風狀。

栝樓根無黃根者二兩 青竹茹刮半斤淡竹者

右水二升煮取一升二合去滓溫溫作二三服吃立效。

當歸白朮湯婦人未平復。因有所動。小腹急痛。腰胯疼。四肢不任舉身。無熱發者。

白朮 桂枝去皮 甘草炙 人參 黃耆蜜炙 芍藥各一分

生薑半兩 當歸一兩 附子一枚破分八片去皮

右剉散。水三升。煮取一升半。去滓。通口服一半。食頃再服一半。溫覆微汗便差。

知母麻黃湯傷寒差後。或十數日。或半月二十日。終不惺惺。常昏沉似失精神。言語錯謬。又無寒熱。醫或作鬼祟或風疾。多般治不差。或朝夕潮熱頰赤。或有寒熱似瘧。都是發汗不盡。餘毒在心胞絡間所致。

知母一兩 麻黃去節 甘草炙 芍藥 黃芩各半

桂枝去皮半兩盛暑中可加桂枝作一分

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎八分。去滓。溫服。半日可相次二三服。溫覆令微汗。若心煩不眠。欲飲水。當稍稍與之。令胃中和即愈。未汗再服。

應手方治傷寒舌出寸餘。連日不收。

以梅花腦子爲末。搽舌上。應手而收。當用五錢病方愈。

白朮散治傷寒氣脈不和。增寒壯熱。鼻塞腦悶。涕唾稠粘。痰咳壅滯。或冒涉風濕。增寒發熱。骨節煩痛。或中暑嘔吐眩暈。及大病後將理失宜。食復勞復。病證如初。悉主之。又五勞七傷。氣虛頭眩。精神恍惚。睡臥不寧。肢體倦怠。潮熱盜汗。脾胃虛損。面色萎黃。飲食不美。口吐酸水。臟腑滑泄。腹內虛鳴。反胃吐逆。心腹絞痛。久瘧久痢。及膈氣噎塞。上氣喘促。坐臥不安。或飲食所傷。胸膈痞悶。腹脇脹。婦人產前產後。血氣不和。霍亂吐瀉。氣厥不省人事。並宜服之。常服辟四時不正之氣。及山嵐瘴疫。

白芷 甘草炒 青皮去白 白茯苓去皮 桔梗去蘆 山藥

香附子以上各三兩去毛 乾薑半兩 白朮去蘆

右剉散。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。木瓜一片。紫蘇葉二三皮。煎七分。食前服。若吐瀉。入白梅煎。喘加桑白皮杏仁。傷寒勞復入薄荷。膈氣木通三寸。麝香少許。中暑嘔逆入香薷。產前產後。血氣不和。入荊芥。霍亂入藿香。氣厥入鹽煎服。

又方白朮散治傷寒雜病。一切吐瀉。煩渴霍亂。虛損氣弱。保養衰老。及治酒積嘔噦。

白朮 茯苓去皮 人參各半 甘草兩半 木香一分 藿香半兩

葛根一兩

右爲末。白湯調服二錢。煩渴加滑石二兩。甚者加薑汁續飲之。
蜜煎導法。陽明病自汗出。若發汗。小便自利者。此爲津液內竭。屎雖鞭。不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及大豬膽汁。皆可爲導。

右蜜四兩。銅器中微火煎之。稍凝如飴狀。攪之勿令焦著。欲可圓。捻作鋌。如指許長二寸。當熱時急作令頭銳。內穀道中。以手急抱。欲大便時乃去之。

豬膽汁方

右以大豬膽一枚。瀉汁。和法醋少許。以灌穀道中。如一食頃。當大便。

蜜漬柏皮治口瘡舌潰爛

右以大藥去粗皮。蜜漬一宿。合之。吞汁勿絕。差。或用蜜炙焦黃色。研爲末。每服半錢。搽。

灸法 初得病或先頭痛身寒熱。或瀉瀉欲守火。或腰背強直。面目如飲酒狀。此傷寒初得一二日。但烈火灸心下三處。第一處去心下一寸名巨闕。第二處去心下二寸名上管。第三處去心下三寸名胃管。各灸五十壯。然或人形大小不同。恐寸數有異。可繩度。隨其長短寸數最佳。取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半。當繩頭名胃管。又中屈半繩更分爲二分。從胃管向上度

一分。卽是上管。又上度取一分。卽是巨闕。大人可灸五十壯。小兒可三壯。亦隨其年灸之。大小以意斟酌也。若病在三四日以上。宜先灸胸上二十壯。以繩度鼻正上盡髮際。中屈繩斷去半。便從髮際入髮下灸繩頭名曰天聰。又灸兩顛顛。穴在耳前動處。又灸內風池。穴在項後髮際陷中。又灸肝膈。穴在第九椎下兩旁相去各一寸半。百壯。餘處各二十壯。又灸太衝。穴在足大指本節後二寸或一寸半陷中三十壯。神驗。

世醫得效方卷第一終

世醫得效方卷第二

大方脉雜醫科

傷風

桂枝湯治足太陽膀胱經傷風。脉陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。瀼瀼惡寒。洒洒惡風。翕翕然發熱。鼻鳴乾嘔。又太陽證宜汗。其人失血及下利。則頻與服。使體潤皦皦。連日當自解。

桂枝去皮 芍藥各三兩 甘草一兩

右剉散。每服二錢。水一盞半。生薑三片。棗一枚。擘破。共煎至七分。去滓溫服。不拘時。惟冬春初可行。自春及夏至以前。可加黃芩半兩。夏至以後。加知母半兩。石膏二兩。或升麻半兩。若病人素虛寒者。不用加減。無汗者不宜服之。

于湯治足陽明胃經傷風惡食。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡風自汗。嗜臥身重。小便難。潮熱而嘔。脉浮弦長而數。悉主之。

杏 仁去尖

半 夏湯去滑

五味子各二錢半

芍藥

桂心

細辛

乾薑炮

大黃蒸

甘草炙各三錢

茯苓四錢

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓食前服。

柴胡加桂湯治足少陽膽經傷風四五日。身熱惡風。頸項強。脇下滿。手足溫。口苦而渴。自汗。其脉陽浮陰弦。或發汗多。亡陽譫語。可以此和其榮衛。通其津液自愈。

柴胡三錢

半夏湯去滑四錢一字

甘草炙三錢一字

芍藥

黃芩

人參

桂 棘各半兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎至七分。去滓空心溫服。

桂枝芍藥湯治足太陰脾經傷風自汗。咽乾腹滿。自利不渴。四肢倦怠。手足自溫。其脉弦大而緩者。

桂心半兩

白芍藥三兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。去滓溫服。腹痛甚者。加大黃一兩。

桂附湯治足少陰腎經傷風。胸滿心煩。咽喉痛。自汗。腰疼連脣骨酸痛。嘔吐涎沫。頭痛。其脉沉弦者。

附子生去皮臍

桂心

乾薑

芍藥

甘草炙

茯苓

桃 仁去皮尖麩炒各一兩

右剉散。每服四錢。水二盞。煎七分。去滓食前服。或咽喉痛。加桔梗半兩。

八物湯治足厥陰肝經傷風。惡風而倦。自汗。小腹急痛。寒熱如瘧。骨節煩疼。其脉尺寸俱微而遲者。

桂心 當歸

川芎

前胡

防風各三分

芍藥一兩半

甘草炙 茯苓各半兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗三枚。煎至八分。去滓空心服。

傷暑

五苓散治傷暑煩渴。引飲無度。兼治傷寒溫熱。表裏未解。煩渴引水。水入即吐。或小便不利。及汗出表解。煩渴不止。又治霍亂吐利。黃疸溫疫。

澤瀉二兩半

桂心一兩

猪苓

赤茯苓去皮

白朮去蘆各一兩半

右爲末。每服二錢。沸湯調下。不拘時候。服訖多飲熱湯。汗出即愈。溫熱病加甘草一兩。炙。瘵熱在裏。身發黃疸。濃煎茵陳湯食前服。疸病發渴。及中暑引飲。白水調服。小兒加白朮末少許。發虛熱。

每料綿黃耆人參麥門冬去心各一兩。分陰陽。退寒熱。山茵陳車前草每服各二根。止瀉加紫蘇陳米各少許。薑汁半匕。久痢加肉豆蔻五錢。每服鹽梅一枚。赤痢烏梅一枚。粟殼二枚去蒂赤膜醋炒。白痢粟殼二枚。製同上。粟米一撮。腹痛。南木香半錢。渴。烏梅一個。枇杷葉二皮去白毛。糯米一撮。伏暑鼻衄。白茅花一握。小便血以生料者每服加梔子三個。車前子一撮。煩熱心神恍惚。朱砂一字。燈心二十莖。麥門冬二十粒去心。淡竹葉十皮。車前草二根。傷暑吐血。白茅花一握。熱瀉車前子一撮。麥門冬二十粒去心。暑濕瀉。紫蘇五葉。木瓜三片。車前子一撮。傷暑頭痛。濃煎葱白湯。大便水瀉。小便不利。加真車前子末少許。又方治燥渴去桂心加人參。謂之春澤湯。濕瀉身痛。加蒼朮少許。秋多淫雨。人患濕疫在冬時。服之效。

縮脾飲治伏暑熱。煩渴躁悶。乾□□亂。

草果 去皮

縮砂 去殼

烏梅 去核各一兩

乾葛

白扁豆

生薑

切片日乾各五分重

右剉散。每服五錢。水一碗。煎至八分。浸冷服。或欲溫欲熱。亦可斟酌。傷暑發熱。頭目痛。用以吞消

暑圓。方見後中暑類

却暑散治冒暑伏熱。頭目眩暈。嘔吐泄利。煩渴。背寒面垢。

赤茯苓 去皮

甘草 生各四兩

寒食麵

生薑

各一片細切與麵令勻

右爲末。每服二錢。新汲水調下。或湯點服。不拘時候。

香薷圓治大人小兒傷暑伏熱。燥渴昏悶。頭目昏眩。胸膈煩滿。嘔噦惡心。口苦咽乾。肢體困倦。不思飲食。或發霍亂。吐利轉筋。並宜服之。

香薷 去梗

紫蘇 去梗

乾木瓜 各一兩

丁香

甘草 炙

檀香

白茯苓 去皮

藿香 各半兩

右爲末。蜜圓彈子大。每一圓至二圓。熟水嚼下。或新汲水化下亦得。小兒半圓。

桂苓甘露散治傷寒中暑冒風。飲食中外一切所傷。傳受濕熱內甚。頭痛口乾。吐瀉煩渴。喜飲冷。小便赤澀。大便急痛。濕熱。霍亂吐下。腹滿痛悶。及小兒吐瀉驚風。

茯苓 一兩去皮

甘草 二兩炙

白朮 半兩

澤瀉 一兩

桂 半兩去皮

石膏 二兩

寒水石 二兩

滑石 四兩

猪苓 半兩

右爲末。每服三錢。溫湯調下。新水亦得。生薑湯尤良。小兒每服一錢。

六和湯治心脾不調。氣不升降。霍亂轉筋。嘔吐泄瀉。寒熱交作。痰喘咳嗽。胸膈痞滿。頭目昏痛。肢體

浮腫嗜臥倦怠小便赤澀。并傷寒陰陽不分。冒暑伏熱煩悶。或成痢疾。中酒煩渴不食。婦人胎前產後。並宜服之。

人參 縮砂 甘草炙 杏仁去皮尖 半各湯泡七次 白扁豆薑汁略炒

赤茯苓去皮 藿香葉拂去塵 木瓜各二兩 香薷去梗 厚朴薑汁製各四兩

右剉。每服四錢。水一盞半。生薑三片。棗子一枚。煎至八分。去滓。不拘時候服。

冷香飲子。老人虛人伏暑煩躁。引飲無度。惡心疲倦。服涼藥不得者。

草果仁三兩 附子炮去皮臍 橘紅各一兩 甘草炙半兩

右剉散。每服一兩。水二碗。生薑十片。煎半碗。去滓。沉冷。旋旋服。不拘時。

潑火散。傷暑煩躁。發渴口乾。及治血痢。婦人熱崩。

青皮去白 赤芍藥 黃連去蠶 地榆各等分

右為細末。每服一錢。冷水調下。如蓄熱而氣血妄行。加甘草等分。

枇杷葉散。治中暑伏熱。煩渴引飲。嘔噦惡心。頭目昏眩。或陰陽不和。致成霍亂吐利。轉筋煩躁。

枇杷葉去毛炙半兩 香薷三兩 白茅根 甘草炙 麥門冬去心 乾木瓜各一兩

陳皮去白焙半兩 丁香 厚朴去皮薑汁炙各半兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。生薑三片。煎服。煩躁沉冷服。如脾虛感暑。嘔吐不食。以此藥煎。去滓。吞消暑圓六十粒。立效。體本虛。嘔吐昏倦。手足冷。除茅根麥門冬。加附子炮用。

香薷散。治臟腑冷熱不調。飲食不節。或食腥膾生冷過度。起居不節。或露臥濕地。或當風取涼。而風冷之氣歸於三焦。傳於脾胃。脾胃得冷。不能消化米穀。致令真邪相干。腸胃虛弱。飲食變亂於腸胃之間。致吐利心腹疼痛。霍亂氣逆。有心痛而先吐者。有腹痛而先利者。有吐利俱發者。有發熱頭痛

體疼而復吐利虛煩者。或但吐利心腹刺痛者。或轉筋拘急疼痛。或但嘔而無物出。或四肢逆冷而脉欲絕。或煩悶昏塞而欲死者。此藥悉能主之。

香薷去梗四兩 厚朴去粗皮切碎薑汁炒令黃 白扁豆各二兩

右剉散。每服五錢。水一盞。酒一分。同煎七分。去滓。水中沉冷。連吃二服。立效。不拘時候。治中暑復傷風。搐搦不省人事者。宜先服蘇合香圓。候其甦省。却以此藥加黃連羌活各一錢。暑濕腫滿。香

蘇散合和。加生薑三片。木瓜二片。車前草二根。伏暑頭疼。小便澀濁。加山茵陳車前草各二根。霍亂吐利。加木瓜二片。藿香少許。生薑三片。傷暑腹痛。加陳大蓼三寸。陳壁土一指頭大。木瓜二片。

臟腑有熱便血。加黃連厚枳殼烏梅各一錢。小便血。加瞿麥穗一錢。車前子一撮。燈心二十莖。感暑濕。手足繃痛痺冷。合和香蘇散。每服四錢。薑三片。木瓜二片。陳大蓼三寸煎服。留滓再加葱葉橘葉竹葉陳大蓼各一握。水一斗。煮七分。先熏後洗立效。脚氣作痛。行步艱辛。每料加入木瓜羌活炒蒼朮枳殼去穢陳皮半夏甘草各一兩。成十味。每服加生薑三片。葱白二根。脾胃不和。嘔逆惡心。冒暑心腹脹滿。去羌活。加藿香烏梅各一錢。壯熱大渴。肚皮熱或五心熱。加燈心二十莖。麥門冬去心白茅根各一錢。淡竹葉十皮。晚禾根淨洗一握。四時感冒嘔泄。亦合和香蘇散。每服四錢。加生薑五片。木瓜二片。諸熱毒。小便赤濁。每服四錢。加車前子黃連去鬚各一錢。則清利。以上皆溫服。暑月煩躁。潮熱甚。加茵陳車前草各二莖。苦竹葉九皮。山梔子三枚擘破。心胸煩躁。只依本方宜清水煎冷服。暑月潮瀉。亦加烏梅車前子一錢。陳米一撮。暑月虛人腹痛嘔泄。加丁香白朮炮附子木瓜各半錢。生薑五片。亦名六和湯。解暑和脾胃。加人參陳皮白朮白茯苓黃耆木瓜甘草每料各一兩。亦名十味香薷散。傷暑單有頭痛。正方加山茵陳。多服取效。以上並熱服。常服消暑健脾。或為末煉蜜為膏。酒服亦妙。陳大蓼須用家園種者。江邊赤蓼則不用。

小黃龍圓治伏暑發熱作渴。嘔吐惡心。及年深暑毒不差。

黃連一斤 酒二升
去鹽 半

右將黃連以酒煮乾為度。焙為末。用麵糊圓。如梧子大。每服三十圓。熱水吞下。又治傷酒過度。臟毒下血或泄瀉。米飲下。食前日二服。酒及熱物過度吐血。茅花湯下。

來復丹治上盛下虛。裏寒外熱。伏暑泄瀉如水。及治中暑。方見後 瘧冷類

小柴胡湯治傷暑外熱內渴。於內更加生薑三片。烏梅一個。麥門冬三十粒去心煎服。不拘時候。方見

前傷寒 陽證類

竹葉石膏湯治伏暑內外熱熾。煩躁大渴。方見前傷 寒通治類

二陳湯治傷暑復感冷。及內傷生冷嘔吐。方見嘔 吐類

濯熱散治傷暑迷悶。及泄瀉霍亂作渴立效。亦能解諸毒。

白礬 五倍子 烏梅 甘草
去核 各一兩

右為末。入飛羅麵四兩拌勻。每服二錢。新汲水調下。雖平日不敢飲冷者。服之不妨。真有奇效。為圓如彈子大。陰乾。冷水調下亦可。

通苓散治傷暑潮熱煩渴。小便不利。方見後 泄瀉類

每服三錢。水一盞半。燈心二十莖、麥門冬二十粒去心、淡竹葉十皮、車前穗五莖煎。不拘時候服。渴甚。晚禾根少許、白茅根五莖、枇杷葉二皮去白毛蜜塗微炙煎服。

傷濕

香蘇散加蒼朮川芎白芷木瓜對合。各用四錢。生薑三片煎服。日近遠年傷濕。倦弱如虛損。多服取效。方見前傷寒和解類

黃耆建中湯治傷濕鼻塞身痛。

黃耆微炙 辣桂各二兩 甘草炙二兩 白芍藥六兩

右剉散。每服三錢。薑四片。棗一枚煎。食前服。

不換金正氣散治傷濕益脾順氣。加茯苓一兩、生薑每服三片。方見後時疫類

朮附湯治傷濕大小便自利。方見後中濕類

茵陳湯治濕氣瘀熱發黃。小便秘澀。渴引水漿。

茵陳一兩 大黃半兩 小紅梔子十枚

右剉散。每服三錢。水煎服。

腎著湯治身重。腰冷癢。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。從身勞汗出。衣裏冷濕。久而得之。腰以下冷痛。腰重如帶五千錢。

甘草炙 白朮各二兩去蘆 乾薑炮 茯苓各四兩去皮

右剉散。每服四大錢。水一盞半。煎七分。去渣食前服。

滲濕湯治坐臥濕地。或為雨露所襲。身重脚弱。關節重疼。發熱惡寒。或小便秘澀。大便飧泄。或汗出衣裏濕漬得之。腿膝或腫。小便利。反不渴。

蒼朮米泔浸 白朮去蘆 甘草炙各二兩 乾薑炮 茯苓各四兩 陳皮

丁香各半兩

右剉散。每服四錢。用水一盞半。生薑三片、紅棗二枚。煎至七分。去渣溫服。或腹膨腰脚重滯。青木香圓。熟水下。兼服。方見諸症類

瓜蒂搐鼻法治傷濕鼻塞頭疼。瓜蒂不以多少。咬咀為細末。口含水。搐一字許入鼻中。流出黃水即效。

中寒

附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語。

大附子炮去皮臍

人參

乾薑炮

甘草炙

白朮各等分

右爲剉散。每服四大錢。水一盞半。煎七分。去渣。不以時服。口噤則斡開灌之。

薑附湯治中寒卒然暈倒。或吐逆涎沫。狀如暗風。手脚攣搐。口噤。四肢厥冷。或復躁熱。

乾薑炮

附子炮去皮臍各一兩

右爲剉散。每服四錢。水盞半。煎七分。去渣。食前服。入肝加木瓜。入肺加桑白皮。入脾加白朮。入心

加茯苓。隨證加之。挾風加防風。兼濕多加白朮。筋脉牽急加木瓜。肢節疼痛加桂心。人參白朮各

等分。仍須暖室添衣被火等圍護。

中暑 又名中暈

大黃龍圓治中暑眩暈昏不知人。身熱惡寒。頭疼。狀如傷寒。或往來寒熱。煩躁渴甚。嘔吐泄瀉。常服

去暑毒。分陰陽。

硫黃

消石各一兩

雄黃通明者

滑石

白礬各半兩

寒食麵四兩

右爲末。滴水爲圓。如梧桐子大。每服五圓至七圓。漸加至二十圓。新汲水下。昏塞不知人事。以水化開灌之。中暑忌得冷。此藥却以冷水下之。乃熱因寒用。疑者釋之。

益元散治中暑身熱嘔吐。熱瀉赤痢。癰閉澀痛。利小便。益精氣。通九竅。六府。消畜水。止渴除煩熱。心躁。百藥酒食等毒。解毒癘及兩感傷寒。及婦人下乳催生。兼吹乳乳癰。孕婦莫服。

白滑石六兩

甘草一兩

右爲極細末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。無蜜亦得。日三服。欲冷。新汲水調下。發汗。煎葱白豆豉湯并三四服。此藥解散。熱甚多服。無害有益。

消暑圓治中暑煩渴。暈眩寒熱。煩躁悶亂。或似欲絕者。

半

夏一斤湯洗七次去滑

茯苓

苓去皮

甘草生各半斤

右爲末。薑汁麵糊爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。新汲水下。中暑爲患。藥下卽甦。夏中常服。止渴利小便。若痰飲停滯。中脘不快。頭眩喜嘔。薑湯吞下。正名生料消暑圓

猪牙皂筴一兩 燒灰 甘草一兩 微炒

右為細末。每服二錢。溫熱水調下。

來復丹方見後 痢冷類 治中暑昏迷。霍亂吐瀉。每服五十丸。米飲吞下。五苓散調下亦可。見傷暑類 或水研灌亦效。

白虎湯治中暑手足微冷。煩渴。四肢不痛。方見前傷 寒通治類

橘皮竹茹湯治中暑痰逆。惡寒。方見後 脾胃類

竹葉石膏湯治中暑不惡寒。煩渴。方見前傷 寒通治類

五苓散治中暑頭疼。惡心煩躁。心下不快。方見傷暑類

香薷散治中暑霍亂吐瀉。方見傷暑類

小柴胡湯治中暑煩熱口乾。候極冷服之。方見傷寒 陽證類

白虎加人參湯治太陽中暈。其脉弦細。紮遲。小便已。洒然毛聳。口開前板齒者。何故。洒然毛聳。緣腠理司開闔。寒則皮膚急。腠理閉。熱則皮膚緩。腠理開。開則洒然寒。閉則熱而悶。方見傷寒 通治類

中 濕

加味朮附湯治中濕脉沉而微緩。濕喜歸脾。流於關節。中之多使人腹臃脹。倦怠。四肢關節疼痛而煩。或一身重著。久則浮腫喘滿。昏不知人。挾風頭暈嘔噦。兼寒則攣拳掣痛。治之不得。猛發汗。灼艾。通泄。惟利小便為佳。此方主之。及治大小便皆自利。

白 朮去蘆 甘 草炒一兩 附 子炮一兩半 赤茯苓一兩

右剉散。每服五錢。薑七片。棗二枚煎。日三服。纔見身痹。又三服。當如冒狀。勿怪。蓋朮附並行皮中。逐水氣故爾。法合加桂一兩。大便堅。小便利。則勿加。

白朮酒治中濕口噤不知人。

白 朮半兩 去蘆

右酒三盞。煎一盞。頓服。不能飲酒。以水代。日三服。夜一服。

甘草附子湯治中濕小便不利。大便自利。

附 子炮一個七錢 淨者 甘 草炙一兩 辣 桂去粗皮 二兩

○圓散。每服三錢。水一盞半。薑七片煎。食前微溫服。汗出加防風。悸氣加赤茯苓。各二錢。

四氣兼中

附子湯治五臟中風寒。手足不仁。口面喎斜。昏暈失音。眼目瞶動。牙車緊急。不得轉動。

附子炮去皮 桂心各半 細辛去苗 防風去叉 人參去蘆 乾薑炮各六錢

右剉散。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。食前服。或為末酒調二錢服。

防風湯治中風挾暑。卒然暈倒。面青黑。四肢緩弱。喜伸欠。口喎斜。四肢不仁。好笑。

防風去叉 澤瀉 桂心 杏仁麴炒去尖 乾薑炮 甘草炙各分

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。食前服。

生附白朮湯治中風濕。昏悶恍惚。脹滿身重。手足緩縱。熱熱自汗。失音不語。便利不禁。

附子生去皮 薑各半 白朮一兩 甘草炙一分

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。食前服。

附子麻黃湯治寒濕所中。昏暈緩弱。或腰背強急。口喎斜。語音混濁。心腹脹。氣上喘不能動轉。

附子炮去皮 麻黃湯洗 白朮去蘆 乾薑 甘草炙 人參各等

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。食前服。

苓朮湯治冒暑遭雨。暑濕鬱發。四肢不仁。半身不遂。骨節離解。緩弱不收。或入浴暈倒。口眼喎斜。手足躡曳。皆濕溫類也。

附子炮去皮 茯苓 白朮 乾薑炮 澤瀉 桂心各等

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。食前服。

四氣相感

麻黃白朮湯治寒濕身體煩疼。無汗。惡寒發熱者。

麻黃去節 桂心二兩 甘草炙一兩 杏仁二十粒去皮尖 白朮四兩去蘆

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。食前溫服。

桂枝附子湯治風濕相搏。身體煩疼掣痛。不得屈伸。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫。

桂枝去皮 白朮去蘆 附子炮去皮 甘草炙二兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗二枚。煎七分。空心溫服。或大便秘則去桂。小便不利悸氣。加茯苓三兩。痹加防己四兩。腹痛加芍藥四兩。

防己黃耆湯治傷風濕寒。脉浮緊細。身重。汗出惡風。并治風水。脉浮身重不渴。

防己四兩 黃耆四兩 去蘆 甘草二兩 炙 白朮三兩 去蘆

右剉散。每服五錢。水盞半。薑五片。棗二枚。煎七分。去滓空心服。喘者加麻黃一兩。胃中不和加芍藥二兩。氣上衝加桂一兩。有陳寒加細辛一兩。服後當如蟲行皮中。從腰以下如水。後坐被上。又以被繞腰以溫下。微汗瘥。

白朮茯苓乾薑湯治伏暑中風濕。煩渴引飲。心腹疼。燥悶口乾。面垢。洒洒惡寒。浙浙惡風。微汗。飢不能食者。

白朮去蘆 乾薑 茯苓 細辛 甘草炙 橘皮 烏梅 豆豉 桂心 乾葛

右等分爲末。每服二錢。白湯點下。

茯苓白朮湯冒暑毒加以著濕。或汗未乾即浴。皆成暑濕。

茯苓 乾薑炮 甘草炙 白朮 桂心各一兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。食前服。

萎蕤湯治風溫兼療冬溫。及春月中風傷寒發熱。頭眩痛。咽喉乾。舌強。胸內疼痛痞滿。腰背拘急。

葛根 麻黃湯泡焙乾 碎去節 甘草炙 白薇 羌活 杏仁各半兩 去皮尖 石膏一兩 碎 萎蕤三分 青木香一分

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎七分。食前服。青木香冬用一兩。春半兩。渴加栝樓根二片。

痰瘧

〔風證〕加減桂枝湯治先熱後寒。煩躁。自汗惡風。名溫瘧。

石膏四兩 半 知母一兩 半 甘草炙 半兩 桂枝一兩 粳米一合

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。未發前進三服。

白朮散治傷風不留經絡。與衛氣相併。病以日作。寒熱交煎。

麻黃去節 白朮去蘆 茯苓 桂心各一兩 陳皮 青皮去穰

桔 梗去蘆 白 芷 甘 草 半 夏 麩 紫 蘇 烏 梅各三分去核
 乾 薑半兩

右剉散。每服四錢。水二盞。薑三片。棗二枚。煎七分。當發日空心一服。臨發一服尤妙。亦治時疫。

〔寒證〕五積散治體虛作瘧。先寒後熱。寒則湯火不能溫。熱則冰雪不能冷。惡寒無汗。方見傷寒陰證類
 養正丹見傷寒類 薑附湯附子理中湯並見中寒類 總治寒瘧。

〔暑證〕香薷散治但熱不寒。陰氣孤絕。陽氣獨發。少氣煩冤。手足熱而欲嘔。兼渴。方見傷暑類

一方加黃連。每料二兩。名黃連香薷散。治暑瘧獨熱。躁煩。大渴引飲。小便不利。或背寒面垢。每服加燈心二十莖。麥門冬去心二十粒。淡竹葉七皮。車前草二根。晚禾根一握。檳榔一個切片煎。不拘時候。

小柴胡湯治傷暑發瘧。熱多寒少。或但熱不寒。咳嗽煩渴。小便赤。每服加生薑三片。烏梅一個。麥門冬二十粒去心。地骨皮少許煎。溫服。不拘時候。熱盛大腑不通。加大黃枳殼各一錢。一服立效。方見傷寒類

清脾湯治瘧瘧脈來弦數。但熱不寒。或熱多寒少。膈滿不能食。口苦舌乾。心煩渴。小便黃赤。大腑不

利。

青 皮去白 厚 朴去粗皮薑汁炒 白 朮去蘆 草 果 仁 柴 胡去蘆 茯 苓去皮

半 夏湯洗七次 黃 芩 甘 草炙各等分 或加人參亦可。

右剉散。每服四錢。水盞半。薑五片。煎七分。不拘時溫服。

消暑圓治傷暑發瘧痰多。煩悶眩暈。每服五十圓。淡薑湯吞下。方見中藥類。與前藥相兼。多服取效。

〔濕證〕朮附湯治寒熱身重。骨節煩疼脹滿。澀澀自汗。喜嘔。因汗出復浴。濕舍皮膚。及冒雨濕所致。除濕湯治同上。二方見中濕傷濕類。除濕湯即參濕湯。

五苓散治傷濕小便不利。發瘧。方見傷暑類

〔食證〕二陳湯治傷食發瘧痰多。

陳 皮 半 夏製各五兩 白 茯苓三兩 甘 草炙一兩

右剉散。每服三錢。薑五片。烏梅一個煎服。寒多者加草果。熱多加前胡。青皮檳榔縮砂白豆蔻之類。隨意增減。

小清脾湯治胃瘧。發作有時。先覺伸欠。乃作寒慄。鼓振頤頷。中外皆寒。腰背俱痛。寒戰既已。內外皆

熱。頭疼如破。渴欲飲冷。或痰聚胸中。煩滿欲嘔。或先熱後寒。先寒後熱。寒多熱少。寒少熱多。或寒熱相半。或但熱不寒。但寒不熱。或隔日一發。一日一發。或三五日一發者。悉主之。

厚朴製同前 烏梅去核 半夏湯去 青皮 良薑各二兩 草果去皮
甘草炙半兩

右剉散。每服四錢。水二盞。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓。未發前併三服。忌生冷油膩時果。此藥溫脾化痰。治胸膈痞悶。心腹脹滿。噫醋吞酸。自可常服。

紅圓子治食瘧食積。氣滯腹脹。

京三棱水浸軟 蓬莪朮煨 青皮去白 陳皮去白各五兩 胡椒 乾薑炮各三兩

右爲末。米醋煮米粉糊圓。梧桐子大。礬紅爲衣。每服五十圓。淡薑湯下。或二陳湯下。方見前

〔七情〕四獸飲治五臟氣虛。喜怒不節。勞逸兼并。致陰陽相勝。結聚痰飲。與衛氣相搏。發爲瘧疾。

人參去蘆 白朮去蘆 白茯苓去皮 甘草 橘紅 半夏
草果去皮 烏梅去核 紅棗 生薑

右等分剉散。每用半兩。以鹽少許淹少時。厚皮紙裹。水濕。慢火煨香熟取出。用水二盞煎。未發前

服。

〔痰瘧〕枳梗半夏湯除痰下氣。治胸脇脹滿。寒熱嘔噦。心下堅痞。短氣煩悶。痰逆惡心。飲食不下。

桔梗剉微炒 陳皮去白 半夏湯洗七次五兩 枳實去穢炒二兩半

右剉散。每服二錢。水一中盞。生薑五片。烏梅一個。煎至七分。溫服。不拘時候。

半夏圓治瘧咳嗽涎盛。痞滿煩悶。咽膈不利。嘔吐惡心。神思昏憤。心忪面熱。並皆治之。

半夏十六兩湯洗去滑薑汁淹一宿 白礬八兩枯過

右爲末。生薑自然汁爲丸。梧桐子大。每服三十九至五十九。食後臨臥。淡薑湯吞下。

〔瘧瘧〕附子湯治瘧瘧經久不瘥。正氣羸弱。身熱如火。極寒極熱。連日方醒。發時沉著枕簟。不能擡身。戰掉不堪。便溺飲食俱不便。

附子二枚一枚生去皮臍一枚炮去皮臍鹽水浸各一兩

右剉散。每服三錢。水一盞半。生薑七片。紅棗七枚。煎至七分。去滓攤冷。就吞靈砂丹五十粒。或百粒。未效。再以七棗湯吞黃芽丹二十粒。仍服黑錫丹以墜痰。亦可回元氣。凡有此瘧。但當守續真元。沉虛熱爲法。

小柴胡湯治挾嵐瘴溪源蒸毒之氣。自嶺以南。地毒苦炎。燥濕不常。人多患此。其狀血乘上焦。病欲來時。令人迷困。甚則發躁狂妄。亦有啞不能言者。皆由敗血瘀心。毒涎聚於脾所致。於此藥中加大黃枳殼各五錢。方見傷寒類

地龍飲治瘴瘧諸瘧。大熱煩躁。

生地龍 三條研細末

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許。新汲水調下。如熱熾。加腦子少許服效。

觀音圓取下暑毒瘴氣毒。

圓白半夏 生

烏梅肉

川巴豆 不去油

母丁香 已上各十枚

礮右為末。薑汁麵糊丸。如麻子大。上下以厚紙蓋貼。有油又再易紙。每服五丸。臨臥冷水下。

〔勞瘧〕芎歸鱉甲散治表裏俱虛。真元未復。疾雖暫止。小勞復來。

當歸

川芎

白茯苓 去皮

青皮 去白

陳皮 去白

半

夏湯洗七次

鱉甲 去裙醋炙黃

芍藥 各二錢半

右剉散。每服三錢。薑五片。棗二枚。烏梅一個。水煎。不以時服。熱多加柴胡。寒多加草果少許。

〔瘧母〕消癖圓治彌年經吐汗下。榮衛虧損。邪氣伏藏脇間。結為癥癖。腹脇堅痛。

芫花 炒

朱砂 研各等分

右為末。煉蜜丸如小豆。每服十丸。濃煎棗湯下。去癖須用芫花大戟破水之劑。下後即與養胃湯。

方見傷寒陰證類

〔熱瘧〕八正散治瘧發則心煩臉赤。聲叫。煩躁極熱。欲冷地上臥。及飲冷漿。加牛黃燈心白竹青煎

即效。方見積熱類

白虎湯治熱瘧表裏俱熱。時時惡寒。大渴口舌乾燥。加人參二錢。方見傷寒通治類

〔虛瘧〕分利順元散治虛怯人患瘧。未可進常山等藥者。

川烏 一兩

附子 一兩或二兩

南星 二兩

木香 別對五錢旋入

右除木香不見火。三味各一半。去皮生用。即三生飲。一半炮熟。即順元散。合和切片。每服四錢。生薑十片。棗七枚。水一盞。煎至七分。當發前一日及當發之日。早晨連進二三服。以化去痰。諺云。無痰不成瘧。又半生半熟。乃能分解陰陽也。

四將軍飲治瘧作時仆厥。撼掖不醒。是中心抑鬱。陰陽交戰所致。先依灸法。後見仍服此藥。

附子一兩 訶子四個 陳皮四個全者 甘草四寸
 右剉散。每服四錢。水二盞。生薑七片。棗七枚。煎至七分。初服或不納。再進則漸能嚥。四服盡頓愈。更不復作。

七棗湯治五臟氣虛。陰陽相勝。作為痲瘧。不問寒熱先後。與夫獨作登間日。悉主之。

附子一枚炮裂以鹽水浸再炮如此凡七次至七次不浸去皮臍

右剉散。水一碗。生薑七片。棗七枚。煎至八分。當發日空心溫服。仍吃棗子三五枚。

理脾飲治脾胃不和。瘧疾瀉利腹痛。下部無力。體重足痿。脚下痛。飲食中滿。四肢不舉。此方極驗。

橘皮生用

甘草炙

厚朴去粗皮一兩薑汁炒

羌活

防風

肉豆蔻

白茯苓各二錢半

川芎半兩

吳茱萸一錢去梗

右剉散。每服二錢。水一盞。煎至八分。空心食前服。

果附湯治脾寒瘧疾不愈。振寒少熱。面青不食。或大便溏泄。小便反多。

草果仁

附子炮去皮臍各等分

右剉散。每服半兩。水二盞。薑七片。棗一枚。煎至七分。溫服。不拘時候。

黑錫丹治冷痰作瘧。方見瘧冷類

冷附湯治瘧疾無過是痰實痞塞不通。脾胃弱虛。熱在上。停於胸膈。不得入於臟腑。所以五更冷服。乃使藥下達。壯脾胃。去痰實。除虛熱。降心氣。屢用屢效。

附子重九文一兩炮去皮臍

右切作片。分二服。水二大盞。生薑十片。煎至一盞。隔夜煎下。用薄綿覆盞面。露一宿。五更初冷服。

〔久瘧〕丁香煮散患瘧經年不安。黃瘦。飲食減少。雖有時歇三兩日。或勞力。或吃少毒物相犯。寒熱立至。多服效。見嘔吐類

大已寒圓治瘧久不愈。每發則極寒極熱。瘧退汗如雨。生薑枳實煎湯服。一服不作。方見瀉瀉類

橘皮煎圓治久瘧扶虛理脾腎。方見虛損類

通治瘧疾陰陽交爭。寒熱互作。用藥須半生半熟。半冷半熱。乃收十全之功。

草果平胃散治脾虛作瘧。不問寒熱先後。飲食不進。宜服。

右以生料平胃散四兩。加入草果大腹皮檳榔青皮各二兩剉碎。相和勻。每服五錢。水一盞半。薑三片。棗二枚。煎七分。空心多服收效。

人參養胃湯治寒多熱少。或但寒不熱。頭痛惡心。胸滿腕噁。身體疼痛。慄慄振寒。面色青白。不進飲食。脉來弦數。每服生薑七片、棗二枚。多寒加炮附子。方見傷寒陰證類

小柴胡湯與養胃湯合和。名加減清脾湯。寒多熱少。多用養胃湯。熱多寒少。多用柴胡湯。寒熱均則平用。生薑桃柳枝地骨皮紅棗煎。多服取效。

藿香正氣散治瘧遍身腫滿。加草果縮砂一兩。方見傷寒陰證類

小柴胡湯與五苓散合和。名柴苓湯。治傷風傷暑瘧大效。每服薑三片、麥門冬二十粒去心、地骨皮少許煎。溫服。方見傷寒陽證類。五苓散方傷暑類。

柴胡桂薑湯治瘧或有寒者、但寒不熱者、亦治久不愈者。

北柴胡 四錢 桂 心一錢 黃 芩 半錢 栝樓根 二錢 牡 蠣 半斤碎 甘 草

乾 薑 各一分

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎八分溫服。

加味二陳湯每服四錢。薑五大片。加旋覆花四錢煎。日四服。不拘時候。久瘧有效。虛弱人果附湯兼服。方見前

〔截瘧〕勝金圓治一切瘧病。發作有時。蓋因外邪客於臟腑。生冷之物內傷脾胃。或先寒後熱。先熱後寒。或寒多熱少。或寒少熱多。或但熱不寒。或但寒不熱。或連日不發。或間日而發。或發後三五日再發。寒則肢體顫掉。熱則舉身如火。頭痛惡心。煩渴引飲。氣喘急。口苦咽乾。背脊痠疼。腸鳴腹痛。或痰聚胸中。煩滿欲嘔。並皆治之。

檳 榔 四兩 常 山 酒浸煎 焙一斤

右爲末。水麵糊爲丸。梧桐子大。每服三十丸。於發前□日晚臨臥。用冷酒吞下便睡。不得吃熱物茶湯之類。至四更盡。再用冷酒吞十五丸。忌食一切熱羹湯粥食。午間可食溫粥。至晚方可食熱。忌一切生冷魚腥等物。

又方川恒山二兩爲末。鷄卵二個。取漬爲圓。治瘧服餌。一如上法。

露星飲

常山一味細剉。每用五錢。半酒半水煎。去滓。於當空以薄綿封蓋碗。露至天微明時。取盪溫服。些小嘔泄無妨。

辰砂圓治瘧之爲苦。異於諸疾。世人治之。不過用常山砒霜之類。發吐取涎而已。雖安。所損和氣多。

矣。有人病瘧半年。前人方術。用之略盡。皆不能效。遂服此藥愈。

辰 砂有牆壁光明者 阿 魏真者各一兩

右研勻。和稀米糊丸。如皂角子大。空心。濃煎人參湯下一圓。瘧之爲病。雖在忌醫之列。但體認得所因真的。按方用藥。無不切效。一方用白茯苓甘草各三錢。分三服。水一盞煎。臨發時頓服自效。

又方生薑四兩連皮搗爛。止用自然汁。約明日當發。隔夜安排。將紗片遮蓋露一宿。五更初攪動澄者。一上吞吃。或有痰吐。任之即安。或微利亦安。

灸法 大椎在第一椎下陷中宛宛中。灸三七壯至四十九。不止。或灸第三骨節亦可。大陵穴在掌後兩骨間。灸三壯立效。

譚諱二穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸。其穴抱肘取之。灸二七壯至一百壯止。凡灸瘡。必先問其病所發之處。先尋穴灸之亦可。

針法 於十指近甲梢針出血。及看兩舌下有紫腫紅筋。亦須針去血效。

痰厥

順元散治暴患痰厥氣虛。身微冷。面淡白。昏悶不知人事。方見風科虛證類
星香飲治暴患痰厥氣盛。身熱面赤。方見風科熱證類
單方治暴患痰厥。不省人事。

右用生清油一盞。灌入喉中。須臾逐出風痰。立愈。

眩冒

白薇湯治平居無苦疾。忽如死人。身不動搖。默默不知人。目閉不能開。口噤不能言。或微知人。惡聞聲。但如眩冒。移時方寤。此由已汗過多。血少氣併於血。陽獨上而不下。氣壅塞而不行。故身如死。過血還。陰陽復通。故移時方寤。名曰鬱冒。亦名血厥。婦人多有之。

白 薇 當 歸各一兩 人 參去蘆半兩 甘 草一分

右剉。每服五大錢。水二盞。煎至一盞。去渣溫服。不拘時。

后公散

瓜 蒂 藜 蘆 礬 石煨 雄 黃各等分

大方脈雜醫科 痰厥 眩冒

右爲細末。少許吹入鼻中。得嚏爲度。此藥能起死人。

卒厥尸厥

追魂湯治卒厥暴死。及主客忤鬼擊。飛尸奄忽。絕氣不覺。口噤。

麻黃去節三兩 杏仁去皮尖二百五十個 甘草炙一兩

右爲剉散。每服四錢。水一盞半。煎七分。去渣灌之。通治諸感忤。或口噤拗口不開。去齒下湯。湯入口活。不下。分病人髮左右。捉搦肩引之。藥下漸甦。令服盡取效。千金有桂心二兩。金匱云。寸脉沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實氣相搏。血氣入臟則死。入胃則愈。若卒厥唇口青身冷。爲入臟卽死。身和汗出則愈。

內鼻散治尸厥脉動而無氣。氣閉不通。靜而若死。名卒厥。

菖蒲去毛

爲末。每用二字。內兩鼻中。吹之令入。仍以桂末安於舌下。

硫黃散治尸厥奄然死去。四肢逆冷。不省人事。腹中氣走如雷鳴。

焰消牛兩 硫黃一兩

右二件。細研如粉。分作三服。每服用好酒一大盞煎。覺焰起傾於盞內。蓋候溫灌與服。如人行五里。又進一服。不過三服卽安。

又方附子七錢。炮熟去皮臍爲散。分作二服。每服用酒三盞。煎至一盞溫服。

又方生薑自然汁半盞。酒一盞。煎令百沸。灌二服。却用灸。

灸法 頭上百會穴四十九壯。兼臍下氣海丹田穴三百壯。覺身體溫暖卽止。

沙證

艾湯試沙證江南舊無。今所在有之。原其證古方不載。所感如傷寒。頭痛嘔惡。渾身壯熱。手足指末微厥。或腹痛悶亂。須臾能殺人。先濃煎艾湯試之。如吐卽是。

右用五月蠶退紙碎剪。安碗中。以礫蓋之。以百沸湯泡艾碗許。仍以別紙封裏縫良久。乘熱飲之。就臥。以厚被蓋之。汗出愈。

又近時多有頭額上及胸前兩邊有小紅點在於皮膚者。却用紙撚成條。或大燈草微蘸香油。於香

油燈上點燒。於紅點上煖爆者。是又名水傷寒。却用樟木煎湯服。或葱豉湯汗出愈。如腹痛不止。又用針於兩手十指近甲梢針出血。即愈。

鹽湯吐法。治心腹絞痛。冷汗出。脹悶欲絕。俗謂攪腸沙。今攷之。此證乃名乾霍亂。此亦由山嵐瘴氣。或因飢飽失時。陰陽暴亂而致。急用鹽湯吐法。此法救人不一。

右用鹽半錢許。以熱湯數碗泡鹽。令患人盡服。連致數碗。不得住手方可。却以鷄羽掃咽喉間。即時吐所吃鹽湯盡出。其證即愈。

又法治沙證。但用苧麻蘸水於頸項兩肘臂兩膝腕等處。見得血凝皮膚中。紅點如粟粒狀。然後蓋覆衣被。吃少粥湯。或葱豉湯。或清油生葱茶。得汗即愈。此皆使皮膚腠理開發。發熱利。誠不藥之良法也。

又法兩足墜痛。亦名水沙。可於兩脚曲腕內兩筋兩骨間刺出血愈。名委中穴。

時疫

十神湯治時令不正。瘟疫妄行。感冒發熱。或欲出疹。此藥不問陰陽兩感風寒。並宜服之。

川芎 甘草炙 麻黃去根 乾葛 升麻去土 赤芍藥

白芷 陳皮 香附子炒去毛 紫蘇各四兩

右剉散。每服三錢。水盞半。薑五片。煎七分。去渣熱服。不以時候。如發熱頭痛。加連鬚葱白。中滿氣實。加枳殼煎。

不換金正氣散治四時傷寒。瘴疫時氣。頭痛壯熱。腰背拘急。五勞七傷。山嵐瘴氣。寒熱往來。五膈氣噎。咳嗽痰涎。行步喘乏。或霍亂吐瀉。臟腑虛寒。下痢赤白。並宜服之。

厚朴去皮薑汁炒 藿香 甘草 半夏 蒼朮米泔浸 陳皮各等分

右剉散。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗二枚。煎八分。去渣。食前稍熱服。忌生冷油煎毒物。不伏水土宜服之。常服進飲食。調脾胃。一方加白茯苓。

桂枝黃芩湯治風疫。脉浮數而不弱。頭項疼。腰脊痛。發熱惡風。遞變傳染。

桂枝 赤芍藥 黃芩去枯心各半兩 甘草炙一兩

右剉散。每服五錢。水一盞半。生薑三片。棗二枚。煎。空心服。

敗毒散治冬合寒反暖。春發溫疫。方見傷寒圖證類

大柴胡湯治春合暖反涼。夏發燥疫。方見上

五苓散治秋合涼反淫雨。冬發濕疫。方見傷暑類

五積散治夏合熱反寒。秋發寒疫。方見傷寒陰證類

柴胡石膏散治時行瘟疫。壯熱惡風。頭痛體疼。鼻塞。咽喉乾燥。心胸滿。寒熱往來。痰實咳嗽。涕唾稠粘。

赤芍藥 五兩

桑白皮 三兩七錢半

石膏 煨

柴胡 去蘆

前胡 去蘆

乾葛 各五兩

升麻 二兩五錢

黃芩 去枯心三兩七錢

荆芥穗 去土三兩五錢

右剉散。每服三錢。水二盞半。生薑三片。淡豉十餘粒。煎七分。去渣熱服。小兒作三服。

蘇合香圓凡入瘟疫家。先令開啓門戶。以大鍋盛水二斗於堂中心。用二十圓煎。其香能散疫氣。凡

病者各飲一甌後。醫者却入診視。不致相染。

又方入疫家不相染。

雄黃研細水調。以筆濃蘸。塗鼻竅中。與病人同床。亦不相染。初洗面後及臨臥時點之。凡瘟疫家。自生惡氣。聞之即上泥丸。散入百脉。轉相傳染。若倉卒無藥。以香油抹鼻端。及以紙撚探鼻。嚏之

為佳。

傷寒遺事

戰汗四證。厥陰逆至第七日。脉得微緩微浮。為有脾胃脉也。故知脾氣全。不再受剋。邪無所容。否

極泰來。榮衛將復。水升火降。則寒熱作而大汗解矣。鳳奴圓證。服藥一圓。但與冷水盡足飲之。

須臾當寒。寒竟汗出便瘥。小柴胡證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下

之。不為逆。得湯必蒸蒸而振。發汗出而解。調胃承氣湯證云。太陽病未解。脉陰陽俱停。必先振

慄汗出而解。

急下兩證。少陰主腎。繫舌本。傷寒熱氣入於臟。流於少陰之經。腎汁乾。咽路焦。故口燥咽乾而渴。

宜急下之。非若陽明證宜下而可緩也。雖然陽明宜緩。而有一證。發熱汗出多者。亦急下之。蓋陽

明屬胃。汗多則胃汁乾。亦須急下也。少陰證口燥咽乾。謂之腎汁乾。宜急下之。陽明證發熱汗多。

謂之胃汁乾。亦急下之。

傷寒傷風誤下成痞。傷寒傷風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞅而滿。

乾嘔心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。屬太陽

三陰可汗。陰病不當發汗。發汗即動經。然太陰脉浮。少陰病發熱。亦須微微出汗。但不可正汗耳。太陰脉浮者。宜桂枝湯。少陰發熱脉沉。宜麻黃細辛附子湯。少陰二三日。常見少陰證。無陽證者。宜麻黃甘草附子湯。微發汗。皆陰證表藥也。

差後昏沉。傷寒差後十數日。或半月二十日。終不惺惺。常昏沉似失精神。言語錯謬。又無寒熱。醫或作鬼祟。或作風疾。多般治之不差。或朝夕潮熱頰赤。或有寒熱似瘧。皆緣發汗不盡。餘毒在心胞絡間所致也。知母麻黃湯主之。

飲酒復劇。傷寒時疾。三日已汗解。因飲酒復劇。苦煩悶。乾嘔口燥。呻吟錯語。不得臥。黃連解毒湯主之。

循衣摸床。傷寒若吐若下後不解。不大便五六日以上。至十餘日。日晡即發熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。若微者。但發熱譫語。大承氣湯主之者。一服利。則止後服。脉弦者生。脉澀者死。

傷寒別名。清便自調。自可。謂大小便如常也。大便秘而堅則曰鞭。小便不利。小便少。下利清

穀。皆謂水穀不分。得大便曰更衣。大便堅。小便利。曰脾約。下利曰飧泄。腸澼謂痔也。

寒蔽利曰鴨溏。熱而利曰腸垢。轉失氣謂氣轉而響。時時失下。即後分泄氣。蓋腸中有積。大

汗傷氣。大下傷血。或火邪逼迫驚狂。或尺寸脉緊而反有汗。或發汗後汗不止。曰漏風。或陰病本無汗而反有汗。或其脉浮遲微弱不能作汗。皆曰亡陽。吐汗下溫針以後。其病不解。曰壞病。曰

何逆。瘥後更發熱曰遺熱。脉相剋賊曰負。兩手無脉曰雙伏。一手無脉曰單伏。左關脉

曰人迎。右關脉曰氣口。足趺上動脉曰衝陽。足後根上陷中動脉曰太谿。婦人乳頭直下近腹處曰期門。臍下一寸半曰氣海。二寸曰丹田。三寸曰關元。玄府即汗空也。臍間動氣曰奔

豚。筋惕肉動曰瞤。中暑曰中暈。妄發濕溫汗曰重暈。渴欲飲水。水入即吐。曰水逆。心

下停水怔忡。身無大熱。頭額微汗。曰水結胸。乾嘔曰哕。咳逆曰噦。目中不了了。謂不明也。睛不和。謂不和平如常也。三月至夏方發病曰晚發。

傷寒戒忌。傷寒新瘥後。但少吃糜粥。常令稍飢。不得飽食。反此則復。不得早起。不得梳頭洗面。不得多言。不得勞心費力。反此則復。瘥後百日內。氣體未得平復。犯房室者死。忌食羊鷄狗肉

肥魚油膩諸骨汁。及鹹藏鮓脯油餅麵。病再發。

臨治警省。傷寒證候。頃刻傳變。傷寒治法。繩尺謹嚴。非可以輕心視之也。其間種類不一。條例浩繁。是固難矣。至於陰極發躁。熱極發厥。陰證如陽。陽證如陰。脚氣似乎傷寒。中暑似乎熱病。與夫蓄血一證。上熱下冷。乍闕乍寒。甚至四肢發厥。昏迷悶絕。凡此等類。尤當審思而明辨之。若疑似未別。體認未明。姑且詢探。切不可妄投決病之劑。方匕雖微。死生係也。謹之哉。

傷寒篤證。搖頭直視。形如烟熏。心絕。唇吻反青。四肢多汗。肝絕。反目直視。狂言遺尿。腎絕。汗出髮潤。喘而不休。肺絕。環口鰲黑。柔汗發黃。脾絕。汗出如油。喘促無已。水漿不下。形體不仁。命絕。大發濕家汗則成瘥。熱而瘥不治。發濕溫汗。身青面變。耳聾不語。曰重暈。不治。發風溫汗。必譫語。並不治。發風濕中濕汗。並逆。發動氣汗。不治。發少陰汗。九竅出血。曰下厥上竭。不治。發少陽汗。則譫語。發汗只在頭面。不至遍身。鼻衄不止者逆。發汗不至足者逆。諸逆發汗劇者。言亂目眩。並不治。當汗無汗。服麻黃數劑。七日汗不出者。不治。汗出如珠不流。不治。汗出如油。口噤肉戰。呻吟喘促。不治。汗後嘔吐。水藥不入口者逆。熱病脉躁盛而不得汗。不治。汗後不爲汗衰。復大熱脉躁疾。狂言不食。曰陰陽交。不治。忽冒昧無脉。服藥後

汗解則生。若無汗。脉不至者。不治。少陰厥逆無脉。服藥通脉。漸續則生。暴出則不治。下利厥逆無脉。灸之脉不回。身不溫。微喘。不治。少陰四逆下利。惡寒而拳。發躁無脉。不治。下利日十餘行。其脉反實者逆。少陽陽明合病。下利脉長大而弦。曰負。不治。陽病見陰脉。不治。發斑屬陽。見陰脉。不治。代脉。不治。吐血衄血。脉反浮大而牢。不治。陰易陽易。脉離經。外腎腫。腹中絞痛。手足拳攣。不治。咳逆上氣。脉散者。不治。譫語脉反沉微。四肢厥冷。不治。脉陰陽俱虛。熱不止者。不治。七八日以上發大熱難治。舌本爛。熱不止者逆。下利發熱。或汗不止。厥不止。並不治。下利發熱。厥逆。躁不得眠。不治。譫語直視。或喘滿。或下利。並不治。譫語屬陽。見陰證者逆。傷寒脉乍疏乍數。不治。發斑先赤後黯。面色鰲晦。不治。發斑大便自利。不治。發黃而變黑。不治。口乾舌黑。不治。口張目陷。不治。張口出氣。乾嘔骨骸熱痛者逆。咳逆不止者。不治。心下痞悶。上氣喘粗者逆。霍亂喘脹煩躁。不治。誤下濕家。額汗喘促。或小便不利。大便自利。不治。頭汗。內外關格。小便不利。此爲陽脫。不治。腹滿咳逆。不得小便。不治。腹大滿而下泄。不治。若脉洪緊而滑。尤可慮。臟結如結胸。舌白胎。陰筋引臍腹痛。時時下利。不治。結胸證具。加煩躁。不治。臟厥七八日。發厥膚冷。煩躁下利。無時暫安。不治。少陰吐利。厥