





144  
2



内外新法卷之二

緒方郁子文—重譯

以

胃瘍エマールグ、ズ

初起慢性胃加苔液斯ノ如ク夥ク水様酸味ノ液  
ヲ吐シ或ハ頑固ノ嘔機ヲ發ス其嘔自ラ發シ或  
ハ源動物、硬固物、軟滑物、刺衝物、冷物、温物等、一定  
ノ食物ニ由テ發シ或ハ食物ノ性味ヲ問ハス胃  
ニ至レハ必<sup>ス</sup>嘔ヲ發スルヲアリ或ハ胃ノ知覺過  
敏ニノ食物胃ニ入レハ苦悶ニ堪ヘスヲ連旬自

内外新法 卷之二



91-2100



ラ飲食ヲ絶ツ者アリ胃痛モ亦自ラ發シ或ハ歴  
 ノ初テ發シ或ハ食後ニ劇發シ或ハ沈ク鈍痛シ  
 テ時々發歇スルアリ或ハ全然疼痛ナキ者モア  
 リ渴ハ必携ノ一症ニメ甚キニ至レハ胃管灼ク  
 カ如キヲ覺フ然レ飲メハ苦悶ヲ増スヲ以テ患  
 者毎常之カ為ニ大ニ困却ス大便ハ秘結シ逾秘  
 スレハ苦悶逾増重ス瘍ノ侵蝕漸ク胃血管ニ及  
 ブ片ハ嘔血ヲ發ス九胃患長ク續キ胃癌ノ景况  
 ナキニ嘔血ヲ發スルハ胃瘍ノ確徵トス遂ニ全  
 身羸瘦メ血虛病、萎黃病ノ如キ症ヲ發シ或ハ神

經症、瘵癆症、歇以私的里症等ヲ發ス其瘍腹腔ニ  
 穿闕スル片ハ患者頓ニ死シ胃ト密接セル他臟  
 ノ内ニ潰ル片ハ胃症治リテ餘症蜂起シ或ハ前  
 症逾増重メ時ニ昏眩ヲ發シ疼痛嘔機逾劇クメ  
 多量ノ嘔血ヲ發スルヲアリ○此病ハ男子ヨリ  
 モ婦人ニ多シ遠因ハ痔疾、產毒、神思鬱憂、經血不  
 整、皮病内攻等ニアリ近因ハ胃ノ粘液膜焮衝ニ  
 メ飲食ノ誤用殊ニ冷飲燒酒ノ過度ヲ誘因トス  
 ○解屍ノ之ヲ檢ルニ其瘍多クハ一個或ハ數個  
 發スルモアリ其所在ハ通例胃ノ下口若クハ後



部若クハ其小灣トス其形ハ大抵正圓ニシテ其大  
ハ小錢或ハ大錢ノ如ク或ハ一偏ニ延ヒテ胃ノ  
全體ヲ環リ所謂带状瘍ト為ルモアリ瘍底ノ侵  
蝕ハ緩徐ナレバ漸ク深キニ進ム者ハ胃ノ織質  
ヲ荒蕪シ遂ニ其外膜ニ達スルキハ忽チ正中ヨリ  
圓孔ヲ穿テ破開ス其穿開ノ部ニ密接スル器ナ  
キ時ハ胃中ノ蓄物腹腔ニ送出シ腹膜焮衝ヲ起  
シテ即チ死ス若其穿開ノ部ニ脾、網膜、肝臟左側等  
相接スルキハ之力為ニ碍ヘラレテ暫ク其患ヲ  
免ルヘシ抑其瘍甚タ小ニシテ僅ニ粘液膜ノミヲ犯

サレ繼テ自ラ癒ヘシ者ノ如キハ其痕少ク窪テ  
洵シノ如ク輝キ或ハ線状ノ皺紋ヲ遺スモアリ  
治法 勉テ胃腑ヲ安保シ食規ヲ嚴守セシムルヲ  
最要トス胃痛發セル際ハ唯水製羹汁、肉羹汁ニ  
卵黄ヲ加ル者、卵若クハ乳ノ輕ク煮タル者等總  
テ流動性ノ食ヲ與ヘシ患者ニ由テハ唯煮乳或  
ハ生乳或ハ石灰水ニ乳ヲ加タル者ノミヲ用ヒ  
得テ一切他物ヲ受ケサルアリ胃痛退ク時ハ穀  
粉食料、羹汁、米粥、漸ク肉食、菓實、蔬菜ヲ許メ可ナ  
リ但患者ノ稟性各異ニシテ偏ニ肉類、偏ニ蔬菜、偏



ニ穀粉食物ヲ受易キアリ茲ニ配意ノ差亦斟酌  
 ナクニハアラス膏梁酸味ノ食物強劇動搖神思  
 感動足脚冷觸等ハ胃痛ヲ招キ易キヲ以テ害ア  
 リトシ全身溫覆殊ニ胃部ニ溫中ヲ貼シ溫湯浴  
 ヲ施スハ甚夕佳トス心窩ヲ壓メ疼痛ヲ覺ル者  
 其人猶健ナレハ蜩針ヲ施シ替久症ニメ衰弱ノ  
 候アル片ハ皮膚刺衝法殊ニ芫菁膏ヲ貼スヘシ  
 胃痛劇發スル片ハ阿芙蓉劑殊ニ摸尔非涅ヲ與  
 ヘ驗ナキ時ハ消酸毘私繆篤ヲ配用シ若摸尔非  
 涅ヲ服シ難キ時ハ老里兒結尔斯水葎若菲沃斯

番水鼈等ヲ撰用スヘシ渴嘔吐便秘等ハ各對當  
 ノ劑ヲ以テ治ムベシ急性胃加苔液嘔血ハ大關  
 係ノ一傍症トス鉛糖單味或ハ之ニ摸尔非涅ヲ  
 配用シ胃部ニ冷罨法ヲ貼スヘシ收斂鐵液モ亦  
 止血ノ卓驗アリ單寧酸及ヒ之ニ阿芙蓉ヲ配セ  
 ル方ハ其功差劣レリトス嘔血劇盛ニメ口内咽  
 喉ニ凝滯シ之力為ニ呼吸ヲ支ヘ窒息ヲ作スノ  
 恐アル時ハ指ヲ以テ之ヲ清刷スヘシ脱血ノ為  
 ニ昏冒惡心ヲ發セハ直ニ揮發衝動劑ヲ用ヒ體  
 溫血行回復セハ更ニ冷罨法ヲ貼シ氷粒ヲ與テ



出血ノ再来ヲ防クヘシ血虚ヲ補フニハ弊黠舎  
躬神經丁幾收斂鐵液ヲ用ルニ宜シ撰方左ノ如  
シ

第一方

消酸毘私繆篤

六氏至十二氏

清淨摸尔非涅

羊氏一至一

氏白糖

右調和分六包每服一包日二三

第二方

番木鱉越幾斯

氏二

白糖

右調和分六包每服一包日二三

第三方

明礬

氏一蒸餾水

栗龍子舍利別

氏半

右調和每服一匙

第四方

收斂鐵液

三十滴至五十滴

桂皮水

氏一

右調和每服一匙布匙

第五方

鉛糖

三氏至六氏

清淨阿芙蓉

白糖

右調和分六包每服一包日三次乃至六次

第六方



撒尔末兒扶斯氏 水製阿芙蓉越幾斯氏

桂皮水三

右調和每一時與十滴乃至六滴

胃瘍ノ根治ヲ營ムニハ消酸銀或ハ皓礬ノ溶劑  
ヲ妙トス消酸銀私繆篤明礬鉛糖モ亦佳但胃病  
ニハ總テ丸劑ト為シ用ルハ宜シカラス華鳥古  
斯氏ノ伊屈篤治法ニ倣テ多量ノ溫湯ヲ用ル法  
ハ間良功ヲ收ルアアレ氏患者或ハ之力為ニ吐  
ヲ催シ或ハ胃擴ノ症ヲ招クノ弊アリ撰方左ノ  
如シ

第一方

消酸銀晶二 單方桂皮水四

右調和貯硝子瓶每服一食匙日二次

第二方

皓礬四 蒸餾水半

右溶和每服十滴至六滴

以

胃瘞ラムグカ

治法 此病有害ノ飲食ヨリ起ルヲ察ハ咽頭ヲ刺  
衝シ或ハ微溫湯或ハ加密列泡劑ヲ與テ吐カシ



ムヘシ但較著ノ胃病、心臟器體病、動脈腫等ヲ夾  
 ム時ハ安ニ催吐スヘカラス有害ノ藥物ヨリ起  
 ル者ハ水、茶、乳ノ類ヲ與テ毒氣ヲ稀開シ或ハ各  
 種ノ消毒藥ヲ用ヒ中和メ之ヲ無害ト為スヘシ  
 輕症ハ大槩原因ヲ退ケ身体ヲ安シ、琶布、摩措法  
 ニテ心窩ヲ溫慰シ、溫湯ノ脚浴ヲ施シテ能ク治  
 スベシ、必効ノ醫藥ハ阿芙蓉、摸尔非涅、摸尔非涅  
 加毘私繆篤劑ナリ、殊ニ毘私繆篤ハ單味用テ亦  
 一、奇藥ト称ス、摸尔非涅ヲ老里兒結尔斯水ニ溶  
 ス者或ハ番木鱉越幾斯モ亦佳、右件ノ諸藥驗ナ

キ時ハ青酸、亞鉛、消酸銀、吐根、木炭ヲ擬用スヘシ  
 胃症ノ荏苒瀰久スル者ニハ又麻酔藥ノ英埤兒  
 麻扶法ヲ施スヘシ、嘔機アリテ内服藥ニ堪ヘサ  
 ル者ハ固、此一法ニ限レリ、其他麻酔藥ノ灌腸法  
殊ニ舍電發 皮膚刺衝法殊ニ芥 巴豆油及吐酒石  
誤阿芙蓉液 膏ノ擦法、峻烈揮發麻酔劑ノ擦法、的里亞加膏、溫  
 湯浴モ亦佳、然レ歌以私的里、依剝昆埤兒、萎黃病、  
 血虛病等ニ傍發スル胃症ニハ麻酔劑功ナク却  
 テ害アリ、宜ク衝動劑、神經劑、鎮痙劑ヲ專用スヘ  
 シ、即橙花、加密列、薄苛、默栗薩、纈草、少許、骨喜、少量、



葡萄酒、亞的兒、遏設、印亞的兒、兩三滴、弊黠舍、腦神經、丁幾、葛私多、倭謨、丁幾、桂皮、丁幾、布氏歌、以私的里、水、加耶普的油、ノ類、ヲ與ヘ且、是等ノ品、ヲ撰テ灌、腸法、塗擦法、トシ兼行、フニ宜シ撰方左ノ如シ

第一方

老里兒、結尔斯水一、醋酸摸尔非涅二

右溶和貯硝子瓶、每服十滴、乃至卅滴

第二方

清淨摸尔非涅十、肉豆蔻膏二

右研和取豆大、擦胃部

第三方

青酸一、地榆、丁幾二

右調和貯黑硝子瓶、每服五滴、乃至十滴、日二次

第四方

消酸毘私繆篤四、清淨摸尔非涅二

白糖一

右調和分六包、每服一包、日三次

第五方

菲沃斯油一、醋酸摸尔非涅十

右調和供塗擦劑



第六方

香竄膏加阿芙蓉分一

右攤布片貼胃部

第七方

布氏阿魏水

即千歌以私  
的里水三分

右每四分時或每平時與一茶匙

第八方

菘蓉越幾斯分一

消酸毘私繆篤分三

薄荷油

糖分八

右調積分十個各包蠟紙每一時半與一個

第九方

番木鱉越幾斯分二

白糖分一

右調積分六包每服一包日三次

第十方

遇設印亞的兒分二

右每服十滴乃至卅滴

第十一方

鹽酸亞鉛分一

亞的兒分二

右溶和每次六滴沙糖水和服日三四次

第十二方



纈草浸

四勺以纈草半勺製者

葛私多倭謨丁幾

一匙

加密列舍利別

右調和每半時或每一時與一匙

第十三方

橙花

綠茶各三

設諾忽葉二

右調和分四包為泡劑之料

第十四方

葛私多倭謨丁幾

一匙

香竄酒三

右調和每半時與七滴

第十五方

礪沙華精

加密列舍利別

各六

加密列水

右調和每四分時與一匙

發作治マル時ハ本病ヲ探テ其療法ヲ下スヘシ  
 喻ハ胃加荅流斯、胃瘍、歇以私的里、依剝昆埜兒等  
 二原ク片ハ各其治ヲ處シ發作ニ間歇アリテ變  
 形間歇熱ノ如キ者ニハ發作前ニ多量ノ規尼涅  
 六氏至ヲ頓服セシムヘシ但、其際胃症ノ主藥モ  
 二十氏亦急ルヘカラス食規攝生ハ本病ニ應ノ異ナリ  
 或ハ儉節食規ヲ要シ或ハ滋味食物、身體動作ヲ



要スルアリ又各人ノ稟資ニ由テ輕味ノ食ヲ嫌  
 フアリ或ハ唯冷食ヲ嗜ムアリ是各其性ニ任セ  
 テ強ヒサルニ互シ又症ニ應メ亞尔加里性鑛泉  
 炭酸若クハ鐵氣ヲ含ム鑛泉ヲ撰用シ或ハ冷水  
 浴川水浴海水浴ヲ施メ全功ヲ收ムヘシ

以

胃癌マクカ

是多クハ胃ノ下口ニ發ス次ニ小灣次ニ大灣次  
 ニ上口次ニ盲囊トス盲囊ニ發スルハ極テ罕ナ  
 リ癌腫胃ノ下口ニ生シ其部厚肥メ通路塞ル片



ハ胃腑蓄物ノ為ニ膨脹シ食スレハ苦懣忽増シ  
 或ハ食セシ物ヲ吐シ大便秘閉シ肉脱頓ニ加ハ  
 ル然氏通路障ナキ時ハ胃腑却テ已甚ク縮小ス  
 總テ患部近鄰ノ器臟ト繋着セサル片ハ自ラ重  
 カニ任セテ腹底ニ垂ル嘗テ胃ノ下口降テ横骨  
 邊ニ垂ルモノヲ見タリ癌腫速ニ増息シ且其質  
 硬キ時ハ劇痛ヲ發ス或ハ鈍痛或ハ壓痛咬痛刺  
 痛ヲ發スルモアリ癌腫胃ノ前面ニ生ノ他臟ノ  
 為ニ蔽レサル片ハ外ヨリ觸テ能ク其結核状ノ  
 モノヲ認得ヘシ但此ヲ候フニハ胃腑ノ虛實ニ



管セス唯大腸ヲ十分ニ疎洩セシ後ヲ佳トス然  
 氏丁寧ヲ極テ腺腫宿糞臍腫等ト混スル下カ  
 へシ吐物ハ通例骨喜メ如ク敗血漿ノ如シ或  
 ハ血管綻ヒテ嘔血ヲ發スルアリ患處漸ク近鄰  
 ヲ掠畧シテ肝膽十二指腸ヲ犯セハ黃疸ヲ發シ  
 横膈胸腔ヲ犯セハ呼吸不利咳嗽吃逆ヲ發シ腹  
 膜ヲ犯セハ腹脹腹痛腹水ヲ發シ胃管ヲ犯セハ  
 嚥下ヲ妨ク自餘總身皮膚灰白帶黃色或ハ涸燥  
 ノ肩剥シ精力虚脱肌肉削瘦速ニ加ル等ヲ替徴  
 シテ診断スヘシ

治法直徑ニ之ヲ治ルノ奇藥未タ曾テ發明スル

一能ハス醫ノ要務ハ唯患者ノ精力ヲ永ク保續  
 セシムル法ヲ處スヘキノ一食規ハ消化機ノ強  
 弱良能ノ好惡ヲ測テ其多寡性味ヲ定ムヘシ大  
 抵滋養ノ能アリテ消化力ヲ費サズ滓渣ヲ殘ス  
 一ノ鮮キ品ニ宜シ消化機仍健ナル時ハ肉類ヲ  
 與ヘ消化機弱キ時ハ唯肉羹汁卵乳穀粉製ノ食  
 料消化シ易キ蔬菜ニ宜シ但各人ノ固有性ニ應  
 メ差之ヲ斟酌スヘシ胃ノ下口若クハ上口ニ狹  
 窄アル片ハ流動性ノ食ニ限ルヘシト雖氏患者



固性ノ食ヲ絶ツテ能サレハ口中ニテ勉テ細嚼スルヲ諭スヘシ疼痛ハ大ニ患者ヲ悩マスノ一症ニノ少、緩解スレハ乍全體爽快ヲ覺ルナリ故ニ麻醉劑ヲ取テ漸ク其服量ヲ増シ或ハ其製法配合ヲ易ヘ與ルヲ最要トス摸尔非涅ハ單味或ハ溶劑トシ用テ此症ニ殊効アリ、莨菪、青酸、菲、沃斯、番木鱉モ亦佳、疼痛極テ劇ケレハ兼テ毳布或ハ失馱苔葉、莨菪葉、蔓陀羅葉、罌粟壳ノ煎劑或ハ香竈膏或ハ摸尔非涅若ハ歌刺多里涅ノ英堊兒麻扶法ヲ施スヘシ吐出物僅ニ血色ヲ帶ルハ

別ニ其設ヲ要セスト雖凡嘔血多ケレハ即氷片ヲ吞下セシメ胃部ニ冷罨法ヲ貼シ明礬、鉛糖ノ劑ヲ與テ直ニ鎮止セサルヘカラス而面色灰白、精力脱衰、諸神經症等血虛ノ候現ル片ハ四肢ヲ摩措シ四肢ニ溫罨法ヲ施シ鼻ニ烈香藥ヲ嗅カシノ亞的兒、葡萄酒、麝香、龍腦ヲ内服セシメ吐出物骨喜ノ如ク或ハ煤色ト為ル時ハ差其方法ヲ緩ニシ全然静息ノ食物ヲ断シ少量ノ收斂劑ヲ與テ嘔血ノ再發ヲ防クヘシ、饅雜ヲ治ルニハ麻、屈涅、失亞、刺蛄石、石灰水、結麗土、鰾蓬塩ニ宜シ胃



ノ上口狭窄甚クシテ飲食全ク通セス将ニ餓死  
セントスル症ハ肉羹汁、卵黄、乳汁等ノ灌腸ヲ施  
シ勉テ滋養物ヲ體中ニ授ルノ外他策ナシ然レ  
大腸ハ唯水分ト塩分トヲ吸收メ油質ト卵白質  
ヲ吸收セサルカ故ニ是ニ由テ十分ノ望ヲ達ス  
ルノ亦難カルヘシ○古来胃癌ニ称用セシ所ノ  
醫藥多シト雖レ皆功ナクノ却テ害ヲ招ケリ即  
甘汞、沃胃謨、砒石、安質母、扭劑、黄金、消酸銀、塩酸、白  
銻、金盞花、解凝越幾斯、鑛泉類是ナリ○撰方ハ胃  
瘵、胃瘍、胃加荅、派斯ノ條ニ讓テ茲ニ録セス參考

スヘシ

以

胃管癌 カン、ス、ロク、ク、ル、ダ、ル、ン、ヒ、デ

此病ハ顯著ノ因ナク頓發シ或ハ近鄰ノ癌腫ニ  
繼發ス患部粘液膜糜爛シ其膜下ノ組織硬結シ  
或ハ髓樣質ト為テ疼痛シ或ハ脊骨若ハ氣管ニ  
附着シ或ハ軟解ノ敗血若ハ鮮血ヲ噴出シ或ハ  
近隣ニ穿開ス胃管窄マルヲ以テ初起ニ於テハ  
胃管狭窄病ト監別シ難キナリ

治法 唯傍發症ヲ靖ルノ劑ヲ用ヒ

阿芙蓉 胃管探針



ヲ以テ身体ヲ養フヘシ千八百五十三年同五十  
 四年此病ニ罹テ胃管全ク窄閉セル症アリ其腹  
 ヲ割キ胃ニ一孔ヲ穿テ食物ヲ入レ以テ性命保  
 續ノ術ヲ試タレ凡終ニ其功ヲ遂ケス「ボウギ」  
 器ノ名其製種々アリニテ胃管ヲ豁開スル法モ  
 初起ニ施スハ可ナレ凡歲月ヲ經テ患部既ニ軟  
 解セル時ニハ毀傷スルノ危アリ此症亦唯灌腸  
 器ニテ榮養ヲ營ミ渴ハ冷水或ハ蜜柑齋ヲ口ニ  
 含テ滋潤セシムヘキノミ

以

胃擴

グアルエイトン

此病ハ下口狭窄下口癌腫慢性胃加荅涼斯等ノ  
 症ヲ發シ尚且鳩尾ト臍トノ間著ク高起シ或ハ  
 全腹膜脹ノ腹水若ハ妊娠ニ擬シ胃ノ大灣腹面  
 ニ浮キ胃ノ冠動脈ノ鼓動觸テ知ヘク外ヨリ急  
 壓スルカ或ハ軀體ヲ動揺スレハ雷鳴ヲ發ス胃  
 中瓦斯ヲ充ル者ハ之ヲ打テ鼓聲ヲ放チ水飲ヲ  
 充ル者ハ其聲曇濁ニノ波動アリ且卧方ニ隨テ  
 彼此ニ推移ス此症能ク多量ノ飲食ヲ容レ又能  
 經日之ヲ蓄藏ス然凡擴張微ナレハ嘔吐ヲ發シ



甚ニ至ハ嘔吐止ミ自初食ヲ嫌ヒ或ハ偶尔不食  
 ト為リ大便常ニ秘閉ノ時々一頓ニ夥瀉スルア  
 リ或ハ横膈運營呼吸血行困難ニメ心悸亢盛ス  
 ルアリ經過中諸症頻ニ交換スレト擴張ノ極ニ  
 至レハ諸症定テ變動セス又吐前ト吐後ト時ヲ  
 易ヘテ候ヘハ能ク其擴張ノ度ヲ定ルヲ得ヘ  
 シ○原因ハ通例胃ノ下口狹窄ニアリ或ハ常習  
 ノ飽滿或ハ胃中ニ液動物所謂胃水若ハ瓦斯ヲ夥ク  
 分泌醸生ノ堆積スルニ由リ或ハ慢性加苔派斯  
 ノ為ニ胃膜延暢シテ起ルアリ○解屍ノ之ヲ檢

ルニ胃ノ周圍擴張ノ常ニ倍スルヲ五層六層ニ  
 至リ間膀胱邊迄擴リテ諸腸ヲ被フアリ嘗テ之  
 ヲ試シニ九懋篤ノ水液ヲ容ルモノヲ見タリ而  
 ノ横結腸ハ胃ト共ニ下ニ降り小腸ハ上邊後邊  
 ニ推サレ肝臟ハ右傍後邊ニ潜リ横膈ハ心臟ヲ  
 推テ上ニ昂リ肺臟ハ壓縮セラレ

治法飽飮貪餐ヨリ起ル者ハ消化シ易キ食ヲ命  
 シ毎次少許宛用ヒシメ下口狹窄ニ原ク症ハ治  
 シ難シ下口狹窄ノ候ナクノ唯麻痺性ノ胃擴ニ  
 ハ私多列格尼涅越列吉的兒冷水滴浴艾灸胃施



保固香竈藥規尼涅肉豆蔻冰粒ノ内服等ニ亘シ

以

胃管擴張ヲルエイチンク、ク、ク、ヒ

其徵ハ多少嚥下ヲ妨ケ或ハ全ク嚥下スルヲ能ハス或ハ口中惡臭牛飴ヲ發シ其患胸廓部ニ位スル片ハ又心肺ノ諸症ヲ媒起ス嘗テ此類ノ一患者午飯後暫時ニノ斃レシ者アリ即胃管強ク臌脹シ俄ニ肺中血積ヲ起セシニ由レリ○原因ハ未夕明白ナラスト雖氏多クハ胃管ノ慢性加答源斯ナリ○解屍ノ之ヲ檢セシニ全管齊ク擴

リテ恰中空圓柱ノ如キアリ或ハ一擴一狹ノ狀ヲ為スアリ其局擴張ハ大抵直下ニ狹窄ヲ兼ルヲ猶胃擴張ノ下口狹窄ヲ併スルカ如シ而單ニ局擴張スルノ症ハ横膈直上ニ發スルヲ最モ多シ通例其擴張ノ經リ大約四岔母ニノ患部ノ織質厚肥シ粘液膜ハ膿腫ヲ發ス

治法 狹窄ニ原ク症ハ先狹窄ヲ治メサレハ擴張ヲ治ルニ縁ナシ單性擴張ノ初起ニ在テハ斯多列格尼涅越列吉的兒ヲ用ヒ其盲囊狀ヲ生セル症ハ胃管探針ヲ施シ之ニ由テ一去ハ榮養ヲ營



一 来ハ食物ノ囊中ニ過ルヲ防テ此ヲ縮小セシムルヲ要トス

以

胃管狭窄フルナーウイング

胃管ノ周縁硬厚シ或ハ傷痕アリテ狭窄セル症ハ加爹的兒術ヲ施スヘシ或ハ彈丸ニ絹絲ヲ附シ中空探針ニテ胃管ノ狭窄部ニ送り繼テ探針ヲ抜退ケ彈丸ヲ留在セシム或ハ左法ヲ行フ狭窄極テ甚キ時ハ先試ニ細キタルムスナールボウギ造法ヲ送入シ次ニ差太キボウギヲ入

レ次ニ加爹的兒ノ中線ヲ具スル者ヲ入ル能ク加爹的兒ヲ入得ル時ハ即中線ヲ抜キ氷柱状ノ注管ヲ其口ニ接シ徐々ニ羹汁、乳汁、骨喜、葡萄酒、麥酒等ヲ注入スヘシ然ル時ハ將ニ餓死セントスル者モ忽活起スルヲ得ルナリ加爹的兒ハ細ヨリ漸ク大ニノ且彈力强キモノヲ用フ其目的ニ般アリ一患者ノ體ヲ培養シ一狭窄部ヲ豁開センカ為ナリ既ニ彈力アル大加爹的兒ヲ用ルニ及テハ患者自能ク嚥下ノ機ヲ發スルヲ得ヘシ是ニ於テ加爹的兒ヲ捨キ彈力アルボウ



キーヲ用テ專ラ豁開術ヲ行ヘシ總テ加爹的兒  
 モボウギ一モ細キヲ用ル際ハ適宜ニ屈曲セル  
 中線ヲ具ノ彈力ヲ添フヘシ俱英製ノ品ハ頗堅  
 窄ナルヲ以テ中線ヲ具スルヲ要セス其中線ハ  
 細キ加爹的兒ニ具スヘキ者ナルヲ以テ前端ニ  
 帽ナクシテ差尖レリ故ニ手術ヲ施ス時其中線ヲ  
 加爹的兒ノ巔ニ押シテ保タサレハ中線加爹的  
 兒ノ側孔ヨリ滑脱シテ胃管ヲ傷ルノ危アリ俱  
 ボウギ一ニハ側孔ナキヲ以テ其患ナカルヘシ  
 且太キボウギ一ハ之ヲ盪ス氏其剛ニテ狭窄部

ニ蹶キ撓レ無キヲ以テ固中線ヲ具スルヲ要  
 セス而ボウギ一ノ形ハ氷柱状ナルニ宜シ凡豁  
 開ノ術ヲ施ス時ニハ多少壓執ヲ加シテ欲ス  
 其強弱ノ適度ハ施術者ノ掌中ニテ定ムヘシ右  
 ノボウギ一ニテ狭窄部漸ク豁開セハ又轉メエ  
 ラスチセゴム一護謨ノノボウギ一ヲ用フ即其頂  
 ヲ熱湯ニテ軟ケ油ヲ塗リ施スヘシ一回施シテ  
 其具恰好ノ屈曲ヲ得ル片ハ尔後復熱湯ニテ軟  
 ルヲ要セス毎回唯油ヲ塗ルノニ足レリ此  
 ボウギ一ハ緊ク狭窄部ヲ排張スルカ故ニ之ヲ



退ル時膚淺ノ痛傷微出血ヲ作コスコアリ殊ニ  
 其面ニ凹凸アルモノハ軟化圓轉ノ摩滅シ用ヘ  
 シ且其器ハ陳ナラス脆ナラサル品ヲ撰ムヘシ  
 若陳脆ナル片ハ動輒スレハ破碎シテ碎片狹窄  
 部ニ阻セラレ其片逾長ケレハ逾祛キ難キア  
 リ又熱湯ニテ過度ニ軟化スルモノヲ用ル片ハ  
 所々在々ニテ屈曲シ後其硬固ト為ルニ及テ狹  
 隘ノ部ヨリ之ヲ退ルニ甚タ難キアアリ是皆預  
 致意スヘキノ事ナリ○患者小兒ニノ説諭スレ  
 比加爹的兒術ヲ行フコト肯ンセス鼻ヲ塞ケバ

唇ハ開ケ凡切齒ノ之ヲ拒ムコトアリ其時ハ木棍  
 ヲ以テ齒ヲ引分ケ嚙爾苦ヲ齒間ニ挿マシノ或  
 ハ左手ノ示指ニ「エ」ラスチセゴム製ノ環ヲ装テ  
 兒ノ口内ニ入以テ其舌ヲ下ニ壓シ且前ニ弩キ  
 而後法ノ如ク「ボウギ」ヲ示指ニ沿テ進ルモ亦  
 妙トス

以

咽喉燉衝 キア

是胃管燉衝、喉頭及ヒ氣管燉衝、扁桃腺燉衝等  
 ノ總稱ナリ治法其各症條中ニ索ムヘシ



以

胃管焮衝

「ウ」ソ「パ」  
ギチス

急性慢性ノ二般アリ急性症ハ疼痛ヲ主徴トス  
 其痛ハ焮衝ノ所在ニ應ノ或ハ咽喉ノ込傍或ハ  
 頸ノ下部或ハ胛骨ノ間ニ發シ嚥下毎ニ増劇ス  
 甚ニ至レハ嚥下呼吸說話共ニ不利シ或ハ飲食  
 全ク通セス口全ク言ハス氣息將ニ窒セン  
 トスルニ至ル或ハ吃逆ヲ發シ粘膠物ヲ吐シ或  
 ハ頑固ノ欬嗽ヲ發ス熱ハ全ク無ク或ハ劇熱ヲ  
 發シ脈ハ細ニノ緊顔面ハ腫脹ノ灰白色或ハ腦

患ヲ作コシ搗搦ヲ發スルモアリ右諸症焮衝散  
 スルニ隨テ徐々ニ退キ或ハ一旦極度ニ進テ窒  
 息ノ際ニ臨セシ者モ膿腫胃管ニ潰テ忽ニ緩解ヲ  
 覺ルトアリ○原因ハ異物ノ梗阻熱物苛烈物侵  
 蝕物強酸類吐酒石升汞等ノ挽入ニアリ或ハ恐  
 水病格列刺發黃熱ニ兼發ス

治法刺絡、尙處瀉血、頭ニ 水銀膏擦法、粘滑油

質藥、甘汞ノ内服、頭ニ 嚥下シ難キ症ハ甘汞ヲ酪ニ和  
 ノ舌上ニ置キ自ラ融釋シ下ラシム咽鎖シテ物  
 全ク通セサル症ハ氷、枸橼汁ヲ含テ口ヲ濕シ渴



ヲ消シ静息黙止ノ分利ヲ俟ツヲ肝要トス輕症ハ唯緩和劑玫瑰蜜加蓬沙ノ類ヲ與ヘ強酸類ニ由テ起ル症ハ直下ニ麻屈涅失亞炭酸刺芥斯脂油劑ヲ與ヘ而後通常ノ治法ヲ行ヘシ慢性症ハ頸痛漸徐ニ加リ嚥下困難ニノ粘液或ハ膿汁ニ血ヲ交ルモノ湧出シ諸症交代リ經過久暫定ナク總テ徵候井然ト齊發セス此症急性症ニ繼發シ或ハ飲酒吹蕩ノ過度ニ起リ或ハ胃若ハ胃管ノ加芥添斯ヨリ發區治法ハ局處瀉血粘滑劑ヲ處シ食ハ唯軟カナル物ヲ與ヘ一切温

物非常冷物刺衝辛辣物說話等ヲ禁スヘシ消石硃沙甘汞沃胃謨下劑吐酒石膏巴豆油擦法艾灸貫線法浴法等モ稱譽ス亦試用スヘシ  
 ○喉頭及氣管喉衝ト、タレイ、ケイ、チ、ス、エ急性ト慢性ノ二般アリ急性ノ輕症ハ聲音嘎レ頸内痒ク或ハ灼カ如ク或ハ刺痛ヲ覺ヘ說話毎ニ其痛増シ嚥下不利シ效ハ全ク無ク或ハ吠ルカ如キ暴效ヲ發シ漸ク黄色ノ濃痰ヲ咯出ス其他食欲差減シ舌苔少ク被ヒ昏暮惡寒肌熱ヲ發シ唯疲勞ヲ覺ルノミニ攝生誤ナケレハ大抵



若干日ニメ即治ス重症ハ頭痛甚ク外ヨリ觸テ  
 之ヲ覺ヘ或ハ自發シ或ハ語話歎嗽ヲ誘レテ發  
 ス嚥下不利聲音全ク噎レ呼吸短數ニメ雖鳴聲  
 ヲ發シ煩悶甚クシテ頭ハ絞擦シ胸ハ破裂スル  
 カ如キヲ覺ヘ顔面ハ始紅腫シ漸ク變メ慘澹色  
 ト為リ效ハ痛ヲ兼子其聲吠ルカ如ク努力セサ  
 レハ發シ難ク脈ハ極數ニメ精神ハ騷醒ス此諸  
 症急ニ退カサレハ忽呼吸困難窘迫シテ昏睡狀  
 ニ陥リ眼ハ半開シ頭ハ後ニ曲リ面色ハ灰白ト  
 為リ呼吸凶ニ通シテ患者靜頓々俱靜頓中屢煩

騷シ或ハ搐搦ヲ發スルヲアリ患者暗ニ神識ヲ  
 存シ時ニ嘆息呻吟シテ其苦ヲ訴ルニ似タルト  
 アリ語次錯乖シ問ニ答ヘ難ク差醒覺スル時ト  
 雖氏既往ノ事ヲ記スルヲナシ漸ク昏睡深重シ  
 呼吸短數ニメ次序ナク或ハ時ニ結代シ脈至計  
 ヘカラス細絲ノ如キニ至テ乃生機滅熄ス此病  
 ハ慢性症ニ轉スル者ニ非レハ吉凶一週ヲ出テ  
 スノ決ス重症ハ治スル者ヨリ死スル者多シ流  
 行性ノ症ハ殊ニ然リ其治ニ趣ク者ハ呼吸不利  
 先退キ熱勢速ニ減シ乾效變メ濕效ト為ル然氏



久ク持續シ聲啞亦久ク復故セス而其死スル者ハ肺及腦ノ血積溢液ニ由リ心臟大血管腦ノ靜脈<sup>テ</sup>一セム内ノ凝血ニ由レリ

治法 急性ノ輕症ハ室内ノ溫度ヲ一ニシ頭ヲ溫覆シ粘滑劑并ニ少量、硝沙、麻醉劑、老里兒結尔斯水ヲ用ヒ攝養ヲ慎守スレハ能ク治スヘシ重症ニノ熱勢劇ク呼吸不利等ノ症ヲ發スル者ハ局處瀉血、毳布、水銀軟膏、粘滑飲劑ニ宜シ吐劑ハ小兒ニ用テ殊功アリ大人ト雖モ粘膠液壅塞ノ呼吸ヲ妨ル時ハ亦救急法トシ用ヘシ病勢逾増重

スル時ハ巴豆油擦法頭項窩刺戟灌腸法醋製窒息

スル片ハ勁引赤法手足龍腦内服百方術盡ル時ハ

氣管割ヲ試ムヘシ○幸ニ夕焮衝ノ勢漸ク退ク

時ハ金礞黃、老里兒結尔斯水、菲沃斯、大麻子等ニ宜シ總テ發汗劑、蒸氣浴、芳香藥、熱飲等ヲ處スルハ血管ヲ衝動スルヲ以テ不當トス

慢性症、即古人所謂喉頭勞、氣管勞是ナリ治法ハ局患ヲ攻ルト原因ヲ除クトノ二般アリ局患ヲ攻ルニ尋常芫菁膏、巴豆油、吐酒石膏ヲ施シ或ハ消酸銀、膽礬等ノ溶水ヲ以テ喉頭ヲ腐蝕シ或ハ



參兒蒸氣、沃胃謨蒸氣ヲ吸入シ或ハ甘汞、赤降汞、  
 鉛糖、明礬、消酸毘私膠、篤等ノ極末ニ白糖一倍乃  
 至八十倍ヲ和ノ藥力刺戟ノ強弱ト患者覺機  
銳鈍ニ應ノ沙糖ヲ加減ス吹  
 劑トシ行フ俱收斂藥ノ乾末、沃胃謨蒸氣ハ刺衝  
 ヲ挑起スルノ恐アリ慎重ヲ加テ施スヘシ近頃  
 黠ル孤氏ハ喉内潰瘍ヲ生スル症ニ喉頭鏡ヲ以  
 テ局處ニ腐藥ヲ施シ屢良功ヲ得タリト云疼痛  
 劇キ症ニハ溫毳布或ハ冷卷法ヲ頭ニ施シ溫湯  
 若ハ麻醉藥泡劑ノ蒸氣ヲ吸入セシメ嗽ハ百  
 尔蘭獨留謨、遠志、硫黃花類ノ祛痰劑并ニ麻醉劑

ヲ以テ靖ムヘシ○此患者ハ空氣ノ溫度渝ラカ  
 ルヲ利アリトス覺機過敏ナル者ハ高山、空氣、海  
 濱ノ氣特ニ東海濱ノ氣ヲ受ルニ宜シ然レ居テ  
 佳適ノ郷ニ移スレ能ハス又長ク病ヲ室内ニ養  
 フレ能ハサル者ハ「レ」スピラトルス絹絲ノ織物  
他兒ノ線ナリ常ニ之ヲ口ニ保テ施メ益アリ總  
テハ能ク吸入氣ノ猛烈ヲ減ステ濕潤ノ空氣ハ乾燥氣ニ優レリ全體ノ景執ニ  
 應メ恰當ノ食規ヲ命シ乳汁療法、乳清療法、葡萄  
 療法ヲ行フニ宜シ其瘰癧毒、梅毒ニ原ク者ハ側  
 ラ其療法ヲ施スヘシ撰方左ノ如シ



第一方

吐根粗末八分 熟湯適宜浸八分時、瀝取六

分加次藥 遇尔托根舍利別詳

右調和、每一時與一匙

第二方

吐根粗末一分 熟湯適宜浸四分時、瀝取三分加

次藥 吐酒石一分 海葱舍利別詳

右半分頓服、餘半分、每十密扭篤與一匙、至得吐

第三方

遇尔托根二分 煎取六分加次藥 消石一分

紫堇舍利別半

右每一時與一匙乃至二匙

第四方

甘扁桃乳六 菲沃斯越幾斯六

右調和、每半時與一匙

第五方

遠志二分 煎取五分加次藥 橙皮舍利別半

右每一時與一匙

烏尔里屈氏ノ氣管割畧式左ノ如シ

一患者既ニ窒息セル時ハ慎重ノ先、皮肉ヲ裂



キ氣管ヲ暴露ノ其部ニ漏斗状ノ環ヲ挿ス  
 其部位ハ環状軟骨ト甲状腺ノ間ヲ佳トス割  
 カハ直形<sup>三</sup>トウリヲ用フ<sup>三</sup>割口ヲ開キ保  
 ツニハ黙他<sup>ル</sup>兒ノ複管ヲ用フ其管徑四列印周  
 圍十二列印トス故ニ之ヲ挿ム割口ノ長ハ少  
 キモ六七列印ニ下ラサルヘシ<sup>四</sup>管ノ一端ハ  
 氣道ニ望ム<sup>一</sup>七列印許ニノ喉頭動ク比創縁  
 ノ管口ヲ掩ハサルヲ要トス以テ全管ノ長ヲ  
 適宜ニ定ムヘシ<sup>二</sup>氣中ノ塵埃或ハ冷氣等ノ挽  
 入ノ肺管加荅涼斯ヲ起スヲ防ク力為ニ管ノ

一端ニ布片ヲ懸ケ管内ニ粘液等充テテ空氣  
 出納毎ニ響高ク或ハ吠ル力如クナラハ内管  
 ヲ拔テ清除スヘシ

○扁桃腺炎<sup>テ</sup>ノ<sup>イ</sup>チ<sup>グ</sup>

是古人咽喉焮衝ノ一症トセル者ナレ氏近来原  
 病解剖學ノ功ニ由テ之ヲ明辨ノ顯然タル獨立  
 病ト為ス而腸胃性膽液性痿麻質性等ノ咽喉焮  
 衝ノ區目ハ臆測ニ原キ徒ニ混雜ヲ致ストシテ  
 皆擲タリ<sup>此發明佛郎</sup>此病ハ年齡ヲ問ハス四時  
 ヲ擇ハス<sup>起レリ</sup>ト<sup>氏</sup>特ニ生殖機發成ノ頃ヨリ



身體退化機ニ向フ近ノ者犯サレ易ク春秋湿冷ノ候ニ最多クノ屢小流行ヲ為ス<sub>1</sub>アリ源因ハ足及<sub>2</sub>頸ノ寒冒劇談高歌啼叫發嚏起熱飲液冷飲過用等ナリ初惡寒發熱頭痛ヲ發シ乍又咽中異常ナルヲ覺フ隨テ之ヲ檢査スレハ扁菴核既ニ少ク赤腫セリ是多クハ一傍ニ發メ徐々ニ腫脹シ渾朧タル胡桃大ノ團塊ト為テ咽中ニ突出ス或ハ兩三日ヲ踰テ後他傍ノ腺ニモ發スル<sub>1</sub>アレ氏其度差輕シ患者不覺不知頻ニ之ヲ嚥下セ<sub>2</sub>ントセシカ忽咽内疼痛ヲ發シ其痛劇シテ劍傷

ヲ被ルカ如ク刺スカ如ク射ルカ如ク且勁ク緊脹ヲ作シ共ニ延テ頸及耳ニ達ス嚥下語話難益ト為リ第三四日全ク其機ヲ廢スルニ至ル腦ノ交感症逾増シ頭痛謔語逾甚ク精神騷擾ノ錯視耳鳴悶夢ヲ作シ或ハ茫然自失スルカ如クニノ半昏睡ノ状ヲ為スアリ脈ハ駛數ニノ實皮膚ハ乾燥メ熱ス舌ハ厚苔ヲ被リ食欲絶ハ大便秘閉ス就中固有ノ一症ハ唾液分泌ノ増盛ナリ通例第二日或ハ第三日ヨリ漸ク増シ焮腫存スル間ハ患者吐唾ニ忙ク遂ニ之カ為ニ夜眠ヲ破ルニ



至ル其故ハ瞬間眠レハ輒唾液過溢ノ扁挑校ニ  
 迫リ嚥下ヲ挑々疼痛ヲ作シ屢驚寤セシムレハ  
 ナリ不眠連綿四五夜ヲ徹スレハ腦ノ刺衝状ヲ  
 起シ大ニ患者ヲ脱衰セシム燬腫益已甚ナレハ  
 又呼吸不利胸内刺痛ヲ發ス豪斯屈尔答實ニテ  
 之ヲ候ヘハ肺ノ後邊下部ニ哮喘ノ響アリ又粘  
 液膜ノ燬衝漸ク蔓テ歐斯答幾烏私管ニ波及ス  
 ル片ハ耳聾ヲ發シ内耳ヲ犯ス片ハ劇耳痛ヲ發  
 ス諸症滿發ヲ劇度ニ止ルヲ短キハ四日修キハ  
 十日乃至十二日トス此病空ク退散スルヲ甚夕

罕ニノ其終大抵釀膿ニ歸ス而數個ノ小膿囊ヲ  
 為スアリ一大膿囊ヲ為スアリ其將ニ破潰セン  
 トスル片ハ腫面ニ黄斑点或ハ一小泡ヲ現シ而  
 睡中ニ自破レ或ハ欬嗽若ハ嚥下ノ機會ニ潰フ  
 小膿破テ膿ノ排洩少キ時ハ其膿消耗ノ見ヘサ  
 レ凡患者惡心スヘキ臭味ヲ覺ヘ語話嚥下少ク  
 痛アレ凡大ニ容易ト為リ且口内ヲ視レハ腫容  
 聊減シテ破潰ノ小口ニ黄痕アル等ヲ以テ之ヲ  
 徵知ス通例餘ノ小膿囊逐次ニ破潰ノ交感諸症  
 隨テ消除シ食欲復故ノ快路ニ趣クヲ甚夕速ナ



リ而潰瘍硬結等ノ如キ他患ニ轉セサル者ハ多  
 日ヲ出テスノ余恢復ヲ得ヘシ大膿囊ノ自破潰  
 モ亦多クハ睡中ニアリ則諸症極度ニ進ムノ日  
 患者苦悶ニ堪ヘス罷弊極テ睡ニ就ク其驟ニ劇  
 效嘔機襲来リ效也嘔也連發シテ惡臭ノ膿汁夥  
 ク出ツ而惡心嘔機ノ餘勢仍暫ク收ラス或ハ一  
 二次真ノ嘔吐ヲ發シテ患者復睡着ス快夢漸ク  
 醒レハ胸内窘迫ナク頭痛ナク言語嚙下ニ妨ナ  
 クシテ恰ヒ燕生スルカ如キヲ覺フ患處ヲ檢スル  
 ニ少前滿腫セシ扁菴按ナ萎縮メ道路豁開シ一

身ノ諸患交感症ト共ニ退キ只嚙下ニ微痛ヲ發  
 シ聲音少ク嘔レ語話ニ疲レ易ク兩三日罷憊ヲ  
 覺ルノ此腫偶外部ニ破潰シテ經久痿瘡ヲ剩  
 ストアレレ氏極テ希有ノ事ナリ

**治法** 初起刺絡ヲ行フ氏防禦スルト能ハス蜈針  
 モ亦唯皮膚焮衝汚疹等ヲ招クノミニノ良驗ナ  
 シ乱刺法ハ益アレレ氏患者ニ由テハ行ヒ難シ早  
 吐劑下劑ヲ用ヒ緩和麻醉藥ノ蒸氣咽内圍布頭含  
 漱劑芥子泥脚脚湯等ヲ撰施シ語話緊葛刺衝食  
 物ヲ避ケシハヘシ而血積益加ハリ熱勢逾進々



體質多血ナルキハ刺絡ヲ行ヘシ是時ニ在テモ  
 乱刺法ハ局處ノ血積ヲ減却シ釀毒外洩ノ路ヲ  
 啓クヲ以テ利アリトス既ニ釀膿シ苦楚極度ニ  
 至テ急ニ自破潰セサレハ吐劑或ハ刀尖ヲ以テ  
 破ルヘシ破潰後患者語話嚥下ノ意ヲ催ス凡少  
 選之ヲ嚴戒シ次日唯緩和清刷ノ注射法或ハ含  
 漱劑ヲ行ヒ惡臭續々口ヨリ出テ過マサレハ格  
 魯林劑ノ注射法患部ノ狀態復故シ難キ時ハ緩  
 和劑ヲ含テ收斂劑ヲ施スヘシ

○慢性扁桃腺炎衝偏傍或ハ兩傍ノ腺漫腫シ或

ハ棱形ト為リ其色微紅或ハ處々灰白ニノ硬ク  
 嚥下ニ當テ觸覺銳敏或ハ一二粘液泡破潰スル  
 マリ近鄰ノ部ハ差赤色ヲ發シ血管怒脹シ懸壅  
 垂ハ側ニ背キ或ハ粘液膜ノ面ニ粘液塗布シ或  
 ハ膿腫ヲ生スルアリ唾液ノ分泌増盛シ聲音嘎  
 レ語話ニ疲レ易ク咽中疼痛刺衝粗糙ヲ覺ルア  
 リ或ハ平常患苦微ニノ殆之ヲ忘レ凡偶頸ヲ努  
 カシ冷氣ニ觸レ温熱ニ遇ヒ或ハ誤テ刺衝物ヲ  
 食スルキハ腺腫急増シ患苦忽加ハルアリ總テ  
 長ク替留スレハ腺質逾硬腫シ時ニ小膿囊破潰



スレ他部依然ト硬腫ノ大ニ快ヲ得ルニ足ラ  
ス此病ハ大抵交感症ヲ發セス唯粘液膜ノ嫩衝  
蔓ル片ハ歐斯荅幾烏私管鼻ノ後口或ハ喉頭ヲ  
侵ストアル

治法 患處濃紅色ナル者ニハ緩和含漱劑其色淡  
紅或ハ灰白ナル者ニハ明礬神功石刺多尼ノ如  
キ收斂藥ヲ塗劑注射法含漱劑トシ用ヒ頑固症  
ニハ消酸銀ノ搽劑沃胃謨丁幾ノ外用モ佳凡慢  
性症ノ時々發動スル者ハ景况ニ應ノ急性症ノ  
治法ヲ斟酌シ施スヘシ撰方左ノ如シ

第一方

加密列油一 舍電發謨阿芙蓉液一

右調和擦頸圍

第二方

消酸銀一 蒸餾水半

右溶和以羽筆塗敷

第三方

明礬二 蒸餾水六

右溶和為含漱劑

第四方



錦葵葉三

撒尔非亞葉一

右調和分取少許煮為含漱劑

○壞疽性扁桃核炎初起患部紅腫シ繼テ灰白色ノ薄膜ヲ生シ其膜漸厚ク漸廣ク其色亦變メ褐色或ハ黒色ト為ル斯假膜剥脱スル片ハ下層粘液膜赤爛ノ流血シ或ハ潰瘍状ト為テ邊緣綠色底面醜穢ニノ敗血漿ヲ滲出ス俱其假膜ハ隨テ除ケハ隨テ復生スルナリ其他頸腺下顎腺腫脹シ口臭惡ク吐涎甚シ全體ノ症状ハ流行病性ト患者稟質ニ由テ差ヘリト雖此大率初起惡寒

發熱失味疲勞四肢疼痛戰寒衄血腦ノ所患或ハ嘔吐下利顔面赤腫皮膚羅斯等ヲ發ス熱勢漸増加シテ後轉メ虚性ニ陥リ煩躁譫言嗜眠細脈浮吸不利衄血綿々肌熱灼クカ如ク或ハ脱汗ヲ發ス其惡性ノ者ハ患部未大ニ損セサルニ患者既ニ死シ其治ニ趣ク者ハ第二週三週ノ頃ニ熱勢減シ口臭退キ假膜漸薄ク遂ニ全ク消滅シ粘液膜ニ潰瘍ヲ生セル者モ亦共ニ治癒ス此病ハ又齦肉唇舌頰ノ裏面咽頭後側等ニ發スルアリ

治法 局處劑ヲ主トス頻ニ含漱劑注射法ヲ行テ



患部ヲ清刷シ假膜剥脱セハ勉テ咯洩セシムヘシ  
 輕症ニハ甘草、乾食鹽、蓬沙、白糖類ノ摻劑、緩慢  
 症ニハ明礬、刺多尼、丁幾ノ如キ收斂藥ノ搽劑、摻  
 劑劇症ニハ消酸銀水、塩酸ノ如キ峻力防腐劑ヲ  
 施スヘシ、但扁桃核劇ク腫脹シ假膜亦厚キ時ハ  
 腐藥ヲ施スニ臨テ先、乱刺法ヲ行フヲ称ス而諸  
 症輕快ニ向フ片ハ復、緩性收斂劑、清刷注射法ニ  
 却回シ潰瘍アリテ治癒遅々スル片ハ緩性腐藥  
 或ハ明礬、撒兒末、尔扶斯、膽礬ノ如キ固性收斂藥  
 ヲ取テ時々其部ニ摻スヘシ此病ハ内服劑ヲ要

トセス輕症ニ於テハ特ニ然リ然氏他器臟ニ合  
 併病アル片ハ應當ノ劑ヲ以テ速ニ之ヲ驅リ、焮  
 衝性ノ熱勢劇キ時ハ刺絡、下劑、甘草ノ類ヲ處シ  
 粘液過多ニ滲沁ノ壅塞セル時ハ吐劑ヲ與ヘ俄  
 ニ虛脱症、神經症發スル時ハ規尼涅、機那、塩酸剥  
 苔斯、葡萄酒、亞的兒、麝香、龍腦、鑛酸類ヲ撰用シ刺  
 戟收斂性、皮膚洗法醋、格魯林ノ類ニテ製スヲ兼施スニ宜シ  
 緩慢症ニハ機那、沃胃、謨加里ノ内服ヲ佳トス佛  
 郎舶来ノ亞炭酸曹達ハ此病ニ普通ノ奇藥ト称  
 スレ氏斯ク異功ヲ奏スルナシ撰方左ノ如シ



第一方

吐根浸

以半至一匙製者

遇尔托根舍利別

右調和每十密扭篤與一匙布匙至得吐

第二方

撒尔非亞葉

蕪格爾需謨葉

各半

浸熱湯

適宜瀝取六勺加次藥

塩酸

半一匙

桑椹舍

利別

二

右調和為含漱劑

第三方

菩提樹花水

默栗薩水

單方桂皮水

各半

水製機那越幾斯

右調和每一時與一匙布匙或一食匙

第四方

塩酸剥荅斯

半一匙至

亞刺比亞護謨漿

一

燕鰯水

六

右調和每服一匙布匙或一食匙日三次至六次





