

儒門事親

醫家

原 文 閣 內	
番 號	漢 12481
冊 數	5 (1)
函 號	300 222

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© Kodak, 2007 TM: Kodak

C Y M





新鐫儒門事親叙

淺草文庫

氣之塊然乎太虛之間也。氤氳摩盪以
生生萬物。而其稟之駁者。為禽獸。為艸木。
粹者為人。而其粹者。亦有厚薄強弱之不
同。加之。六氣沴乎外。七情侵乎內。而諸疾
生焉。有寒有熱。有表有裏。千狀萬證。不可

儒門事親

信門事類
具述。而要之。不過虛實二者之間焉。故經
曰。虛則補。實則瀉。嗚呼。虛實者。診病之標
的。而補瀉者。施治之大要也哉。長沙以還。
明哲輩出。家擅專門。人立異見。諸說匆匆。
多岐。至若張戴人。薛立齋之學之術。
可謂百世之宗師矣。而究其設施之方。則

戴人偏於瀉。而立齋偏於補。既有所偏。則
不能無弊。苟不能無弊。則又不可無辨焉。
予竊謂二君之術。一補一瀉。雖有不同。而
各極其至。庶乎聖之功。亦莫以加焉。然天
下之病。未必盡實。則其偏於瀉也。吾恐虛
者之反受其害也。未必盡虛。則其偏於補

也。吾恐實者之亦反受其害也。一得一失。明於此而暗於彼。此豈斯道之大成哉。若長沙則不然。可以補則補。而不偏於補。可以瀉則瀉。而不偏於瀉。虛實隨證。補瀉應機。嗚呼。亦可謂大成矣。擬諸古之聖賢。二君之於長沙。猶夷惠之於孔子也。益補瀉

之不可偏廢。猶裘葛之不可一施也。而今不覈虛與實。而致補瀉之各偏。猶不審冬夏之異候。而欲偏裘葛之御也。豈其理也哉。故曰。少陰病。下利清穀。裏寒外熱者。通脈四逆湯主之。又曰。少陰病。自利清水。色純青者。宜大承氣湯。補瀉不可偏廢也。可

見矣。方今之世。好補而惡瀉。喜溫而畏寒。大黃芩硝。視如蛇蠍。乾薑附子。甘如飴蜜。遇硝黃奏効。則曰此惟取一時之快。後必致寒中之患。薑附鎔投。則曰薑附猶不驗。歸之於命。蓋亦不思之甚也。故凡治療之書。偏於補者。盛行于世。而梨棗日廣。至于

戴人此書。傳誦甚罕。予竊恐童蒙學醫者。咕呶偏補之書。而不講實瀉之方。則虛虛實實。其弊將有不可勝言者。乃鳩工壽梓。以廣其傳。惟冀此書與立齋之書。並行于世。可以瀉則師戴人。可以補則師立齋。無致補瀉之偏勝。使斯民同躋于仁壽之域。

矣

正德辛卯八月望日渡邊榮元安甫書于

洛陽松下睡鶴軒

此書之序也。其言曰。予嘗讀此書。感其言。而思其意。夫醫者。所以救世也。而世之為醫者。往往以名譽為事。而不以仁心為懷。此書之序。其言曰。醫者。所以救世也。而世之為醫者。往往以名譽為事。而不以仁心為懷。此書之序。其言曰。醫者。所以救世也。而世之為醫者。往往以名譽為事。而不以仁心為懷。

重刊儒門事親序

是書也。戴人張子和專為事親者。著論議淵微。調攝有法。其術與東垣丹溪並傳。名書之義。蓋以醫家與旨。非儒不能明。藥品酒食。非孝不能備也。故曰為人子者。不可不知醫。予幼失怙。慈親在堂。踰七望。入滌髓。既具。未嘗不防。以藥物每慮當有所饋。委之時。醫恐為盡道之累。將欲遍閱方書。諸家著述。繁雜竊為是。皇皇者數載矣。近得是書。如獲寶璐。執是以証。何慮臆說之能惑。惜其板久失傳。本多亥豕之訛。因付儒醫聞忠。較訂。復梓。與世之事親者共云。

嘉靖辛丑三月戊子復元道人邵輔序

儒門事親序畢

儒門事親後序 跋

醫道之大尚矣其上醫國其下醫人而身之所繫抑豈小哉觀抱樸子之金櫃肘後其用心以亦精矣功亦溥矣久矣邵君柏崖以至牒之親存以于天下後世乃以是書命愚機之壽諸梓以廣其傳功豈在抱樸子下哉愚不學恐成後人之誚幸栢崖之去然日夜是懼不敢語盡以力至於根徹鄙奧劇謬辯非尚俟後之君子嘉靖十九年歲次庚子孟冬朔日錢唐者相聞忠機于南圃陋室中

儒門事親卷中
 卷之十一 平效大烈下五冬時日分
 本林有精與陳醫獄非商於野文
 人之能幸於世之去水自交其
 高林以觀其野以立其味卷下
 亦與矣又矣醫臣林
 且小者應時味下之金醫臣
 後序畢

儒門事親論方目錄

卷之一

- 七方十劑繩墨訂一
- 指風痺痿厥近世差互說二
- 立諸時氣解利禁忌三
- 瘡非脾寒及鬼神辯四
- 小兒瘡疔丹標癭瘡舊蔽記五
- 婦人赤白帶下錯分寒熱解六
- 霍亂吐瀉死生如反掌說七
- 目疾頭風出血最急說八

卷之二

過愛小兒友害小兒說九
服藥一差轉成他病誠才

卷之二

嗽入赤白帶下論全表熱論六

偶有所遇厥疾獲瘳記才四五

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

汗下吐三法該盡治病詮十三

凡在上者皆可吐式十四

凡在表者皆可吐式十五

凡在下者皆可下式十六

推原補法利害非輕說十七

卷之一

口眼喎斜是經非竅說十八
痼本肝經宜通勿塞狀十九
五虛五實攻補懸絕法二十

卷之三

喉舌緩急砭藥不同解二十一

五積六聚治同鬱斷二十二

凡十膈五噎浪分支派疏二十三

飲當去水溫補轉劇論二十四

嗽分六氣母拘以寒述二十五

九氣感疾更相為治衍二十六

卷之四

三消之說當從火斷二十七

蟲慝之生濕熱為主訣二十八

補論二十九

水解論三十

風下

濕三

燥五

解利傷寒七

痺九

卷之四

卷之三

火四

寒六十

中風八

痿十

厥十三

瘡十三

疔痢十五

下痢膿血十七

痔漏腫痛十九

大便澁滯二十一

酒食不消二十三

沉積水氣二十五

骨蒸熱勞二十七

上喘中滿二十九

癩十二

泄痢十四

臟毒下血十六

水泄十八

霍亂吐瀉二十

小便淋瀝二十二

酒食所傷二十四

諸積不化二十六

虛積二十八

一切涎嗽三十

咳嗽三十一	咳逆三十二
風痰三十三	咯血欬血三十四
消渴三十五	雷頭風三十六
頭痛不止三十七	兩目暴赤三十八
目腫三十九	病目經年四十二
風衝泣下四十一	風蛀牙疼四十二
口瘡四十三	喉閉四十四
瘦四十五	背疽四十六
療癰四十七	便癰四十八
惡瘡四十九	下疳五十

卷之五

瘡癰瘤腫五十一	瘡腫丹毒五十二
凍瘡五十三	金瘡五十四
誤吞銅鐵五十五	魚刺菱芒五十六
蛇虫所傷五十七	杖瘡五十八
禁蝎五十九	落馬墜井六十
腰膝疼痛六十三	頭風眩暈六十四
經血暴下六十五	赤白帶下六十六
月事不來六十七	婦人無子六十八
小產六十九	大產七十

產後心風七十一 乳汁不來七十二
 產後潮熱七十三 乳癰七十四
 妊娠大小便下利七十五 雙身傷寒七十七
 妊娠病虛七十六 懷身入難七十九
 身重瘖瘖七十八 牙疳八十一
 眉煉八十 丹藩八十三
 夜啼八十二 身瘦肌執八十五
 疳眼八十四 大小便不利八十六
 久瀉不止八十七 通身浮腫八十八

發驚潮搐八十九 拗哭不止九十
 身熱吐下九十一 風熱涎嗽九十二
 水瀉不止九十三 瘡疥風癬九十四
 甜瘡九十九 白禿瘡九十六
 瘡疾不愈九十七 腫痛氣刺九十八
 赤瘤丹腫九十九 瘡疱癩疹一百

卷之六

十形三療目錄

風形

因驚風搐一

風搐反張二

傷風事類

殞泄三
因風鼻塞四

風痰五
癩六

手足風裂七
胃脘痛八

搖擗九
面腫風十

驚風十一
風溫十一

風水十三
小兒風水十四

腎風十五
勞風十六

中風十七

暑形

中暑十八
瘡瘡十九

火形

馬刀二十二
項瘡二十一

伐指痛二十二
癩癧二十三

咽喉腫痛二十四
舌痛二十五

腰膝痛二十六
狂二十七

痰厥二十八
滑泄乾嘔二十九

笑不止三十
膈食中滿三十一

目盲三十二
小兒悲哭不止三十三

小兒手足搖三十四
目赤三十五

熱形

諸明事類

錄

六

沙石淋三十六	膏淋三十七
二陽病三十八	小兒面部赤腫三十九
頭熱痛四十	勞嗽四十一
勞嗽咯血四十二	吐血四十三
嘔血四十四	因藥燥熱四十五
肺癰四十六	痿四十七
口瘡四十八	虛勞四十九
心痛五十	傷寒極熱五十一
失笑五十二	赤目五十三
目蒙五十四	痘後嘔吐五十五

卷之三

熱厥頭痛五十六	產後喘五十七
血崩五十八	婦人二陽病五十九
月閉寒熱六十	惡寒實熱六十一
遇寒手熱六十二	嘔逆不食六十三
瘞癰六十四	牙疼六十五
淋六十六	口臭六十七

濕形

疝六十八	水疝六十九
留飲七十	黃痺七十一
黃病七十二	病發黃七十三

水腫七十四 涌水七十五

停飲腫滿七十六 濕痺七十七

屈膝有聲七十八 白帶七十九

溫嗽八十 瀉是八十一 濕癬八十二

溫慝瘡八十三 泄瀉八十四

洞泄八十五 大便少而頻八十六

暑泄八十七 腹滿面腫八十八

卷之七

燥形

臂麻不便八十九 大便燥結九十

孕婦便結九十一 偏頭痛九十二
腰脊痛九十三

寒形

因寒腰強九十四 寒疝九十五

感風寒九十六 凍瘡九十七

寒痰九十八 瀉痢惡寒九十九

內傷形

因憂結塊一百 病怒不食一百一

不寐一百二 驚一百三

兒寐不寤一百四 孕婦下血一百五

傷寒雜病類編

收產損胎一百六

懷恐脇痛一百七

背疽一百八

肺癰一百九

咽中刺塞一百十

誤吞物咽中一百十一

腸刺下血一百十二

水腫畢丸一百十三

伏驚一百十四

外傷形

孕作病治一百十五

杖瘡一百十六

落馬發狂一百十七

太陽脛腫一百十八

足閃胸痛一百十九

膝胸鼓行一百二十

杖瘡入水一百二十一

卷之八

內積形

傷冷酒一百二十二

心下沉積一百二十三

茶癖一百二十四

腹脹水氣一百三十五

疝氣一百二十六

胸膈不利一百二十七

冷積一百二十八

積塊一百二十九

肥氣積一百三十

伏瘕一百三十一

停飲一百三十二

積氣一百三十三

沉積疑胎一百三十四

是胎非積一百三十五

外積形

瘤一百三十六

膠瘤一百三十七

瘦一百三十八

痔一百三十九

卷之九

雜記九門

誤中涌法

嗽

疥

赤目

感風寒

誤中寒涼

經閉

下血

痢

臨變不惑

當禁不禁

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

病愈犯禁而死

涌嗽

不可忌口

高技常孤

群言難正

病人負德愈後吝財

病人負德愈後吝財

謗三法

謗峻藥

同類妬才

群口誣戴人

卷之十

撮要圖

四因氣動

五鬱風暑濕燥寒主病

六氣主治

五氣風暑濕燥寒主治

大寒初氣至終氣小雪為病

十二經是動為病

風暑濕火燥寒六淫為病并治

六門病治諸方

卷之十一

內經濕變五泄 金櫃十全之法

金櫃十全五泄後論已述之圖以校為篇法

卷之十一

治法雜論

風論 論火熱二門 濕熱門

風門 濕門 寒門

內傷 外傷治法 婦人風門

火類門 濕門 寒門

半產 小兒風門 二火類

卷之十二

三法六門

吐劑

三聖散

瓜蒂散

獨聖散

稀涎散

蔚金散

茶調散

獨仙散

碧雲散

常山散

汗劑

通聖散

雙解散

浮萍散

麻黃散

升麻湯

桂枝湯

下劑

目錄

目錄

三

備門事類
目錄

丁時導水丸

禹功散

通經散

神祐丸

琥珀丸

益腎散

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

玉井散

水煮桃紅丸

無憂散

泄水散

牛黃通膈丸

四生丸

內托散

藏用丸

神芎丸

進食丸

牛黃白朮散

玉燭散

三和湯

丁香化癖散

三六抵當湯

十棗湯

除濕丹

利膈丸

三承氣湯

握宣丸

人參補肺散

白木湯

薏苡仁湯

益黃湯

香連丸

火門

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心湯

八正散

調胃散

三黃丸

芍藥皮丸

大金花丸

清涼飲子

黃連清心湯

犀角散

黃連木通丸

身月百

目錄

七

傷門事類
目錄

燥門

神功丸

麻仁丸

寒門

薑附湯

二薑湯

六門 大已寒丸

平胃散

兼治於內者

大柴胡湯

脾約丸

潤體丸

三黃丸

四逆湯

木附湯

理中丸

養脾丸

益壽膏

小柴胡湯

柴胡飲子

白木湯

兼治於外者

桂苓湯

升麻湯

青金散

獨治於內者

陷胸湯

備急丸

蓮殼散

防風當歸飲子

麻黃湯

五積散

黃連丸

黃芩丸

大黃丸

枳殼丸

木香檳榔丸

導飲丸

四物湯

又方

定志丸

小檳榔丸

獨治於外者

青金散

水澄膏

金絲膏

赴筵散

五香連翹散

當歸散

葛根散

檳榔丸

瞿麥散 治氣積方

敗毒散

魚膽丸

生肌散

麝香玉線子

人參化瘦丹

通氣丸

又方

消毒散

煮肝散

枯瘤散

小黃膏

刀箭藥

木香檳榔散

陽起石散

卷之十三 鉛白霜散

雄黃散

化斑湯

調治

無比山藥丸

當歸丸

香薷湯

石葦散

妙功丸

人參散

茴香丸

七宣丸

人參調中湯

烏金散

沉香降氣丹

卷之十三

劉河間先生三消論

猪肚丸

葛根丸

胡粉散

人參散

卷之十四

扁鵲華陀察聲色定死生訣要

病機

卷之十五

世傳神効諸方目錄

瘡瘍癰腫第一

口齒咽喉第二

眼目疾證第三

頭面諸疾第四

解利傷寒第五

腰脚疼痛第六

婦人雜病第七

咳嗽痰喘第八

心氣刺痛第九

小腸疝氣第十

腸風下血第十一

小兒病證第十二

破傷風邪第十三

陰毒傷寒帶附

此詩
船來
今共
關須
後考

儒門事親

目錄

卷之

諸風疾證第十四 小腫第十五

下痢第十六 雜證方藥第十七

閉穀諸藥第十八 小兒疳積第十九

太醫先生辭世詩仍附于後

諸風疾證卷之

下痢卷之

閉穀諸藥卷之

太醫先生辭世詩卷之

卷之

儒門事親論方目錄

儒門事親卷之二

戴人張子和著

新安吳勉學校

七方十劑繩墨訂

方有七劑有十舊矣雖有說者辯其名而已敢申昔

人已病之意而為之訂夫方者猶方術之謂也易曰

方以類聚是藥之為方類聚之義也或曰方謂五方

也其用藥也各據其方如東方瀕海鹵斥而為灘場

西方陵居華食而多頽腫贅癭南方瘴霧卑濕而多

痺疝北方乳食而多藏寒滿病中州食雜而多九疳

儒門事親

卷之二

食癆中滿留飲吐酸腹脹之病蓋中州之地土之象也故脾胃之病最多其食味居處情性壽夭兼四方而有之其用藥也亦雜諸方而療之如東方之藻帶南方之丁木西方之薑附北方之參苓中州之麻黃遠志莫不輻輳而參尚故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用劑者和也方者合也故方如瓦之合劑猶羹之和也方不對病則非方劑不盡疾則非劑也七方者大小緩急奇偶復也十劑者宜通補瀉輕重滑澀燥濕也
漢人氏子
夫大方之說有二有君一臣二佐九之大方有分兩

大而頓服之大方蓋治肝及在下而遠者宜頓服而數少之大方病有兼證而邪不專不可以一二味治者宜君一臣二佐九之大方王太僕以人之身三折之上爲近下爲遠近爲心肺遠爲腎肝中爲脾胃胞臚膽亦有遠近以予觀之身半以上其氣三天之分也身半以下其氣三地之分也中脘人之分也又手之三陰陽亦天也其氣高足之三陰陽亦地也其氣下戊巳之陰陽亦人也其氣猶中州故肝之三服可併心之七服腎之二服可併肺之七服也
小方之說亦有二有君一臣二之小方有分兩微而

壽月事見

卷之二

二

頻服之小方蓋治心肺及在上而近者宜分兩微而少服而頻之小方徐徐而呷之是也病無兼證邪氣專可一二味而治者宜君一臣二之小方故腎之二服可分為肺之九服及肝之三服也
 緩方之說有五有甘以緩之之緩方糖蜜棗葵甘草之屬是也蓋病在胸膈取甘能戀也有丸以緩之之緩方蓋丸之比湯散其氣力宜行遲故也有品件群眾之緩方蓋藥味衆則各不得騁其性也如萬病丸七八十味通相拘制也有無毒治病之緩方蓋性無毒則功自緩矣有氣味薄藥之緩方蓋藥氣味薄則

長於補上治上比至其下藥力已衰故補上治上制之以緩緩則氣味薄也故王太僕云治上補上方若迅急則上不任而迫走於下制緩方而氣味厚則勢與急同

急方之說有五有急病急攻之急方如心腹暴痛兩陰溲便閉塞不通借備急丹以攻之此藥用不宜恒蓋病不容候也又如中風牙關緊急漿粥不入用急風散之屬亦是也有湯散蕩滌之急方蓋湯散之比丸下咽易散而施用速也有藥性有毒之急方蓋有毒之藥能上涌下泄可以奪病之大勢也有氣味厚

藥之急方藥之氣味厚者直趨於下而氣力不衰也
 故王太僕云治下補下方之緩慢則滋道路而力又
 微制急方而氣味薄則力與緩等
 奇方之說有二有古之單方之奇方獨用一物是也
 病在上而近者宜奇方也有數合陽數之奇方謂一
 三五七九皆陽之數也以藥味之數皆單也君一臣
 三君三臣五亦合陽之數也故奇方宜下不宜汗
 偶方之說有三有兩味相配之偶方有古之復方之
 偶方蓋方之相合者是也病在下而遠者宜偶方也
 有數合陰陽之偶方謂二四六八十也皆陰之數也

君二臣四君四臣六亦合陰之數也故偶方宜汗不
 宜下

復方之說有一方有二方三方相合之復方如桂枝
 越婢一湯如調胃承氣湯方芒硝甘草大黃外參以
 連翹薄荷黃芩梔子以為涼膈散是本方之外別加
 餘味者皆是也有分兩均劑之復方如胃風湯各等
 分是也以内經攷之其奇偶四則反以味數奇者為
 奇方味數偶者為偶方下復云汗者不以奇下者不
 以偶及觀仲景之制方桂枝湯汗藥也反以三味為
 奇大承氣湯下藥也反以四味為偶何也豈臨事制

疑二

醫門事類

卷之二

四

傷風專論 卷之一
宜復有增損者乎攷其大旨王太僕所謂汗藥如不以偶則氣不足以外發下藥如不以奇則藥毒攻而致過必如此言是奇則單行偶則併行之謂也急者下本易行故宜單汗或難出故宜併蓋單行則力孤而微併行則力齊而大此王太僕之意也然太僕又以奇方爲古之單方偶爲復方今此七方之中已有偶又有復者何也豈有偶方者二方相合之謂也復方者二方四方相合之方歟不然何以偶方之外又有復方者歟此復字非重複之復乃反復之復何以言之蓋內經旣言奇偶之方不言又有重複之方惟

二云奇之不去則偶之是爲重方重方者卽復方也下又云偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也由是言之復之爲方反復亦不遠內經之意也所謂宣劑者俚人皆以宣爲瀉劑抑不知十劑之中已有瀉劑又有言宣爲通者抑不知十劑之中已有通劑舉世皆曰春宜宣以爲下奪之藥抑不知仲景曰太法春宜吐以春則人病在頭故也况十劑之獨不見通劑豈非宣劑卽所謂通劑者乎內經曰以者因而越之木鬱則達之宣者升而上也以君召臣曰宣義或同此傷寒邪氣在上宜瓜蒂散頭痛葱

根莖豉湯傷寒懊懺宜梔子豉湯精神昏憤宜梔子厚朴湯自瓜蒂以下皆湧劑也乃仲景不傳之妙今人皆作平劑用之未有發其秘者予因發之然則為涌明矣故風瀉中風胸中諸實痰飲寒結胸中熱蔚化上上而不下久則嗽喘滿脹水腫之病生焉非宜劑莫能愈也

所謂通劑者流通之謂也前後不得澉便宜木通海金沙大黃琥珀八正散之屬裏急後重數至圍而不便宜通因通用雖通與瀉相類大率通為輕而瀉為重也凡痺麻蔚滯經隧不流非通劑莫能愈也

所謂補劑者補其不足也俚人皆知山藥丸鹿茸丸之補劑也然此乃衰老下脫之人方宜用之今往往於少年之人用之其舛甚矣古之甘平甘溫苦溫辛溫皆作補劑豈獨硫黃天雄然後為補哉况五臟各有補瀉肝實瀉心肺虛補腎經曰東方實西方虛瀉南方補北方大率虛有六表虛裏虛上虛下虛陰虛陽虛設陽虛則以乾薑附子陰虛則補以大黃硝石世傳以熱為補以寒為瀉訛非一日豈知酸苦甘辛鹹各補其臟內經曰精不足者補之以味善用藥者使病者而進五穀者真得補之道也若大邪未去左

滿方悶心火方實腎水方耗而驟言鹿茸附子庸詎知所謂補劑者乎
 所謂瀉劑者泄瀉之謂也諸痛為實痛隨利減經曰實則瀉之實則散而瀉之中滿者瀉之於內大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也惟巴豆不可不慎焉蓋巴豆其性燥熱毒不去變生他疾縱不得已而用之必以他藥制其毒蓋百千證中或可一二用之非有暴急之疾大黃牽牛甘遂芒硝足矣今人往往以巴豆熱而不畏以大黃寒而反畏庸詎知所謂瀉劑者哉

所謂輕劑者風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜輕劑消風散升麻葛根之屬也故內經曰因其輕而揚之發揚所謂解表也疥癬痊癩宜解表汗以泄之毒以薰之皆輕劑也故桂枝麻黃防風之流亦然設傷寒冒風頭痛身熱三日內用雙解散及嚏藥解表出汗皆輕劑之云耳所謂重劑者鎮縋之謂也其藥則硃砂水銀沉香石黃丹之倫以其體重故也久病咳嗽涎潮于上咽喉不利形羸不可峻攻以此縋之故內經曰重者因而減之貴其漸也
 所謂滑劑者周禮曰滑以養竅大便燥結小便淋瀝

皆宜滑劑燥結者其麻仁郁李之類乎淋瀝者其葵子滑石之類乎前後不通者前後兩陰俱閉也此名曰三焦約也約猶束也先以滑劑潤養其燥然後攻之則無失矣

所謂澀劑者寢汗不禁澀以麻黃根防已滑泄不已澀以葶藶枯白礬木賊烏魚骨罌粟殼凡酸味亦同乎澀者收斂之意也喘嗽上奔以薑汁烏梅煎寧肺者皆酸澀劑也然此數種當先論其本以攻去其邪不可執一以澀便為萬全也

所謂燥劑者積寒久冷食已不飢吐利腥穢屈伸不

便上下所出水液澄徹清冷此為大寒之故宜用乾薑良薑附子胡椒輩以燥之非積寒之病不可用也若久服則變血溢血泄大枯大涸洩使痿闕聾鼓聵痿弱之疾設有久服而此疾不作者慎勿執以為是蓋疾不作者或一二誤死者百千也若病濕者則白朮陳皮木香防已蒼朮等皆能除濕亦燥之平劑也若黃連黃蘗梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此內經之本旨也而世相違久矣嗚呼豈獨薑附之儔方為燥劑乎所謂濕劑者潤濕之謂也雖與滑相類其間少有不

同內經曰辛以潤之蓋辛能走氣能化液故也若夫
硝性雖鹹本屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯
涸皺揭之病非獨金化為然蓋有火以乘之非濕劑
莫能愈也

指風痺痿厥近世差玄說二

風痺痿厥四論內經言之詳矣今余又為之說不亦
贅乎曰非贅也為近世不讀內經者指其差玄也夫
風痺痿厥四證本自不同而近世不能辨一槩作風
冷治之下虛補之此所以曠日彌年而不愈者也夫
四末之疾動而或勁者為風不仁或痛者為痺弱而

不用者為痿逆而寒熱者為厥此其狀未嘗同也故
其本源又復大異風者必風熱相兼痺者必風濕寒
相合痿者必火乘金厥者或寒或熱皆從下起今之
治者不察其源見其手足痺曳便謂之風然左傳謂
風淫末疾豈不知風暑燥濕火寒六氣皆能為四末
之疾也哉敢詳條于左有意於救物者試擇焉可也
夫風之為狀善行而數變內經曰諸風掉眩皆屬肝
木掉搖眩運非風木之象乎紆曲勁直非風木之象
乎手足掣顛斜目喎口筋急攣搐癱凝驚癩發作無
時角弓反張甚則吐沫或泣或歌喜怒失常頓僵暴

什昏不知入茲又非風木之象乎故善行而數變者
皆是厥陰肝之用也夫肝木所以自甚而至此者非
獨風爲然蓋肺金爲心火所制不能勝木故也此病
之作多發於每年十二月大寒中氣之後及三月四
月之交九月十月之交何以言之大寒中氣之後厥
陰爲主氣已亥之月亦屬厥陰用事之月皆風生之
時也故三月四月之交多疾風暴雨振拉摧拔其化
爲水雹九月十月之交多落木發屋之變故風木鬱
極甚者必待此三時而作凡風病之人其脉狀如弓
弦而有力豈敢以熱藥挽之更增其勢哉今人論方

者偶得一方間曾獲効執以爲能著矣施鍼豈由病
者巧說病人使從已法不問品味剛柔君臣輕重何
歲何輕何部何氣凡見風證偏枯口眼喎斜涎潮昏
憤便服靈寶至寶清心續命等藥豈知清心之雜以
薑桂靈寶之亂以起石硫黃小續命湯歲以附子惟
夫至寶其性尚溫經曰風淫於內治以辛涼如之何
以金石大熱之藥以治風耶有以熱治熱者之爲
甚其可再乎故今之劉河間自制防風通聖散搜風
丸之類程叅政祛風丸換骨丹用之者獲効者多矣
而謗議百出以証其實余嘗見內經氣交變論中言

五鬱之法鬱極則為病况風病之作倉卒之變生嘗
治驚風癇病屢用汗下吐三法隨治隨愈內經中明
有此法五鬱中木鬱達之者吐之令其條達也汗者
是風隨汗出也下者是推陳致新也此為汗下吐三
法也愈此風病莫知其數如之何廢而不用也余恐
來者侮此法故表而出之昔項開完顏氏風病搖先
右臂并右足約搖六七十數良久左臂并左足亦搖
六七十數不瘥兩目直視昏憤不識入幾月餘求治
于余先逐其寒痰三四升次用導水禹功丸散泄二
十餘行次服通聖散辛涼之劑不數日而瘥故書此

以證之

夫痺之為狀麻木不仁以風濕寒三氣合而成之故
內經曰風氣勝者為行痺風則陽受之故其痺行且
劇而夜靜世俗莫知反呼為走注疼痛虎咬之疾寒
氣勝者為痛痺寒則陰受之故其痺痛且靜而夜劇
世俗不知反呼為鬼忤濕氣勝者為著痺濕勝則筋
脉皮肉受之故其痺著而不去肌肉削而著骨世俗
不知反呼為偏枯此疾之作多在四時陰雨之時及
三月九月太陽寒水用事之月故草枯水寒為甚或
瀕水之地勞力之人辛苦失度觸冒風雨寢處津濕

痺從外入况五方七地寒暑殊氣剛柔異稟飲食起居莫不相矣故所受之邪各有淺深或痛或不痛或仁或不仁或筋屈而不能伸或引而不能縮寒則蟲行熱則縮緩不相亂也皮痺不已而成肉痺肉痺不已而成脉痺脉痺不已而成筋痺筋痺不已而成骨痺久而不已內舍其合若臟腑俱病雖有智者不能善圖也凡病痺之人其脉沉澁今人論方者見諸痺證遽作脚氣治之豈知內經中本無脚氣之說或曰諸方亦有脚氣統論又有脚氣方藥若止取素問則諸方皆非即曰痺病以濕熱為源風寒為蕪三氣合而

為痺奈何治此者不問經絡不分臟腑不辨表裏便作寒濕脚氣烏之附之乳之沒之種種燥熱攻之中腕灸之臍下燒之三里火之蒸之熨之湯之炕之以至便旋澁滯前後俱闕虛燥轉甚肌膚日削食飲不入邪氣外侵雖遇扁華亦難措手若此者何哉胸膈間有寒痰之故也痺病本不死死者醫之誤也雖亦用蒸之法必先涌去其寒痰然後諸法皆効內經曰五臟有俞穴六腑有合穴循脉之本分各有所發之源以砭石補之則痺病瘳此其內經中明白具載如之何不讀也陳下酒監魏德新因赴冬選犯寒而行

真氣元衰加之坐計冷濕食飲失節以冬遇此遂作
 骨痺骨屬腎也腰之高骨壞而不用兩膝似折面黑
 如炭前後痲痛痿厥皆作腎虛治之
 余先以玲瓏竈熨蒸數日次以苦劑上涌訖寒痰三
 二升下虛上實明可見矣次以淡劑使白朮除脾濕
 令茯苓養腎水青官桂伐風木寒氣偏勝則加薑附
 否則不加又刺腎俞太谿二穴二日一刺前後一月
 平復如故僕嘗用治傷寒汗下吐三法移為治風痺
 痿厥之法愈者多矣

痿之為狀兩足痿弱不能行用由腎水不能勝心火

心火上燥肺金肺金受火制六葉皆焦皮毛虛弱急
 而薄者則生痿躄躄者足不能伸而行也腎水者乃
 肺金之子也令腎水衰少隨火上炎腎主兩足故骨
 髓衰竭由使內太過而致然至真要大論云諸痿喘
 嘔皆屬於上者上焦也三焦者手少陽相火也痿喘
 嘔三病皆在膈上屬肺金之部分也故肌痺傳為脉
 痿濕痺不仁傳為肉痿髓竭足躄傳為骨痿房室大
 過為筋痿傳為白淫大抵痿之為病皆因客熱而成
 好以貪色強力過極漸成痿疾故痿躄屬肺脉痿屬
 心筋痿屬肝肉痿屬脾骨痿屬腎總因肺受火熱葉

焦之故相傳於四臟痿病成矣直斷曰痿病無寒故痿之作也五月六月七月皆其時也午者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發此三月之內以為熱也故病痿之人其脉浮而大今之行藥者凡見脚膝痿弱難於行步或一足不伸便作寒濕脚氣治之驟用烏附乳沒自然銅威靈仙之類燔針艾火湯煮袋蒸痿弱轉加如此而死豈亦天乎夫治痿與治痺其治頗異風寒濕痺猶可蒸湯灸燔時或一効惟痿用之轉甚者何也蓋以痿肺熱為本葉焦而成痿以此傳於五臟豈有寒者歟

若痿作寒治是不刃而殺之也夫痿病不死死者用藥之誤也陳下一武弁宋子玉因駐軍息城五六月間暴得痿病腰膝兩足皆不任用雙而不行求治于子察其兩手脉俱滑之而有力子憑內經火淫于內治以鹹寒以鹽水越其膈間寒熱宿痰新者為熱舊者為寒或宿食宿飲在上脘者皆可涌之宿痰既盡因而下之節次數十行覺神志日清飲食日美兩足漸舉脚膝漸伸心降腎升便繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心湯涼膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷之經曰治心肺之病最近用藥補不厭頻而少治

腎肝之病最遠用藥劑不厭頓而多此法人皆恠之
 然余治痿尋常用之如拾遺物予若以此誑入其如
 獲罪於天何此宋子王之證所以不得不書也且示
 信於來世故內經謂治痿之法獨取陽明經陽明經
 者胃脉也五臟六腑之海也主潤養宗筋宗筋主束
 骨束骨在臍下陰毛際上是也又主大利機關機關
 者身中大關節也以司曲伸是以陽明虛則宗脉縱
 宗脉縱則大脉不伸兩足痿弱然取陽明者則脉也
 胃為水穀之海人之四季以胃氣為本本固則精化
 精化則髓充髓充則足能履也陰陽應象論曰形不

胃氣

足者温之以氣精不足者補之以味味者五味也五
 味調和則可補精益氣也五味五穀五菜五果五肉
 五味貴和不可偏勝又曰恬淡虛無真氣從之精神
 內守病安從來若用金石草木補之者必久而增氣
 物化之常氣增而久天之由也所以久服黃連苦參
 者而反化為熱久服熱藥之人可不為寒心哉余嘗
 用汗下吐三法治風痺痿厥以其得効者衆其敢誣
 於後人乎
 厥之為狀手足及膝下或寒或熱也舉世傳脚氣寒
 濕之病豈知內經中無脚氣之說王大僕亦云本無

脚氣後世廣飾方論而立此名古之方謂厥者卽今所謂脚氣者也然厥當分二種次分五臟所謂二種者有寒厥亦有熱厥陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥熱厥爲手足熱也寒厥爲手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣勝足下熱陰氣勝足下寒又曰陽主外而厥在內陰主內而厥在外若此者陰陽之氣逆而上行故也夫春夏則陽多陰少秋冬則陰壯陽衰人或恃賴壯勇縱情嗜慾於秋冬之時則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽氣既衰真精又竭陽不榮養陰氣獨行故手足寒

發爲寒厥也人或醉飽入房氣聚於脾胃主行津液陰氣虛陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則四肢不榮酒氣與穀氣相薄則內熱而溺赤氣壯而慄悍腎氣既衰陽氣獨勝故手足熱發而爲熱厥也厥亦有令人腹暴滿不知入者或一二日稍知入者或卒然悶亂無覺知者皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脈不至也腎氣微少精血奔逸使氣促迫上入胸膈宗氣友結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相助令身不仁又五絡皆會於耳中五絡俱絕則令人身脉皆動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥有延

憲當作

如拽鋸聲在喉咽中為痰厥手足搐搦者為風厥因
醉而得之為酒厥暴怒而得之為氣厥骨痛爪枯為
骨厥兩足指戀急屈伸不得爪甲枯結為臂厥身強
直如椽者為肝厥喘而咳者狂走攀登為陽明厥皆
氣逆之所為也今人見茲厥者皆謂之或著掠著此
是何等語也非徒其名之謬因其名之謬而垂其實
也既言或著中著掠著必歸之風此清心靈寶至寶
又為先驅矣鼻中噴藥身上烘火豈知厥之為病如
前所說者耶頃西華李政之病寒厥其妻病熱厥前
後十餘年其妻服逍遙十餘劑終無寸効一日命余

診之二人脉皆浮大而無力政之曰吾手足之寒時
時漬以熱湯漬而不能止吾婦手足之熱終日以冷
水沃而不能已者何也余曰寒熱之厥也此皆得之
貪飲食縱嗜慾遂出內經厥論證之政之喜曰內經
真聖書也十餘年之疑今而釋然縱不服藥愈過半
矣僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上
者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分處二
藥令服之不輟不旬日政之請門謝曰寒熱之厥皆
愈矣其妻當不過數月而有娠何哉陰陽皆和故也
凡尸厥痿厥風厥氣厥酒厥可一涌而醒次服降心

醫門雜記

火益腎水通血和氣之藥使粥食調養無不瘥者若
其餘諸厥做此行之慎勿當疑似之間便作風氣相
去邈矣

立諸時氣解利禁忌式三

春之溫病夏之熱病秋之瘧及痢冬之寒氣及咳嗽
皆四時不正之氣也總名之曰傷寒人之勞役辛苦
者觸冒此四時風寒暑濕不正之氣遂成此疾人之
傷於寒也熱鬱於內淺則發早為春溫若春不發而
重感于暑則夏為熱病若夏不發而重感于濕則秋
變為瘧痢若秋不發而重感于寒則冬為傷寒故傷

寒之氣最深然而傷寒及溫熱但發必先發熱惡寒
頭項痛腰脊強者一日在太陽經故也內經中雖言
一日太陽者傳受常也亦有太陽證至了不傳者止
可汗之如升麻湯解肌湯逼毒散五積散之類發散
則愈也蓋病人熱甚更以辛溫則病必轉加今代劉
河間先生自製辛涼之劑以通聖益元散相合各五
七錢水中中椀入生薑十餘片葱鬚頭二十餘根荳
豉一撮同煎至五七沸去滓分作二服先以多半服
之頃以釵股於喉中探引盡吐前藥因其一涌脹理
開發汗出周身復將餘藥溫熱而服之仍以酸醋辛

棘漿粥投之可以立愈解利傷寒濕溫熱病治法有二天下少事之時人多靜逸樂而不勞諸靜屬陰雖用溫劑解表發汗亦可獲愈及天下多故之時勞惑失常師旅數興饑饉相繼賦役既多火化大擾屬陽內火又侵醫者不達時變猶用辛溫茲不近於人情也止可用劉河間辛涼之劑三日以裏之證十痊八九予用此藥四十餘年解利傷寒溫熱中暑伏熱莫知其數非爲術也將以證後人之誤用藥者也予嘗見世醫用升麻五積解利傷寒溫疫等病往往發狂譫語衄血泄血喘滿昏瞶懊懷悶亂勞復此數證非

傷寒便有此狀皆由辛溫之劑解之不愈而熱增劇以致然也凡解利傷寒時氣疫疾當先推天地寒暑之理以入參之南陲之地多熱宜辛涼之劑解之朔方之地多寒宜辛溫之劑解之午未之月多暑宜辛涼解之子丑之月多凍宜辛溫解之少壯氣實之人宜辛涼解之老者氣衰之人宜辛溫解之病人因冒寒食冷而得者宜辛溫解之因役勞冒暑而得者宜辛涼解之病人稟性怒急者可辛涼解之病人稟性和緩者可辛溫解之病人兩手脉浮大者可辛涼解之兩手脉遲緩者可辛溫解之如是之病不可一槩

而用偏熱寒涼反與辛溫皆不知變通者夫地有南北時有寒暑人有衰壯脈有浮沉劑有溫涼服有多少不可差玄病人禁忌不可不知昔有人春月病瘟三日之內以驢車載有餘里比及下車昏聩不知入數日而死又有人飲酒過傷內外感邪頭痛身熱狀如傷寒三四日間以馬馱還家六七十里到家百骨節皆痛昏憤而死此余親覩若此之類不容更述假如瘟病傷寒熱病中暑冒風傷酒慎勿車載馬馱搖撼頓挫大忌夫動者火之化靜者水之化也靜為陰動為陽陽為熱陰為寒病已內擾又復外擾是為至

擾奈人之神詎能當之故遠行得疾者宜舟泛牀擡無使外擾故病不致增劇又若傷寒時氣瘟病嘗六七日之間不大便心下堅硬腹脇緊滿止可大小承氣湯下之其腸胃積熱慎勿用巴豆杏仁性熱大毒之藥雖用一二九下之利五七行必反損陰氣涸枯津液燥熱轉增發黃譫語狂走斑毒血泄悶亂輕者為勞復重者或至死間有愈者幸矣不可以為法故傷寒新愈之人慎勿食猪魚雜果醞酒濕麵及沐浴房室事如犯病必再發愛其身者不可不慎又如正二三月人氣在上瘟疫大作必先頭痛或骨節疼與

傷寒時氣，自暑風濕及中酒之人，其狀皆相類，慎勿
 便用巴豆大毒之藥治之。元光春京師翰林應泰李
 屏山得瘟疫，證頭痛身熱口乾，小使赤澁，渠素嗜飲，
 醫者便與酒癥丸，犯巴豆利十餘行，次日頭痛諸病
 仍存。醫者不識，復以辛溫之劑解之，加之臥於暖炕，
 強食葱醋湯，圖獲一汗，豈知種種客熱，疊發併作，目
 黃斑生，潮熱血泄，大喘大滿，後雖有承氣下之者，已
 無及矣。至今議者紛紛，終不知熱藥之過，往往獨歸
 罪於承氣湯。用承氣湯者，不知其病已危，猶復用藥，
 學經不明，故也。良可罪也。然議者不歸罪於酒癥丸，

者亦可責也。夫瘟疫在表，不可下。况巴豆之丸乎？巴
 豆不已，况復發以辛溫之劑乎？必有仲尼方明治長
 之非罪，微生高之非直，終不肯以數年之功，苦讀內
 經，但隨衆好惡為之毀譽。若此者，皆妄議者也不真。
 知其理，遽加毀譽，君子之所不取。以予論之，凡傷寒
 之氣，有六禁：初病之時，甚似中酒，傷食者禁，大下之
 一禁也。當汗之時，宜詳時之寒暑，用衾衣之厚薄，禁
 沐浴之火坑，重被熱粥燔針，二禁也。當汗之時，宜詳
 解脈之遲數，用辛涼之劑，禁妄用熱藥，三禁也。當下
 之時，宜審詳證，下之藥，禁巴豆銀粉丸方，四禁也。遂

來之病人禁車載馬馱五禁也大汗之後禁雜食嗜
慾憂思作勞六禁也故凡有此者宜清房涼榻使不
受客熱之邪明牕皓室使身見斑出黃生之變病者
喜食涼則從其涼喜食溫則從其溫清之而勿擾休
之而勿勞可辛溫則辛溫解之可辛涼則辛涼解之
所察甚微無拘彼此欲水之人慎勿禁水但飲之後
頻與按摩其腹則心下自動若按摩其中腕又則必
痛病人獲痛復若有水結則不敢按矣止當禁而不
禁者輕則危重則死不當禁而禁者亦然今之士大
夫多為俗論先錮其心雖有正論不得而入參茸陸

象先嘗云天下本無事庸人擾之為煩耳余亦曰正
氣本亂庸醫擾之為劇耳

瘧非脾寒及鬼神辨四

夫瘧猶酷瘧之瘧也以夏傷酷暑而成瘧瘧也又有
瘧瘧連歲不已此肝經肥氣之積也多在左脇之下
狀如覆杯是為瘧瘧猶瘧也久而不已令人瘦也內
傷既以夏傷於暑而為瘧何後世之醫者皆以脾寒
治之世醫既不知邪熱畜積之深為寒戰遂為寒戰
感又不悟邪熱入而後出於表發為燥渴遂為交
爭所惑相傳以薑附硫黃平胃異攻散交解飲子治

傷字
疑經字
感疑惑
字

之百千之中幸其一効執以爲是至使父子弟兄相
傳及其瘡之甚者則歸之崇惟豈可不大笑耶內經
拘於鬼神者不可與言至德何世俗之愚而難化也
又或因夏日飲冷過常傷食生硬瓜果梨棗之屬指
爲食瘡此又非也豈知內經之論則不然夏傷於暑
遇秋之風因勞而汗玄府受風復遇悽愴之水風閉
而不出舍於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行
於陰邪熱淺則連日而作邪熱深則間日而作併入
於裏則熱併入於表則寒若此而論了不干於脾後
世論藥如此之差互也以時言之治平之時常瘡病

少擾攘之時常瘡病多治平之時雖用砒石辰砂有
毒之藥治之亦能取効緣治平之時其民夷靜故雖
以熱攻熱亦少後患至於擾攘之時其民勞苦不可
遽用大毒大熱之藥若以熱攻熱熱甚則轉爲吐血
泄血癰疽瘡瘍嘔吐之疾蓋擾攘之時政令煩亂徭
役紛冗朝戈暮戰畧無少暇內火與外火俱動在侯
伯官吏尤甚豈可與夷靜之人同法而治哉余親見
泰和六年丙寅征南師旅大舉至明年軍迴是歲瘡
癘殺入莫知其數昏瞶懊懣十死八九皆火之化也
次歲瘡病大作侯王官吏上下皆病輕者旬月甚者

彌年夫富貴之人勞心役智不可驟用砒石大毒之藥止宜先以白虎湯加入參小柴胡湯五苓散之類頓服立解或不愈者可服神祐丸減用神芎等甚者可大小承氣湯下之五七行或十餘行峻泄夏月積熱暑毒之氣此藥雖泄而無損於臟腑乃所以安臟腑也次以桂苓甘露散石膏知母湯大小柴胡湯人參柴胡飲子量虛實加減而用之此藥皆能治寒熱往來日晡發作與治傷寒其法頗同更不愈者以常山散吐之無不愈者余嘗用張長沙汗下吐三法愈瘧極多大忌錯作脾寒用暴熱之藥治之縱有愈者

後必發瘡疽下血之病不亦危余自先世授以醫方至于今日五十餘年苟不識練豈敢如是決也又嘗觀刺瘡論五十九刺一刺則衰再刺則去三刺則已會陳下有病瘡二年不愈者止服溫熱之劑漸至衰羸命予藥之余見其羸亦不敢便投寒涼之劑乃取內經刺瘡論詳之曰諸瘡不已刺十指間出血正當發時余刺其十指出血血止而寒熱立止咸駭其神余非術術竊見晚學之人不放誥典謬說鬼疾妄求符籙祈禱辟匿法外旁尋以致病人遷延危殆瘡病除嵐瘴一二發必死其餘五臟六腑瘡皆不死如

有死者皆方士誤殺之也或曰汝言瘡因於暑者春發之瘡亦傷暑乎余曰此瘡最深何哉暑伏於秋冬而不發至春始發此瘡之深者內經氣交變太論歲火大過炎暑流行金肺受邪啓玄子云火不以德邪害於肺金也故金肺先病以金氣不及故為病又經曰歲火太過大熱先發故民病瘡少氣欬喘血溢血注下溢燥耳聾中熱肩背熱上應熒惑星見則山澤燔燎雨乃不降燥石消金涸泉焦草火星大而明見注曰火無德令縱熱害金水復制心故心火自病熒惑見則酷法大故瘡常與酷吏之政並行或酷政行

于先而瘡氣應于後或瘡氣行於先而酷政應于後昔人有詩云大暑去酷吏此言雖不為醫設亦於醫巫之肯有以暗相符者也以前人論瘡者未嘗及于此故予發之及知聖人立瘡之名必有所謂云

小兒瘡疱丹標癭疹舊藏記五

兒之在母腹也胞養十月蘊畜濁惡熱毒之氣非一日及歲年而後發雖至貴與至賤莫不皆然輕者稀少重者稠密皆因胞胎時所感濁惡熱毒之氣有輕重非獨人有此疾凡胎生血氣之屬皆有蘊畜濁惡熱毒之氣有一二歲而發者有三五歲至七八歲而

作者有年老而發丹燦癩疹者亦有傷寒中溫毒而發癩者亦有陽毒發斑者斑有大小色有輕重大者為陰小者為陽均是熱也但色重赤者熱深色輕紅者熱淺凡治者輕者因而揚之重者因而減之內經曰少陽客勝則丹疹外發及為丹燦手少陽者三焦少陽相火也啓玄子云是五寅五申之歲即少陽相火司天故也他歲亦有之但內經獨明瘡疹者少陽相火之所為也俗呼曰毒疹傷寒此言却有理為此證時與傷寒相兼而行必先發熱惡寒頭項痛腰脊強從太陽傳至四五日燦疹始發先從兩脇下有之

出於脇肋次及身表漸及四肢故凡小兒瘡泡丹燦癩疹皆少陽相火客氣勝也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火豈有寒乎故治瘡泡與治傷寒時氣同法初覺頭痛身熱惡寒此小兒初發瘡泡之候也其脉息皆浮大而有力亦與傷寒時氣冒風驚風宿乳一槩難辯宜先解之有二法遇亢陽炎熱之時以辛涼解之遇又寒凝冽之時以辛溫解之辛涼之劑者涼膈通聖之類是也辛溫之劑者升麻葛根之類是也此二法慎勿互用之既用此二法之後次以白虎湯加入參冷服之勿輟蓋防瘡疹發喘喘者必死人參止

喘故也或云立秋之後不宜服白虎湯者非也假如
秋深發瘧瘧者中暑而得之白虎大解暑毒既有白
虎湯證豈可間以秋冬乎瘡疱癰疹丹燥皆是火之
用也是肺金之不及也故曰白虎湯加入參一日不
可闕也瘡疱燥疹或出不均大小如芥黍相親見其
不齊也相天之寒溫以蟬殼燒灰抄半字或一字以
淡酒調少許飲之大人以淡酒溫調之不半日則均
齊如或用百祥丸紫草飲子皆可服之俗以酒醋薰
之者適足增其昏聩耳至六七日瘡疹出全可調胃
涼膈下之同調理傷寒法或言瘡疹首尾俱不可下

有此水奉議公之言也適足使人戰戰兢兢而不敢
用藥也錢仲陽之用百祥丸其間有大戟豈奉議公
獨不見耶自奉議公斯言一出死者塞路矣子家其
親屬故舊小兒有患瘡疱黑陷腹內喘者余以白虎
湯加入參涼膈散加當歸桔梗連進數服上灌下泄
晝夜不止又使睡臥於寒涼之處以新水灌其面目
手足膿水盡去蓋四肢者諸陽之本也兒方為瘡疱
外燔沃以寒水使陰氣循經而入達於心肺如醉得
醒是亦開昏破鬱之端也如此救活者豈啻千數夫
瘡疱黑陷喘而滿者十死八九若依此法尚能活其

六七何世醫與病家至冷猶未悟也近年予之庄鄰沿蔡河來往之舟常艤於此一日舟師偶見敗蒲一束沿流而下漸迫舟次似聞啼聲而微舟師疑其人也探而出之開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密而容隙兩目皎然飢而索食因以粥飽其舟師之妻怒曰自家兒女多惹瘡疱傳染奈何私料此兒沿蔡河來其流緩必不遠持兒一鞋逆流而上徧河之人皆曰無此兒行且二十里至一村村落舟師高唱曰有兒年狀如許不知誰是瘡疱病死棄之河中今復活矣聞酒邸中飲者喧嘩有人出曰我某村某人也

兒四五歲死於瘡疱舟師出其鞋以示之其父泣曰真吾兒也奔走來視驚見兒語大痛流涕拜謝舟師喜抱兒歸今二十餘歲矣此兒本死得水而生伏誦來者瘡疱之疾熱耶寒耶經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火啓玄子注云心寂則痛微心燥則痛甚百端之起皆自心生瘡疱之疾豈有寒歟余承醫學於先人閱病多矣苟誑後人罪將安逃誠如此法則原上之丘以瘡疱而死者皆誤殺人故療小兒惟錢仲陽書中可採者最多但其方爲閩孝忠所亂有識者宜擇而取之

而證婦人帶下赤白錯分寒熱解六

君子非好與昔人辨以要譽也蓋昔人有二誤流為千百世之禍者苟不證其非雖自謙讓其如人命何如精選聖惠方二十三卷論婦人赤白帶下云婦人帶下者由勞神過度損動經血致令身虛受於風冷風冷入於脬絡傳其血之所成也又有巢氏內篇四十四卷論任脉為經之海其任之為病女子則為帶下手太陽為小腸之經也手少陰為心之經也心為藏主於裏小腸為府主於表一經之血在於婦人上為乳汁下為月水衝任之所統也衝任之脉既起於

脬內陰陽過度則傷脬絡故風邪乘虛而入於脬中損衝任之經傷太陽少陽之血致令脬絡之間穢與血相蒸帶而下冷則多白熱則多赤二家之說皆非也夫治病當先識經絡靈樞十二經中有是動之病有所生之病大經有十二奇經有八脉言十二經之外後有此八道經脉也十二經與八道經脉通身往來經絡共二十道上下流走相貫周環晝夜不息與天同度自手太陰肺經起行陽二十五度行陰亦二十五度復會於手太陰肺經也然此二十道經絡上下周流者止一十九道耳惟帶脉起少腹側季脇之

端乃章門穴是也環身一周無上下之源絡屏而過
如束帶之於身難經曰帶之爲病溶溶如坐水中衝
任者是經脉之海也循腹脇夾臍傍傳流於氣衝屬
於帶脉絡於督脉督脉者起於闕元穴任脉者女子
在養胎孕之所督脉乃是督領婦人經脉之海也衝
任督三脉同起而異行二源而三岐皆絡帶脉衝任
督三脉皆統於募戶巡陰器行廷孔溺孔上端衝任
督三脉以帶脉束之因餘經上下往來遺熱於帶脉
之間熱者血也血積多日不流火則從金之化金曰
從革而爲白乘少腹間宛熱白物滑溢隨洩而下綿

綿不絕多不痛也或有痛者則壅礙因壅而成痛也
內經曰少腹宛熱洩出白液宛者屈滯也病非本經
爲他經宛抑而成此疾也宛一作客客猶寄也遺客
熱于少腹久不去從金化而爲白設若赤白痢赤者
新積也從心火白者舊積也從肺金故赤白痢不可
曲分寒熱止可分新舊而治之假如癰癤始赤血次
潰白膿又豈爲寒者哉而病者未信也此今之劉河
間常言之矣皆云寒多則白以乾薑赤石脂桃花丸
治痢雖愈後必生血疾如白帶下病徑以白芍藥乾
薑白帶雖愈則小洩必不利治瀉痢與治帶下皆不

可驟用峻熱之藥燥之燥之則內水涸內水涸則必
煩渴煩渴則小溲不利小溲不利則足腫面浮漸至
不治內經曰思想無窮所願不得意淫于外入房大
甚發為筋痿淫衍白物如精之狀男子因溲而下女
子綿綿而下左傳曰少男惑長女風落山之象是為
惑蠱之疾其文三虫同血曰蠱乃是思慕色慾內生
後蝕甚不可使用燥熱之藥攻之漸至形削羸瘦脉
大者必死而不救且赤白痢者是邪熱傳於大腸下
廣腸出赤白也帶下者傳於小腸入脬經下赤白也
據此二證皆可同治濕法治之先以導水禹功瀉訖

次以淡劑降心火益腎水下小溲分水道則自愈矣
頃頃丘一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載
矣命予脉之診其兩手脉俱滑大而有力得六七至
常上熱口乾眩暈時嘔酢水余知其實有寒痰在胸
中以瓜蒂散吐訖冷痰三三升皆酢水也間如黃涎
狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹功以
瀉其下然後以淡劑滲洩之藥利其水道不數日而
愈余實悟內經中所云上有病下取之下有病上取
之又上者下之下者上之然有此法亦不可偏執更
宜詳其虛實而用之故知精選聖惠方帶下風寒

言與巢氏論中赤熱白寒之說正與難素相違予
敢妄論先賢恐後學又流不明未免從之而行也如
其寡學之人不察病人脉息不究病人經脉妄斷寒
熱信用羣方暴熱之藥百有矣雖悔何追嗚呼人命
一失其復能生乎赤白痢與赤白帶下皆不死入內
經惟腸澀便血血温身熱者死赤白帶下白液白物
蠱病腎消皆不能死人有死者藥之誤也

霍亂吐瀉死生如反掌說七

巢氏先賢也固不當非然其說有誤者人命所係不
可不辯也今之醫者家置本以為繩墨嗚呼何令之

人信巢氏而不信素問也此予不得不為之說且巢
氏論霍亂吐瀉皆由温涼不調陰陽清濁二氣相干
致腸胃之間變而為霍亂寒氣客於脾則瀉寒氣客
於胃則吐亦由飲酒食肉腥膾生冷過度或因居處
坐卧湿地當風取涼風之氣歸於三焦傳於脾胃脾
胃得冷水穀不消皆成霍亂其名有三一曰胃反胃
氣虛逆反吐飲食二曰霍亂言其病揮霍之間便致
撩亂也三曰哺食變逆者也霍亂者脉必代又云七
月間食蜜令人暴下霍亂此皆巢氏霍亂之論也予
以為不然夫醫之治病猶書生之命題如秋傷於濕

冬生咳嗽是獨以濕為主此書生之獨脚題也風濕
喝三氣合而成霍亂吐瀉轉筋此猶書生之鼎足題
也風者風木也內應足厥陰肝木濕者雨化也內應
於足太陰脾土喝者火熱也內應於手少陰心火此
風濕喝三氣之所生也內經曰土氣之下木氣乘之
是肝木乘脾土也又曰厥陰所至為腸痛嘔泄少陽
所至為嘔涌注云食不下也太陰所至為中滿霍亂
吐下太陰所至為濡化也注云濕化也又曰太陰所
至為濕生終為注用故轉筋者風主肝肝主筋風急
甚故轉筋也吐者喝也火主心心主炎上故嘔吐也

泄注者土主濕濕主脾濕下注故泄注也此三者豈
非風濕喝如書生鼎足題耶脾濕土氣為風木所克
土化不行矣亢無雨火盛過極土怒發焉極則為雷
霆驟雨烈風蓋土氣在上木氣乘之故也是以大水
橫流山崩岸落石迸沙飛豈非太陰濕土怒發之象
耶故人病心腹滿脹腸鳴而為數便甚則心痛脇膜
嘔吐霍亂厥發則注下肘腫身重啓玄子云已上病
證皆脾熱所生也乃知巢氏所論正與素問啓玄子
相違故內經治法病急則治其標緩則治其本先可
用淡劑流其濕辛涼以退其風鹹苦以解其喝冰水

以救其內澗大忌食粟米粥飲者立死偉哉王米之言脾熱一句可以爲方世俗止知取其頭巾而濯之以飲其水亦取黑豆皂礬頭垢寒涼然近似終不足以制其甚也又有以寒水沃其手足者大非也四肢已厥更以寒水沃之則益厥矣曷若以寒水沃其心之爲愈也秦和問余親見陳下廣濟禪院其主僧病霍亂一方士用附子一枚及兩者乾薑一兩炮水一椀同煎放冷服之服訖嘔血而死頃合流鎮李彥甫中夜忽作吐瀉自取理中丸而服之醫者至以爲有食積以巴豆下之三五丸藥亦不動至明而死可不

哀哉遂平李仲安携一僕一佃客至鄆城夜宿邵輔之書齋中是夜僕逃仲安覺其時也騎馬與佃客往館潁急追之時七月天大熱炎風如箭埃塵幔天至辰時而還曾不及三時往返百二十里既不獲其人復宿於邵氏齋忽夜間聞呻呼之聲但言救我不知其誰也執火尋之乃仲安之佃客也上吐下泄目上視而不下胸脇痛不可動搖口欠而脫白四肢厥冷此正風濕暈三者俱合之證也其婿曾聞余言乃取六一散以新汲水剉生薑而調之頓服半升其人復吐乃再調半升而令徐服之良久方息至明又飲數

服遂能調養三日平復而去嗚呼若此三人其生死豈不如反掌哉彼世醫往往以謂六一散治得其病此無學之輩也可勝恨哉

目疾頭風出血最急說八

內經曰目得血而能視此一向聖人論人氣血之常也後世之醫不達其旨遂有惜血如金之說自此說起目疾頭風諸證不得而愈矣何以言之聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目塞塞而發痛不及則目耗竭而失睛故年少之人多太過年老之人多不及但年少之人則無不及但年老

皆疑皆字

之人其間猶有太過者不可不察也夫目之內皆太陽經之所起血多氣少目之銳眦皆少陽經也血少氣多目之上綱太陽經也亦血多氣少目之下綱陽明經也血氣俱多然陽明經起於目兩傍交鼻頰之中與太陽少陽俱會於目惟足厥陰肝經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故血出者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以血養目而已此內經所謂目得血而能視者此也凡

血之爲物太多則益太少則枯人熱則血行疾而多
寒則血行遲而少此常理也至於目者肝之外候也
肝主目在五行屬木然木之爲物太茂則蔽密太衰
則枯瘁蔽密則風不踈通故多摧拉枯瘁則液不浸
潤故無榮華又况人之有目如天之有日月也人目
之有翳如日月之有雲霧也凡雲之興未有不因蒸
騰而起者雖隆冬之時猶且然耳况於炎夏之時乎
故目暴赤腫起羞明隱澁淚出不止暴寒目瞶皆工
藝之所爲也夫目之五輪乃五臟六腑之精華宗脉
之所聚其氣輪屬肺金肉輪屬脾土赤脉屬心火黑

水神光屬腎水兼屬肝木此世俗皆知之矣及有目
疾則又不知病之理豈知目不因火則不病何以言
之氣輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神
光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也能治火
者一句可了故內經曰熱勝則腫治火之法在藥則
鹹寒吐之下之在鍼則神廷上星顙會前頂百會血
之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫
者可使立消惟小兒不可刺顙會爲肉分淺薄恐傷
其骨然小兒水在上火在下故目明老人火在上水
不足故目昏內經曰血實者宜決之又經曰虛者補

介月事類 卷之一
之實者瀉之如雀目不能夜視及內障暴怒太憂之所致也皆肝主目血少禁出血止宜補肝養腎至於暴赤腫痛皆宜以銚針刺前五穴出血而已次調鹽油以塗髮根甚者雖至于再至三可以也量其病熱平爲期少白可黑落髮可生有此神驗不可輕傳人年四十五十不問男女目暴赤腫隱澁難開者以三稜鐵刺前頂百會穴出血大妙至如年少髮早白落或白屑者此血熱而太過也世俗止知髮者血之餘也血衰故耳豈知血熱而寒髮反不茂肝者木也火多水少水反不榮火至于頂炎上之甚也大熱病汗

後勞病之後皆髮多脫落豈有寒耶故年衰火勝之人最宜出血但人情見出血皆不悅矣豈知出血者乃所以養血也凡兔雞猪狗酒醋濕麴動風生冷等物及憂忿勞力等事如犯之則不愈矣惟後頂強間腦戶風府四穴不可輕用鍼灸以避忌多故也若有誤不幸令人瘖固宜慎之其前五穴非徒治目疾至於頭痛腰脊強外腎囊燥癢出血皆愈凡針此勿深深則傷骨唐甄權尤得出血之法世俗云熱湯沃眼十日明此言謬之矣火方乘目更以熱湯沃之兩熱相搏是猶投賊以刃也豈知涼水沃之暫澁而又

滑熱水沃之暫滑而久溢不然曷以病目者忌沐浴
或曰世俗皆言涼水沃眼血脉不行余聞大笑之眼
藥中用黃連礪砂朴硝龍腦熊膽之屬皆使人血脉
不行耶何謬之甚也又若頭風之甚者久則目昏偏
頭風者少陽相火也久則目束小大腸悶澁者目必
昏何也久病滑泄者目皆明惟小兒利久反疳眼昏
蓋極則反與此稍異其餘皆宜出血而大下之余嘗
病目赤或腫或翳作止無時偶至親息帥府間病目
百餘日羞明隱澁腫痛不已忽眼科姜仲安云宜上
星至百會速以銚針刺四五十刺攢竹穴絲竹穴上

兼眉際二十刺及鼻兩孔內以草莖彈之出血二處
出血如泉約二升許來日愈太半三日平復如致余
自嘆曰百日之苦一朝而解學醫半世尚闕此法不
學可乎惟小兒瘡泡入眼者乃餘熱不散耳止宜降
心火瀉肝風益腎水則愈矣若大人目暴病者宜汗
下吐以其血在表故宜汗以其火在上故宜吐以其
熱在中故宜下出血之與發汗名雖異而實同故錄
銅人中五穴照用

過愛小兒反害小兒說九

小兒初生之時腸胃綿脆易饑易飽易虛易實易寒

易熱方書舊說天下皆知之矣然禮記曲禮所以至
符潛訣論云天下皆不知曲禮云童子不衣裘裳說
云表火溫消陰氣且人十五歲成童尚不許衣裘今
之人養禡子當正夏時以綿被裹腹日不下懷人氣
相蒸見天稍寒卽封閉密室睡壇下幕煖炕紅爐使
微寒不入大煖不泄雖衰老之人尚猶不可況純陽
之小兒乎然君子當居密室亦不當如是之煖也王
符潛訣論云嬰兒之病傷於飽也今人養禡子不察
腸胃所容幾何但聞一聲哭將謂饑號急以糜乳納
之兒口豈復知量不吐不已及稍能食應口輒與夫

小兒初生別無伎倆惟善號泣爲強良耳此二者乃
百病之源也小兒除胎生病外有四種曰驚曰疳曰
吐曰瀉其病之源止有二曰飽曰煖驚者火乘肝之
風木也疳者熱乘脾之濕土也吐者火乘胃膈甚則
上行也瀉者火乘肝與大腸而瀉者也夫乳者血從
金化而大寒小兒食之肌肉克實然其體爲水故傷
乳過多反從濕化濕熱相兼吐痢之病作矣醫者不
明其本輒以紫霜進食比金白餅之屬其中皆巴豆
杏仁其巴豆大熱有大毒杏仁小熱有小毒小兒陽
熱復以熱毒之藥留毒在內久必變生故劉河間先

生以通聖涼膈神芎益元治之皆無毒之藥或曰此
大人所服之藥非小兒所宜也余問笑曰大人小兒
雖年壯不同其五臟六腑豈復殊耶大人服多小兒
服少其實一也故不可下者宜解毒可下者宜調胃
瀉心然有逐濕爲之方者故余嘗以牽牛大黃木通
三味末之爲丸以治小兒諸病皆効蓋食乳小兒多
濕熱相兼故也今之醫者多以此藥謗予彼既不明
造化難與力辯故予書此方以俟來世知道者然善
治小兒者當察其貧富貴賤治之蓋富貴之家衣食
有餘生子常天貧賤之家衣食不足生子常堅貧家

之子不得縱其慾雖不如意而不敢怒怒少則肝病
少富家之子得縱其慾稍不如意則怒多怒多則肝
病多矣夫肝者木也甚則乘脾矣又况貧家無財少
藥故死少富家有財多藥故死多故貧家之育子雖
薄於富家其成全小兒反出於富家之右其暗合育
子之理者有四焉薄衣淡食少欲寡怒一也無財少
藥其病自痊不爲庸醫熱藥所攻二也在母腹中其
母作勞氣血動用形得克實三也母既作勞多易生
產四也此四者與富家相反也俚語曰兒哭即兒歌
不哭不儂儂此言雖鄙切中其病世俗豈知號哭者

乃小兒所以泄氣之熱也老子曰終日號而不嗔余
嘗授人以養子之法兒未坐時卧以赤地及天寒時
不與厚衣布而不綿及能坐時以鐵鈴木壺雜戲之
物連以細繩置之水盆中使一浮一沉弄之有聲當
炎暑之時令坐其傍掬水弄鈴以散諸熱內經曰四
肢者諸陽之本也手得寒水陰氣達於心中乃不藥
之藥也余嘗告于陳敬之若小兒病緩急無藥不如
不用庸醫但恐妻妾恠其不醫宜湯以蒸餅令軟丸
作百丸給其妻妾以為真藥使兒服之以聽天命最
為上藥忽歲在丙戌群兒皆病泄瀉但用藥者皆死

蓋醫者不達濕熱之理以溫燥行之故皆死性陳敬
之不與藥用余之言病兒獨存噫嗚呼班固真良史
嘗曰有病不治得中醫除暴得大疾病服藥者當謹
熟陰陽無與衆謀若未病之前從予奉養之法亦復
不生病縱有微疾雖不服藥可也

服藥一差轉成他病說十

語云子之所慎齊戰疾又曰丘未達不敢嘗此言服
藥不可不畏慎也然世有百十年相襲之弊至今不
除者敢略數一二使後輩改輒不蹈前覆夫傷寒溫
疫時氣中暑風溫風瘧與中酒傷食者其初相類此

備門事類 卷之十一
晁誤入或先一日頭痛曾傷酒便歸過于酒曾傷食
便歸過于食初覺滿悶醫者不察其脉不言其始徑
用備急丹纏積丹軟金丸酒癘丸此藥犯巴豆或出
油不盡大熱大毒走泄五七行或十餘行其人必津
液枯涸腸胃轉燥發黃瘵熱目赤口乾恍惚潮熱昏
憤惑狂諸熱交作如此誤死者不可勝舉若其人或
本因酒食致過亦能頭痛身熱戰慄惡寒醫者不察
其脉不究其原反作傷食發之桂枝麻黃升麻之屬
以汗解之汗而不解轉轉疑惑反生他證如此誤死
者可勝計哉又如久病咳嗽形體羸瘦食飲減少日

輕夜劇醫者不察便與烏梅罌粟殼紫苑枯礬如此
峻攻嗽疾未除澁滯之病作矣嗽加之澁飲食漸減
醫者不察更以熱劑養胃溫劑和脾致令頭面汗出
燥熱潮發形容瘦瘠涎液上出流如湧泉若此死者
不可勝數又如婦人產餘之疾皆是敗血惡物發作
寒熱臍腹撮痛乳澁枯涸食飲稍減醫者不察便謂
產後血出數斗氣血俱虛使用溫熱之劑養血補虛
止作寒治舉世皆然豈知婦人之孕如天地之孕物
也物以陰陽和合而後生人亦以陰陽和合而後孕
偏陰偏陽豈有孕乎此與禾黍瓜果之屬何異哉若

水旱不時則華之與實俱痿落矣此又與及而不育者復何異哉七月立秋後十八日寸草不結者猶天寒故也今婦人妊娠終十月無難而生反謂之寒何不察其理之甚也竊譬之治瘧者炎火在下以水沃其窠之巔遂成瘧矣瘧既出窠窠頓寒耶世俗竟博黑神散之屬治產後一十八證非徒其不愈則經脉涸閉前後淋瀝嘔吐嗽痰凡百熱證生矣若此誤死者不可計之曷若四物湯與涼膈散停對大作湯劑而下之利以數行惡物俱盡後服淡甘之劑自愈矣又如小兒腹滿喘嗽痰涎不利醫者不察使用白餅

子之屬夫白餅子巴豆大熱有大毒兼用膩粉其後必生口瘡上喘欬嗽嘔吐不嗜飲食之疾然此治貧家小兒猶或可効膏梁之家必生他病又何疑哉又如瀉利之疾歲歲有之醫者不察使用聖散子之屬乾薑赤石脂烏梅罌粟殼官桂石榴皮龍骨牡蠣之屬變生小便癃閼甚者為脹又甚者水腫之疾生矣間有愈者病有微者也甚則必不愈矣又如人病停飲或因夏月傷冷過多皆為脾胃客氣有餘也宜逐而去之醫者不可以為脾衰而補之則痞者更痞滿者更滿復有巴豆丸下之者病雖少解必不嗜食上

燥之病生矣。又如人因閉腠，膝髀肘腕大痛，醫者不察，便用銚針出血。如未愈者，再三刺血，出血既多，遂成跛臂。內經曰：足得血而能步，血盡安得步哉？若余治閃肭，則不然。以禹攻散或通經二三錢，下神祐丸，或除濕丹百餘丸，峻瀉一二十行，則痛出，當痒發痛，屬夏痒，屬秋出，則夏衰矣。此五行勝復之理也。故凡腰膝脇痛，杖瘡落馬墜，打撲莫不同。然蓋此痛得之於外，非其先元虛元弱。古人云：痛隨利減，宜峻瀉一二十行，畢但忌熱酒，可一藥而愈。勿謂峻瀉輕侮。此法昔有齒痛連月不止，以鉄鈴鈕取之，血不止而

死。又有入因上下齒痛，凡百痛者，輒取不數年，上下齒盡，至五十歲生硬之物，皆不能食。夫上下齒痛皆由手足陽明二經風熱甚而痛矣。可用大小承氣湯，或用丸祛風丸等藥瀉之，則痛當自止。內經曰：諸痛痒瘡瘍皆屬心火。啓玄子云：百端之起皆自心生，心者火也。火生壬之故也。出牙之誤不可不知。又如治水腫痛者，多用水銀輕粉白丸子大毒之藥下之，水腫未消而牙齒落，牙齒落而不進食，水盡而立斃。復有人於兩足針之，水出如泉水，盡亦斃矣。

