

右調勻每一時服一食匕

○方 越 老人氣管支炎粘痰分泌多量者

阿芙蓉越幾三分單寧二至白糖半

右調勻每服一劑日三次

○方 樞 主治同前

沒藥末一匙 炭酸加里 二十五人

薄荷水 八分 硫酸鐵 一刃 白糖 半刃

右調勻每服一食匕日四次

慢性氣管支炎

○方 越 主治慢性氣管支炎難咯痰者

遠志 半刃浸出 礞砂 一匙至

右調勻每一時服一匕

○方 鑿 患者虛脫而咯痰困難者

遠志 二匙沸湯浸出 海慈舍利別 半刃

右調勻每服一匕

○方 樞 主治慢性氣管支炎

寶菱荅利葉 半匙

右浸出取液四刃每二時服一食匕

○方 樞 慢性乾燥加答流

礞砂 一匙 阿片加安息香丁幾 半

吐酒石 三分八 甘草越栗失爾 三匙

蒸餾水 四刃

右調勻每二時服一食匕

○礞砂飲 越 主治慢性氣管支炎咯痰困難者

礞砂 一匙至 水 八刃 甘草越幾 半刃

右調勻每服一食匕日日用

○方 歷 主治同前

吐根浸 三刃以 吐酒石 三入

單舍利別 一刃

右調勻每四分時服一二食匕至得吐

○葛私加栗海葱劑每主治同前咯痰過多者

海葱丁幾一錢半至二錢 芳香硫酸一錢

鹽酸莫非水三十密 葛私加栗浸八錢

右調勻每服六分之一日三次

○方馬主治百日咳慢性氣管支炎

非阿斯越幾四錢 實芟谷利葉一錢

吐根末三錢 白糖十錢

右為散製劑十個每日服三劑

○方每主治慢性肺管炎

吐根酒一錢半 甘硝石精六錢

失鳩答榨汁三錢 遠志浸八錢

右調勻每六時服六分之一

○方馬主治同前

非阿斯越幾 吐根末 各半錢

金硫黃一錢 甘草越幾適宜

右為十五球每服一球日四次

○方馬主治同前

金硫黃半錢 阿芙蓉半錢 甘草膏適宜

右為六十九丸每服一丸至二丸日三次

○皓礬丸每老人慢性肺管炎

皓礬十二錢至二十四錢 失鳩答越幾三十六錢

右為十二丸每服一丸日三次

○方馬主治慢性氣管支炎及呼吸惡臭

格羅兒石灰一錢 白糖一錢 達刺侃篤漿適宜

右為四十錠每服二三錠日三四次

○方馬慢性氣管支炎

沒藥半錢 護謨二錢 接骨木花水五錢

硝砂一錢 甘草膏三錢 寧露舍利別半錢

右調勻每三時服一匕

○方馬慢性氣管支炎咯痰困難者

百爾蘭獨留讓 半勺水煎 取液三名 海葱醋蜜 四匙

右調勻、每二時服二食匕

○方罨 主治慢性肺管炎、兼肝臟分泌過止者

安息香華 十二匙 白糖 一匙

右為散、分六服、每二時一服

○安息酸海葱劑 五 主治同前

安息香酸 四十八 海葱舍利別

櫻春花舍利別 各一勺半

右為散劑、每四時服一小茶匕

○方丹 主治慢性肺管炎

安息香酸安汶尼 十五至二十匙 水 一勺半

橙花舍利別 一匙

右調勻、一日三次分服

○結列阿曹篤飲 五 主治同前 方出慢性 胃喉衝

○沒藥散 五 慢性氣管支炎、粘液分泌不止者

沒藥 半勺 白糖 二勺

右為散、每服一茶匕、日四次

○方厘 主治同前

沒藥 三匙 拔爾撒謨加那達 一匙

阿芙蓉 半匙

右二以為一丸、每二時服二丸

○方歷 主治同前

的列並底那 二匙 龍腦 一匙

阿芙蓉 半勺 高苜越幾 一匙

右為六十九丸、每服一丸、漸加至四丸、日三次

○方冠 主治慢性氣管支炎、咯痰過多者

拔爾撒寧露 二匙 鷄子黃 一個

白糖 半勺 水 八勺

右調勻、每一時服二匙

○方越 主治氣管支膨大症、咯痰多量者

拔爾撒骨并霍

右服十二滴二十滴漸加至四十滴日三次

○遠志癒瘡木合劑 主治肺管喉衝終期

揮發癒瘡木丁幾 三或 遠刺侃篤漿 三

右研和加遠志浸八分每服三食匕日三次

○安汶尼遠志合劑 老人慢性氣管支炎

炭酸安汶尼 三十八 越的兒精 三

海葱丁幾 二或 複方龍腦丁幾 二或

刺賢埕兒丁幾 六或 遠志浸 八分

○又方 主治慢性肺管炎

硃砂香竇精 四或 複方香竇精 六十密

遠志丁幾 六或 龍腦水 八分

右調勻每六時服六分之一

○規尼安汶尼劑 方出 主治同前

下癩劑

○方 主治粘痰分泌不止者

護謨安汶尼亞幾 沒藥

蘆薈 剝禮瓦刺越幾 各等分

右為丸

○海葱安汶尼莫非劑 主治慢性加答流

海葱舍利別 六或 硃砂香竇精 三或

鹽酸莫非水 一或即 攝爾扁答里浸 八分

右調勻每服六分之一日二三次

○海葱失鳩答丸 主治同前

複方海葱丸 失鳩答越幾 各三十分

右為十二丸每夜臨卧服二丸

○祛痰劑

鹽酸越幾知涅半或 遠志末 一或

白糖 二或 遠刺侃篤漿 適量

右為五十錠每二時服二錠至四錠

○鳩列刺氏和胸散（經） 主治慢性氣管支炎

硫黃華四錢 梅那葉 甘草末 各六錢

過泥子二錢 白糖四錢

右為散每服一卵匕日四次

○哥羅防一錢

右為吸入法

○方（丹） 主治慢性肺管炎粘液分泌過多者

的列並油一錢 熱湯六錢

右以吸管吸入其蒸氣

○方（經） 主治氣管支炎粘痰過多者

石炭酸一錢 水十二錢

右納罐上火吸入其蒸氣

○結列阿曹篤吸入法（丹） 出于慢 性深膜炎 主治同前

○沃實吸入方（丹） 主治慢性氣管支炎

沃度加里二錢至十錢 或沃實丁錢一密至十五密

右和水一錢為吸入劑

○引赤擦劑（丹） 主治肺管炎

胡椒末三十錢 肉豆蔻油三十密

的列並軟膏三錢 複方龍腦軟膏八錢

右調勻塗擦于胸部

○的列並油一錢

右塗擦胸膛

○方（經） 慢性氣管支炎咳嗽劇甚苦悶甚者

的列並油三錢 醋酸半錢 卵黃一個

薔薇水二錢半 拘攏油一錢

右調勻塗擦于全胸至發赤色

小兒氣管支炎

○方（置） 一歲以下兒咳嗽

托弗兒散一錢至二錢 白糖二錢

右為散每二時服一小茶匕

○方置 主治一二歲兒氣管支炎及肺炎

吐根皮末 四公至六公 單舍利別 一公

右調勻每服一匙布匕至得吐

○方置 主治同前

吐根舍利別 蜀葵舍利別 各四公

右調勻每二時服一匙布匕

○方置 主治小兒氣管支炎及肺炎

油乳劑 或蜀葵舍利別 吐根舍利別 二公

老利兒水 十滴至二十滴

右調勻每二時服一匙布匕

○方置 主治四五歲兒氣管支炎及肺炎

吐根舍利別 櫻實水 各四公

菩提樹花水 半公

右調勻每二時服一匙布匕

○方置 主治小兒氣管支炎咳嗽劇甚者

菲阿斯越幾 或子 白糖 半公

右為散分八服為一日或二日量

○方置 主治小兒氣管支炎

蒸餾水 二公 護謨漿 一公

結爾茂斯 一公至三公 橙花舍利別 一公

右振盞每二時服一匙布匕

○方置 主治同前

龍腦 三公 護謨 二公

蒸餾水 三公 安息香華 六公

確砂加過泥精 一公 橙皮舍利別 一公

右調勻每半時服一匙布匕至得效

百日咳 即瘰癧

○峻吐劑 丹方出急性 發作劇甚者

○吐根酒一斗 主治同前

右每服一匙、糖水和服、至得吐

○方糖 哺乳兒百日咳

莫爾非涅一斗 老利兒水一匙半

右溶和、每服一二滴

○溴素加里水一斗 主治百日咳及喘息

溴素加里半匙 淨水三斗

右調勻、一日三次、分服

○溴素加里散一斗 主治同前

溴素加里二十斗 白糖半匙

右為散、分三服、一日服之

○方糖 主治同前

溴素安沒尼亞二十斗 淨水二斗

右調勻、每服一茶匕、日三次、糖水和服

○硝酸合劑一斗 主治同前

稀硝酸十二匙 複方益智丁幾三匙

舍利別三斗半 水一斗

右調勻、每二時、服一小茶匕

○方糖 主治同前

硝砂精十滴 薄荷水二斗

葭岩越幾二斗 嬰粟舍利別六匙

右調勻、每三時、服一茶匕

○沃弗篤兒氏和劑一斗 主治同前

哥羅尼爾八斗十斗 酒石鹽一斗

單舍利別一斗 熱湯六斗 或四斗

右調勻、每一時、服一茶匕

○皓礬葭岩水一斗 主治同前

皓礬八斗 葭岩越幾二斗 水四斗

右調勻、每服一茶匕、日四次

○吐根嬰粟糖煉一斗 主治小兒咳嗽

吐根酒 二匙

罌粟舍利別 三匙

遠刺侃篤漿 一弓 水 三弓

右調勻、每二三時與一茶匕

○方置 主治同前

印度大麻越幾 一瓜至二瓜 吐根末 一乳糖半

右為散、分八服、每三時一服

○方吻 主治百日咳

吐根丁幾 五滴 安質沒酒 三十滴

阿芙蓉加安息香丁幾 十五滴 扁桃乳 一弓

右調勻、每四時服一小兒匕、一歲兒服量

○方寫 主治同前

葇荂葉 十八浸出 吐酒石 半 白糖 六

取液二弓 右調勻、每服一匙布匕、日三次

○方瑟 主治同前

葇荂越幾 四瓜 阿芙蓉舍利別

橙花舍利別 各一弓

右調勻、每服一茶匕、日一次、至四次

○方置 主治小兒痙率性咳、百日咳

葇荂根末 一瓜 白糖 半匙

右為散、分八服、一二日盡之

○方鑑 主治同前

葇荂丁幾 一滴至六滴 覆盆子舍利別 二匙

蒸餾水 一弓

右調勻、朝夕與一匕

○方置 主治同前

葇荂根丁幾 一滴至六滴 石長生舍利別 二匙

蒸餾水 一弓

右調勻、朝夕各服一匕

○方寫 主治百日咳

嗎囉叻 十六 吐根丁幾 安質沒酒 各二

右調勻、每服一茶匕。

○方_寫 主治同前

麝香 二錢

吐根 一錢

金硫黃 半錢

護謨末 十二錢

右為散、製劑八個、每三時服一個。

○安波尼合劑_丹 主治小兒百日咳

硝砂香竈精 七十五

越的兒精 一錢

莨若丁幾 十二

稀青酸 八 舍利別 二

右調勻、每四時取一食匕、水等分和服。

○安波尼遠志合劑_丹 主治肺管中、粘液鬱蓄

者_{方出于馬脾風}

○方_越 主治痙性咳嗽

老利兒水 一錢

水 四錢

右納罐上火、吸引其蒸氣。

○歌爾謨氏嗅入法 主治百日咳

溴素加里 二錢

蒸餾水 一錢

右為嗅入水

喘息 附喉頭痙攣

○方_越 喘息發作

莫爾非涅 半錢

重碳酸曹達 二錢

右為散、分八服、每半時或每一時一服。

○方_越 主治同前

蔓陀羅丁幾 一錢

老利兒水 二錢

右調勻、每半時或一時服十滴、至十五滴。

○方_越 主治同前

阿芙蓉 半錢

白糖 十錢

右為散、製劑六個、每半時或一時服一劑。

○方_越 主治同前

老利兒水 一匙

魯別里亞丁幾 一匙

右調勻、每一時、服十滴、至十五滴

○方選 主治喘息

吐根末 一匙 蘆根越幾 一匙 薄荷油 五滴

右為三十九丸、衣甘草末、朝夕、各服一丸

○魯別里越的兒劑 再 主治同前

硝砂香竇精 二匙 魯別里亞丁幾 三匙至六匙

雙鸞菊丁幾 三十密 龍腦水 八分

右調勻、每服六分之一、一日二三次

○蔓陀羅非阿斯劑 再 主治同前

蔓陀羅丁幾 一匙 呀羅防精 三匙 水 八分

右調勻、每服六分之一、一日三次

○方歷 小兒喉頭痙攣

吐根浸 三匙以八分 結爾茂斯密涅刺 二分

老利兒水 一匙 護謨漿 一匙

右調勻、每一時、或二時、服一匙布也

○方 主治喘息

亞波莫爾非 一分至二分 蒸餾水 四分

單舍利別 半匙

右溶和、每一時、服一食匕

○方 越 主治喘息發作

吐根末 二分至四分 白糖 十分

右為散、每半時、服一劑、至得吐

○方 蛤 主治急性喉頭痙攣

吐根 一匙浸出 蜀葵舍利別 三匙

右調勻、每五分、或十分、服一匙布也、至得吐

○方 露 主治同前

吐根 半匙浸出 吐酒石 一分

蜀葵舍利別 半匙

右調勻、每五分、或十分、服一匙布也、至得吐

○蓖麻子油 二勺

右每二時服一匙布七

○方 蛤 慢性喉頭痙攣

麝香 二勺 河狸香 一勺 白糖 一匙

右為散分六服每三時一服

○方 冒 主治同前

亞鈴華 八勺 吐根末 六勺 白糖 一匙

右為散分八服每二時一服

○方 蛤 主治同前

規尼 六勺 苣苔越幾 一勺 白糖 一匙

右為散分六包每服一包日三次

○方 蛤 主治同前

硫酸規尼 三勺 茴香水 三勺 橙皮舍利別 一

右調勻每二時服一茶匙

○方 蛤 主治同前

甘汞 八勺 白糖 一匙

右為散分八包每服一包一日四次

○方 寫 主治喘息

苣苔越幾 三勺 苣苔根末 六勺 白糖 一匙

右為散分六服日三服

○方 寫 主治喘息

菲阿斯越幾 一勺 龍腦末 半匙

阿芙蓉越幾 五勺

右為二十九每服二九日二次

○溴素加里水 務 主治喘息 方出于

○溴素加里散 務 主治喘息 方出于

○沃度加里水 越方出于 主治同前 于微毒

○沃度加里合劑 丹 主治同前

沃度加里 三勺至 硝砂香竈精 四十

薄荷水 一牙半 苣苔丁幾 五

薄荷水 一牙半 苣苔丁幾 五

複方幾那丁幾 一考

右調勻、日服三劑

○方 越 主治同前

福氏砒石液 半考 茴香水 二考

右每服十二滴、日二次

○莫非皮下注射法 越方共出 喘息發作

○亞篤魯比皮下注射法 丹神痛 丹方出 神經痛 主治同前

○方 逐 主治呼吸窘迫甚者

莫岩葉 一考 菲阿斯葉

蔓陀羅葉 各半考 李爾蘭獨留葉 四考

右細劉調和更取溶解阿芙蓉二瓜于老利

兒水適宜者加之、以洋紙卷之、或裝煙管、

火吸其煙

○麻醉吸引法 丹

哥羅叻或越的兒或亞酸化室素 二考

右取少許、浸布帛、或疊摺手巾、致鼻邊

○溴素加里吸引法 丹歌

溴素加里 二瓜至 十瓜 蒸餾水 一考

右調勻、為吸引法

○砒石吸引法 丹

砒石水 三密至 八密 水 一考

右調勻、為吸藥法

○方 彌 主治同前

莫岩葉 一考 或非阿斯葉或蔓陀羅葉

硝石 一考 淨水 四考

右軟解、後乾之、和煙草吸煙

○方 烏 主治同前

番椒 三考 硝砂揮發膏 一考

右調勻、為擦劑

○方 登 主治同前

複方白芷精 龍腦精 各一 硝砂精 二錢

右調勻塗擦胸壁及脊推

○方 歷 主治慢性喉頭瘰癧

阿魏 一錢至 鷄子黃 一個

續草浸 四錢以三錢浸出者

右調勻為乳劑注于直腸

方 窩 主治喘息發作

哥羅叻 一刃 橄欖油 一刃

右調勻加糖水為灌腸劑

肺氣腫

○方 梧

依蘭苔 一刃水煎 櫻實舍利別 一刃

老利兒水 二錢

右調勻每一時服一食匕

○規尼鐵丸 丑方出于 神經痛

○鐵百布失涅丸 丑方出于 主治貧血 胃弱者

○越的兒合劑 丑 發呼吸窘迫者

忽氏鎮痛液 四十密 流動阿片越幾 十密至

河狸香丁幾 一錢 薄荷水 十二錢

右調勻當發作頻服

○安沒尼合劑 丑方出于 膿毒症 主治同前

○麝香根越的兒劑 丑方出于 併私的里 主治同前

○方 愈 主治同前

魯別里亞丁幾 一錢 醋酸莫爾非 一八

右調勻每服二十滴至三十滴

○方 歷 主治同前

舍電阿芙蓉液 二錢 硫化越的兒

硝砂加過泥子精 各半 老利兒水 一刃

右調勻、每一時、服半茶匕、至一茶匕、至鎮靜

○方 栝 主治同前

番木鱉 一弓 燒酒 三弓

右為丁幾劑、塗擦胸上

肺水腫

○方 匱

吐根末 一弓 吐酒石 一弓

右為散、分二服、為吐劑

○方 匱

泉水 五弓 礪砂精 五滴

右調勻、每十分、或十五分、服一食匕、至得吐

○方 匱

藥刺巴末 半匙至二刃 甘汞 十弓

右為散、頓服

○實芟答利葉 匱

右取十人、至十五人、浸出、取液五弓

○方 匱 主治急性肺水腫

實芟答里葉末 吐根末 各十弓

右浸出、取液五弓、加剝禮瓦刺舍利別半弓、

每二時、服一食匕

○方 越 主治肺水腫、及其預防

安息香 一弓至一刃 白糖 十弓

右為散、每服一劑

○方 越 主治同前

安息香 半匙 水 四弓或六弓

右投吸入器、引其氣

○方 匱

醋 二食匕 泉水 十二弓

右為灌腸劑

胸膜嫩衝附胸水

○方〔燈〕胸脇疼痛者

扁挑乳_六 醋酸莫非_一 老利兒水_一

右調勻、每一時服一匕

○方〔斯〕

酒石葉晶_ニ 泉水_六 白糖_二

右調勻、每一時服一匕

○甘汞下劑〔越〕胸膜嫩衝初期_{方出于}

○方〔越〕疼痛甚者

莫爾非_{十二分八一} 白糖_{或炭酸曹達}

右為散、每日服三劑

○越的兒安沒尼水〔丑〕胸膜及肺嫩衝初期

硝石_{半錢至}

甘硝石精_{三錢}

民埕列里精_{十二錢} 龍腦水_{八錢}

右調勻、每服六分劑、一日三四次

○又方〔每〕主治同前

炭酸安沒尼_{十八錢至} 哥羅防精_{三錢}

民埕列里精_{二十錢} 格爾失屈酒_{三十錢}

達刺侃篤漿_{四錢} 水_{八錢}

右調勻、每四時服六分之一

○拘椽酸加里安沒尼劑〔每〕方出于

○葱實水銀丸〔每〕胸膜炎生滲出液者

水銀丸_三 實芟答利末_半 海葱末_一

右為一丸、一日服二劑至三劑

○方〔冠〕主治同前

葯刺巴末_{十八至} 酒石英_{一錢至}

右為散分四服、每三時一服

○雙鸞菊阿片丸 丹方出 腹膜炎 主治胸膜炎

○方 冠 主治胸膜炎、生滲出液者

杜松子 一號浸出 取液六號 純精酒石 一號乃至 二號

右調勻、每一時服一食匕

○實芙蓉里硝石飲 冠 主治同前

實芙蓉里葉 十五乃至一刃 硝石 一號至 二號

屋施蔑兒 一號

右調和一日量

○方 冠 諸症為慢性者

實芙蓉利葉 十公浸出 取液四號 醋酸加里 一號

右調勻、每一時服一食匕

○方 冠

實芙蓉里葉 十公至半號 浸 覆盆子糖煉 一

右調勻、每一時服一匕

○方 冠

馬尾草 二號水煎 取液四號 杜松實舍利別 半號

右調勻、每一時服一匕

○方 冠 主治胸水及水腫

遠志根 半號水煎 取液六號 杜松子精 六號

海蔥丁幾 一號 甘硝石精 半號

右調勻、每一時服二食匕

○方 冠 主治胸水腫

海蔥末 實芙蓉利末 蕪甘沒扭末 各二

右研和、為四十九丸、日服二丸、至十二丸

○方 冠 主治同前

海蔥 半號至 二號 實芙蓉利葉 一刃

右水浸、取液八號、每一二時服一食匕

○方 冠 炎候已退、滲出物不消散者

沃度鐵舍利別 二號 單舍利別 一號

右調勻、每一時服一茶匕

○方 羅 主治同前
沃度加里 半錢 淨水 四錢

右調勻、每服一匙、日三次、兼用肝油一匙

○沃度加里合劑 慢性胸膜炎、滲液積留者

沃度加里 十五錢至 三十錢 格爾夫屈消 九十錢

非阿斯丁幾 六錢 瀉利塩 二百二十錢

野菊花浸 八錢

右調勻、每服六分劑、一日三次

○方 羅

幾那越幾 一錢 桂皮水 四錢

右調勻、每服一匙、布已、至一食已、日三次

○葛岩阿片塗劑 丹方出 主治胸脇痛

○方 羅

純沃實謨 二錢至 四錢 沃度加里 半錢至 一錢

甘油 半錢至 一錢

右調勻、朝夕塗擦于胸部

咯血

○方 羅 咯血因肺結核者

明礬 半錢至 一錢 阿芙蓉 二錢 白糖 半錢

右為散、分六服、每一時、或二時、一服

○方 羅 主治同前

明礬 半錢 血竭 十二錢 白糖 一錢

右為散、分六服、每一時、一服

○方 羅 主治咯血、因肺充血者

實芙蓉刺葉 一兩、至一兩半、浸出、取液 四錢

右每二時、服一食已、咳嗽劇甚者、劑中加阿

芙蓉丁幾 半錢

○方 羅 主治同前

實艾荅利葉末 抱弗兒散 各十二丸

明礬 白糖 各一匙

右為散分十二包每服一包日二次至四次
○方[烏] 主治咯血

鉛糖 實艾荅利末 各一丸
阿芙蓉 半丸 護謨末 十二丸

右為散製劑八個每四時服一劑

○鉛加醋酸劑[丹] 主治劇性咯血
鉛糖 五丸至十丸 阿芙蓉 四分丸至半丸
玫瑰煉劑 適宜

右為二丸每二三時取一劑以後方送下
稀醋酸 二匙 桂皮水 六匙

右調和
○方[鈴] 咯血因肺結核者
鉛糖 三丸 阿芙蓉 一丸

明礬 白糖 各半匙

右為散分六服每一時或每三時一服

○方 主治同前
哮喘止咳越幾 一刃覆盆子水 一匙
右調勻每服一匙布已

○麥奴越幾水[馬] 主治咯血
麥奴越幾 即越兒吳 護謨漿
單舍利別 各半匙 櫻實水 或扁挑水 五匙

右調勻每一時或二時服一食匕
○方[歷] 主治同前
越兒吳 知涅 單寧酸 各一刃

阿芙蓉 五丸 甘草膏 適宜
右為二十九每二三時服一丸

○方[搗] 咯血饒多而諸方無效者
麥奴末 六丸 白糖 五丸

右為散每十分服一劑

○安沒尼鐵水丹方出于腸第扶斯主治咯血

○沒食酸水丹方出于紫班病主治同前

○沒食吐根散丹方出于腸第扶斯主治同前

○的列並飲丹主治咯血劇甚而患者虛衰者

的列並油十密至二十密甘扁挑飲一寫

右調勻每一時服一劑

○鹽酸鍊液一寫

右每服取十滴至二十滴糖水一盞和服

○方

稀硫酸二錢 的列並油 銳烈燒酒各一

右每服取三十滴至四十滴糖水一盞和服

○鍊礬水丹主治肺勞咯血

明礬 九十八 硫酸鍊 二十八

硫酸規尼 四八 稀硫酸 一錢

枸橼舍利別 一寫 蒸餾水 八寫

右調勻每服八分劑一日三次水一盞和服

○箇巴爾篤複方枝爾撒馬主治咳血

枝爾撒骨海霍 篤隆舍利別 或枝爾撒

薄荷水 銳烈燒酒 各一寫

甘硝石精一刃或半錢

右調勻每日服一食匕至三食匕

○莫爾皮下注射法越方出于神經痛

○麥奴越幾注射法越方出于出血病

○單寧酸吸引法丹主治咯血

單寧酸 三入至十二入 水 一寫

右調勻用吸引器

肺癆衝

○方 罌

甘扁桃 去皮者 二匙 水 一升 白糖 一匙
右調勻為飲劑

○方 越 標 主治義膜性肺炎初起熱灼熾盛者

實芟荅里私葉 半匙乃 至一匙

○方 塔 右浸出取液四勺每二時服一食匕

實芟荅里末 吐根末 各十勺

右注沸湯適宜浸出四分時濾過取液五勺加橙皮舍利別半勺每一時服一匕

○方 靈 主治肺炎

實芟荅利葉浸 六勺至十勺浸 取出液六勺 鉛糖 六勺至十勺

阿芙蓉丁幾 六滴至十滴

右調勻每一時服一食匕

○方 越 主治同前

甘汞 五勺六勺 至十勺 藥刺巴末 十五勺一刃 至一匙

右為散頓服或二三回分服

○方 羅 患者體質不壯實病勢不劇烈者

甘汞 五勺 白糖 十勺

右為散製劑八個每三時服一劑

○綠 蒸蘆根 一刃 主治肺燉衝

右浸出取八勺之液

○方 丹 主治肺燉衝胸膜燉衝

綠蒸蘆丁幾 五密至十密 水 一勺

右為一服每三時服一劑

○方 越 主治熾盛肺炎

吐酒石 三勺至六勺 泉水 或橙花水 六勺

屋施淺兒 一勺或白糖 半勺

右調勻每一二時服一食匕

○方 烏 主治肺炎

右調勻、每二時服二食匕

○方調 主治內藏組織炎及粘膜滲出性炎

吐酒石 八分至十分 老利兒水 二分

菩提樹花水 八分

右調勻每一時服一食匕

○方寬 熾熱減退後要祛痰者

吐根末 十五分至一分 注沸湯適量

阿芙蓉丁幾 十滴 蜀葵舍利別 半勺

右調勻每一時服一匕

○方澄

吐根末 一分 吐酒石 一分

右為催吐散

○方越 主治肥硬性肺炎、咯痰困難者

吐根 一分 浸出液 八分 海葱醋蜜 一分

右調勻、每二時服一食匙

○方越 主治熱減退、咯痰困難者

金硫黃 四分 菲沃私越幾斯 一分

右研和、分十二包、每一時服一包

○方澄 主治同前

昇汞 半勺 蒸餾水 四分 甘草越幾 一分

右調勻、每三時服一匕

○方越 主治老人肺炎、咯痰困難者

硝砂加過泥子精 一分至二分 海葱醋蜜 一分

水 六分

右調勻、為飲劑

○方寬 主治老人肺炎、無粘液咯出者

亞兒尼加華 一分至三分 浸出液 四分

安息香酸 一分至一分 遠志舍利別 一分

右調勻、每二時服一食匕

○枸橼酸加里安汶尼劑 丹 肺炎及胸膜炎

枸橼酸加里 百二十 民埕列里精 十八

硝砂香鼠精 三 雙蘭菊丁幾 二十

水 八

右調勻，每四時或六時服六分之一

○幾那安汶尼劑 丹 方出 于 瘰癧 主治肺炎後期

○規尼鐵丸 丹 方出 于 神經痛 主治同前

○武蘭實鷄卵飲 丹 方出 于 貧血 主治同前

○牛肉濃煎 丹 主治同前

牛肉 去皮脂，細到者

右加水三食匕，石臼內搗碎，浸漬二時，加食

塩少許，入磁器，為重湯煎，瀝過，取液五六

每服二三食匕，一日數次用

○方 寫 患者虛脫者

麝香 六分或龍腦 白糖 一分

右為散，分六服，每一時一服

○方 寫 主治同前

迷粟薩水 一 醋酸越的兒 十八

華尼利丁幾 十滴 橙皮舍利別 二

右調勻，每半時服一匙布匕

小兒肺厥衝

○方 寫 主治哺乳兒氣管支炎、肺炎、

吐根 二分至四分，浸 覆盆子舍利別 二

右調勻，每二時服一匙布匕

○方 寫 主治小兒肺炎、胸膜炎

吐酒石 一分 護謨漿 一分

右取一匕，和糖水一盞，每二時服一小匕

○方 寫 主治小兒肺炎

蜀葵根煎 三 吐酒石 三分

甘草舍利別 二

右調勻時々與少許

○方罇 主治同前

甘草 藥刺巴末 各六分 白糖 半匙

右為散分六服一日用

○方罇 主治小兒肺炎熱退者與之

金硫黃 一分 白糖 二刀

右分六包每二時服一包

○方罇 主治同前

吐根酒 或安質液 水 蜀葵舍利別 各一

右調勻每一時與一匙布也

○方罇 主治小兒肺炎呼吸短息者

實艾答利丁幾 一滴至六滴 蒸餾水 一匙

覆盆子舍利別 或石長生舍利別 二匙

右調勻朝夕各服一匙

○方罇 主治腺病性小兒有慢性肺浸潤者

遠志根 半匙 水煎 醋酸缺丁幾 十滴

橙皮舍利別 二匙

右調勻每二時服一匙布也

○方罇 諸症緩慢而粘液分泌饒多者

鉛糖 一分 白糖 二匙

右為散分八服一日或二日服之

肺壞疽 即肺癰

○方罇

幾那皮 半匙 水煎 橙皮舍利別 半匙

右調勻每二時服一匙

○方罇

硫酸規尼 九分 稀硫酸 九滴 水 三匙

右調勻每服一食也

○咯羅兒曹達水 丹 肺壞疽及虛性熱

咯羅兒曹達水 四十至百二十密 阿芙蓉液 三十密

龍腦水 八分

右調勻、每服二食匕、日三次

○方 罇

格羅兒石灰 四十 阿芙蓉 十五分

右為二十丸、每日服二丸至四丸

○鹽酸越的兒飲 丹 主治同前

稀鹽酸 一匙 忽氏鎮痛液 三匙

橙皮舍利別 六匙 橙皮浸 八分

右調勻、每六時服六分之一

○方 罇 主治肺壞疽

的列並油 或參兒、或結列阿曹篤、

右和水四分、納吸入器上、火封其蒸氣

○方 罇 主治肺病

結列阿曹篤 五滴 硫化越的兒 十滴

右注沸湯一碗、吸入其氣

○結列阿曹篤吸引法 丹 方出慢 性滲膜炎

○方 罇 主治肺壞疽、咯痰有惡臭者

過酸化滿掩 一分 稀鹽酸 三分

右入罇鍋上、微火薰病室

○方 罇 主治同前

鹽酸石灰 一分 水 四十 鹽酸 或硫酸 二三滴

右入陶壘、以一管、接口或鼻、吸入其氣

○方 罇

鹽酸加爾基 十八 蒸餾水 六分

右調勻、為含嗽劑

肺勞

○依蘭苔煎 [珍]

依蘭苔 一弓半 注熱湯軟解 煮取液六弓

櫻實舍利別 一弓 老利兒水 二匙

右調勻 一日服

○依蘭苔傑列乙 [珍]

依蘭苔 一弓至一弓半

右注泉水適宜 煮取液四弓 加白糖一弓半 為傑列乙之稠 一日服

○依蘭苔規尼膠 [丹]

依蘭苔 各一弓 蛤刺賢苔 各一弓

右加牛乳一巴半 上文火煮一時 瀝過去滓 和白糖三弓 複方規尼丁幾半弓 每服一食匕 一日盡之

○方 [珍]

主治同前 百爾蘭獨留謨 葛刺賢苔 各一弓 甘草 半弓

右調和 取一茶匕 以水二碗 煎服

○牛乳石灰水 [丹]

石灰水 一弓至四弓 牛乳 四弓

右混和

○鷄卵乳酥牛肉浸 [丹]

上好西國米 洗淨者 水 十弓

右上火 令煮熟 和乳酥十弓 鷄子黃四個 牛肉浸四十弓 更煮而攪和 供用

○鷄卵湯 [珍]

卵黃 一箇 温湯 三四碗

右攪和 加白糖適宜

○人工鹽乳 [丹]

精製膠 半弓 大麥煎 熱沸者 半巴

白糖 一弓 新鮮牛乳 一巴

右先取前二味 溶解 加後二味

○又方〔冊〕主治同前
牛脂細剉者 一字

右盛布袋投于牛乳四十字中上火煮之、後加白糖或里鳩兒酒適宜調味

○牛乳麥粉鍊〔冊〕主治同前

麥粉 一食匕 鷄卵 一個

加糖炭酸鍊 二十字 牛乳 半匕

右混和加肉豆蔻及白糖調味供食料

○滋養潤和飲〔冊〕主治同前

亞刺比亞漿 甘扁桃和劑 牛乳 各半匕

冰糖或蜂蜜 適宜 里鳩兒酒 一食匕

右調勻為一日之量

○又方〔冊〕主治同前

魚膠 二食匕 牛乳 一大茶碗

巴且杏 搗碎者 白糖 二三塊

右煮攪和一日一二次溫服

○白酒漿〔冊〕主治同前

牛乳 半匕 設里酒 一二酒盞

右煮而濾過加砂糖調味

○武蘭寶鷄卵飲〔冊〕方出主治同前

拔爾撒篤隆 一或或草露 護謨末 一或

鷄子黃 一個 白糖 半字 水 六字

右調勻每服一食匕

○肝油傑列乙

肝油 八十五分 魚膠 三分

白糖 八分 水 四分

右調和

○肝油擦藥〔冊〕主治肺勞不能服肝油者

肝油 十四字 硝砂香竇精 一字

阿片丁幾 二匙

刺賢埤兒油 三十密

右調勻、朝夕取半劑塗擦于胸腹

○又方〔丹〕主治同前

肝油 一匙

加那普的油 一匙

右調勻、臨卧塗擦于胸部

○方〔糖〕主治咳嗽劇甚者

莫爾非 二匙

老利兒水 二匙

右調勻、每半時服六滴至八滴

○方〔糖〕主治同前

莫爾非 十二分 一匙 白糖 半匙

右為散、每服一劑、一日二三次

○莫非曹達散〔方〕出于氣管支炎 主治同前

○方〔糖〕主治同前

莫若越幾 二匙

鯨腦油 一匙

白糖 半匙

右為散、每三四時服一刃尖

○方〔糖〕主治同前

撒爾非越幾 一匙

醋酸莫爾非 三匙

黑櫻寶水 三匙

右調勻、每服一匙布已

○發那安沒尼劑〔丹〕主治同前

硝砂香窟精

呀囉防精 各七匙

鹽酸莫非水 二匙

黃幾那丁幾 三匙

黃幾那流動越幾 四匙

右調勻、取一茶匙、葡多酒一盞和服、日三次

○方〔丹〕主治肺勞咳

的里答幾斯 八匙至十匙

右為二丸、臨卧用

○方〔糖〕主治咳嗽劇甚者

阿片越幾

實斐答利斯 各十五

葛首越幾 半匙

蜀葵根末 適量

右為三十九、每夜臨卧、服一丸

○方_楷 主治心悸亢盛、胸中苦悶者

實芟荅利葉 半分 莫爾非 十五分 一

重碳酸曹達 四分

右為散、每二三時、服一劑

○方_越 急性肺勞、脈搏亢盛、或有咳血者

實芟荅里斯葉 或綠藜蘆根 一丸、
浸出、取液八分

老利爾水 一匙

右調勻、每一時、服一匙

○方_歷 主治急性肺結核

實芟荅利葉 十五分 阿芙蓉 二分

華氏越栗失爾 一匙 覆盆子舍利別 一匙

右先取前一味、浸出、取四分之液、加後三味

調和、每一時、服一食匕

○次亞磷酸曹達 飲 主治肺勞、疳勞 方出舞
蹈病

○方_越 主治肺結核

次亞磷酸曹達 一匙至水 六分

右調勻、每二時、服二食匕

○鐵失鳩荅丸 主治肺勞初期

碳酸鐵丸 六十八 失鳩荅越幾 三十六分
至六十分

右為二十四丸、每服二丸、日二三次

○方_楷 肺勞、發發氣管支炎、痰沫太多者

單寧 二分 阿芙蓉 三分 一

右為散、每三時、服一劑

○沒藥散 主治慢性氣管支炎

沒藥 一匙 炭酸加里 半匙 薄荷水 八分

硫酸鐵 十二分 蜀葵舍利別 一分

右調勻、每服一食匕、日四次

○方_寫 主治肺勞

結列阿曹篤 二十滴 鉛糖 十八

甘草末 半匙 葛斯加栗越幾 適宜

右為四十丸、衣桂末、每服四丸、日三次

○方馬 主治肺粘液勞

結列阿曹篤 十二滴 甘扁桃油

亞刺比護謨 各二匙 蒸餾水 四勺

蜀葵舍利別 六匙

右調勻、每三時、服一食匕

○次鍊肝油劑 丹 主治腺病、肺勞、虛性微毒

次鍊舍利別 四匙 達刺侃篤漿 一勺

肝油 四勺半

右調勻、每服一食匕、日二三次

○方越 主治肺勞

次度加里 二匙 水 十二勺

右調勻、每朝夕、服一食匕、至二食匕、

○方塔

規尼 六八至 十二八 莫爾非 一八

右為散分六包、每服一包、日二次

○方斯 主治肺勞、寒熱往來者

硫酸規尼 三八至 六八至 稀硫酸 三滴

橙皮舍利別 四匙 蒸餾水 三勺至 四勺

右調勻、每一時、服一食匕

○規尼合劑 丹 主治肺勞、癢汗 方出干 紫斑病

○方馬 主治脫汗

鹽酸 一匙 幾那越幾 半匙 甘草末 適宜

右為六十丸、每服五六丸、日三次

○沒食酸丸 丹 主治勞瘵、脫汗

沒食酸 四八 印度大麻越幾 半八

玫瑰花煉劑 一八

右為一丸、每夜臨卧、服一劑

○又方 治同前

沒食酸 八分 玫瑰舍利別 適宜

莫爾非 四分 或一或印度 大麻越幾 半

右為一丸 每夜臨卧 服一丸

○方 治汗甚者

撒爾非 二錢 浸出 取夜五字 橙皮舍利別 半

右調勻 每服一食匕

○方 治汗及痰沫太多者

單寧酸 六分 至 阿芙蓉 二分 白糖 一錢

右為散分 六包 每服一包 日二次 至四次

○方 治夜汗

單寧 一司 玫瑰昆設爾帶 適宜

右為三十五丸 每夜服一丸 至四丸

○亞鉛華丸 治勞瘵 盜汗太甚者

亞鉛華 十二分 菲阿斯越幾 或失魁答越幾 十八分

右為六丸 每夜臨卧 服一丸

○方 治同前

落葉松茸 橙皮油糖 各半錢

右為散分 六包 每服一包 日二次 至四次

○鐵椰子油劑 治虛脫甚者

○鐵油質劑 治同前

○規尼鐵劑 治同前

○鐵百布失涅丸 治同前

○鐵鹽酸劑 治同前

○鐵安沒尼劑 治同前

○鐵枸橛酸加里劑 治同前

○燐酸鐵劑 治同前

○方 治肺勞 有下利 要收斂者

槲皮 或槲實 或刺答尼根 半

右水煎取八字之液用

○方 治同前

刺答尼越幾十 莫爾非一 白糖一

右為散分六包每服一包日二次至四次

○方 治勞瘵下利

格綸僕二 煎取五 沙列布漿二

阿芙蓉一 至二 橙皮舍利別一

右調勻每二時服一食匕

○方 治肺勞

鈴糖 實芟答利末各十 阿芙蓉六

甘草末一 野菊花越幾適宜

右為六十丸每服六丸一日二次

○麻知胡刺答尼飲丹 方出于腸第扶斯 主治勞瘵下利

○阿仙藥合劑丹 方出于干下利 主治同前

○吉納坎百設木劑丹 方出于腸第扶斯 主治同前

○木炭煉劑丹 方出于干下利 主治同前

○炭酸蒼鉛劑丹 方出于腸第扶斯 主治同前

○酸化銀丸丹 主治同前

酸化銀一 至二 香竈散二

印度大麻越幾半 甘油適宜

右研和為一丸一日服三劑

○收斂灌腸法丹 方出于腸第扶斯 主治勞瘵下利

○青酸吸引劑丹 主治肺勞喉頭潰瘍等

稀青酸二十 菲阿斯丁幾

忽布丁幾各一 熱湯八

右調勻以吸管吸引其蒸氣

○沃實謨吸引方丹 主治肺勞

沃實謨一分 哥羅呀五分

右溶和納硝子蠟接鼻孔嗅入或取沃實十

氏上火用漏斗接鼻孔嗅入其蒸氣

○沃實吸引劑丹

沃實丁幾

三十密

熱湯 四多

右調勻、謹重、吸引其蒸氣

○單寧酸吸引法 丹方出 于咯血

血液循環器病

心囊、心筋、及內膜炎

○重碳酸加里飲 丹方出于 急性風濕 主治心囊炎

○酒石飲 丹方出于 刺衝熱 主治同前

○鹽酸加里飲 丹方出于 急性風濕 主治同前

○病院白飲 丹方出于 尿毒病 主治同前

○蘆薈梅那瀉利鹽劑 丹方出于 腫瘍 主治同前

○攝度律篤散 丹方出于 于充血 主治同前

○甘汞下劑 丹方出于 于腦液衝 主治心臟液衝

○方 丹方出于 于腦液衝 心囊及心臟液衝

稀磷酸 一匙

覆盆子水 一匙

右調勻為飲劑

○方 丹方出于 于腦液衝 主治同前

枸橼酸 十八至 二十

蒸餾水 一匙

覆盆子舍利別 一

右調勻為飲劑

○方_證 主治同前

實艾答里葉 十片至一尺，注沸湯適宜，浸出四分時，濾過取液五

覆盆子舍利別 半

右調勻，每二時服一匕

○方_證 主治同前

實艾答里葉 一錢 半 老利兒水 二

右調勻，每二時服十五滴，至二十滴

○方_證 主治同前

扁桃乳劑 八 硝石 一

右調勻，每一時服二匕

○沃度加里雙鸞菊合劑_丹 方出 于痛風 主治心囊炎

○方_證 急性心臟炎

實艾答里葉 十五片至二尺，浸出液六 硝石 一

孕禁酒石 二 亞刺比亞漿 醋蜜 各一

右調勻，每一時服一二食匕

○方 小兒僕麻質性心囊炎

實艾答里葉 六片，浸出液三 硝石 一

吐酒石 四分 一 格爾失屈實酒 一

覆盆子舍利別 一

右調勻，每一時服一小兒匕

○幾那安汶尼劑_丹 主治心臟或大血管有

雜質之沈着者 方出于 膿毒証

○方_證 主治心囊炎、虛脫甚者

龍腦 十 護謨 三 蒸餾水 六

硝砂加過泥子精 越的兒舍利別 一

右每一時，或每半時，服一食匕

○水銀軟膏_丹 心臟及囊炎

右塗擦心部

○方_拾 主治同前

沃度加里 一匙

單軟膏 六匙

右混和為塗擦劑

心囊水腫

○方_拾 主治胸水及心囊水腫

硝石 二匙

金硫黃 六匙

白糖 一匙

右為散分六包每服一包日三次

○方_拾 主治同前

實麥答里丁幾

格爾失屈實丁幾

各二匙

甘硝石精 一刃

右調勻朝夕取二十滴白糖和服

○方_拾 主治同前

萬苜越幾 二匙至四匙

實麥答里葉 半匙

白糖 半刃

右為散製劑十二個每二三時服一劑

○方_伍 主治同前

藥刺巴 半匙

甘汞 二匙

實麥答里葉 一匙

右為散製劑八個每三時服一劑

○方_捌 主治同前

煙草

半匙至一匙浸出液四匙

桂舍利別 半匙

右調勻每二三時服一食匕

○實麥答里剝篤亞斯水 主治心臟水腫

剝篤亞斯水 一匙或二匙

甘硝石精 六匙

洎夫蘭丁幾 三匙

實麥答里浸 十一匙

單舍利別 六匙

水 八匙

右調勻每服六分之一日三次

○方_拾 主治心囊水腫

馬尾草 一匙水煎取液五匙

酒石葉液

海葱舍利別 各半勺
右調勻、每服一食匕

○方 湯 主治同前

遠志根 一匙
實芟答利葉 一刃
萬苴越幾 一刃
白糖 三匙
右先取前二味、注沸湯、浸出半時、濾過取液、六勺、加後味、每二時服一食匕

障膜病

○方 湯

實芟答利葉 十五勺至一刃 注熱湯、浸出四分時、濾過取液、五勺
老利兒水 一匙
覆盆子舍利別 勺
右調勻、每一時服一匕

○方 散

實芟答里末 六勺

九

托弗兒散 九

九

白糖 一

匙

右為散、分六包、每服一包、日二三次

○方 散

扁桃乳劑 六勺

六勺

亞美翼達里涅 八勺至

右調勻、每二時服一匕

○方 散

青酸亞鉛 二勺至

四勺

枸椽油糖

白糖 各二勺

右為散、分八包、每服一包、日二次、至四次

○方 歷 主治障膜病、夜間煩躁甚者

硫酸莫爾非 二勺

二勺

苦扁桃水

橙花水 各一

勺

右調勻、每夜臨卧、服一茶匕

○方 三尖辨不全、及靜脉口狹窄

海葱丁幾 十滴

消酸 六滴

菲阿斯越幾 三勺

清水 一勺半

右調勻、每服一匙、日數次

○方_栴 主治三尖辨不全症、發水腫者

甘汞 實芟答利斯各半 茴香油糖半

右為散、每三時服一劑

心臟肥大

○方_栴 主治心臟衝搏太甚者

雙鸞菊越幾八分 菲阿斯越幾十六分

右為八丸、每四時、或每八時、服一丸

○實芟答利劑_栴 主治同前

實芟答利斯浸十二 過泥子水八分

右調勻、每二三時、或四時、服六分劑一

○又方_栴 主治同前、兼胃刺衝者

實芟答利丁幾一匙至二匙 複方益智丁幾六匙

稀青酸二十密

龍腦水八分

右調勻、每服六分劑、一日三次

○又方_栴 主治同前

芳香硫酸二匙 實芟答利丁幾一匙

阿片流動越幾三十密 竜胆浸八分

右調勻、每服六分劑、一日三次

○方_栴 主治心臟撞突太甚者、及心臟衰弱

米幹擗實丁幾三匙至六匙 水八分

右調勻、每四時、或八時、服八分劑一

○苦味安沒尼水_栴 主治患者虛脫、而煩悶太

甚者方出于 猩紅疹

○越的兒武蘭實飲_栴 主治同前方出于 第扶斯

○規尼鐵劑_栴 主治衰弱甚者方出于 紫班病

○鐵百布失涅丸_栴 主治同前方出于 貧血

○燐酸鐵劑_栴 主治同前方出于 紫班病

○幾那安沒尼劑丹 主治同前方出于癰疽

心臟痙攣 即胸痞

○方鑑

格爾夫屈實酒 三勺 舍電阿芙蓉液 二勺

右調勻、朝夕各服二十滴、至三十滴

○方鑑

忽氏砒石丁幾 半勺 桂皮水 三勺

右調勻、每服二滴、至五滴、日二次

○方鑑

萬草越幾 二勺 實艾答里葉末 半勺 白糖 二勺

右為散、製劑八個、每二時服一劑

○方鑑

阿芙蓉丁幾 一匙 老利兒水 二勺

右調勻、每二時服十滴、至十五滴

○方鑑

格爾夫屈實丁幾 二匙 舍電阿片液 二十四滴 至

右調勻、每服十滴、至十五滴、日三次

○方鑑

硫酸規尼 十二勺 蘆薈越幾 三勺至六勺

蒸餾水 三勺 稀硫酸 十二滴

右調勻、每四時服一匙

○曹達莫非劑丹 主治胸膈發作

重碳酸曹達 十五勺 莫爾非水 十五匙

稀青酸 五匙 葛私加栗浸 一勺

右調勻、頓服

○越的兒合劑丹 主治胸膈及諸痙攣性病

越的兒精 九十匙 硝砂香竈精 二匙

良岩丁幾 三十匙 複方哥羅防丁幾 四十匙

龍腦水 四勺 羌青丁幾 八十密
右調勻、每半時、服二食匕、至疼痛止

心悸亢盛

○方 證 主治心悸亢盛

實芟荅利末 六 阿芙蓉 一八至 白糖 一
右為散、分六包、每服一包、日二次

○方 證 心悸亢盛、夜間發作者

重碳酸曹達 一匙 黑櫻實水 五勺
扁挑舍利別 半勺

右調勻、每二時、服一匕

○方 證 心悸亢盛

老利兒水 二匙 莫爾非 一八

右調勻、每二時、服十滴、至二十滴

○方 證 主治同前

硫酸規尼 六八至 稀硫酸 半 蒸餾水 六
九八

右調勻、每二時、服一匕

○方 證 心悸亢盛、夜間發作者

炭酸麻偈涅失 一 枸橼油糖 白糖 各一

右為散、每服一匙布匕、一日三次

○方 證 主治神經性心悸動

阿魏丁幾 二匙 葛私多儂丁幾 半匙

右調勻、每二時、服二十滴、至二十五滴

○格魯刺兒水 證 主治同前 方出于
瘧藥

○方 證 主治心悸動

實芟荅利丁幾 一匙 龍腦醋劑 一

櫻實水 四勺 單舍利別 六匙

右調勻、每服一食匕、日三次

○方 證 主治神經性心悸

實麥答利丁幾

收斂越的兒 各等分

右調勻、每十分時、取六滴、至十滴、白糖和服

○方 羅 主治併私的里性心悸

顯草丁幾 二錢

阿狸香丁幾 半錢

右調勻、每服十滴、至十二滴

○方 烏 主治心病、喘息、氣管炎

實麥答利末

海葱末 各十二分

菲阿斯越幾 十八分

右為十二丸、每服一丸、日二次

○方 羅 主治神經性心悸

實麥答利葉末 一錢

硫酸莫爾非 三分

萬苣越幾 半錢

右為六十九丸、每服一丸、日二次、至四次

○方 羅 主治同前

實麥答利丁幾

葛私多儂丁幾 各半錢

舍電阿芙蓉液 二錢

右調勻、每服二十五滴、至三十滴、日三次、糖

水和服

○莨菪結礬丸 羅 主治心悸尤盛、駛疾者

莨菪越幾 五分

結礬 三分

竜胆越幾 九分

右為二十九丸、每服一丸、日三次

○安汶尼合劑 羅 主治同前

方出于 膿毒症

○顯草酸規尼丸 羅 主治同前

方出于 併私的里

○實麥答利斯劑 羅 主治同前

方出于 藏肥大

○菲阿斯大麻丸 羅

印度大麻越幾 四分

莨菪越幾 一分

菲阿斯越幾 四分

右為一丸、每十二時、或每二十四時、服一劑

○規尼缺劑 羅 主治心機能變常、兼貧血者

硫酸規尼 十二分

過咯味缺丁幾 二錢

番木鱉丁幾 一匙 忽布丁幾 六匙

瀉利鹽 一匙 忽布浸 八号

右調勻、每朝飯後三時、服六分之一

○鍊安沒尼劑 丹 主治同前 方出併私的里

○鍊枸椽酸加里劑 丹 主治同前 方出于食血

○鍊私的列幾尼劑 丹 主治同前 方出依卜昆埋兒

動脈焮衝

○方 鑑

實麥答利葉浸 五号 以十八至二十入浸出者

硝石 一匙 至 單舍利別 半号

右調勻、每二時、服一食匕、至二食匕

○方 鑑

水銀軟膏 二匙

醋酸莫爾非 六号

右混和塗擦于患部

跳血囊

○方 鑑 大動脈跳血囊

實麥答利葉 十八、至二十五入、浸出四分時、濾過取液六号

老利兒水 一匙 蜀葵舍利別 一号

右調勻、每二時、服一食匕

○方 鑑 主治同前

老利兒水 二匙 實麥答利越幾 四号

右調勻、每服取十五滴、白糖、或糖水、和服

○方 鑑 主治同前

實麥答利葉 半匙、以沸湯適宜 硝石 一匙

格爾失屈實丁幾 二匙 單舍利別 一号

右調勻、每二時、服一匕

○方 主治跳血囊

實芟塔利末 二錢至三錢 白糖 半斤

右為散、製劑八個、每服一劑、日三四次

○方 粗 主治急性、及慢性心病、跳血囊

實芟塔利葉 半錢、浸出液六錢 硝石 二錢

老利兒水 一匙半至二匙 櫻實舍利別 一錢

右調勻、每二時服一食匕

○方 鑿 大動脈跳血囊、疼痛甚者

老利兒水 二錢 醋酸莫爾非 一錢

右調勻、每一時、取十五滴、糖水和服

○方 受 大動脈跳血囊

鉛糖 三錢至六錢 阿芙蓉 一錢至三錢 乳糖 一錢

右為散、分六包、每服一包、日二三次

○方 鑿 主治同前

單寧酸 八錢至十二錢 阿芙蓉 二錢 白糖 四錢

右為散、分四包、或六包、每服一包、日二次、至四次

○方 鑿 主治同前

稀硫酸 一匙 櫻實水 一匙 覆盆子舍利別 一錢

右調勻、為飲劑

○方 鑿 主治同前

明礬 十二錢至十八錢 護謨末 白糖 各半

右為散、分六包、每服一包、日二三次

○方 鑿 主治同前

扁桃乳 以甘扁桃一牙製者、八錢 苦扁桃水 一錢

石長生舍利別 半錢

右調勻、為飲劑

○方 鑿 主治同前

白葡萄酒 一廿 海葱

藥刺巴 各一錢 硝石 一牙半

右調勻、每服二食匕、至三食匕、日三次

○方_司 主治腸骨動脈跳血囊、及水疔

礪砂_三 泉水_一 醋 亞爾箇兒_{各八}
右溶和、蘸布片、為卷法

靜脈腫

○方_黑 主治妊婦靜脈腫

礪砂_三 醋_六

右溶和、為浴法

○方_正 初生兒頭顱血腫

礪砂_一 海葱醋_一 淨水_十

右調勻、為卷法

○方_醫 主治同前

礪砂_二 淨水_一 亞爾箇兒_一

右調勻、為卷法

○方_越 主治同前

甘油_一 蓖麻子油_二

右調勻、蘸綿絮、貼于患部

○方_軍 主治靜脈腫

阿芙蓉_半 蓬砂_一 玫瑰軟膏_半

右調和、塗擦于患部、日二次

○密陀醋_二 初生兒頭頂血腫

右為卷法

○方_匱 主治妊婦脚靜脈腫

篤爾面室刺 榆皮_{各一}

右以蒲萄酒適宜、煎而下火、加失鴉答葉一

子、浸漬四時、濾過、取液一匕、加後味

密陀醋_一 蟻精_四

右調勻、洗患部、且蘸布片、貼患部

○方 主治畢丸靜脈腫

明礬 一錢至二錢 泉水 六分

右溶和為罨貼劑

○方 主治同前

硫酸亞鉛 一錢至二錢 榆皮煎 十号至十二号

右溶和為罨貼劑

○方 主治同前

水楊皮 或七葉樹皮一号 泉水 九号或十二号

右煎取液六号為罨貼劑

對症方選卷之二 終

版權免許 明治八年十二月八日

白川縣士族

從六位高橋正純

大阪府第一區大區十七小區
淡路町四丁目六番地寓

大阪心齋橋通南二丁目
松村九兵衛

同 唐物町四丁目

淺井吉兵衛

東京馬喰町三丁目

鳴村利助

西京御幸町姉小路七

藤井孫兵衛

發兌書肆

