

詳校官助教 李巖

欽定四庫全書

普濟方卷八十八

諸風門

中風

活命金丹

衛生寶鑑

治中風不語半身不遂肢節頑痺痰

涎上潮咽隘不利飲食不下牙關緊噤及解一切藥

明 周王朱橚撰



毒酒毒發熱腹脹大小便不利胸膈痞滿上實下虛

欽定四庫全書

普濟方

氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問老幼  
男子婦人俱宜服之

貫衆 甘草 板藍根 砒硝 乾薑 各一兩一作乾葛

龍腦 研 麝香 研 青黛 三錢上二味同 牛黃 研 生犀 研 珠子

末 薄荷 各半 川大黃 一兩半 辰砂 四錢一半入桂藥一半為衣

三兩

右為末與研藥一處攪勻煉蜜同水浸蒸餅為劑每  
兩作十丸別以硃砂為衣就濕真金箔四十箔為衣

臘月修合磁器收貯多年不壞如療風毒茶清化下  
解藥毒新冷水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱薄  
荷湯化下已上並量病大小加減用之大有效一無  
貫衆

牛黃鐵粉丹 御藥院方 治中風痰甚精神昏憤語言蹇澀

手足不隨諸病不效服之神驗

牛黃 膩粉 硃砂 麝香 生犀木 腦子 研

鉛白霜 雄黃 各一分 南星 牛膽製 鐵粉 川砒硝

人參 各半兩

金箔

銀箔

大者各十片

右研細煉蜜和丸如雞頭大每服二丸以薄荷湯化

下

紅雪通中散

出聖濟總錄

大青

別研一兩

硝石

五斤煎藥後下

丹砂

別研半兩

桑根白皮

一兩

羊角

鎊半兩

蘇枋木

二兩

梔子仁

一十枚

槐花

一兩

升麻

一兩

半淡竹葉

二握訶黎勒

一十五枚去核

大腹

檳榔

各五枚剉

右別研丹砂大青外餘並粗搗篩用水一斗浸一宿

煎至五升去滓入銀石鍋即下硝石丹砂大青不住

手攪候沫水盡即成紅雪置瓷器中三日取出搗羅

為末即用瓷餅盛不得泄氣有皮風疾者即及一切

滯悶不通臨卧用溫水調下二錢匕小兒半錢匕亦

治傷寒

附子湯

出聖濟總錄

治中風欲死身體緩急目不得開強

舌不能語

芍藥

甘草

炙

麻黃

去根節先煎掠去沫

白朮

各一兩

防風

去

防已各一兩半 附子炮製去皮臍一枚 人參 黃芩去黑心 桂去粗

皮獨活去芦頭 芎藭各一兩 天雄炮裂去皮臍一枚

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎八分去滓空心日午夜卧各温服如人行五里以熟生薑粥投之微汗出慎外風

五靈脂丸

出聖濟總錄

治中風精神昏昧四肢縱緩言語

塞澁

五靈脂

別為末

附子

炮製去皮臍

天麻

各五兩

白殭蠶

生天用

南星

生用烏頭酒浸

烏蛇

酒浸去皮骨炙各三兩

地龍

去土

蛇

酒浸去皮骨炙各五兩

白附子

生用

牛黃

龍腦

麝香

各二錢並細研用

右為末用醇酒五升以五靈脂末並入細麪一兩同煎成膏與衆藥杵丸如雞頭實大每服一丸用葱白二寸生薑一寸細剉酒一盞煎臨熟去滓入薄荷汁少許放温磨下

神照散

出聖濟總錄

治中風昏塞肢體不收口眼喎斜



木香 白茯苓 芍藥 茯苓子炒去角 人參 獨

活去蘆頭 黃耆剉各一分 附子炮製去皮臍 遠志去心各三分 草

薛 茵芋各一兩 梔子仁二兩

右為末每服一錢匕溫酒調下加至二錢三錢匕空

心日午夜卧服

苦參丸出聖濟總錄 治中風餘熱未退頻服前湯力不能

攻更服方見本門風熱類

獨活湯出聖濟總錄 治中風五臟奄忽不能言四肢垂曳

皮肉瘡痺痛癢不知

獨活去蘆頭三兩 防風去叉 芍藥 白茯苓去黑皮 當歸切焙

葛根 桂去粗皮各二兩 細辛去苗葉 甘草炙各一兩 附子炮製去皮

臍一兩 麻黃去根節先煎掠去沫焙三兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至

八分去滓空心日午夜卧溫服若初得病自有汗減

麻黃宿有滯氣加吳茱萸湯洗七遍炒二兩厚朴去

粗皮薑汁炙一兩乾嘔加附子炮製去皮臍一兩噦

加陳橘皮湯浸去白二兩若胸中吸吸少氣加大棗  
去核十二枚心下驚悸加茯苓去黑皮一兩若熱去  
生薑加葛根初得風不須加減即依本方服四五日  
以後更視病虛實或再加減

鐵粉散

出聖濟  
總錄

治中風涎潮搐搦口眼喎斜手足垂

鞞及沐浴時傷風產生後中風等

鐵粉 研四兩 天麻 一兩 蠍梢 炒一分 白殭蠶 直者炒一兩 白附  
子 炮半兩 烏頭 炮製去皮骨 白花蛇 酒浸去皮骨炙各三分 桂 去粗皮半

兩 麝香 龍腦 各一分 丹砂 一兩三味  
同研細

右以前八味搗羅為末以後三味合研令勻每服一  
錢匕薄荷汁和酒調下臘茶清亦得如病勢危急研  
龍腦膩粉薄荷水調服小兒驚風半錢匕

防風湯

出聖  
惠方

治中風不語兩目不開手足抽掣發歇

往來昏塞涎潮

防風

去粗皮 羚羊角 鎊

赤箭

獨活

去蘆頭

當歸

切焙 麻黃

去根節 桂皮

杏仁

赤箭

獨活 湯浸去皮尖雙

前胡

去蘆頭

甘草

灸秦艽去苗土 各半兩

右粗搗篩每服四錢匕以水一大盞生薑半分切煎至七分去滓不計時溫服

人參順氣散一名通氣驅風 湯出直指方

治男子婦人血氣虛弱

虛風攻症肌體顫掉肩輦刺痛手足拳攣口眼喎斜半身不隨頭目旋暈痰涎壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣短客氣所湊四肢拘急鼻塞頭痛脾胃不和心腹刺痛胸膈不快少力多困精神不爽不思飲食

嘔吐惡心霍亂吐瀉胎前產後俱是風虛百病皆可治之此藥常服調榮衛進食去風通滯氣

天台烏藥五兩 桔梗去蘆 頭 川白芷 川芎 甘草炙

陳皮去白 白朮各二兩半 麻黃 枳殼去穰 麩炒 乾薑炮

錢人參去芦 半兩

右細末每三錢水一盞薑三片棗一個煎八分食前服若傷風鼻塞頭痛葱白薄荷同煎服婦人血氣當歸煎服一方去白朮人參加殭蠶炒去絲嘴 各一兩 乾薑半兩



細末生薑薄荷同煎治風氣不順手足偏枯流注經絡並濕毒進襲腿膝攣痺筋骨疼痛大有功效若用治風去薄荷增棗煎名烏藥順氣散血虛生風氣痺之狀亦類中風世人呼曰中風所謂熱則生風益大綱之論其實疼痛癱瘓縱掣攣痺之證因於血虛氣不流行者為多間有起居不節為賊風所中亦必因虛而得故治風以暖散中通為先通則痰氣不薰蒸風亦自得以攄散小續命湯古今治風良法也但無

通氣藥不可獨用復以此藥兼而治之成功必矣一方無乾薑用紫蘇木瓜湯調末服一方治閃挫身體不能屈伸溫酒調下一方治搔癢抓成瘡薄荷煎服一方每料加天麻一兩沈香五錢常服疏風通滯氣調榮衛進飲食

加減續命湯

一名小續命湯出濟生方

治中風不省人事漸覺半

身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體痿痺神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸骨



節煩疼不得轉側亦治脚氣弱緩熱久服之瘥有風  
病人每遇天色陰晦節候變更宜預常服不可缺以  
防瘡啞

麻黃去根人參 黃芩 白芍藥 川芎 甘草

防已 杏仁去皮尖炒桂各二兩 防風一兩半 附子炮去皮臍有熱

用者白附子以上係

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不  
拘時候溫服取汗隨人虛實與所中輕重也筋急拘

攣語遲脉弦加薏苡仁治筋急加人參黃芩芍藥以  
避中寒服後稍輕再加當歸全愈脚氣痺弱不能轉  
側心神恍惚加茯神遠志骨節煩疼有熱者去附子  
倍加秦艽煩燥大便澁去附子倍芍藥加竹瀝臍寒  
大便自利去黃芩加白朮附子骨肉疼痛者加肉桂  
附子煩燥多驚者加犀角嘔逆腹脹人參半夏無汗  
出麻黃語言蹇澁手足顫掉石菖蒲竹瀝大便秘胸  
中不快枳殼大黃氣塞沈香有痰南星數片發渴麥

門冬乾葛瓜根身疼秦艽上氣浮腫喘急防風桑白皮以上所加各一兩小兒慢驚煎取藥汁一盞入生薑汁再煎一二沸日三服夜二服夏間又有熱者減桂一半春加麻黃一兩夏加黃芩一兩秋加當歸四兩冬加附子半兩風虛加川芎一兩一方加木香縮砂獨活各一兩川烏炮三分亦效牙關緊用南星末半錢龍腦一分頻擦牙上令熱即開若便痢產後失血并老人小兒加麻黃桂心甘草各二兩若或歌或

哭或笑語無所不及用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無附子防風生薑有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白朮若脚弱加牛膝石斛各一兩若腰疼加桃仁杜仲各半兩若失音加杏仁一兩深師方有白朮無杏仁救急方無川芎杏仁延年方無防風葉氏方有羌活川烏當歸無防已外臺方無防已加石膏忌猪肉冷水海藻葱菜一方無棗煎名防已湯此方諸風通治然有感受不同法須兼服一曰首風因沐

頭而感多汗惡風當先風一日而病頭痛不可出至日則少愈用熟附子一箇鹽等分二味為散沐了以方藥摩痛上令藥行二曰漏風因醉而感多汗少氣口乾而渴近衣則身熱如火欲食則汗出如浴骨節急隋用澤瀉白朮各一兩為末每服二錢酒飲任下空心名白朮湯三曰內風入房室而成惡風多汗沾衣口乾上瀆不能辛苦肢體盡疼生附子人參各半兩苗香茯苓山藥各一分甘草乾薑各三分為散每

用四大錢薑三片少鹽煎食前名附子湯一方中風卒失音濃煎桂末三服效云喉痺用本方

麻黃續命湯

出技 粹方

治中風不審六經之形證加減雖

治與不治無異也開則洒然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之中風無汗惡寒

麻黃 防風 杏仁

依本方加一倍宜鍼太陽經至陰出血崑崙舉蹻

小續命湯

出技 粹方

中風有三內經曰人之氣以天地之



疾風名之故中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年過四旬氣衰者多有此疾壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治法和臟腑通經絡便是治風然輕重有三中血脉則口眼喎斜亦有賊風襲虛傷之者也中腑則肢廢中臟則性命危急此三者治各不同如中血脉外有六經之形證則從小續命加減及疎風湯治之中腑內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利外無六經之形證內

無便溺之阻隔宜養血通氣大秦苳湯羌活愈風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脉中腑之病初不宜用龍腦麝香牛黃為麝香治脾入肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風入骨髓如油入麩莫之能出又不可以概用大戟芫花甘遂瀉大便損其陰血真氣愈虛方列於後治風經驗方

- 麻黃去節 人參去蘆 黃芩去心 芍藥 甘草炙 川芎
- 杏仁麩炒去皮尖 防己 官桂各一兩 防風去蘆頭 附子



炮去皮臍  
細剉半兩

右除附子杏仁搗為粗末後入二味令勻每服五錢  
水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓稍熱服一方  
有熱者加桂枝麻黃各用半兩黃芩加作二兩去附  
子一本云恍惚者加茯神遠志錄驗方有白朮不用  
杏仁救急方無川芎杏仁延年方無防風昔人有久  
患脚弱服此六七劑乃愈有風疹人天陰節輒合服  
之可以防瘡啞

附子續命湯 出按 粹方

治中風無汗身涼

附子 加一倍 乾薑 加二兩 甘草 加三兩

宜鍼隱白以去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂枝續命湯 出按 粹方

治中風有汗惡風

桂枝 芍藥 杏仁

依本方加一倍宜鍼風府此一證太陽中風

白虎續命湯 出按 粹出

治中風身熱無汗不惡寒

石膏 知母 一料中各加二兩 甘草

依本方加二倍

葛根續命湯 出按 粹方

治中風身熱有汗不惡風

葛根 桂枝 黃芩

依本方加一倍宜鍼陷谷刺厲克者瀉陽明之實也此二證陽明中風之賊也刺厲克者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

羌活連翹續命湯

出按 粹方

無此四證六經有繫於少陽

厥陰或肢節攣痛或麻木不仁

小續命 八兩 半 羌活 四兩 半 連翹 六兩

右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經鍼刺別無不愈也治去厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絕骨灸以引其熱以此通經引熱是鍼灸同象治法之大體也

桂附續命湯 治中風有汗無熱

甘草 桂枝 附子

依本方加一倍宜鍼太谿此證少陰經中風也

續命湯一名西州續命湯

治中風入臟四體不自知口不能

語昏昧不知痛處或筋脉拘急中外疼痛不得轉側

方見本門風痲類

大通青金丹出聖濟總錄

治中風

金箔四十片丹砂研硫黃研曾青二分螺髻者為上研胡粉

鉛丹與曾青末紫石英末胡粉鉛霜再同研雄黃各三分與丹砂同研紫石英

研一鉛霜研一水銀三分與硫黃兩結砂子研

右取一湖南燒藥餅子并蓋用六一泥固臍火燻令

乾先下金箔二十片次下砂子同研四味末實按平

又下金箔二十片次下曾青同研五味末又實按令

平次又下金箔九片始用蓋子六一泥合蓋子只留

縫一寸不泥合用火法并再搗羅出火毒及再研法

並與前方大通水銀丸同用槐膠濃煮湯去滓停令

温入麩煮作粥糊丸如梧桐子大凡中風癱瘓風手

足攣急風口面喎斜風癩癩風狂風邪並用温酒下

至五丸七丸空心日午夜卧各一服



薏苡仁湯 出聖濟總錄

治中風風勢未退服前湯數日未

效

葳蕤 一兩 石膏 研二兩半 生薑 切焙三兩 薏苡仁 炒一兩半 犀角 鎊半

地骨皮 兩 人參 各一兩 麥門冬 去心生用半兩 烏梅 去核二十

杏仁 枚 去皮尖雙仁 炒二兩半

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入

竹瀝半合白蜜少許攪令勻溫服病若熱多即食前

令服若冷多即食後暖服如服後苦參丸以此湯嚥

下

麻黃湯 出聖濟總錄

治中風肢體弛緩言語蹇澁精神昏

憤

麻黃 去節根先煎掠出沫焙三兩 桂 去粗皮半兩 獨活 去蘆頭三錢 羚羊

角 鎊三分 萎蕤 切焙一兩 葛根 剉三兩 防風 去叉一兩半 升麻 一兩

石膏 碎六兩 甘草 炙剉三分

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫

服如人行五里再服用熱生薑稀粥投汗出慎外風



犀角搜風丸 出御藥院方

治風下痰解結順氣

乾生薑 木香 各半 白茯苓 去皮 車前子 木通 各一

兩 青皮 去白 陳皮 去白 枳實 麩炒去穰 牽牛頭末 四兩

生犀角 一兩半 鎊屑

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸

至五十九食後溫生薑湯下

乳香尋痛丸 出危氏方 治中風癱瘓不遂手足躄曳口眼

喎斜或旋運僵仆涎潮搐搦卒中急風不省人事每

服二十九黑豆淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴

疼痛宜用生地汁調酒下腰脚疼重行步艱辛筋脉

攣促俯仰不利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺

不仁或血脉不行肌乾瘦生葱酒下或生葱茶亦可

風濕脚氣腿膝無力或腫或疼不能舉步兩脚生瘡

膿血浸漬癢痛無時愈而又發溫鹽酒下打撲閃肉

筋骨損已經多年每遇天寒時發疼發痛沒藥酒下

乳香 川烏 沒藥 五靈脂 白膠香 地龍

白薑 半夏 五加皮 赤小豆各等分

右為末糊丸隨證湯引如前並空心服

桂附湯一名解語湯 治中風精神冒悶語聲不出方見諸風雜治

類

神異溫風丹 治中風一切諸疾

麻黃去下節擇淨 人參 白朮 乾薑炮各三兩 茯苓神

附子炮去皮臍 白膠香別研 甘草炙各一兩 乳香別研 全蠍炒各

兩一

右將麻黃細剉用水五升熬去半入蜜六兩又熬成膏入前件藥末和丸如彈子大每服一九溫酒下日

三服

陰濕湯余居士選奇方 治一切中風自汗浙浙惡風翕翕發

熱呼吸少氣風潮風濕表實裏虛或表虛裏實腠理開踈氣道壅塞虛汗盜汗目黃身腫小便不利胸膈滿腰疼體痛嘔吐涎沫

白朮 白茯苓 蒼朮米泔浸 藿香葉去土 甘草炙 橘

紅厚朴製半夏各一兩附子六錢生薑二兩

右厚朴半夏生薑一處搗作餅子焙乾同衆藥為粗末每服三錢水二盞薑十片煎至一盞不拘時候

麻黃湯 治中風氣逆滿悶短氣

麻黃三兩 甘草二兩 石膏四兩碎 杏仁五十枚去

皮人參三兩 半夏一兩 乾薑五兩 防風 茯苓各四兩 桂

心三兩

右咬咀以水九升煮取三升先食服一升日三服忌

海藻生葱羊肉錫菘菜

大通水銀丸 出聖濟總錄 治中風

水銀 鉛丹 丹砂 胡粉 鉛霜 雄黃

研硫黃 先以銚子銷鎔熟帛濾入水銀 硃砂 以水

黃雄黃丹 曾青 各一兩別研次以曾砂同研 青鉛丹胡粉同研

右先將水銀砂子雄黃丹砂硃砂入湖南餅子中實

築次下曾青鉛丹胡粉實築用蓋子蓋訖使六一泥

固臍留縫一寸不泥合火炙乾先用文火養一日夜



後用文武火從午時燒至申時通赤縫中有煙焰藥  
 氣起即抽火向後急泥合縫用篩了淨灰蓋窰餅子  
 後至來日冷即開取藥出搗羅下用篩了濕淨沙土  
 攤開上以重抄紙三重襯置藥在上上更以三重抄  
 紙蓋細勻晒濕上以盆合蓋經三日夜每日微晒日  
 滿取藥再入鉢與鉛霜一味同研細用爛蒸青州大  
 棗取肉研如膏拌和丸如梧桐子大每服一九至兩  
 丸用豆淋酒下空心午時夜卧服得汗出慎外風未

汗用熟生薑稀粥投汗出即瘥

附子補湯

出聖濟總錄

治中風服前湯後服

- 附子 炮製去皮臍
- 石膏 碎
- 乾薑 炮各一兩半
- 桂 去粗皮一兩
- 犀角
- 鎊 二兩
- 地骨皮 二兩
- 白朮 二兩
- 獨活 去蘆頭
- 芎藭 各二兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切  
 煎至八分去滓空心溫服三服後用熟生薑稀粥投  
 以厚衣覆令汗出汗不止以牡蠣粉粉身覺熱壅即  
 疎服病勢損不必盡劑服此二藥未效宜服薏苡仁



湯

青金丹

出御藥院方

治中風不醒痰涎壅滯在咽嗑間如

拽鋸聲連服三兩丸或吐或利後精神出立醒

膩粉

粉霜各一兩

滑石

為末

水銀

錫結砂子一兩

半夏

湯洗過生

薑汁浸為末三錢

青黛

二錢

腦子

麝香各一錢

續隨子

去皮研一

百二十箇

右為末同研令勻水丸如榛子大每服三兩丸煎葱白湯下或薄荷湯化亦得

大星附湯

一名生附散出醫方大成

中風雖能言口不喝斜而手

足躡曳脉虛浮而數風中肺也蓋風中肺則口眼喎

斜風中腑則肢體廢風中臟則性命危凡風中腑痰

涎昏冒牽掣不遂宜以汗解服澹寮

天南星

半夏

二味切薑汁浸

黑附子

白附子

川烏

並生去皮

僵蠶

人參

白茯苓

沒藥

研各等分

右咬咀每服二錢水酒各一盞煎至七分去滓服并進得汗為愈鹿本薑七片煎

防風湯 一名防已湯

治證同前 方見中風半身不遂類

水銀丸 出聖濟總錄

治中風仆地口眼喎斜涎潮語澀手足不隨及非時胸膈痰涎

水銀 一兩 臘茶末 半兩 青州棗 十枚取肉煮

右將棗肉先同水銀研令星盡然後入臘茶末一處

研勻旋滴糯米飲丸如皂子大每服一丸温酒下不計時候磨下

防風湯 出本事方 治中風内虛脚弱語蹇

石斛 一兩半 乾地黄 杜仲 丹參 各一分 防風

川芎 麥門冬 桂心 川獨活 各一分

右為粗末每服五錢水一大盞半棗二枚同煎八分去滓温服

金箔丸 出旋舍備要 治中風語澀口吐涎頭目昏項強直

口眼喎及治痰飲腸鳴清膈利涎疏風壅

金箔 五十片 天南星 炮 半夏 各一兩 白附子 炮二兩 雄黃

研飛 牛黃 研 硃砂 研飛 人參 半兩 犀角 一分

善濟方

三

右為末麵糊為丸菜豆大生薑湯下十五丸急病竹

瀝下

茯苓湯

出聖濟方

治中風入腹心下如刺不得卧或在脇

下轉動無常腹滿短氣憒憒欲死此病或中虛冷或

素有宿食食飲不消或素風氣在內今得他邪往干

五臟故成此病

茯苓二兩 芎藭 乾薑 芍藥 白朮 當歸 人

參各一分 枳實三分 甘草二分

兩

炙

兩

炙

右細切以水九升煮取三升日三服若病劇者可相

去人行五里頃一服胸中有氣可加人參二兩服一

劑不瘥不過兩劑忌海藻菘菜桃李雀肉大鮓

牛黃丸出聖濟方

治中急風涎潮昏塞不省人事口眼喎

斜手足羸曳抽掣麻木筋脉拘急皮膚不仁

牛黃別研 天南星搗羅為末內牛膽中陰乾者各一兩 白附子生用 天

麻三分 天雄炮製去皮 躑躅花醋拌炒 烏頭炮製去皮

犀角一兩



右除外搗羅為末拌勻煉蜜為丸如鷄頭大每服一  
丸或二丸溫薄荷自然汁化下不計時候

羌活湯 出聖濟  
總錄

治中風身體疼痛四肢緩弱不隨

羌活 去蘆頭  
半兩 葛根 三分 甘草 炙一分 乾熟地黃 焙三分 桂

去粗皮 芍藥 半兩 麻黃 去根節  
三分 黃耆 半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去  
滓食後良久溫服訖以被覆取微汗為度

雄硃丸 出和  
濟方

治中風涎潮咽膈作聲目眩不開口眼

喝斜手足不遂應是一切風疾並宜服之

雄黃 研 硃砂 研 龍腦 研 麝香 研各一兩 白附子 生 天南

星 洗 白殭蠶 去絲嘴  
生用 烏蛇 去皮骨生  
各半兩

右除研外餘皆為末煉蜜為丸如梧桐子大如中風  
涎潮牙關不開先用大蒜瓣搗爛塗在兩牙關外腮  
上次用豆淋酒化一丸措牙齒上即開續用薄荷酒  
化下一兩丸如丈夫風氣婦人血風牙關緊急者只  
用豆淋酒化藥措牙齒上即開如頭風目眩暗風眼

黑欲倒者急嚼一兩丸薄荷酒下

八味順氣散 出濟生方

治中風亦當間服此藥中氣者尤

得其宜

白朮 白茯苓 青皮 去白 香白芷 陳皮 去白 人參

各一兩 甘草 炙半兩 天台烏藥 一兩

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分溫服不拘時候可加生南木香仍以酒化蘇合香丸兼服蘇沈良方謂蘇合香丸祇宜人參湯否則白湯嚼如古方

用酒多不效然愚謂恐人之臟腑有不宜酒者古方未間服有風之人先宜服此次進治風藥

療風飲子

羌活 二兩 桂心 半兩 人參 一兩 蜀升麻 茯神 防風

生薑 和皮切 生犀角 屑各二兩

右切以水一大升煮取二大合分溫三服如熱下竹

瀝一盞忌生葱鮓

七寶丸 出御藥院方

治中風不計緩急涎潮冒悶不知人

事

丹砂 牛黃 水銀 龍腦 膩粉 麝香 以上並細

研各一錢 金箔 大者二十片與藥同研

右再同研令水銀星盡用蒸棗肉丸如梧桐子大病輕者每服十九重者二十九溫水化破服利下涎須服和氣藥日後時服漫治風藥如治中風涎潮不下精神昏憤不省人事者用薄荷湯磨下

雄黃半夏丸 出聖濟總錄

治五臟內虛中風昏冒涎潮氣

壅

雄黃 研飛過一兩 丹砂 研一兩 膩粉 研一分 麝香 研一分 半夏

湯浸七遍去滑焙三分為末 牛黃 研一錢 天竺黃 研一分

右研極細用生薑自然汁調麩和丸如梧桐子大每服一粒食後臨卧生薑湯下如要行風氣空心服二粒甚效

銀粉丸 出御藥院方

治中風痰涎不得下精神昏塞不省

人事



水銀二兩錫結砂子另研 突中煤 牛黃研各半兩 麝香另研 蠟稍

各一 天南星四兩牛乳拌勻濕炒 白附子生薑汁拌勻炒取二兩

右除別研外為細末後同研令勻煉蜜和丸如彈子

大每服半丸薄荷湯化下如大便不利薄荷湯調膩

粉半錢匕下小兒服量虛實服如豆大一二丸

桃溪回陽丹出簡易方 治卒暴風中氣中癱瘓手足不遂

語言蹇澁口眼喎斜筋脉攣急半身不舉不省人事

川烏洗 草烏洗各三兩 地龍洗 五靈脂洗 南星洗各一兩 腦

子 麝香各少許

右日乾細末蜜丸雞頭子大初服半丸漸加小丸至

大丸薑汁磨化溫酒先嚼薄荷日午夜卧服癱瘓不

能行服三十九丸必愈如中風不軟只口眼喎斜服三

二丸效

紅龍散出三因方 治一切中風前開闔竅不致枯廢服此

後服治風之藥

硃砂別研 五靈脂各一兩半 全蠍半兩 茯神 草薺各一兩 腦

子別研各半錢麝香

右為細末每服二錢酒調或煎荊芥薄荷湯服次服神異溫風丹

十二味正氣散出朱氏集驗方

治風中氣中

陳皮 厚朴 半夏 藿香 甘草 人參二錢半

茯苓 白朮 石菖蒲 木香 遠志 薏苡仁

各半兩

右除人參外餘藥各半兩咬咀每服三錢水一盞薑

三片棗一枚煎八分服

通心辰砂丸出旅舍備要 治一切風涎潮發以至狂語狀

若心風只服此藥方

硃砂半兩 龍腦半兩 硃砂半兩 明者 黃丹炒一錢 白芥子

微炒取末一兩 半夏湯洗取末半兩 天南星炮取末半兩

右研勻麩糊丸如菉豆大更研硃砂為衣每服十五

丸同鐵粉牛黃丸共服

嚙鼻奪命散出德生堂方 治中風不省人事口眼喎斜痰

涎壅塞半身偏廢及卒中風痲即隱證傷寒手指青冷諸般眼疾暴發者悉皆治之

頑荊葉 石菖蒲 谷精草 東平薄荷 芎

藟 二錢 半 藜蘆 二錢 細辛 二錢 半

右為細末先令患者吃葱茶一盞後噙水在口卻用手捻藥末些小嚙入鼻內如手不可動以葦管吹入即時痰唾涕噴隨時見效如至三吹藥不涕噴其病難治以順氣之藥服之為妙

分涎散 出御藥院方

治中風涎潮作聲不得出口噤手足

搐搦 方見急風類

薏苡仁湯 出聖濟總錄

治中風肢體緩縱精神恍惚言語

塞涎

薏苡仁 炒五兩 萎蕤 切焙三兩 犀角 鎊二兩 茯神 去木三兩 烏梅

去核 麥門冬 三合 去心焙

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓入竹瀝白蜜各少許再煎三五沸食後



日午夜卧各一服

附子湯

一名附子散  
出醫方大成

治五臟中風挾寒手足不仁口

面喎斜昏暈失音眼目睵動牙車緊急不能轉動

附子

炮去皮臍  
桂心各半兩

細辛

去苗  
防風去人參

乾薑

炮各六錢

右剉為散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎至

七分去滓食前服或為末酒調二錢服亦可

青龍湯

治中風發三春脉浮短者多凶大而長可療

甘草

炙一兩

生薑

芍藥

各二兩

大棗

二十枚擘

麻黃

二兩去節

桂心

七寸

右咬咀以水六升煮取二升半分為再服初服覆取

汗後即止忌海藻菘菜生葱等物

三陽湯

治中風發三夏脉沈緊惡寒不汗煩

當歸

一兩

生薑

二兩

甘草

炙五分

麻黃

五兩去節

杏仁

四十枚去皮尖

並雙仁  
碎為用

石膏

二兩碎  
綿裹

右咬咀以水六升煮取半升再服忌海藻菘菜等物

扶金湯 治中風發三秋脉浮大而洪長

葛根 三兩 獨活 二兩 附子 一兩炮製炒 石膏 二兩碎綿裏

右咬咀以水八升煮取三升服九合日三夜一忌猪肉冷水等物

温脾湯 治中風發三冬脉浮者

芎藭 二兩 石膏 四兩碎綿裏 甘草 炙四分 黄芩 三兩 杏仁 十四枚去

皮尖雙 麻黄 六分去節 蜀椒 二分去汗 防風 四分 桂心 五分

右咬咀以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜生

葱等物

五虎湯 治中風輶曳目睛上視牙關緊急涎盛昏塞

不省人事 出衛生家寶方

南星 草烏 川烏 並炮去皮 半夏 炮七次 皂角 去皮弦子炙

右咬咀等分每服三大錢水二盞薑十片煎至八分去滓温服不以時口噤灌下余居士選奇方二草烏

川烏並不去皮尖

二香三建湯 出醫方大成 治男子婦人中風虛極言語蹇

澁六腑俱微舌強不語痰涎並多精神如癡手足偏廢不能舉運此等證候不可攻風止可扶虛

天雄去皮生用附子去皮生用川烏生去皮各一兩木香不見火半兩沈

香旋磨水入

右咬咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓

溫服空心食前

勝金丸一名硃砂丸出簡易方治中風忽然昏若醉形體昏悶

四肢不收涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷半兩猪牙皂角二兩槌碎水一升二味一處並搗取汁漫熬成膏瓜

蒂末一兩藜蘆末一兩硃砂半兩研

右將硃砂半兩與二味研勻用膏子搜和丸如龍眼大以餘硃為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治心用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾



荆瀝湯 出聖濟總錄

治男初中風四肢不收心神昏憤眼

不識人不能言語先服

荆瀝 竹瀝 生葛汁 各一升 生薑汁 三合

右和勻去滓瓷器中煎三五沸每服二盞平日日午

晡時夜卧各一服服訖覺四體有異以次更服後防

風湯

次服防風湯 出聖濟總錄

防風 去節根先掠去 杏仁 湯浸去皮尖並雙仁炒 芎

藟 防己 人參 附子 炮製去皮臍 石膏 研三兩 黃芩

去黑心 桂 去粗皮 甘草 炙各半兩 芍藥 羚羊角 鎊一兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切

煎至八分去滓更入竹瀝葛汁各少許再煎三五沸

溫服日二夜一覺減損更服後防己竹瀝湯

次服防己竹瀝湯 出聖濟總錄

防己 剉一兩 防風 去 升麻 麻黃 去根節先煎掠去沫焙 桂 去粗

皮 芎藭 獨活 去芦頭 羚羊角 鎊各三兩一方無獨活

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓更入竹瀝一合再煎三五沸溫服日二夜一手足逆冷加生薑三兩白朮二兩風若未除再服後防風獨活湯

次服防風獨活湯 出聖濟總錄

防風 去義 獨活 去頭 秦艽 去苗 黃耆 芍藥 人參

茯苓 去木 白朮 剉炒 芍藥 山茱萸 薯蕷 天門

冬 去心 桂 去皮 羚羊角 鎊 升麻 麥門冬 去心 焙

甘草 炙 丹參 五加皮 厚朴 去粗皮 生石斛 去根

地骨皮 遠志 去心 各四兩 陳橘皮 湯浸 附子 炮製

麻黃 去根節 煎抹去沫焙各三兩 石膏 碎六兩 乾菊花 半開者 一升微

炒薏苡仁 升牛膝 去苗 酒熟乾地黄 焙六兩

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓空心日午夜卧各溫服如覺心膈虛煩滿悶氣喘面赤即與前四味荆瀝湯相間服佳又用竹根竹葉細切濃煮汁去滓代水煎防風湯尤良

一方治偏風半身不隨肌肉偏枯者加防己二兩可再服本類荆瀝湯

小竹瀝湯 出醫方大成

治中風涎潮言語昏塞四肢緩縱

不收

秦艽 去苗土剉 防風 去芦頭 附子 炮去皮臍 獨活 剉各一分

右水四盞煎二盞入生地黄汁竹瀝合半盞煎三五沸去滓分四服不拘時熱服病去以他藥扶持未知再作

羌活湯 出仁存方

治中風眩暈惡風自汗或身體不仁兼

濕身體疼煩掣痛不可屈伸或身微腫

羌活 附子 炮 白朮 甘草

右等分每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時

雄附醒風湯 出醫方大成

治中風涎潮牙關緊急不省人

事

附子 一箇 天雄 一箇各 蠍稍 半兩 南星 一箇一兩重與雄附並生用去



皮  
臍

右咬咀每服五錢水一盞薑七片煎七分不拘時

三化湯

出技  
粹方

治中風外有六經之形證先以加減續

命隨證治之內有便溺之阻隔復以三化湯導之

厚朴薑製大黃 枳實 羌活

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日

服之以微利為度無時法曰四肢不舉俗曰癱緩故

經所謂太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜

阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏

梁之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發

病為偏枯痿易四肢不舉王注曰三陰不足則發偏

枯三陽有餘則為痿易二為變易常用而痿弱無力

也其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃

承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及

則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆稟

氣於胃而不能至經必因於脾乃不得稟受也今脾

不得與胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以先故不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正

桂枝湯 治中風身體煩疼惡寒而自汗出頭強痛急

桂心

五兩

生薑

八兩

甘草

二兩

葛根

八兩

芍藥

三兩

大棗

十二枚

擘

右切以水七升煮取二升服八合日三溫服取汁忌生葱海藻菘菜

普濟方卷八十八

欽定四庫全書

普濟方卷八十九

明 周王朱橚 撰

諸風門

中風

秦朮丸

一名桂心散 出聖濟總錄

治中風汗出不止

秦朮

去苗土

白朮

桂

去粗皮

附子

炮製去皮臍

石斛

去根各一

兩

普濟方

右為散每服三錢匕空腹温酒調下日再

葛根湯 出聖濟總錄

治中風因飲食過節不能言語手足

不隨精神恍惚得病一兩日服

生葛根 長一尺經六寸 竹瀝 二升 生薑汁 一合

右先取生葛根洗刮去皮土搗研壓取汁葛滓再搗以竹瀝沃復壓取汁盡為度將生薑汁和勻同用厚綿濾過銀石銚內煎三五沸瓷器盛不拘時候食前温服如覺腹內氣轉作聲似痛即食後温服如此服

七日後可服九味附子湯補之

治中風面目相引口偏着耳牙車急舌不得轉方 出仁存方

獨活 三兩 竹瀝 生地黄汁 各一升

右合煎取一升頻服之即愈

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百

病或中風痲痺背強口噤直視煩熱 方見風症類

木香羌活散 出經驗方 治中風頭目昏痛心胸煩悶氣逆

痞滯調順榮衛進飲食



南木香 藁本 各三分 羌活 川芎 人參 白朮

炮 薏苡仁 大檳榔 各一兩 枳殼 去心 麩炒 白茯苓 荆

芥穗 各半兩

右為末每服三錢匕水一盞生薑二片煎至七分去

滓稍熱服

治中風但腹中切痛 出肘後方方見本門風入腹拘急切痛類即食鹽方

星附湯 出濟生方 治因中風痰涎壅塞不省人事脉來沈

伏服涼藥不得者

附子 生去皮 南星 生去皮 木香 不見火半兩 一方用沈香

右以咀每服四錢水一盞半薑九片煎至七分去滓

溫服不以時兼寒者用熟附子 沈困而手足厥冷

者加川烏名三生飲 弱甚者加天雄名三建湯

痰涎壅塞聲如拽鋸服藥不下宜於關元丹田二穴

灸之 氣纔正人事稍甦痰下却只用南星八錢木

香二錢名星香湯 或兼用小續命湯在臨時量輕

重治法前方生薑十片煎服

解毒雄黃丸 一名雄黃救命丹 出醫方大成

治中風卒然倒仆牙關

緊急不省人事并解上焦壅熱痰涎咽喉腫閉一應

執毒 方見諸風 雜治類

夢仙備成丹 一名烏龍丹

治卒急風中癱瘓口眼喎斜語

言不正不省人事一切風證

川烏 五兩炮 微黃色 五靈脂 取淨二兩半 沒藥 乳香 各一錢

右研為末煉蜜丸彈子大每一丸如服藥先以酒一

盞薑七片薄荷七葉同煎七分去滓後溫入腦子一

匙細嚼藥一粒審氣少時用前酒送下臨卧服

治手足躡曳言語蹇澁行履不正

大川烏 五兩去皮 臍生用 沒藥 半兩研 五靈脂 五兩擇去石

右入麝香不拘多少研細拌和滴水丸如彈子大每

服一丸生薑汁研化熱酒浸量力服之

三建湯 出如宜方

治中風風涎不省人事

附子 天雄 烏頭 各等分生用 去皮臍薄切

右每藥一兩生薑一兩同水三大盞煎至一盞半去

淳温服

人參訶子散 治中風涎盛不省人事

人參 訶子 青白者 炒去核 甘草

右件各等分為細末每服二錢白沸湯點服如卒中風痰壅不省人事急投此藥神效無比即便醒也

桂枝湯 治中風汗出乾嘔

桂 甘草 炙三兩 大棗 十二枚擘

右切以水五升煮取二升半分三服一方用生薑五

兩忌生葱海藻菘菜

三生飲 出簡易方 治卒中風昏不知人事口眼喎斜半身

不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒

或六脉沈伏或指不浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥

及氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如

鼾睡者難療 方見卒中風類

烏龍丸 一名錫藥丸 治中風肢體麻痺頑痰少力 方見偏風類

吐痰白礬散 出聖濟總錄 治初中風失音不語昏冒不知



人事宜先吐風痰令醒覺次可服諸湯散

白礬

二兩生用 一兩連皮擦碎水 二升煮取一升二合

右先細研白礬為末入濃煎薑湯研濾分三服旋旋

灌須臾吐出痰毒服開風退方可救治若氣衰力弱

不宜用猛性藥吐之設吐得痰毒別增疾勢

取涎丸

出聖濟總錄

治中風病不語喉中如拽鋸口中沫

出

藜蘆

一天南星

大者一枚去浮皮去中作坑入醋令八分滿四面用火逼醋乾黃色

劉

右為末用麵糊丸如梧桐子大每服三丸溫酒下良

久吐出涎為效吐不止用冷葱湯呷即止

治中風涎伏在膈上難出者並咽作聲

出海上名方

藜蘆

一兩去皮 瓜蒂三十片

右為細末每服半錢臘茶清調下吐出風涎為效

楊氏神柏散

出危氏方

治中風不省人事涎潮口噤語言

不出手足躡曳得病之日便進此藥可使風退氣和

金定四庫全書 土風良令 犀鬣欠丁反者易文 卷八十九

不成廢人卒有此證無藥去處用之得力

柏葉 一握 去枝 葱白 一握 同根

右研如泥用無灰酒一升同煎一二斗沸去滓溫服不拘時如不飲酒須分作四五服服盡方進他藥

二聖飲 治中風

雄黑豆 半升 皂角針 剉半升

右用無灰酒二升同煎至半升去粗服汁為度

薑附湯 出簡易方 治中風口噤四肢強直失音不語或卒

然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩燥兼治隱證傷寒大便自利而發熱者久中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆

乾薑 熟附子 各二兩

右咬咀每服四錢水二盞煎至六分去滓溫服若其人未蘇甦則先用三生飲方中治法次方服此或慮此藥大燥即以附子理中湯相繼服餌薑附湯本治傷寒經下之下又復發汗內外俱虛身無太熱晝日



煩燥夜即安靜不嘔不渴六脉沈伏 一方附子生  
用名白通湯治傷寒發熱大便自利 一方用白通  
湯倍加白术甘草減半名生附白术湯治中風濕昏  
悶恍惚腹痛身重手足緩縱津津自汗失音不語便  
利不禁 一方用薑附湯加麻黄白术甘草人參等  
分名附子麻黄湯治中寒濕昏暈緩弱腰背强急口  
眼喎斜語聲昏濁心腹滿脹氣上喘急不能動轉已  
上證候各宜詳審用之 澹寮方云千金方治卒中

風痰壅塞生薑八兩附子減半並用生者同陳氏三  
因方用等分炮熟薑附王氏因之改乾薑為生薑附  
子用熟者然既知其未穩當從古方可也乃持兩端  
以嘗試未為切當其云治中寒口噤與隱証傷寒下  
利不竭手足逆冷小便及利汗出過多脉微欲絕此  
脫之證兼服炮薑炮附子亦未為過今中寒昏倒口  
吐痰沫而遽服熟附烏知寒邪不因補而盛耶當先  
以生薑附與之或未效徐投以半生半熟者人或虛



甚然後以熟薑附未晚也雖是陳氏不審之故而王  
氏不能發明之安得不任其咎

木香湯 治丈夫婦人中風氣痺其疾作之初切不可

以治風瞑眩之藥與服若大段有痰即畧與不損氣

者下涎藥方定如手足緩弱不遂即便與此藥服方見

風癱  
緩類

蘇青丸和氣血散風痰亦可常服

右以蘇合香丸與青州白丸子打和薑蘇湯化下

桂心方 出十便  
良方 治中風雖能舉動尚口眼不正

右用官桂一兩碾為細末每用半兩好酒一盞煎藥

成膏塗在不啞處次用紙或軟帛子貼蓋定取新瓦

二片火上頻換炙令熟熨貼藥上候纔覺口正便速

去藥用溫湯洗之如左啞搨右右啞搨左 一方以

酒煮汁蘸搨病上 一方治舌強不語以桂末着舌

下漸漸嚥汁水漿嗽去涎沫 一方治中風失音用

水煎服之復取汁亦可

旋覆丸 治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足  
躄曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人  
卒有此證無藥去處用之得效又治中風及壅滯  
用旋覆花即金沸草淨洗為末蜜丸如梧桐子大夜  
卧茶湯下五七丸至十丸

治風涎暴作氣塞倒卧

用瓜蒂約半寸許暴極乾不限多少為細末量疾每  
用一二錢以膩粉一錢匕水半合同調勻灌之良久  
涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但如此服即出  
或服藥良久涎未出含沙糖一塊下咽即涎出此物  
甚不損人

治中風不省人事牙關緊急者

用藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒  
微褐色為末每服半錢溫水調下以吐出涎為效如  
人行三里未吐再服

治中風心肺風熱手足不遂及風痺不仁筋脉散緩恍

惚煩燥

用熊肉一斤切如常法酒調和作醃腊空腹服之

治筋骨急強中風

方見本門中風百節疼痛類

治中風

取杏仁去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之

活鼠方

治項強身中急痛者

取活鼠破其腹去五臟就熱傅之即可一方治中卒

風腰脊反張牙闔口噤四肢強直用鼠一頭和尾燒灰為末以臘月猪脂傅之

又方療患風疾數年不效者朱真人治風坑湯野人閑話朱真人靈驗篇云有病者患風疾數年不較風科集驗方掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以葦蓋之瘥

敗龜散 治中風賊風麻痺風疾

龜卜師處鑽了者以酥塗灸搗羅細末酒下二錢用



雞卵和豆淋酒服之一方治中風手足顫掉譫曳者

為末以飯為丸每服二十九丸温酒下

治中風立有奇效出聖惠方

用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒一斗浸

之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜

各温飲一盞老幼臨時加減若常服只每朝一盞

破棺散出經驗良方

治中風牙已緊無門下藥方見本門卒中風類

名開關散

治三十六種風

方見本門諸風雜治類即馬齒膏出本草

荆瀝湯出指南方

治中風虛熱狂言恍惚驚悸

牛黃三分別研

人參

麥門冬

去心各二兩

升麻

鐵精

別研

各一兩

龍齒

茯苓

天門冬

去心各二兩

梔子仁

右除牛黃鐵精外餘藥為末每五錢水二盞入竹瀝荆瀝各一合煎一盞去滓入牛黃鐵精各一匙再煎

一兩沸温服

瀉青丸出保命集

治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安

卧此是風熱煩燥

當歸 龍膽 川芎 梔子 羌活 大黃 防

風各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸竹瀝湯下

五珍丹出楊氏家藏方 治男子婦人中風涎潮不語牙關緊

急半身不遂口眼喎斜

天南星炮 白殭蠶炒去絲嘴 川烏頭炮去皮臍 半夏切片子湯浸七

遍 蠍用糯米一合炒黃 已上五味各一兩

右件為細末醋煮麩糊為丸每一兩作一十五丸每

服一丸用生薑自然汁化下不拘時候

川芎散出朱氏集驗方 治中風中氣先服此藥

川芎 人參 枳殼各一兩 沈香 香附子各二錢 木

香一兩

右為細末每服三錢以沸湯入鹽點灌之

治中風手足偏痺筋縮急脚膝痿痺不能行步余居士選奇方

牛膝 川當歸 防風 芍藥 五加皮 生薑

各六  
分兩  
羌活  
乾葛  
桂心  
甘草  
薏苡仁  
各八  
分  
四  
二十

右剉為末分作七貼每一貼水一升棗二枚同煎至

六合無時服

大省風湯 出楊氏家藏方

附子 吳木 一兩 向菓 一名使丁香 天南星 防風 各半兩

藿香 一分

右為飲子每服三錢生薑五片煎去滓服常服以防

天陰雨作

硃砂丸 治中風涎停留胸上令吐

生薄荷 猪牙皂角 二味研碎各二兩以水一升搓令如草葉絞取汁用銀器

中熬成膏 瓜蒂 一兩 蔡蘆 去苗半兩 硃砂 半兩 研

右將三味研勻用前膏子和丸雞頭子大每服二丸

溫酒吞下口噤者用物斡開口灌之得藥下立吐為

佳

治中風論 如是病人無汗者方可用麻黃表之



夫中風者蓋五臟俱虛乃得是病醫者不治其本先以治風藥如續命湯排風之類投之間有見牙關急緊便下靈寶至寶硃砂牛黃之屬以搐鼻吐涎無所不至有一於此不復得為全人矣蓋續命排風湯中有杏仁麻黃之類若投一劑一表而虛必為左癱右瘓之人矣良由真氣乘虛應表而出筋脉乾枯也大凡治風之藥往往性涼未宜遂服若醫者察証辨脉的知是中風之候亦有痰厥類中風者宜先服生附子湯加黑豆三十粒

煎得痰涎不作口眼端正能辨人事然後以朮附湯加木香煎服間服六味順氣散月餘候補正氣血脉息稍勻尚有風痰餘証然後服續命排風湯以驅逐之以此救療百無一失中風甚不難治蓋內外之證分明唯在醫者謹其始耳或初得疾便有熱證亦須開關調氣化涎消滯未宜遽用太熱之藥更在詳審之也安藥後宜清居絕慾若更能不食毒物則必保天年矣

如欲調氣化痰宜先

服六味順氣散

六味順氣散 出衛生寶鑑方

白朮 五兩炒 白茯苓 兩人 陳皮 三兩去 青皮 白麩炒

二兩 甘草 二兩炮 去皮 再麩炒

右為細末每服三大錢水一盞半棗子一枚薑二片

煎至七分溫服日三四服

羌桂湯 治中風有汗及一切風壅加倍桂枝極佳

川羌活 二兩 桂枝 一兩 芍藥 五兩 甘草 一兩

右為粗散每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚同

煎七分去滓溫服日三服不拘時候

治男子婦人雞爪風等病手口動搖不能舉物服兩料

全安 方見本門諸風雜治類川芎散

犀角升麻湯 出衛生寶鑑 治中風麻痺不仁鼻額間痛唇

口頰車髮際皆痛不可開口雖言語飲食亦相妨左

額頰上如胞手觸之則痛此乃足陽明經受風毒血

微滯而不行故也

犀角 一兩二錢半 升麻 一兩 防風 兩 羌活 各七錢 川芎 白

附子 黃芩 白芷 各半 甘草 二錢

右為細末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服食後日三服足陽明胃也經云腸胃為市如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熱飲食故飲食之毒聚於腸胃故此方以犀角為主解飲食之毒也陽明經絡環唇挾口起於鼻交額中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱故王公所患此一經絡也以升麻佐之餘藥皆滌除風熱黃芩升麻專入胃經為使

也

稀涎散 出經驗良方 治風涎不下喉中作聲狀如牽鋸

半夏 大者十四枚生切片 猪牙皂角 一條

右作一服水二盞煎一盞去滓入薑汁少許溫服不能咽徐徐灌之

奪命通關散 出衛生寶鑑 治中風涎上不省人事

躑躅花 川芎 華陰細辛 龍腦 薄荷

右五味等分晒乾碾為末用少許以筆管吹入鼻中



如嘔噎乃可救急將生附子一枚須重一兩以上者去薄皮切入厚朴切連皮老生薑十大片水一碗半同煎至半碗通口灌服

小續命湯

出澹察方

本草序列云有男子年六十脚生瘡因食肉不安醫利得愈時出外中風汗出頭面暴腫紫黑色多睡耳輪上有浮胞小瘡黃汁出乃與小續命湯倍加羌活服之而愈  
中風氣逆有痰涎

蘇合薑薑汁下咽次用省風小續命湯多增木麝二

香煎往往中風之證多因喜怒不常或飲食停滯或怒氣傷神思慮過多損於心臟用局方蘇合香丸三九生薑自然汁化開灌下咽喉次用局方省風湯小

續命湯各加麝香木香依法煎服一方無麝香衛生寶鑑

附子酒

出三因方

治凡中風冷痰痺脹滿諸瘕

大附子

一枚去皮臍切作四片

右用醇酒一升春浸五日夏三日秋冬七日每服一

合日二三服以痺住為效未知再作

澹寮方云凡中風一時諸證蜂起則為困篤倉卒之間藥不可入名醫多用蘇合香丸擦起牙關或以生半夏皂角末吹入鼻竅或灌陳霜梅汁收其痰或服真清油調麝香以疏通其氣又或用麝香煎五積散為之兼行要藥倘或不然迨至風氣日增不得安愈凡中風人湯食不下不能嚥藥口噤不開即用黑豆二三升以青布緊裹熱醋鍋內醃稍熱熨病人前後心

胸背脊令風氣散其口自開然後藥易下耳或炒鹽醋或用微熱灰熨皆可

稀莨丸

出風科 集驗方

治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇

澁手足緩弱

稀莨草

一名水救草生於沃壤間帶猪莨氣者是

臣訥云江陵府節度使進稀莨丸方臣有弟訢年三十一中風牀枕五年百醫不瘥有道人鍾鍼者因觀此患曰可餌稀莨丸必愈其藥多生沃壤高三尺許

節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以溫水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必大燥但取蒸為度仍熬搗為末丸如梧桐子大空心溫酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訐服果如其言鍾鍼又言此藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土人呼猪為豨呼臭為豨氣緣此藥如猪豨氣故以為名

但經蒸暴發氣自泯每當服後須吃飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳錄

治男子女人中風

出本草

以羊乳和脂作羹食之

治中風急喉痺欲死者

出本草

用白殭蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌喉中效

治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉

出本草



用桂心以酒煮取汁故布蘸搨病上正即止左喝搨  
右右喝搨左常用大效

瓊田草 出本 治中風

用瓊草根葉生搗羅蜜為丸服之

治三十年風不效者 出本

以松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服汗出

立瘥

療暴中風 出本

用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土

用生布拭搨絞取汁一大升和灼然如蜜四大合温

分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便瘥此

方得之鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因飲一頓熱肉便

中暴風外孫盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗

遂瘥神效 牛蒡根本草名惡實一名鼠粘草

治鍍金燒 人多患風者 出本

須飲酒並食肥猪肉及服鐵漿可禦其毒

又方 出本草

用紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升八合拌子暴令乾重搗篩蜜丸如梧桐子大空心服酒下四十九  
紅藍子乃紅花子也

療中風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之

用羌活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥

及繆針灸但服用補治湯餌自瘥

葉氏十味劉散 出醫方集成

治中風血弱臂痛連及筋骨

舉動艱難

附子 三兩炮去皮臍 當歸 去土洗切 黃耆 炙 白芍藥 各二兩 川芎

不見火 防風 去蘆 白朮 各一兩半 肉桂 去粗皮不見火 茯苓 熟

地黃 洗淨用少酒蒸令乾焙之各七錢半

右咬咀每服四錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨

卧服

治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者出本草

取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服之

口已噤者強開以筒灌之使得下入便愈甚效

神力圓出經效濟世方治手足失力麻痺悶胸打撲風血凝

滯走疰作痛及癰瘡等疾

乳香 沒藥 當歸洗淨去蘆頭各半斤草烏好酒浸春夏三日秋冬五

日去皮晏木 歲靈仙各一兩五靈脂二兩

右為末用好酒煮麵糊丸如梧桐子大食後臨卧用

温酒下五丸旋加至七八丸服藥後忌熱物少時亦

予家常用甚效

治中風語澁四肢拘急產後婦人亦宜服之

用羌活三兩為粗末每服五錢水酒各半盞煎至六

分去滓不拘時候温服

治中風傷寒頭痛

用蒼耳根葉生搗和小兒尿絞取汁冷服一升日三

服甚驗



治中風面浮腫咽喉不通

用葱葉作羹粥及燂作羹食之良

治小中風

用銅碌不拘多少細治如粉醋和圓如雞頭大纔覺中者便用薄荷酒磨下一圓須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神效

治中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩痛言語似澁一身動搖

用烏驢頭一枚燂洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食之效

肝中風 附論

內經謂以春甲乙中風為肝風蓋體虛之人腠理開踈肝氣不足風邪所傷筋脉拘攣手足不收言語蹇澁項背強直多汗惡風善悲噎乾喜怒時增女子者有頭目矐兩脇痛行常偃僂嗜甘如阻婦狀者但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微青唇青面黃者治法宜灸肝俞

百壯遂服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而斃矣

方

龍腦丸

出聖惠方

治肝臟中風口眼不正四肢抽掣語澁

昏沈

龍腦

半兩研入

犀角屑

半兩

秦艽

半兩去苗

防風

半兩去蘆頭

麻黃

一兩去根節

漢防風

半兩

天雄

半兩炮製去皮臍

茵芋

半兩

乾菊花

半兩

赤箭

一兩

獨活

半兩

白殭蠶

半兩微炒

桂心

半兩

芎藭

半兩

歸

半兩剉微炒

羚羊角屑

半兩

鹿角膠

半兩搗碎炒令黃燥

乳香

半兩

研烏蛇

二兩半酒浸去骨皮炒令黃

乾蠍

半兩生用

牛黃

一分

硃砂

一分研入

麝香

一分研入

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵為丸如

梧桐子大每服十丸以薄荷溫酒下不計時候服

牛黃散

出聖惠方

治肝臟中風筋脉攣急口眼喎斜言語

塞澁神思昏憤

牛黃

一分研入

龍腦

一分研入

烏犀角屑

半兩

天麻

半兩

防風

半兩

去蘆 麻黃三分去根節 羚羊角屑兩 乾菊花兩 蔓荊子

半桑螵蛸微炒兩 桂心兩 細辛兩 側子半兩炮製 獨

活兩 白殭蠶微炒兩 烏蛇二兩酒浸去皮骨炒令黃 乾蠍半兩生用 阿

膠半兩搗碎 蟬殼一分微炒 硃砂一分研入 麝香一分研入

右為末次入研了藥更研令勻每服一錢以豆淋酒

調下不計時候服

赤箭丸出聖惠方 治肝臟中風攻手足緩弱無力口眼喎

斜精神不定行步艱難

赤箭兩 天雄半兩炮製 犀角屑兩 天南星半兩炮製 白

花蛇肉半兩酥拌微炒 獨活兩 防風半兩去蘆頭 芎藭兩 白附

子半兩炮製 川升麻 白朮兩 白殭蠶半兩微炒 桑螵蛸兩

微炒當歸半兩剉 細辛兩 酸棗仁半兩微炒 草薢兩 牛黃

一分硃砂研入 麝香一分研 龍腦一分研

右為末研入牛黃等令勻煉蜜和搗二三百杵丸如

梧桐子大每服不計時候以豆淋酒下二十丸忌濕

麩猪肉羊血毒魚等



天麻丸 出聖濟總錄

治肝臟中風筋脉不利四肢攣痺

天麻 二兩 苦參 二兩 菖蒲 二兩 細辛 二兩 去苗葉 赤箭 二兩 地榆

剉二兩 人參 二兩 牛膝 二兩 酒浸去苗 桂 一兩 去粗皮 防風 二兩 去叉

赤芍藥 二兩 芍藥 一兩 當歸 二兩 切焙 附子 二兩 炮製去皮 陳橘

皮 湯浸一日焙 木香 一兩 酸棗仁 二兩 獨活 一兩 去蘆頭 藁

本 去土 歲靈仙 二兩 去土

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下日二服不計時候

羚羊角散 出聖惠方

治肝中風筋脉拘急言語蹇澁頭項

強直四肢不利心膈煩壅頭目眩

羚羊角屑 三分 防風 半兩 去蘆頭 犀角屑 半兩 麻黃 三分 去根節

前胡 半兩 去蘆頭 人參 半兩 去蘆頭 旋復花 半兩 赤芍藥 半兩 芍

窮 三分 桂心 三分 羌活 三分 當歸 三分 剉 漢防己 半兩 赤茯苓

苓 枳殼 三分 麩炒 黃芩 半兩 蔓荊子 半兩 乾菊花 半兩

甘草 半兩 炙 酸棗仁 三分 微炒

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓入竹瀝一合更煎二三沸不計時候温服

羌活散 出聖 惠方 治肝中風筋脉拘急口眼偏斜四肢痛

疼

羌活 三分 天麻 三分 芎藭 三分 酸棗仁 三分 鹿角膠 三分 搗碎

炒令黄色 蔓荆子 三分 羚羊角屑 三分 人參 二分 去蘆頭 白附子

三分 牛膝 三分 肉桂 三分 去粗皮 薏苡仁 三分 烏蛇肉 三分

醋拌 草薢 三分 犀角屑 三分 白鮮皮 三分 地骨皮 三分 柏子

仁 三分 防風 三分 去蘆頭

右為末每服不計時以豆淋酒調下一錢忌雞猪魚

蒜等

附子散 出聖 惠方 治肝中風上攻頭目旋暈心驚悸悶四

肢拘急

附子 一兩 炮製 去皮臍 酸棗仁 半兩 防風 半兩 去蘆頭 羚羊角

屑 半兩 人參 三兩 去蘆頭 桂心 半兩 羌活 半兩 乾菊花 一分 蔓荆

子 半兩 白鮮皮 半兩 茯神 三分 薯蕷 三分 黃芩 半兩 龍齒 一分 芎

天麻 半兩 黃耆 半兩 枳殼 半兩 麩炒 微黃去穢

普濟方

天

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

桂枝酒出千金方 治肝虛寒卒然喑啞不聲踞坐不得面

目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所積方

桂枝 芎藭 獨活 牛膝 薯蕷 甘草 各三兩

附子 二兩 防風 茯苓 天雄 茵蘘 杜仲 蒟

藿根 白朮 各四兩 乾薑 五兩 大棗 四十枚 躑躅 猪椒

桑根皮 各一升

右咬咀以酒四斗漬七日每服四合日二加至五六

合

羌活散 出聖濟總錄 治肝臟中風筋脉拘攣疼痛諸風

羌活 去蘆一兩半 天麻 二兩 芎藭 一兩 酸棗仁 炒一兩半 人參 一兩

桂 去粗皮一兩 薏苡仁 一兩 鹿角膠 炙燥一兩 白附子 炮製一兩 羚羊

羊角 鎊一兩半 犀角 鎊三分 蔓荊子 去白皮三分 白鮮皮 剉一兩

地骨皮 剉一兩半 柏子仁 一兩半 烏蛇 三寸酒浸 牛膝

酒浸去苗 用焙二兩



右為散空腹豆淋酒調下一錢漸加至二錢日三夜

一

獨活散 出聖濟總錄

治肝臟中風手足少力筋脉拘急骨

痛項背倦皮膚瘙癢口面喎斜頭目眩暈

羌活 去蘆頭 獨活 去蘆頭 白芷 各一兩 防風 去叉一兩半 芎藭

天麻 蔓荆子 藿香葉 各半兩 蟬脫 去土半兩 雄黃

研桂去粗皮 乾蠍 全者去土炒 麻黃 去根節煎掠去沫焙乾一兩 白附

子 炮一兩

右為末每服二錢匕温酒調下不計時候

犀角散 出聖惠方

治肝中風流注四肢攻頭面煩疼言語

蹇澁上焦風熱口眼喎斜腿膝疼痛無力

犀角屑 一兩 羌活 三分 羚羊角屑 三分 人參 半兩 乾菊

花 半兩 獨活 兩 芎藭 半兩 白朮 半兩 黃耆 半兩 石膏 一兩 漢

防已 半兩 防風 半兩 蘆頭 去 黃芩 半兩 天麻 半兩 枳殼 半兩 麩

去穰 蔓荆子 半兩 當歸 半兩 甘草 一分 炙 微赤

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

仁壽丸 出三因方

治肝臟氣虛風冷所中筋脉暈動口眼

喝斜脚膝緩弱反索有風手足拘攣常服補肝元行

榮衛養氣血

桂心 白茯苓

杜仲

去皮薑製炒絲斷各一兩半

山茱萸 洗

巴戟

防風 各一兩

牛膝

酒浸二兩

兔絲子

酒浸濕研一兩半

附

子 炮去皮臍一兩

右為散煉蜜丸如梧桐子大每服三五丸溫酒鹽

湯米飲食前任下一方有肉苁蓉酒浸一宿焙乾一

兩

犀角丸 出聖濟總錄

治肝臟中風肢體拘急頭痛旋運

犀角 鎊一兩

獨活 去蘆頭

芎藭

羚羊角

鎊各一兩半

防風

去天麻

人參 各一兩

乾蠍 炒半兩

丹砂

細研一兩

龍腦 細研

分一麝香 細研半兩

白殭蠶 微炒半兩

天南星

炮去皮臍半兩

右除研三味外搗羅為末細入研藥再羅煉蜜和丸

如梧桐子大每服十五丸嚼破以荆芥茶清下食後

卧服

地黄酒出本 治中風在肝脾語蹇脚弱大便多秘

附子 茵芋 羌活各一兩 熟乾地黄四兩 防風 芎

藟各一兩 石斛二兩 丹參二兩 牛蒡根二兩 大麻子一兩

杜仲 牛膝 桂枝各一兩

右細剉入絹袋盛貯之用無灰酒一斗九升封漬七

日逐日空心食前飲一盞常醱勿令吐

天雄散出聖濟 治肝中風肢體不隨頭目眩昏四肢

無力補虛損益元陽

天雄炮製去皮臍 山茱萸 桂去粗皮 附子炮製去皮臍 秦艽

去苗 獨活去蘆頭 山芋 白斂 乾薑炮製 狗脊去毛 乾

漆炒令煙盡 防風

右為散每服二錢温酒下空心日午近晚三服

赤茯苓散出聖 治肝臟中風氣壅語澁四肢拘急

赤茯苓一兩 黃耆一兩 黃芩三兩 酸棗仁半兩 防風半兩

去蘆頭 羚羊角屑一兩 歲蕤三分 麻黃一兩 芎藭三分 獨



活半枳殼三分麩炒甘草半兩炙

右為散每服三錢水一中盞入淡竹葉三七片煎至

五分去滓入荆瀝半合更煎一二沸不計時候溫服

忌雞猪肉炙博等

薏苡仁散出聖惠方治肝中風四肢攣急身體強直

薏苡仁三兩防風二兩去蘆頭麻黃二兩去根節附子一兩炮製去皮

臍芎藭一兩桂心一兩獨活一兩柏子仁一兩石膏一兩細辛一兩

羚羊角屑一兩枳殼一兩麩炒

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時溫服忌雞猪魚蒜等

石膏湯出聖濟總錄

石膏碎一兩芎藭 芍藥 桂去粗皮黃芩去黑心甘草

人參 當歸切焙防風去叉各半兩麻黃去根節煎掠去沫焙乾一

兩杏仁一十五枚湯浸去皮尖雙仁炒

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半薑半分切片煎至

八分去滓服空心日午夜卧各一服後吃熟生薑葱

菲稀粥投微汗出慎外風

白鮮皮湯

出聖濟總錄

治肝虛中風目眩視物不明筋肉

抽掣

白鮮皮

人參各一分

芍藥

芎藭

各三分

知母

一分白

合一

冬花

二兩

前胡

去蘆頭一兩

茯苓

去木一兩半

防風

去

三兩黃芩

去黑心三分

右粗搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓

入竹瀝半合重煎一兩沸放溫臨卧再服

秦艽散

出聖惠方

治肝中風語澁筋脉舒緩面上浮腫行

履不穩

秦艽

三分去苗

茯苓

三分

桑根白皮

三分剉

犀牛角屑

三分木

通

三分剉

麥門冬

三分去心

防風

三分去蘆頭

羌活

三分

漢防己

三分酸棗仁

三分微炒

甘草

三分炙微赤剉

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

枸杞子散

出聖惠方

治肝中風致筋脉舒緩舉脚不知高

下目多冷淚肢節無力

枸杞子一兩 薯蕷一兩 牛膝一兩 天麻一兩 草薢一兩

神三分 羚羊角一分 茵芋三分 防風三分 生乾地黄一分

芎藭三分

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方 治肝中風語澁煩燥四肢拘急

麥門冬一兩 茯神三分 木通三分 犀角一分 川升麻三分

防風三分 獨活半兩 元參半兩 川朴一分 漢防

已半兩 甘草三分

右為末每服三錢水一中盞煎至六分去滓入荆瀝

半合再煎一二沸不計時候溫服忌酒熱麪炙燂等

雄黃丸出聖濟總錄 治肝中風四肢攣急身體強直

雄黃別研 續斷一兩 桂去粗皮 天南星生用 烏頭炮

皮臍羌活 茵芋去粗莖 白附子炮 木香

天雄一兩 去臍皮一半 生用



右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服一十五丸温

酒下日三夜一

真珠丸

出危氏方

治肝經因虛內受風邪卧則鬼散而不

守狀若驚悸

真珠

二分研一方用真珠母

當歸

熟地黄

各一兩

人參

酸

棗

柏子仁

各一兩

犀角

茯神

沈香

龍齒

各半

兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十

丸金銀花薄荷湯下日午夜卧服

天麻丸

治肝風頭目睵動筋絡拘急或肢體弛緩不

收

天麻

三兩酒浸二宿焙乾用

防風

去叉

甜瓜子

各半兩

歲靈仙

去苗

元參

半兩洗淨焙乾

地榆

洗淨焙乾

烏頭

去皮臍生用各一兩

龍腦

研一錢

麝香

研一錢

右搗極細用蜜四兩河水四盞同熬及四兩將藥末一兩半入在蜜內更熬三五沸候冷入餘藥拌和杵

三五百下丸如雞頭大每服一丸細嚼茶下

獨活散 出聖惠方

治肝中風筋脉拘急肢節疼痛起卧艱

難

獨活 一兩 羚羊角屑 一兩 麻黃 一兩半 當歸 一兩 剉 五

加皮 一兩 附子 一兩 炮製 去皮臍 甘草 半兩 炙 兩 荊芥 半兩 桂心 兩

一兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時候溫服忌猪肉毒魚等

丹砂丸 出聖濟總錄

治肝臟中風手足麻痺筋脉拘攣

丹砂 別研 芎藭 羌活 去蘆頭 荊芥 各一兩 白附子 天

南星 炮製 乾蠍 去土炒 半夏 湯洗去滑薑汁炙搗作餅焙乾一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前溫服下

十丸日三二服

升麻湯 出聖濟總錄

治肝虛中風頭痛目眩胸中客熱氣

壅閉心煩悶

升麻 一兩 元參 地骨皮 各一兩 前胡 一兩 半 葛根 去蘆頭

二 羚羊角屑 二 酸棗仁 一  
兩 兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入  
竹瀝半合重煎一兩沸放溫食後服如人行五六里  
更進一服

竹瀝湯 出聖惠方

治肝中風心神煩熱言語蹇澁少得眠

卧宜服此方

竹瀝 三合 荆瀝 二合 生薑汁 半合 白蜜 一合 葛根汁 二合

右藥相和令勻每服一合服宜頻服

羚羊角散

出聖惠方

治肝中風筋脉拘急舌強語澁

羚羊角屑 一兩 獨活 一兩 附子 一兩炮製  
兩 兩 去皮臍

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去  
滓入竹瀝一合更煎一二沸溫服

治肝元風壅侵傷痺氣非時兩肋下鳴當胃脘上疼痛

面多赤色宜喫此方

白蒺藜 去刺 京三稜 羌花 醋炒黃 芍藥 木香  
黑色

檳榔 羌活 各等分



右為細末非時熱湯調下二錢

白散子

出德生堂

治肝腎虛為風所襲卒中涎潮昏塞不

語嘔吐痰沫頭目眩暈上實下虛真陽耗竭兼治陰

証傷寒六脉沈絕昏不知人事又治霍亂吐瀉飲食

不進及小便淋瀝不通止及赤口瘡咽喉冷痛一方

治痰涎土厥頭疼旋暈四肢逆冷口眼喎斜語言不

出牙關緊急如有風涎証皆可服之

大附子

生去皮臍

桂府滑石

各半兩

圓白半夏

七分半湯洗七次

右為末每服二錢水二盞薑七片蜜半匙煎至七分

空心冷服如心燥加辰砂如霍亂加藿香如小便不

利加木通燈心茅根煎此藥雖有差諒亦無所苦



普濟方卷八十九

總校官候補知府 臣葉佩蓀

校對官編修 臣張九鐔

謄錄監生 臣魯揚清