

衛生鴻寶目錄

華亭 高味卿增補

劉湄 沈子翔校閱

卷一 內科

○通治

太乙紫金錠

解毒主方 通治百病

太乙救苦丹

辟瘟主方

靈通萬應丹

痧脹主方 通治百病

至寶丹

治諸中 痰迷驚

蘇合香丸

治尸症五絕 跌撲等症

清心牛黃丸

治中

風痰熱閉 證 過等證

黑錫丹

治陰冷 諸證

紫雪

治火熱 諸證

寸

金丹

治感冒霍亂等證

菩提丸

治瘴氣中暑等證

神效藥茶

治感冒傷

食等症

隔等

症

范志神麩

治吐瀉瘧痢等症

五香丸

治痞滯壅

卧龍丹

治痰厥痲痧等症

蒸臍方

治沉寒鋼冷諸症

罨熨法

治結胸痞滯等症

傷寒

醋熏法

治傷寒發狂

葱蘇姜查茶

治傷寒無汗

紫

蘇摩熨法

治傷寒食積蓄血

糟蒲餅

治傷寒結胸

黑膏

治温

斑毒發

山梔散

治發斑豌豆疹

礬石散

治發斑怪症

霍亂

陰陽水

治霍亂吐瀉

芫蔚湯

治乾霍亂斑毒

蒜漿飲

治中暑

千金消暑丸

治中暑

五汁丸

治腹痛水瀉

濕

瘟方

附暑

疫癘

達原飲

治疫主方

消毒達原丸

通治諸疫

普濟消

毒飲

治大頭瘟

蝦蟆瘟方

人中黃散

治疔瘡瘟

骨麻

症

雞子瘥法

治時疫熱病。附吊脚痧。

撥正散

治雜氣陰陽毒諸厥

症

呂祖師清瘟神方

辟瘟集祥香

痧脹

寶華散

治痧主方

焮痧法

附打火確法

刮痧法

放痧法

時疫急救靈丹

濟生丸

治諸翻症

通關

散

治翻症。朱砂症。

時疫經驗方

坑砂飲

治痧

蕎麥散

治黑痧

羊毛疹

中寒

葱熨法

治中寒厥逆脫陽等症

手握丹

治傷寒火陰陰症

吸風法

治陰症

松節煎

治陰風

純陽救苦湯

治陰症

風痺

通關散

治中風

開關散

治中風口噤

熨痺法

治半

身不遂

改容膏

治口眼歪斜

透頂散

治頭腦風

禦寒膏

痺治冷

史國公藥酒

治風痺癱瘓

青松藥酒

治風濕氣

大神效活絡丹

治風濕諸痺

觀音救苦針

治濕氣痞塊等症

諸痛

止痛太陽丹

治頭痛

止痛薰法

治頭痛

滴鼻

法治頭痛

姜附散

治心腹痛

點眼止痛法

治胃脘痛

安東散

治肝氣痛

海蛤丸

治肝氣痛

韭菜餅

治脇痛

過

街笑

治閉氣痛

摩腰紫金膏

治腰痛

四製火薑方

失血

當歸煎

治吐血

猪肺丸

治吐血

地黃粥

治吐

血

七生湯

治口鼻血

十灰散

治吐血

花蕊石散

治陰邪湧血

惜紅飲

治鼻衄

止血法

神塞丸

治耳鼻衄

小薊散

治牙衄

紫霜丸

治舌衄

牽牛散

治尿血

便血方

勞瘵

烏雞丸

治虛勞吐血

保陰煎

治內熱虛勞

八

珍丹

治虛勞吐血

虛勞神應膏

治吐血咳嗽

益陰養榮

膏

治童子勞

阿魏散

治骨蒸

驅蟲丸

治尸勞

鰻魚

丸

治尸症

金絲膏

治癆蟲

引癆蟲法

癆瘵擦法

○ 瘋症

白金丸

治癲狂

橄欖膏

治癲狂羊頭風

葱蘆散

治癲

狂

甘遂丸

治癲狂

定痛丸

定癢丸

治癲癩

○ 痰嗽

青鹽陳皮

治痰停痞結諸症

法製半夏

治痰塞癩癲諸症

青金錠

治風痰喉蛾等症

牛胆清心丸

治痰厥驚癩等症

節齋化痰丸

治頑結老痰

青蛤丸

治癆火

清金止嗽

膏

治痰嗽

蘇游鳳髓膏

治肺燥咳嗽

痰哮方

附食

湧吐方

治鹽哮附醋哮

冷哮塗法

○ 噎膈

秘傳噎膈膏

開關散

油蜜飲

治關格

柿餅飯

治反胃

止胃散

治反胃

鼻嗅法

治呃逆

嘔糞方

○ 膨脹

雞矢醴

治膨脹

鯉魚羹

治水膨脹

猪肚煎

治

脹

雞金散

治氣脹

貼臍餅

治水

土狗散

治水腫

鯽魚膏

治河白

○ 黃疸

猪膏髮煎

治黃疸並陰吹

祛黃湯

治黃疸

青礬散

治黃疸附黃胖病

蠟筒取黃法

治黃疸

瓜蒂散

治黃疸

神效方

治黃疸

土瓜飲

治黑疸

卑方

治黃病

○ 積聚

消積飲

治食積

二賢散

治冷積

橘核丸

通治七疝

海上仙方

治諸疝

吊腎丹

治雙腎腫痛

葶藶酒

治癥

痔

蠶痞氣法

椿皮膏

治痞塊

廣濟髮癩方

飲油

疾

生硫飲

治酒驚氣驚血驚
附風癩蛇癩

消痞神效方

瘡疾

平瘡三方

青蒿截瘡丸

截瘡神方

治三日瘡

扎臍法

治間日瘡

神仙碧霞丹

治疫瘡

早蓮膏

治瘡

止兒瘡法

藥衣

治胎瘡

痢瀉

止痢三方

海上香蓮丸

治赤白泄瀉

牛黃丸

治紅白痢

香參丸

治痢

藕荷飲

治休息痢

鯉魚羹

治久痢噤

口○附五色痢

鍋粳散

治白瀉

礬蠟丸

治久瀉

米蓮飲

治虛瀉五更泄

封臍法

治泄瀉白痢

立止靈丹

痢疾泄瀉

之則 止小兒泄瀉方 祛邪止痢散

○ 淋濁 藕蜜煎 治熱淋 藕絲飲 治血淋並三消症 白果漿

治白濁。附赤濁。 將軍蛋 治赤白濁夢遺 轉胞法 治關格 蜣

螂散 治二便秘 敷臍法 治小便秘不通 通便法 治小便秘

蜜煎導法 治大便秘

卷二 外科

○ 內服 梅花點舌丹 治諸般惡毒 蟾酥丸 治疔瘡惡毒

丹治 芎芷香蘇散 治瘡疽挾風寒而發者 保安萬靈丹

治一切腫毒風氣宜發散者 四妙湯 瘡疽不論陰陽先後通用 三煎方

卷二目 五

治無名腫毒初起
衛生湯 治瘡疔初起
連翹金貝煎 治陽分瘡

毒 琥珀蠟礬丸 瘡疔已成未濃用之
陽和湯 治陰毒諸疔

醒消丸 治一切陰毒
黃丸 治熱毒大瘡
小金丹 治流注等初起
參

芪內托散 治潰瘍
長春藥酒 治外科虛症
一粒珠方

對口癰疽等證
治無名腫毒發背
五花散 治腫毒

外治 神仙隔蒜灸法 陽瘡陰疽通
黃蠟灸法 治頭

瘡腫 毒 觀音救苦丹 小癬用之
蟾蜍消毒法 治惡毒初起

拔毒異法 治陰疽初起
移毒法 治毒發骨節間
如意金

黃散 紅癰用之
回陽玉龍膏 陰疽用之
冲和膏 陰疽半

用 萬應針頭丸 惡毒腫核已成膿用之 元珠膏 治腫瘍將潰

烏金膏 六合回生丹 治瘡毒潰爛。海浮散去腐生新 黑龍

丹 治勞肉 生肌玉紅膏 瘡疽收功 陽和解凝膏

貼潰爛 仙傳三妙膏 貼一切外症 黑虎丹 拔毒長肉

○眼目 歸掌地黃丸 治內障 開明銀海丹 點一切目疾

丹砂散 金露散驚翎眼藥。點治諸眼 石燕丹 點外障諸翳 珍珠

散 點翳障初起 二百味花草膏 點赤腫爛 棗慈餅 點大

眼 碧雲散 治火眼攀睛 眼丹 萬金膏 洗爛沿風淚

紗罩取蟲法 治爛 阿魏散 治星翳 捷經法 治雲翳

附盒
關法

去翳方

努肉攀睛

拳毛倒睫

立翻

散

治眼皮
外翻

平祟散

治眼珠突出
附肝脹

雀目

視物

反常

附視物到植
瞳人反背

偷針眼

眼内生瘡

附眼皮
生瘡

翠雲錠

治眼胞菌毒
附眼胞痰核

補漏生肌散

治眼
漏

石楠散

治通
睛

羅氏煮肝散

治瘡
眼

化針散

治目
疾厚

翳

洗眼神方

治紅白赤眼
一切目疾

七靈丹

鼻

天羅散

治控
腦砂

鼻淵

鼻痔

鼻瘡

改容丸

治粉刺雀斑
附肺風痞

赤鼻

附酒刺
鼻破

鼻透雙線

耳

耳痛

聾耳

滴耳油

治耳
疳

龍骨散

治耳
膿

三仙方 治耳腮 穿粉散 治耳珠及 耳草 附耳

菖蒲散 治耳鳴

咽喉 七寶漱散 治一切喉風 附時疫喉風 辛烏散 治喉風

膏治 頑痰 冰梅丸 治風火喉症 牛黃清心丸 治鎖喉毒

玉液上清丸 治喉痺並口舌生瘡 紫膏 治咽喉痛 桂姜

湯 蜜附子治 格陽喉痺 滴鼻漿 治喉蛾 透關散 治纏喉

通關神應散 治乳蛾纏喉風喉痺 魚胆礬 治急喉症 絳雪

丹 治喉風乳蛾疔癰通 元霜散 治喉蛾痺閉 並口舌諸症

冰硼散 治咽喉口舌牙疔等症 柳華散 治喉風乳蛾口舌生瘡牙疔等症

玉鎖匙 治喉閉喉風及痧症爛喉
壁錢散 治纏喉風乳蛾
烏雲

散 治乳蛾
吸咽法 治喉痺
提髮法 治乳蛾
刺筋法

蛾治乳
刺穴法 治喉閉大頭瘡
喉痛
咽喉生肉
天

白蟻

舌
針刺法 治重舌木舌紫舌脹
烟熏法 治舌腫重舌木舌
吹鼻

法 治舌腫舌出
塗足法 治舌腐重舌齦
木舌
膜舌

絆舌
舌腫
翳舌
懸癭 附小舌脹
毀舌風 附舌瘡

北庭丹 治舌菌
蜘蛛線 治舌菌

口唇
柳花散 治虛火口破
赴筵散 治實火口破
鳳衣散

治口瘡口疳及
乳蛾喉癰疔癰

唇瘡 附唇紫
唇裂

緊唇作痛 唇

黑腫痛 審唇○附
銜唇瘡

繭唇 翻唇疔 口中肉球

○牙齒 青蒲散 治走馬
牙疳

勒馬聽徽絲 治走馬
牙疳

青

蓮膏 治走馬
牙疳

牙疳扎足法 附爛黃
牙疳

玉帶膏 治
風

火牙 蝕

牙疼灸法 刻歡丸 治風火
蟲牙

取牙蟲法

風火牙疼 擦牙散 治牙
痛

牙漏 南星散 治
骨

槽風

青腿牙疳 齒鋸 髓溢

○頭面 救苦拔毒丹 治頂門疽腦發
發鬚發眉對口

鬚毛瘡 附火
珠瘡

耳後銳毒 治
疽

雲頭風塊 附面
丹

面上瘋 癩

骨紅瘡 華蓋散 治禿瘡 黃香膏 治胎毒瘡 梨肥瘡 綠

雲膏 治蟻及頭 蟾攻頭 附額頭 眉毛爛脫 治瘡

○ 頤頸 茄蒂湯 治對口 對口方 猪肉貼法 治對口

時毒砭法 通氣散 治大頭瘟 礬蠟丸 治兩腮紅腫 疥

腮 燕窠瘡 蟻漏 結喉瘻方

○ 瘰癧 消癧丸 蹲鴟丸 治結核癧 串並喉癧 痰毒 痰癧

內消方 灸癧內消法 灸癧除根法 癧瘡吸

膿法 天香膏 貼瘰癧

○ 發背 神燈照法 治發背並一切陰毒 白芨膏 治發背搭手 發

膏神方 搭手 發背膏藥 準提膏 治外證 陰毒

○內癰 金鱗湯 治肺癰 肺癰秘方 化毒桂枝湯 治

脚腸 癰 地榆飲 治大小腸癰 溫腎丸 治胃癰 井疽 心肝癰 心癰

○胸腹 地栗粉 治胸漏 附 糯飯罨法 治脇肋腰

○附皮 膚起 泡 三妙散 治臍中出水 大青散 治肚

色黑 石楠散 治肚

○手指 穿掌毒 擊 手發背 套指法 治蛇 蜓蚰

散 治手指濕毒 並塗內痔 脫疽 甲疽 代指 癰瘡

魚臍疔 鷺掌風 鷺爪風 錫灰膏 治螞蟻窩 及血癩

瘡

拖油膏方

治濕毒爛脚

下部

回春脫疔散

治下疳並舌被咬去

螺蛳散

治下疳腎囊腫

蛋套法

治龜頭腫硬

燭卸疔

腎囊腫

附陰球開花

繡

球風

保腎法

治囊爛

紫襠風

附陰腫如斗

腎漏

諸疔初起

附囊瘰

囊芽

楊梅結毒

五寶丹

治楊梅結毒並下疳燭卸頑癬癩瘡驚掌風赤白癩風爛牙疔

等症

忍冬湯

治梅瘡

金蟬洗甲酒

治結毒

槐蕊方

治梅瘡

結毒奇方

銀青散

治梅瘡疔瘡陰瘡痘毒

紫

蘆散

治梅瘡陰蝕胎毒

後部

九龍膏

治魚口便毒
懸癩橫症

國老膏

治懸癩
騎馬癩

生

熟地黃丸

治懸癩內外
痔漏臙瘡

礬蠟丸

治偷糞風
騎馬癩

魚

膠飲

治魚口
便毒

牛膠飲

治陰處
惡瘡

茜草湯

治橫瘡
便毒

化毒丹

治猴
疔

猓猴疔

止痒丹

治臟頭風
附穀道生瘡

坐板瘡

蓐瘡

腸風痔漏

棉柿丸

治腸風
下血

秘製腸風散

固漏

九猪臟丸

治痔
漏

洗痔湯

引痔蟲法

痔漏

去管生肌方

脫出腸頭

腿膝

附骨疽

馬蘭膏

治兩腿赤腫
附火疔

加味五益

膏治膝風

皂倍丹

治鶴膝附牛頭瘡

五聖散

治鶴膝

瘡填法

鉛皮貼法

治瘡

紗罩去蟲法

治瘡

濕毒腫瘡

夾紙膏

治瘡

脚肚瘡

夾膏神方

○足趾

驢眼瘡 飛丹散

治脚瘡

升葛散

治濕脚氣

並下疳

爛脚藥 濕脚癬

附脚氣

蠟香丸

治牛程躄

○泉疽

鐵粉散

治冷疔

烏茄疔

雞眼膏

續

節丹

治絕足風

○風濕

脚氣洗法

脚氣膏

附雞脚風

香附餅

治流注

雷火神針

治風濕

風毒灸法

松香膏

治風濕

芥末拔法 治風濕
蟾蜍酒 治大風
蒼耳膏 治癩風紫

白癩風。附白駁風。
蛇皮風瘡 附雞脚風
神效方

○丹毒 丹毒砭法 丹毒貼法 犀角解毒飲 五

松散 治赤游
煤塊散 治疔腫流火
清涼膏 治纏腰火丹

水蛇火丹 鬼臉火丹 抱頭火丹 痞子火丹

爛皮火丹 赤遊丹神方

○疔毒 立馬回疔丹 壁釘散 治諸疔
慈礬餅 治疔瘡并

乳癰惡瘡
菊花甘草湯 治疔毒惡瘡紅絲疔
神驗疔毒丸

極重走黃疔方 人中疔 血疔 魚子疔 羊毛

疔 消疔丸

一名拔疔散 立消疔瘡

○諸瘡

呂祖仙膏

治無名腫毒瘡癰

獨蒜膏

治無名腫毒瘡癰風濕

惡瘡洗法

諸瘡擦藥

製瘡藥油

金銀散

治瘡

柏油膏

治肥瘡羊鬚奶癰膿窠耳瘡血風鈕扣風襖邊瘡

硫黃

粉

治膿窠瘡疥

礬香油

治疥肥膿窠附頑癬禿瘡

麻黃膏

治疥

瘡

青蛤散

治黃水浸淫膿瘡

膿窠瘡

血風瘡

天

泡瘡

天火瘡

魚胞瘡

金絲瘡

附葡萄瘡

癩疽

五色瘡

附頭面浮腫如蛇

天行斑瘡

檳皮酒

治諸癩

濕癬方

百部膏

治頑癬

紫草膏

治眉風癬附咬髮癬

消風玉容散

治面風癩。附荷葉癩。

黃連膏

治脚癬潰爛。

○ 雜症

龍泉疽

附臂竅腎囊出血。

桃花散

治肌衄。

血癖

風疹疙瘡

鷲黃散

治瘰癧。

疣瘡

瘤贅

蛛絲

纏法

治疔。

體氣

下頰脫

凍瘡

手足凍裂

漆瘡

狐刺瘡

漏管

瘡疔

翻花瘡

多骨

疽

卷三

幼科

○ 通治

保元湯

治氣虛血弱。

活幼補腎地黄丸

治先天不足諸症。

症

五福化毒丹

治蘊熱胎毒諸症。

沈瀼丹

治胎毒火丹諸症。

三仙丹

治食物過多

瀉青丸

治肝火鬱熱諸症

抱龍丸

治急驚內

肥兒丸

治內熱蟲積

解表通用方

治外感諸

症

太乙保生丹

治急驚

○初生

拭口法

防驚法

封臍法

擦穴法

附揉乳法

挑泡法

治初生

通氣法

治悶臍生○附肚門內合

撲粉

法

治初生無皮

地黃膏

治目不開

葱白湯

治不乳使閉

硫

黃散

治陰囊入腹

梨汁飲

治胎熱胎赤

嚏驚散

治胎驚

胡桃飲

解胎毒

人中黃散

治胎毒遺毒

粉艾丹

治胎癩

蛇體浴法

晶體摩法

螳螂子塗法

○ 臍風 辰砂膏 治臍風

摻臍法 預防臍風馬牙

掩臍法

搥泡法 啗鼻法

擦背法

灸筋法

燈火淬

法 以上並治臍風

○ 外感瘕症

桂枝葛根湯

治柔瘕

桂枝加防風湯

治柔瘕

瘕

防風當歸湯

治柔瘕

瓜蒌根桂枝湯

治剛瘕

羚羊角散

治陽瘕

附子散

治陰瘕

當歸四逆湯

治虛瘕

瘕

○ 痰火閉症

通關散

治內火急驚

奪命散

治急驚痰潮

導

赤散

治心旺發搐

清熱鎮驚湯

治急驚

加減涼膈散

治急驚

金粟丹

截風定搐

萬蟲丸

治急驚

治驚簡便

法

止驚神妙法

秘製抱龍丸

治小兒驚風百病

虛寒慢症

逐寒蕩驚湯

治慢驚

理中地黃湯

治慢驚亡

陰症

附子理中湯

治慢驚亡陽症

溫中補脾湯

治慢脾

拔驚奇驗法

大驚猝恐

秘旨安神丸

治血虛驚悸

七味安神丸

治

熱驚悸

天鈞內鈞

鈞藤飲

治天鈞

木香丸

治內

癩症

定癩丸

斷癩丸

○疔積 集聖丸 疔症 主方 君雷散 疔疔 積 疔積膏 疔

疾丸 疔積方 雄黃解毒丸 治蟲 痛 葱油飲 治蟲

積 傷食熨法 消癖法 治乳 癖 疔積膏藥

○雜症 青果煎 稀 疔 蟬花散 治夜 啼 花火膏 治夜 啼

手摩丸 治中寒 腹痛 天麻丸 治疔 眼 消疔散 治口疔 牙疔

小兒急黃 天哮 止嗽丸 治百 疔 杏蜜煎 治 疔

逆 牛黃奪命散 治馬 脾風 葶麻膏 治肺 脹 手握

丹 治瘰癧 疾。 附瘰癧 母 金液丹 治吐 瀉 貼疔方 治久 疔 燒

針丸 治吐 瀉 封疔法 治噤 口疔 蒔蘿散 治小 腸疔 倍礬

散 治脫肛

掩臍法 治二便不通

尿床方

疎表法 治發

外治法

納氣法 治喘虛

通脉法 治厥冷

開閉法 治風

熱

清裏法 治發熱

解煩法 治實熱及麻疹

開閉法

痰

引痰法 治痰嗽

化痰法 治寒痰

定痛法 治臍腹痛

回生艾火

治陰寒久病

治螳螂子方

卷四 痘科

種痘

藏苗法

下苗法

新增種痘說

牛痘論

稀痘三豆湯

發熱

加味升麻葛根湯

治體強外感

加味參蘇飲

治體

弱外感

敗毒和中散

治毒閉
煩悶

清解散

治毒壅
驚搐

蘓解散

治外感
驚搐

溫中益氣湯

治內虛
驚搐

真人解

毒湯

治痘
母

元參升麻湯

治痘出夾
痧麻丹疹

見點

九味神功散

治痘密
焦紫

十神解毒湯

治血熱
毒盛

調元化毒湯

治痘密
毒盛

必勝湯

治痘隱
毒陷

歸宗

湯

治火盛
毒熾

枳實導滯湯

治裏滯
夾毒

十宣散

治虛
寒夾

滯

百祥丸

治裏實
黑陷

起脹

太乙保和湯

治血熱
毒盛

清毒活血湯

治毒盛
血凝

利咽解毒湯

治火炎
咽痛

參歸大補湯

治面目
腫脹

參歸鹿茸湯

治氣虛血縮

千金內托散

治全上

三妙

血

治熱盛毒陷

灌膿

參芪湯

治氣虛血陷

托裏散

治表虛裏實

四物內

托飲

治血燥氣鬱

異攻散

治表虛痒塌

木香散

治裏虛泄瀉

九味異攻散

治虛寒塌陷

建中湯

治寒戰咬牙

加味

四苓湯

治熱毒泄瀉

參朮散

治虛寒泄瀉

七味豆蔻丸

治虛滑泄瀉

○回靨

養胃開痰湯

治痰血不靨

溫表調中湯

治虛寒不靨

清表散毒湯

治毒滯不靨

保嬰百補湯

漿足調理

大

連翹飲 治痘後餘毒

清毒保目湯 治痘毒攻眼

清毒撥

翳湯 治痘後目翳

解毒護童膏 治痘後餘毒

外治法 燈火焮法

治痘初驚搐

雄雞敷法 治氣虛毒滯

胡荽酒 痘初碎穢

茵陳熏法 治觸穢黑陷

神燈照法 治痘

痒塌

胭脂塗法 治一切惡痘

水楊浴法 治毒絆血滯

煖臍法 治腹痛吐瀉

敷臍法 治舌黑痘紫

神應膏 痘出護眼

紫龍丹 治眼中

煮針法 治痘

二妙丹 治痘

四聖散 治痘輕者

拔疔丹 治痘重者

生肌散 治疔

潰成坑

除泡散 治水泡

混沌如金散 治痘

松花

散 治痘

化毒湯 治外

生肌散 治痘

痘毒方

痘癩膏

消疔解毒散

治痘後

疹

竹葉石膏湯

麻疹

宣毒發表湯

治疹初

化

毒清表湯

治疹出

清熱導滯湯

治疹後

清肺湯

治疹後

敗毒散

治疹後口

爛喉痧

加味荆防葛根湯

治疫痧

加味藿香正

氣散

治夾滯

爛喉痧煎劑神方

爛喉痧吹藥

神方

珠黃散

治喉爛

葛根湯

治痧

加減葛

根湯

治無汗

香鼓散

治痧隱邪

葛犀湯

治痧

片無汗

犀豉飲

治喉爛痧隱

犀角地黄湯

治痧

已透及未透邪
火燥津液喉爛

犀羚二鮮湯

治痧透喉爛
舌絳液涸

奪

命湯

痰火燥津喉
爛痧點雲密

清肺飲

治痧透熱
淡咳嗽

雙解散

治痧癰喉爛
元強邪實

四虎飲

治痧透喉爛
舌絳便閉

五鮮飲

治痧

癰喉

育陰煎

治痧透肌燥
便閉脈虛

爛喉痧塞鼻方

珠黃奪命散

治喉爛

神醫七液丹

治瘟疫癰痢
爛喉丹痧

八寶紅靈丹

治時疫吐
瀉痧暑

卷五

女科

經孕

宜坤至寶丹

治經帶崩淋
胎產百病

秘旨烏骨雞丸

治月事不調等

八珍養血丸

治經帶崩淋

益

勞崩帶諸症

母膏

治經帶胎產諸病

蕎脂丸

調經止痛

丹參散

治經脈不調崩

帶

桃耳煎

治乾血勞

膠紅飲

治倒經

血山崩方

止逆飲

治逆經

柏綿飲

治赤白帶

血餘散

治血淋

通

經丸

治經斷發腫血分水

加味白薇丸

治血厥

濟仁固

精丸

男服有子

濟仁調經丸

女服有子

七製香附丸

治統

婦女脾腎兩虧一切氣滯百病

輔元保和丸

胎前 千金保孕丸

治胎動小產

苦柚飲

治惡阻

止漏

絕神丹

治胎漏

紫蘇飲

治子懸子痛

全生白朮

散治子 桂姜飲治胎上 苓麻飲治妊 梔

子慈岐湯治妊熱病 護胎法治妊 祛邪

化滯煎治娠 雞蛋粥治妊 仙傳保產無憂

散安胎 達生散瘦胎 易產

臨產 佛手散催生 開骨散治交骨不 仙傳四

急保生丹治難 加味八珍湯治漿乾 通津救

命至靈丹治漿 仙傳保產回生丹治難 及

觀音普濟丹治難 神應丹治盤 琥珀黑

龍丹治死胎包衣不 消衣神應方治胞衣 塗

臍法

治子死腹中

產後

生化湯

治產後諸疾

虛暈急救法

血暈急救

法

失笑散

治痰血脹胞

烏金散

治產後收血

二味參

蘇飲

治痰血入肺。附三冲

養陰惜紅煎

治鼻衄

猪腰粥

治勞

加味理中湯

治小產下血過多

乳疾

通脉湯

治乳少

神效瓜蒌散

治乳癰乳岩

香附

餅

治乳癰

塞鼻法

治乳閉乳岩

王不留行煎

治乳脹

紫草膏

治妬乳吹乳

定岩散

治乳癰

鹿角散

治乳癰

蚌殼散

治乳癰瘡

○雜症 石菖蒲湯 治花顛 雄黃丸 治鬼胎 石瘕方

陳皮葵根湯 治腸癰 海浮湯 治腸癰 收腸法 治子腸不

收 硫黃湯 治五門不閉 參朮膏 治胞損 除蝕法 治產

門生蟲○附 隱疾方 治翻花症 腸交方 附遺尿遺尿

卷六 傷科

○五絕 救自縊 救溺死 救凍死 冬月落水 救中暈

救魘死 驚怖死 救中惡 鬼打鬼排 霹靂散 治中惡

神鬼箭打 妖媚木客 山魁 透關散 救五絕 不飢丸

救荒 垂死飢民

防飢救生四果丹

救荒

○金瘡跌打

治刀傷

救自刎

救肚破腸出

杖

傷

撲打墜壓

三黃寶蠟丸

治跌打損傷蛇犬湯火瘡毒等症

黎洞丸

治跌打筋損無名腫毒蛇蟲傷等症

十寶散

治金及跌打骨碎腸

出

補損接骨仙方

治跌打骨碎筋斷肉破

秘傳正骨丹

續筋骨

治宿傷

秘傳紫金丹

治跌撲血脹筋斷骨折

澤蘭湯

治損

傷積

血

地榆絹煎

治及傷腸腹箭損筋骨產損膀胱

蟹酒

治跌損骨

碎打傷

青腫

古錢散

治折傷筋骨

玉真散

治破傷風

保辜

飲

治破傷風

破傷濕

內傷藥酒

天下第一金瘡

藥治刀傷跌碎
腫毒癰瘡

鐵扇散治刀傷

花蕊石散治刀傷吐

破腸出貓
犬咬傷

金刀黃靈藥治及傷
潰膿

軍門丹治刀傷

止血絮截血
如神

止血粉止血
生皮

截血膏治跌打
折傷

嫩鼠丹治金
瘡

接骨仙方

跌損接骨敷藥

香地膏治墮跌脫血
附閃氣

葱白膏治跌打
青腫

葱熨法

治青腫
死血

象皮膏治破傷
斷骨

紅玉膏生肌
長肉

夾棍

傷神驗膏按傷
手指

諸傷破血丹治舌
斷

戳傷玉堂耐傷
顛門

補天丹治傷

喉咽

打傷眼睛

擦落耳鼻

爪傷面目

傷破

陰囊

箭鏃入肉

附鉛子入肉

鐵鉞入肉

竹木刺

入肉

附蘆葦刺

磁鋒嵌脚

附瓦石荆棘刺足

風絲入目

辟塵膏

塵埃入目烟渣入目

湯火傷

解毒行血膏

地榆散

救命散

湯火

傷

火藥燒壞

四椽烟熏○狼烟煤毒

雜物傷

人咬傷

解毒散

治毒蛇射工蟲獸傷

痂狗咬方

螫蠶粉

治瘋犬傷

提毒法

治痂狗傷

惡犬咬

熊虎

爪傷

狢猴爪傷虎狼爪傷

馬咬傷

蹄傷馬汗驢涎入瘡

貓咬

爪傷

鼠咬

猪咬狐尿刺人

白芷護心散

治毒蛇蜈蚣咬

拔毒法

治毒蛇蜈蚣蜘蛛
毒蛇傷
蜈蚣咬
蛇繞不解
蜈蚣咬

蝮蛇傷
蝎毒
蝎蜂螫
蜘蛛咬
蛇傷
花蜘蛛

蚯蚓咬
蜈蚣咬
刺毛螫
蝎螫
沙虱毒
水蛭

石蛭毒
蠼螋尿瘡
百蟲入耳

○誤吞
吞針入腹
誤吞鉄物
誤吞銀
誤吞釵

環
毒
戒指
碗片入腹
誤吞木屑

諸木竹釵
烏龍針
針刺喉
雞

魚骨鯁
諸骨鯁咽
諸獸骨鯁
誤吞桃

螺鯁
誤吞蜈蚣
誤吞螞蝗子

○中毒

解毒飲

治射罔虎莽葭若烏附巴豆躑躅
斑毛芫菁六畜諸魚野菌等毒

解毒丸

解百毒毒
草蠱毒

解毒飲

治金石砒霜蟲蠱
賜草射工藥箭毒

解飲食毒

鮮菌野芋閉口花極砒石銀
鋤水銀冰片宿肉漏脯

解毒

錠

治蛇蝎蜈蚣等傷

中鮮蔴菇毒

野芋

中鈎吻毒

水葸

木鱉子
半夏毒

中食肉物毒

馬犬河魴鮓鯪蟹蟹藥
箭毒自死六畜毒

中狼犬牛馬毒

獸蛇牛馬肝
毒猪肉毒

誤食瘟肉生疔

牛馬猪羊
誤食廬牛

中諸鳥毒

鴉毒鵝酒
雉毒鵝頂毒

中諸魚

毒鱒魚

河黃鱔

中魚鱉蝦蟆毒

馬蝗毒鱉鳧毒
食蟻致吐游

波蟲毒

中鼠涎毒

蛇交水

中射工毒

中溪水毒

中鹽毒

中丹石毒

水銀毒 昆礬毒

鉛粉輕粉毒 候服銀朱蟻黃

瀉毒神丹

解砒 霜毒

服鹽滴

過飲燒酒

中蒙

汗毒

桐油 煤毒 百毒氣

淘古井毒

心藥 慈悲度世方

象髓丸

真人養臟膏

六

字金丹

長生飲

延齡丸

富貴湯

保生無

憂散

銘心快活飲

六味明目飲

祛邪養正

丹

和氣湯

無比逍遙散

四妙誠實湯

處

世咸宜方

歡喜錠子

種子方

附

戒洋烟

仙傳

戒鴉片煙方

戒煙神方

如聖保安

丹 固本保元丹 補元安神湯 代洋烟膏

救吃生洋烟方 鴉片有四損勸人勿吸論

衛生鴻寶 卷五

女科

經孕

經不調 血勞

赤白帶下 痛經

崩漏

血淋

倒經

經斷

逆經

血乾

厥育

寧坤至寶丹

治婦人經脈不調帶下崩漏虛勞胎前產後百病

煉黃芪

蜜炙 三兩

白朮

陳壁 土炒

棗仁

炒香

歸身

酒炒

香附

杵米 酒製

川

斷

酒炒

條芩

酒炒

甘枸杞

血餘

煉不 見火

阿膠

蛤粉 炒

杜仲

鹽水 各二兩 炒

茯苓

乳製

白芍

酒炒

丹參

酒炒 各兩半

北五味

焙六錢

甘草

蜜炙

朱砂

飛為衣 各一兩

大生地

酒煨
四兩

各為細末。秤准分兩。和勻。煉蜜丸。每重三錢。

按症照引調服。一凡及不垂孕。經脉不調。腹疼痠脹。或赤淋白帶。腰痛胃疼。夜熱心煩。食

少。蓮子湯日服一丸。諸病皆愈。即能受孕。一孕婦

每月服十餘丸。胎安身健。若胎氣失調。惡心嘔吐。虛

煩阻食。浮腫氣急。腰腹痠痛。胎漏下血。或傷胎見紅。

蓮子湯服一丸。甚者入參湯服數丸。一臨產疼陣

作時。白湯服一丸。胎自順下。如有橫逆異產。湯和童

便服數丸。母子保全。或難產者。冬葵子三錢煎湯調

服。立產。一產後下血過多。湯和童便服。惡露不行

腹痛塊痰。山查三錢。紅花一錢煎湯調服。或寒熱往

來。有外感者。荆芥穗一錢煎湯服。兼虛汗者。人參湯

服。虛煩狂躁。腹滿氣急。俱白湯服。一無論老少婦

女。益崩尿血。或因益虛。周身筋骨疼痛者。

白湯服。鮑問梅手抄廣東蠟丸方刊本。

秘旨烏骨雞丸

治婦人鬱結不舒。蒸熱咳嗽。月事不調。或久閉。或倒經。產後蓐勞。及崩淋不止。

赤白帶下，白淫，諸症。兼療男子
新喪太早，勞嗽吐血，成虛損者。
絲毛烏骨雞 一隻 男用

雌女用雄，溺倒，泡去毛，竹刀剖脇，
出肥肝內金，去腸穢，仍入腹內。
熟地 四兩，如血熱，加生地。

二兩，北五味 碎一兩，二味入雞腹內，陳酒童便各
一碗，砂鍋內水煑，旋添至糜爛汁盡。

綿芪 去皮蜜 於木 飯上蒸九
水拌炙 次各三兩 白茯苓 去皮 歸身

酒 白芍 酒炒各二兩，五味為粗末，同雞內搗
爛焙乾，骨用酥炙，共為粗末，入下項藥。

人參 三兩，虛甚倍加，川芎 一兩，童便浸晒，丹參 二兩，酒
無力者黨參代。

三味研末，用乾山藥末六打糊丸，晒乾，瓶貯，清晨
入前藥中。

沸湯下三錢，卧時醇酒下二錢，大便實者，蜜丸亦可。

助髓甲三兩，銀柴胡地骨皮各兩半，經閉加肉桂
一兩，崩漏下血倍熟地，加阿膠二兩，倒經血溢。

加麥冬二兩。鬱結痞悶。加童便製香附米一兩。沉香五錢。赤白帶下。加草薢四製香附各二兩。斷艾一兩。白淫。倍參芪苓朮。張略玉曰。此方藥味平常。而調經最驗。蓋雞屬巽。補肝。尤妙在烏骨。益腎。變巽。歸坎。甲癸同。源。兼滋衝任也。

八珍養血丸

治月候不調。赤白帶下。皮寒骨熱。肢體倦怠。並一切崩淋乾血等症。

炙芪

生地

白朮

丹參

當歸

阿膠

茯神

茯苓

白芍

遠志

川芎

炙草

為末。杜仲。

十兩。

熬膏。

和煉蜜丸。

每服四錢。淡酒下。

重症

者。早三錢。姜湯下。晚二錢。淡酒下。乾血癆。由先天不足。七情所傷者。用全當歸五錢。水酒各半煎。分早晚服。煎進養血丸。可漸愈。慎勿輕用。通經逐瘀。如桃仁代赭之類。恐致崩下。暈脫也。○囊精

益母膏

一名返魂丹。治胎前產後諸病。及月經不調。赤白帶下。

益母草

一名芫蔚。方梗。

對節生葉。四五月開。紫花者是。白花者非。

連根葉子

五六月采。洗淨。陰乾。忌鐵器。石臼內。

搗砂鍋內煮濃汁。漉去渣。

文武火熬成膏

如黑糖色。磁瓶貯。

每服二三匙。

胎動腹痛。下血。當歸湯下。胎衣不下。炒鹽湯下。產後血暈中風。

血積脹痛。鼻衄。舌黑。童便和酒服。產後瀉血。棗湯下。

痢疾。米湯下。崩漏。糯米湯下。赤白帶。阿膠。陳艾。

湯下。凡產後童便。調服一二匙。能調經絡。破血。痛。

或治血湯藥中。加一匙。尤妙。或碾細末。煉蜜丸。彈。

子大。每用一九。俛純。字曰益母草。通經逐滯。消疔。

腫乳癰。產後諸疾。因血熱。血滯。氣脈不和者。用之。相。

宜。若胎前血虛。形怯。血脫崩漏者。未可概與也。

喬胎丸

調經止痛。

蕎麥

五升。去粗皮。取淨麩。能逐瘀滯。補衝任脈。

畫邊臙脂

二兩。係蕪木苗草紅花。佐烏梅煎染而成。取其
濕潤之氣。威而不猛。恐行血過峻。加酸味制之。將

臘脂煎濃汁。搗麥麵為丸。梧子大。每服三錢。空心開

水下。忌猪肝羊血糟醋。○毛達可曰。婦人行經作痛。
難以受孕。子投以培養衝任通絡。逐瘀之品。痛

止。經調俱得生育。○林章甫曰。消息血中之氣。此方甚精。

丹參散 治經脈不調。或紫腹痛崩帶。 丹參 十斤。酒洗。醋浸一宿。晒乾。為末。每

服二錢。早滾湯下。晚好酒下。久服調經養血。子宮。溫

日。丹參一味。功同四物。能破宿血。補新血。安生胎。下死胎。止崩帶。產後惡露不下。經脈不調。

桃耳煎 治婦女乾血勞。 大木耳 水泡脹去蒂。晒乾為末。 胡桃肉 去皮搗各

錢二 黃酒煮服。過半炷香時。渾身汗出。是其驗也。○奇方類編

膠紅飲

治婦人。晚年驟然血。海大崩不止。名倒經。

阿膠

米粉炒成珠。

當歸

各一

兩 茜紅花 錢四

冬葵子 錢五

天泉水煎服。

崩止。用六君子。

加歸芍調理。○毛達可曰。葉夫士云。初崩宜塞。久崩宜通。子每治老婦圍經。多神應。後見少婦大崩。屢服補劑不止。取此方投之。立效。

血山崩方

鹿角膠 錢三

晚間用酒浸。次早重湯烱化。

服下。或下午再加一服。更妙。屢驗。

久服。不特斷根。血氣更旺。於昔。○墨

寶齋集

驗方

止逆飲

治逆經久閉。血從口鼻出。

陳墨

水磨一杯服。即止。

次用當歸。

紅花各二錢。水煎服。或服韭菜汁甚效。○文堂集驗方

柏棉飲

治赤白帶

棉花子

半斤燒存性淨一兩

柏子仁

一兩燒存性淨三錢

為末空心淡酒調服三錢

○程鍾齡曰帶下有五

色之分不必分屬五臟總不外脾虛有濕而已用五

味異攻散加扁豆苡仁山藥澤瀉等無不愈有熱加

黃柏蓮心青加柴胡山梔黃加石斛荷葉陳米

赤加丹參當歸白倍加苡仁黑加杜仲川斷

血餘散

治血淋

髮灰

二兩

藕汁調服痛脹甚者三日即

愈

種福堂精選方○集驗方金針菜每日淡煮數兩食之○濟世養生集浮小麥童便炒研砂糖調服

通經丸

治婦人經斷發腫

歸尾

赤芍

生地

川芎

牛

膝

五靈脂各一兩

紅花

桃仁

各五錢

香附製

蘇木

各二錢

琥珀

七錢半

煎酒和砂糖熬化為丸悟

子大每服三錢酒下

五錢。○心悟。經水先斷後發腫

者名曰血分。此丸主之。若先發水腫後經斷者名曰

亦用五皮飲加芥末。脾虛不能制

加味白薇丸

治婦人多崩漏之疾。忽爾

白薇 赤芍

沙參

各三

歸身

四

川芎

甘草

各一兩

黃芪

蜜丹皮 各二兩

為末水法丸。菘豆大每服二三錢

早晚沸湯下

忌菜菔葱蒜猪羊糟酒。○湛清堂集

癩。但目閉身僵口不能言。外無形症。身不冷無痰沫。此方多服。養血可。不復發。如煎服。六錢為一劑。○同

壽錄。婦人血風攻腦。倒地不省人事。蒼耳草取心陰乾為末。每服一錢。

濟仁固精丸男服此合六味地黄丸。五子衍宗丸。二方增減。大熟地砂仁炒

九晒八兩砂仁需用二兩枸杞子去梗蒂黃肉去核酒蒸肝

用。菟絲子揀淨杵懷山藥乳蒸各茯苓乳蒸

飛去浮在上面粉丹皮酒蒸各北五味酒蒸肺有

覆盆子用草本車前子各一取淨末煉蜜丸

梧子大每早開水下四錢凡男孛左火無力或脉數

六兩熬膏右尺無力或脉遲厥冷此火虛也加鮮釵斛

桂附子各一兩二尺無力精薄不能射遠此水火

俱虛也加魚鱉鹿角膠各二兩鹿茸史妙綿萆一斤

熬膏為丸若其人相火熾盛內熱遺精尿血者須

服知柏補陰之品火靜熱清亦可有

子一切綴精壯陽之藥均非所宜

濟仁調經丸

女服亦名坤厚資生丸。此本益母勝金丹。稍加減之。

大熟地

砂仁酒拌

九蒸當歸酒蒸

芫蔚子

酒蒸

於木

陳上炒各四兩

香附

枳米姜汁鹽

白芍

酒蒸

丹參

酒蒸各三兩

川芎

酒蒸二兩

阿膠

黃炒珠

益母草

鮮者數斤熬膏

煉蜜丸

每早開水

下三四錢

經水先期色紫脉數血熱也。加生地條芩丹皮。經來過期色淡脉遲血寒也。加桂

心炮姜紫石英。行經腹痛拒按者。加陳皮延胡。腹有痞塊飲食滿悶者。加莪朮。食少氣虛面少血

色四肢無力。減香附。加參芪遠志。食少氣虛面少血。鬱結脇脹。胃脘痛。癥瘕腹疼。經阻。須先服和脾養胃

之品。他症一去再服此丸。益母勝金丹。有牛膝酒炒。杜仲。益水炒。無阿膠。血熱。加丹皮。生地。各二兩。血

寒。加肉桂。一兩。

周呂萃廣達生編嗣息之艱命也而積德可以回天
然亦有男女不善調攝者男子之要在固精女子之
要在調經固精宜寡慾調經先養性今錄齊仁二方
於右。張景岳曰種子之方本無定執因人而藥各
有所宜故凡寒者宜濕熱者宜涼滑者宜澁
虛者宜補去其所偏則陰陽和而生化著矣

七製

香附丸

凡婦女多因鬱怒傷肝思慮傷脾故見證肢
體困倦面目枯黃日晡潮熱夜靜晝煩胸膈

填脹腰脇疼痛飲食無味神識不安赤白帶下如是

等情漸致經水不調或致半產漏下久而不孕亦有

成勞宜服此丸日久自有功效此調經之聖藥保元

理氣之神方也凡山嵐異氣老幼水土不服者亦治

香附能為主辛溫一分醋浸開氣中之一分鹽水浸

中之一分小茴香二兩入水同一日炒一分童便浸

陽中之一分乾去小茴二兩入水同滋離

陽中之一分益智仁二兩入水同浸炒一分蘿蔔子二

去益智培脾補腎強志一分兩入水同

浸炒去苗子一分福珍酒浸通十二化滯開胃經絡一方無浸春秋三日夏

一日冬五日製完淨米即香入砂鍋加艾葉四兩無灰

酒隨添隨煮至色黑為度使氣味完固淨米七兩為君方氣和平

當歸四兩熟地四兩姜兩川芎三兩白芍四兩酒炒

人參一兩貧者西黨白朮二兩茯苓二兩炙甘

草九錢棗仁二兩天冬二兩益母草四兩酒炒

山萸肉二兩酒炒陳皮二兩延胡索兩半阿

膠二兩炒加條芩一兩清血熱平肝熱去膈熱解

共為細末酒煮神麴為丸或稍加煉蜜潤肺如桐子

大其性清上達早白湯下清上焦之營晚温酒送養

下焦之血或下導滯和中或用清米湯則補肺健脾或用桂圓汁則

養心和血每服七八十丸加至百丸左右修合不易

氣味和平血病用之效氣病服之靈不但無孕者能

孕即有孕者可以却病延年也輔元堂補刊。高味

水不調漸致癸閉食減神疲肉削頸患應串膿水淋

瀉醫藥無效余議熟地生芪冬朮各四錢歸身丹參

炒枣仁各二錢炙甘草六分桂圓肉五枚每日一劑

輔元保和丸

治氣血虧弱風寒留戀筋脉痠楚骨節

疼痛四肢不仁乃補虛通絡之妙劑

熟地

十二兩

黃耆

甜冬朮

製首烏

白歸身

炒酒

各六兩

潞黨參

川續斷

各八兩

赤丹參

雲茯苓

夜交藤

枸杞子

淮山藥

牡丹皮

補骨脂

菟絲子

各四兩

淮牛膝

炒鹽水

白芍

炒酒

秦艽

蘓葉

澤瀉

威靈仙

各三兩

新會皮

防風

薑

半夏

枳椇

炒焚

川撫芎

各二兩

西砂仁

半兩

廣木

香

八錢

炙甘草

一兩

川桂枝

八錢

右藥味共為細末以

絲瓜絡

四兩

茄子根

四兩

鮮藕


二兩

煎濃湯化煉白蜜

四十兩

打糊為丸如彈子大

每丸重三錢外用蠟殼則氣固勿霉○莘溪周芸閣擬方



Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page, covering the majority of the left and center areas.

胎前 滑胎小產 胎動不安 胎漏 惡阻 臟
燥 子懸 子眩 子痛 子腫 轉胞

胎氣上逆 孕婦熱 病娠 中惡

千金保孕丸

治胎動不安。腰痠腹痛。善於小產。杜仲八兩。糯米浸透。去粗皮。蒸晒。鹽炒。水炒。續斷。四兩。酒浸炒。山藥。六兩。炒另磨。歸身。酒炒。二兩。

用山藥粉。打糊為丸。菘豆大。空心開水下。四錢。忌酒。

醋惱怒。汪樸齋產科心法。此方大補腎氣。托住胎元。有孕。即合服。勿間斷。服過六七月。永無小產之患。

○廣達生編固胎方。用杜續各二兩。雄猪尿脬一個。填藥在內。酒煨搗丸。梧子大。每服三十九。空心米飲下。治滑胎易產。每月吃一個。效過多人。○幼幼集。

成。加熟地。煑膏於木條。茶無山藥。各三合。保胎丸。

苦柚飲

準繩。治妊娠惡阻。嘔吐。不食。頭暈。不敢行步。

苦柚皮

不拘多少。

濃煎

湯數盞服即愈。吐甚加姜汁。王宇泰曰：予治惡阻，

自笑紅棗燒存性米飲調下。

止漏絕神丹 治胎漏。 白木 五錢 熟地 一兩 三七根末 七錢

水煎服。萬密齋曰：此方妙在三七乃止血神品。故

一合糯米二合煮粥調勻空心服。一方加阿膠蛤

粉炒清酒下無糯米。○高味卿治徐姓一婦胎已

九月因過勞不慎致小便下血如注食減汗多肢

軟神疲胎動欲產陰戶滯痛用熟地五錢生地製

冬朮各三錢生芪牡蠣各四錢白芍炭二錢歸身

錢半地榆炭二錢炙甘草六分大棗五枚桂圓肉

二十枚水煎服至七劑血止接服熟地生芪西黨

冬朮各一兩歸身二錢大棗桂圓肉各十六枚服

紫蘇飲 嚴氏治子懸腹痛臨月浮腫 紫蘇 二錢 川芎

喘脹或臨產驚恐氣結不下

當歸酒洗

白芍酒炒各一錢

陳皮腹皮黑豆水製淨各八分

人參

炙草各五分

生薑片二

葱白五

水煎服

氣加白

虛羸少

米倍參。○心腹痛甚。加木香延胡。○怒傷肝。加柴胡。

○感冒風寒。去腹皮。加香豉。○胎動不安。加芩朮。○

胎不運動。加木香砂仁。○肥盛氣滯。加厚朴。○心悟

程鍾齡曰。胎氣上逆。緊塞胸間。名曰「子懸」。更有氣逆

而厥暈。名曰「子眩」。並用前藥。如脾虛挾痰。則六君子

湯。不虛者。二陳湯。加竹瀝薑汁。○闕誠齋曰。孕婦氣

挾痰火。狀如中風。卒倒即醒。此為「子痛」。馮氏治法。四

物養血。酒芩清熱。二陳化痰。獨活。防風。皆勿用。

全生白木散

治胎水腫滿。名曰「子腫」。

白朮土炒

一兩

姜皮

大腹

皮

去外膜盡

茯苓

陳皮

各五錢

為末。每服二錢。

豆汁製

米湯下。

未應。佐以人參甘草。○一方。磨木香汁。三匙。入藥。○張路玉曰。此即五皮飲。惟白朮易桑

皮而功用懸殊。煎成金手也。汪樸齋曰：予每用五皮飲，加蘇梗、車前，治胎腫多驗。惟參、朮不宜早補，總以利濕為先。

桂姜飲

治臨月胎上逼心嘔噦欲死。

烏梅肉

十枚

生姜片

三

煎湯

灌即下

張路王曰：取酸以降斂之，辛以散火之逆也。用童便灌亦佳。婁氏治胎氣上逆，熱痛下

血，用葱白十四莖煎濃飲之。胎未死即安，已死即出。

苓麻飲

治妊娠轉胞，小便不通。

茯苓

赤白各二錢

升麻

錢半

當歸

二錢 川芎 錢一

苧根

錢三

急流水煎服

或調琥珀末二錢服更妙。

○汪樸齋曰：此鍾齡先生方，升麻以舉胎，苧根以理胞，然之繚亂也。○濟陰綱目：轉胞外治法，以健婦人同病婦皆仰臥，將兩足直伸相對相抵，則胎自隨。而。上。使自通。或將病婦兩足倒提向上，便亦隨通。

梔子蔥豉湯

治孕婦熱病，斑出赤黑，小便如血，氣急欲絕。

梔子

黃芩

升麻各二錢

生地二錢

青黛八分

豆豉九粒

杏

仁去皮尖十二粒

石膏微錢半

葱白七寸水煎服。闊誠齋胎產心法。妊

娠熱病。斑出黑色。乃胎落之症。須急治此。熱入於裏。

陽明症之方也。舒馳遠女科要訣。妊娠傷寒胎動

不安。若三陽外感。頭痛壯熱。表邪大盛。當分經解表

以去其邪。則胎自安。若三陰中寒。陰邪內攻。下利厥

逆。腹中急痛。宜急回其陽。以驅其陰。而胎自安。若陽

明內結。火邪入胃。燥竭陰精。舌乾便結。當驅其陽以

救其陰。胎亦可保。子常用白虎調胃承氣。以治孕婦

熱病。屢效。若泥膠艾安胎之法。鮮不胎墜而斃矣。

護胎法

千金治妊娠時氣。身熱令子不落。

伏龍肝末

水調塗臍下

二寸乾則易。

一方加青黛等分。又方井底泥塗心下。三寸。張路玉曰。妊娠傷寒。表裏和解

等法。與平人無異。但須無碍子氣為大。綱。千金塗法

並佳。虛寒則用伏龍肝。大熱則用井底泥。若心腹大

熱絞痛和蜜塗之各分寒熱治為當

祛邪化滯煎治妊 川芎 黃芩各八分 當歸 白朮

炒各 錢半 建麩 半夏麩各二錢 藿香 茯苓各一錢 赤

芍一分 木香煨四分 炙草三分 姜皮一分 砂仁殼二分

冬瓜皮五分 水煎服投二劑化滯驅邪和調榮衛痢可

錢服三五帖自愈。古方彙精

雞蛋粥千金治妊娠中惡心腹絞痛 雞子新生者二枚 糯米粉和如

粥服亦治胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止。張路士曰：新生雞子。肘後主妊娠心動

藏器治胎漏下血取其解一切毒也。

仙傳保產無憂散又名保安煎。有孕安胎臨產催生。不論少壯虛實並宜服之。 斷

艾醋炒厚朴姜汁炒當歸酒洗川芎各錢兔絲

子揀淨酒泡綿芪炙荆芥穗炒黑各川貝去心研

白芍冬天一錢春夏秋一錢二分枳殼炒去穰六分羌活炙

草各五分十二味分兩不加生薑片水煎空心服加

人參。凡偶傷胎氣。腰痠腹痛。甚至見紅。勢欲小產

者。一兩帖。即安。懷孕後。四月起。每月服一帖。至八

月。二帖。九月。三帖。臨產。先服一二帖。易於分娩。產後

切不可用。小陰。胡遠公云。此方家藏數十代。並無

小產。難產之患。程鍾齡曰。新產婦人。胎氣完固。腹

皮窄緊。氣血裹其胞胎。最難轉動。此散妙用。撐法。扶

達生散

丹溪治孕八九月時服數劑。易產有力。亦名束胎散。

歸尾

酒洗

白朮

酒炒

紫蘇莖

各一錢

人參

或黨參代

大腹皮

錢半 黑豆汁洗晒

炙草

陳皮

各五分

黃楊腦子

七個即黃楊樹葉稍兒也此物瘦胎若胎

弱食少者不用

葱白

三根

水煎服

春加川芎夏加酒芩秋加澤瀉冬加砂仁胎動不

安加苧根生地氣上迫心加柴胡食少加砂仁神曲

口渴加麥冬多怒加川連熱甚加黃芩食積加山查

有痰加半夏腹痛加木香官桂一方加枳壳砂仁

無黃楊名密傳達生散○煎密齋曰妊娠七月後用

枳壳腹皮則易產行氣開滯故也○吳本立曰此方

亦治臨產驚恐氣怯累日不下補中行滯能下死胎

妊娠要劑也


胎前總論

醫宗金鑑丹溪云胎前當清熱養血為主恐傷陰血也理脾脾健則氣血易生疎氣

氣順則氣血調和理脾疎氣兼以清熱養血則胎自

安矣有三禁汗下利小便也然又當隨症詳表裏虛

實以施治。形瘦之人多火，過用溫熱則傷陰血。肥盛之人多痰，過於補氣恐壅氣動痰。白朮消痰健脾，條芩清熱養陰。二味為安胎要藥。若有他症，以藥佐之。火盛當倍芩以清火，痰盛當倍朮以消痰。血虛則合四物以補血，氣虛則合四君以補氣。胎不安穩，更佐杜續、阿膠、艾葉以安之。若氣盛胎高，則加枳、陳、紫、蘇、腹皮、砂仁以舒之。



Faint, illegible vertical text columns on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

臨產 橫生倒產 胎死腹中 交骨不開 盤腸產 胎衣不下 漿乾難產

佛手散

治胎傷下血及橫生倒產交骨不開胎死腹中產後血暈昏亂崩中等症

全當歸

三五錢酒洗須素產 糙米色氣香味甜者

川芎

催腦者 佳二錢

水一盞酒二

分煎七分溫服

跌撲傷重加青木香錢半益母草三錢腹痛加肉桂○橫生倒產胎死腹

中如黑大豆一台乘熱淬酒中和童便一半煎服○

朱丹溪曰催生只用佛手散最穩當又效捷○萬密

齋曰如胞漿已破久而不生皆因氣血乾枯所致急

用歸身四兩川芎黨參各一兩益母草二兩濃湯頻

服自下○汪樸齋曰大抵漿水未破宜保產無憂散

胞水已破或延時不生必用佛手散若去血過多瀝

乾兒難轉身方用八珍大補氣血以助生機萬無一

失○金鑑曰不日芎歸曰佛手者謂此方治胎產諸

疾如佛手之神妙也若氣

虛難產必倍加人參救之

開骨散

一名加味芎歸湯。摘元。治難產。及矮小女子。交骨不開。並下死胎。

當歸酒炒五錢

川芎

三錢體虛者減半

龜板

酥炙研末

婦人頭髮

生育過者瓦上

焙存性各三錢

水煎服。如人行五里即生。

虛加入參寒加姜桂。武叔卿

曰立齋以交骨不開為陰氣虛。龜為至陰。板則交錯相解。故用之神驗。○王品泉達生編補注。醫通云。曾見服此藥者。惡血凝滯。反致不救。予謂此必母體多寒。板髮反能凝滯氣血。故必遵金鑑。寒加姜桂之法。方無滯快。○周理筌曰。開骨散能通任脈。用於陰虛交骨不開。實為穩台。倘陽氣不振者。必加肉桂少許。以助其生。生之機為是。

仙傳四急保生丹

臨產服神效。

鳳仙子

大紅九十粒 白四十九粒

龜

板

一兩麻油塗炙

通梢牛膝

三錢

桃仁

半錢

川芎

歸身

各五錢 共為末 鳳仙子另研包好 臨時
服二錢 遲則百服一錢 交骨不開者即開 難產者不
過二服 臨產一月內本方去鳳仙子入益

毋膏二兩 每早米飲調服二錢 則臨盆迅速 產後
瘀血變症 或免枕痛 加炒紅麴三錢 酒炒馬料豆二

合共為末 童便陳酒各半杯 調服二三錢 即
愈 惟鳳仙子於難產時用 剉瀉坡簡便方

加味八珍湯 凡臨產驚惶 用力太早 致漿
水去多 乾澀難產 速服此方 人參八分 虛者

一錢 白朮 土炒 丹參 酒炒 益母草 二錢 當歸 五錢

大熟地 川芎 各錢 乳香 五分 炙草 二分 水煎

服 天寒加黑姜五分 服藥而嘔 加姜二片 砂仁五分
虛甚連服二三劑 大碗濃煎進之 漿水去多 橫

星倒產 老練穩婆 輕手扶正 隨用此湯 即時分娩 總
之藥水未行 用保產無憂散 以順其胎 漿水去多 必

左

臨產

左

用此湯，大補氣血，以助其力。保產順生，百無一失。則不能上逆，只助藥力下行耳。且用之漿水已行，尤為穩當。醫學心悟。

通津救命至靈丹

治難產，數日不下。

桂元肉

去核 六兩

生牛

膝梢

一兩黃酒一 杯浸搗爛

將桂元煎濃汁，沖入牛膝酒內。

半日即產

保命集此方親救多人，垂死者無不奇驗。陸畫村經驗方，臨產代參法，先期兩月。

將龍眼肉一二斤，置磁器內，上蓋建蓮肉一層，每日飯上蒸，愈蒸愈妙。至臨產數日，每取小塊，開水服。臨

分晚時取大塊，沖食一二 次，大助氣血功同，人參也。

仙傳保產回生丹

治難產及產後一切實邪 疼痛，死胎，瘀血沖逆等症。

錦紋大

黃

研末 一斤

黑大豆

三升，煎滾取汁去肉，聽用。豆壳曬乾聽用。

陳米醋

九斤

紅花 三兩好酒四碗煎數
蘇木 三兩河水五碗
煎汁三碗去渣

聽用。將大黃末入鍋下醋二斤熬不住手攪。再下
醋一斤。漸漸下畢。再下豆汁。再下蘇木汁。紅花汁。漸

漸熬成膏。大黃
枳殼下聽用。
黨參 四兩原方
烏藥 去皮二兩半

茯苓 歸身 洗酒
川芎 熟地 製酒
益母草 去筋香

附片 炒米
延胡 醋炒
蒼朮 浸汁
蒲黃 隔紙炒
桃仁 去皮

一兩 黃肉 酒浸
五靈脂 淘去砂土
三稜 醋浸
紙裹

煨地榆 洗酒
牛膝 洗酒
白芍 炒酒
炙草
馬鞭草

羌活 各五錢
良姜
木香 研生
橘紅 各四錢
白朮

浸青皮 去穰
秋葵子
木瓜 各三錢
乳香
沒藥

二味去油
各二錢

右三十味。連大黃粬。黑豆殼。為極細末。

入大黃膏。加熟蜜。一斤。干搗為丸。帶濕。每丸重四錢。陰乾。磁瓶收。

貯。臨產氣血虛弱。人參湯下。橫生倒產。胎衣不下。淡益湯服一二丸。子死腹中。車前子一錢。煎湯下。

產後血暈。並便調服。瀉痢膿血。山查湯下。中風。炒黑荆穗調服。敗血流注。四肢浮腫。偏體斑點。酒化服血

邪。如見鬼神。葱白湯下。二便秘泄。寒熱如瘧。滾湯調服。凡產後言語顛倒。敗血腫痛。一切異症。每服一二丸。立愈。婦人經水不通。服至三五丸。自通。如倉

猝無引。概用開水調下。亦可分作小丸。以湯送下。此丹崑山進士方範述其祖節庵主事。遇仙所授。濟

人萬應。惟產後氣虛血脫。惡露已盡者。忌之。胎前亦不宜服。柯集庵以為保產之仙方。徐露胎以為催生

之聖藥。洵不虛也。葉杏林曰。此丹先將大黃末熬膏。即羅謙甫血極膏。次下紅花汁。即仲景紅藍花酒

也。次下黑豆汁。孫真人大豆紫湯也。次下蘇木汁。二

味參蘇飲也。取大黃膏入藥同磨。其藥半是許叔微
琥珀散也。是五六方合成。一方藥雖猛峻服之不多。
妙在攻補兼施。制度有法。故能起死回生。神品藥也。

觀音普濟丹

亦名烏金丸。治難產交骨不開。橫生倒養。胎衣不下。子腸努出。胎死腹中。產後中風。

血暈血崩。莫血。痰積腹痛。並婦女月經不調等症。

陳徽墨

五錢。頂煙無麝。昔佳。先置烘箱。

烘軟。切片。再和後藥研磨。

百草霜

五錢。即竈突中墨。非鍋臍中灰也。微烘。俟乾透。細羅。

東天麻

透明者。四錢。

廣木香

三錢。忌火。上三味。並忌泡水。

飛麵

三錢。

烘乾。羅淨。

各研細末

羅去粗頭。用曹平秤准。

再入陳墨細羅。取長

流水為丸

用一新水桶。取水者。在大河中汲起。提在手裡。不可攔下。一直走到家中。用繩繫梁

上。凡有用水處。俱用此水。

每料分四十九粒

料。則分切九百八十

塊計藥五十兩。有水氣。必重數兩。請一善歸除者。將
合成之一大塊。蔓研多少。重再算。一丸。約定幾分。幾
厘準。便切一小塊。隨秤。隨搓。隨
滾。若合三五料。照數加算。須順滾。一晝夜。不住。

手。滾法。但九成一粒。即滾。不得停攔。一刻。到九齊時。
看明。自鳴鐘。直滾。至次日。此時。方纔歇手。滾藥用
大藥。區一個。安椀上。兩人另坐對滾。一樣。左旋。右手
時。添一人。插手。依樣。同滾。數轉。先者。徐徐。却下。切不
可。住手。換人。如順。滾。一
候。換手。一歇。藥便不靈。合成。晒乾。磁瓶收貯。每服一

丸。陳老酒送下。催生忌陰人手。馮務堂曰。此方。蘇
州汪邁園先生傳。專以固氣。調血。為

主。臨產。催生。頗多奇驗。藥價甚廉。雜費亦有限。惟修
台。須淨室。同志十數人。齋宿。虔製。忌婦人孝服。烟酒
雞犬。誠至。則藥自通靈。可濟危。於頃刻也。
按他本用藥引。繁雜不倫。係後人妄添。不可從。

神應丹

治盤腸產。

草麻子

四十九粒去壳。

細研成膏塗產婦頂。

心腸上。即洗去。

又治胎衣不下。塗脚心。胎下。即洗去。

虛臨產用力太早。其腸先下。令婦仰臥。將淨漆盆。或

溫水。和煉蜜麻油。或香油。二三斤。煎濕。浸養。或黃芪

五六兩。煎湯。浸腸。待兒並胞衣俱下。穩婆以香油塗

手。徐徐送入。產婦兩足夾繫穀道。腸自收。上如仍木

牧。用神應丹。貼頭頂。內服補中益氣湯。倍升麻。一

法。用大紙撚麻油。潤之。點燈吹息。以烟熏鼻。即收。或

用皂角末。或半夏末。吹鼻。得嚏。即

上。若尿管壅出。亦用前法送入。

逆產治法

曹維不曰。凡橫逆等症。不可妄用催生藥。蓋手足之出。非藥力所能制。或麻油蜜糖。

各半煎服。以滑潤之。則可倒產者。今人往往隨其倒

足。生下。名脚踏蓮花生。並無大患。子母兩全。不必依

前入推足。討益之法。有臍帶絆肩。穩婆嘗用指撥。亦

可。橫生。死手先出者。以香油沐其手。令穩婆輕輕推

上。待兒轉身。頭正。扶起。產母用力一努。兒即出矣。切

勿悞聽兒婦用。刀斲兒手足。一動刀。及子必腹中亂

擾而傷
母矣。

琥珀黑龍丹

治死胎胞衣不下。敗血上冲。昏暈不省。惡露刺痛。血滯浮腫。血入心經。語言顛倒。血

風相搏。身熱頭痛。一切產後危急症。

五靈脂 酒研澄

當歸

洗酒生

地 川芎

良姜

各二兩。五味。入砂盆內。鹽泥封固。用炭十斤。煨紅。取出。如黑糟色。研

細入

琥珀

水調。剛。搗粉。

生硫黃

煨時。封密。不

後藥。均須防

花蕊石

全硫。研勻。入確封固。文武火煨。三炷香。取出。置血上。血化為水者。真

乳香

若上炙去油。各二錢。

百草霜

三錢。五錢。計重二兩。為末。全上藥和勻。

用米醋煮麵糊為丸。彈子大。每服一丸。

於烈火中。煨紅。投入

生薑自然汁內。浸開。研爛。一方。入麝香少許。以童便和酒調服。曹維石曰。此與回生丹俱。產家之聖

藥救急之奇珍。神妙難言。用者自見。但花蕊石難得。真耳。局方花蕊石散。治胎衣不下。胎死腹中。產後血迷血暈。瘀血脹痛等症。花蕊石煨研。每用一錢。童便或酒調服。隨下惡物。如雞肝片。若膈上有血。化為水。黃

消衣神應方

治胎衣不下。

無名異

為末三錢。即漆匠所用煎油之藥是。

鴨

蛋白調勻。陳米醋。

一杯。煎滾冲服。

其衣即縮小而下。絳囊撮要。女科要訣。

芡實葉。大如盤。完全無損者。紅菱葉亦可。每用一葉。扯作三塊。水煎濃酒冲對服。胎衣即裂為三塊而出。若扯作二塊。即裂為二塊。神驗。產科合參。凡胎衣未遲。用草紙燒烟熏鼻。或皂角或半夏末吹鼻。取嚏。即下。如再遲。只管斷臍。洗兒。若不斷臍帶。恐子血脈反潮入胞。脹滿攻心受傷。但先要粗麻線將臍帶繫住。又將臍帶双折。再繫一道。以軟物包繫。墜住。不致胞上掩心。繫後。方將臍帶截斷。剪帶不可太短。只留

一半。以便麻線能繫。不令帶頭。收入母腹。過三五日。衣自痿縮而下。如惡血流入胞中。脹不能出。須覓諸練穩婆。以手指輕扳胞口。泄去惡血。順手取。下甚妙。

塗臍法

千金治子死腹中。

牛屎

炒熱

塗母臍腹上。并左右少

頃立出

一方炒熱。入醋半盞。青布包裹。熨臍腹。○又平胃散厚朴蒼朮陳皮各三錢。甘草錢二分。

酒水煎。入朴硝五錢。再煎溫服。其胎化水而出。此方壯盛者宜之。○關誠齋曰。下胎最宜謹慎。必驗明產

婦面赤舌青。腹中陰冷重墜。口穢氣喘。然後下之。以佛手散為主方。子每見死胎。人不慌迫。遲遲生下。並

不傷母。蓋人腹中極熱。食物入內俱化。其胎雖死。產母安心飲食。腹內熱氣熏蒸。自柔軟腐化。或一二月。

三五日。自然生下。但所出穢氣難聞耳。

臨產要訣

達生編六字真言。○一日睡。將產時。要調養心神。愛惜氣力。若能在床。閉目安睡。片

時最好。若不能睡。暫時起身。或扶人緩行。或倚桌站
立。痛若稍緩。又上床安睡。總以睡為第一妙法。但宜
仰睡。使腹中寬舒。小兒易於轉動。且大人睡下。小兒
亦睡下。轉身更不費力。○二曰忍痛。若腹中痛。且令
扶行。或痛或止。尚痛得慢。名曰弄胎。非正產也。且腹
痛。腰不痛者。未產。腰痛。腹不痛者。未產。不可使穩婆
湯試手。探亦不可。屈腰眠臥。直至腰腹齊痛甚緊。連
痛三五七陣。交骨分開。胸中陷下。二便俱急。眼中金
花亂閃。此真欲產也。當於此時。用力一遍。自然順生
矣。○三曰慢臨盆。將產時。切不可輕易臨盆。倘候聽
穩婆說。孩兒頭已在此。以致用力太早。候盡大事。蓋
兒在腹中。要聽其慢慢轉身。尋到產門。頭向下。脚向
上。倒懸而出。若兒未轉身。用力一遍。則脚先出。轉身
未定時。用力一遍。則橫臥腹中。一手先出。即或轉身
向下。生路未正。用力畧早。亦偏在一邊。不得出。皆是
時候未到。候於用力之故。若當其時。小兒自會尋路
鑽出。瓜熟蒂落。自然而然。及至生下。產母
亦不知其所以然也。○大生要音節本

產後 虛暈 血暈 血冲 喘急 鼻血 敗

生化湯 景岳云會稽錢氏 當歸 酒洗四錢破血 川

芎 錢半頭痛倍用 乾姜 炙存性四分腹痛 桃

仁 十粒去皮尖及雙 炙草 五分 水煎加酒一匙 或

童便 一鍾温服 一方加丹參錢半 葉杏林方無桃仁

當大補 但惡露未盡 用補恐致滯血 惟此湯行中有

補能生 又能化真萬全之劑也 如四物湯地黃性滯

白芍 酸寒伐生氣 此方除去二味 加以温中行血之

品 如產後兜枕作痛 世多用消塊散血之劑 然後議

生養言 歸桃仁善攻舊血 驟生新血 佐以黑姜炙草

下即服不拘正產半產自無血

暈之患名曰生化以功用也
加減法 母亦可 紅花肉桂治產後塊痛或加元胡益

汗多形氣脫而暈加人參肉桂從權急救之痰火乘
虛上泛而暈加橘紅肥人加竹瀝姜汁汗不止加灸

莖○本方加人參附子棗引治新產厥症四肢逆冷
泄瀉或更加肉桂○本方加人參白芷黑荆穗治產

後塊痛血崩汗多氣促○本方加茯苓神栢子仁棗仁
陳皮龍眼肉八棗治塊痛不止妄言妄見未可用參

莖者○本方加神曲麥芽治塊痛未止停食痞塞傷
肉食加山查砂仁傷冷物胃脘痛加吳萸或肉桂○

本方加陳皮木香去炙草治塊痛未除口受氣惱○
本方加桂枝治風冷乘虛氣上攻則心痛下攻則腹

痛有塊加木香○本方加炒白木澤瀉陳皮蝦肉果
茯苓人參治產後泄瀉血塊已消者寒加砂仁熱加

川連有濕加蒼朮有塊痛者減人參○本方去乾姜
加木香茯苓陳皮治新產赤白痢○本方加半夏藿

香砂仁陳皮生姜治塊痛未除氣逆嘔吐如嘔逆不
食者木方加砂仁生姜去桃仁○木方加桔梗生姜
治產後感冒風寒鼻塞聲重再加桑皮半夏
橘紅治感寒咳嗽或身熱頭痛○產科合參

虛暈急救法

凡兒生下則昏暈不醒者此時有藥不能入口

宜輕輕扶坐勿

令臥倒用細絹舊衣緊閉產戶令知事婦女曲膝抵

住勿使下而氣泄

又令一人一手拖住髮一手捫住口

勿令上面

氣泄俟稍轉畧有聲息方用醫治

大生要旨○崔氏法房中燒紅炭沃以醋

醋使氣熏入鼻甦時急控人中靜以待之元氣漸復

○產科合參大病大虛之人皆能作暈產後之暈因

去血過多所致凡眼閉戶開唇白手撒自汗遺尿六

脉微細皆氣隨血脫之象急用獨參湯大劑進之若

兼口鼻氣冷手足厥逆速加姜桂以回其陽稍醒用

生化湯加人參再進八珍十全等湯大補氣血若認

作惡血搶心。而輕用蘇木牛膝紅
花。及辛香開竅之劑。則速其斃矣。

血暈急救法 切勿放倒。如牙關緊閉。用鷺羽筒插喉

灌藥。灌後。漸漸溫煖。當用熱手單衣外。從心揉至腹

上。又時換熱衣。候其漸醒。廣嗣備要。丹溪心法。切

醋灌入。封大口。小指對鼻孔。令醋氣熏鼻。即甦。○又

生半夏末。吹鼻取嚏。或乾漆燒烟熏之。亦崔氏法。○

產科合參。產後瘀血乘虛上湊。心包致眼花頭暈。心

下滿悶。神昏口噤。痰涎壅盛。肢冷氣粗。心腹疼痛。面

唇赤色。牙關緊閉。兩手握拳。此血逆症也。莫若生化

湯。溫而行之。去瘀止暈。最妙。古法用童便頻灌。取其

降火消痰。惟胃氣壯盛。不畏膠氣者。宜之一法。產後

血升。用紅壳雞蛋一個。剝開小口。下白灌口中。即

甦。○又荆芥穗焙乾。水酒各半。蓋煎湯服。產寶云。凡坐草受風。而成暈。宜服此藥。名華陀愈風散。

失笑散

治瘀血脹胞。產後兒枕痛。或血迷心竅。

五靈脂

酒研澄去砂

蒲黃

篩淨

等分。為末。

行血。二味俱生用。止痛。蒲黃減半。或靈脂減半。若用酒煎。入砂糖和滓服。尋常

每

服二三錢。葱湯調下。

或酒煎。入砂糖和滓服。尋常月水不調。經痛亦效。一方。醋

糊丸。龍眼大。每一丸。童便和水煎。名紫金丸。治產後

臍下痛。心痛。時作寒熱。月信不調。痛甚。加川芎。延胡

肉桂。產後血暈。沖心。靈脂二錢。溫酒下。名獨行散。

醋丸。名獨聖丸。本方加當歸。治兒枕痛。濟陰綱

目。靈脂行。汚濁之血。如神。

烏金散

治產後血迷。血暈。敗血不止。淋瀝。臍腹

百草

霜

血竭

髮灰

松墨

當歸

延胡

赤芍

肉桂

去皮各五錢

為末。每服二錢。空心酒下。

武叔

知曰。諸病皆從。敗血不止。生末。此方之妙。不在止。而

在行。行則歸經。血自止矣。治崩者要得此旨。程鍾齡曰。產後惡露不絕。當用八珍歸脾諸湯。若瘀血阻礙經絡。不得歸經者。其症腹痛拒按。宜歸芎湯送下。失笑丸先去其瘀。而後補其虛。則血自歸經矣。

二味參蘇飲

治產後瘀血入肺咳嗽喘急。口鼻起黑煤及鼻衄者。

人參二錢

蘇

木

四錢

水煎服

厥冷自汗加附子既愈當六君子溫補脾胃。醫過產後敗血上冲有三。

或歌舞談笑或怒罵坐臥踰牆上屋口咬拳指山腔野調號佛名仙此敗血冲心多死用琥珀黑龍丹或花蕊石散如雖悶亂不致顛狂者失笑散加鬱金若飽悶嘔惡腹滿脹痛者曰冲胃用平胃散加姜桂嘔逆面赤曰冲肺二味參蘇飲甚則加芒硝蕩滌之。濟陰綱目產後口鼻起黑氣及鼻衄急取緋線一條并產婦頂心髮兩條繫繫右手。中指節上即止此禳厭之法。

養陰惜紅煎

治產後鼻衄不止。

歸尾

三錢

川芎

半錢

荆芥穗

炒黑 一錢 血餘灰 五分 煎成京墨 酒磨汁 和溫服 又產後血

崩不止 用芎歸合蒲黃炒黑末各二錢 煎服 彙精

猪腰粥 治產後辱勞寒熱如瘡自汗無久咳嗽頭疼腹痛 猪腰一對去白膜 當

歸 白芍 酒炒各一兩 水煎去渣將猪腰切小 同晚米

一合 香豉 一錢 加葱椒煎煮稀粥 空心日服一次 或加入參更妙

武叔卿曰此不藥之藥所謂穀肉果菜食養盡之矣用猪腎者以胎繫於腰故借之以為補助耳

加味理中湯 治小產下血不止 西黨參 三錢 野於朮 二錢 炙

甘草 二分 乾薑 六分 歸身 半錢 大棗 三枚 水煎溫

服 高味卿治吳繹勤妻小產下血不止頭汗如雨嘔吐氣喘飲食不進六脈衰弱將此方加附子肉桂

各一錢 生芪丁香各二錢 半日連服兩劑 汗與血漸

產後

五

止後重用參芪地朮調理兩月而安明年生子產後
患水腫氣喘余用西黨葛根各二錢生冬木廣藿香
茯苓各三錢炙甘草四分煨木香一錢大腹皮錢半
此錢氏白朮散法也服月餘而愈。沈子翔云每聞
私產下血不止而死者因無此方服耳

產後總論

汪樸齋曰產後總屬氣血空虛丹溪云雖
有他症以末治之誠千古格言如佛手散

生化湯之類自當遵前賢制方選用至產後汗出須
防元陽外越泄瀉即防中氣下脫喘急更防惡露土
逆此皆產後極忌之處而產後發熱多緣下元空虛
陰虛生內熱只須四物湯加童便熱即退也間有瘀
血不行或經風或傳滯或蒸乳各審其因風感者用
歸芎補血之中加黑荆芥一味足矣停滯者只於理
脾之藥加穀芽陳皮可矣須知產後有邪總宜補中
兼消世醫故胆竟用柴苓羌防查麩之劑輕者變重
悞人不淺况中風一症血虛者多內經謂治風先治
血血行風自滅景岳本此發非風之論醫平人尚謹
慎如此况產後肝血空虛生內風便可知矣

乳疾

乳少無乳
乳痛
乳脹
乳瘰
乳潰
乳岩
乳頭生瘡

通脉湯

治乳少或無乳。

生芪

當歸

白芷

通草

四錢

猪前蹄

七孔者一對

煮湯

吹去浮油

煎藥

一大碗

服之

被覆面而睡即有乳

新產無乳者不用猪蹄水酒各半煎體壯者加紅花三分以消

惡露。○
彙精

神效瓜蒌散

治乳癰及乳岩初起

瓜蒌

黃色子多者連皮一大個焙研

當歸

酒洗

甘草

生各五錢

乳香

沒藥

二味去油各一錢

黄酒

三碗

文火煎分三服

如數劑不效。血虛佐以四物。氣虛佐以四君。憂鬱傷脾佐以歸脾湯。○張

景岳曰。乳癰之方。獨此神效。瘰癧初起亦宜用之。○
濟陰綱目有乳岩便服此藥可杜絕病根。如毒氣已

成能化膿
為黃水。

香附餅

治乳癰。

香附

炒研一兩

麝香

三分共研勻

以蒲公英

二兩金銀花

三兩

酒煎

渣去

調香附末，頓熱敷之，即時消散。

內服瓜蒌散。心悟一切瘡疽皆可敷。胎產心法。

乳上纔覺硬腫作痛，葱白搗爛炒熱敷患處。冷即換。

一桶。傾入鍋熬成膏，濃搽乳上。結塊自消，屢驗。

塞鼻法

治乳閉並吹乳腫痛乳岩初起。

生半夏

一粒

葱白

一寸許

同搗

為丸。芡實大。絲棉包塞鼻孔。

患左塞右，患右塞左。

飲酒盡量出。

汗即愈。

何氏濟生論。濟世經驗集。用巴豆一粒。細辛錢半。焙研細絹包塞鼻。一周時即消。

王不留行煎

治乳房掀脹。

通草

一錢

王不留行

赤芍

各錢

半

麥芽 炒三錢

蔥白 七個 酒煎服 成方切用王不留行其性走而不佳

氣盛血滯者可暫用以行之虛者宜慎心
悟婦人不自乳子炒麥芽五錢煎湯服即消

紫草膏

治妒乳吹乳成膿潰陷者

紫草 二兩

麻油 四兩浸三日去滓

將

白蠟 一兩入油熬烱

用白芷 一錢 降香 各三錢 松香 各三錢

枯礬 輕粉 各二錢

錢研細投油內攪勻

候冷以小筌子挑一塊刮入陷中

上蓋膏藥

內服參芪苓朮歸桂乳沒等藥拊托收功則乳房無損日後有乳○女科要訣

定岩散

治乳癰潰爛洞見內腑

雄鼠糞 兩頭尖者 是炒

露蜂房 有子者煨

存性 土棟子

經霜有核者川棟不用等分

為末每服三錢酒下

間兩日一服數日膿盡瘡口漸收○王晉三日鼠矢入厥陰血分通經下乳土棟力薄走中焦乳間泄熱

蜂房驅肝經風毒犯胃。凡外瘍之毒在臟腑者非此
不愈。故潰若僅存內膜者服之痛止膿乾。江鐵君
手抄方。乳岩乾白蓮蓬壳。生香附。
等分。研細。好酒調服。以愈為度。

鹿角散

治乳頭生瘡汁
出痛不可忍。

生鹿角

分三

生甘草

分一

研

末雞子黃

一枚

攪勻。炙溫敷。日二次。

濟陰

綱目。女科

切要。治乳頭生瘡

及乳花。用秋冷茄子。經霜開裂者。陰乾。瓦上燒存性。
為末。蜜調塗。內服加味逍遙散。又乳癬痒不可忍。

銅綠輕粉為末。菜
油調敷。痒漸止。

蚌殼散

治男女乳上濕瘡。膿血成片
飛紅無醫痛痒。名火草瘡。

蚌殼

煨五錢

輕

粉五分

冰片一分

研勻。銀花湯調搽。三兩次。結靨收。

功

便易集。外科百效。乳勞癩。爛見臟
腑。貓腹下毛。鍋內煨存性。為末。搽之。

雜症 花頭 鬼胎 腸瘻 子腸不收 玉
閉 陰挺 產後胞損 產門生蟲 翻

症 腸交 陰氣

石菖蒲湯 治化

柴胡

當歸

桃仁

白芥子 各二

錢

白芍 錢五

甘草

茯神

石菖蒲 各一

元參 錢三

水煎服 婦人情欲不遂 忽然顛癇 見男子則抱住

不放此肝木枯槁內火熾盛脈必弦出寸

只當平肝祛邪之味用此方

一二劑而愈醫方一盤珠

醫崇案

喻嘉言曰楊氏女病多汗食減肌削診時手

女每夜睡去口流白沫戰慄而絕以姜湯灌良久方

蘇余知為邪祟之病乃以犀角羊角龍齒虎威骨牡

蠣鹿角霜參芪等藥合未羊肉半斤煎濃汁調服果

得安寢竟不再發予蓋以崇附於身與人之神氣交

持亦逼處不安無隙可去故多用靈物之遺形引以
羊肉之羶俾邪祟轉附骨角從大便而出做上古遺

精變氣祝繇之法而充其義耳

雄黃丸

治鬼胎瘕血腹痛

雄黃

鬼白

去之洗

丹砂

水飛五錢

川芎

延胡

各七錢

麝香

一錢

半夏

姜汁炒一兩

為末

蜜丸梧子大空心服三十九丸

程鍾齡曰婦人經閉腹大如懷子狀面色青黃

不澤脉濡細或乍大乍小兩手如出兩人寒熱往來此乃肝脾積鬱之氣非胎也宜此丸攻之而以各經

見症之藥輔助元氣如肝經鬱火佐以逍遙散脾氣鬱結佐以歸脾湯肝虛挾痰佐以六君子

石瘕方

婦人小腹正中有一塊狀如懷子名石瘕屬衝脉

沉香

丹參

各五錢

熟地

砂仁炒五兩

茯苓

三兩

牛膝梢

淡吳萸

各一兩

為末蜜丸陳酒或淡下三錢一得山房方

陳皮葵根湯

治腸瘻初起未穿者

陳皮

當歸

皂角

各二錢

生芪

五錢

蜀葵根

一兩

水煎沖酒

一杯

分二次服

產科心法

海浮湯

治腸瘻穿後膿出微痛

乳香

二錢

沒藥

俱去油

浙貝

茯苓

各一錢

生芪

酒炒三錢

炙草

五分

水煎三服毒盡

收口

即服八珍十全湯補之。汪樸齋曰產後積瘀每生內瘻其流注腿腹而出者外也若積

於內生大小腸瘻者往往穿腸而出子製二湯治愈

多人。一產婦穩婆見衣胞出其一半以手挖下傷

其帶脉腹痛縮一足不能伸已一月予曰此只脚腸

瘻也脉已數知毒熟矣用陳皮葵根湯加甲片次日

下膿數碗而安

收腸法

丹溪治孕腸不聚

香油

斤五

煮熟盛盆候濕坐油盆

上約一頓食時以皂角末吹鼻中嚏作立上

景岳子宮不收

補中益氣湯煎而舉之外以黃芪湯薰洗。醫無問子胎產心法子官不將甚至損落一片者乃氣血虛極大劑參芪加升麻當歸川斷阿膠調補則脫落者復生仍能生育。高味卿治子腸不收及產門拖出肉線用草麻子肉七粒搗爛塗頭頂百會穴二三時即收屢驗

硫黃湯

千金治產後玉門不閉陰挺腫痛

硫黃

錢三

吳萸

兔絲子

各二錢

蛇床子

半錢

研勻水煎候溫頻洗自收

產科心法

玉門不閉氣血大虛也先用生化湯以消血塊隨進八珍湯補之或被穩婆指傷產門破損疼痛用花蕊石散少許摻患處漸愈。濟陰綱目產後陰戶腫痛手足不能屈伸四季慈乳香搗餅安患處即愈

參朮膏

治產後胞損
成林歷者

人參 二錢

白朮 二錢

炙芪

半錢

茯苓

橘紅

桃仁

各一錢

炙草

五分

用猪

胞一個或
羊胞

童便煮湯入藥煎服

朱丹溪曰一婦因收
生不慎致厚損淋瀝

除蝕法

產門生蟲
痛痒微骨

猪肝片切

香油搽之瓦上炙香乘

熱將大黑紗裹之置產門內過時取出蟲即隨之

再換

再置蟲盡痒除。○經驗良方一法鯽魚生切片布裏
納陰中良久蟲自出盡入布眼二三次出盡為度。
○本草綱目陰毛生風痒不可忍白果
仁麝細頻擦並以百部煎湯熏洗。

隱疾方

產後玉門燥熱遂成翻花。

澤蘭葉

四兩

煎湯熏洗。二三次。

即收。

或加枯礬。又陰中生莖長半寸。用川連半斤煎水半鍋。入鹽一撮。盆盛。乘濕坐盆內。半根香

時即消。簡易良方。○大全陰內出臭黃水。甚痛。露蘭三錢。燒研細。酒調。鷲毛掃上。亦治交接出血不止。

腸交方

產婦小便出糞。名腸交。乃氣血俱虛。失行常道。

舊僕頭

燒灰

酒調服

薛立齋醫案。一婦腸交。用六君子二劑。又用五苓散

一劑。而痊。○濟陰綱目。產後遺屎者。故燕窠中草。燒

灰。酒調。下半盞。遺尿者。雞尾毛灰。酒

調。下一錢。或雄雞腔脰。燒末。酒服。

衛生鴻寶 卷六

傷科

五絕

自縊 中惡

溺死 尸厥

凍死 鬼擊

中暈 妖媚

魘死 飢荒

救自縊

徐徐抱住解下。不得用。刀剪斷。縊。繩。倘慌張

截斷則

百無一生

放令安卧。微微揪正喉嚨。以手掩其口鼻。勿令透氣。

一人以脚踏其兩肩。以手挽其頂髮。

常令弦急。不可使頭垂下。

人以熱手摩按其胸腹。屈伸其手足。

若已僵直。漸漸屈之。用棉

軟之物。裹緊大小便。

勿令洩氣。

以竹管吹其兩耳。用生半

夏末

或皂角末

吹鼻取嚏。或刺雞冠熱血。

男用雌。女用雄。

滴口內。

或研山羊血二三分。酒灌下。不可用茶灌。俟氣從口出。呼吸眼開。仍引按。

不止。倘住手。血脉凝滯。前功盡棄矣。甦後。少與粥飲。或姜湯灌。務要

多吹多摩。勿謂已冷。忽畧不救。此法自旦至暮。已冷可活。從夜至早。陰氣

盛稍難。心下微溫。一日以上。猶可救。灸法。湧泉穴。在足底心。艾圓灸三壯。男左女右。胡雲坡洗冤急

救方。杜絕後患。法急於懸繩之地。用大石鎮壓。於所鎮四面深為挖掘。將所鎮之中。層層撥視。或三五寸

或二三尺定。有如雞骨等物。取出焚化。可絕將來之患。稍遲。八地曰深。此處常有縊死人矣。屢試屢驗。實

非幻妄。林章甫曰。縊死遇救後。一半日必身痛心煎。氣血隔絕。不相附也。往往致死。當歸三錢。紫蘇一

錢。生薑五分。煎服。

救溺死。急將口挖開。橫銜筋一。隻便可出水。將濕衣

解換。

將濕衣

兩人以竹管。用熱氣吹其兩耳。碾生半夏末。或皂角末吹

鼻。取嚏。或取鴨血灌口中。再以皂角末綿裹納穀道。

內。一面炒鹽包裹熨臍。或用米炒熱布裏貼胸。前令熱氣內外相接。又取

灶內熱灰。或炒熱砂。多鋪被褥上。令溺人覆臥於上。

臍下墊棉枕一個。仍以草灰渾身。俟其水出七孔即

厚。蓋之再加被。勿使灰眯眼內。活。溺人或笑。急掩其口。莫笑不再用生姜湯灌之。得

合九。止難救。驟令近火必大笑。尤佳。冬天稍飲溫酒。夏天稍飲粥湯。照此救法。極為

妥善。可期復生。姚稔齋增訂洗冤急救方云。洗冤錄

覆等法。雖無不善。但行法萬不能善。予見救溺橫牛背。口眼流血。而不得生者多矣。蓋人經溺死。腹中到

處無不被水漲滿。經衆人重手高舉橫覆腸胃，迸裂安望復生。至倒懸一條尤為不可。試思無疾之人倒

懸亦能致死。豈有倒懸以求生之理耶。

救凍死

及冬月落水。四肢僵直口噤。只有微氣者。

解生人衣包。煖用大釜

炒竈灰令煖。

或米炒熱。

布包熨心上。冷則易

若不先熨其心。便將火灸

冷。熱相爭必死。

候口開氣回。

倘或微笑。急掩其口。然後以溫

粥清稍稍灌之。

或姜湯溫酒灌。即甦。○參中寒門葱

繫定。放平穩處。令二人相對。推令滾轉。往來如扞墮法。候四肢溫。即活。

救中暈

即熱死。

暑月熱倒。急扶在陰處。切不可與冷水

飲。

冷熱相激。即死。

當以布手中蘸熱湯覆臍。及氣海。

更以熱湯淋布

上令徹臍腹
但煖即甦

若倉猝無湯藥。搗道上熱土於臍端。以多

為佳。冷則頻換。或以灶間熟灰壅之。或用大蒜瓣。冷水研取汁。灌之立

甦。參中暑門。

救魔死。不可用燈火照。如原有燈不妨。并不得近前急喚。但

唾其面不醒。即痛咬其足跟。及足大拇指。畧移動臥

處。徐呼其名。又筆管吹兩耳。及取病人如久而難醒。髮二十七莖。撚成條。刺鼻中。

者。以皂角末吹鼻取嚏。俟醒後。灌以姜湯。魔死肉未冷者。酒調

蘇合丸灌之。即活。或非菜汁。灌鼻中。劇者。灌兩耳。仲景云。灌口中。驚怖死者。以溫酒一二杯。灌之。即活。

救中惡。凡人暮夜登廁。或出郊。或游空冷屋。室忽中惡。氣。驀然倒地。四肢厥冷。兩手握拳。口鼻出血。與

只厥同。但腹不鳴。心腹俱暖。

切勿移動其屍。令眾人圍繞打鼓。

燒火。或焚安息諸香。或羊矢燒烟薰鼻。

用半夏末吹鼻。或灌蘇合丸。或馬糞一枚。

絞汁灌之。直候能醒人事方。可移動。視上唇內沿有粟粒。以針挑破。一方用

蒜汁。或韭汁灌鼻中。或菖蒲汁灌口中。醒後隨症虛實。用藥調理。鬼打鬼排同治。以上俱參洗寃急

方救

神鬼箭打

身痛有青紋。以亂髮擦痛處。髮捲成團而硬者。是不捲而硬非。

金銀花

煎湯飲之

外取桃皮一片貼痛處。用艾灸之。妖魅鬼覺不肯言。鹿角末。溫湯調服。即知人事。

秘方集驗。敬信錄良方。凡山魃木客狐媚纏繞。憑負者。生桐油搽其下身。私處自去。又狐迷男女。珠蘭

根搽之。獸自死。

霹靂散

治中惡卒死。一切卒暴之症。

猪牙皂

分三

細辛

川芎

白芷

各五分

雄黃

分一

麝香

躑躅花

各半分

為細

末。用燈心蘸藥點鼻孔。得嚏為驗。

方治中惡卒死。葱末。用燈心蘸藥點鼻孔。得嚏為驗。方治中惡卒死。葱

黃刺鼻。男左女右。入七八寸。小兒量度之。若目中出血。佳。扁鵲法。用葱葉刺耳。耳鼻中出血者莫怪。

透關散

救五絕。一切自縊。二墻壁壓。三溺水。四魘魅。五凍死。并治一切中風。尸厥。暴厥。不省人事等症。惟

產暈忌用。

生半夏

皂角

去皮弦各一兩

細辛

去葉五錢

共為

細末。取菜豆大。吹鼻中。

男左女右。得嚏即甦。

凡五絕內服。莫妙於紫金

錠。中邪崇者尤宜。靈通萬應丹亦捷。俱宜預備救人。參洗冤急救方。

不飢丸

黃山谷救荒帖。

糯米

芝麻

各三升淘洗。蒸熟磨粉。

紅棗

斤三

泡去皮核。連湯並棗肉和粉搗成丸。每丸乾重五錢。風吹半乾。烘

晒收貯。早午各細嚼一九。開水送下。可耐一日。飢仍

忌飲啖。○道光二十年蘇城重刺高氏療飢良方云

此方簡而易製。常郡已經試用。實在靈驗。○致富奇

書療垂死飢民法。煮薄粥。發桌上。令飢人漸漸吮食。

之。必生。飢腸微細。若頓食。則脹死矣。又或粥方離釜

尚沸。湧器中。飢民食之。多死。

須待微溫。令食。方可保全。

防飢救生四果丹

栗子

去壳

紅棗

去皮核

胡桃

去壳反

柿餅

去蒂核等分

入甑蒸二時。取出石臼中杵搗不

辨形色。捻為厚餅。晒乾收貯。

冬月吉日。焚香修合。凡飢者與食一餅。茶湯任

醫服。氣足自飽。一餅可耐五日。再服不限日數。此藥

補腎水。健脾土。潤肺金。清肝木。而心火自平也。○惠

惠堂救急方。姚龍懷曰：飢荒者，世界一切運也。殺
劫者，順天之心。逆天之運也。天心好生，順以承之。天
運行罰，逆以挽之。人道所以與地參也。人欲一日
而行千百善，一人而救千百人。舍此等時節，無處着
力。

六

所行千百善。一人而終。其善。念其善。即能無交善。
重行善。必能。一人而終。心與天。此是。入於。一。日。
所行。天。必。善。天。此。入。天。
則。善。天。此。入。天。

金瘡跌打傷 撲打墜壓 骨折筋斷

破傷風 破傷濕 跌打 內傷

青腫 脫血閃氣

治刃傷 凡殺傷不透膜血出不止急用天下第一金

瘡藥乾糝瘡口 以藥能勝 血為準 軟帛緊縛不可見風水 如上

藥後仍有血流即避風輕手 解開再加多藥縛扎自愈 若傷已潰爛作膿或初

時治不得法以致內潰則用金刃黃靈藥糝瘡口 外用

膏藥蓋護一日一換則膿盡肌生腫痛立除數日可愈。○金瘡失血常令乾食與肥膩之物以止其渴。不得多飲粥湯恐血溢出被入也。又忌嗔怒大笑勞力及食鹹酸熱酒熱羹皆使瘡口疼痛沖發。又忌飲冷水。血見寒則凝入心即死。○如血出過多面黃眼黑不可專攻瘀血宜服八珍湯調補之。或獨參湯之類。

金瘡跌打

加蘇木紅花
煎調瘀血

救自刎

氣喉斷不治如
止食喉斷可治

急令安穩正卧用油線縫合

刀口

或鮮桑樹皮內
白茸為線縫之

隨用金瘡藥厚塗之以棉紙四

五層蓋藥上

取女人舊脚帶周
圍纏住線扎好

患者仰卧以高枕枕

在腦後

使項鬱而不
真刀口不開避風覆煖

不可見水間日輕手解開

敷藥仍纏好候過數日挑紅玉膏敷傷處

外用生肌
長肉大膏

藥貼

仍用絹布圍住傷口

用濃蔥湯洗
然不痛內服八珍湯調理

之

一法初刻一時無藥或不能動手用線者急剖活
雞皮帶熱貼瘡口勿令透氣以棉紙蓋皮上脚帶纏

血乾不治矣

救肚破腸出腸全斷難醫。不，斷者可治。腸及肚皮破者用麻縷為

線或鮮桑皮內白。以花蕊石散敷線上先縫腸子縫好以麻

油將腸熬活放入肚內再縫肚皮不可縫外重皮。四

肉仍摻花蕊石散凡傷破肚皮腸與脂膏俱出者先服十寶

散再用手劈去脂膏此是開肉。然後推腸入內。一法。

粥汁洗腸送入用線依前法縫之仍服通利藥如澤蘭湯之類。勿令二便

秘澀。姚稔齋曰此非倉卒間生手所能治者全在

素教官醫習學預備藥物方委予宰豐邑常有刃傷

腸出案官醫束手予自依法施治俱得完好

杖傷 熱豆腐片鋪傷處其氣如蒸復以一片鋪之。旋鋪旋換。以紫肉淡

紅色為度。

傷重肉爛者用木耳。

四兩水泡煮爛

敷傷處止痛生肌。

肌痛止。內服童便二三碗。免血攻心。○德軒方木耳。

炒黃為末。每三錢。好酒下。傷處如針刺。痒時流血水。即其效也。

撲打墜壓

心頭温者。經日可救。

急扶坐起。

如僧打坐狀。並拳其兩手兩足。令人緊抱。

定。不可令卧。

將手扶其髮。

往後畧控。放低令頭仰起。

用生半夏末。

或皂角末。

吹鼻內。少麩。以姜汁香油攪勻灌之。

或蘇合丸酒下。

但被撲

打。必有瘀血。宜澤蘭湯。多服數劑。

凡墜落者。急以袖掩其口鼻。食頃。候

眼開。以熱小便飲之。馬溺更妙。若初覺氣絕。急劈開口。灌小便。利去瘀血。以上俱參洗。究急救方。

三黃寶蠟丸

治刀箭鎗棒毒。跌打損傷。破傷風。傷力成勞。死血凝滯。遍身麻木。產後瘀血攻心。痰

迷心竅。及毒蛇
惡蟲、瘋犬、咬傷

騰黃

有毒。須隔湯煮數十沸。去盡
浮紅沫。須多備製淨。四兩

天竺黃

生南海。鑛竹中。結如黃土。著手成
片者。是無真者。以九轉胆星代之。

大戟

杭產紅芽者。
去骨洗淨

劉寄奴

酒洗

血竭

孩兒茶

雄黃

取無石者

朴硝

一兩

歸尾

酒洗
兩半

鉛粉

水銀

全鉛

各三兩

粉在鉄鍋內。火上熱。研
成末。一方無此二味。研

乳香

沒藥

二味。箬
上去油

麝

香

研去毛
各三錢

琥珀

燈心同
研二錢

各研極細

秤取
淨末

擇吉虔

製和勻。用黃蠟

二十
四兩。放磁器內。坐滾水中。化開。將藥

入內。不住手攪勻。為丸。

大小不等。或搓如手
指條大。用時切薄片。熱黃酒

燉化服。

病重者。每丸一錢。輕者。五六分。或三分。傷重
者。連服數次。服後飲酒出汗。更妙。能令瘀血。

金瘡跌打

八

化為新血。破頑痰。却邪毒。活絡舒筋。起死回生之聖藥。○一切外傷麻油化開。勿見火。雞翎掃瘡上。腐肉不須刀割。自然生肌。○毒弩所傷。用五分口內嚼下。毒氣不能攻心。仍敷傷處。○烏鎗打傷。黃酒下三分。醉眠片時。鉛子從傷處出。仍敷傷處。○火燒麻油調敷。○一切惡瘡疔毒。香油化開敷。○金鑑參瘍醫大

黎洞丸

外國地名。治跌打損傷。筋損骨斷。夾棍刀傷。斧砍吐血。傷勞。小兒急驚。婦人難產。下部重傷。惡

血攻心。產後兒枕塊痛。乾血勞。血山崩。血

淋白帶。一切危症。服之。護心散。血解毒。騰黃秋

葉露泡之。隔湯煮十餘次。去浮沉。山羊血五錢出

取中。用山羊血拌入。晒乾。二兩。廣西無

真者。以子羊各二水片錢半麝香三七

鮮心血代。牛黃若

人參。帶黑色。名蘿蔔。三七為

上。出貴州。色白而苦者勿用。生大黃 阿魏 煑

孩兒茶 去渣

天竺黃 去石

血竭 去渣

乳香

沒藥 二味去油

雄黃 去石

各研細 和勻 取天泉

水。化騰黃。拌藥。搗千餘下。 稍加煉蜜。為丸。每重一錢。陰乾。

黃蠟封固。 一法。蜜一兩。黃蠟六錢。全煎。乘熱。黃酒化

服。醉蓋被。取汗。 一切無名腫毒。對口疔瘡。乳癰。內服。外敷。○毒蛇蜈蚣蝎螫蟲傷。俱外敷。

用黃酒磨塗。○

金鑑參大全

十寶散 一名四紅丹。治一切金

歸尾 二兩 滴乳香

洋沒藥 二味去油 朱砂 水飛各

血竭 毛上醋炒 兒茶 毛焙

各二 錢半 紅花 雄黃 各五錢

冰片 麝香 各三分 生

卷六 金瘡跌打

九

研細末。磁瓶密貯。每服五分。好黃酒隨量下。重者兩

服。骨斷者。加地鱉蟲炒。自然銅醋煨研。每服七厘。名

七厘散。跌打皮肉青腫未破者。陳酒調敷患處。

刀器傷皮破血出者。以藥末摻上。包裹避風。內傷

骨碎。陳醋調厚敷患處。藥性一到。骨自接矣。劉喬

松曰。予用此方。救重傷垂危者。不可勝數。莊在田

集驗方。加生大黃五錢。白芷三錢。肉桂一錢。內紅花

加倍。名紅花散。每用三錢。一半黃酒沖服。一半燒

酒調敷傷處。傷輕者。只外敷。即傷重。腸出者。極效。

補損接骨仙丹

治跌打撲墜。骨碎筋斷。肉破。疼痛不息。

當歸酒洗 川芎

白芍 炒

補骨脂

熟地

五靈脂

地骨皮

木香

防風

各五錢

乳香

沒藥

去油 二味

血竭

各一錢

夜合花樹皮

五錢

同入瓦壺。加燒酒。煮一炷香。取出

温服。陸晝村經驗方云。此方見金鑑。正骨科。庚戌秋。使女受傷。立驗。

秘傳正骨丹

景岳治跌打損傷重者。用此。可續筋骨。

降香

乳香

沒

藥二味
去油

蘇木

松節

自然銅

煨醋淬
七次

川烏

煨

血竭

各一兩

地龍

去土酒
浸烘乾

生龍骨

各一錢

土狗

即螻蛄十個。浸油內火烘乾。

共為末。每服五錢。隨病上下。酒調。

服。覺藥自頂門至遍身。搜至病所。則颯颯有聲。而筋骨漸愈。愈後。服參朮歸芪。並朴甘草。肉桂之屬。

調補元氣。傷科補要。無地龍名。紫金丹。消痰止痛。去骨節。經絡之宿傷。

秘傳紫金丹

治跌撲血脹。筋斷骨折。昏迷暈倒。灌下。即甦。

乳香

沒藥

二味

燈心同炒。研去油淨。

研砂濕。紙裏水打。

天竺黃

搗起。成片者。真。今人多燒。

諸骨及蛤
粉雜之
土驚蟲
即麤蟲無甲有鱗八足圓如棋
子雄者刀切斷碗覆之其蟲能

自接上。否則用生米
酒棧中燒酒浸炒各一錢
黑石子出桂林去
銅淨煨酒淬三次
骨碎補
酒
自然銅煨醋淬
七次

血竭
敲斷有鏡面磨甲間
為極細末磁瓶收貯勿
透紅者真各二錢

氣
每服七厘酒下重者兩服其骨自接
方。四知堂救急
○絳囊撮

要無天竺黃牛
膝名八厘散

澤蘭湯
治跌打損傷通二便除
腸中積血乃活命神丹

澤蘭
歸尾
各五錢

紅花
錢一
丹皮
錢二
青木香
赤芍
各半錢

水煎熱酒冲服
大便不通加酒炒大
黃二三錢○心悟

研十
粒

桃仁
皮去

研十

粒

水煎熱酒冲服

大便不通加酒炒大

黃二三錢○心悟

研十粒

地榆絹煎治刀及所傷內損大腸及兩脇助并腹皮傷

損膀胱小便 地榆八 黃絹天然黃色一匹 以炭

便淋瀝 灰淋清汁二升煮絹熟爛成片取出 入鍋以水二升

榆末煮以手撚着不作絹 分二服 白米粥飲調空心

服服後仰臥不得驚動轉側言語 其餘一服 次日依

上法服 將養一月準繩比方神妙其葉直至損處

蟹酒治軍身打傷 大活蟹一隻脚瓜全搗 冲熱酒

盡量飲醉渣 卷患處半日 骨內有聲自接骨碎垂危

三錢 骨碎補錢半 冲蟹酒服 跌打傷損不出血但

外有青腫紫色者先用葱白搗爛炒熱敷痛處隨用

大黃末姜汁調敷。並
飲蟹酒即愈。○彙精

古錢散

治折傷筋骨。

古文錢

五銖半兩或開元錢燒紅醋淬

為末酒調

服銅末自結為圈周束傷處

閱微草堂集。○文堂集驗方用自然銅研細水

飛和酒服愈後終身忌食葷葷。○陳文治曰跌撲之症全在補氣行血若自然銅惟接骨者用之而其燥散之害甚於刀劍。

丹溪備言之矣。

玉真散

治破傷風立可回生。

天南星

姜汁炒

防風

白芷

姜

蠶炒斷絲

研細每服三錢童便和好酒調下。

跌打傷損

內有瘀血者亦效。○景岳凡跌打或蟲獸傷破皮肉被風邪入內牙關緊急腰背反張遍體麻木用大蒜搗塗傷處將艾炙之膏護內服玉真散。○大成破傷風角弓反張大蒜一升黃酒四升煮爛服與得汗

即。瘥。劉瀛坡簡便方。破傷風。頭腫如斗。鵝糞火者。炒一二錢。麥麴炒一兩。蒜不拘多少。燒存性。為末。黃

酒調灌。即生。

保辜飲

刑曹案牘被毆後。受破傷風。百日。在保辜限內。速飲此方。

荆芥 黃蠟

魚鱧 炒黃色 各五錢

陳紹酒。一。隔湯煮一炷香。乘熱飲之。

汗出立愈

百日內忌食雞肉。一方加艾葉三片。關微

如蠶。遇物觸之。則卷縮。黃堆內有之。捉其脊。俟口涎出。滴傷處。片時。瘡覺麻木。汗出立效。如風驟急。速將此蟲剪去尾。將肚內黃水塗瘡口。再滴些於熱酒內。飲訖。汗出愈。

破傷濕

傷處入水受濕。口禁。身強直。

牡蠣 煨粉

敷瘡口。仍取末二

錢甘草湯調服

凡瘡口無汁者。中風也。邊口出黃水者。中水也。活人息事方

內傷藥酒

治跌打。及勞傷太過。腹脇腰膝筋骨肢體疼痛無力。不拘遠近。男婦老少皆效。

紅

花 桃仁

秦艽

川斷

木香

砂仁

素

皮 靈仙

當歸

五加皮

牛膝

骨

碎補

忌缺

胡桃肉

杜仲

丹參

晒乾

陳酒

二十斤

將一半。同藥隔湯煮大線香。

三炷

冷定取開。

將所存酒冲入封固。每早晚隨意温服一二杯。

古方

天下第一金瘡藥

一名油藥。治刀斧傷損。並跌撲打藥。敷上。立時止血。定痛。更不作膿。勝於

雄猪邊油

一斤

松香

黃蠟

乳香

沒藥

二味。箬上烘去油

血竭

兒茶

面粉

即銀粉炒篩四

樟腦三兩 水片各六分 麝香各六分 研極細先將油

蠟松香熬待冷 入藥末和勻磁罐密貯傷處不可見水

鍾鈴曰予製此藥普送刻方廣傳一方加輕粉五分

皮破見血者用油紙甘草湯煮過揉熟攤藥貼上日

換二次奇效如瘡有蟲用細辛一兩入猪油內煎一

二沸去細辛不用

製松香法明松香河水煮透扯拔九次去盡苦水再用鍋溶化傾冷水中待冷又化三次鍊淨

末一法用光磚二塊燒紅觀多紙將松香壓二三

次則油淨如霜刀傷藥中去油不淨反痛

鐵扇散治刀傷石傷用此搽上立時收

龍骨各五錢 古石灰老材香更妙 飛礬 寸栢香黑即

鐵扇散

口可避風以扇搽之勿碍 象皮切片炒

色之
松香
同寸栢香培
各研細和勻磁瓶收貯

備方。傷科補要

花蕊石散

治金刃傷。肚

花蕊石

出映州。色如硫黃。中有淡白點。質重體堅。

或方或圓。火煨入

羌活

紫蘇

蛇含石

火煨童

童便

草烏製

厚朴 姜汁

白芷

細辛

降香

當歸

南星

製

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

煨各

麝香

分三

共研細。罐貯。傷處用此糝之。軟棉紙蓋

緊。一日一換。

洗寃急救方。羅氏花蕊石一味。煨為散。通治金刃跌打。貓犬咬傷。死血瘀傷

處。或服或敷。其血化為黃水。心悟。花蕊石入兩。硫

黃四兩。研末。八瓦罐。泥封口。煨二炷。香研細。每版

錢。程鍾齡曰。此散。療血之神藥。

金刀黃靈藥

姚氏治刀傷
內潰作膿

蜜陀僧錢

麝香

分

水

片三厘

研細磁瓶貯勿泄氣

姚稔齋曰予昔宰蕭豐
二邑民俗强悍刀力之

傷日有數起以此施治無不全愈○按傷科有濫用
入骨者殊傷天理近高郵孫氏以狢猴骨代之殊妙
附錄於此其實金刃傷說以止血止痛為主此等藥
本不必用○林章甫曰道書凡尋常鬼魂無仕業者
皆守屍蓋游氣無歸以此
為廬舍耳殘之必受其殃

軍門丹

治刀傷第一
一神方

紫藤香

即降香中最佳者
瓦鑷刮下碾細

五倍

子去蟲屎

牡蠣

白占

三七各一兩

生半夏

血

竭

乳香由去

象皮

焙黃各五錢

為細末磁瓶收貯敷

傷處

止血止痛續筋生肌不膿無癥○方從福建軍
營得來施送極效按刀傷單方如荔枝核龍眼

核降香三七等末。均可續斷。指。又。旋覆花根搗汁。塗傷處封口。可續斷筋。此丹漢法。黃氏集驗方。

止血絮截血第一靈方

太子參二兩

參三七用野三七形如葶臍更妙三兩

真川連三兩

乳香二錢

沒藥二錢

煤丹煤即

中硬塊至堅者四兩

金銀花子三兩

修合須擇六月晴

天黎明時將藥水煎收入新花絮約一內。一晒乾。

用。高梅溪秘方人求者與絮不與方近時止。血絮皆楊氏代方今已刊在傷科補要。

止血粉刀傷用此

風化石灰

韭菜汁 二味拌作

餅狀風乾研細聽用沈子翔方

截血膏準繩治跌打研傷諸症

天花粉三兩 赤芍

片子姜黃

白芷

各一兩

為細末

不見火

茶清調敷

頭面

傷血不傷塗頸上周圍。○手傷塗臂周圍。足傷塗腿

上。○傷各處塗瘡口周圍。使截住其血不來潮。作○

若瘡口風襲肉硬加獨活酒調敷。又不消加紫荆皮

嫩鼠丹

治金瘡止血生肌

嫩鼠

未生毛者不拘多少

韭菜根

與鼠相等全搗

爛入陳石灰末摻乾作餅陰乾用時以刀刮末敷

傷處包裹立愈

外科百效。羅軍門集驗方加油頭髮灰人指甲各二兩無韭汁。蔣偉

士救急方刀傷跌損好雞骨炭明松香多用老韭

接骨仙方

骨斷粉碎者可治先於跌碎處整理對縫不可少有差錯

五加皮

四兩

雄雞一隻重六兩以上，黑者更妙，連皮骨血，一方用小雞。與五加搗爛敷斷骨。

處布包好。一周時揭去內自完好。一云須聽不響即

煎服。盡量醉睡為妙。○大生多骨矣。再用五加皮五兩酒煎服。盡量醉睡為妙。○大

跌打接骨敷藥 薄荷骨 劉寄奴 川烏 草烏

錢 黑梔 飛麵 各三 大黃 生 沒藥 各二 生

姜十片葱十把各藥搗爛加醋一杯炒熱敷患處外骨斷處用夾板夾

緊對時一換。○傷重者加桂枝松香各一錢。骨碎補二錢。生軍用五錢。○不腫不用醋。皮破不用醋。○如

碎骨在皮內作膿。田螺搗酒糟和勻。敷四圍中留一孔。其骨自出。○彙精

香地膏 本事方治墮跌臂面脫急與生地研木杏接入口中若血漬白難治

細研 以生地攤紙上。搽木香末一層。又攤生地。貼腫

上。日換一次。腫至肩背。於是藥一之。瀉去黑血。數

香雄黃各五分。為末。每少許。點眼。潭內。過夜即愈。

葱白膏

治跌打青腫。不拘破不破。不用開刀。一夜復原。不痛。

鮮猪肉 不精不肥 二斤去皮

淨骨 葱白 半斤

明松香 末三

全搗勻。攤敷患處。扎

緊周時。皮肉如舊。膿血水任流不妨。房床。忘放他物。種福堂方。

葱熨法

薛氏治刀傷跌打青腫不散。死血不潰。

葱白 炒熱敷患處。葱

冷再易

本事方。一人劈裂指。拇取葱白煨熱。剝皮中。有涎。搽損處。血止痛消。並不潰膿。彙精跌

打損傷。不論新久。麴皮乾炒。細包。噴酒在細上。熨之。再噴再熨。簡便方。生梔子五錢。飛麴三錢。姜汁調

塗傷處。拔出血。腫即消。

象皮膏

治跌打破傷斷骨。

地鱉蟲

一兩

血竭

象皮

乳香

去油

沒藥

去油各五錢

龍骨

海螵蛸

各三錢

真珠

豆腐

煮過

人參

或黨參代各二錢

冰片

一錢以上十味。研細末。另包。

大黃

二兩

川芎

當歸

生地

各一兩

紅花

川連

荊

芥

肉桂

白芨

各三錢

甘草

五錢

白薇

二錢。以上十一味。

切片

麻油

一斤。將藥片入鍋熬。俟藥枯。以麻布絞去渣。

入黃白占。各三兩。

芡

蘇末。全熬。至滴水不化。

傾入淨水缸內。將膏在水中稔

長。

一塊分作五塊。

漸入大鍋內。鎔滾。看藥泛紅黃色。漸漸化

盡其膏如鏡面。不粘手為度。

如老。加麻油。如嫩。加百草霜一兩。攪勻。

方

將前十味藥末和勻聽用。傷科補要

紅玉膏 生肌長肉 麻油 柏油 各二兩半 管仲 三錢 象皮片

黃丹 炒各五錢 血餘 一大團 朱砂 兒茶 輕粉

沒藥 去油 川椒 樟腦 各五分 乳香 去油二錢半 血竭

半錢 先以油髮管象同煎。至髮枯去油再煎滴水成珠 下黃丹再

下諸藥末攪勻離火。候半冷 下黃蠟 二錢半 杭粉 兩半 成膏

攤貼患處。一日一換。並治頑瘡不收口及濕爛。疔瘡楊梅結毒。活人息事方。

夾棍傷神驗膏 大黃 白蠟 各四兩 松香 乳香 各二兩

沒藥 骨碎補 各一兩 川斷 五錢 麝香 二錢 當

歸

龜板

各三兩

為細末猪板油

三兩將乳松白蠟銅鍋內化開入藥

末

攪勻為膏貼傷處

第二日即可行走丹方彙編

個細胡椒十四粒研貼夾傷處新棉裏緊一夜即能

步履矣。○景岳按傷手指皂礬二兩水熬滾將手薰

洗血活痛止

不致潰爛



諸傷

傷舌 傷面上 傷耳鼻 傷頰門 傷眼

肉 鉛子入肉 鐵針入肉 竹木刺入肉 磁

鋒 風絲入目 塵埃入目 烟渣入目

破血丹

大人小兒含刀在口割舌垂落者用 雞子白軟皮袋佳舌頭以此丹救之 花粉三

赤芍

二 薑黃 白芷 各一 為末蜜調塗舌根

斷血却

以黃蠟 稠得所 敷雞子皮上常勤添敷三日

舌接方去雞子皮只用蜜敷七日全安

愈後舌硬以白雞冠血點

之即軟醫書滙叅。幼幼集成 活蟹炙乾為末敷舌斷能重生。

戳傷玉堂

即口中上腭 賦粉 冰片 敷紙上貼肉

破處以止其血

內服傷藥復用 日二三十次更以柿霜牛乳等涼潤

將色之。○嬰兒跌傷。頤門骨肉破出血。馬屁
勃灰敷止其血。以猪肉貼之。避風。○金鑑

補天丹

治烟筒傷咽喉及刀斧木石跌仆等傷。

龍眼

去壳用肉連核燒存性研末一兩、

冰片二分或吹或點神效。

一方大蚌鱗雌雄各一隻陰陽瓦煨末和冰片二分。

吹喉中。○方氏喉科

打傷眼睛

如突出。急揉進。

生猪肉片

當歸

赤石脂

末少許

摻肉上熱貼之。出毒血即愈。

方。打傷眼珠。牛口延。方。打傷眼珠。牛口延。

每日點兩次。避風。

擦落耳鼻

油髮灰

急以所落耳鼻蘸末綴定。軟帛

縛之神效

木草類方。千金翼鼻破被傷。或擦落猫兒頭上毛。剪碎。唾調敷。自愈。

爪傷面目 橄欖核 磨水搽之。過宿無痕。或耳垢封之。或人乳。

調塗。即結。良方集要生半夏。芙蓉葉。麝。彙精。等分。為末。紹酒白蜜調敷。

傷破陰囊 三九脫落。懸挂。未斷。漫漫托上。 壁錢 多取幾個 敷傷處。日漸

止痛其囊如故 醫鑑。金鑑。陰囊破。人扯破。雞子黃。油。并金毛狗脊上毛。薄攤塗油於上。

次敷傷藥封。以蘇葉煎水洗之。

箭簇入肉 巴豆肉 微炒 蠅螂 即准尿。蟲研白 塗傷處。俟痒

痛拔之 肘後方。千金方。螻蛄。杵汁。塗患處。並治。針刺入肉。丹方彙編。鎔子入肉。水銀。灌

入傷處。其鉛。即化。從傷處。隨水。跟流。出。活人息。事方。乾莧菜。搗和。砂糖塗之。鉛。脾。箭簇。皆可。出。

鐵針入肉 靈磁石末 車脂輦油 研膏 調攤紙上。如

諸傷 丸

錢許貼之。每日二換。

名神聖膏。○金鑑跌針。入肉無眼者不動。有眼者隨氣流走。烏

細羽數根。炙黃。研酒服二錢。外貼比膏針自出。

大成酸棗核數十枚。剪湯服。針從原孔出。

竹木刺入肉

松脂

流出如乳頭香者

敷上。帛裹三五日。當

有根出不痛自安

兵部手集。千金方。鹿角燒末。水和塗。一文即出。○金鑑。螻蛄搗敷

少時即出。○彙精。大活蝦。七個。搗爛。塗之。刺隨蝦出。

外莖。蘆葦刺入肉。生子。嚼爛敷之。○葉氏法。竹

木刺。針撥不盡者。人

齒垢封之。即不爛。

磁鋒嵌脚

三角白果

去壳衣心

浸菜油內。搗餅貼之。再

易而愈

便易集。或以白果肉。生搗。罨傷處。○四知堂救急方。瓦石荆棘刺足。鹽梅肉二枚。白糖和

搗爛。敷

患上。

風絲入目 赤痛甚者 滾水 一杯 安鹽花 少許 明礬 三錢 將舌尖

浸水中。片刻。其絲自落。水中。養生經驗集。得效方。石菖蒲。搗碎。左目塞右

鼻。右目塞左鼻。百發百中。公生集。捉肥虱。二十餘

個。二指取虱。那熱。針破。仰臥。將虱血點眼內。少刻。天

絲。反抱。虱血。而。出。李保齋

經驗方。桑樹葉。點之。即出。

辟塵膏 治塵埃入目。指成腫痛。或飛絲入目。睛脹突出者。 頂烟陳墨 新汲水磨之

入元明粉 五分 和成膏。新筆 清水 蘸點目內。日三五

次。如飛絲。畧閉。划許。墨。染。絲。黑。用筆挑去。見慈幼後

出。普濟良方。塵芒入目。生藕汁。綿裹。蘸。滴。目中。即

出。養生集。目。慈。沙。泥。牛。膝。頂。粗。一。段。長。二。寸。嚼。爛

搓。在。塞。兩。眼。角。少。刻。泥。沙。裹。藥。和。淚。盡。出。種。福。堂

方。烟。渣。入。目。亂。髮

緩緩揉之。即出。

湯火傷

藥 烟 熏 煤 毒

解毒行血膏

凡為湯火所傷。肌肉既爛。血必不行。毒從何解。酌用此膏。

當歸

劉

寄奴 頭髮

生地 各一兩

芝蔴油

大兩。銅鍋內煎。上藥。至髮溶。濾。

渣。

入白蠟 八錢。不佳。手攪。候溫。

下寒水石

生大黃

黃柏

嫩白

礬

生各一兩。輕粉二錢。

為末 埋土內。出火毒。

有患者塗之

選粹。福堂方先。

用好酒二十斤。溫浸。以解其毒。或菜油亦妙。叢桂堂方。湯火傷。用麻油煎數滾。入白蠟。鎔化。加蜜熬。勻。刷塗傷處。止痛無斑。若疼急傷重。內服。即可護心。

地榆散

治湯火傷

地榆

磨如細麵

香油浸。破爛者先敷。加以

乾末搽上

今治坊。以地榆浸油。缸以備不虞。敷上。立刻止痛。乃湯火之聖藥。仙拈集。

卷六 湯火傷

王

救命散

治湯火燒

黃柏

川連

黃芩

黃芪

薄荷

各一錢

滑石

飛三兩

為細末香油或猪油調搽

盧怡亭信

驗方。景岳。寒水石。赤石脂。黃等分。為末。菜油調敷。或乾

湯火傷

嫩黃衣

六月收

連水和大黃為餅

入壘密封

遇傷

以少許塗患處止痛無痕

簡便驗方。湯火外治方。如陳白螺壳。蛤蜊壳。蚌壳。

龍眼核。俱煨灰。銀杏。醃菜葉。然瓜葉。扁柏葉。俱搗汁。蕎麥麵糊。得一二味。或敷。或貼。俱效。參經驗方。

火藥燒壞

先以好酒洗淨

雞子

十個。煮熟。取黃。炒焦。黑。熬油。

入生大黃

末。二兩。香油調搽。即愈。

幼幼集成。聖濟方。被火回祿烟熏至死者。白菜蕨搗汁。灌之。即

甦。亦治。狼烟。煤。毒。楊振祖普濟方。火藥燒壞。熟柿子爛水。搽之。或乳香。炒黑。研。菜油搽之。

雜物傷

人咬 馬傷 疥狗咬 熊虎狼傷 刺傷 鼠咬

猪咬

狐尿刺人

毒蛇咬

土虺咬

蛇咬

蛇繞

不

解蜈蚣

蜈蚣咬

蝎蜂螫

蜘蛛咬

壁螫咬

壁螫咬

蛇

虱毒

水蛭毒

刺毛螫

蜈蚣咬

蜈蚣咬

百蟲入

沙

耳

石蛭傷

蜈蚣咬

蜈蚣咬

蜈蚣咬

蜈蚣咬

蜈蚣咬

人咬傷

先以童便洗齒垢淨。

澹雞矢

塗咬處。立刻止痛。

或生

嚼塗。亦治馬咬。熊虎爪傷。或柿餅搗爛。敷患處。咬

後受牙黃毒。老鼠矢。兩頭大者。七粒。荔枝肉。紅糖。搗

勻敷。黃印。拔在藥上。人咬指。久爛欲脫。

龜板。鱉甲。燒灰。香油調塗。參經。驗良方。

解毒散

治一切毒蛇。射工。蟲獸所傷。毒入腹。則眼合口。噤。手足僵直。或下惡血。好卧暗室。太便如漆。

甘草

白礬

分等

為末。每服二錢。冷水調下。更敷。

傷處神效。吐黑涎或瀉即愈。瑞竹堂方。此藥平易。

木可吐
衆毒。

癡狗咬方

春末夏初犬多發狂。尾拖口流涎舌黑色咬後。急於無風處擠出惡血。鹽水洗淨。葱搗爛貼上。用蚯蚓糞全蓋。或百草霜香油調敷。扎好。數日內頂心有紅髮數根。日中照之即見。拔去之。

紅蚯蚓

五六條。韭菜地內者。竹片破去腹內泥。鹽水洗淨。

好醋一杯。入蚯蚓畧

炙。陳酒送下。大便泄出毒氣。即愈。重者兩服。

又方。黑槐子。燒

存性。五錢。好酒下。避風出汗。隔二日再服。以防毒發。

○咬後。忌見苧麻物。百日。忌猪羊麵食銅鐸聲。一年忌食魚腥茄子。終身。忌食牛犬肉。蠶蛹。赤豆。可常食杏仁漿。以防餘毒。韭菜汁。亦可時飲一杯。○黃昆夫

集驗方。○高味。即見鄉人用鮮蚕莖葉搗爛塗。即愈。

一云蚕豆搗爛塗亦可。

鰲鱉粉

治瘋犬傷

番木鱉

半個切碎

斑發

七個過一目加一個去頭翅足

糯米

撮全二味炒至米出烟為度去毒鱉取米研末

冷水入麻油

少許調服

以便利下惡物為度

復內有狗聲者再加木鱉一個如前法製取

米調服愈後以黃連甘草湯解之。張景岳曰每見犯諸忌而復發者不救。又見服斑毛而死者亦有之。蓋斑毛至毒止用米全炒取其氣猶備甘連以解其毒。若竟服斑毛豈不危險慎之。全牛集止用木鱉子炙研末撒於處一方加雄黃四分冷水調服。二便出血即愈。

提毒法

治癰狗咬

砂壺

二個盛燒酒各半壺

先以一壺上火

令滾有聲

更去

即按在破傷處拔出血黑血水滿則自落

再以次壺

輪板以盡為度立愈。又法川豆豉研香油調糊丸彈子大常措試咬處始看豉丸內有狗毛茸茸然此

雜物傷

三

毒氣已出。易丸再指。至無毛為度。○又法。胡桃壳。以人糞填滿。插咬處。著艾圓灸之。壳焦則易。灸至百壯。更物。盡下。內服玉真散。○金鑑

惡犬咬

瓦松 一兩

雄黃 二錢

杏仁 三錢

研貼患處

生

編。○本草。白果仁。爵塗。或黃蠟。簞化。滴入瘡內。或熟牛屎封之。即時痛止。○劉氏簡便方。桑樹。砍自然汁。塗之。○藏器方。犬咬。破傷風腫。蒼耳莖葉酒調塗。

熊虎爪傷

粟米

爵塗

虎狼爪傷。香麻油飲。并洗之。又。薤白。搗汁飲。并塗。○胡搽

爪傷。潰爛。金毛狗脊。焙研。搽之。或麻油調搽。○參古方彙精

馬咬傷

毒氣入心。傾悶者。

馬齒莧

煮食之。或煎湯飲。

金鑑亦治

馬汗。驢涎入瘡。○肘後方。馬咬腫痛者。雞冠血塗之。○集驗方。馬咬及踏傷。飲童便及韭汁。以寒水石末

敷傷處。○良朋彙集馬咬。或人咬。白煮猪肉。同飯自嚼。貼患處。立止痛。○金鑑馬牙入瘡。掀腫痛。急取腫處。令出紫血。烏梅嚼塗之。

貓咬。或爪。薄荷搗汁。或研末。搽之。戴元禮方。古

萊萸。搽貓鼻。取涎塗之。或貓毛燒灰。香油調搽。于金方。猪咬成瘡。松脂煉作餅。貼之。○肘後方。狐鼠刺人。腫痛。桑灰汁漬之。冷即易。

白芷護心散。治毒蛇咬。雄黃。灸草。各五錢。白芷。一兩。

乳香。去油。研細。每服四錢。酒調服。醫學心悟。○聖五靈脂。五錢。雄黃。二錢半。為末。酒調灌。少時。咬處。出黃水。以雄黃末。搽之。口合。而愈。

拔毒法。治毒蛇咬。並蜈蚣。蜘蛛。蠅。屎。等毒。雞蛋。三個。敲破。頭。合咬處。聽。

雜物傷。三五

蛋內有聲變黑色。

再用一個合之。俟蛋內變黃白。

自愈不疼極妙。

全

周寫仙方。○叢桂堂方。用雞蛋頭。畧搗碎。放咬處。

蛋大頭。用艾。灸。蛋。熟。連。換。數。箇。其。毒。方。出。○大成。諸

毒蛇。蟲。蝎。所。傷。無。如。此。

蒜。艾。灸。為。妙。俱。能。止。痛。

毒蛇傷

同。白。礬。

白礬

刀頭燒紅。將礬置上。汁出。熱。滴。

之。立。瘡。

劉禹錫傳信方。○叢桂堂方。去。虺。蛇。咬。即。按。心。紅。髮。一。根。何。首。烏。搗。汁。沖。酒。服。渣。敷。

患處。疼。立。止。○丹方。桑。編。烟。管。燒。熱。滴。油。搽。之。○千

金方。蛇。繞。不。解。熱。尿。淋。之。即。脫。蛇。入。七。孔。母。猪。尾。血。

滴。入。即。出。○高。味。啣。見。一。丐。毒。蛇。咬。彼。尋。鮮。灰。菟。葉

傷處。搽。搽。頃。刻。腫。退。毒。消。

蜈蚣咬

雄雞

倒。挂。少。時。口。內。出。涎。

手。蘸。抹。傷。處。痛。立。止。雞。冠

血塗之

金。鑑。○大。金。大。蜘蛛。安。咬。處。吸。其。毒。亦。治。蛇。傷。又。法。雄。雞。嘴。對。傷。處。吸。盡。毒。雞。自。去。又。方。

雄黃末。燃菜子油。熏咬處。痛立止。○集驗方。蜈蚣咬。獨頭蒜。擦咬處。並治蝎蠍螫傷。蜈蚣咬。蜈蚣咬。

蝎蜂螫

蜀葵花

石榴花

艾心分

端午時。陰乾

為末。水調塗。

肘後方。○蝎螫。胆礬末。或白糖。搽痛處。或銀朱。胡雞。蛋清。煎。○蜂螫。尾松汁。塗之。

又生芋。芫梗。及了。擦之。又生栗子汁。桑樹汁。俱可擦之。○參經。驗良方。

蜘蛛咬

縛定痛處。勿使毒行。

貝母末。酒服五錢。至醉。瘡口出水。

愈。亦治蛇傷。仁齊直指。○又方。炮姜。切片。貼之。或雄黃末。敷。雞冠血。塗之。遍身發腫。牛羊乳。或靛青。葉

汁。飲之。○又「花」蜘蛛毒。蒼耳草汁。服。以渣敷。○「壁」蟻咬。毒人至死。桑柴灰。炭煎汁。調白礬末。敷之。○參經

方驗諸

蚯蚓咬

形如大風。眉毛皆落。夜則蚓鳴於體。

鹽湯頻洗。毒去。

或鳴血。聲之。或

石灰水浸之。蟻。蝮。咬者。石灰醋和塗之。○蟻。蝮。咬。生
芝麻搗敷。又馬。蟻。齧。流血不止。竹葉。燒。灰。塗。之。○
敷。○參。經。驗。諸。方。

刺毛螫

即樹間雜毛蟲。

伏龍肝

酸醋控成團。在痛處撓。轉。

其毛自出。

或蚯蚓泥搽。或蒲公英白汁敷。如肉已爛。

或熱蜜搽之。或以艾心嚼敷。見政中言。毛即癢。○又

樹間雜毛蟲。名在刺蟲。亦名射毛。射人。外痒內痛。

肉爛。豆豉清油搗敷。少時毛出。

白芷湯洗之。○參。經。驗。良。方。

沙虱毒

在水中。陰雨即着人。鑽入皮裏。有赤點。如米。痛如刺。

麝香

和鹽塗。肘後

方。先以茅柴刮去。苦菜汁塗之。○張景賢說。南方多

雨。有禾。瑤。大。鼻。生。古。木。上。聞。人。氣。則。閃。閃。動。墮。

體間。立成瘡。通體。水。砂。麝香。塗。之。愈。○千金方。山。中。

草木枝上。有石。蛭。着人。足。則穿肌入肉。中害人。以臘

猪膏和盐。塗足脛趾。即不着入。

蠖蝮尿瘡

即多脚蟲。藏壁間。以尿射人。皮膚起泡。痛如火烙。初如飯糗。次如豆大。甚則毒延遍身。搔

痒不休。

盐湯

綿漏瘡。上敷。即消。

又方。胡粉。酢和塗。或大麥嚼敷。

或茶葉油調敷。又烏雞翎毛。燒灰。油調敷。或大黃末塗之。千金方。其瘡狀如茱萸。中央白膿。惡寒發熱。犀角磨汁塗。

參經驗良方。

百蟲入耳

牛膠

以麻紀剪一頭散

溶膠上。探入耳

中。使其物粘之。徐徐引水。

曹氏經驗方。金鑑。百蟲入耳。如蠅。蚊。小蟲。以麻油

滴入耳竅。蟲即死。如疑。等物。以肉炙香。置耳旁。蟲聞香。自出。夜照燈。光向耳竅。蟲見光。則出。叢桂堂方。百蟲入耳。在左耳。以手緊閉右耳。及兩鼻孔。努氣至左耳。閉口。勿言。右耳亦然。少頃自出。大全。蜈蚣

入耳，雞肉炒香，
置耳邊引出。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 耳, 雞, 肉, 炒, 香, 置, 耳, 邊, 引, 出.]

誤吞

吞針

碗片

鐵物

磁鋒

銅錢

木屑

金銀

諸木

環釵

竹釵

戒指

魚鈎

雞魚骨

田螺

蜈蚣

蟻子

吞針入腹

靈磁石

細研

黃蠟

等分

鎔攪如針。涼水送下。

藥裏針下。

大成，凡鐵器皆用此法。江紹庭應驗方，蠶豆、韭菜同煮飽食，針從大便包裹而出。

○文堂集驗方，田雞眼睛一對，木通湯下。其珠穿針兩頭，從大便出。一方用蝦蟇冬月桑樹下掘覓。

誤吞鐵物

並銅錢亦為骨鯁。

新炭皮

研細亦可

調粥三碗食

飽每服二錢其鐵自下

蘇沈良方。紀曉嵐曰：予孫偶吞鐵釘，以此試之，果炭屑。

裏釘而下。○文堂方，誤吞銅錢，並金銀、鐵骨等物，多吃青菜、脂、油，自然送下。大腸與糞俱下。若至肛門不能出者，以

鉗取之。

候吞釵環

薤白

大束

煮熟切食。釵即隨出。

葛洪方。

洗寃急救方。候吞金環釵。鉛糖一斤。食盡便出。通治。福。芒。骨。鯁。又。黃。金。毒。食。鷓。鴒。肉。解。自。銀。毒。黃。連。甘草湯解。○盧怡亭信驗方。一婦吞金戒重三錢。氣閉欲絕。王定九學士。用升麻八分。提氣。火麻仁一兩。滑。腸。煎。湯。灌。兩。劑。金。從。大。便。出。

碗片入腹

並吞金銀。胸膈痛。

羊脬骨

五錢炙。炭研細。

開水送下。又

吞磁鋒。生紅蘿蔔搗爛吞下。其鋒從大便出。○洗寃急救方。

候吞木屑

喉候不下。

鐵斧

磨水灌之。

古方彙精。○集元方。候吞諸木屑。鐵

鐵秤錘。燒赤。淬酒中。熱飲。○三因方。斤。鎔。刺。喉。芝。麻。梗。燒。灰。紅。棗。丸。含。化。即。愈。○各。竹。絲。福。芒。殼。哽。芝。麻。妙。研。白。

湯調下。

烏龍針

治諸骨
鯁咽。

細鉄絲

燒軟兩
頭處。

用黃蠟作丸。龍眼

大裹鉄線頭上。絲棉裏之。推入咽中。哽處其骨自然

順下。不下再推。

正宗。又針刺喉中。亂麻筋一團。搓龍眼。以線穿繫。留線頭在外。浸濕。

急吞下咽。頃刻。扯出針。刺麻中而出。醫通。候吞魚

齒。以晶串或葱子。嚥下。扯之。有線在外者。以綿紙剪數層穿線上。徐咽下。少頃引之。上。出。

雞魚骨鯁

霜梅肉

把成指頭大丸子。再將綿裹。用線穿在內。

冷水送下。

扯住線頭在手。一嘔即出。

簡便驗方。本草魚骨鯁。皂莢末。吹鼻取嚏。又獨蒜

頭塞鼻中。自出。又鯉魚三十六鱗。焙末。涼水服。其刺自跳出。便易經驗集。凡吞其魚之骨。即以某魚生

眼珠吞下。即出。有人食甲魚骨鯁咽。試之立效。

諸骨鯁咽

威靈仙

半兩

砂仁

一兩

砂糖

一盞

冷水煎

服少頃其骨自軟如綿而下奇驗

本草一方有青果仁無砂仁。蘇沈

良方膏鯁或竹木簦刺喉臘月青魚胆風化每以酒一合煎化一皂子許溫漱若得逆便吐骨隨出。張景岳曰諸物鯁咽必有鋒芒之逆治者當借飲食之勢湧而吐之使之上出如拔刺之捷也。

諸獸骨鯁

象牙末

浮於新汲水上吸之即下

並治

桃李不下。陳文治曰諸物鯁咽無如此物制物雞骨用狗涎煎骨用貓涎。稻芒用鷄涎點入喉中甚近於理。又狗涎治骨鯁鴨涎治白螺鯁咽。參洗寬急救方

誤吞蜈蚣

生公雞

熱血頓吃須臾以生油一口灌

之在咽即出

如已入腹急吞雞子二枚勿嚼次日即裏出。繼與雄黃末水調服。洗寬急救

方

快吞螞蝗子

即水螅。食芹菜菹所致。肚腹作痛。

水田泥

一兩

雄黃

二錢

為丸。分作四服。滾水下。即隨泥解出。

後方。熱羊血。便易集。肘

猪脂飲之。蝗即下。○劉氏簡便方。食生蜜。螞蝗化為水。

Faint vertical text columns on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Large, faint characters in the center of the page, possibly serving as a section header or large characters.

東天... 主... 靜... 無... 亦...

... 湖... 湖... 湖... 湖... 湖...

... 然... 然... 然... 然... 然...

... 東... 東... 東... 東... 東...

... 亦... 亦... 亦... 亦... 亦...

... 惟... 惟... 惟... 惟... 惟...

... 水... 水... 水... 水... 水...

... 豈... 豈... 豈... 豈... 豈...

芫花野菌等毒
○參丹方彙編

解毒丸

解毒百毒及候食
毒草或中壘毒

板藍根

洗淨晒
乾四兩

貫眾

去毛

青黛

生甘草

各一兩

為末蜜丸梧子大青黛為衣

如稍覺精神恍惚急取十五丸嚼爛并
水送下或水浸蒸餅尤佳傷科補要

解毒飲

治金石砒霜及蟲蠱斷
腸草射工一切惡毒

鴨血或雞

乘熱灌

入喉垂死者立生

凡猪羊血俱能解射工
藥箭毒○本草綱目

解飲食毒

凡覺胸中不快嚼生豆
不聞腥氣是中毒也

地漿

其法掘地成
坑以水傾注

攪成

飲一碗即愈

能解鮮菌野芋閉口花椒砒石
銀鋤水銀水片及飲食百毒

凡生雞子調白礬末可吐眾毒○食物中毒或宿肉
瀉脯毒韭汁解之○中飲食毒雄黃青黛等分為末

每服二錢。并水下。
○參本草綱目

解毒錠 明雄黃 大蒜 糯米粽 端午日午時合

成錠佩之於身。如行水陸之路能辟一切邪氣妖氛

毒症俱用燒酒或開水調治。外敷諸蛇蝎蜈蚣等傷內服解各種

中鮮蘇菇毒

此陰毒之物禁川寒藥川連黑豆等。

乾姜 附子 人參

白朮

水煎服。景岳全書。劉氏濟急方。山東人種芋魁。三年不收。成野芋。殺人。荷

葉、銀花、茱萸糞汁俱可解。

中鈎吻毒

生池旁與萍葉相似惟莖有毛俗名毛脚鴨兒片。候食面青唇紫。

葱涕

啖之即解。一種水葺葉圓而光。候食狂劇如中風或吐血。甘草濃汁灌之。服木鱉子發抖

欲死。香油和白糖灌。○中半夏毒。生姜汁飲。○
中野葛毒。雞子清灌。吐毒出。○參經。驗諸方。

中食肉物毒

蘆根

搗汁飲。乾者煮汁服。

通治馬犬

驚蟹。并藥箭毒。心下堅硬。口渴。發熱。妄語。○自死。六畜毒。壁上黄土。水調飲。即解。或赤小豆。燒研。水服。或黃柏末一錢。水調。或胡荽子。煮令發裂。取汁研服。○參本草綱目。

中狼犬牛馬毒

杏仁

去皮搗爛。以沸湯絞汁。

作三服。

金匱牛

毛髮向後。其肉殺人。人乳飲一升。即愈。或牛壯水。煮汁。取汗。○中馬肝毒。雄鼠屎。三七枚。水研服。○中猪肉毒。猪屎。燒灰。水服。○參本草綱目。

候食瘟肉生疔

牛馬猪羊。

烏桕樹葉

搗汁一大碗。

頓服。大瀉。

毒氣即。慙。

無葉。用嫩根。○候食瘟牛。菊花汁。酒。或早稻草煎。濃服。○參經。驗良方。

中諸鳥毒

生扁豆末

冷水服

或生薑汁解之。中
鴿毒及斑鴿毒葛粉

二合。姜汁調服。食雉中
毒吐下不止。生犀角末并
水調服。中鴿酒毒。綠豆
粉二合。水調服。觸鴿頂
毒。手脚赤腫。青松毛和糯
米飯搗敷。參經驗諸方

中諸魚毒

香紫蘇

濃汁飲之

或橘皮汁。冬瓜汁。馬
鞭草汁。大豆汁。均可

解。中鯉魚毒。食蟹即解。凡藥中
荆芥忌。與魚同
日服。河鮪黃鱔魚尤忌。中
河鮪毒。麻油多。蕘吐毒
出。或槐花汁。橄欖汁。蘆根汁。金汁。俱
冷服。紫金錠尤妙。參丹方彙編

中魚鱉蝦蟆毒

二便秘
臍下痛

豆豉一大
合

井水浸濃。温服。

中魚鱉馬蝗毒。藍汁。或靛青
水飲。鱉與莧全食。成
癢。白馬尿飲一碗。即化。食
蟹致吐。丁香末五分。姜
湯服。或乾蒜煮汁飲。食海
蛤。中有游蟲。壳骨相
似。惟面上無光。誤吞狂走。欲
投水。醋飲之。可解。參

經駢諸方

中鼠涎毒

低頭往暗處不言不答背人竊食蓋物經宿鼠欲竊食涎滴其上人食之也

吳

萸塞貓口涎自出與萸同服

萬病回春。名醫錄一人撰飲蛇交水心

腹疼。雄黃水調服。下出毒而愈。

中射工毒

一名蝮。生江南。形如甲蟲。正黑。有長角。其端上如弩。以氣為矢。因水勢以射人影。中其毒

者。寒熱筋急。悶亂成瘡。中黑邊赤。如芒刺火灼。

葱白

一握

葛根

二兩

升麻

七錢

每用四錢水煎服。

或知母搗汁飲。此蟲畏鷲。鷲能食之。劉暉西濟

半急方

中溪水毒

山水中有毒蟲射工等。伺人涉水。中其毒者。惡寒頭痛。心煩背強。手足逆冷。至肘膝二三

日腹中生蟲食臟
將過八九日不治

吳黃錢一

犀角末

升麻

陳

皮各三錢

烏梅七個

鮮姜三片

水煎服

中溪毒下部蟲蝕生瘡用藍汁通體

塗浴之或蒼耳汁納肛門亦可內服。○溪毒初覺下部有赤瘡如截肉者陽毒最急知魚齒者陰毒稍緩欲知是否用小蒜煮水溫浴是亦毒身發赤無者非也。○劉氏濟急方

中蠱毒

嶺南人養蠱胃魚肉中害人

在上胸膈痛

用升麻手摳吐之

在下膈下痛

用鬱金湯服下之

或二味合服不吐即下范石胡集○防蠱毒用

石首魚以首製器或飲食遇蠱必燥裂或銀簪過毒則黑或犀角製為器試飲食有毒則白沫竦起。○驗中蠱吐津於清水內沉則是浮則非或嚼黑豆不腥食白礬反甘為中蠱一法雞蛋煮熟含口中食頃拿出。○卵黑為蠱蠱。○劉氏濟急方

中丹石毒

肥猪肉

五斤

慈薤

半斤

煮食。心腹鳴毒下

而愈。

千金翼方。勝金方。黑鉛一斤。鎔化。投酒一升。如此十餘次。待酒至半升服。中求銀毒。吳屑

煎汁飲。

中鉛粉。輕粉毒。葶藶蘆薈汁。俱可解。中

輕粉毒。齒縫出血臭腫。貫衆川連煎水。入冰片少許

時時救之。中皂礬毒。麩糊一餅服之。候服

銀朱。臘黃。薺菜汁溫服。即解。參急救須知

瀉毒神丹

治砒毒

當歸

三兩

大黃

各一兩

白礬

各一兩

生甘

草

五錢

水煎湯飲。立時大瀉則生。

凡飽腹服砒者。毒在上焦。吐之。即愈。

若空心服者。毒直達中下二焦。宜服瀉藥。可救。

服砒未久者。桐油灌之。或雞子一二十個。打沫。入明

礬末三錢。灌之。得吐。即解。毒入腹痛者。黑鉛四兩

一塊。井水旋磨旋灌。或石青冷水調服。洗冤急救

方

服盪滴

生甘草

三兩

淡豆豉

一兩

水煎服

如服已久加當歸一

兩、今煎。一方、肥皂汁、和水灌之。即吐。如未盡、用熱豆腐漿。或生豆腐、調灌。即吐。出。如腐形。如不吐。以鷲翎、然、喉、中、必、吐。或白洋糖四兩、胡湯灌。又雞鴨血

灌之。不可、用、熱、水。或生大黃一兩、調汁灌。或抹桌布、灑水灌之。

參活人息事方

過飲燒酒

人事昏沉。先以新汲水浸其髮。

熱豆腐

細切

遍身貼之

冷即

換醒乃止。或井底泥、卷其胸。生薑汁、茅根汁、白葉、煎汁、黑豆、菜豆汁、俱可灌之。或生蚌、瀝水灌之。

參洗寬

急救方

中蒙汗毒

俗名燒香

冷水

飲之即安

食桐油吐不止。飲熱酒即解。

中、煤炭、烟、暈、清水灌之。或白菜、煎汁、或熱尿灌之。解百毒氣。桑白皮汁、一合服。吐、利、自、出。參丹方彙

淘古井毒

古塚深洞皆有灰毒令人悶亂夏月更甚。

急取井水喫患者之。

面并用雄黃末。

錢一二冷水調服。凡入井先投雜毛。俾便不妨。洗完急救方。

用暖酒數升。酒入。待時下。

諸物有毒例

李士材本草通元云。菓忽異常。根下必藏毒物。核如未脫。仁雙並可傷人。或果

落地而蟲緣。或瓜沉水而雙蒂。指六翼四距四足三

皆禽中之最毒。角獨尾歧。肝青足赤。恐獸肉之非良。

飛者死。而目閉足踏。走者死。而口張首北。死疔死箭。

異色異形。下咽便能殞命。烏白首元。鳥元首白。舉已

即爾腐腸。心損心而肝損肝。腦滑精而血敗。血或死

緣瘡痂。或身戴龍形。或心肝有孔。而著草飲飛。或落

水不浮。而久烹不爛。是皆發毒生癘。係生當戒。至若

脯沾屋漏。犬有懸蹄。牛羊身黑而白頭。鹽醋久醃。而

不變。黑斑昂首。四目無腮。縵中之刀。獨目腹文。頭
伸足赤。鱉類之鴟。夜照身浮水面者。其鱗決從蛇
化。腹毛獨目足斑者。此蟹必令人亡。肉中若有米星。
日晒久難乾燥。烹既爛而水如初。殺已久而血不斷。
經宵方煮。着塵不沾。獬犬馬肝。餒魚敗肉。尤宜慎之。
庶免傷殘。若夫。毒性設傷。良方宜急。豆豉頭垢。能消
六畜之幾危。犬豆豉湯。可治箭傷之肉毒。杏仁糜狗
甘草化羊。牛馬生疔。甘菊澤蘭服解。過傷肉食。芫荽
韭汁嘗消。人乳制獨肝之牛。猪骨化馬肝之毒。螃蚶
遇蒜汁紫蘇。而害弭。河豚得橄欖。荆芥而毒消。馬肉
病者美酒蘆根。猪肉病者朴
硝韭汁。此特大端。尚俟縷舉。

救急方告示

廖公鴻苞時署揚州府事。為勸民切
勿輕生。並抄錄救急諸方。出示曉諭。以

全身命事。照得人情莫不貪生。萬物皆知畏死。即或
命當夭折。猶須造福延年。而況時際昇平。何致輕
生短見。本署府莅任此邦。披閱各屬詳報。自盡人命
案件。無日不有。原其拚命之由。非難恕之情。率皆

由於口角微嫌。錢債細故。或繫絲繩而自縊。命懸三尺紅綃。或取砒毒以潛吞。氣絕一杯毒水。甚至抹頸不顧。抱痛楚於泉臺。投水如歸。委形骸於溝壑。此皆孽由自作。與人無尤。惟思德在。好生於心。何忍所願各愛其性命。切勿輕視夫身家。與其橫死以貽羞。莫若忍虧而無事。倘遇蚩氓無識。忿戕生。尤貴急救。勿遲。挽回有術。是用遍搜舊帙。慎簡良方。事甚便。而可行。簡頗廉。而不費。樂善者常破囊而濟世。無力者第依法以活人。何須妙藥千金。方足回生而起死。即此救人一命。已堪排難而解紛。願紳已廣種福田。體上天之陰陽。俾黎庶咸登壽域。樂盛世之龐洪。各宜祇遵。勿辜厚望。特示。道光十五年孟夏刊送。

心藥

慈悲度世方

孚佑帝君此書

勤人宜服八藥

孝弟

二味。甘。極和緩。

補骨內。健手足。培
養根。本。充足。先天。

信義

二味。辛。直。而。不。曲。者。信。能
通。肺。腑。實。腸。胃。正。心。壯。氣。

服之。始
終。劃。一。

讀書

味。苦。有。回。甘。能。通。心。竅。利。眼
目。益。聰。明。強。胸。腹。去。鄙。俗。

教子

味。苦。亦。有。回。甘。能。滌。污。去。邪。
旺。血。脈。馨。香。悠。久。者。最。良。

積善

味。甘。能。寬。中。除
惡。氣。去。心。腹。毒。

多。服。延。年。其。益。不。後。不
拘。大。小。愈。多。愈。有。功。效。

知命

味。淡。能。定。心。去。躁。妄
息。無。根。火。靖。魂。魄。甘。

眠。食。安。此。八。藥。者。治。病。之。良。劑。也。世。人。不。可。不。服。故

勸之。戒人宜忌八藥

淫

味。雖。甘。有。大。毒。能。走。損
精。神。瘦。肌。肉。喪。魂。魄。多。

服。必。死。出。之。不。正。者
尤。忌。服。之。其。患。莫。延。

任性

味。烈。大。熱。能。升。火。動。氣
令。人。增。躁。怒。若。無。溫。和。

平。緩之。藥制。之。必致發狂。貪。味似甘。實苦。能昏神。惑智。令人迷。

殺。味辣。有大毒。能傷元氣。促壽命。求補。反削。心。富貴人喜多服。服必有大損。其損亦在後。

術。味鹹。有暗毒。令人心腹生熱。狀如蜈蚣。或如蟻。從暗中飛出。螫人射人。人苟中之。不禱。則傷。故不可近。

口罪。味酸。中之有聲。其毒在聲。能令人舌強。齒利。喜中傷人。多服。賈禍。刀筆。味

有小毒。有大毒。能黑心肝。壞臟腑。胸中有物。利如芒。及唾而出之。必傷人。終歸害已。爭訟。味

苦。能損心神。苦皮肉。生疼痛。益憤憊。飽暖變飢寒。亦有致死。者。此八藥者。傷人之

醜毒也。世人不可不忌。故戒之。信心

象髓丸。取昆損。願。三卦為用。思不出其位。養心。為君。懣忿。養。室

慾。養。慎言語。養。肺。節飲食。養。脾。四。服法。用毛穎。

故濡墨為圖。一有合與。圈一白。一或悖與。圈一黑。朝

斯夕。斯有日。改月化。而歲不同者。張敬堂曰。是方散見義經。一言一。

合之。君臣之義備焉。雖藥不標於神農。方非處於和。而觀象玩辭。信金石之神品。得醫師之上乘者也。

通性命之學者。能近取諸身。服之無致。則五內和平。百病不作。身安德茂。去道豈遠哉。正修齊治錄。

真人養臟膏

見洞神經。

寵辱不驚。

肝木自平。

動靜以敬。

心火自定。

飲食有節。

脾土不泄。

調息寡言。

肺金自全。

恬淡無欲。

腎水

自足。上藥五味。用太和元氣醞釀成膏。久服輕身延

年。是方昂鷲調和坎離既濟。其得力處。以無欲為宗。以主敬為本。范子心箴曰。天君泰然。百體從令。前

賢詩曰。自身有病。自心知。心病仍將心藥醫。心境靜時。身亦靜。心生還是病生時。敏軒筆記。

大字金丹

太乙真人垂訓。

忍。

忍耐忍耐。逍遙自在。若不忍耐。必遭禍害。

方便。

方便。

方便到處相勸。彼此互行。天下皆善。

依本分。

本分本分。衣祿前定。強取強求。破家害命。

右三味合煉成丹。常服保合太和滋培元氣。

真人曰。子有經

三部。只六字。三經不在大藏。只在靈臺。傳家寶。

長生飲

靜坐。

或止觀。或納息。隨便行之。

東坡云。無事此

靜坐。一日似兩日。若過七十年。便是百四十。入世何物能有此效。此方人人做得。若無好湯。使多嚙不下。

詩林。廣記。

延齡丸

治一切虛弱勞傷。吐血痰喘等症。

獨睡。

須要靜樂。切忌思擾。

一味久

服精神康健。却病延年。

昔包恢年八十八。以樞密拜登精神老健。費似道意。其必

有攝養奇術。問之。恢曰。某有一服九子藥。乃不傳秘方。似道堅叩之。恢徐曰。全靠吃了。五十年。獨睡在滿座大笑。醒世良方。

富貴湯

無事。以常貴。

早寢。以常富。

安步。以常車。

晚食。

以常肉。

和勻。夏日水。冬日湯。隨意飲啖。暢快無比。

此戰

國時。頗氏。處窮方也。常服。永無失榮之症。鷓林玉露。

保生無憂散

除煩惱。

斷妄想。

洒掃靜室。窓楞虛。

朗前列小檻。栽花種竹。貯水養魚。室中設几榻蒲團。

跏趺調息。將前藥用。清靜湯調服。

至三炷香。倦則啜苦茗。就枕偃息。自

覺神氣爽泰。不知人間有煩惱。不見我心有妄想。霞外雜俎。

銘心快活飲

治一切憂愁思慮不安。及願欲不遂等症。

知足

時刻存想此字。能除一切

志念。

常樂

時刻存想此字。能除一切煩惱。

用清淨湯調服

世人福壽榮華。

但是前生修積。豈由思慮可得。但不飢不寒。無災無病。即是現享大福。知足常樂四字。乃銘心法也。醒世良方。

六味明目飲

治勞神過度。目暗不明。

損讀書

減思慮

專內

視

簡外緣

旦晚起

夜早眠

六味熬以神火

下以氣。然後納諸方寸。

閉目養神。去驚。習靜。修之一時。近能數其睫。遠視尺

裡之餘。長服不已。洞見牆壁之外。非但明目。兼可延年。○白拂齋記

祛邪養正丹

專治一切不正之病。

老實頭

一個。

好肚腸

一條。

慈

悲心。一大片。

信行。

孝順。各十分。

道理。五分。

本分。三錢。

忠真。一瞠。

忍耐。三分。

溫柔。四兩。

陰鷲。全用。

方便。不拘。

用寬。多。

鍋炒。不可焦燥，去火性。

以波羅蜜為丸如菩提。

子大不拘時候和氣湯送下。

切忌六般發物暗中箭笑裡刀心頭火草內井。

兩頭舌平地風波。凡智慧信受者身心安樂福壽延長。陳無際大師方。

和氣湯

治一切客氣怒氣怨氣抑鬱不平之氣。

先下一忍字。

繼下一

忘字。

用不語唾送下更飲醇酒數杯使醺然半酣。

尤妙。

張公藝九世同居得力在一忍字若到忘字地位則丹成九轉矣。岩栖幽事。

無比逍遙散

治倫理難醫之症。

忍耐。

糊塗。

聾盲。各一箇。

正經三分。癡呆七分。和勻。用感化湯下。如未愈。再加。

逍遙一味服之。呂新吾曰。心不必太分。曉陳眉公曰。留三分正經以度生。七分痴呆以防

死。醫倫理之要藥也。韋弦佩。

四妙誠實湯。治遇事輕易。言語粗率。熟思。審處。守口。防

意。遇難事大事。將四味用。不語津。細細咀嚙。至胸

膈中。又要溫養多時。方可出。而應事。薛文清公曰。應

處。熟思則得其情。審處則得其常。富鄭公曰。守口。如

瓶。防意如城。從古聖賢。都用這箇方得效。清寤齋

處世咸宜方。和血脉。悅顏謙。味苦而甘。能和讓。味

色。大有補益。諸脉益身心。

而苦。回甘。

自卑。味苦辣。而北。大補骨髓。

加隨俗子。中心堅者。有大毒。必

以金剛子濃汁製之方可。良方

歡喜錠子

治心高氣傲。惹人憎嫌。起人怨恨等症。

和顏。謙下。婉言。

三味和勻作錠。佩服紳帶間。能令到處歡喜。諸人

和美。且消許多煩惱。真奇方也。醒世良方

真率三養湯

蘇東坡在黃州。早晚不過一爵一肉。有尊客盛饌。則三之。

寬胃。以養氣。

安分。以養福。

省費。以養財。

用慈悲。甘露飲。和之日

再服。此方簡易可珍。

司馬溫公為真率會。東坡做其意。高忠獻公家訓曰。少殺生命。

最可養心。最可惜福。一般皮肉。一般痛苦。但不能言耳。宴客勿多餽品。兼用素菜。切切為生命。莫計省殺。

一命於吾心有無限安處積此仁心
慈念自有無限妙處。敏軒筆記

種子方

曰四省文宗。茲有構隙者。夜將紙。改作一代

人物四字。笑其五十無子也。公憤訴郡守。守曰。曷早

為種子計。使鳳毛麟趾。振振一堂。請者自愧。公曰。吾

留心房術已久。卒無效。守曰。悞矣。房術不如心術。種

子必先種德。方今歲稔。正天假之緣也。乃列數事。題

曰。種子方。一。貧民踐履。而數以下代完。二。小犯追贖

贖罪。三。兩以下代納。三。各城門設廠施粥。四。姻黨朋

友。貧乏者。量親疎厚薄。不時餽遺。五。村落貧民。求乞

者。多給錢米。六。延名醫。施藥療疫。七。掩田野遺骸。八。

造橋修路。九。置義田。瞻族。十。立義學。養蒙。公欣

然拜謝。次第舉行。連生三子。皆登第。公猶及見

金匱子業於其父。女曰四也。

西華。自第。大前。西。公。子。門。公。聖。公。公。

戒洋煙

附

仙傳戒鴉片煙方

昔有一孝子嗜鴉片自悔專心戒吸凡壇求仙示方

石蓮子

貫眾

各三錢

藿香

製附子

丹皮

各錢半

防已

一錢

加黑沙糖

五錢

水煎服十劑之後即照前分兩十倍

共為細末

合丸開水吞服後或腹瀉肢體委頓無妨蓋必

除盡臟腑之毒始能復元慎毋信心不堅仍犯前戒

也

良方集驗口高味卿抄寫傳人屢試屢驗

戒煙神方

善戒鴉片烟毒

石蓮肉

貫眾

各三錢

白當歸

附子

藿香

各錢半

漢防已

一錢

加紅糖

五錢

水煎引

前服服至四五劑後則泄瀉再服至十劑自然不喜

喫烟如服十劑後仍不能斷即照此方分兩十劑料合丸

引來時用滾水吞三四錢永福堂刊送。劉湄沈子翔云此方試驗切勿輕視

如聖保安丹每引一分者開水吞一九一錢者吞十九輕則減重則加日減一九至減盡而止

肉桂製附子各五錢研細末淨烟膏即鴉片膏三錢寧坤丸

蘓合香丸各四丸和勻入後藥白荳蔻母丁香石蓮

子防已藿香丹皮貫眾各三錢為細末加

紅糖五錢開水和勻不可太濕丸如桐子大以硃砂為衣陰

乾忌日晒良方彙編。寶山李仙根云此方極效近日店家合此稱為秘方

固本保元丹 立戒鴉片不論烟引大小年分遠近皆效 上洋復 上南肉

桂 木香 白麝 砂仁 法半夏 各一錢 茯苓 半錢

川貝 二錢 沉香 半錢 牛黃 七分 研細末加洋煙

膏二錢半 要烟灰重熬更妙 製南星二錢半為丸如菜豆大

硃砂為衣 每引五六分者服十五粒仍吸烟三分或二分半若引大以次遞加服至二十日便可去烟祇吞丸藥以下三日減一粒減盡即斷矣

補元安神湯 斷烟後祇吞丸藥如夜不寐者接服此方 熟地 五錢 黨參 三錢

米炒 冬朮 土炒 枣仁 炒黑 茯神 各二錢 菟絲餅

當歸 各錢半 陳皮 半夏 各一錢 遠志肉 七分 鹽 水炒

五味子

分四

硃砂

四分作兩
次冲服

水煎服

服至能寐為
度。必效方

代洋煙膏

戒烟後念念不忘
微吸者以此代之

元參

生地

白歸

胡黃連

各一兩

地骨皮

二兩

金針菜

四兩

肉蓯蓉

東洋參

桔梗

各五錢

黃芩

六錢

水煎三次去滓再

煎至成膏

入金櫻膏白蜜各一兩再煎如烟狀止大
用次洋烟筒如烟而吸。華亭金雲淞傳

救吃生洋烟方

急以生羊血或鴨血灌之。一方生甘草胆
汁或飯瓜蒂汁灌之。一法膽凡

凡各三錢研末入碗內又白蜜四兩開水燉化與藥
攪勻令一人把置懷中盤膝而坐令一人用牙著搗

開灌之另令一人用手於胸前抹之須臾吐即能
回生忌三日茶水。高杏庄抄送方。汪廣疴以釀

醋温熱入沙糖灌下探吐如不醒須七晝夜毒始解
去心頭微温總可望生務于八九日上入水為要

鴉片有四損勸人勿食論

沈子翔曰。夫鴉片之盛行於世也。一綠老年疾疴。一

綠少年縱慾。或因賭邪。或為公務。始云自有把握。繼

云驗假可停。孰知逢場作戲。已經弄假成真。獨不思

鴉片烟者。夷人用以蠱人也。此土曰。蝮蝗蠱。又名血

膏土。道中華稱芙蓉膏。即本草逢原載阿芙蓉者。即

此物也。究其修合之由。咸知以嬰粟造成。殊不知又

有蝮蝗。砒霜。火硝。石灰。死人血肉汁。及諸毒藥。鑲成

其土。此非余之謬言。蓋嬰粟但能斂精。何以有如此

之利害乎。惟蝮蝗能追筋透骨。驗到則骨節難忍。死

人血肉汁。能攝神戀魄。不吸則思想無窮。硝以引火。

砒以助陽。石灰則香燥。花辦則聚膏。試如砒得酒則

殞命。蛭得鹽則化漿。此製烟之料。非由斯而驗乎。第

吸之者。用以火化。則其性不致霎時而烈。取其由漸

而來。人易傳染。不知不覺。自淺入深。一至形質漸消。

毒氣現面。已難復脫矣。蓋其損有四。一曰損精。凡瀆

精提陽。惟烟為最。不知助火。所以耗精。非所以瀆精。

蓋縱慾則因烟。而精可瀆。逾時則無烟。而精自泄。至

於日久驗深。精由火耗。陽氣日瘵。精液日涸。即欲求
 子而不能。不亦危乎。二曰損氣。凡人晝則行陽。而日
 起。夜則行陰。而安眠。人為小天。陰陽詎可相悖。至一
 吸。烟則陽氣上。越而夜不眠。陰氣下陷。而晝不起。失
 烟。則淚流涕出。便痢如注。腰間如雞啄。腹中如針刺。
 即云。得烟可愈。自此陰陽日悖。正氣日亡。元氣日脫。
 不亦難乎。三曰損神。內經云。得神者昌。失神者亡。凡
 人夜吸烟。則通宵不寐。乃內神失散也。日久則外之
 元神亦失。故始焉面漸青。繼焉青漸黑。俾晝作夜。神
 志昏迷。百骸盡廢。非由此而來乎。四曰損血。凡人一
 身以血為養。一吸烟。則陽痿而面青。血虧也。痢見而
 面黑。血枯也。久則肩聳背灣。形如龜贅。血盡也。血盡
 則肺枯。生虫。漸至勞瘵。命在須臾。即時不吸烟。亦
 不過苟延旦夕而已。有此四損。或家業與烟氣俱銷。亦
 爨火幾虛。典貨亦盡。隣朋親族。誰復憐之。四路亦由
 之而斷焉。斯時即欲回頭。其可及乎。惟願人之未吸
 者。早發猛省。已吸者。急服戒方。斯得免後來之苦况。
 亦且享無窮之福壽也夫。上海隱名氏捐資補刊