

外臺祕要

S25-4

1474

1部

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷目錄

癰疽方

癰疽方一十四首

癰腫方二十五首

石癰方五首

癰癰方一十四首

附骨疽方八首

癰疽方一十六首

緩疽方四首

發背方四首

又按今有方三十九首

癰疽發背雜療方二十六首

尚德按
疽字下
疑脫方
字

尚德按
癰癰疑
當作癰
癰

尚德按
四首疑
當作四
十一首



唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

新安後學程衍道敬通父訂梓

癰疽方一十四首

集驗癰疽論黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯荅曰榮衛稽留於經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之從之而不通壅遏不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚於骨髓骨髓不為焦枯五藏不為傷故命曰癰黃帝曰何謂疽岐伯荅曰熱氣純盛下陷肌



膚筋髓骨肉內連五藏血氣竭盡當其癰下筋骨良肉終
無餘故命曰疽疽者其上皮夭瘵以堅亦如牛領之皮癰
者其上皮薄以澤此其候黃帝曰善

出太素第十六卷中

經言五藏不調致疽六腑不和生癰一日燔疽急者二三
日殺人緩者十餘日殺人二日癰疽急者十餘日殺人緩
者一月死三日緩疽急者一年殺人緩者數年四日水疽
所發多在手足數年猶可療疽者數十種要如此于氏法
癰之疾所發緩地不殺人所發若在險地宜令卽外消若
至小膿猶可療大膿致禍矣

一爲腦尸

二爲舌本

三爲玄癰

四爲喉節

五為胡脉 六為五藏俞 七為五藏繫

八為兩乳 九為心鳩尾 十為兩手魚

十一為腸屈之間 十二為小道之後 十三為九孔

十四為兩膈腸 十五為神主之舍 一本云主容之舍

凡十五處不可傷而況於癰乎若癰發此地遇良醫能

不及大膿者可救至大膿害及矣 范汪同

候賊風證但夜痛應骨不可按抑不得迴轉痛處不壯熱

體亦不乍寒乍熱但覺體疹疹然冷欲得熱熱慰痛處即

小寬時有汗此是賊風證也宜即得針灸服療風藥温也

方在療風候上大方法

宜知二候如此也

通按 瘰癧一 本作索 索 尚德安 慰疑當 作發



又初得附骨疽卽服漏蘆湯下之傅小豆薄得消也

又下利已瘧處未消者可除大黃用生地黄及乾地黄

時之熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黃餘熱

本清可傅升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散如

瘰癧法又...天喜著四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯

熱其發於...至踝赤如編繩謂之漏病也

又其發於...下起至掌也皆由四肢勞熱氣盛爲

涼濕所積...筋中成此疾也不卽療取消潰去膿則筋

孳縮也其若但置不消復不潰其熱歇氣不散喜變作漏

也



又療之宜服漏蘆湯令下外以鋒針針去血氣針瀉上結
脉處傅小豆薄則消也皆可依療丹法消之及潰成膿出
火針傅膏散如療癰法也

又亦用苴蕉根薄之差

又癰發腫高者病源淺腫下者病源深大熱者易療小熱
者難療初便大痛傷肌晚乃大痛傷骨都堅者未有膿半
堅半軟者有膿發腫都軟血痛也非癰發腫以漸知長引
日月亦不大熱時時牽痛癰也非癰吳音曰謂諸氣結亦
有腫久久不消成癰療之宜散氣氣已散若初腫處有浮
氣年衰皆發癰療之宜及年盛竝折散熱可無此憂

于氏法夫癰疽脉洪麤難療脉微濇者易療諸浮數之脉
應當發熱而反惡寒者癰也此或附骨以有膿也

趙乃言無虛勞腹中疾或發血瘤瘡瘡狀墳起頭墨
置不當灸療療之火熨便焦爛剝刮去焦痴則血泄不可
禁必死癰起於節解遇頑醫不能即消令至大膿者豈膏
藥可得復生乎

又發癰堅如石走皮中無根療癰也久不消因得他熱之
疾時有發為癰也

又發癰至堅而有根者名為石癰療之法當服酒非酒即
藥勢不宜但當稍飲取令相得和散便止凡癰腫有肥



加貼宜柘椶根和平體宜赤小豆貼方

又發以赤小豆五合內苦酒中熬之畢搗為散以苦酒

之塗拭紙上貼腫從發腫兩頭以下

范汪同

又論少小有渴年四十以外多發癰疽有膈痰而渴者每

盛必作黃疽年衰必發癰疽也

范汪同

又黃帝曰願聞癰疽之形與其期日岐伯曰略說癰疽之

極者十八種

又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化為膿膿不寫塞

咽半日死其化膿者寫已則含豕膏無冷食三日而已一

去無食



通發
 於股
 肅重
 雁
 作發
 於
 股脛
 名
 曰股
 脛
 疽
 尚德
 極
 重
 極
 改
 管
 作
 敗
 此
 連
 作

外臺秘要

又發於股脛名曰股脫疽其狀不甚變而癰腫膿搏骨不

急療三十日死

髀內曰股脛外曰髀膝上股下骨稱曰股脛也

又發於脇名曰改訾改訾者女子之疾也久之其狀

大癰

膿其中乃有生肉大如赤小豆療之方

剉連翹草及根各一升以水一斗六升煮令竭取二

升卽強飲厚衣坐釜上令汗出至足已

又發於尻者名曰銳疽其狀赤堅大急療之不療三十日

死

又發於脛者名曰兔囓其狀赤至骨急療之不療害人

又發於足上下者名曰四淫其狀大如癰不急療百日死



此至服
疑脫
以

又發於肩及臑者名曰疵疽其狀赤黑急療之此令人瘠

出至足不害五藏癰發四五日逆熇之

尚德按逆靈樞作逆

上灸百壯石子當碎出也不出可益壯

從癰發高下范汪疏同

又石癰者始發皮核相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸

自歇便堅如石故謂之石癰難消又不可得自熟縱愈皆

百餘日也又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非

癰也發癰狀如虻雖極大此肉瘤非癰也腫一寸至三寸

癰也三寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺

名曰竟體疽腫成膿九孔皆出諸氣憤鬱不遂志欲者多

發此疾癰及疽血瘤鼠乳石癰結筋瘤癰皆不可就針角



針角少不及禍者

凡癰疽之疾未見膿易療之當上灸三百壯四邊間灸

各二百壯實者可下之虛者可補之有氣者下其氣膿占

斯內塞散得愈絕房三年凡癰瘡審知膿者破之皆當近

下邊膿出後當膏藥兌之常使開潤勿令燥合也若其人

羸勿一頓盡膿徐徐令後稍出乃盡癰方潰其上皮薄人

喜當上破之此終不愈當下破之乃得膿耳勿要其皮厚

也凡癰有膿當破無膿但氣腫若有血慎不可破針灸也

按之四邊堅中軟此爲有膿瀦也一邊軟亦有膿都堅者此

爲菹核或但有氣也都軟者此爲有血血瘤也當審堅軟

疔實為要若堅疽積久後若更變熟偏有軟處不可破者

疔當暖裹置耳若灸刺破療必暴劇不可救及結筋腫

肉鼠乳皆不當療也又服內塞散不與他療相害晝夜

十餘度服散當以酒

又發於腋下堅赤者名曰米疽療之用硃石欲細而長踈

啓之塗以豕膏六日已勿裹其癰堅而不潰者為馬刀挾

纓急療之

太素經曰頸前已纓

尚德按已纓疑當作疔曰纓

又發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之內不

可療一云六十日死

又發於膝者名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱如堅石勿

尚德按 疔靈樞

尚德按 弛靈樞 作施



作癰

外臺秘要

石石之死須其柔色異乃石之者生

破冷石熨之柔乃破之準例之也

又諸癰腫之發於節而相應者不可療

太素經云膈門故不可療也

又發於陽者百日死

丈夫陽器曰陽婦人陰器曰陰

又發於陰者三十日死

丈夫陽器曰陽婦人陰器曰陰

又發於踝者名曰走緩其狀肉色不變數石其輸而止其

寒熱不死

又發於足傍者名曰厲疽其狀不大初從小指發急療之

去其黑者不消輒益不療百日死

云足側也

尚德按疽靈樞作癰

又發於胷者名曰背疽狀如大豆三四日起不早療下入

腹入腹不療十日死

太素經云寒熱不去十日早死

又按背疽靈樞作井

如初從靈樞作初

是按



發於膚

靈樞作

於膺舌

疔作其

尚德按

項曰之

行曰字疑

尚德按

千金

疔背

又發於足指者名曰脫疽其狀赤黑死不療不赤黑可

療不衰急斬去之得活不去者死

尚德按 靈樞作癰疽

又發於膚者名曰舌疽其狀如穀實瓜萋常苦寒熱急療

之去其寒熱不療十歲死死後出膿

又發於頸者名曰天疽其狀大而赤黑不急療則熱氣下

入淵腋前傷任脉內熏肝肺十餘日死

太素經曰項日前曰頸

一云

發頭

以前十八種並

又按並字下

疑有脫字

千金論曰夫癰疽初發人皆不以爲急此實竒患唯宜速

療若療不速病成難救以此致禍者不一發皆外皮薄爲

癰皮厚爲疽宜急治之夫癰壞後有惡肉者以豬蹄湯洗



外科

去穢次傳食肉膏散惡肉盡傅生肉膏散及摩四邊令善
肉速生當斷絕房室慎風冷勞煩待筋脉平復乃可任意
耳不爾新肉易傷傷則重潰發發則禍至慎之慎之
凡癰疽始發或似小癰或復大痛或復小痛或發如米糝
大白膿子此皆微候宜善察之見有少異即須大驚忙須
急治之及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥即灸當
頭百壯其大重者灸四面及頭上二三百壯壯數不慮多
也復薄冷藥貼膏種種救療必差也

又其用藥貼法皆須當瘡中處開孔口令洩瘡熱氣出亦
當頭以大針針入四分即差

尚德按
大千金



高德按
千金云
便住藥
以謂無
效即福
至矣

尚德按
蜂千金
作蜂

身中忽有痛處似打狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住
作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬受濕風至春發寒
風來折之不成溫病乃作氣痛也又宜先服五香連翹湯
摩丹參膏又以白酒煮楊柳皮及煖熨之有赤氣點點刺
出血也其連翹湯可服數劑及竹瀝湯勿以一劑未効便
謂即止遂不服耳中間將白薇散佳

素問曰寒氣客於經絡血凝滲澀不行擁結為癰疽也不
言熱之作也其後成癰又陽氣湊集寒化為熱熱盛則肉
腐為膿也又以酢和蜂蛤灰塗之乾即易差即止
凡腫根廣一寸以下名癰一寸以上名小癰如豆粒大者



高德按
此方今
見千金
翼青小
豆作小
豆無甘
草

名胞子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取差止

第十三卷中

廣濟療癰疽排膿散方

黃耆

十分膿多倍

青小豆

一分熱口乾倍

芎藭

三分肉不生倍

芍藥

三分痛不止倍

白斂

三分有膿不合倍

栝樓

三分若渴小便利倍

甘草

三分炙

右七味爲散酒服方寸匕日三服不利忌海藻菘菜熱

麩魚蒜等

千金同一方無白斂甘草

又療發癰疽排膿散方

人參

二兩

當歸

二兩

桂心

二兩

芎藭

一兩



厚朴 一兩 炙

甘草 一兩 炙

防風 二兩

白芷 二兩

桔梗 一兩

右九味擣篩為散以酒服方寸匕日二服不利若

合常服之忌生冷菘菜海藻生葱蒜 並出第五卷中

劉涓子療癰疽先宜傅大黃食肉膏方在發背部千金方

食惡肉散後用大黃附子等十物者乃是次兌膏方

當歸

芎藭

白芷

各二兩

烏頭

一兩

巴豆

二十枚 去皮

松脂

二兩

猪肪

二分

右七味㕮咀內膏中微火合煎三沸已內松脂攪令相

得以綿布絞去滓以膏著綿絮兌頭大瘡雖深兌之膿



自出就兌盡卽生善肉瘡淺者不足兌著瘡中日三
肉盡卽止

又療癰疽發壞出血生肉黃耆膏方

黃耆 一兩

芍藥 一兩

當歸 一兩

大黃

芎藭

獨活

白芷

薤白

生地黄 各一兩

右九味切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傳兌

瘡中摩左右日三

文仲同並出第四卷中

又療癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆

細辛

生地黄

蜀椒



當歸

芍藥

薤白

白芷

芎藭

丹參

猪膏

甘草

各一兩

一升半臘月者

菴蓉

獨活

黃芩

各一兩

右十五味以苦酒一升二合夏月漬一宿冬月二宿

火煎三沸煮酒氣盡成傳之

又療癰疽始作便壞熱毒發瘡膏方

羊髓

一兩

甘草

二兩

胡粉

五分一法五兩

大黃

一兩

猪膏

二升

右五味切合膏髓煎二味烱內甘草大黃三上三下絞

去滓內胡粉絞令調和傳瘡上日五度



又療癰疽已潰白芷摩膏方

白芷

甘草 各二分

烏頭

三分

薤白

十挺

青竹筴

雞子大一枚

右五味切以猪膏一升合煎白芷黃膏成絞去滓塗瘡

四邊勿著瘡中

並出第五卷中

深師內塞散療癰疽潰漏血脉空竭方

黃耆

細辛

芍藥

薏苡人

白芷

瞿麥 各二兩

赤小豆

七兩

乾地黄

人參

防風 各二兩

右十味切先以新成白苦酒置新器中內赤小豆須臾



出銅器中熬令燥復須內苦酒中更熬凡五反止合搗
為散酒服方寸匕日夜六七過腹痛甚倍芍藥口未閉
倍薏苡人膿多倍黃耆

出第二十八卷中

刪繁療癰疽等毒潰爛猪蹄洗湯方

猪蹄

一具治如食法

薔薇根

一斤

甘草

五兩炙

芍藥

五兩

白芷

五兩

右五味切以水二斗煮猪蹄取八升去滓下諸藥煮取

四升稍稍洗瘡

出第九卷中

千金翼黃帝問曰有疽死者柰何歧伯曰身有五部伏菟

一臑二

一臑一臑

背三五藏之膂四項五五部有疽死也

刪繁同本



出靈樞

又王不留行散主癰疽及諸雜腫潰皆服之亦療癰腫不潰苦困無賴方

野葛皮半

五色龍骨五

王不留行子

二升千金方

桂心一兩

當歸二兩

乾薑一兩

栝樓末六

合

尚德按
千金翼
野葛皮
一兩龍
骨二兩
云階濟
關黎所
名神散

右七味為散食訖溫酒服方寸七日三以四肢習習為度不知漸漸加之此浩仲堪方隨日濟閣黎施行實為神散癰腫即消此方妙千金同出第十四卷中

癰腫方二十五首

集驗療癰腫大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處



陷不復者無膿按之卽復者有膿若當上破者膿出不盡
不盡稍深蝕骨骨碎出當以魚導側際從下頭破令膿
盡出盡則骨生愈矣若惡肉不盡者食惡肉藥去之膏
之卽愈食肉藥方

取白荻灰水淋之煎令如膏此不宜預作作之十日
則歛并可以去黑子黑子藥注便卽拭去不時拭則
傷膚又一方以桑皮灰亦妙

凡破諸病肉厚處當先廣封四面不爾瘡披裂氣泄便死
不可救也

以前范汪同

有久癰餘瘡爲敗癰深疽有脛間喜生

瘡中外惡瘡霜寒凍不差經年或骨疽亦名脛瘡深爛青



黑四邊堅強中央膿血惡汁出百藥療不差汁漬好肉處
皆腫亦有碎骨從中出者可溫赤龍皮湯洗之夏月
洗之冬日三日四日一洗潰肉多者可時傳白藺茹散
去之可一日之中三四傳之止後長傳家猪屎散得差也

取猪矢燒作灰下絹篩以粉疽敗瘡中令滿汁出脫
去便傳之長傳須差也若更生青肉復著白藺茹微

如前法也 出第八卷中

千金翼凡五子日夜半 五丑日雞鳴 五寅日平旦

五卯日日出 五辰日食時 五巳日禺中

五午日日中 五未日日昃 五申日脯時

五酉日日入 五戌日黃昏 五亥日人定

右以此日時遇疾發者皆不起也

出第二十三卷中

廣濟療癰腫潰內服藥外宜貼膏方

松脂 一斤 鍊者

脛脂 三合 生

椒葉 一兩

白蠟 三兩

蛇銜 一兩

黃耆 一兩

芎藭 一兩

白芷 一兩

當歸 一兩

細辛 一兩

芍藥 一兩

右十一味切以水先煎脂蠟烊盡內諸藥三上三下白

芷色黃膏成用剪故帛可瘡大小塗膏貼上日夜各一

又療癰腫膿潰瘡中有紫肉硬不消以此散兌頭內蝕之

方



石硫黃 一分 研

馬齒礬石 二分 熬 令汁盡

漆頭蔞茹 二分

麝香 二分 研

雄黃 二分

雌黃 一分 研

白礬 二分 熬 汁盡

丹砂 二分 研

右八味擣篩爲散攪令調熟以傅瘡中瘡惡肉上貼膏

日二易 千金并翼深師同並出第三十卷中

劉涓子療癰腫方

白歛 烏頭炮 黃芩 各等分

右三味擣下篩和雞子白傅上卽愈 出第十卷

療癰腫有熱黃耆貼方數用神驗

甘草 炙 大黃 白歛 黃耆



芎藭

右五味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上
熱有堅處大小貼之燥易甚効

癰瘡癰腫白歛薄貼方

白歛

當歸

芍藥

大黃

莽草

芎藭

右六味各等分擣篩下雞子黃和如泥塗布隨大小貼
之燥易

又癰癰腫堅核不消白歛貼之方

白歛

大黃

赤石脂

芍藥



莽草

黃芩

黃連

茱萸

右八味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上

大小貼之燥易

又療癰腫黃耆貼之方

腫一按作疽

黃耆 一兩半

黃芩 一兩

芎藭 一兩

黃連

白芷

芍藥 各二兩

當歸 一兩半

右七味擣篩以雞子白和如膏諸暴腫起處以塗著布

上已貼燥易腫處不覺貼冷便愈熱勢毒者加白歛一

兩尤佳

又療癰腫黃耆貼方



黃耆 大黃 白芷 牡蠣 熬

白欬

右五味各等分搗篩和雞子貼燥易

又療癰腫已潰四物黃連薄貼方

黃連 黃蘗 地榆 白芷 各二兩

右藥搗篩雞子白和塗布薄癰上對瘡口穿布出癰氣

令疎氣

又療癰腫一物栝樓薄貼方

以栝樓根隨多少止一物切五片內苦酒中熬燥搗

篩之苦酒和塗紙上以貼癰腫上服散人宜用 並出



第九卷中

千金療癰腫松脂貼方

當歸

黃耆

黃連

芍藥

蠟

黃芩

芎藭

大黃

各兩
細切

松脂 一斤

臘脂 一斤

右十味切以微火煎之三上三下綿布絞去滓向火炙

塗生牋紙上隨大小貼之一日三度易之即差

又療腫瘰癧散方

疾藜子 一升熬
令黃

右一味擣篩以麻油和之如泥炒令焦黑以塗故布上



兩德按
千金四
味各三
分
又按千
金乾即
易之

剪如腫大勿開頭拈上無蒺藜子用小豆和雞子如餡
乾則易之甚妙

又搯湯方

大黃

黃芩

白斂

各三兩

芒消

六分

右四味以水六升煮取三升以故帛四重內汁中以搯
腫上煖復易晝夜爲之

翼同

又癰腫痛煩困方

以生楸葉十重貼之以布綿裹緩急得所日二易止

痛消腫食膿血良無比勝於衆貼冬以先收乾者臨

時鹽湯沃潤用之亦可薄削上皮用之

備急張文仲肘後同



尚德按
千金翼
黃耆以
下五味
各三兩
芍藥黃
芩各一
兩

又諸癰腫牢堅諸藥不療方

削附子如碁子厚一指正著腫上以少唾濕附子

炙附子令熱徹附子欲乾輒令更唾濕之常令附子

熱氣入腫中無不愈者此法絕妙並出第二十三卷中

千金翼黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方

黃耆

升麻

栝樓

乾地黃

各二兩

麥門冬

去心

芍藥

各二兩

黃芩

一兩半

梔子

二十枚擘

右八味切以水一斗煮取三升分三服

劉涪子用升麻一兩梔子十四

枚餘藥同

又白歛薄貼主癰腫方



白斂

大黃

黃芩

各等分

右三味擣篩和雞子白如泥塗布上薄貼腫上乾則易

之可以三指撮藥末內三升水中煮三沸綿注汁拭腫

上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆之乾則易

一易輒以煮汁拭之日夜三十度

劉涓子同

又療癰腫方

伏龍肝以大酢和作泥塗布上貼之乾則易之消矣

又凡腫已潰未潰者方

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上

開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未

子金翼
馮德按



無還合
二字

尚德按
千金翼
煮取三

外臺秘製

有膿者腫當自消矣

又方

燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差為度至良

又溫中湯主癰腫取冷過多寒中下利食完出方

甘草 炙

乾薑

附子

各六分炮

蜀椒

二百四十枚汗

右四味切以水六升煮取三升分三服忌海藻菘菜猪

肉冷水

劉涓子同出第二十三卷中

張文仲劉涓子療癰消膿木占斯散方

木占斯

桂心

人參

細辛

敗醬

乾薑

厚朴 炙

甘草



防風

桔梗

各一兩

桔樓

一兩

右十一味搗為散服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰疽灸亦不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已壞者膿者內敗醬此藥時有化癰疽令成水為妙
隱居必効方消癰腫

白斂 二分

藜蘆 一分

右二味搗為末以苦酒和如泥貼腫上日三大良

備急同出

第五卷中

石癰方五首

千金堅如石核復大色不變或作石癰療之鍊石散方



鹿角

入兩一作白灰

白斂

三兩

麤理黃石

一斤酢五升先燒石令赤內酢中復

燒內之酢盡半止

右三味擣篩作細末以餘醋拌和如泥厚塗之乾即塗

取消止盡更合諸漏瘰癧藥悉皆主之並須火針瘡上

塗膏

又方

單磨鹿角半夏塗不如上方佳也

集驗文仲小品古今錄驗同

又療石癰堅如石不作膿方

以生商陸根爛擣傅之燥則易又治腦漏及諸癰癩

古今錄驗同

白德按
屬千金
作濕



又方

以蜀桑根白皮陰乾擣末消膠以酒和傅上即拔出

並出第二十三卷中

備急療若發腫至堅而有根者名曰石癰也方

灸腫三百壯當石子破碎出如不出益壯乃出其癰

疽石癰結筋療癰皆不可針角針角殺人

集驗文仲千金同出

第四卷中

癰癰方一十四首

劉涓子療癰癰諸腫有熱方

地黃三斤洗細切



右一味以水一斗煮取三升去滓煎湯令小厚以塗
常瘡中央貼之日再三易數用大良并療牛領上腫

第十卷中

集驗療及癰如結實赤熱者方

以水磨半夏塗之燥復更塗得流便消也出草中可
自掘生半夏乃佳此療神驗勿不信也

出第八卷中

千金療凡癰頭者方

吞葵子一枚即出勿多服頭多也

又方

燒葛蔓灰

封上自消

又方

牛糞封之佳

又方

以鼠粘葉貼之

又方

用水和雀糞傅之

又方

狗頭骨主乳芸薑子

右二味等分爲末和酢封之

又療癰潰後膿不斷及諸物刺傷不差方



取石硫黃三兩粉之一味筋一片礎頭令碎少濕之

內石硫黃中刺瘡孔以瘡差為度

通按筋字可疑

又乾地黃丸主虞熱消瘡癩方

乾地黃

四兩

大黃

六兩

桂心

二兩

芍藥

三兩

茯苓

三兩

王不留行

二兩

黃芩

二兩

麥門冬

二兩去心

遠志

二兩

升麻

二兩

人參

二兩

甘草

二兩炙

枳實

二兩炙

右十三味擣篩蜜和丸如梧子大酒服十九日三加至

二十九長服令人肥健

翼同

又地黃煎方補虛除熱可將和服取利也散石癰疽疔瘡



熱悉宜服百日癰疽永不發也

取生地黃隨多少三擣三押取汁令盡一味以新布

重絞其汁澄清置銅器中湯上煮之減半復下更新

布絞去麤碎結濁者滓穢盡復煎之濃竭令如飴糖

置中酒服如彈丸大日三勿加至百日服之有

驗

又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰瘡大

小便不利方

芒硝 二兩

大黃 四兩

梔子 二七枚

黃芩 二兩

知母 二兩

甘草 二兩



右六味切以水五升煮減半下大黃煮取一升八合

滓內芒硝二兩分三服忌海藻菘菜並出第一十卷

千金翼論曰一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰之後膿汁

不止得冷卽是鼠瘦是以漏方次之大須急救之

馬齒草五升切槲白皮一斤水五升煮取一升澄清麝香半臍乾之仍研作末

杏人半升油煎令黑擣如膏

右四味以甕器貯之合和以三四重綿密繫口病已成

瘡者以泔清淨洗拭乾剪作貼子塗藥貼著瘡上日三

易若未作瘡如作癩癰子者以艾一升熏黃如棗大乾

漆如棗大末之釜月下土三味並末和艾作炷灸三七



壯本方療鼠瘦出第二十三卷中

又主癰腫方

生椒末麴末釜月下土末之以大酢和傅之

卷中

附骨疽方八首

千金診附骨疽法凡附骨疽者無故附骨成膿故名附骨
疽喜著大節解中丈夫產婦喜著膝髀嬰兒亦著脊背丈
夫急者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸
急洪腫如肥狀是也小兒纔近便大啼呼卽是肢節有痛
候也大人緩者先覺肥洪洪然經日便覺痺痛不隨小兒

高德按
千金註
作破膝
解作膝
中纔字
下有手
字肥洪
洪作肌
煇煇



又按千
金著作
看有洪
洪作有
崩烘烘
成作或

四肢不能動搖亦如不隨狀著肢節解中有洪洪處不知
是附骨疽令遍身成腫不至潰死體皆青黯大人亦有不
別是附骨疽呼爲賊風風腫也

又凡人身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相搏便成
附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋夏露卧爲冷所折
風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒
未知取風冷何意而有此疾由其血氣盛肌嫩漸爲風冷
折之卽腠理凝結故也

又凡骨疽者久瘡不差差而復發骨從孔中出名爲骨疽

方

以猪膽和楸葉擣封之

又方

擣白楊葉下篩傅之

又方

穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎五升以艾及
荆葉和之令可燃火令煙出內疽孔坑中以衣擁坑
口勿洩煙半日許當有蟲出

又癰疽敗及骨疽方

末龍骨粉瘡四面厚二分

又方

高德按
及千金
作成
又按千
金與下
膏方併



用高德按千金猪膏一介

用自死蝦蟇一枚頭髮一把以猪膏一片半内二物

煎之消盡下之欲冷内鹽一合攪和以膏著瘡中

一易蟲出如髮蟲盡愈

又骨疽百方療不差方

可瘡上以艾灸之三日三夜無不愈也

並出第二十卷中

備急若骨疽積年每一年一發汁出不差方

取膠熬擣末粉勃瘡上及破生鱧魚以搗之如食頃

刮視其小蟲出更洗更傅蟲出盡止 備急文仲同

又療疽瘡骨出方

黃連

牡蠣 各二分熬



右二味末先以鹽湯洗以粉之

文仲同出第四卷中

療疽方一十六首

集驗論腎中痛少氣急入闇中以手掩左眼竟視右眼見
光者腎中結癰也若不見光療疽內發若吐膿血此不療
之疾宜以灰掩膿血上不爾著傍人也又齒間臭熱血出
是療疽也七日死療所不差宜以灰掩地血療疽喜著指
與代指相似人不別者亦呼作代指不急療其毒逐脉上
入藏殺人也南方人得此疾皆斬去指恐其毒上攻藏故
療疽著指頭者其先作黯疱然後腫赤黑黯疼痛入心是
也

出第八卷中



尚德按
千金點
點作點
熟搗作
搗合作
令勢作
熱

千金療疽論說曰療疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤黑青白不定一種其狀有根不浮腫痛癢應心根深至肌少久便四面悉腫胞黯黯紫黑能爛壞筋骨也毒散逐脉入藏殺人南方人名為榻著毒著厚肉處卽割去之亦燒鐵烙疮上合焦如炭亦疮上灸百壯為佳單擣酸草葉傅腫四面防其長大飲葵根汁及藍青汁若犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸單療折其勢耳其病亦喜著指故與代指相似人不識之呼作代指不急療之亦逐脉上入五藏殺人南方人得之皆斬去指疽著指初指頭先作黯寇然後腫赤黑黯癢痛入心是也復



尚德按
後科當
作反

有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如

馬乳上如雞冠狀不療自長出不止不痛痒此由春冬時

受惡風入肌脉中變成此疾療之宜服漏蘆湯外燒

日為之令焦盡竟以升麻膏傅之積日乃差備急同出第
二十三卷

劉涓子療癰疽侵淫廣大羊髓膏方

羊髓 二兩

大黃

甘草 炙

胡粉

各二兩

右四味咬咀以猪膏二升半合煎微火三上三下絞去

滓傅日四五

深師云兼療赤黑爛壞成瘡出第五卷中

千金療癰疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈

復發方



黃耆 六分

欵冬花 二分

升麻 四分

附子 一分

苦參 一分

赤小豆 一分

右六味下篩酒服半錢匕漸增至一錢日三服

范狂方無苦參

又方

虎糞白者以馬尿和之暴令乾燒灰粉之 翼同

又方

胡粉

青木香

龍骨

滑石

各二兩

右四味下篩以米粉一升和之稍以粉之日四五

又方

尚德按 屎千金 作屎

尚德按 千金胡 粉一兩 條三味 各三兩



竈室塵

竈突中墨

竈釜底土

各一升

右三味合研令勻以清水一斗煮三沸取汁洗瘡日

三度

又凡癩疽手足肩背忽礫礫如赤小豆刺之汁出者是

之方

剥却瘡皮溫泔清洗胡鷲窠和百日男子矢塗之

又方

熬蕪菁子熟擣綿裹傅之勿止

文仲備急附後同

又方

熬麻子末摩上日五六度

尚德按
附疑當
作肘

尚德按
千金刺
作刮溫
字下有
醋字



又方

麩和酒傅之

又方

鯽魚三寸長者亂髮如雞子大猪脂一斤煎以成膏

塗之

又療癰疽秘方世所不傳神良無比

射干

甘草炙

升麻

枳實

炙各二兩

大黃

十分

麝香

二分研

乾地黃

二兩

犀角

六分屑

前胡

三兩本方云三分

右九味切以水九升煮取三升分三服差上不限劑數

尚德按
斤千金
作分

尚德按
千金有
贊苓二
兩



翼同深師加黃芩十分餘同

又療疽漏蘆湯方

商德按
白銀千
全作白
變

商德按
千金蛇

漏蘆

白欽

黃芩

麻黃

白薇

枳實 炙

升麻

芍藥

甘草 各二兩炙

大黃 三兩

右十味切以水一斗煮取三升分三服無藥單用大黃

下之良 張文仲備急并翼並同

又升麻膏方

升麻

白薇

漏蘆

連翹

芒消 各二兩

黃芩

蛇銜

枳實 各二兩炙



枳實 各三兩
梔子 十枚

尚德按
疑當

梔子人二十枚
蒴藿四兩

右十味切搗破令細後以水三升漬半日以猪膏五升煎水氣竭去滓傳諸丹毒皆用及熱瘡腫上並日之

升麻搯湯方

升麻

漏蘆

芒硝各二兩

梔子二十枚

黃芩三兩

右五味切以水一斗合蒴藿五兩煮取七升冷搯諸丹

腫上常令濕內宜服漏蘆湯甚佳

又瘡癩疽侵淫多汁日就浸大胡粉散方



并磨 又 千金 浸 尚德 千金翼 後作浸 六味各 水 六分

胡粉 二分 熬

黃連 三分

甘草 二分 炙

藜蘆 二分

右四味下篩以粉瘡上日三

翼文仲備急深師同並出 第二十三卷中

千金翼薄榆湯主療疽侵淫欲作未成或如桃李核或如

雞子赤嫩方

甘草 炙

黃芩

大黃

黃連

當歸

芒消 各 兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓鑊中下芒消一

沸攪之貼布帛中以搗腫上數百遍

劉涓子深師同出 第二十三卷中

緩疽方四首

集驗論有緩疽者初結腫形似癰回回無頭尾其色不異



尚德按
內疑當
作肉

但痛深有根核又與皮肉相親著外耳一名內癰其有大
者如拳小者如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑久即皮
內俱爛如牛領瘡狀便通體遍青黯色而不作頭穿潰出
膿初作服五香連翹湯鑱去血以小豆薄塗之其間數針
鑱去血薄之取消也若不消色未變青黯者以鍊石薄
之若失時不得療已爛者猶服五香連翹湯及漏蘆湯下
之隨熱多少投方也外以升麻湯搨洗之薄升麻膏若生
臭惡肉者可以單行一物白蔞茹散傅之青肉去盡便停
也好肉既生但傅升麻膏良不生單傅一物黃耆散也若
傅白蔞茹散積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮蔞茹取

半錢匕和三大錢匕白藜茹散中合和傅之惡肉去盡
以淳用白藜茹散也視好肉欲生可傅黃耆散也黃耆散
方白藜茹散方漆頭藜茹散方並一味單行隨多少將篩
爲散 出第八卷中

范注飛黃散療緩疽惡瘡食惡肉方

取丹砂著瓦盆南雌黃著中央磁石北曾青東白石
英西礬石上石膏次鍾乳下雄黃覆雲母薄布下各
二兩先擣篩瓦盆中以一盆覆上羊毛泥令厚作三
隅竈燒之以陳葦一日成取其飛者使之甚妙

又療緩疽以飛黃散食惡肉令盡作土竈熏之方

雄黃 一兩

雞白朮 一兩

藜蘆 一兩

丹砂 一兩

乾鰻鱺魚 一兩

右五味搗下篩青布裹之熏經三日乃止止畢要以蛇

銜膏摩之良

簡范汪方無蛇銜膏崔氏方附於後並出第三十一卷中

瘡方
崔氏蛇銜膏療癰腫瘀血產後血積耳目暗等牛領馬鞍

蛇銜 一兩

大黃

附子 去黑皮

芍藥

當歸

細辛

黃芩

大戟

椒 去目

莽草

獨活 各一兩

薤白 十四莖

右十二味並切之以苦酒淹之一宿以不中水成鍊指



膏二升龍銜藤一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似
蛇銜而葉大耳亦有取其根合煎者亦名龍銜膏
小品療緩疽初作卽以小豆薄塗之亦消也 出第十卷中

發背方四十一首

其乳石發背自有正方在第八卷中具述

千金論曰凡發背皆由服餌五石寒食更生散所致亦有
單服鍾乳而發者又有生乎不服諸石而自發背者此是
上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或
痛或痒仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日
遂至不救其臨困時方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔
以手按之諸孔之膿皆反出尋卽失音不言所以養生者



商德按
千金二
七疰作
七疰作
七疰作
青 疰 疰 疰 疰

小覺背上痛痒有異即取淨土冷水和泥捻作餅子徑

寸半厚二分以麤艾大作炷灸泥上貼著瘡上灸之

一易餅子若粟米大時可灸七餅即差若榆莢大灸

炷即差至錢許大日夜灸不佳乃差并服五香連翹湯及

鐵漿諸藥攻之乃愈又常以冷水射之漬冷石熨之日夜

勿止待差住手此病忌麪酒肉五辛等亦有當兩腎上發

者

又論曰凡服石人皆須大勞役四體無得自安如其不爾

多有發動亦不得遂便恣意取暖稱適已情必須違欲以

取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益終無發動之慮



又發背方

凡腫起於背胛中頭白如黍粟四面相連腫赤
人悶亂者名發背也卽禁房慎蒜麩不速灸治
內殺人灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫
之皆死

又方

取亂髮灰酒服方寸七

又方

以三年酢滓微火煎令調和牛脂封上日一易

又方

高德按
千金
作綱



取狗牙灰酢和傅之

又方

取猪羊脂封之亦療發乳

又方

以蛇頭灰水和傅之

又方

飲鐵漿三升下利為佳

又方

以鹿角灰酢和塗之
古今錄驗同

又方

金醅按



燒古蟬末之如粉雞子白和傅上日三卽差止

又發背及癰疽潰漏并未潰毒腫方

栝樓

榆皮

胡鷲窠

鼯鼠土

女人月水布洗取汁

右五味並須等分以月水汁和如泥封腫上乾卽易之

潰者四面封已覺卽封從一日至五日令差翼同

又療癰疽潰漏發背及小小瘰癧李根散方

李根

半夏

洗

栝樓

各一升

甘草

二兩炙

葛根

三兩

桂心

四兩

當歸

二兩

通草

一兩

芎藭

一兩半

白斂

一兩

桔梗

二兩

厚朴

炙

勸德按
千金李
根作李
根皮半
夏栝樓
各五兩



兩桔梗
兩

唐德按
千金山
藥莖以
下四味
各六兩
藜麥作

外臺秘要

黃芩

各一兩

芍藥

四兩

附子

一兩

右十五味爲散酒服方寸七日三瘡大困者夜再服

患發背骨出身有三十餘癰瘡服此差忌羊肉鴆

菘菜猪肉冷水生葱

范汪同

又治諸虛不足發背癰疽經年差後復發或由大風聚結

毒氣在內閉塞夏月已來出攻于背久不療積聚并膿血

爲瘡內漏大內塞排膿散方

山茱萸

五味子

茯苓

乾薑

各六分

當歸

四分

附子

二分

肉蓯蓉

八分

石斛

五分

菟絲子

三分

巴戟天

八分

瞿麥

三分

一云地麥地膚



五倍子
地黃
地黃
地黃
地黃
地黃
地黃
地黃
地黃
地黃
地黃

高德按
千金蜀
升麻作
蜀椒乾
薑二分
桂心一
分芎藭
二兩小

遠志 八分 去心
人參 五分
甘草 五分 炙
麥門冬 八分 去心

石韋 四分
芎藭 四分
芍藥 五分
乾地黃 八分

桂心 五分

右二十味爲散酒服方寸七日三夜一稍加至兩七長

服終身不發癰瘡忌同前

又內補散療癰瘡發背方

蜀升麻
黃芩
人參 各二分
乾薑

白斂
桂心
甘草 炙
附子 炮

防風 各一兩
芎藭 一兩
赤小豆

右十一味爲散酒服方寸七日三夜再
椒非 一云蜀



豆一合

尚德按

千金人

參一兩

又按忌
字下疑
有脫字

尚德按
千金瞿

麥一兩

極心以

下五味

各二兩

又內補散主癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸

桂心

人參

芎藭

厚朴 炙

桔梗

甘草 炙

防風

白芷 各一兩

右九味為散酒服方寸七日三夜再瘡未合服勿停忌

范汪同

又瞿麥散主排膿止痛利小便方

瞿麥 二兩

芍藥 二兩

桂心 半兩

赤小豆 半合

芎藭 半兩

白斂 半兩

黃耆 一兩

當歸 二兩

麥門冬 二兩
去心



商糖按
子金六
味各二
兩

商糖按
子金半
夏二兩
飛煮行

右九味為散先食溫酒服方寸匕日三忌生葱

同翼深

又薏苡人散主令癰自潰長肌肉方

薏苡人

桂心

乾薑

白歛

當歸

肉蓯蓉

各一兩

右六味為散先食溫酒服方寸匕日三夜再

翼同

又黃耆竹葉湯主胷背遊熱癰疽方

生地黃

八兩

黃耆

甘草

炙

芍藥

黃芩

各三兩

人參

石膏

碎

芎藭

當歸

各二兩

生薑

五兩

大棗

三十枚擘

半夏


四兩洗

淡竹葉

切一升

麥門冬

去心三兩



平藥取一

右十四味以水一斗二升煮竹葉取九升去滓內藥煮
取三升分四服相去如人行五六里再服日三夜

海藻菘菜羊肉餒 古今錄驗同

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛

方

防風

茯苓

白芷

桔梗

遠志

去心

甘草 炙

人參

芎藭

當歸

黃耆 各一兩

桂心 二分

附子 炮二枚

厚朴

二兩

赤小豆 五合 熬

右十四味擣散酒服方寸七日三夜一忌全前



去

尚德按
千金辛
夷二兩

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背上惡肉方

麝香 研

雄黃 研

真珠 研各一兩

礬石 熬一兩

右四味細篩以猪膏攪令如泥塗惡肉盡止更傅生肉

膏佳

又療癰疽敗壞生肉膏方

生地黃 一斤

辛夷

獨活

當歸

黃耆

大黃

芎藭 各一兩

薤白 五兩

白芷

芍藥

黃芩

續斷 各一兩

右十味切以臘月猪脂四升煎傅之佳

又方



尚德按
千金雄
黃半兩

外臺秘要

大黃
附子炮
芎藭
雄黃

真珠各一兩
白欽
礬石燒
黃芩

蘭茹各二兩
雌黃一兩
莽草一兩

右十一味先以猪膏一升半煎六沸去滓內蘭茹礬石

末攪之塗瘡上惡肉盡止劉涓子同

又方

蘭茹漆頭者
礬石各二分熬
雄黃二分研
硫黃二分

右四味爲散內瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也

又發背上初欲作腫卽服此方

梔子一百枚
大黃
升麻
黃芩



甘草

炙各二兩

右五味切以水九升煮取三升半分三服使利便

下更進一服忌海藻菘菜從瞿麥散以下九方並

背部中已次之

文仲備急同並出第二十三卷中

范汪療癰腫發背虎牙散方

虎牙

炙

乾薑

附子

炮

當歸

甘草

炙

防風

桂心

王不留行

茯苓

各一兩

右九味擣下篩服方寸七日三忌同前

出第三十一卷中

又療癰發背排膿內補鐵屑散方



當歸

人參

細辛

甘草 炙

菴蓉

黃耆

桂心

防風

黃芩

鐵屑

芍藥

芍藥

右十二味各等分合搗為散服方寸七忌同前

又療癰腫牢核發背成膿菴草膏方

菴草

芍藥

當歸

細辛

附子 炮

黃芩

身頭 炮

牛膝

躑躅

野葛

茯苓

防風

杜薺 各一兩

猪脂 二斤

右十四味切用猪肋合煎去滓傳瘡上日再忌同前



又卓氏白膏療癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸痂疥患療之方

當歸

附子炮

細辛

續斷

牛膝

通草 甘草炙

白芷

各二兩

蜀椒

三合

芍藥

黃耆各二兩

右十二味咬咀以猪膏二升煎之微火上以白芷色黃

藥成絞去滓以傅瘡上日三忌同前

又療發背發乳房及諸惡瘡膏方

黃連

當歸

馬齒

芎藭

薯蕷

各一兩

珍珠

十四枚

礬石

半兩燒

黃蘗

半兩



石韋三分
去毛

生竹皮三合

猪肪一斤

右十一味咬咀細切肪美酒一升合煎石韋焦膏成

滓有病稍稍傳上亦可酒服棗核大一枚忌同前

第四十一卷中

救急療發背百無不差方

取猪羊脂切作片冷水浸取貼上暖徹易之五六十

片即差若初貼少許即寒寒定好眠甚妙

又療發背若初覺赤腫腫上作小瘡疼不可近方

急用針刺上七八針取冷水用筒擊射腫上日夜不

止疼歇腫消

出第五卷中



藥經按
搜果當
作復

又蒸發背方

取白麩搜圍腫四畔令童子七人尿漬之

又方

以馬糞封之乾易婦人發乳亦差

又方

取蔚臭草擣取汁服一雞子滓封上熱即易之

又方

擣地菘汁一升日再服以差止

又方

大黃

石灰熬

小豆

小豆必要

二十四卷

辰



右三味等分末白酒和塗立効忌羊肉熱麪大酢並此

第六卷中

尚德按

仕疑當

作士燒

疑當作

疑一日

疑當作

十日

近効凡發背皆發出自腸胃流入五藏仕流多脚氣為主
或有先服乳石并熱肉麪并失饑房室過度皆作此疾縱
身不曾服乳石先代服亦有此病或有下里人服麪過度
亦有患者請依後方萬不失一發背亦覺有腫即須審看
根硬軟如硬頭一點白燒四邊紫黑色時掣痛憎寒不食
狀若天行此石癰知是此狀即須當上灸一百壯艾炷大
如鼠屎許大凡發背初亦一點白四邊赤色漸漸長大或
盃盞并碗許大四邊生飯漿小小瘡如粟米許大亦時時



石擊痛此兩狀皆是死病一日內堪醫十日以外不濟
中冬月得此病卽延得三五日其發背初覺卽須當頭灸
二十一壯如盃許大卽五花灸之各二十一壯卽服
子栝樓葛粉第二服犀角湯瀉之不然服犀角丸亦得
效也忌梨鯉魚麪酒肉漿水粥

真鴻臚賈顯錄

凡發背候憎寒壯熱身如拘束或口乾不用食瘡初出如
青紫色者毒重赤者輕膿如稀泔者極重膿稠白赤者輕
張道士昇玄房陵口錄留

又療惡寒齋齋似欲發背或已生瘡腫隱癢起方

消石 三兩



右一味以煖水一斗和令消待冷取故青布疊三重可

似欲赤處方圓濕布揜根熱即換之頻易差

又療發背及一切毒腫方

生麻油

六合

黃丹

二兩半

地膽

兩錢搗碎篩

生栗子

四十九枚取大小中者熬焦去皮碎縮篩

右四味和於銅器中盛用炭火重湯煎候沫溢出與器

口欲平取小麥一合分二人嚼取筋急內藥中攪使與

相和膏擊下安銅器冷水中成膏訖以故綿塗膏貼所

苦處晨夕換膏

又療前瘡定訖令生肌方

黃四頁外云極効



麝香 兩錢

棗皮灰 兩半

生麻油 六合

右三味依法和用火重湯上煎十餘沸稀稠前藥相似
取故綿塗膏貼瘡上膏漸取瘳滅唯得喫白羊頭但
是豆並不得喫餘如藥法

又療癰腫犀角丸主腸癰乳癰發背一切毒腫服之化爲

水神驗方

犀角 十二分

蜀升麻

黃芩 各四分

大黃 五分

防風 四分

巴豆 二十二枚去心皮熬令黃

人參 四分

當歸 四分

黃耆 四分

乾蓼藍

黃連

甘草 炙

梔子 人各四分



尚德按
搜疑當
作搜

右十三味搗為末別搗巴豆成膏內末和以杵研搗令
相得鍊蜜和搜更搗二三百杵煖湯服三九如梧子得
利三兩行喫冷粥止即差不利加至四五丸初服取快
利後漸減丸數取鴨澹微洩為度老小以意增減腫消
及和潤乃止利却黃水即覺輕皮皺色變一切腫皆內
消神驗不可論忌熱麪蒜猪肉蘆笋魚海藻菘菜生冷
粘食以上並主發背

癰疽發背雜療方二十六首

劉涓子療發背發乳口已合皮上急痛生肉摩跗折丹參

膏方

丹參 防風 白芷 細辛

芎藭 黃芩 芍藥 牛膝

大黃 槐子 獨活 當歸

右十二味切以臘月猪脂五升微火煎三上三下膏

病日三四不須向火 古今錄驗同出第五卷中

肘後療諸癰疽發背及乳方

熬粢粉令黑雞子白和之以塗練上貼癰小穿練上

作小口以泄毒氣令散燥復易之此藥神効 文仲備急同

又方

以釜底土擣取散以雞子中黃和塗之加少豉彌良



以五月葫及少鹽佳 文仲備急同一本無下一法

又方

取茱萸一升擣之以苦酒和貼癰上乾易之佳

刪繁療癰疽發背九物大黃薄貼方

大黃 各三 黃芩 各三 白芷 二兩 寒水石 五兩

白欬 五兩 黃藥 二兩 石膏 赤石脂

黃連 各三兩

右藥下篩以三合投粉麋二升中和之薄塗紙貼腫上

燥易之腫下止不下厚傅之忌生冷熱麩大酢

又蝟皮散療諸癩及浮核壞敗并主男子發背女子發乳



等癰疽或膿血肉瘤方

蝟皮

一具 燒

杜仲

八分 炙

續斷

五分

附子

炮

地榆

各五分

厚朴

八分

藁本

五分

當歸

桂心

各五分

小露蜂房

一具 燒

右十味擣篩為散服方寸匕日三服酒進取差止忌猪

肉生葱冷水

又陵鯉甲散療發背乳房癰腫方

陵鯉

一頭取 甲爪炙

桂心

三分

當歸

二分

右三味擣篩為散服方寸匕日三服酒進

出第九卷中

千金療癰疽發背猪蹄湯方



猪蹄

一具治如食法

黃耆

黃連

芍藥

各三分

黃芩

三兩

薔薇根

狼牙根

各八兩

右七味以水三斗煮蹄令熟澄取二斗清切藥煮取

斗洗瘡一食頃以綿拭燥著生肉膏日二差生痂止痛

加當歸甘草各二兩

又療癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉方

猪蹄 一具

當歸

大黃

芎藭

芍藥

黃芩

獨活

莽草

各一兩

右八味蹄取膝下斷治如食法以水二斗煮取八升內

藥煮取四升去滓漬瘡兩食頃拭令燥以麝香膏傅之

高德按
千金分

作兩黃
二兩

一作
二作

高德按

千金以

水三斗

三斗



惡德種
千金六
最作六
分續斷
作蛇斷
二宿作
字

其方在前發背部中只有四味者是也

又生肉膏主癰疽發背已潰令生肉方

甘草 炙

當歸

白芷

菘蓉

蜀椒

細辛

烏喙

薤白

乾地黄

三兩

續斷

一兩無以蛇銜替之

右十味以好酢半升相和漬二宿猪膏三斤煎令三沸

又三上三下膏成使用

劉涓子同

又癰發腹背陰匿處通身有數十者方

取牛糞乾者燒擣下重絹以雞子白和以塗之乾復

又法易 肘後張文仲備急同



又若已結膿使聚長者方

以生栝樓根細搗苦酒和傅上燥復易之末赤

亦佳

又凡發背為癰疽已潰未潰者方

以香豉三升少與水和熟搗成強泥可腫作餅厚三

分已有孔勿覆孔可腫上布豉餅艾列其上灸其豉

使溫溫熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當

減便得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出

卽差 備急文仲并翼同

又癰腫發背初作及經十日以上腫勢焮熱毒氣猛盛日

尚德按
千金為
作及可
作依已
字下有
上字孔
可
度
二日作



通按
被音段
不成子
也

夜疼痛百藥不治者方

蝦段雞子 一枚

新出狗矢 如雞子大

右二味攪令調和微火熬之今稀稠得所捻作餅
頭堅處貼之以紙貼上以綿抹之時時看之覺餅

即易勿令動轉及歇氣經一夜定其多日患者三日貼

一度差止

謹按千金論曰此方穢惡不可施於貴勝然其愈疾一切諸方皆不及又自外諸方還復

備負作儀注而已學者常當曉斯以備諸急云耳並出
第二十三卷中

于金翼諸癰腫發背及癰疔已潰爛疼痛方

蒸糜穀更遞熨之當即愈 一云薔薇殼更炙熨之

又連翹五香湯主一切惡核瘡腫方



連翹

射干

升麻

獨活

各二兩

桑寄生

二兩

通草

二兩

大黃

三兩

丁香

一兩

青木香

二兩

沉香

二兩

薰陸香

二兩

麝香

三兩

右十二味咬咀以水九升煮減半內竹瀝二升煮取

升分三服未差中間常服佳

又五香湯主惡氣毒腫方

沉香

青木香

丁香

各一兩

薰陸香

一兩

麝香

半兩

右五味切以水五升煮取一升半分三服

集驗方用雞舌香一兩不

用丁香出第二十四卷中



崔氏療發背及諸瘡久不差有效方

先以甘草湯洗瘡拭極乾乃嚼胡麻傅上乾即易從
且至日西去胡麻乃取黃連末滑石末中半相和以
傅瘡上數數易明日又依前傅胡麻及黃連等末更
不須洗瘡不過六七日即差 必効備急同

又連翹湯療患瘡腫而渴方

連翹

蜀升麻

各二兩

黃芩

三兩

枳實

二兩

乾藍

三兩

芍藥

二兩

玄參

二兩

白欬

二兩

甘草

一兩

羚羊角

屑二兩

通草

二兩

黃耆

二兩

犬黃

三兩



右十三味切以水八升煮取二升半分三服利一兩行
後更服去大黃乾藍卽不利忌海藻菘菜

又犀角飲子方

犀角 三兩屑

羚羊角 三兩屑

右二味以水八升煮取三升渴卽飲盡更作之時熱恐
壞懸著井底甚妙

又五香連翹湯療惡瘡熱毒腫恐惡毒氣入腹兼取利以
洩毒氣方

連翹 三兩

蜀升麻 二兩

薰陸香 二兩

淡竹瀝 一升

麝香 一分

青木香 二兩

丁香 一兩

獨活 二兩



寄生 三兩
射干 二兩
甘草 二兩
沉香 一兩

大黃 四兩水一升別漬

朴消 二兩熬乾別內

右十四味切以水一斗煮取二升半絞去滓然後內大

黃朴消竹歷更煮一兩沸去滓內麝香分溫三服服別

相去如人行十里久以得利一二行為度慎雞猪魚蒜

生冷酢滑油膩麩食小豆五辛葵菜等 備急文仲同並出第五卷中

備急葛氏療始發諸癰疽發背及乳房方

皆灸上百壯半夏末雞子白和塗良姚云生者神驗

以水和塗之 肘後文仲古今錄驗小品並同

又方



以酢和墓上土茱萸擣薑小蒜薄貼並良

肘後文仲同並出第

四卷中

救急療熱毒風丹并發背犀角膏方

犀角 六分

升麻 十大分

羚羊角 六分

梔子人 二枚

薤白 升切一

吳藍 八分大藍亦得

玄參 六分

續斷

大黃

白欬

射干

白芷 各六分

蛇銜 升切一

寒水石 十二分

黃芩 六分

慎火草 升切一

麻黃 六分去節

右十七味切以竹瀝三升生地黃汁五合漬藥一宿內

猪脂二升微火上煎十上十下候白芷黃膏成去滓塗

尚德按
六味當
作六



痢上

文仲療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散方

木占斯

厚朴 炙

甘草 炙

細辛

栝樓

防風

乾薑

人參

桔梗

敗醬草

各一兩

商德按千金單有桂心慶作善

右十味為散酒服方寸七日七夜四以多為度病在上

當吐病在下當下膿血此謂腸癰之屬凡癰腫即可服

兼療諸疽痔若瘡已潰便早愈發背無有不療長服去

敗醬亦療婦人諸產癥瘕益良

是劉涓子方千金范汪刪繁古今錄驗同出第

五卷中

又按千金無此方



古今錄驗療諸癰瘡發背有膿血當歸貼方

當歸 一分
蟻螬 一分
丹參 一分
附子 炮一分

蠟蜜 一分
梔子 十枚
桂心 一分
膠 一分

右八味合煎以貼瘡上
出第二十一卷中

宋右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子

孟較勘

大日本 醫官 平安山脇尚德玄飛甫 校刊

清水敬長源五甫 參校

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷終

