

壽 四十三

痰飲

咳嗽

喘

肺痿

肺癰

古今醫統

古今醫統大全卷之四十三目錄

痰飲門

病機

痰飲敘論

痰證因於熱

飲專主於濕

痰飲有三因

仲景舉痰飲證有四目

百病皆生於痰

痰清痰濁辯

察色知痰

痰飲之病總屬於脾

痰證條錄

脈候

治法痰飲以實脾燥濕為本 逐痰理氣有所先後

壽集

張子和吐法論

不可吐例

治飲證當上下分消水濕
燥熱藥治痰之誤

半夏南星治痰辯

治痰條錄

治案

藥方

通治痰飲方劑

五飲丸

五飲湯

二陳湯

二賢湯

導痰湯

豁痰湯

橘皮半夏湯

大半夏湯

白木湯

茯苓飲子

茯苓丸

導引丸

大人參半夏丸

本事化痰丸

苓桂木甘湯

脾胃食積濕痰方劑

加味二陳湯

茯苓湯

茯苓半夏湯

柴胡半夏湯

小半夏湯

五苓散

澤瀉湯

橘皮湯

驅痰飲子

三仙丸

半夏白朮天麻湯

保和丸

神朮丸

星半丸

二朮丸

清痰丸

小黃丸

指迷茯苓丸

黃瓜薑丸

半夏丸

潤下丸

瓦粉瓜薑丸

法製竹瀝丸

製竹瀝法

火痰老痰劑

流金膏

黃芩二陳湯

清肺導痰湯

小陷胷湯

節齋老痰丸

黃芩利膈丸

瓜蒌半夏丸

清氣化痰丸

利膈化痰丸

青礞石丸

黃芩半夏丸

加味潤下丸

風痰諸方劑

千緡湯

星薑湯

省風湯

芎辛湯

搜風化痰丸

辰砂化痰丸

玉芝丸

玉壺丸

豁痰丸

水煮金花丸

青州白丸子

天南星丸

靈砂白丸子

寒痰諸方劑

丁香茯苓湯

半夏溫脾湯

五膈寬中散

新法半夏湯

御愛紫宸丸

丁香五套丸

半夏丁香丸

溫中化痰丸

倍木丸

順元散

黑錫丹

靈砂丹

強中丸

八味丸

鬱痰諸方

四七湯

中和丸

殭蠶丸

喘痰諸劑

千緡湯

黃瓜蔓丸

酒痰諸劑

葛花解醒湯

御愛紫宸湯

香莎丸

清化丸

前胡半夏湯

蘇子降氣湯

杏仁來復丹

半夏湯

白龍丸

三
卷之四十三目錄
四
三

吐痰諸方劑

瓜蒂散

茶調散

三聖散

青黛散

下痰諸方劑

厚朴大黃湯

小胃丹

妙應丸

滾痰丸

獨聖散

稀涎散

蔚金散

元戎勝金丸

十棗湯

控涎丹

三花神祐丸

蠲飲枳實丸

滌痰丸

開結枳實丸

濬川散

舟車丸

烏巴丸

透羅丸

墜痰丸

神仙墜痰丸

破痰丸

沉香和中丸

易簡方

養生導引法

卷之四十四目錄

咳嗽門

病機

內經敘論

咳嗽二字取義辯

欬有十證

欬分六氣母拘以寒

六欬之狀

欬分三因

咳主於氣逆

欬主於濕痰

呷欬

乾欬

欬久成勞

欬久成肺痿

脉候

治法欬以消痰順氣為先

治欬須分時令

治欬要分虛實新久

治欬有早晏之殊

治欬不可先用泄藥

治欬條例

醫案

藥方

發散諸劑

華蓋散

橘蘓散

參蘇飲

金沸草散

三拗湯

杏仁湯

消風百解散

人參荊芥湯

小青龍湯

敗毒散

麻黃杏子湯

桑白皮散

小柴胡湯

火熱咳嗽諸方

三
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十

流金膏

麥門冬湯

梔子仁湯

黃連解毒湯

神芩丸

瀉白散

加減瀉白散

水煮金花丸

枳殼湯

雙玉散

人參平肺散

知母茯苓湯

桑白皮散

加味枳殼半夏湯

紫苑膏

紫苑茸湯

寧肺湯

前胡散

黃芩知母湯

涼膈散

暑濕咳嗽諸方

人參白虎湯

清暑益氣湯

黃連香茹飲

五苓散

白朮湯

欬氣丸

清痰順氣止嗽諸方

蘓子降氣湯

分氣紫蘓飲

大承氣湯

平氣湯

百合湯

蘓子煎

鯉魚煎

人參欬花膏

星香丸

潤下丸

三哥湯

杏仁蘿蔔子丸

清燥潤肺止咳諸方

杏仁煎丸

杏仁膏

阿膠散

天門冬丸

潤肺止咳膏

鳳髓膏

牛髓煎

通聲煎

虛寒咳嗽諸方

理中湯

胡椒理中湯

溫肺湯

加味理中湯

補肺湯

半夏溫脾湯

貝母湯

仁齋真武湯

陰虛勞嗽諸方

五味黃芪散

補肺湯

紫苑散

麥門冬湯

黃芪湯

黃芪鱉甲散

蛤蚧散

團參飲子

溫金散

栝白皮煎

羊肺湯

人參養肺湯

鍾乳補肺湯

百花膏

瓊玉膏

人參芩歸湯

方人醫考卷之二

大阿膠丸

四物桔梗湯

收斂止嗽諸方

人參欵花散

人參紫苑湯

人參清肺湯

寧肺散

九仙散

三妙湯

訶子散

安眠散

生熟煎菓丸

烟筒方

靈寶烟筒

焚香透膈散

蘆吸散

壘湯煎

劫嗽方劑

一捻金

五味子丸

百藥煎

寧神散

五味子丸

法製半夏

法製杏仁

易簡方

灸法

導引法

喘證門

病機敘論

喘急與短氣不同

運氣為喘

喘為痰氣鬱滯

喘脹病須分肺脾樞機

審狀別證此細明知本

病後喘者危

脉候

治法

喘證須審攻補先後之宜
喘嗽遇寒則發

喘證有不宜下

治喘條例

藥方

發散定喘諸劑

五拗湯

三拗湯

華蓋湯

杏蘇飲

宣肺湯

五虎湯

神秘湯

蘊沉九寶湯

直指神秘湯

人參定喘湯

治諸氣逆喘方

蘓子降氣湯

葶藶大棗寫肺湯

調降湯

四磨湯

參朮調中湯

人參白朮湯

治喘通用諸方

黃芩半夏湯

星半瓜萋丸

定喘陳皮湯

桑白皮湯

葶藶散

玉華散

五味子湯

紫蘓子湯

三才人參定喘湯

定肺湯

杏仁煎

人參胡桃湯

二黃丸

定喘丹

神應丸

治喘利下諸方

大利禹丸

八仙丸

道水丸

黑鉛丹

控涎丹

千緝湯

定喘湯

易簡方

鍼灸

治案

卷之四十五目錄

吐痰證

病機肺痿論

脉候

藥方

人參平肺散

知母茯苓湯

紫苑散

保和丸

潤肺膏

生薑甘草湯

甘草乾薑湯

桂枝皂角湯

七寶散

括萸湯

肺癰證

病機論

脉候

古今醫統卷之四十五目錄

十一

治法藥方

桔梗湯

團參飲子

葶藶散

升麻湯

理肺膏

蜜膠丸

黃芪湯

排膿散

消膿散

如聖散

五味子湯

紫苑散

葶藶大棗瀉肺湯

白芨散

易簡方

鍼灸法

古今醫統大全卷之四十五目錄終

古今醫統大全卷之四十三

新安徐春甫編集

四明朱法校正

痰飲門

稠濁者為痰清稀者為飲一為火燥一為寒濕今醫不分混同出治所以鮮能取効

病機

痰飲敘論

經曰諸瘕強直積飲否膈中滿霍亂吐下體重肘腫肉如泥按之

不起皆屬於濕

此是太陰濕土乃脾胃之氣為病也

張子和論痰有五曰風痰曰濕痰曰食痰曰酒痰是也風痰多

帶涎沫因形寒飲冷或因感風而發或因風熱拂鬱而致則痰清

三才圖會卷之四十三

三

白濕痰因停飲不散而成熱痰為火盛制金飲食辛辣重裊厚禱
所致酒痰因浩飲所得食痰因厚味炙博過多

痰證因於熱

玉機微議云痰之為病誠多也何則人之血氣流行無一息之間
斷絕有壅滯津液凝積鬱而成熱痰遂生焉因證而觀痰則火之
變出也未有痰病而不因火而成者也間有寒痰為病者亦千百

中之一二也甫謂寒痰之說非也飲則有寒有熱不同痰則一因於熱而已加之寒字不得所以痰脉多滑大明知傳

冷成痰亦遂鬱而為熱藥惟以橘皮半夏神麩之辛以散之行
之亦不敢用熱藥也陳無擇云飲脉多沉絃微細始可以言寒
治以理中二陳之屬是也性理所
謂有溫泉而無寒火不其然歟

飲專主於濕

原病式曰**積飲**留飲積蓄而不散也水得於燥則消散得濕則不消以為積飲土濕主病故也大畧要分濕熱寒濕之因

運氣濕土太過痰飲為病

經曰太陰在前濕淫所勝民病飲積又云歲土太過兩濕流行甚則飲發中滿又云土鬱之發飲發又太陰之復皆病飲發於中治水諸熱劑是也

痰飲病有三因

陳無擇云人之有痰飲者由榮衛不清氣血濁敗凝結而成也內則七情汩亂臟氣不行鬱而生涎涎結為飲**為內所因**外則六淫侵冒玄府不通當汗不泄蓄而為飲**為外所因**或飲食過傷色慾

無度運動失宜津液不行聚而為飲為不固外因其為病也為喘
為欬為嘔為泄為眩運嘈雜煩心忪悸憤懣寒熱疼痛腫滿等症
癢閉如風如癩未有不由痰飲所致

仲景舉痰飲證有四目

有痰飲有懸飲有溢飲有支飲有人素盛今瘦水走腸間漉漉有

聲謂之痰飲又云痰飲者心下冷極以溫藥和之大甘草湯是也飲後水流在脇下咳唾引

痛謂之懸飲又云懸飲者法當下之十棗湯是也飲水流於四肢當汗出而不汗出

身體重痛謂之溢飲病溢飲者當法其汗大青龍湯是也欬逆倚息短氣不得卧其

形如腫謂之支飲又云病支飲者多屬濕故其形如腫眠下如引蠶者宜分利之仲景五苓散澤瀉湯是也古

方有五飲六證之說即四飲加以飲留飲二證是也留飲者背

寒如掌大其人短氣而渴四肢無力歷節痛脇下痛引缺盆咳嗽
則轉甚伏飲者膈滿嘔吐喘咳發則寒熱腰背痛目淚出其人振
振惡寒身𦵏惕者為伏飲

百病皆生於痰

王隱君曰痰證古今未詳素問雖載鼻斂辛頰喘滿為熱而無治
法方書雖有五飲諸痰之異而莫知其致病之源或頭風目暈如
坐車舟精神恍惚口眼𦵏動眉稜耳輪俱癢或腮頰四肢遊風腫
硬似痛非痛或渾身燥痒搔之則癢疹隨生皮毛烘熱色如錦斑
用盡風藥而無効或齒頰似痛而痛無定所累謁齒科未能奏功
或噫氣吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥心煩鼻塞咽喉不利咯之不出

噴之不下或因噴嚏而出或因舉動而嚙其痰似墨有如破絮或
似桃膠或如蜆肉服四七湯如水投石其聚也心下如停冰鐵閉
滯妨悶噎逆連聲狀如啞氣降氣湯丁香五套丸之屬其病自若
至若寢寐常夢刑戮劒戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇自計
透出則失記何所或夢燒人地上四面枯骨烟焦摸鼻不得其路
或觸憤而怒號哭悲啼或騎馬郊行急急回顧元無所自往往問
醫師之達者皆知為肺病驗方處藥罕投其機或之膝痠軟或腰
腿卒痛或四肢肌骨之間痛如擊截即痛即止并無常所乃至不
特手麻臂痛狀若風濕百藥不效夏卧光滑竹簟如卧芒刺不安
或逢陰晴交變則骨疼背脹不時齒癢咽疼口糜舌爛及其奮然

而發則噴嚏連聲始則唾涕稠粘次則清水如注眼前黑暗腦後
風聲耳內蟬鳴眼瞤肉惕每於靜室默然熟察病勢之來則於胃
腹間有如二氣交紐遂噎塞煩鬱有如烟火上冲頭面烘熱眼花
耳鳴痰涎涕淚沸然湧起凜然毛豎噴嚏千百連聲然後遍身煩
躁大寒之時則盡去衣衾裸體一凍則稍止片時或春和乍涼之
時則多加衣衾亦暫少緩或頓飲冰水而勢定或痛飲一醉而頗
寧或時失志甚欲顛狂或心下怔忡如畏人捕或嘔吐冷涎綠水
黑汁婦人則月經不通忽成勞瘵任再之疾內外為病非止百端
其狀不同難以盡述嘗用一藥愈此痰疾不計萬數即滾痰丸是
也今用詩括以傳於世共為饒益之事云

痰清痰濁辯

王隱君曰世論痰清白者為寒黃濁者為熱誤也殊不知始則清
白久則黃濁清白稀薄漬於上黃濁稠粘凝於下咳而易出者清
而白咳而難出者黃濁結滯也若咯唾日久濕熱所鬱上下凝結
皆無清白者也甚至帶血血敗則黑痰為關格異病人所不識又
清白者氣味淡久之漸成惡味酸醜腥臭焦苦不一總是濕熱為
源而云寒因熱用乃大誤也甫謂清痰則飲是也問亦有因於寒
濁痰則不可以言寒也

察色知痰

病痰者眼皮及眼下必如灰烟黑色舉目便知不待診脈眼堂黑
而面頰赤者熱痰也如大黃色者熱痰也心下煩滿口乾思冷飲

大便秘結小便赤久必生風或眩暈耳鳴眼花多虛證誤以熱證
治之脹久脉大實發大熱甚至中風此宜急下之凡眼黑而行步
呻吟舉動注骨者入骨痰也其證骨髓痛眼面俱黑四肢冷痺屈
伸不能此風濕也眼黑而氣短心驚恐氣痰也

痰飲之病總屬於脾

諸書論痰飲有因氣脉閉塞津液不通水飲停留結成痰者有胃
氣虛弱不能運行水谷成痰者有因酒後飲水停滯于脾成痰者
有風寒濕邪入脾相搏成痰者此證之所感不同難以類舉今脾
胃為倉廩以納谷因脾弱而不能運行致氣血失於滋養故不周
流氣道壅滯中焦不能腐穀遂停滯為痰為飲變則為寒為熱為

喘為嗽為嘔吐為反胃為腫滿為眩暈為風澗為噯氣為吞酸嘈
雜為噎噎為怔忡為疼痛之類不可盡狀皆痰之變而為病其源
出於脾濕不流水穀津液停滯之所致也

痰證條錄

痰者津液之異名血氣和平關絡調暢則津液流通而無痰患至
若氣脉窒塞腕竅凝滯則津停聚而成痰涎痰之所以發動者豈
無自而然哉大抵飲食酸寒辛辣炙煨腥膻生冷醇酒濕熱蒸鬱
而成痰者最多其次為七情久鬱而致者亦有矣凡治痰病須審
其因有痰而生熱者有因熱而生痰者有因氣鬱有因風火而成
痰者有因積飲有因傷宿酒而成痰者所宜審別而施治也

熱痰

則多煩熱咳吐頗難間有口乾

濕痰者多倦怠軟弱或面浮腹脹因停飲不散所致

風痰多稀白或成癰瘰奇證因形寒飲冷所致

驚痰發則心痛或為癲疾恐怖

食積痰多成痞塊癖滿因過食厚味及脾虛所致

酒痰飲酒過多不得消導次日又吐漸成及胃

氣痰攻刺走注不定或時一點如刺或時一掌如水皆為氣痰

丹溪云痰之為物隨氣升降無處不到是也

骨節動是痰凡人手臂或動不得或骨節遍身疼痛坐卧不安

此痰入骨也有人脚氣病久骨節痛與脚氣藥不愈此痰病也

嘈雜是痰 凡人胃膈一時如火烘炙似痛非痛忽然饑甚北人呼

為心刺此火動其痰也詳見本門

眩暈是痰 頭目眩暈眼前黑暗如坐舟車嘔吐欲吐者痰也詳見本門

煩躁是痰 凡人似熱非熱似寒非寒似病無病坐卧不寧心中焦

躁欲哭欲叫者痰病也審其人之虛實從痰治之立愈

顛狂是痰 凡人忽然發狂詭言錯亂棄衣登高此痰病也痰在膈

上使人顛狂或健忘詳見本門

顛仆是痰 凡人卒然跌倒不省人事痰病也雖氣虛治痰為先

中風不語是痰 雖曰中風亦以治痰為先詳見本門

小兒驚風是痰詳見本門

婦人產後最多十有八九蓋因產後因乳孩兒因月事方行驚因
虛而入結而成塊者為驚痰或常有一塊在腹如身孕轉動跳躍
痛不可忍者是也

活人書云中腕有痰亦令人憎寒發熱惡風自汗膏膈舌滿有類
傷寒但頭不痛項不強為異

脉候

脉要精微篇曰肝脉奕而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲
而溢入肌皮腸胃之外也

巢氏云偏絃為飲浮而滑為飲

仲景云脉雙絃者寒飲也或大下後善虛脉偏絃者飲也○脉飲

不絃但苦喘短氣○脉浮而細滑者傷飲○脉沉而絃者懸飲內
痛其人短氣四肢歷節痛○肝脉瀦甚為溢飲○沉者為留飲○
脉絃數有寒飲冬夏難治

脉經云病人一臂疼痛一時又移在一臂其人脉沉細非風也必
有飲在上焦

陳無擇云飲脉皆絃微沉滑

或云左右關脉大實者膈上有痰也可吐之○病人百藥不効關
上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如炭烟薰黑者亦痰也

丹溪曰久得瀦脉痰飲膠固脉道阻滯力牽難得開必費調理

治法

治痰飲以實脾燥濕為本

養育為百病中多有無痰世鮮知也古人用二陳湯治痰所以實脾土燥脾濕是其本之治也脾實而濕燥則痰自清而飲自散何變病之有王節齋謂二陳為實脾燥濕以治其標則誤也夫痰因脾濕為病之源久則變而為頑痰老痰之類當因其形證觀其緩急而分治之是則諸方皆以治標而後立者

逐痰理氣有所先後

嚴氏曰人之氣順則津液流通決無痰患古方治痰多用汗下溫利之法不若以順氣為先分道寸次之氣順痰飲亦順而下出矣此則嚴氏亦有所見而云然也玉機微義云順氣特一法耳要觀痰

之淺深有痰積膠固氣道因之而不得順宜先逐去積痰然後氣
可得順豈可專主理氣一法愚謂有理氣而痰自順者治其微也
有逐痰而氣方暢者治其甚也二者皆治痰之要也不可偏廢者
也但看痰與氣孰輕而孰重故施治有可急而可緩故曰逐痰理
氣有所先後

○張子和吐法論

痰在胃膈之上大滿大實非吐安能得出仲景曰大法春宜吐蓋
春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜吐也涌吐之藥或凡或
散中病即止不必盡劑過則傷人然則四時有急吐者不必直待
春時也但仲景言其大法耳今人不得此法遂廢而不行試以名

方所記者累數之如仲景傷寒論中以葱白豉湯吐頭痛

厚朴湯吐懊懷 **瓜蒂散**吐傷寒六七日因下後腹滿無汗而喘者

本事方稀涎散吐膈實中滿痰嗽失音牙關緊閉如喪神守真全

方以**鬱金散**吐頭痛胸運頭風惡心普濟方以**追風散**吐口噤不

開不省人事以**皂角散**吐涎潮摠錄方以**常山**吐瘧孫尚方以**日**

聖散吐狂神驗方吐舌不正內經名言高者越之王啟玄上盛不

已奪而吐之仲景曰宿食在上脘者當吐之又如宿飲酒積在上

脘者亦當吐之又曰病人手足厥冷兩手脉乍結以客氣在胃中

心下滿而煩欲食不能食者知病在胃中當吐之予今用吐法皆

是仲景方用**瓜蒂散**吐傷寒頭痛用**葱白豉湯**以吐雜病頭痛

或單瓜蒂散

名獨聖加茶末

少許以吐痰飲加金蝎稍

以吐兩脇

肋刺痛濯濯有聲者內經所謂濕在上者以苦吐之其是之謂歟
今人亦有竊予之法者然終非口授或中或否或涌而不能出或
出而不能止豈知上涌之法名曰擦痰擦之一字自有擒縱卷舒
近有醫工吐一婦人半月不止涎至數斗命懸須臾倉惶失計求
予解之予煎麝香湯下咽立止或問麝香何如止吐予謂之曰瓜
苗聞麝即死今吐瓜蒂所以立解也如藜蘆吐不止者解以葱白
湯石藥吐不止者解以甘草貫衆湯惟草木吐者解以麝香考之
本草吐藥之苦寒者有豆豉瓜蒂茶葉梔子黃連苦參大黃辛苦
而寒者有蔚金常山藜蘆甘苦而寒有地黃汁苦而溫者有木香

遠志厚朴辛苦而溫者有薄荷芫花辛而溫者有殺精草葱根鬚
辛而寒者有輕粉辛甘而溫者有烏頭附子火酸而寒者有晉礬
緩蒼虀汁酸而平者有銅絲甘酸而平者有赤豆酸而溫者有飯
漿酸辛而寒者有膽礬酸而寒者有白米飲辛鹹而溫者有皂角
甚鹹而寒者有食鹽青鹽甘而寒者有牙硝甘而微溫者有參蘆
甘辛而熱者有蝎稍凡此三十六味惟常山膽礬瓜蒂有小毒蒸
蘆罌花輕粉烏頭火有大毒外二十六味皆吐藥之無毒者各對
證擢而用之此法宜先少服不涌漸次加之余之擦痰者以釵股
鷄翎探引不出以虀汁投之投之不出再探之且投且探無不出
者吐至昏眩頭痛者飲以冰水立解如無冰水新汲水亦可飲壯

者一吐而安。弱者可三四次吐之。庶無損也。吐之次日頓快者。有轉甚者。蓋吐之傷而未平也。俟數日再當涌之。如覺渴者。新水瓜梨及涼物皆不禁。惟禁食飽厚饌乾舖難化之物。心火既降。中脘沖和。陰道必強。大禁房勞。大憂大怒。謹守禁忌。不信浮言。真知病證。訣可吐者。然後吐之。庶萬全也。

不可吐例

病人性行剛暴。好怒善謔。不可吐。

病人左右多雜之言。不可吐。

病人頗讀醫書。實非深明其理。疑而不決。不可吐。

主病者不能辯邪正之說。不可吐。

病人無定見妄言妄從反覆不定者不可吐

病勢熾危老弱衰朽者不可吐

自吐不止亡陽血虛者不可吐

諸吐血嘔血咯血衄血嗽血崩血失血者皆不可吐吐則轉劇

治飲證當上下分消水濕

子和云留飲一證也古人有五飲六證之分皆觀病之形狀而定

名也予詳飲之所得其來有五有憤鬱而得之者有困乏而得之

者有思慮而得之者有痛飲而得之者有熱而傷冷者得之飲證

雖多其因無出於此夫水陰物也但積水則成痰成飲在左脇者

同肥氣也在右脇者同息賁也入肺則嗽入腸則泄入腎則為涌

水入脾則為腫滿故在上則面浮在下則胛腫在中者為支滿否
噎痰逆在陽不去者久則化氣病在陰不去者久則成形著今之
用方例以飲為寒積皆用溫熱之劑補之燥之水濕未除反增大
孰豈知內經云留者攻之**導水丸****禹功散****十毒湯****三花神祐丸**之
類是也昔有病數年不愈子和診之左手皆微小右手皆滑而大
微小為寒滑大為燥以瓜蒂散涌其寒痰數升汗出如沃次以導
水凡禹功散去腸中燥垢亦數升其人半愈然後以痰劑流溫降
火開其胃口不逾月而瘥

燥熱藥治痰之誤

丹溪曰氣之初病其端甚微或因飲食不謹或外觸風雨寒暑或

內因七情或食味過厚偏助陽氣蘊為膈熱或資稟充實表密無汗津液不行清濁相干氣之為病或否或痛或不思食或噎腐氣或吞酸或嘈雜或膨滿不求病源便認為寒遽以辛香燥熱之劑投之數服時暫得快以為神方厚味依前不節七情又復相仍舊病被劫暫開濁液易於攢聚或半月一月前證復作如此延蔓自氣成積自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也醫猶不察復以香燥之藥久服過多血液俱耗胃脘枯槁漸成否痛噎噎之證此燥熱之誤也若夫用執藥其必挾虛寒之證或為外束風寒痰氣內鬱可以溫散或先踈導痰滯必當攻補兼施要在臨病制方隨時增減河間子和丹溪諸家治法靡不精詳或執或寒或攻或補究

其所屬合其所宜無施不當矣何熱藥之誤哉

半夏南星治痰辯

世人泥用二陳湯治痰不論風寒濕熱一槩施治凡無痰字堅執
二陳雖彌年不効亦不敢更變甚至佐之南星其誤何可勝言也
自王節齋氏雜著之論出而後醫者聞之其差知亦未必盡知之
也其曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有
惟夫氣血濁逆則津液不清蒸薰成聚而變為痰焉痰之本水也
源於腎痰之動濕也主於脾古人用二陳湯為治痰通用者所以
實脾燥濕治其標也標當然以之而治濕痰寒痰飲痰涎則固
是矣若夫痰因火動肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊

凝滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液隨氣而升卒為火鬱凝結而成歲月積久根深蒂固名曰老痰又曰鬱痰而其源即火邪病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰冷痰飲痰涎之比故湯藥難治亦非半夏南星茯苓蒼朮枳殼等藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而消化凝結之痰緩以治之庶可効耳故製**老痰丸**用黃芩海粉桔梗瓜蒌天門冬之類則二陳湯輩豈能觀効於萬一哉由此觀之半夏非但不能効於老痰若用之必反劇者大抵執泥丹溪有云二陳湯總治一身之痰之句竟不察夫新久寒熱每有用之痰結成膠聲不清咳不出者半夏之過也或者憾其辨之不早予

觀今之例執半夏南星而治痰者猶不少矣

治痰條例

痰在表者汗之在裏者下之挾濕者則分利之

痰在經絡中非吐不可吐中就發散之義

吐則有汗故曰發散

痰在膈上必用吐法瀉亦不去

稠痰膠固者必用吐脉浮者亦必用吐

氣實痰執結在上者吐難得出

痰在腸胃間可下而愈

凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗芽茶生姜

蘆汁之類

中焦有痰食積胃氣亦賴所養卒不可峻用攻之攻盡則虛矣
凡治痰用利藥過多致脾胃虛則痰反易生而多矣治痰病久滯
不通狀若寒凝不用溫藥道引必有推格之患况有風寒外來痰
氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱行滯也亦有峻用利藥過多則
脾氣愈虛津液不運痰反易生法當補脾胃清中氣則痰自運下
治痰用寒涼攻擊藥過多而痰不去此必脾氣虛而不運行也亦
須佐以溫補

肥人氣虛有痰宜二陳參朮

瘦人血虛有火當歸黃芩蒙石丸之屬

痰成塊吐咯不出氣鬱者難治

治痰藥味各有所能

痰在四肢非竹瀝不能達○痰在脇下非芥子不能除○痰在皮
裏膜外非薑汁竹瀝不能真達○熱痰火痰用青黛黃芩黃連天
花粉實者滾痰丸最効○老痰用海石瓜蒌貝母老痰丸之類○
風痰用南星白附子○濕痰用白朮蒼朮半夏○食積痰用神麩
山查麥芽○酒痰用天花粉黃連白朮神麩○痰因火盛逆上者
治火為先白朮黃芩石膏之類中氣不足加參朮○痰結核在咽
喉咯唾不出化痰藥加鹹能更堅之味瓜蒌仁杏仁海石連翹佐
以朴硝薑汁○二陳湯丹溪謂一身之痰都管治如要下行加引
下藥要上行加引上行藥噫斯言過矣按二陳不過治輕小飲食

之濕痰耳痰勢甚者宜各從其門戶如火炎上者用流金膏滾痰
丸膠固者老痰丸飲積者小胃丹之類是也如此對證尚有不
況二陳乎○潤下丸降痰最妙可以常服○小胃丹治痰飲必用
之藥實者用之亦二三服而已虛者便不宜多用○滾痰丸治火
痰必用之藥亦不宜多用○竹瀝導痰非薑汁不能行經絡○荆
瀝治痰速效能食者用之二瀝佐以薑汁治經絡中痰最效痰中
帶血者加蘆汁効○海粉熱痰能清濕痰能燥堅痰能軟頑痰能
消可入丸藥亦可入煎藥○南星治風痰濕痰半夏油炒大治濕
痰喘氣心痰○石膏墜痰火極効黃芩治熱痰假其下火也○枳
實去痰有冲墻倒壁之功○五倍子能治老痰人鮮知之○天花

粉治熱痰酒痰最効又云太治膈上熱痰○玄明粉治熱痰老痰
速効能降火軟堅故也○硝石礞石大能消痰結降痰火研細末
和白糖置手心舌舐服甚効○蒼朮治痰飲成窠囊行痰極効即
末又治痰挾瘀血成窠囊

醫案

虞博治一婦人因多食青梅得痰飲病日間胃膈中痛如刀割至
晚宵中痛止而膝髀大痛蓋痰飲隨氣升降故也醫作胃寒治用
乾姜良姜官桂烏附丁沉葶病日劇加之口渴小水淋瀝虞診六
脉洪數而滑作痰治與竹瀝服三日口不渴小水利但胃中與膝
之痛如舊用蘿蔔子汁研與半碗吐痰升許至夜痛尤甚丹溪所

謂引動其猖狂之勢耳次日用參蘆二兩逆流水煎服不吐又次日以苦參湯服又不吐又與附子製桔梗蘆皆不吐一日清晨用藜蘆末一錢麝少許酸漿水調服始得大吐半日得頑痰及飲約一小桶其痛如脫後以薄粥將理而安

傅治一人遍身作塊子如腫毒即痰也以二陳湯加白芥子姜炒黃連服數劑遂消

春甫治一婦人年二十身頗肥性急因氣惱後得痰咳嘔逆用二陳加順氣降火開鬱利痰之劑如水投石漸次效逆恠聲哈哈日夜不絕如縷昔人所謂欬逆連連五七十聲方已或三五七聲而已者此之謂欬逆也茲日夜連聲不息無乃死證歟脉浮而微洪

沉按小滑復以滾痰丸下之亦如故予意痰鬱滯胃脘胸膈之間而氣不得宣通欬逆而後能出非吐之不可遂以瓜蒂散酸漿水調鷲翔探吐得痰碗許而欬逆遂止寂然無聲而其効若神也逾二日因食麪及肉汁又復欬逆與清痰順氣藥不効予意前日吐痰不多尚有未盡再吐之又得痰半碗許即愈

治一丈夫年四十餘身肥素耽勞神有痰火一日先惡寒後發熱頭微痛眩多如不勝其重躁熱不退自用參蘓飲發汗不愈請予治診其脉沉洪而滑予謂痰火鬱積無疑矣以二陳加芩連天麻神麩之類復以滾痰丸下之三逾日反躁熱不退咳唾痰涎不止此正丹溪云痰在膈上非吐不可瀉之亦不去復用瓜蒂散探吐

五七十九食後或臨卧白湯送下

和劑二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或

因生冷飲酒過多脾胃不和此効

橘紅

半夏

梨各二錢

白茯苓

二錢

炙甘草 一錢

右作一服水二盞姜三片棗一枚煎八分食遠服

二賢湯 治一切痰飲

橘紅 用真正廣陳皮 刮去白一斤

炙甘草

食鹽 各四兩

右水五碗慢火者焙乾搗為細末白湯點服

一方橘紅四兩甘草

一兩

為細末點服治痰極有効世人但知用

南星半夏枳實茯苓之類何足語此有人腹滿壑痛服此利下

物數塊如彈子臭惡不可近腹滿疾豁然頓愈

和道痰湯 治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

陳皮

茯苓

甘草

半夏

南星

枳殼

炒各等分

右咀每服六錢水二盞姜十片煎七分食後服

王隱豁痰湯

治一切痰疾此方與滾痰丸相副蓋以小柴胡湯為主

合前胡半夏南星枳殼紫蘓陳朴之屬出入加減素花痰疾及肺氣壅塞者以柴胡為主餘者並去柴胡以前胡為主

柴胡

半夏

各二錢

人參

肺感有力者不用

甘草

紫蘓

陳皮

厚朴

之得痰半碗許彼畏苦而止予意痰少不能効燥熱如舊但以人參白虎湯五苓散合服亦不愈予謂鬱滯重吐難得出分利亦不去宜以散鬱之劑仍用二陳加前胡柴胡葛根桔梗蒼朮川芎姜汁炒苓梔三劑遂愈

藥方

通治脾胃痰飲諸方

歲五飲湯 一留飲在心下二僻飲在脇下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五留飲在腸間凡此五飲酒後飲冷過多所致

旋覆花

人參

陳皮炒去白

枳實

茯苓

澤瀉

厚朴姜汁炒

半夏

猪苓

白朮

各八分

前胡

桂心

芍藥

炙甘草

各五分

右水二盞姜十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁

秘方五飲丸 治一切停痰留飲理脾順氣消食寬胃

青皮

陳皮

去白各一兩

半夏

製

南星

製各二兩

枳實

炒

茯苓

各一兩

白朮

炒二兩

香附子

真蘊子

山查肉

神麩

炒各半兩

白礬

一兩

皂角

生薑

各二兩搗

右以南星半夏同皂角白礬生薑煮南星無白點為度以南星半夏焙乾同前藥為末竹瀝薑汁作糊為丸如梧桐子大每服

南星

薄荷葉

枳殼

羌活 各五分

右水二盞姜五片煎八分不拘時服中風者加獨活腎膈不利

者加枳實內外無熱者去黃芩治一切痰氣最効

明橘皮半夏湯 治痰壅咳久不已者常服潤燥解肌熱止咳

陳皮 半兩

半夏 製二錢半

右為末作二服水盞半姜十片煎七分溫服

藥 衛 大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓 各二錢

石水二盞姜五片煎八分溫服有熱加甘草

白木湯 治胃中虛損及吐痰者

半夏麴 半兩

白朮

木香

甘草 各一錢

茯苓 二錢

檳榔 二錢半

右為細末每服一錢生姜湯調下食前服

濟生 茯苓飲子 治痰飲蓄於心膈怔忡不已

赤茯苓

茯苓

半夏

麥門冬

陳皮 冬一兩

沉香

檳榔

甘草 各三錢

右咀每服八錢生姜五片煎八分食後溫服

指 痰苓丸 治人有臂痛不能舉手之或左右時腹轉移因伏痰在

內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下

故上行攻臂其脉沉細者是也但治痰則臂痛自止及婦人產

後發喘四肢浮腫者用此則愈

半夏製二兩

茯苓一兩

枳殼炒半兩

風化硝三錢半

右為細末姜汁煮麩糊丸梧桐子大每服三十丸姜湯下累有人為痰所苦夜間兩臂常覺如有人抽掣兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈立見功效

^藥導飲丸 治痰氣滯膈腕舌滿停飲不消頭目昏眩手足麻痺聲

重鼻塞神困多睡志意不清常服消痰進食忌猪魚麩

三稜煨各二兩

白木白茯苓

陳皮半兩

木香檳榔

枳殼製各一兩

青皮半兩

右為末滴水丸梧桐子大每服五十丸薑湯送下

宣明大人參半夏丸 化痰止咳定喘治諸痰不可盡述

人參

半夏

南星

茯苓

薄荷葉 各半兩

乾薑

白礬

寒水石

蛤粉 各一兩

藿香葉 各二錢五分

右為末糊丸梧桐子大薑湯

下三十丸食後或溫水下一方加酒炒黃連黃柏各二兩

木化痰丸 治傳痰宿飲

半夏

白茯苓 各一兩

前胡 半兩

桔梗 姜製

人參 各八錢

白朮

香附子 各一兩

梨實 炒

甘草 各半兩

右末薑汁煮糊丸梧桐子大姜湯送下四十九

金苓桂木甘湯 治心下痰飲胃脇肢滿目眩

茯苓

桂枝

白朮

各二錢

甘草

七合

右水煎服小便即利

脾胃食積濕痰諸方

指加味二陳湯 治酒麪積熱成痰手臂痛併痰攻眼腫及身麻痺

陳皮

半夏

茯苓

甘草

蒼朮

邵武薑黃

枳殼

炒各少許

右水二盞薑五片棗一枚煎八分食遠服

金痰苓湯 治胃中痰飲自吐清水後膈間虛氣滿不能食服此消

痰氣能飲食

茯苓

人參

白朮

枳實

橘皮 錢半

生薑 半兩

水二盞煎八分温服

娘茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾

胃之間當先實脾胃

茯苓

半夏

白朮

神麴 炒各一錢

麥芽

炒錢半

陳皮

天麻

右作一服水二盞薑五片煎八分食前服

紫胡半夏湯

一名補肝湯

紫胡

蒼朮

半夏

白茯苓

神麴 炒

藁本

升麻

各一錢五分

右水 麥蘆五片煎八分食遠服

和劑 小羊夏湯 治心下水支痰飲嘔吐痞滿

半夏 下錢 生薑 二錢半 水二盞薑五片煎八分服

仲景 五苓散 治瘦人臍下悸動吐涎沫而頭眩者水也

白朮 各二錢 猪苓 各一錢 澤瀉 各一錢

肉桂 五分 右水二盞煎七分食遠服

王棧 澤瀉湯 治心下有支飲其人苦眩冒

澤瀉 五錢 白朮 二錢 水二盞煎七分食遠温服

根 驅痰飲子 治痰飲頭痛背痛飲食嘔惡皆痰飲之證

南星 製 半夏 製 陳皮 去白 青皮 各一錢

赤茯苓

草果各五

右水盞半薑七片棗一枚煎七分通口服遇飲酒時先進一服

酒後醒來或次日再進一服永無痰疾

百選三仙丸 治一切濕痰痰飲胃膈煩滿痰涎不利頭目不清

商星

半夏

香附子各製各五兩

右用商星半夏泡過為末用生薑自然汁和不可大軟用楮葉或荆葉包住以蒲包再包會令發黃色晒乾收之須是五六月內造如會麩法每製丸藥用星半二兩香附一兩同為細末煮麩丸如菜豆大每服四十九食後薑湯下

和半夏白朮天麻湯 治脾胃虛弱不能運化食積痰厥頭眩嘔吐

等證 方見脾
胃門

丹保和丸 治積食痰滯胃膈飽悶嘔吐痰涎 方見飲
食門

學神木丸 治痰飲

茅山蒼木 製一
斤 生油麻 半兩水二
蓋
研細取漿

大棗 十五枚
爛取肉

右三味和丸梧桐子大日乾每服七十丸空心温酒下

丹星半丸 治濕痰

南星 半夏各製
一兩 蛤蚧 三兩

右為末姜湯泡蒸餅丸青黛為衣每服五十姜湯送下

二木丸 治濕痰

白木 六錢
炒

蒼木 三錢
炒

芍藥 二錢
半

香附子 錢半

右為末蒸餅丸服

清痰丸 專清中脘食積熱痰

南星

半夏

神麩

山查

香附子

陳皮

去白各一兩

青皮

枳實

蒼朮

黃芩

烏梅

枯礬

滑石

乾薑

各半兩

右為末湯浸蒸餅為丸服

東垣小黃丸 化痰涎除濕飲消胃氣利膈

黃芩 一兩

半夏

白朮

各兩半

乾薑 五錢

澤瀉 三錢

黃芪

錢

右為細末蒸餅丸如菉豆大每服五十丸溫水送下

黃瓜萹丸 治食積痰壅滯喘急

瓜萹仁

半夏

山查

神麩炒各等分

右為末瓜萹汁丸姜湯下五十丸

半夏丸 治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅悶短氣煩心

風痰壅竇頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡心神思昏沉心悸面熱

涕唾稠粘並皆治之

集成潤下丸 治膈痰降痰甚妙

陳皮去白一斤 甘草炙一兩

右為末蒸餅丸棗豆大每服五十丸白湯下

秘方在粉瓜萹丸 治一切頑瘡結滯咯吐難出久嗽不已氣寒妨悶

三才全書統痰飲 卷之四十三 三十四

痰火勞嗽並効

瓦礫子

一名蚶子將殼火煨醋淬二次研為極細末

黃瓜萹

霜後黃熟時取穰并子和瓦礫爛搗成膏為餅

廣陳皮

去白各等分

右各精製晒乾為末湯浸蒸餅為丸菜豆大每

服八十九食後臨卧姜湯送下

法製竹瀝丸

清熱降火化痰利膈止嗽止嘔吐進食開胃治勞嗽

陳皮

去白

白朮

炒

白茯苓

各三兩

炙甘草

半夏

麩

貝母

枳殼

神麩

桔梗

黃芩

各三兩

玄明粉

一兩

香附子

製一兩

右為粗末用大磁盆以竹瀝一碗入薑汁酒半盞和勻拌諸藥

日中晒乾仍依法入竹瀝薑汁拌晒七次為度磨羅為細末
水丸如菜豆大食後或卧時白湯送下八十丸三日便見効驗
久病者七日効疲者一月全愈此方得之海上道人秘密不傳
予求以治痰火効如嚮應不敢自私公於天下共倡醫道云

製竹瀝法

詳見製法備錄

凡取竹瀝大約宜於春夏間而竹有汁多凡筍可食其竹可用
金竹桂竹尤佳其竹節高味甘勝於大猫竹江南最多

人痰者痰證

經流金膏治一切火痰咳逆等證

白石膏

微煨研細末無滓為度

大黃

錦紋者不見鉄器搗碎如豆大好酒浸半日蒸熟

乾須九二兩
為度各二兩

片黃芩 酒洗

橘紅 各兩

連翹 去枝酒洗

川芎

桔梗

貝母 各一兩

陂膽南星

蘓州薄荷葉

香附子 各半兩

右各精製為極細末煉蜜為丸

彈子六午後或臨卧細嚼一丸忌酒麪諸濕熱物

臆黃芩二陳湯 治熱痰

黃芩

陳皮

半夏

茯苓 各一兩

甘草 五分

右水盞半姜三片煎七分食遠服可隨證加味

清膈導痰湯 治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出咳嗽稠粘

黃芩

貝母 各一兩

桔梗

甘草

陳皮 各一兩

天花粉

瓜蒌仁

白朮

白茯苓各八分

石膏

朴硝各錢半

右水二盞加竹葉二十箇洗淨揉爛煎八分食遠服

仲景小陷胷湯 治熱痰胸膈不利石滿喘嗽

黃連

瓜蒌仁

半夏各二錢

右先以水二盞

煎瓜蒌仁一盞半下二藥同煎八分溫服未利再服

節齋老痰丸 潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間

肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心肺之分俱宜

開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳

天門冬去心

黃芩酒炒

海粉另研

橘紅去白各一兩

連翹半兩

桔梗

香附子

淡鹽水浸炒各半兩

青黛另研一錢

芒硝另研二錢

瓜蒌仁另研一兩

右為細末煉蜜入姜汁少許和藥杵勻丸如龍眼大噙嚼一丸

清湯送細嚥之或丸如棗豆大淡姜湯送五六十丸此等老痰

大率飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故鬱結而

成痰也此方天冬黃芩瀉肺火海粉芒硝鹹以突堅瓜蒌潤肺

消痰香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥之藥

煉黃芩利膈丸 利膈上熱治胃中痰

生黃芩

炒黃芩各一兩

半夏

南星

黃連

枳殼

白茯苓

陳皮各二錢

澤瀉半兩

白朮一錢

右為細末滴水為丸梧桐子大每服五十丸食遠白湯

嚴氏瓜萸半夏丸 治肺熱痰嗽

瓜萸仁另研 半夏製各一兩

右為細末浸蒸餅為丸梧桐子大每服五十丸姜湯下

丹清氣化痰丸 治上焦痰火壅盛咳嗽煩熱口渴胸中否悶

南星製三兩 半夏 黃連各五兩

瓜萸仁 茯苓 杏仁去皮尖四兩

枳實炒各六兩 甘草二兩 陳皮

右為細末姜汁煮糊丸梧桐子大每服五十丸姜湯下

清膈化痰丸 清熱去濕利痰

黃芩

黃連

黃柏

山梔

香附製

蒼朮

右為細末滴水為丸梧桐子大每服五十丸白湯下

青黛丸 治熱痰咳咯不出

青黛

瓜蒞仁

黃芩

香附子

貝母

橘紅

右為末湯浸蒸餅為丸梧桐子大每服五十丸白湯下

青礞石丸 清熱化痰燥濕重在風化硝

南星

半夏

黃芩煨汁

茯苓

枳殼

青礞石

風化硝

各以皂角明礬水浸二宿切片曬乾

如法煨

一兩

右為末神麩糊丸梧桐子太母服五十九白湯下

周府黃芩半夏丸 治上焦有熱咳嗽生痰

黃芩

半夏製各一兩

右為細末薑汁糊丸梧桐子太每服七十九姜汁湯下

集加味洞下丸 治前症

橘紅半斤食鹽一兩微以水拌半日

南星製

半夏製

黃芩

黃連

甘草各一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸梧桐子太每服五十九白湯下

風痰者方

和劑干紙湯 治風痰壅盛喘急日夜不得卧人扶而坐者一服立愈

半夏製者

皂角灸去皮 弦一寸

甘草炙 寸

右作一服水一盞姜三片煎七分温服

直指星薑湯 治風痰

南星五錢 筒製

老生薑三錢 半

右咀水三盞煎去半遂渐温服

浪省風湯 治厥痰

半夏四錢

防風二錢

炙甘草一錢

右為細末分二服每服水一盞薑十片煎七分去渣無時服

醫林 辛芎散 治熱痰壅塞頭目不清語音不出服藥不解乃是熱蒸

風痰所致服此即愈

細辛

川芎

防風

桔梗

白朮

羌活

桑白皮炒

薄荷葉各一兩

甘草五分

右水二盞姜三片煎八分食後溫服

丹搜風化痰丸 治一切風痰

人參

槐角子

僵蚕

白礬

陳皮

天麻

荆芥各一兩

半夏製四兩

辰砂半兩另研

右為末姜汁浸蒸餅為丸辰砂為衣每服四十丸姜湯下

醫林辰砂化痰丸

治風化痰安神定志止咳除堅

辰砂另研

明礬另研各半兩

南星製

半夏麩各一兩

為細末姜汁糊丸藜豆大朱砂為衣每服三十丸食後姜湯下

玉芝丸 治風痰咳嗽

人參

白茯苓

薄荷葉

明礬枯

南星製各二兩

半夏麩六兩

右為細末姜汁打糊為丸梧桐

子太每服三十丸食後姜湯下風盛薄荷湯下

和劑 玉壺丸 治風痰

南星製

半夏製各二兩

天麻

白礬各半兩

右為細末姜汁打糊丸如胡楸大每服三十丸白湯下

良方 豁痰丸 治風痰壅盛

南星製

半夏各二兩製

白附子

直殭蚕炒各一兩

華陰細辛

白礬 枯

全蠍 各三錢

右為末皂角煮汁作糊丸梧桐子大每服三十丸薑湯下

楊水煮金花丸 治風痰咳嗽

南星

半夏 生用各一兩

寒水石 一兩煨存性 天麻 五錢

白麩 三兩

雄黃 一錢

右為細末滴水為丸小豆大每服五七丸至百丸煎沸湯下

藥丸者浮為度澇出淡漿浸另用生薑湯下

和青州白丸子 治風痰 方見風門

娘天南星丸 治婦人風痰

天南星 泡

半夏麩

白附子

皂角子 炒

晉礬枯半兩

右為細末薑汁糊丸姜湯送下

靈砂白丸子治元氣虛弱風痰壅盛嘔吐不已

靈砂另研

白丸子各一兩

右為末和勻以生姜自然汁打

黍米糊丸梧桐子大每服三十丸空心棗湯下



楊氏丁香茯苓湯治脾胃虛寒宿飲留滯否塞不通氣不升降以致

嘔吐涎沫或嘔酸水不思飲食

半夏製

陳皮去白各兩半

丁香

附子製各半兩

木香

乾姜炮各一兩

肉桂

砂仁各半兩

茯苓兩半

每服四錢水二盞姜七片棗一枚煎七分服

半夏溫脾湯 治中脘痰飲冷氣心下汪洋嘈雜多噦清水脇脹

不食此脾胃虛冷所致其脉沉細遲絃

旋覆花

細辛

桂心

人參

陳皮

桔梗

芍藥

甘草

半夏 製各五分

右水盞半夏三片煎七分食遠服

和五膈寬中丸

治脾胃虛寒不行津液氣鬱停痰遂成噎噎

方見本門

新法半夏湯

治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水胃脇腹滿頭暈

惡心不思飲食

砂仁

神麩 炒

陳皮

草果 各半兩

白豆蔻

丁香 各二錢

大半夏 二兩

甘草 一兩

右為細末每服二錢先用生姜自然汁調成膏入炒鹽湯點服

良御方愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香 五分

砂仁

芍藥

檀香

茯苓

官桂

藿香 各一錢

陳皮

乾葛

良薑

丁香

甘草 各二錢

右作二服每服水盞半煎七分不拘時服

和劑丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀故痰飲羣

結嘔吐惡心脹滿不食

丁香

木香

青皮

陳皮 去白半兩

乾薑 炮

白朮

良薑

茯苓 各一兩

南星

製

半夏

製各二兩

右為細末神麩大麥芽各二兩

為末煮糊丸梧桐子大每服七十丸溫湯下

半夏丁香丸 治脾胃宿冷胃膈停痰嘔吐惡心吞酸噯醋心腹

否滿不思飲食

肉豆蔻

丁香

木香

藿香

人參

陳皮

去白各二錢

半夏

製三兩

右為細末生薑汁煮糊為丸梧桐子大每服三十丸姜湯下

溫中化痰丸 治停痰留飲胃膈否滿頭目眩暈惡心咳嗽痰涎

陳皮

青皮

良薑

乾薑

悅各二兩

右為細末醋煮糊丸梧桐子大每服三十丸空心米飲送下

倍木丸 治五痰飲證

乾薑炮

肉桂去皮各半斤

白木炒一斤

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服三十九空心米飲送下

治順元散 治氣虛氣中痰厥虛寒厥冷不得睡卧

南星製一兩

川烏製

附子製各半兩

木香二錢半

右咀每服三錢水一盞姜十片煎七分熟服

黑錫丹 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯涸一應下虛

之證及婦人血海久冷無子赤白帶並宜服之

方見頭

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜奔降陰陽安和

五臟扶助元氣

水銀 一斤

硫黃 四兩

右以硫黃新鐵杓化開次入水銀炒成砂子入固濟罐內以鐵燈盞封口塩泥赤石脂固定三釘在地上架住罐子四圍磚搗以文武火煉一日罐子通紅為度冷定取下則成靈砂研極細末糯米糊丸麻子大每服二十粒空心米飲下此靈砂即煉銀硃市中確口砂是也

三強中丸 治胃脘虛寒痰飲留滯吞塞不通氣不升降

高良薑

乾薑 炮

陳皮

青皮 各一兩

半夏 製二兩

右為細末生薑汁煮糊丸梧桐子大每服三十九薑湯下

八味丸 腎氣丸 並治虛寒痰飲 方見虛損門



和劑 四七湯 治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核咯之不出

嚥之不下併治中脘吞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏 三錢

茯苓 二錢四分

厚朴 一錢六分

紫蘇葉 一錢二分

右水二盞姜五片棗一枚煎七分服

丹 香莎丸 調中氣散鬱痰

香附子

蒼朮 各四兩

黃芩 二兩

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十九丸白湯下

中和丸 治濕痰鬱熱

蒼朮

黃芩

半夏

香附子

各等分

右為細末姜汁打神麩糊為丸梧桐子大每服七十九白湯下

清痰丸 專清中脘食積熱痰

南星製

半夏

神麩炒

山楂

香附子製

陳皮去白各一兩

青皮

枳實

蒼朮

黃芩

烏梅

枯礬

滑石

乾薑炮各半兩

右為末湯浸蒸餅為丸服

殭蚕丸 治鬱痰

白殭蚕

瓜蒌仁

杏仁

訶子

貝母

伍倍子各等分

古今醫考卷之二 卷之二 四十三 三十四

右為末粥糊丸梧桐子大每服五十九丸白湯下

良方前胡半夏丸 治感冒停痰咳逆

前胡

半夏

茯苓各一錢

陳皮

紫蘇

枳殼

木香

甘草各五分

右水二盞姜三片烏梅一箇煎二盞食遠服

喘痰諸方

和劑干縉湯 治風痰壅盛喘促不能睡一服則安

半夏製

南星製各二錢

皂角一寸

甘草錢

右水一盞姜三片棗一枚煎七合溫服

蘓子降氣湯 治痰喘氣逆方凡

瓜蒌丸 治食滯痰壅喘急如神

瓜蒌仁

半夏 製

神麩 炒

山查 各等分

方為末瓜蒌水為丸每服五十丸薑湯下

杏仁來復丹

治痰喘

即來復丹加杏仁方見固冷門

和葛花解醒湯 方見飲復門

治酒滯宿痰留積胃膈痞滿

半夏湯 消酒痰宿飲舌滿

半夏 製

橘紅

桔梗 各一兩

枳實 炒半兩

右咀每服五錢水盞半姜五片煎八分服一加黃連砂仁各一錢

御愛紫宸湯 方見前

成集白龍丸 治酒積有痰

半夏

白茯苓

白礬各等分

右為末神麩糊丸如菉豆大薑湯下

吐痰方

瓜蒂散

瓜蒂七枝

赤豆同上

右為細末每服一錢或錢半量虛實加減空心溫薑汁調服

和獨聖散

瓜蒂不拘多少

右為細末每服一錢或一錢薑汁調服脇痛加

全蝎頭痛加爵金同服吐

茶調散 一名二仙散

瓜蒂 二錢
好茶 一錢

右為末每服二錢壅汁調服

稀涎散

猪牙皂角 炙去皮 弦一兩

藜蘆 五錢

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

三聖散

瓜蒂 一兩剉炒微黃 研末滓再炒研

防風 一兩

藜蘆 三錢去苗去心

右為粗末每服約半兩以壅汁三茶盞先用 盞煎三四沸去

壅汁次入一盞煎至三沸却將原二盞同一處然二三沸去滓

澄清放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度

五入... 卷之四十三 三十六

蔚金散 輕劑

蔚金

滑石

川芎 各半

右為細末每服一二錢空心薑汁調下

青黛散 吹鼻

猪牙皂角 一條 胡索 一粒

青黛 少許

右為細末鼻內灌之其涎自出

元勝金花

薄荷 半斤

瓜蒂 半斤

藜蘆末 一兩

猪牙皂角 一兩

朱砂 半兩

右將皂角灸去皮筋提碎水一升與薄荷一處

採取汁熬成膏另將藜蘆等研勻用膏子和丸龍眼大以餅朱

痰甚者量加之

妙應丸 治諸痰

控涎丹加下項藥 驚痰加朱砂 痛者加全蝎 酒痰加雄黃全

蝎 驚氣成塊者加川山甲黨甲玄胡索蓬木 臂痛加水蠶

子去油官桂 熱痰加盆硝 寒痰冷飲加胡椒丁香肉桂

曠三花神祐丸 治一切濕熱沉積痰飲變毒諸病或風熱燥鬱收

體麻痺走注疼痛風痰涎嗽氣血壅滯不得宣通等證

芫花 大戟 甘遂各半兩 黑丑取頭末二兩

大黃一兩 輕粉一錢

右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下日

三服快利為度痞滿甚者初多服頓攻不開反加痛悶則初止
可服二三丸每服再加二丸快利則止

已上五方皆是攻結破飲藥性之有毒者非此瞋眩厥疾弗瘳
誠不得已而用之也醫者須要量人虛實不可輕率也

隱滾痰丸 治一切濕熱食積等痰窠囊老痰

大黃 酒蒸

黃芩 各半斤

礞石 紫一兩

沉香 五錢

右為細末滴水為梧桐子大每服三五丸量人強弱加減

隱括其方詩曰

酸裏翻身甲掛念 於今頭戴草堂深 相逢二八求斤正

硝煨青礞倍若沉 十七兩中零半兩 水丸桐子意常真

砂為衣温酒化下一丸以吐為度得吐知人事者愈不知者不
救或謂不吐唾痰涎不須吐法有痰飲凝結膈阻寒清氣或
咳而不已或悶昏沉或悸怖健忘如此諸證真宜吐涌若謂
無顯而不吐病何由安

厚朴大黃湯 治肢節脇滿痰飲為患

厚朴 一錢

大黃 五錢

枳實 八分

右水二盞煎八分温服即傷寒 **淨氣湯** 是也

十棗湯 治懸飲內痛

芫花 醋拌經宿 炒黑勿焦 甘遂 煨 麩包

大戟 長流水煮半時 晒乾各等分

右為細末水盞半煮大棗十枚至八分去棗內藥末強人一錢
弱人五分平日服之不下更加五分決下徐以糜粥自養

三因小胃丹 上可去膏膈之痰下可利腸胃之痰

芫花

甘遂

大戟 各一兩

大黃 酒拌蒸一兩半

黃柏 炒褐色二兩

右為細末粥丸麻子大每服十丸溫湯下

三因控涎丹 凡人忽患膏背手足頭項腰膝隱痛不可忍筋骨牽引

鈞痛時時走易不定乃是痰涎在心膈上下變為此疾或手足
冷痺氣脉不通誤認癰癩非也

甘遂 製

大戟 製

真白芥子 各等分

右為末糊丸梧桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十丸

千般恠證如神効 水瀉隻身却不任

凡服痰丸之法必須臨睡就床用熱水一口許只送過咽即
便仰卧令藥在咽膈間徐徐而下如日間病出不測疼不可忍
乾嘔惡心必即徐差者須是二依臨睡服法多半日不可飲食
湯水及不可起身坐行言語直俟藥氣除遂上焦痰滯惡物過
膈入腹然後動作方能中病每次須連進兩夜所服次日痰物
既下三五次者夜減十九下一兩次者仍服前數下五七次或
只下二三次而病勢頓已者次夜減二十九頭夜所服並不下
惡物者次夜加十九壯人病實者多至百九唯狂痰動實及暴
卒惡候多服無妨大抵服罷仰卧咽喉稠粘壅塞不利者乃痰

氣泛上藥病相攻故也少頃藥力既勝自然寧貼徃徃痰病日
久結實於肺胃間或只暴病餘無泛溢者服藥下咽即仰臥頓
然百骸安靜五臟清寧寤寐佳境如遊華胥氏之國和悅何可
云喻大抵次早先去大便一次其餘遍次皆是痰涕惡物亦有
看是澹糞用水攪之盡繫痰片粘涎或百中有一稍稍腹痛腰
背拘急者蓋有一種頑痰滯秘裏急後重狀如痢疾片向即已
若其痰涎易下者其為快利不可勝言頓然滿口生津百竅爽
快間有片時倦怠者蓋為病苦不安一時為藥所勝體氣整和
似醉初醒如浴方出如暈初起則非虛倦也此藥並不洞瀉元
氣但能取痰積惡物次第穿鑿而下腹中糟粕並不相傷非比

神祕丸小胃丹之毒藥精悍多服必傷人凡服者當自知之
一切新久失志喪心或顛或狂等證每服百丸人壯氣盛能食狂
甚者一百二十丸以効為度

一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或通或結者每服八九十九壯實
者加之常服三三十九則無大便秘結之患自然上清下潤

一切陽證風毒遍身遊走痠痛每服八九十九未再加

一切無病之人遍身筋骨平日疼痛不能名狀者每服七八十九
未効加之以効為度

一切頭痛又非頭風牙痛或腫或瘡每服八十丸

一切噎氣吞酸致於噎逆膈氣及胃脘腹中氣塊冲上嘔吐涎飲

狀如翻胃者每七八十九未効再服

一切心下怔忡如畏人捕牀惕不安陰陽關膈變生乖證每服七八十九甚者加之

一切新久痰氣喘嗽或嘔吐痰沫或痰結貫熱或頭運目眩每服七八十九老人虛弱者四五十未効加服

一切急慢喉閉赤眼每服八九十九腮頰腫硬繞項結核者瘰癧之狀正宜服之口糜舌爛咽喉生瘡者每以五六十九同蜜少許一處嚼碎噙睡徐徐嚥下此少口瘡等證只以二三十九如前噙嚼二三夜即差

一切荏苒之疾男子婦人之患非傷寒內外之證或酒色吐血或

月水愆期心煩志亂或腹滿脇痛或背脹腰疼耳聾鼻乾痰疼
燥熱乾嘔惡心諸般疼痛百藥不効病者不能喻其狀方書未
常載其疾醫者難以別其證並依前法加減服之無不全愈

拔毒飲枳實丸 逐飲消痰真滯清膈

枳實炒

半夏製

陳皮去白

黑牽牛取頭末各三兩

右為末糊丸梧桐子大每服五十丸薑湯下

御藥滌痰丸 治三焦滯氣胃膈痞滿咳唾稠粘面上赤熱肢體倦怠

不思飲食此藥下痰飲消食快膈

木香二錢

檳榔

半夏製

三稜各半

青皮

陳皮

枳殼各三錢

大黃一兩

黑牽牛二兩 炒

右為細末麩糊丸梧桐子大每服三十丸食遠薑湯下

開結枳實丸 宣導滯氣消化痰飲專治嘔逆惡心宿醒不醒宿

物停滯兩脇膨脹咽嗝不利上氣咳嗽等疾

枳實炒

白木炒

半夏製

南星製

白礬枯

苦葶藶炒

青皮

大黃各五錢

木香三錢

黑丑頭末 二兩

大皂角炙去一皮弦

旋覆花各一兩

右為細末姜汁煮糊丸梧桐子大每服五十丸姜湯下

婦人乾嘔喘氣滿悶或面目浮腫小便不利姜葱湯下

子濟川丹即濟川散治一切痰飲十種水脹

甘遂 類白 煨

芒硝 各二錢

郁李仁 一錢

大黃 三錢

牽牛末 三錢

右為末滴水丸梧桐子大每服五十丸溫水下

聖惠舟車丸 治五飲痰積腫脹

甘遂

大戟 醋炒

芫花 醋炒各一兩

大黃 二兩

木香

檳榔

青皮

陳皮 去白各五錢

牽牛 頭末 四兩

輕粉 一錢

右為末水糊丸梧桐子大每服五十丸臨卧溫水下以利為度

醫林烏巴丸

治腎膈久為頑痰所害積成痰氣面目清白色腫浮不

思食遍身痛夜間氣壅不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側

屢用南星半夏黑錫靈砂墜之不下取之不出此是頑痰堅滯

宜此藥利下頑痰如魚腦則愈未利再服

烏梅肉 二兩

巴豆 五粒 研 去油

右用水二碗沙銚內將烏梅肉

煮爛候水稍乾入巴豆將竹片攪候如稠糊取出爛搗丸梧桐

子大每服七丸九丸十丸十一丸或十五丸姜湯下不拘時

土透羅丹 治痰實咳嗽胃膈不利

皂角 酥炙去皮 一兩

黑丑 微炒

半夏

大黃 各一兩

巴豆 去油 另研

杏仁 去皮尖炒 各一錢

右為細末姜汁為丸梧桐子大每服三十丸食後姜湯下

醫 墜痰丸 治痰飲風痰等證

黑丑 頭末 二兩

枳實

枳殼 半兩

白礬 枯

一方 治風痰用**尉金**一分**藜蘆**十分為末每服一字用溫漿水一盞

先以少漿水調下餘水漱口都服便食物壓之

一方 治痰暈用**白礬**枯為末姜湯調下吐之即愈

一方**回生丹**治痰厥氣絕心頭溫者取古塔上**陳石灰**一合水一

盞煎滾去水再用清水一盞煎極滾澄清罈口灌之痰下自蘇

一方**化痰丸**用天絡絲即絲瓜也通條燒存性為細末棗肉為丸彈子

大每服一丸好酒化下之可化痰

一方 治風痰壅塞大便秘滯用**蜣螂**大者一枚小者一對新瓦

上焙乾存性為末好酒調下不能飲酒者以滾水各半服大便

即通其効如神 蜣螂名推糞虫以其性能推糞下行通塞故也

一方 治痰飲奇効以瓦礫即海不拘多少炭火煨研末候

疔黃熟時正搗和瓦粉作餅子晒乾為末用蜜湯調一錢或

入諸藥為丸其効過於海粉多矣

造蛤粉法 此可代海粉用能化酒痰頑痰有謂此粉即海粉非

也秦州紫口蛤蜊以炭火煨成粉候瓜萋熟時同粉搗爛作餅

子竹囊懸風處陰乾次年聽用入丸藥為極細末入煎藥為咀

道引法

左右側卧不息十通治痰飲不消右邊飲積左側卧左邊飲積

右側卧又有不消氣排之左右各十有二息治痰飲也

古今醫統大全卷之四十三

終

朴硝風化

猪牙皂角各三錢炒

右為細末蘿蔔汁和丸菜豆

大每服五十九平日時服初下糞次下痰

瑞神竹仙墜痰丸

大皂角灸去皮弦子一兩六錢

白礬一兩二錢

黑丑取頭末四兩

右為細末滴水丸梧桐子大每服五十九空心温酒下

醫林破痰丸 治痰飲心腹痛立効

萹撥

胡椒

丁香

木香

砂仁

蠋稍

烏梅肉

青皮

巴豆去殼各等分

右以青皮同巴豆入漿水內浸一宿次日同炒

青皮焦去豆為末水浸烏梅肉湯泡蒸餅碾和成膏入藥和勻

九菴豆大每服十九至十五丸不拘時姜湯下

秘方沉香和中丸 治一切痰氣壅盛

陳皮

青皮

枳殼

黃芩

各一兩

木香

礞石

製各半兩

大黃

黑丑

頭末各一兩二錢

檳榔 一兩

沉香

二錢

滑石

二兩

右為細末滴水丸梧桐子大每服五十九臨卧茶清下

易簡諸方

御藥方

治胃中有痰癍癖者

白礬

一兩水二升

煮一升入蜜一合

更煮少時温服須臾即吐如未吐再飲熟水必盡吐痰為効

一方

治膈壅風痰以

半夏

洗淨為末

薑汁

和為餅子濕紙包煨

熟水二盞餅子一塊彈子大入鹽五分煎一盞食遠溫服

一方 治痰涎囁塞以**檳榔**為末每服食後白湯調下二錢

一方 治痰飲流注疼痛以**大半夏**二兩洗淨為末**厚朴**二兩姜汁

打糊丸梧桐子大姜湯下十五丸痛在上臨卧服在下空心服

千金翼方 治痰飲吐水用**赤石脂**一斤為細末每服方寸匕酒飲

任下漸加至三七服盡終身不吐痰水又不下痢按本草赤石

脂補五臟令人肥健有人痰飲吐清汁諸藥不効用此遂愈

一方 治頑瘡不化以**石膏**一兩**石綠**半兩俱水飛末麩糊丸梧桐子

大空心白湯下四十九五日十日一服輕者半月一服

一方 治冷痰寒飲惡心用**皂揆**一兩食前用清米飲調下五分

勝金方 治風痰**白姜蚕**七細研以姜汁一匙溫水調灌

又方 治風痰**羅蔔子末**溫水調一匙良久吐涎沫愈

一方 消痰潤燥以**貝母**為末和沙糖為丸龍眼大嚼下能止咳

經驗方 治胃膈氣滯煩悶痰飲不利頭目不清**皇**括去皮

半夏湯泡七次各五兩為末以姜汁和為餅以楮葉蓋之令發

黃色曬乾須五六月內做合時用**香附子**一兩製以成麩二兩

共為末水糊丸梧桐子大每服四十九食後姜湯下

一方 治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩**桑葉**泡焙

乾白茯苓等分煉蜜丸梧桐子大每服三十九食遠熱水下

一方 治風痰食不消化大便秘澀**訶子**枚搗調酒服三五度良