



AMSTELODAMI, Sumptibus } JOANNIS VAN SOMEREN et JOANNIS VAN DYCK.
HENRICI et Viduæ THEODORI BOOM. A° 1702. CLXXXII.

QK 349.7
.R4
1682-83
c. 1
v. 3-4
Cob 18
1-4

H O R T I
I N D I C I
M A L A B A R I C I
P A R S T E R T I A
D E
A R B O R I B U S
R E G N I M A L A B A R I C I,

Latinis, Malabaricis, Arabicis, & Brachmanum Characteribus nominibusque expressis,

Unà cum Floribus, Fructibus & Seminibus, naturali magnitudine à peritissimis
pictoribus delineatis, & ad vivum exhibitis.

*Addita insuper accuratâ earundem descriptione, quâ colores, odores, sapes, facultates,
& præcipuè in Medicina vires exactissimè exhibentur.*

A D O R N A T A

Per Nobilissimum ac Generosissimum D. D.

HENRICUM VAN REEDE, TOT DRAAKESTEIN,

Toparcham in Meydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Confessus
apud Indos Belgas Senatorem Extraordinarium; nunc vero Equestris ordinis nomine
Illustribus ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum,

E T

J O H A N N E M M U N N I C K S, M. D.

In eademque facultate Anatomies ac Botanices in Academia Ultrajectina
Professorem, & Reip. Ultraj. Poliatrum.

Notis adauxit, & Commentariis illustravit

J O H A N N E S C O M M E L I N U S.



Mo. Bot. Garden,

1883
A M S T E L O D A M I,

Sumptibus Viduæ JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van DYCK,
& HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM.

Anno cId Idc LXXXII.

1682

PRIMARIO NOBILI IN MALABAR

POTENTISSIMO PRINCIPI

NOETAVILE-VIROLA

R E G I

Pedinbodappe-Sourowan, Courour, Peratevide,
Ellerta-Sourowan, Cochin, &c.

S. P. D.

HENRICUS VAN REEDE TOT DRAAKESTEYN.



*Quoties Malabaricas stirpes animad-
verto, toties mihi collectionis, depictio-
nis ac descriptionis occasio ante oculos
versari videtur: Eorumque memoria,
quorum ope in colligendo usus fui, sæ-
pius recordor. At majestatis tuæ, ingentis Horti
Malabarici Domini, nomen præsertim in men-
tem venit; moxque tanti beneficii, ac amoris recor-
datio, quibus Majestas tua, ejusque subditi & vici-
ni, me semper prosequuti fuere, renovatur: quorum
auxilio, & ope mihi ex immenso arborum, fruti-
cum, ac plantarum numero hortulorum hunc colligen-
di potestas fuit. Si his impulsus spatium præteriti
temporis respiciam, cum fortunæ tuæ vexatæ, fun-
ditusque everse, exilii solatium quærere coactus
esses, Majestatis tuæ dignitas memoriæ meæ, egre-
gium*

D E D I C A T I O.

gium constantiæ exemplum, & Regiæ indolis signa profert; Celso ac nobili tuo genere digna, quod per duo mille, & quingentos annos suppeditavit successivè Indiæ Reges. Tunc enim recordor, quoties tum tacitis ac occultis, tum Indictis & apertis hostibus, ex altissimo Regiæ dignitatis gradu præcipitatus, à subditis expulsus, exul agere coactus fuisti. Fortunà ita adversá, adeo te constantem fuisse miratu dignum, ut neque honorum direptio, neque divitiarum privatio Majestatem tuam permoverint; neque tunc, cum in Celsam & pristinam dignitatis sedem restitui, ac tot tantæque Regionis Regem te coronari viderem. Cum namque in maximas calamitatis tenebras Majestas tua esset conjecta, atque in adversis sine ullo remedio aliquandiu mansisset, postea feliciter Belgarum ope, omnibus hostibus subactis, tantis victoriis ad Regiæ dignitatis Solium ascendit: Quo tempore per septendecim annos me tuæ Majestati servire fortuna permisit. Hisce omnibus ad gratias impellor, ut non solum Majestati tuæ, sed omnibus notum sit, quod neque absentia, neque locorum diversitas, honorem, quem per totum vitæ cursum Majestati tuæ debeam, perdere valeant. Eas ob causas Majestati tuæ hæc depicta Horti Malabarici pars offertur, quæ cum nomine Majestatis tuæ exordiens per totum versabitur orbem, & Majestatem tuam inter Duces ac Principes cuicumque Reipublicæ Mæcenates numerari valebit.

VIRI NOBILISSIMI,
HENRICI VAN REEDE
VAN DRAAKENSTEIN, &c. &c.

A D

BENEVOLOS LECTORES

P R Æ F A T I O:

*In qua ratio redditur operis hujus, nec non obiter multa non protrita
de Brachmanibus & Malabaribus eorumque religione, politia
ac moribus admiscuntur.*



I qui sunt, qui me norunt ac pulcre perspectum habent, me ab ineunte quarto decimo meæ ætatis anno nihil aliud egisse, quam extra patrios fines peregrinatum, & pene maximam orbis partem continuo itinere permensum fuisse; illi, inquam, non possunt non novisse, me nec eruditione varia & recondita, nec Botanices, nec aromatum simpliciumve medicamentorum accurata cognitione florere; quam scientiam uti quis nanciscatur, illi per omnes suæ vitæ dies huic uni rei diligentissime incumbendum fore crederem, qua tamen felicitate ipse gavissus non sum, qui alio vitæ genere tantum non perpetuo fui occupatus. Has ob rationes, hisce, quos dixi, hominibus absurdum admodum videtur, quod in fronte HORTI MALABARICI meum nomen extet, qui liber persequitur exoticas plantarum descriptiones, earumque in Medicina usum: Neque sine ratione absurdi me arguunt, putant namque si mala fide, temere, ac arroganter id peregerim, nihil mihi superfore, præter ignominiam.

Alii, qui me non norunt, & forte majora sibi de me pollicentur, quam præstare possum, illi procul ullo dubio erunt persuasi, priores hos duos tomos totum HORTVM MALABARICVM constituere, aut si benignius sentient, scatere credent librum magni momenti erroribus, & nullo ordine editum; quod nemo non exspectat, si illi ad edendos libros animum applicent, qui doctrina non pollent. Offendent etiam nonnullos barbara & ignota exoticarum plantarum nomina; & omiffæ earum cum Europæis convenientiæ & comparationes: omiffæ itidem Doctissimorum Virorum laudationes, qui

**

ali-

aliquando de his plantis scripserint, aut earum mentionem fecerint, male alios habebunt, qui horum Virorum testimonio has plantas in rerum existere natura serio persuasuri sibi fuissent. Erunt etiam, quibus tædiosæ erunt tot in describendis plantis minutia, quarum sane quam accuratam rationem habuimus: Culpabunt forte etiam nonnulli, nos in persequendis plantarum descriptionibus iis verbis usos non esse, quibus Botanici eruditiores has illasve plantarum partes insignire ex artis suæ more consueverunt. Sic & alii alia, quæ quidem ipsimet non diffitemur, criminabuntur.

Ut ergo & his & mihi satisfaciam ipsi, absurdum fore non credidi, si prima HORTI MALABARICI initia, progressum & successum à capite ad calcem, quod ajunt, paullo diligentius repetam. Non enim dubito, quin candidi rei herbariæ aestimatores non solum admiraturi sint, sed & grato animo accepturi, quod tot exoticas ignotasque plantas luci damus, ex regione & notissima & multis frequentata, & quam Lusitani per centum & septuaginta admodum annos coluere, & magnificis urbibus exornavere; mirabuntur, inquam, & grati recolent, has plantas jam primum in theatrum spectandas proferri ab eo, qui aliis & majoris momenti rebus occupatus potuisset eo labore superfedere. Verum enim vero quia ea est sæculi nostri & Europæ felicitas, & doctorum copia, ut typographiæ jam videantur commercia, quæ Terrarum orbem innumeris libris replent; hinc quoque orta est crambe centies milliesque recocta, qua plerique mutatis nonnullis verbis, ordine parum variato ex charta in papyrum alienos priorum labores exscribunt, & pro suis ambitiosissime edunt; unde non mirum, quod plerique eruditiores nihil magni faciant, nisi quod aliqua novitate se commendat, cum vetera iis sint cognitissima: Damus ideo hoc nostro opere amplum exscriptoribus campum, in quo plantas legere possunt, easque generali plantarum indici inferere, quæ in nostro orbe huc usque innotuerunt.

Posteaquam aliquamultis annis apud Indos fuisset, & pro ratione ejus, quam ornabam, spartæ sæpius mihi itinera facienda essent per cultissimas regiones, obiter mihi notavi sylvas & amplas & arduas & densas; notavi eas mira arborum varietate jucundas, ita ut duas ejusdem generis arbores in eadem sylva reperire difficile quæsituro foret: notavi arbores plerasque cinctas & implicatas aliis plantis, quarum aliæ radice in terram defixa eam fecerant cum arbore, cui implicabantur,

tur, mixturam, ut vix discernere esset: notavi sæpius tales (ut ita generatim loquar) hederas plures & diversi generis arbori uni adhærescere; & præter has succrescere in ipsis arborum ramis, nec non ad caudicis truncum alias atque alias plantas, ita ut spectaculo longe jucundissimo sæpissime in una arbore exhiberentur decem duodecimve diversi generis folia, flores, fructus: neque tamen hæc ullo erant impedimento, quo minus caudices harum arborum essent bene spissi, & largissimæ crassitie; aut quo minus arbores illæ proceritate eleganti ad LXXX. sæpius pedes [vulgaris mensuræ] capita sua in auras efferrent, circumcirca omnis generis virentibus herbis, ita ut nihil intactum relinqueretur, ornatae; rami etiam undequaque patuli & umbrosi ascendebant tandem in fastigium amplissimum, & plane mirificum; imo nonnunquam descendebant ac terræ feracissimæ denuo insiti repullulabant ac germinabant. Videres in una ejusmodi arbore magnificum, elegans ac amœnissimum palatium, cujus fornices tot columnis sustinebantur, quot ramos cerneret; atque in tali palatio plurimi latere commode poterant, vitandæ aëris injuriæ causâ, imbrium puta & æstus Solis nimii, atque ita hæc sylva potius elegantissimæ structuræ domus, quam inculta nemora videbantur. Neque solum terram feraciorem per plana porrectam sic ornatam animadverti, sed & horridas rupes, & præcipitia montium comata ejusmodi sylva luxuriare, quin imo sterilissimas etiam petras nihilominus lætissima arborum herbarumque segete superbas, quarum quædam plantæ cacumen obsidebant, quædam rimas fecerant, in quarum fissuram radicem inferebant. Omnis ager, & campus per plana decurrens adeo læta omnis generis plantarum arborumque (quod supra de sylvis dixi) fertilitate ridebat, ut quævis etiam pars curiosa cujusdam Hortulani manu culta, & elegantissima serie digesta videretur. Etiam ipsa stagna, quod mirere, paludes, imo littora fluviorum salis aquam vehentium ostendebant varias plantas, quibus tantum non plane tegebantur. Quid multis? nulla vel minima soli portio, etsi sterilissimi, erat quæ non aliquas plantas ostentaret.

Hæc quum omnia identidem animadverterem, illa me in eam adduxerunt opinionem, ut non sine ratione existimem, hanc Indiæ partem jure meritoque esse totius Terrarum orbis fertilissimam, & fere maxima ex parte respondentem Insulæ Taprobanae (quæ *Ceylon* hodie vocatur) inprimis illi portioni, quæ sub eodem, ac Malabaræ regionis, climate est sita.

Sæpius me incessit lubido explorandi ac inquirendi harum plantarum folia, flores, cortices, radices; ibique tum plerumque deprehendi illa esse odoris suavissimi, & saporis penetrantis; & quum ex indigenis quærerem, qui me in itinere faciendo comitabantur, plantarum harum si quid nossent, illi tum non nomina solum indicabant, sed & vires & usum earum pulcerrime callebant, id quod obiter sæpius expertus sum, si ubi quis nostrorum comitum malo quodam sive interno, sive externo laboraret, licet nec Medicinæ, nec Botanices cognitione essent præditi, hi Indi, ut qui omnem ætatem terunt sive militiæ, sive agro colendo, sive opificiis.

Injucundum aut abs re fore non arbitror, quoniam mentionem facimus horum Indorum, hujusque regionis, hæc paullo accuratius Lectoribus si referamus, quibus operæ pretium fuerit hæc nostra legisse.

Malabarica regio ab uno latere mari cincta, ab urbe Goæ ad promontorium Comorinum, in longitudinem circiter centum & viginti milliarium Germanicorum patet, lata hinc inde decem, trigintave plus minus milliariis. Ipsa regio tanta hominum frequentia colitur, ut videatur nihil esse aliud, quam continuæ urbes, pagi, horti. Variis paret principibus quibus subjecti sunt plures quam tres myriades, seu, ut liquido constat, unum & triginta millena millia nobilium, soli militiæ natorum; ut taceam innumerum illum cæterorum hominum numerum. Vivunt ad capularem fere senectutem, eorumque valetudini prospiciunt indigenæ Medici, qui ex aliis regionibus medicamenta non petunt, aut certe quam paucissima, illis solis, quas ipsorum regio liberaliter suppeditat, contenti; quem morem Europæi ibidem locorum felicissime imitantur: Belgæ vero qui ibi sub auspiciis Societatis Orientalis Indiæ morantur, nescio qua oscitantia utuntur medicamentis, quæ primum ex illis locis petita per Persiam Arabiamque in Europam deferuntur, & hinc denuo mari in Indiam referuntur, fere obsoleta & corrupta, non sine summa sumtuum jactura, qui huic rei sine ullo commodo impenduntur.

Hæc ideo & similes rationes me impulerunt, ut votis summis expeterem hominem huic rei aptum & idoneum, qui data opera hujus regionis plantas vivide delinearet, easque describendo explicaret, additis viribus earumque usu: ipse videlicet mihi persuadebam, quod si hæc res successu non frustraretur, multis Botaniciæ studiosis in Europa placituram; nec minus emolu-
men-

mentum redundaturum ad Illustrem Indiæ Orientalis Societatem, quippe quæ posset sumtibus illis superfedere, quos in medicamenta illuc locorum transportanda impendit: posse enim & minori cum sumtu, & majori cum fructu Indica medicamenta in usum vocari, aut eadem, aut certe viribus paria, si non, ob dictas rationes, superiora.

Sed enim hæc res votis perfici non poterat. Malabaricam namque regionem nemo petit, ut huic rei incumbat, sed omnes sub Auspice Illustri Societate Indiæ Orientalis illuc profecti ita coguntur sui officii accuratam habere rationem, ut nihil illis suppeteret otii ad hanc rem, etiamsi vellent, perficiendam: quare hæc me via omnino fefellit hujus tam egregii operis aliquando in actum deducendi. Tandem, quum hujus operis perficiendi spem tantum non abjecissem, ad aures meas accidit, in ditioe Regis Cochinenfis degere Virum quendam, præditum summa plantarum Indicarum notitia, quas ad vivum delineaverat. Hic, quem modo dixi, Vir erat summæ eruditionis, vitæ austeræ, sexagenarius ætate, professione Sacerdos Pontificius ex ordine Carmelitarum Discalceatorum, dictus nomine Frater Matthæus de Sancto Josepho, natione Neapolitanus: hic multos annos in Arabia & Persia vixerat, & tum temporis missus erat Coadjutor futurus Archiepiscopi Christianorum S. Thomæ regionum Malabaricarum. Arcessitus reverendus hic Vir ad me venire non dubitavit in urbem Cochinensem, & ubi meum scopum intellexisset, scilicet ut fieret recensio ac descriptio plantarum Malabaricarum, in quam rem meam opem pollicebar reverendo huic Patri; ille humanissime ac promptissime officium suum mihi vice versa detulit, & una ostendit rudimenta plantarum, quæ antea in suæ memoriæ subsidium calamo atque atramento delineaverat, scilicet cujusvis plantæ unum folium, florem, fructum, quorum maxime notaverat vires, quorumque ope piissimus hic senex in itinere suo tum sibi, tum aliis quamplurimis opem tulerat.

Itaque prima hujus horti initia fuerunt, ut ex rudimentis plantarum in aliam translatis chartam fieret earum exactior delineatio, curante Rever. Patre Matthæo, qui sola memoria fretus naturales plantarum figuras mirum in modum ex rudimentis expediebat; sed enim, quum omnia calamo idque superficie tenus signaret, penicilli utique ducendi ignarus, ideo picturæ minus respondebant vivis plantis; huc accedebat,

quod

quod partes plantarum minores nequiverint accurate exhiberi; aut saltem per transennam, ut ita veras & spirantes plantarum figuras minime exin cognoscere esset, præsertim quum in picturis illis calamo factis neque lucis, neque umbræ ratio paullo accuratior habita fuerat. Scilicet opus fore non putarat optimus senex, majorem & accuratiorem in pingendis describendisque hisce plantis operam collocare, quum memoriæ suæ ope facile obvias plantas earumque vires ipse pernôset: accebat præterea, quod hæc in itinere fere confecta essent rudimenta, ita ut sæpiuscule aut huic plantæ fructus, aut illi flores, aut utrumque aliquando deesset; quem tamen ego defectum pro mea virili emendabam, plantas ipsas inquirendo & desiderata supplendo: plures tamen repertæ non sunt, sive quia nomina accurate non notasset, sive illa accepisset venerandus senex ab hominibus, qui communia plantarum nomina, queis unamquamque Malabarici Botanici insigniunt, nesciebant, sive quia erant alius climatis plantæ. Hæc fere impedimenta MALABARICI HORTI initia turbabant; inter quæ hoc maximum, quod si conferres figuras ipsis plantis, vix dixisses, ex iis effigiem esse expressam, ita male respondebat. Quantum ad descriptionem, illa subinde perfunctoria ac fugitiva diligentia adeo male cohærebat, ut pluribus plantis convenire potuerit, licet dissimillimis.

His tricis impeditus quum hærerem, ex insula Ceylonensi ad Malabaricos accessit Cl. V. Paulus Hermannus, M. Doct. cum maxime in Illustri Lugduno-Batava Academia designatus Botanicæ Professor; hic quum vidisset nostri Horti initia tot laborare impedimentis, & minus accurata ratione cum descriptionum, tum figurarum, modestissima humanitate nobis significare visus est, hac ratione librum alicujus momenti vix fore. Veruntamen brevitatis temporis illius, quo mihi aderat, in culpa fuit, quo minus, aut ego illi mea collectanea Horti Malabarici communicare, aut ille me prudenti consilio in hoc opere adeo perplexo juvare potuerit. Hæc cum ita se haberent, animus tulit, rem omnem denuo ordiri, ac memet ipse contuli, ad plantas pro mea virili describendas, atque Hortum hunc alio more colendum; sed vix cœperam, quum animadverti quanto mihi sit impedimento illud, quod sustinebam, officium; cujus ratio mihi etiam horarum momenta dispensabat, ut ita vix Horto colendo pro dignitate vacare potuerim.

Nec

Nec est, quod quisquam putet, hæc narrari, ut labores & honestissimi conatus Rev. Patr. Matthæi eleventur; sed potius contra. Huic enim Viro honestissimæ vitæ & non fucatæ pietatis gratias quas possumus maximas habemus, qui nos adeo candide, fideliter, & improbo labore juvit. Quin imo in eum finem Optimi hujus Viri mentionem facimus, ut ostendamus memoriam ejus apud nos esse & fore semper venerandam, ejus in nos amorem & voluntatem grata recordatione recolendam: hunc, inquam, primum hujus Horti conditorem, & auctorem, nec non in progressu sedulum cultorem ingenue profiteor; hujus tandem consilio, utpote semper Sacro officio, cujus causa illic locorum morabatur, occupatissimi, in partem laboris sollicitavi Virum admodum Reverendum, Johannem Casarium, V. D. in Ecclesia quæ Christo in urbe Cochinchinæ colligitur vigilantissimum ministrum, Virum in omni eruditione, solam Botanicen si exceperis, versatissimum, cui studio nunquam operam dederat, unde verebatur, stylum suum, quem propria illa Botanicorum & Medicorum vocabula fugiebant, non fore è dignitate tanti operis. Attamen, multis & gravibus causis persuasus in partem oneris ferendi consensit.

Ordinem, ut opus hoc sine tricarum molesta mora promoveretur, hunc observabam. Medici nonnulli, tam Brachmanes quam alius generis, meo jussu notissimarum & celeberrimarum indices plantarum suo idiomate conficiebant, ex quibus iterum alii plantas dividebant, pro ratione tempestatis, qua vel foliis, vel floribus, vel fructibus ornata conspiciebantur; harum catalogus pro ratione temporum anni certis hominibus dabatur plantarum peritis, quibus curæ illud erat demandatum, ut nobis plantas cum foliis, floribus ac fructibus undecunque demum conquirerent, etiam conscensis altissimis arborum fastigiis, hos partibus factis plerunque ternis ad has illasve sylvas ablegabam. Pictores tres, quatuor, qui mecum habitabant in loco commodo è vestigio vivas accurate depingebant plantas à conquisitoribus mox allatas, quibus & me fere præsentem descriptio addebatur. Præterea omnes Principes Malabaricos humanissime rogaveram, ut amice nobiscum communicarent plantas & forma & usu celebriores, qua re factum est, ut subinde quinquaginta sexagintave leucis plantæ ad nos perlata fuerint, & ut nullus Regum illorum Principumque fuerit, qui in nostro horto aliquos flores non sevisset. Plantæ itaque per Botánicos conquisitæ, per Pictores depictæ, per idoneos

neos homines descriptæ, si quidem operæ erat pretium, examini Medicorum ac Botanicorum peritiorum, quos in eum finem convocaveram, tam ex familiaribus, quam celebritate nominis aliqua notis subiciebantur. Scilicet huic Collegio, quod nonnunquam quindecim aut sedecim doctis constabat, exhiberi curabam plantarum picturas, ac per interpretem ex illis quæri, num novissent istas plantas, ipsarumque nomina & vires; quæ responsa in Commentarium referebantur. Verum enimvero istud Collegium ex diversis Malabaricæ regionis partibus coierat, unde fiebat, ut, cum alter alterum non novisset, ambitionis, pudoris atque suspitionis stimulo agerentur; gratiam videlicet demererî; si quæ ignorarent, palliare atque tegere; & ne se prostituerent, si mala fide plantis aut majora vero aut minora tribuerent, omni opera conabantur.

Jucundissimum sæpe audiivi acroama, hos puta Brachmanes seu Gentiles Philosophos inter se differentes & certantes pondere argumentorum, quæ ex sententiis, regulis, rhythmis ex antiquitate & libris suorum majorum eruditione illustrium depromebant. Disputabant vero, atque unusquisque sententiæ suæ fortissime patrocinebatur, incredibili tamen modestia, quam vel in cultissimis gentium Philosophis desideres, sine ulla acerbitate, animi perturbatione aut neglecto secus sententium mutuo honore. Piissima reverentia Antiquitatem prosequuntur, & primos artium inventores, his & suas sententias & sua quoque experimenta accepta referunt, ac eorum auctoritati subjiciunt. Et quantum ad Medicinam atque Botanicen spectat, harum doctrina versibus continetur, quorum primus quisque versus plantæ nomine proprio incipit, cujus dein species, propria, accidentia, formas, partes, locum, tempus, vires, usum & alia ejusmodi accuratissime persequitur; atque hoc artificio illud effecere, ut si quis plantæ alicujus proprium nomen proferat, Brachman aliquis extemplo tibi referet, quæcunque de illa dicta sunt dicique possunt. Quamvis autem hic docendi modus, qui memoriam tenacem requirit, difficilior esse videatur, attamen teneræ pueritiæ inter lusus & crepundia hos versus memoriæ, quam tum plus valere ajunt, imprimunt, quos postea animi dociles adolescentiæ & statæ ætatis fidelissime tenent. Prima harum artium (Medicinæ puta & Botanicæ) inventio adeo antiqua habetur, ut proferant Auctorum libros, quos constantissima asseveratione ante hos quater mille annos vixisse affirmant omnes. Sed enim quia homines hi quam
exer-

exercēt artem non libēra electionis voluntate, sed nascendi forte profitentur, quæ unicuique honores, servitūtem & Spartam denique, quam hac nascendi lege exornet, necessitate plus quam Stoica dispensat, inde est, quod per continuos ætatum & generum gradus ac successiones parentes liberis quasi de manu in manum tradant, quæcunque ad artis illius, quam natiuitatis lex ab ultima temporum memoria huic aut illi generi præscripsit, perfectionem requiruntur: sive inevitabilem & vel adamante fixiorem hanc legem Rex aliquis illorum populo in obsequia paratissimo tulerit; sive mutuus populi huius consensus eam introduxerit; sive devotissima aliqua sacrorum reverentia, aut oraculorum superstitiō divinarumque revelationum, cui hæc gens mirum in modum dedita originem & auctoritatem & per tot sæcula confirmationem huic legi dederit, de quo tamen disputandi nec locus nec animus nobis est. Hoc unum tamen possumus affirmare & experti verissima testari, hanc Legem, quæ ex sorte nascendi vitæ genus cuiusvis demandat, adeo rigide, adeo stricte, adeo sancte in hanc usque diem observari, ut nemo mortalium quacunque demum vel arte vel audacia etiamsi Herculea mutare huius legis vel hilum possit; sic ut rustici & piscatores, per omnem annorum seriem & temporum fugam, nunquam alios nisi rusticos & piscatores daturi sint; tali etiam modo se res in opificiis & artibus cæteris habet. Hac autem fatali quasi lege efficitur, ut nunquam artes aut opificia deficiant, ut omnes placidissime ac incredibili tranquillitate vitam innocentissimam transigant, quippe qui pro nascendi sorte altiora non cupiunt, majoribusque non invident, ea tantum re occupati, in quam fatalis illa lex per majorum progeniem posteros eorum devolvit. Atque hinc est, ut in continua illa majorum & consanguineorum disciplina semper magis magisque eruditiores redditi tandem insignem illius, quam profitentur, artis & exquisitissimam notitiam acquirant.

Nec est, quod quis miretur tam antiquitatem horum populorum, quam inconcussam per tot sæcula legum & consuetudinum constantiam & auctoritatem: Si quis vel levi cognitione legum, morum, privilegiorum, & consuetudinum quæ apud illos Sanctissime vigent sit tinctus, fateatur oportet, in hac republica constituenda accuratissimam habitam esse rationem fundamentorum adeo solidissimorum, quæ, ut ita loquar, vel æternam possint reddere & ab omni mutatione securam rempublicam. Theologia namque illorum atque Politia tam

arti-

artificiose ac prudenter conspirant, adeo provide etiam distinguuntur, adeo altera alterius auctoritatem tuetur, ut cui primæ deferri debeant, ambigui res sit iudicii. Theologiæ enim Politia & hæc vicissim illi amicissime respondet; sic eadem lex, quæ maleficos templo arcet, illos quoque & civitatis & cognationis jure, quin imo humanitate atque adeo vita ipsa privat, aut si clementius cum iis agatur, libertatem per omnes vitæ annos adimit. Respublica eorum harmonia tam arcana mixta est, ut ante diu illorum admisione opus sit, quam nôris, ex quo reipublicæ genere sint. Populus liber tantis gaudet privilegiis, ut videatur esse Democratia; è regione tamen populus ipse tantis ac tot fervilibus officiis Principes suos suspicit, ut vitæ necisque jus ac omnium fortunarum in unum Regem concessisse putes. Alienæ nationis aut exterorum conjugia non ineunt, & tamen quascunque nationes cujuscunque religionis inter se liberrime vivere patiuntur. Patrios fines nunquam egrediuntur, nec tamen peregrinorum itinera moleste ferunt. Reges illorum nec successionis, nec electionis solo jure regnant, sed utroque, tantæ enim majestatis fastigium uni alicui familiæ ac toti generi hæreditaria est, ex qua Principes eliguntur, quorum natus maximus Rex est. Qui Sacrorum curam habent & religionis, illi & plurimi sunt, & summa tranquillitate vivunt, amplissimis beneficiis & summis honoribus aucti, queis accedunt devotissimi populi donaria, ut jure merito homines illi in toto terrarum orbe beatissimi prædicari possint. Nobiles quoque ejus regionis frequentissimi & numerosissimi sunt, qui opificiis aut artibus exercendis omnino liberi, amplissimis privilegiis & summa præ cæteris dignitate excellunt; atque adeo patet huic populo vitæ & morum mutationem nec expectandam nec optandam fore. Eadem ratio, quæ perpetuam in hoc populo pacem conservat, illa & seditiones, si quæ subortæ, in ipso ortu oppressit, ita ut mutationem aliquam rerum saltem minari nequiverint. Alieni Imperii bellis intacti, illa quoque non metuunt, hinc ab Occasu vasto illo Indico Oceano cincti, illinc ab Ortu prærupto, arduo & immani montium tractu muniti, qui per angustissimas & difficillimas pylas non nisi paucissimos simul admittere potest, si vel ingredi vellent hostili animo homines. Neque finitimos verentur, quibus vires ad se aggrediendos deesse norunt; cum ipsi Malabares è contrario bidui spatio plures exercitus incredibili frequentia hominum, unde illorum numerum fidem vix
habi-

habiturum referre non audeo, cogere possint, egregie & apte armatos, ac belli peritia nulli secundos; quorum milites audacia & fortitudine omnes Indos cæteros antecellunt, qui æternam animæ suæ salutem extra omnem dubitationis aleam ponunt, si in bello pro patria, pro aris & focus, pro Lege & Rege occumbant defuncti officio, cui nati erant. Hanc Spartam optime & fortissime Nobiles illi, quos diximus, Malabares ornant: qui, ubi occasio tulerit, viros se patriæ natos fortissime præstant, ac quasi furore quodam correpti tunc in hostem per tela per ignem aguntur, adeo in lethum mens prona Viris; hinc natio hæc nec ulli unquam hosti, nec ulli etiam rerum mutationi ab ultima sæculorum memoria fuit subjecta; unde haud injuria illos antiquissimis Orbis terrarum populis asserere possumus, cum Brachmanum nomen temporibus quoque Alexandri Magni in dignatione fuerit, & Historicorum libris celebratum.

Sed de his jam plus satis, quæ tamen Lectori nostro gratificaturi diximus; abs ratione namque alienum non duximus, quum Hortum hunc Malabaricum oculis tuis subjiceremus, nonnihil præfari, quibus in terris, per quos & quales homines fuerit cultus. Ordine, quem supra dixi, constituto, quo Hortus felicius coleretur, absoluti sunt hi tomi, quos nunc in publicum dedimus, quorum nimirum primus arbores, alter frutices persequitur. In animum equidem induxeram, satius fore Horto huic in Europa edendo tamdiu superfedere, donec colligendis plantis finis esset repertus & factus; at quum una mecum meo animo reputarem, quam inconstantes, fluxæ ac mutabiles essent res humanæ, quam vanus fuisset & in casum omnis labor iste meus, si forte Deo ita volente vitæ summa brevis spem præcideret longam; neque enim persuadere mihi poteram, successores mihi in tot tantosque labores fore, quos equidem indefessa constantia in hoc Horto colendo exantlaveram: accessit, quod ipse mihi nec moræ tempus, nedum plantarum numerum definiveram, quo Hortus noster esset colendus; itaque pergebam in ejus cultura, dum tempus & occasio ferebat; siquidem plerique, quorum opera poteram uti, Illustri Indiæ Orientalis Societati alter in hoc, alter in illo officio operam suam locaverant, quam ne negligenter exerceant, alienis illis Horti nostri colendi laboribus sæpissime vacare nequibant, unde Hortus subinde cultoribus erat vacuus. Interea tamen temporis ad finem properabat plantarum

descriptio, quæ circa urbem Cochîn crescunt, quarum vires ab ultima antiquitate celebres à Medicis indigenis indicabantur. Fuere tamen sæpius plantæ, quarum ut florem aut fructum nancisceremur per integrum annum, imo nonnunquam longiori spatio expectandum erat, atque hæ plantæ quasi per Satyram annotabantur, ut quæ in iis deficiebant data occasione recte possent suppleri. Nonnunquam, si ubi vel officii ratio, vel prægnantes aliæ causæ poscerent, omnibus iis, quorum opera in hoc Horto colendo occupabatur, aliisque bene multis comitatus ad hunc illumve Malabaricum Principem meorum Superiorum ergo compellendum, id quod publici boni causâ sæpius necesse erat, aqua in continentem interiorem proficiscebam: Ibi quasi aliud agens dum observarem in itinere fertilissimas sylvas, & campos longe amœnissimos, omnem meum comitatum navî exscendere jubebam, quorum quidam præmiî nanciscendi ergo, nonnulli quod ea re impendio delectarer, plures ut animo suo novarum rerum curioso gratificarentur, cæteri, quod operam horto nostro locassent, partibus factis per nemora palabantur, depopulantes omne plantarum genus, illarum præprimis, quas fructu & floribus ornatas videbant. Hæc manus, quæ subinde ducentorum capitum erat, ubi per aliquot horas legerant plantas, hinc illinc undecunque lectis plantis onusti ad naves nostras bellicas, quas Malabares *Mansjous* appellant, revertebantur. Heic prædam excutiebamus lustrabamusque, ac plantas nec dum visas ruditer delineabant pictores, quibus descriptio brevior & rudior accedebat, quæ postea commodiori loco & tempore perficiebantur. In aulis Regum facta re Illustris Societatis Indicæ Orientalis, Principes ea erant curiositate & humanitate, ut per suos homines nobis omnis generis plantas suppeditarent, imo vero ipsimet illi Principes ad nostra tentoria visabant, & summa animi delectatione improbum nostrum laborem & spirantes plantarum picturas conspiciebant, atque hoc modo, qui sæpius accidebat, Hortus noster cultior & plantis indies crescebat: imo haud raro una die plures plantæ ruditer delineabantur, quam quot per menses aliquot pictores atque Clarissimus Casarius digerere possent. Interea dum hac ratione cœptum opus urgeo, causâ maxime prægnantes me nec-opinum subito Malabarica regione abire jusserunt. Dum enim honestissimis & innocuis hisce deliciis animum pasco, animadverto insidias & cuniculos, per quos me clanculum invidia oppugnabat, insidias,

dias, inquam, quas nunquam vel in horridissima Malabarum solitudine verebar: animo tamen coeptum opus tam in itinere, quam Bataviae perficiendi continuabam. Sed, ô jacturam gravissimam! dum hæc meditor, ille fidus noster Achates, ille laboris focus, ille Horti hujus rigator Apollo, ille suavissima nostræ deliciae Vir doctissimus & admodum Reverendus Cassearius in flore ætatis acerba morte nobis eripitur, ac mortalitatem cum immortalitate commutat. Jacturam tamen hanc nonnihil levabat humanissimus Vir Christianus Hermanni de Donep calamo promptus & Latinæ linguæ fatis peritus, qui mecum adversaria illa & collectanea, quoad ejus fieri poterat, digerebat; quam rem summopere juvit, quod pleraque illæ plantæ recenti mea memoria hærerent. Bataviæ plantas quasdam reperi, quarum nonnullæ partes apud Malabares defecerant, has pictorum ope supplebam. Vir autem felicissimæ experientiæ ac doctissimus Guilielmus ten Rhijnen (qui ob excellentem in Medicina peritiam Imperatoris Japonici postulatu ab Illustri Societate Indica Orientali ad Japonas missus est) vires plantarum ac usum, quæ in certis adversariis annotaveram, Latine subiciebat, ut si gravior casus opus nostrum turbasset, nonnihil saltem ejus superesset; ipse vero totum opus idoneum otium nactus recensiturus, errores correcturus, plurima, quæ adhuc deficiebant, & subinde integras descriptiones suppleturus; infelix enim hoc lolium in Horto nostro succrescebat subito illo nostro à Malabaribus abitu, & præmaturo Cl. Cassearii p. m. obitu. Vix recensione coeperam, quum causæ plane fonticæ me Indos omnino relinquere urgerent: itaque plantarum picturas denuo depingi, ac descriptiones eousque perfectas describi curabam, quod exemplum Clarissimo Doctore ten Rhijnen reliqui, ut, si vel naufragium, vel jactura iter nostrum turbaret, denuo Horti Malabarici exemplum aliud ad Europæos transmitteret, idque toties repeteret, donec tandem portum opportunum nactæ essent; sed placuit Deo T. O. M. nos iterum salvos & incolumes patriis Laribus reddere. Has in regiones appulsus ac patriæ redditus non sine quadam animi perturbatione primam arborum partem editam conspicio, quippe quæ longe aliter edita, ac ipse editionem adornandam ex Indis transmissam volueram; unico enim tomo arbores secundum sua genera & species divisas contineri placebat: sed Typographus, ut quidem videtur, librum molis amplioris fore quoque nimii pretii putavit, neque sane in-

juria,

juria, figuræ namque æri incisæ nativam plantarum magnitudinem & formam exacte referentes, chartæ regiæ & optimæ notæ, nec non literæ magnificæ & nitidissimæ libro pretium faciunt, quod quum plurimi expendere nolint pro libro, qui novas, ignotas & peregrinas plantas, quibus paucissimi etiam delectantur, simpliciter persequitur; hanc ob causam primam partem in duos tres tomos divisit, unde, quia in isto tomo vel illo arbores pro tomi commoda mole deficiebant, frutices quidam intermixti sunt: præterea vero tot jam figuræ æri curaverat Typographus incidi, ut non sine gravissima sumtuum jactura ordo mutari, aut figuræ commodiori loco reservari potuerint; factum hinc est, ut tomus alter pari passu primum insequeretur, ordine inquam perplexo; iste enim tomus, qui fruticibus erat destinatus supplementi ergo & minoris generis herbas recepit. Primus tamen tomus felicior altero fuit, gavius Commentatione & illustratione & comparatione ad Europæas plantas facta Viri Doctissimi & longe Celeberrimi Arnoldi Syen, Med. Doct. & in illustri Lugduno-Batava Academia Botanices Professoris, Botanici summi & in plantarum experientia plane incomparabilis, cujus eruditissimis curis & cæteras Horti nostri partes relinquere animus ferebat: at, quam vanæ & fluxæ hominum curæ! Botanicorum hic nostra ætate princeps morte longe acerbissima & nobis & Academia Lugduno-Batavæ eripitur, quæ Tanti Viri dotes, & indefessos floridæ ætatis doctissimos labores incredibili & tristissimo desiderio luget. Neque ruina hæc sola fuit, traxit etiam Viros optimos & humanissimos Johannem van Someren & Johannem van Dijck, qui Horti edendi curam susceperant, præclare de re Botanica merituri: atque hæc jacturæ gravissimæ Horti nostri lætum incrementum mirum quantum turbarunt. Interim tamen humanissimus Vir Johannes Commelinus, Vir Botanices eruditione nemini secundus, Botanices amore inflammatus alterum tomum elegantissimis notis illustravit, unde tandem aspexit lucem. Tantæ molis erat. Tot discrimina, tot casus, tot sumtus, tot denique labores Hortum hunc exercebant, ut unum impedimentum ex alio natum, ac proximum quodque gradus ac instrumentum esse sequentis videretur: hic accedebant querelæ Typographi sumtuum jacturam verentis; emtores paucissimi, ut opus tantum minimi fieri crederes; ardui illi & perplexi tomi reliqui, qui sub manibus meis adhuc erant, quique idem ac priores fatum habituri vide-

videbantur; hæc, inquam, omnia tædium summum mihi ingerebant, sumtus tantos faciendi, & æris nostri impendendi alienis deliciis. Hortum proin alio plane oculo ac ante intuebar, quem mihi seponebam, ut laborum olim nostrorum meminisse juvaret, parvi facturus aut laudes aut calumnias famæ rumorisque levioris. Atque sic aliquandiu hortus noster placide compositus quiescebat, donec aliquamulti rei Botanicae bene cupientes quotidianis pene adhortationibus nos obtunderent; rem miserrimam caussantes, tot labores atque alio sub sole natas plantas uni chartæ credere: esse satis multos, qui maximo desiderio reliquos tomos desiderarent. Typographus quoque rursus sopore illo solutus me etiam denuo incitavit, ut secundo me Horto edendo accingerem, atque ejus ordine, quantum fas esset, commodissime digerendo; nam, quod antea monui, illa pars, quæ arbores continebat, me incio in plures tomos divisa erat, ita ut plane nefas foret opus totum eleganter distinguere; licet enim tertio tomo arbores denuo continuarem, alter tamen tomus, qui fere frutices continet, ordinem turbabat; hinc commodissimum fore judicavi, conjungere illas plantarum species, quæ singulae per se uni tomo non sufficiebant, sed quidem junctæ; ut ita reliqui tomi non turbarentur. At vero D. Commelinus cum modo minus digestus specierum ordo existeret, ita procedere iniquum censebat; sed arbores ordine exhibere convenientius putabat: atque ideo reliquos tomos ita disposuit, ut minime dubitandum sit, quin hujus studii cultores grato animo accipient. In quibus dum adversaria memoriæ ergo facta digero, exque iis descriptionem concinno, præter opinionem video adeo multa abesse, ut seculo huic delicatissimo satisfacturus alia plane via mihi incedendum fuerit, idque eo magis, quod cavillos censorum & notas experti sint primus & alter tomus à Cl. Caserio p. m. descripti, unde immerito in sequentibus tomis optimum Virum calumniati fuissent, & Hortum inamœnum reddidissent; hinc ope meorum adversariorum, collectaneorum, annotationum, & experientiæ, quam moræ meæ apud Malabares spatio satis largo nactus eram, quæque recens memoriæ observabatur, ipsemet ego descriptionem plantarum Belgice concinnabam, neque dubitabam Typographo affuturos homines, qui has descriptiones Latine & commode redderent, id quod ipse Typographus mihi affirmabat. Capto autem translationis experimento eam incommodam & admodum impro-

priamprehendimus; quam remoram dum indico Viro Clarissimo & Doctissimo Johanni Munnicks, Anatomes & Botanices in illustri Academia Ultrajéctina Professori ordinario, ut pro singulari suo in Botanicen studio & sparta ea, quam publice ornabat, Hortum hunc tarde succrescentem sua opera juvaret, ac hominem transferendis descriptionibus idoneum inquireret; is non solum humanissime omnem suam operam detulit, sed & omnium descriptionum & quæ eas spectabant curam generose in se suscepit; uti hic, quem Tibi, Benevole Lector, nunc exhibemus tomus tertius, ejus Cl. V. curæ debetur, quem indefesso labore commodo hoc ordine digessit. Atque hæc sunt, Benevole Lector, quæ nobis præfari ac Te scire æquum esse putabamus.



JOHANNES MUNNICKS LECTORI BOTANICO

S A L U T E M.




Nobiliff. ac Generosiff. D. D. Henricus de Reede in Draakestein, Toparcha in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernator strenuiffimus, *praestantiffimorum Regum, ac Magnanimorum Illustriumque Heroum ad exemplar, in ipfo etiam armorum strepitu, rerumque politicarum occupationibus distractiffimus, studiosè semper excoluit rem herbariam, & stirpium in isto mundi tractu nascentium cognitione cum primis fuit delectatus. Et sane non mirum: quum enim harum rerum investigatio amoeniffima varietate se commendet, nec minus habeat utilitatis quam oblectamenti, non visum est Regum amplitudini, nec Imperatorie Majestati indecorum hujusmodi exercitiis detineri; praesertim ubi ab urgentiffimis negotiis publicis respirare, atque aliquid sibi otii impetrare licuit. Sic Salomon Regum ampliffimus, praeter immensas opes eam consecutus est a D. E. O. sapientiam, ac rerum naturalium cognitionem, ut nullus Regum illi fuerit comparandus; in herbarum notitia mirificè versatus, exactèque edoctus legitur: ac disseruisse non solum de piscibus, alitibus quadrupedibus, astris; sed de arboribus etiam, & stirpibus a cedro Libani usque ad hyssopum, qui egreditur e pariete, hoc est, a minutiffima herba ad clariffimas usque arbores, omnia habuisse probe explorata, & penitiffimè perspecta. Cyrum legimus Perfarum Regem celebratiffimum, plantaria manu suà instituisse, atque hoc ipsum cum Lyfandro Lacedaemonum Legato differentem, in aliqua gloria & felicitatis suae parte collocasse. Attalum quoque Pergami Regem non pretiosiffima suppellectilis fulgor, non secundae fortunae blandimenta adeo detinebant, quin intermissà aliquando Regni administratione, hortorum colendorum studio plantarumque satum, defessum aut aberrantem animum recolligeret. Romanos olim haec exercitatio tantoperè tenuit, ut Reges, & Imperiorum fundatores, positis aliis curis, hac unà potiffimum delectarentur. Scipionem Carthaginis everforem, Hannibalis atque Antiochi devictorem palam est, Linterni horto subigendo triumphalem manum adhibuisse: Et tam suaverè expertum fuisse hortensem hanc operam Diocletianum Caesarem, ut lactucas & olera disserere diademati Imperiali praesferret.*

Hisce itaque, aliisque, quorum meminit veneranda antiquitas, exemplis incitatus Nobiliff. D. De Reede, cum hoc ageret, ut accuratam arborum, fruticum, aliarumque in Malabarica Regione crescentium plantarum daret descriptionem, non ex aliorum relatione, sed propria & diligentiffimà inquisitione, atque accuratà observatione, multis itineribus propterea non sine

peri-

periculo susceptis, primo confusè illas notari & delineari curavit, prout variis locis & temporibus sese offerebant, aut ipsi plerorumque Regni Malabarici Regum, ac Brachmanum, aliorumque Doctorum Malabaricorum auxilio suppeditabantur; deinde illas ordine suo disponere, & ad suas classes redigere cœpit: & Reverendo D. Joanni Cafeario verbi Divini Ministro in Cochin persuasit, ut accuratam omnibus adderet descriptionem, ac integrum aliquando exstrueret Hortum Malabaricum; sed morte prævento Rever. D. Cafeario, duo solum volumina ex ejus editione lucem viderunt, reliqua vero imperfecta remanserunt: quo in casu nos rogati à Nobiliss. D. de Reede, ut ipsius, & Rever. D. Cafearii, tum Doctoris ten Rhyne, Patrisque Matthæi, ordinis S. Josephi Camelitæ discalceati, aliorumque notatis, cateris stirpium picturis nostras quasque adjungeremus commentationes; sicque reliqua volumina orbipanderemus, ac integrum opus perficeremus: quod sanè, quanquam professorali munere, tum agrorum visitationibus distracti admodum, denegare nec volumus, nec potuimus; atque adeo arborum harum imaginibus adornavimus descriptiones, ut decet Botanicum, breves ac succinctas, sequenti Clusii, Bauhini, Prosperi Alpini, aliorumque Botanographorum hac in re vestigia. Quasi non ingratas fore animadvertimus, sique DEUS vitam & vires fuerit largitus, integram tandem stirpium Malabaricam historiam perfecturos nos pollicemur. Interim hisce fruere, & vale.



JOHANNES COMMELINUS

A D

LECTOREM BENEVOLUM.



E mireris, *Benevole Lector*, hanc tertiam Horti Malabarici partem, quæ de arboribus agit, ac primam sequi debebat, post secundam de fruticibus demum prodire, quam præcedere ordinis gratiâ par esset. Cum enim præcedentium voluminum, jam modo impressorum, descriptionum, ex India huc transmissorum compotes essemus, in ea hærebamus opinione, omnia ad umbilicum esse perducta, & nil amplius restare. Sed cum *Nobiliss. D. de Reede*, ex India reducem, conveniendi occasio nobis esset, plures arborum, fruticum, ac plantarum imagines commentatione, ac impressione indigentes superesse cognovimus ac omnes stirpium picturas suo generi debito ordine conjungere necesse habuimus; quod pro viribus præstare fuimus conati. Quapropter ut reliquæ Horti Malabarici partes ordine in lucem prodirent, ab arboribus rursus exordiri coactos nos fuisse patebit. Sed quoniam variæ in tertio hoc tomo exhibentur arbores, quarum species in primo descriptæ sunt, quasque propterea illic sequi convenientius fuisset, Lectorem in bonam partem id accepturum rogamus;

***** 2 quod

quod facile impetraturos speramus, cum error
ibi commissus, hic corrigi à nobis nequeat. In-
terim animadvertas, & intuearis hancce Horti
Malabarici partem, in qua miraberis Divinæ
bonitatis, cui tot tantisque stirpibus, hæc-
tenus ignotis, hoc Regnum Malabaricum ornare
placuit: quæque nunc exactis imaginibus orbi
panduntur, quibus arborum & plantarum exoti-
carum notitia haud mediocriter promovebitur;
Enimvero multos quidem in earum depictio-
ne elaborarasse, nullos tamen earum genuinas
figuras & descriptiones protulisse, sed alios ex
aliis omnia excerpisse certum est, unde tanta
orta fuere discrimina, præsertim quum propira
carerent experientiâ, quæ nostro collectori
minime defuit: ipse enim omnia observavit,
& accuratè notari & depingi curavit, ut non i-
magine sed ipsa objecta repræsentari videan-
tur; quibus iterum nostra adjunximus commen-
taria, quæ Lectori grata fore speramus: sunt
namque ociosi, & à munere publico redun-
dantis temporis labores. Utaris ergo his nostris
laboribus, quos amœno huic operi impendi-
mus; ac stirpes hæc Malabaricas adspicias, ex
quibus, omnia hæc mundana magnificentiam
Dei referre, haud difficile tibi erit colligere.

Cödda-panà. Lat.
കുറ്റിപ്പാലം malab.
Karetála
करतला Brañ.
قحاطة نعنع Arab.


Fig. 4.



Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.




Cocoda-pana. Lat.

Fig. 1.

Tab. 2.

Fig. 2.



Cōdda-panā. Lat.




Fig. 2.

Fig. 3.






Fig. 1.

Còdda-panà. Lat.

Tab. 4.



Còdda-janà. Lat.



Códda-panà. Lat.





Fig. 2.


Fig. 3.




Fig. 1.



Còdda-panà. Lat.





Codda-nana. Lat.

Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 2.






Fig. 1.

Tab. 9.

Còdda-panà. Lat.



Cōdda-panā. lat.



Còdda-pañà. lat.

Fig. 1.




Fig. 4.




Fig. 3.





Fig. 2.



P A R S T E R T I A.
H O R T I
M A L A B A R I C I
D E
A R B O R I B U S.

C O D D A - P A N N A,

ſive PALMA MONTANA MALABARICA.

T A B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



Arbor hæc *Codda-Panna* Malabarenſibus dicitur, iſque *Panna* generale nomen eſt, quod cuique *Palmæ* ſpeciei attribuitur; atque ideo *Palma Indica* etiam *Tenga-Panna* nominatur. *Brachmanis* autem *Karetela*; *Cingalenſibus* *Tala-gas*, & *Talagaija*; *Lufitanis* *Arvore dos Sombreiros* hoc eſt *Arbor Umbroſa* appellatur. Ea autem magnam habet ſimilitudinem cum *Tenga*, *Karin-panna*, & *Ampanna* in parte 1^{ma} deſcriptis; ubi in *comment. ad Fig. 9. Doctiſſ. Arnoldus Syen. p. m.* Folium ejus à *Cl. Paulo Hermans* Botanico eximio ex *Infula Zeilan* ad ſe miſſum deſcribit pro *Karin-panna*.

Postquam vero intra annos triginta quinque aut ſex, ad ſexaginta vel ſeptuaginta pedum altitudinem arbor hæc excrevit, nec interea ullis aut floribus, aut fructibus prolatis, è medio ejus apice novum quaſi caudicem emittit; qui trium quatuorve menſium ſpatio ad triginta circiter pedum menſuram aſſurgit; quo tempore folia plæraque decidunt, & arbor altiſſimo ac lævigato malo plane ſimilis

Pars III.

A

eſt.

est. Dein novus hic caudex duodecim aut tredecim circiter hebdomadarum decursu undique longos, rotundos, ac læves ramos, nullis foliis aut ramulis lateralibus ornatos, emittit, quorum inferiores viginti pedum longitudinem obtinent. Atque ex hisce ramis demum plurimi ramuli prodeunt, qui copiosissimis ac exiguis albicantibus flosculis; in fasciculos quasi collectis, instructi intuentibus jucundum exhibent spectaculum. His autem flosculis post tres quatuorve septimanas deciditibus, exiguæ succedunt baccaë, quæ indies augentur, & sex circiter mensium spatio perfectos ac maturos exhibent fructus; quibus delabentibus novus hic caudex emarcescit, totaque arbor emoritur. At vero arboris hujus varias partes, & multiformes earum imagines qui cupit intueri, adjectas hæc tabellas perlustret, ubi *Fig. 1.* arbor ostenditur novella, cum foliaceis suis ramis, quo tempore haud absimilis est *Ampanna* partis 1^{mæ} *fig. 10.* delineatæ. *Fig. 2.* pars folii, in qua lacinia & divisuræ exactè apparent. *Fig. 3.* integrum folium istius magnitudinis, ut decem pluribusve hominibus umbraculi loco inservire queat: quem in finem incolæ extremas folii lacinias consuunt, ut rotunditatem quandam acquirat, qua facilius sub ejus tegmine aliquot homines ab imbribus, radiisque solaribus defendi possunt.

Tab. 1.

Tab. 2.

Fig. 1. Arbor in summo vigore exhibetur, antequam ullos emisit ramulos; nec non genuina folii expansi constructio, uti arbori adhæret, latitudine quatuordecim, & exceptâ spinosâ caule, longitudine octodecim pedes superantis. Etenim isto tempore stupendæ magnitudinis observantur folia, quæ tamen cum arbor ramos undique emittat, altiusque excrescat sensim minora proferuntur. Et quoniam arbor hæc, uti *Tenga*, è medio trunci apice novella profert folia, hinc *Fig. 2.* complicatum hujusmodi folium adest, rotundum, viginti pedum longitudinem obtinens, quo cautè resoluto & explicato integrum sese hic offert folium. *Fig. 3.* exiguum folii segmentum explicatum

tum cum nervo intermedio, quo complicari ac iterum resolvi queat: & *Fig. 4.* idem segmentum complicatum, longitudine sex pedes, latitudine vero sex digitos non raro superans.

Fig. 1. Arbor triginta quinque aut sex annorum conspicitur, cum novo suo caudice, seu potius theca, è qua fructus postea emergunt. *Fig. 2.* Fructuum theca aut vagina exactus delineatur, quæ (uti dictum) ad triginta pedum mensuram è medio trunci apice excrescit: eaque è plurimis constat geniculis, quæ singula obducta sunt viridibus, flexibilibus, ac intrinsecus albicantibus & coriaceis involucris sibi è regione respondentibus; sub quibus aliæ minores latent thecæ seu vaginulæ, ut ex *lit. a. b. c.* & adjuncta *Fig. 3.* facile colligitur. Atque in tali vaginula, quæ longitudine spithamam, & latitudine palmam nondum superat, plusquam viginti millia fructuum occultantur.

Fig. 1. Vaginula quædam cum involucro suo *lit. a.* majori Tab. 4. vagina *Fig. 2.* desumpta habetur, intra quam primordia florum furculi *lit. c.* & *Fig. 4.* separatim depicti, exactè apparent. *Fig. 3.* florum primordiorum ramusculus desumptus e *Fig. 1.*; demptis omnibus involucris, in quorum primo *lit. d.* semper apertura *lit. B.* apparet, qua augescente hic florum ramusculus sponte in lucem prodit. At vero theca hæc, cum tenera est, ex foliaceis integumentis, supra se invicem convolutis, atque in apice aperto semper hiatu patentibus, conformatur; cui innumera capsularum germina ordine decussato adhærent. Ita ut *Fig. 4.* e *Fig. 3.* & illa e *Fig. 1.* atque hæc e *Fig. 2.* succedat. Qui vero hujus Tabulæ *Fig. 1^{mæ}* multiformes vicissitudines intueri satagit, tabulas omnes sequentes respiciat necessum est, ubi

Fig. 3. Theca hæc in latere (ubi floriferus furculus extat) Tab. 5. aliquantulum, *Fig. 4.* magis aperta. *Fig. 5. 6. 7.* turiones. *Fig. 8.* tres coles ob oculos, ponuntur.

• *Fig. 1.* Arbor undique læves, virides ac nitentes ramos Tab. 6.

emittit: at *Fig. 2.* patet quomodo iidem e communi fructuum theca, apertis vaginalibus involucris *lit. a.* & propriis thecis *lit. b.* dehiscentibus, erumpunt. Inferiores autem hi transversi rami longitudine viginti pedum mensuram superant, antequam florum ramusculi in conspectum prodeunt.

Tab. 7. *Fig. 2.* Lateralis ramus *lit. a.* e theca sua *lit. B.* emergens, suis que ramigeris capsulis geniculatim interstinctus, atque involucris suis (quale separatim *Fig. 1.* delineatur) obreptus exhibetur; quibus ablatis *Fig. 3.* scema floriferis fructiferisve furculis (*lit. c. c. c.* junctim, & *Fig. 4.* seorsim notatis) alternato ordine circumdatum commonstratur: quæ omnes harum partium vicissitudines ex vaginula *Fig. 5.* oriuntur.

Tab. 8. *Fig. 1.* Ramus lateralis, e quo floriferi furculi *lit. B. B. B.* erumpunt; at *Fig. 2.* floriferus furculus seorsim designatur.

Tab. 9. *Fig. 1.* Floriferi furculi in ipsa arbore integra. *Fig. 2.* thecæ segmentum cum appenso furculo, genuina in magnitudine. *Fig. 3.* segregatus furculus cum capsæ tegmine. *Fig. 4.* recisus furculi floriferi lateralis ramulus cum floripromis gemmis, viva imagine exprimuntur.

Tab. 10. *Fig. 1.* Floriferus ramus cum lateralibus ramusculis; florum viz. conceptaculis, retinaculisque, ac fructuum promiscendis, jucundissimum exhibens spectaculum. *Fig. 2.* trifidum ramulorum segmen cum annexis partim clausis, partim apertis flosculis (qui *Fig. 3.* cum omnibus suis partibus constituentibus exactè adumbrantur) repræsentatur. Ita namque post furculorum floriferorum omnium partium, ramis ac ipsis furculis ad majorem longitudinem proVectis, flores è gemmis apertis propullulant; iique plures & numerosi furculis adhærent contigui, terni, quaterni, candicantes, tribus foliolis, sexque staminibus dotati.

Tab. 11. *Fig. 1.* Ipsa arbor foliis privata, at fructuum primordiis ornata. *Fig. 2.* abruptus lateralis ramulus cum fructibus exiguis ostendit ur.

Tab. 12. *Fig. 1.* Ramuli illius lateralis segmentum unicum cum adhæ-

hærentibus fructibus naturali magnitudine. *Fig. 2.* separatus fructus cum suo putamine. *Fig. 3.* fructus transversim dissectus (in quo *lit. a.* cortex cum carne. *lit. b.* nucleus osseus. *lit. c.* medullare corculum, quod nunquam induratur, sed tempore confumitur, ac cavitatem relinquit, ostenditur) *Fig. 4.* ipse nucleus genuinâ suâ figurâ exhibetur. Fructus autem hi, qui furculis adhærent, exactè sphærici sunt, cortice glabro, viridi, carnosò, succulento, aqueo, subpingui, ac subamaro vestiti; nucleus vero, qui hoc fructu continetur, satis magnus, rotundus, albicans, ac eburneus, carne dura & ossea infarcitur.

Nascitur hæc arbor locis montanis & petrosis in Malabar, Provinciis nimirum Mangatti, Tirtsjour, Katour, & pluribus aliis locis. Crescit quoque in Insulæ Zeilan Provinciis Menda Corla, Agras, & juxta Bhoudhou-Malec feu Adams-pico. Floret indifferenter quocunque anni tempore, quanquam in Augusto non raro hi flosculi observentur, qui intra quatuordecim menses vix maturos exhibent fructus; quos antequam ferat hæc arbor, plusquam triginta annis indiget, & postquam semel illos produxerit toto suæ vitæ spatio, emoritur, atque ex deciduo hujusmodi fructu nova propullulat arbor.

Cæterum arbor hæc in Medicina vix ullum habet usum: nihilominus tamen succus e furculis fructiferis expressus vomitum excitando conducit ex morfu serpentis vertiginosis, ac delirantibus. Fructuum theca tenella adhuc si discindatur liquor exstillat, qui radiis solaribus in substantiam duriolem condensatus, ac mulieri gravidæ exhibitus foetum necat, & potenter expellit. Insuper folia ædium tectis inserviunt; nec non pro chartaceis philyris Malabarenfes iis utuntur, adeo ut eorum libri non ex libris, hoc est, arborum corticibus interioribus ipsi ligno adhærentibus, sed ex hujus arboris foliis conflentur admodum durabiles, & si bene asserventur pene perennes; quibus ferreo stilo suos characteres imprimunt, unde superiore cuticulâ de-

hiscente literæ signatæ remanent. E fructibus autem globuli ad armillas, brachialia, moniliaque pro Domicellis tornantur, iique lævigati & rubro colore tincti pro genuino rubro corallo imperitis facile obtruduntur.

T A B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Inter varias, quæ inveniuntur, Palmæ species, hæc maxime admiranda est, tum ratione ipsius structuræ, tum præcipue in producendis floribus fructibusque, quo nulli arbori potest comparari; atque ideo haud immerito arbor per se habetur, uti *Ampanna* part. 1. descripta: cujus tamen species est, quapropter convenientius in parte 1. post *Ampannam* & *Carim-pannam* potuisset describi: licet enim harum arborum flores, fructusque inter se non conveniant, foliorum tamen ratione merito sub uno referuntur genere; idque quod ad hypothesin à *Cl. Rob. Marison* de legibus naturæ exhibi-

tam, obiter ibidem proponit *Doctiss. Arnold. Syen. p. m.* magis hanc *Coddam-pannam* confirmare puto. Mentionem ejus nullus, quod sciam, fecit Botanicorum; videtur tamen rudi modo illam delineare *Jacobus van Neck* in *Itinerario* 1598. Estque forsan *Codda-panna* admiranda illa arbor, cujus meminit *Nicolaus Cosinus* in *Itinerario suo*, quæque à *Casparo Baubino* in *pinace* vocatur *Arbor foliis sex brachiorum longis, cujus folio extenso tres quatuorve viri in itinere operiuntur, ut plurimas non metuant.* Nobis vero erit *Palma montana Malabarica*; folio magno, complicato, acuto, flore albo racemoso, fructu rotundo.



NITI-PANNA.




Et altera *Coddæ-panna* species, quæ Malabarenfibus *Niti-panna* dicitur Cingalensibus *Nicol* & *Gin-colla*, Lusitanis *Olas d'agoa*; quasi *Palmam aquaticam* dicas. Crescit namque in aquis, & copiosè in fluminibus Teckencour in Malabar.

Radix nigricans, orbiculata, fibrata, amara, graveolens.

Folia, Palmæ foliis, plane similia sunt.

Hujus arboris icon inter cæteras non reperitur.

Niti-panna *Coddæ-panna* species haud videtur, quòd; insuper nec arbor est, sed potius planta aquatiam nulla inter eas, nisi foliorum, est & similitudinis.



Todda-panna. Lat.

തോട്ടം. mal.

தோட்டம். tam.

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.



Todda-panna Lat.







Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Todda-panna. Lat.

Fig. 1.





Fig. 1.

Todda-panna. Lat.



Fig. 2.



L.A.

Fig. 1.

Tab. 18.

Todda-panna. Lat.





Fig.

Todda-panna. Lat.



B.

L.

A.

L'g.

G.

Lat. C.




Fig. 1.




Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 1.

Tab. 21.

Toddiana Lat.



T O D D A - P A N N A.

T A B. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.



T *Odda-panna* feu *Mouta-panna* Malabarienfibus¹, *Andexa Motha-panna* Brachmanis, *Soteetson* Japonenfibus, *Armatoria das Igrezias* feu *Palma d'Igrezia* Lufitanis, in arborem excrescit juftæ magnitudinis, quadraginta circiter pedes altam, caudice craffo uti *Tenga-panna*, qui circularibus & extuberantibus annulis undique circumdatus, & cortice craffo, cinereo, squammofo, intus purpureo obductus eft; lignum albicans, molle, cujus matrix flavescens.

Cum vero arbor hæc primum e terra erumpit, nullum caudicis fundamentum fub dio obtinet, fed *Conus* prodit foliaceis tegminibus coopertus *Tab. 1. Fig. 3.* qui cum undique fele aperit, ac novelli foliorum furculi, tribus femet infequentibus ordinibus (in inferiore fedecim, in media novem, in superiore ferie octo) ex eo prodeunt, pedentim foliacea illa tegmina fublevantur, ut qui primo ferme planus erat comi apex, acutius fenfim, tandemque rotundum acquirat cacumen, ufquedum obtegentia illa foliola tranfitum concedere cogantur foliofis furculis *Tab. 1. Fig. 2.* qui quo magis adolefcunt, eo magis explicantur, foliorumque illa operimenta verfus latera diducunt; atque ita foliofi furculi majore fpatio indigentes magis reclinant, & ad latera vergunt, donec tandem ipfam caudicis peripheriam circumveftiunt, languidis tunc & marcefcentibus

eorum primis tegminibus, quæ dein decidunt, & sui stigmata relinquendo circularibus prominentibusque annulis eam cingunt. Post hæc inter ipsas arboris frondes novus exoritur Conus priori plane similis, è quo novelli alatorum foliorum rami denuo prodeunt; quæ foliorum productio toties renovatur, quoad fructibus enitendis apta fiat arbor: quo tempore Conus in humani capitis magnitudinem augetur, ac undique sese aperiendo plures ramulos reflexos fructibus ornatos exhibet *Tab. 4. 6. 7.* & simulac aperitur novus ex ejus cavitate emergit foliigerus Conus *Tab. 5. Fig. 1. 2.* qui cum denuo augetur, aperitur, ac novellos foliorum ramos undique emittit, ecce novus intus adest fructipromus Conus; quæ foliipromi fructigerique Coni vicissitudines toties fiunt, quousque viget arbor. Contingit quoque nonnunquam, ut ex uno truncato quatuor aut quinque vertices enascantur *Tab. 8. Fig. 2.* viz. quum, caudice ad viginti circiter pedum altitudinem aucto, fructipromus conus non unum, sed plures includit novellos Conos, e quibus totidem prodeunt arboris vertices; id tamen raro observatur, & singulis arboribus simplex plerumque adest vertex, uti *Tab. 8. Fig. 1.* videre est. At vero ut arboris hujus variæ partes, & multiformes earum vicissitudines rite intelligantur, adjectæ hæc tabellæ ut perlustrentur necesse est, ubi

Tab. 1. Fig. 1. Arbor, prout extra terram truncum suum constituere incipit: quoties namque foliorum rami cum foliaceis Coni tegminibus marcescentibus decidunt (quod semel intra annum aut sesquiannum contingit) toties circulari prominentique annulo caudex cingitur, & augetur. *Fig. 3.* idem Conus, qui *Fig. 1. lit. A.* in medio consistens alatorum foliorum ramos undique emittit, constans è plurimis oblongo-teretibus, crassis, coriaceis, densaque lanugine vesti-

vestitis foliis; lanugine vero illâ detritâ viridi-fuscis. *Fig. 2.* novelli foliorum furculi, uti primum è Cono aperto prodeunt, exhibentur.

Fig. 1. Foliacei rami, octo pedum mensuram longitudine Tab. 2. haud raro superantis, genuina effigies. *Fig. 2.* caulis foliacei rami saturatè viridis, ac in superiore limbo exiguis spinis munitus, naturali magnitudine. *Fig. 3.* unicum folium atrovirescens, superne splendens, inferne nequaquam, viva imagine exprimuntur.

Fig. 1. Ostenditur, quomodo novelli alatorum foliorum Tab. 3. rami ex arboris apice, foliaceis Coni tegminibus undique apertis, prodeunt. *Fig. 2. 3. 4.* iidem novelli foliorum furculi, subrufescente densaque lanugine vestiti, lanuginosâ vero illâ tunicâ manu detrita viridi-fusci, adsunt; quorum lateralia & tenella folia hæcenus cuncta, intorta, & crassa existunt. *Fig. 5.* exactius adumbrantur ea, quæ *Fig. 1.* exhibentur, viz. quomodo ex arboris cacumine *lit. C.* foliaceis Coni tegminibus *lit. B. B. B.* undique apertis, foliorum furculi prodeunt.

Fructipromus Conus, cui numerosi includuntur fru- Tab. 4. ctus, naturali magnitudine repræsentatur, ubi singulis illius partes unitis repagulis obserantur.

Fig. 1. ejusdem fructipromi Coni discissi interior com- Tab. 5. monstratur forma, qua insuper exilior Conus, è foliaceis tegminibus (novellorum ramusculorum conceptaculis) conflatus comprehenditur, uti *Fig. 2.* speciatim ostenditur.

Prædicti Coni majus incrementum refert, ubi lingui- Tab. 6. formia involucra, veri fructuum loculi, magis extenduntur.

Fig. 1. Iidem fructus maturi cum expansis suis retinaculis, Tab. 7. ac novellis foliorum furculis *lit. B.* nec non foliaceorum te-

gminum abscissorum reliquiæ *lit. A.* continentur: Fructus autem cum suo putamine *lit. C.* putamen ipsum *lit. D. & E.* nucleus vero transversim dissectus *lit. F.* repræsentantur. Suntque hi fructus oblongo-rotundi, prunis majoribus haud absimiles, quos tegit cortex glaber, viridis, ac nitens, postea subflavus, & dein rubescens, grati dulcisque saporis, cui subjectus cortex rufus ac lignosus, nucleum continens candidum, sapore castaneis haud absimilem.

Tab. 8. Integra habetur arbor, quæ *Fig. 1.* simplici cacumine, at *Fig. 2.* quinque apicibus ornata conspicitur. *Fig. 3. 4. 5. 6.* multiformes hujus arboris in foliis fructibusque producendis mutationes observari possunt.

Tab. 9. Adulti caudicis frustum cum orbicularibus suis extuberantiis (tegminum foliaceorum, atque fructiferorum ramusculorum vestigiis) viva imagine ob oculos ponitur.

Hic vero caudex crassitie sesquipedem, altitudine triginta pedes haud raro superans, nonnunquam in ternos, quaternos, quinosque apices (ut supra dictum, & *Tab. 8. Fig. 2.* depictum) semet divaricat, alias simplici cacumine *Tab. 8. Fig. 1.* erectus. Singuli autem illi apices unius ferme pedis spatio reliquum trunci circularibus & extuberantibus annulis circumdant, qui duos tresve digitos lati, distinctis intervallis trium quatuorve digitorum intercapedine ab imo ad summum à se mutuo distant. Ad hæc ubi transversim disseccatur hic caudex, guttas expromit pelucidas, quæ radiis solaribus in candicans crystallinumque gummi inspissantur.

Crescit hæc arbor locis montanis, petrosis, & arenosis in Tirtsjour & Couronuada Provinciis Malabar, nec non in Japoniæ insulis Roukiou & Lequas: nunc vero conspicitur id Celsissimi Principis Auriaci viridario *Honselaardijk*, non procul Haga comitis, eo ex India Orientali delata.

In-

Indifferenter quocunque anni tempore vicissitudines suas patitur, & foliipromos fructigerosque profert conos, atque à quinto sextove circiter fationis anno ad centesimum & ultra frugifera est.


Cæterum arboris hujus tanta est fertilitas, ut recifus ejusdem ramus terræ vel levius commissus in novam arborem progerminet; quinimo experimento compertum dicitur, rejectum trunci frustum novas radices emittere, & in arborem denuo renasci; quodque magis adhuc mirandum, si vel per annum, vel etiam plures annos è terra evulsa fervetur sicca arbor, & postea terræ committatur, revirescere, cujus rei fidem faciunt Japonenses, qui ob admirandam ejus cum ferro sympathiam arborem hanc *Sotetsou*, hoc est, *à ferro virefcentem* naucupant: hæc quippe cum suis radicibus e terra evulsa, & in aprico loco siccata reviviscit, ubi arena fervida scoriis ferri admixta radici substernitur. Etiam prodigii instar esset, si verum foret, quod de hac arbore referunt, viz. ramos à trunco abruptos, clavisque ferreis eidem denuo affixos pristino virori reddi. Insuper ubi languescit hæc arbor, ramosque quasi mortua dimittit, trunco clavos ferreos infigunt, atque ita ad virorem reduci perhibent.

Fruetibus autem vescuntur Malabareses cum saccharo Thomæo, alioquin alvum relinquunt adstrictam. Succus e novellis foliorum furculis expressus, atque exhibitus intestinorum cruciatus compescit, stomachi ardorem sedat, & vomitui cruento medetur. Fructigerus conus contusus, & in cataplasmatibus formam redactus, lumbisque applicatus dolorem nephriticum tollit, & involuntarium feminis in Gonorrhæa effluxum mitigat. At vero è fructibus tene-rioribus in aqua decoctis medicamentum paratur, quod vomitum ciendo ventriculum egregie expurgat. Ipsius ar-


boris gummi assumptum quibuscunque venenis resistit, atque cum gallinæ stercore mixtum & foris applicatum viperarum morsus mirifice sanat. Ex Arboris trunco Japonenses farinam ex eaque panem conficiunt, *Sagou* ipsis dictum. Denique ii Malabareses, qui à D. Thoma conversos se profitentur, atque ideo *Thomistæ* vulgo nuncupantur, templa sua diebus festis foliosis hujusmodi ramis exornant, quia non facile exarescunt, atque hanc ob causam arbor hæc *palma d'igresia* seu *armatoria das igrezias* à Lusitanis nuncupatur.

T A B. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Quamquam e fructibus hujus arboris farina conficitur, *zagu* dicta, non tamen *Todda-panna* est *Palma* cujusdam arboris fit: *Todda-panna* vero admiranda quædam *Palma* species est, quæ ex Japonia adfertur. ;
referens arbor *Farinifera*. C. B. neque *Arbor zagu* Amboënsium, quoniam farina quæ *zagu* nomine ubique




Katou-juel. Lat.
കാട്ടുവേലി. Mal.
Kasouri.
काठुवे. Bra.
كاسوري. Arab.




Katou-jndes. Lat.



Katou-jndel. Lat.



Katu Jndel. Lat.
 ४३३० ४५. Malab.
 Dafuri Bram.
 ५५५५
 نسيج ۵ نسيج Arab.



KATOU-INDEX.

TAB. 22. 23. 24. 25.



Rbor hæc Malabarenfibus *Katou-indel*, Brachmanis *Kafouri*, Lusitanis *Tamara do Mato*, Belgis *wilde Dadelboom* nuncupatur: Estque mediocris magnitudinis, quatuordecim circiter pedes alta, cortice nullo, sed crustâ cinereâ solummodo obducta, ligno albicanti, præduro arctissimè unitâ.

Rami foliacei è caudice ordine decussato erumpunt, novelli solum è vertice prodeuntes, vetustioribus, qui inferiores sunt, interea decidentibus: sunt autem rami hi virides, glabri, & nitentes, intus plani, extus convexi, nec non inferius spinis oblongis ac rigidis obsiti.

Radix albicans, fibrata, odoris sylvestris, saporis unctuosi.

Folia brevibus petiolis ex adverso ramulis inhærent, numerosa, oblongo-teretia, acuminata, densa, glabra, communi virore nitentia, ad exortum interiora versus clausa, nec non nervulis subtilioribus in longum striata.

Flores, uti etiam in *Tenga* cernitur, rigidis, viridibus, ac coriaceis capsis primo occultantur, e quibus deinde apertis emergunt exigui, plurimi uni pediculo inhærentes, tribus rotundis e viridi-albicantibus foliolis, tribus albicantibus lanuginosis staminulis dotatis, constantes; odor nullus, sapor austerus.

Fructus oblongo-rotundi, exigui, prunellorum sylvestrium adinstar, cuspide duro ac lignoso in vertice dotati, ad basin vero calyce viridi in tres lacinias secto excepti, primum virides, dein rubicundi, maturiores vero rubro-fusci, nigricantes, & nitentes, cortice tenui & fructu facili obducti, ac carne albicante, dulci, farinaceâ referti; intra

Pars III.

F

quam

quam officulum continetur oblongum, rufum, fulco profundo in longum striatum, nucleum continens albicantem & amarum. Hi vero fructus ramis proveniunt viridibus, glabris, & nitentibus, duos ferme cubitos longis, duosque digitos latis, planis, rigidis ac lignosis, nulloque cortice vestitis; quorum tenerioribus abscissis liquor effluit pellucidus, austerus. Provenit hæc arbor locis montanis, petrosis, & arenosis ubique in Malabar, imprimis circa Warapouli, & Trevancoor: quo vis anni tempore floret, fructusque fert, estque non raro ad sexagesimum annum frugifera.

Fructus vero hujus arboris, quemadmodum fructus *Fausel* seu *Areeckæ*, cum folio Betel & calce viva a pauperibus manducantur; avidè quoque ab Elephantibus expetuntur ob Palmito, *hoc est*, medullam suavissimam ramulis, quibus fructus adhærent, inclusam. Cæterum folia, fructus, aliæque arboris partes validissime adstringunt, & fluxus quoscunque potentissime sistunt. Insuper e foliis pileos contextunt indigenæ.

T A B. 22. 23. 24. 25.



Hujus palmæ speciei nemo, quod sciam, meminit Botanicorum, atque e sylvestrium palmarum genere est, & referri potest ad eas, quas describit *Piso hist. nat. & med. Brasil. libr. 4. cap. 11.* ubi decem sylvestrium Palmarum proponit species, quæ in Brasilia proveniunt, quapropter hanc vocabimus, *Palmam sylvestrem Malabaricam, folio acuto, fructu pruni facie.*

Tsjakamaram, aut. Pilau. lat.

പാലക്കാട് mal.

Ponoffou पणस, bram.

بيلقوا Arab.



Tsjakamaram. aut. Pilau. lat.

കല, ഹ malab.

Ponoffou
പറമ്പു bram.

تيلو Arab.



T S ꝑ A K A - M A R A M.

sive ꝑ A C A, vel ꝑ A A C A.

T A B. 26. 27. 28.



Sjaka-maram & *Pilau* Malabarensibus, *Ponossou* Brachmanis, *Faqueira* Lusitanis, *Soortfacken* Belgis, Arbor est procera, caudice ex albo flavescente variegato, crasso, præduro, multisque ramis viridi-fuscis, geniculatis donato, qui cortice crasso, cinereo, rufo, ac intus croceo obducti, ubi inciduntur lacteum succum stillant.

Similiter *Radix* crassa, cortice crasso, aqueo, rufo, intus vero ad medullam croceo-rubescente tecta, nec non fibris suis late per terram diffusa; sapor amaricans, odor nullus.

Folia oblongo-rotunda, densa, glabra, brevibus ac rotundis petiolis ramulis inhaerent, ac longitudine spithamam superant, superne splendent colore ex atro-virescente, inferne viridi diluto; costa media crassa, & in adversa parte alte extuberans, e qua nervuli transversi scabri, & subasperi superiora versus excurrunt, qui in se invicem arcuatim deferuntur, atque fundunt diffracti lacteum succum insipidum ac inodorum

Fructus, *Jaca*, dicti, ramis crassioribus, nec non ipsi caudici adhærent, & non raro cum imo caudice, cui inhaerent, intra terram sepulti: ramulis autem & furculis tenellis non pendent, sed crassioribus, cubiti longitudinem ferme æ-

quantibus ac nodulatis. Ipsi vero fructus oblongo-rotundi sunt, seu potius *Coni* ingentes, latitudine spithamam, longitudine duas spithamas, pondere viginti quinque libras haud raro superantes: cortex namque viridis est, crassus, & squammis densis aculeatis, velut gemmis adamantinis, bullatim exasperatus, intusque albicans & lacteus.

Cæterum intus in fructibus hisce majoribus, innumeri minores fructus intra communem corticem includuntur; suntque hi oblongi, carne spissa, flavescente, dulcis gratissimique odoris & saporis, referti; qui singuli in medio unam continent castaneam, quæ intra carnem, tanquam facculum confitæ, ac albâ tenui pelliculâ, ceu tunicâ interiore coopertæ sunt. Hæ autem castaneæ oblongæ, & facculis inclusæ, cortice tenui, cartilaginoso, albicante, & transparente tegunt, cui alter rufus subjicitur, nucleum continens densum, albicantem, & lacteum, ejusdem cum nostratibus castaneis saporis. Porro in medio ingentis hujus *Coni* stylus columnaris, crassus, albicans, & lacteus adest; cui tanquam communi basi, fructus minores in orbem locati, inserti sunt, una & altera extremitate ipsi cortici è diametro adhærentes; inter quos numerosa observantur ligamenta coriacea, albicantia, & subflava, quæ & stylo medio, & cortici affixa sunt; è quibus, (dissciso integro fructu) ut & è stylo, & cortice, succus lacteus glutinosus, therebinthinæ instar, exsudat, quo aves capiuntur

Nascitur hæc arbor ubique in Malabar, & per totam Indiam: singulis annis maturos exhibet fructus, mense viz. Decembri, atque à sexto circiter sationis anno ad septuagesimum & ultra fructifera est, propagatur autem hunc in modum: integer fructus terræ committitur, omnesque sur-

furculi, quos singuli minores fructus, majori huic Cono inclusi, emittunt, ab incolis viminibus colligantur, ita ut in unum excrescant caudicem. Id vero peculiare hic observatur: quæ arbores locis petrosis nascuntur, crassiores sunt, & minus altæ; quæ arenosis, altiores, sed minus crassæ; at radix arboris cum aquis insistat, nullos profert fructus.

Cæterum arboris hujus ultra triginta numerantur species ratione fructuum distinctæ, quæ tamen omnes ad duo referuntur genera; quorum alterius fructus, qui carne succulenta, gratissimi, mellinique saporis turgent, *varaka*; at alterius, qui carne flaccidâ molliori, & minus sapidâ referti sunt, *Tsjaka-papa* nuncupantur.

Porro fructus hi maturi corticibus denudati in deliciis comeduntur, at lautius comesti difficile digeruntur. Ab indigenis fructus teneri in eduliis *Caril* expetuntur, vel muria in *Atsjaar* condiuntur, vel etiam in frustra concisi coquantur, aut in oleo de Palma fricantur. Castaneæ assatæ dulcis saporis sunt, & inter bellaria ad secundæ mensæ delicias habentur; verum avidius comestæ fauces pectusque ardore, ac dein raucedine infestant: indigenæ quoque in eduliis *Caril* hisce utuntur, atque ex iis sole ficcatis farinam, ex eaque placentas, *Apas* dictas, conficiunt. Nec non corticula, quæ castaneæ pulpam proxime ambit, vicem *Arequa* seu *Kanuga* iis præstat in manducatione Betel. Præterea è fructuum teneriorum cineribus lixivium paratur, quorum lotrices linteamina eluunt. Adhæc arboris lignum operi fabrili infervit.

Cæterum è radicibus decoctum paratur diarrhæam sistens. E foliorum pulvere Bubali excrementis admixto cataplasma conficitur, quod calidè maxillis appositum spasmo cynico medetur. Lacteus fructuum succus cum pul-

vere calami aromatici tritus; oculisque illitus Nyctalopiæ conducit. Tritum cum aceto lignum uvulæ relaxationi, & faucium tonsillarumque inflammationi prodest. Radix cum fructus pulpa trita, & addito saccharo in emplastri formam redacta, ac loco dolenti imposita maligno ac vermiculari herpeti cum vermium nece confert.

T A B. 26. 27. 28.

Errat *Casparus Bauhinus*, quum *Pin. libr. 12. Sect. 6.* fructus quem exhibet, non *Faaca* est, sed *Durion* Arborem hanc inter *Palmarum* species recenset, & vocat *Palmam fructu aculeato ex arboris trunco prodeunte*: nullam namque cum *Palma* habet similitudinem. Arborem hanc *Faacam* describunt *Garcias ab Horto libr. 2. cap. 11. Acoftu libr. 3. Cap. 39. Linscotus*, aliique. *Bon-tius libr. 6. cap. 31.* obscure arboris hujus facit mentionem, quum fructum solummodo describat: Et sane

fructus quem exhibet, non *Faaca* est, sed *Durion* *Acoftæ*, & *Garcizæ ab Horto*, quem vocat *Fructum Durionem majorem*, *Faacam*, adeoque errat cum duas plane distinctas arbores, *Durionem* & *Faacam*, inter se confundat. Omnium optimè hanc *Tsjaka-moram* describit *Paludanus comm. in Linscotum*. Cæterum Fructus hi in *Guzaratte panaz*, in *Calecutio jaceros*. *Sinensis Pome* nuncupantur.



Atamaram. Lat.
 𑀅𑀲𑀓𑀲𑀓𑀲𑀓 mal.
 Atou 𑀅𑀲𑀓 bram.
 𐎠𐎡𐎢𐎣 Arab.



ATAMARAM.

Annona squarrosa
L. 1757

TAB. 29.



Tamaram ob similitudinem, quam fructus ejus habet cum *Jaka*, Malabarensisibus *Maniljaka* appellatur; Brachmanis *Atoa*, *Manilpanosou*, & *Jona-jaka*; Lusitanis *Atas*, & *Arocira*.

Arbor est mediæ magnitudinis, ad viginti circiter pedum altitudinem assurgens, cortice tegitur fungoso intus rubro. *Lignum* albicans, prædurum, cujus *matrix* viridior est, inodora, gustu subamara ac subaustera, paucos diffundit ramos, quorum ut & ramulorum ac virgultorum cortex viridis est, cinereis interstinctus punctulis.

Radix flavescens rubido tegitur cortice, graveolens est, saporis vero unctuosus, & in plurimas divisa fibras, quæ tamen per terram non late diffunditur.

Folia oblongo-teretia atque glabra foliis *Malake-tsjambou* in parte prima depictæ haud absimilia sunt, sibi tamen è regione non respondentia; parte superiore viridia & nitentia, inferiore vero subviridia, manibus confriicta unctuosus, inodora: a pediculo ad apicem folii nervus conspicuus decurrit, a quo plurimi nervuli oriuntur contortuplicati, qui tandem in apice reüniti terminantur.

Flores singuli suis pediculis cohærent, foliis ornatis minoribus, quæ postea decidunt; foliis constant tribus, crassis, triquetris, coriaceis, intrinsecus albicantibus, extrinsecus vero dilute viridibus, odorem corio usto æmulum, si adoleantur, spirantibus.

Cæterum e floribus stamine *Fructus* emergit, seu potius *conus*, qui maturus magnitudinem habet citri vulgaris, exterius viridis ac striatus, interius vero albicans, nec non medullâ succulentâ saporis grati, odorisque suavis refertus.

In his autem fructibus *semina* dura, oblongo-teretia, glabra, nitentia, nec non plana, ac utriculis inclusa, locantur;

H

ea-

eaque succulentâ & albicante fructus pulpâ artificiosè obducta cernuntur. At vero fructus ipsi immaturi decarpuntur, qui sponte per se mespilorum instar mitigantur, ac comeduntur,

Arbor hæc nullibi, nisi sobole aut feminibus in hortis facta reperitur. Amat locum calidum & humidum, nec non fimo equino subactum, atque rigatione & fervidis solaribus radiis gaudet. Et licet fructus hosce copiosos ubique India suppeditet, non tamen Provincia Malabar patrius hujus arboris locus est; sed ex insulis Philippinis & Manillas primum à Chinesibus & Arabibus, & postea à Lusitanis in Indiam delata fuit.


Porro post primum biennium aut triennium arbor hæc demum frugifera est, idque bis in anno; Aprili viz. Majorque, tum Augusto atque Septembri mensibus, floret, fructusque fert: flores namque qui mense Aprili emergunt, Augusto circiter maturos proferunt fructus. Et quanquam à mense Aprili ad Octobrem continui fere sint imbres, nihilominus tamen Augustus ut plurimum ab iis immunis est, quapropter ab Indis inter menses æstivos numeratur, & ob eandem causam à Lusitanis *Veranico* appellatur. Flores vero qui mense Septembri prodeunt, proximo Februario perfectum exhibent conum. Cæterum arbor hæc diu superstes, & non raro ad quinquagesimum annum & ultra frugifera est, modo conveniens adhibeatur cultura.

Folia hujus arboris minutim contusa, & addito sale in cataplasmatibus formam redacta, tumoribusque malignis imposita, potenter eos maturant. Fructus vero immaturi in aqua communi cum pauxillo Zinziberis decocti, vertigini medentur; at sufficienter mitigati, & in deliciis comesti valde refrigerant, alvumque reddunt laxiorem si aqua superbibatur.


T A B. 29.

Atamaram ob fructus similitudinem videtur species *Jaaæ*. Recchus de plantis Mexicanis pag. 348. figuram arboris cujusdam *Atamaram* persimilis proponit, quam *Abate de Panucho* vocat, & hisce verbis breviter describit: *Abate de Panucho vel Ate Pannicensis, aut Tzypipalis, fructu apud Mexicanos præcellenti arbor nobilis, Foliolum aurei pomi, Fructus cæruleus, sed in nigrum tendens, ferro polito similis, rotundus, totus quasi ex glandulis constans pineæ nucis figura, ramus vero castanei, folia juglandis.*

Anona - Maram. Lat.



Anona-maram. Lat.



ANONA-MARAM, an ANON OVIEDI.

T A B. 30. 31.



Ltera est *Atamaram* species, quæ Malabaren-
sibus *Parangi-jaca*, Brachmanis *Tsjina-panosou*,
Lusitanis *Anona* nuncupatur. Eaque præ-
cedenti haud absimilis est, nec proceritate
cedit.

Folia tamen angustiora magisque acumina-
ta, ac pluribus ornata nervulis, nec non altiori virore ni-
tentia.

Flores à prioribus vix differunt.

Fructus vero licet non, uti *Atamaram*, è compactili ligno-
farum squammarum strue compositi, sed undique glabro,
hyacinthino, ac tenui nitente cortice obducti sint, nec ma-
gnitudine cedant; quoad cætera tamen plane cum iis con-
veniunt.


Arbor hæc quoque nullibi, nisi fobole aut feminibus in
hortis fata provenit, nec Provincia Malabar natale ejus so-
lum constituit, sed è longinquis regionibus prius in eam
allata fuit, quapropter haud perperam Malabarensis
Parangi-jaca, hoc est, *Jaca* peregrina appellatur.

Vires cum priori easdem habet.

T A B. 30. 31.

Anona-maram quoque *Jaaka* species merito habetur
ob similitudinem Fructus, eamque *Recchus* libr. 3. cap.
60. describere videtur nomine *Quantzapoti* seu *Anona*,
testaturque non solum in India Orientali, sed etiam
pluribus in locis calidioribus provenire, uti in Insula
Helina, atque in Quaulmacensi novæ Hispaniæ pro-
vincia. Et forsan arbor hæc *Anona oviedi* est, uti cen-
set *Fabius Columna* annot. in *Recchum*; quæ sententia
confirmatur si arboris hujus descriptio ex *Oviedi* libr. 8.
Cap. 18. cum ea *Fabii Columnæ* conferatur, hucque
referatur *Guanabano oviedi*, quæ species est *Anonæ*
maram. *Josephus Acoſta* libr. 4. Cap. 25. quoque men-
tionem facit *Anonæ* seu *Guanabano*, quæ huic *Anonæ*
maram persimilis est.

Anjeli. lat.
ആരികി mal.
Pala-ponofu
പാപനസു bram.
عنب Arab.



A N S J E L I

T A B. 32.



Rbor hæc Malabarensibus *Ansjeli*, Brachmanis *Pata-ponoffou*, Lusitanis *Angeli*, Belgis *Anjeli* nuncupatur: Estque vastæ magnitudinis, atque sedecim mensuram crassitie non raro superans, multisque ramis rotundis, geniculatis, hirsutis, subasperis, & spadiceis donata; Lignum solidum, prædurum, albicans, intus subrufum, crasso, viridi, ac intus albicante cortice tectum, qui insuper cinereâ, & austeri saporis crustâ squammosa obductus est.

Radix crassa, albicans, fibrata, cortice crasso candido, cuticulâ rubicundâ & squammosa obducto, tecta, odoris & saporis sylvestris & ingrati.

Folia brevibus, rotundis, ac hirsutis pedunculis ramorum geniculis ordine decussato inhærent, oblongo-rotunda, densa, glabra, longitudine spithamam, latitudine palmam æquantia, supernè colore ex atro virescente nitentia, infernè viridi dilutiore, nec non brevibus ac lanuginosis pilis obsita, adeoque aspera, & manui tangenti adhærentia, nervis aliquot villosis & subasperis e media costa in latera excurrentibus. At vero tenella folia e vertice ramorum prodeunt, spadiceo-viridi villoso involucro inclusa, uti & in *Tiliis* cernitur: ipsa vero arbor cum tenerior est, in tres lacinias plerumque incisa sunt folia.

Florum loco supremis ramis *julos* arbor hæc producit virides, intus albicantes, teretes, ac lanuginosos, longitu-

dine spithamam, crassitie digitum æquantes; iique siccati candellarum instar a pueris in ludis accenduntur.

Fructus, Angelica dicti, rotundis, crassis, spadiceis, ac lanuginosis pendent petiolis oblongo-rotundi, cortice crasso, aculeato, seu potius echinato, viridi, & dein flavescente obducti, fructibus *Datura* haud absimiles, at pugni magnitudinem superantes: intus vero, uti in *jaca* cernitur, alii minores fructus oblongo-rotundi, ac fulcati intra corticem & medullam occultantur, fabarum aut castanearum adinstar, saporis acido-dulcis & vinosi, odorisque fragrantis: nec non integro fructu diffisso lacteus succus stillat.


Crescit hæc arbor locis petrosis & arenosis ubique in Malabar, in primis in sylvis Kalicolan: singulis annis, mense viz. Decembri, fructus profert maturos, ac integrum seculum frugifera manet. Cæterum exsiccata, calefactaque hujus arboris folia artubus imposita eorum dolorem ac rigiditatem demulcent: Eadem testiculorum intumescenciam e contusione vel quavis externa vi ortam, ut & ὕδρω κηλὴν ἢ πνευματοκηλὴν discutunt; at in pulverem redacta, & cum unguento albo caphurato forinsecus applicita Bubones venereos curant, vel cum radice curcuma trita, atque Indies parti affectæ affricta vi sua adstringente vasorum orificia consolidando inveteratum hæmorrhoidum fluxum plane reprimunt. Fructus vero maturi avidius comesti diarrhæam facile excitant, quam arboris radices & cortices facile sedant. At oleum e fructibus coctis expressum vel intus sumptum, vel foris applicitum appetitum excitat, ac alimentorum in ventriculo fermentationem juvat: idem cum affato & trito allio, nec non coagulato lacte frixum, & podici admotum hæmorrhoidum dolores potenter sedat.

Insuper lignum arboris operi fabrili accomodum, ex eoque ingentes cistæ, & naves fabricantur: nec non ex hujusmodi

modi arboribus excavatis naviculas Indi conficiunt, quas *Mansjous* appellant, quarum nonnullæ longitudine octoginta, latitudine novem pedum mensuram superant, at vero naves ex ligno hujus arboris, quamvis duro, constructæ in aquis vermium putredini facile obnoxia sunt, præfertim in fluminum aquis minime falsis.

TAB. 32.

Arboris hujus accuratam descriptionem nullus Botanicorum tradidit, ejus tamen mentionem facit *Zonarius*, descriptionem; uti nec *Lincolus*, qui quidem refert eamque *Angelinam arborem* nuncupat, Estque forsitan *Angelina arbor* B.P. sed *Angelina arbor Pisonis* nullam cum hac habet similitudinem. *Christi Acofta* Cap. 33. etiam arboris hujus facit mentionem, nullam tamen adjungit descriptionem; uti nec *Lincolus*, qui quidem refert ex hujus arboris trunco continuo in India naves, *Tonac* vocatas, exstrui; sed præterea nihil addit.



Katou Tsjaka. Lat.
K3 عر م. Mal.

تفحاطو چيا قحاة Arab.



K A T O U T S J A C A .

T A B. 33.



Arou Tsjaka Malabarenfibus, *Davo ponoffou* Brachmanis, *Faqua falsa* Lufitanis, *Morgenfterren* Belgis, Arbor est procera, caudice crasso, præduro, multisque ramis donato; qui cortice glabro, cinereo, intus viridi, saporis odorisque sylvestris obducti, atque medulla intus rufa & molli referti sunt.

Radix fibrata, albicans, ac fusco cortice tecta, odoris saporisque ingrati.

Folia geminata brevibus, crassis, ac rotundis petiolis ordine decussato furculis geniculatis inhaerent, oblongo-rotunda, glabra, densa, superne colore ex atro virescente nitentia, inferne viridi dilutiore, nervis aliquot è media costa in latera excurrentibus; odor sylvestris, sapor acidiusculus.

Summis ramis innascuntur *globosa capita*, queis densa congerie in orbem *Flosculi* flavescentes inodori insident, qui è calyce candido in quinque lacinias secto prodeunt, & quinque oblongis, exteriora versus reflexis constant foliolis, totidem in medio rufis staminulis præditi, inter quæ oblongus, surrectus, albicans prodit stylus. Flosculis vero decidentibus *fructus globosi* virides sunt, qui dein rubicundi, tandemque nigricantes & fragiles evadunt; & si asperius tractentur, facile solvuntur, ac in plures oblongos, virides, nitentes folliculos secedunt; quibus numerosa, albicantia, exigua, oblonga continentur *semina*; sapor intus aqueus, in cortice vero acidus.


Nascitur in locis sylvestribus Malabar, inprimis circa

Cranganoor; quovis animi tempore floret, fructusque fert, ac diu frugifera manet.

E fructibus vero expressus succus ventris cruciatus mitigat.

T A B. 33.

Arbor hæc nullibi descripta reperitur, & quam ea similitudinem habet, adeoque nec ejus speciem *Tsjaka* seu *Faaca* vocatur, nullam tamen haberi potest.



PELA seu GUAJABOR

POMIFERA INDICA BPIN.

P. indicum *pyrus* *d. 54. 692*

T A B. 34.



Rbor hæc Malabarenfibus *Pela* & *Pelonka*, Brachmanis *Pera*, Lusitanis *Guajavas* seu *Pee-ra*, Nostratibus ibidem *Goejaves* appellatur. Estque justæ magnitudinis, viginti circiter pedes alta, caudice recto, præduro, sesquipedali crassitudine, multisque ramis donato, qui cortice glabro, rubrovirente saporisque austeri obducti sunt; novellis tamen omnino virentibus, quadrangulis ac undique alatis.

Radix rufo cortice tecta fibris suis late per terram diffunditur.

Folia decussatim brevibus crassisque pediculis ramis furculisque cohærent, crassa, oblonga, acuminata, & nonnihil crispa, nervis aliquot ex media costa in latera excurrentibus, inferne scabra seu aspera, superne nequaquam; color ex atro virescens, odor gratus, sapor vero austerus.

Flores candidi ac inodori, quatuor, quinifve tenuibus, oblongo-rotundis foliolis constant, multis in medio staminulis præditi albicantibus, quæ tamen apicibus seu potius nodulis flavescentibus eleganter sunt ornata.

Fructus nostratibus pyris haud absimiles, in vertice umbilico præditi lacunoso, ac tenui & è viridi albicante cortice cincti; maturi gratum spirant odorem, maturitatis indicium, carne intus albicante & succulenta, dulcisque ac grati saporis referti, quæ tamen in immaturis valde dura & adstringens; intra quam numerosa subrotunda ac prædura observantur grana.

Arbor hæc nusquam sponte in Malabar nascitur, sed facili negotio in hortis alitur. Seminibus sata tertio anno fructus fert, quos plerumque mensibus Januario & Februario maturos exhibet, manetque frugifera ultra triginta annos.

Ex foliis hujus arboris in aqua coctis Balneum conficitur, quod sua caliditate sudores movendo febrem sanat. Nec non è corticibus radicibusque decoctum paratur, quod subinde assumptum viscerum obstructions referat, aquas hydropicorum ducit, & icterum tollit. Fructus in aceto vini cocti diarrhæam ac dysenteriam sistunt: iidemque maturi avide comeduntur, & in bellariis esse solent, alvumque laxant.

T A B. 34.

Pela hanc describit *Piso Hist. Nat. & Med. Brasil. libr. 4. cap. 2.* nomine *Guajaba*. Eamque *Xalxochtl* seu *pomo arenoso* nuncupat *Recchius rerum Med. Novæ Hispan. libr. 3. cap. 51.* ubi tres ejus proponit species. Et refert *Joh. de Laet libr. 10. cap. 3.* *Guáyavos* provenire in Peru, & Quito provincia; adeo ut fructus hi in Indiis cum orientali, tum occidentali abunde proveniant. Estque *Pela* hæc *Guáyabo pomifera Indica* Caspari Bauhini Pin. libr. 11. Sect. 6. & *Guáyava Indica fructu malifacie* Joh. Bauhini Hist. Plant. Tom. I. libr. 1. cap. 41.



Pela. lat.
പെലാ mal.

پهل Arab.



Malacka pela. lat.

മലക്കര Mal.

ബ്രാ bram.

ملاقا پیر Arab.



MALACKA - PELA.

TAB. 35.


P. ardens *persea*
L. 4. 622

Rbor hæc altera Pelæ species est, ac Malabarenfibus *Malacka - Pela* & *Tsjina - Peloucka*, Brachmanis *Pera*, Lusitanis *Pera de Malacka*, nostratibus ibidem *Goejarves* appel dicitur. A priori vix differt, nisi foliorum & florum magnitudine.

Fructus autem rotundiores, ac malis potius assimilantur, intus carne punicea acidiuscula præditi. Et quemadmodum prior, sic etiam hæc nusquam sponte provenit in Malabar, sed exteris è regionibus allata fuit, uti nomen *Malackæ* indicare videtur, quanquam nec Malacka patrius hujus arboris sinus est; at è Moluccanis Insulis, aut China, aut forsitan è Nova Hispania prius transferri cepit.

TAB. 35.

Altera hæc *Guayavos* species est *Xalxocopti prima Recchi*, & *Araca-Guacu Pisoms*; cum priore ubique crescit, uti *Recchi* testatur.



PELOU seu GUAYABO SYLVESTRE.

T A B. 36.



Elou & Katou Pela Malabarenfibus, *Pelouarta* Brachmanis, *Pera Brava* Lusitanis, *wilde Goeyaves* Belgis, Arbor est mediocris magnitudinis, decem aut duodecim pedes alta, caudice mediocriter crasso, multifque ramis in orbem diffusis donato, cortice crasso, lignoso, scabro, furvo, ac intus rubro, obducto; Lignum albicans, densum, ponderosum, insipidum, odoris sylvestris.

Radix itidem albicans, cortice fusco intus rubro tecta.

Folia oblongo-rotunda, crassa, mollia, lanuginosa, in ambitu crenata, crassis, brevibus, albicantibus petiolis ramorum extremis, proveniunt rubicunda; quæ tamen postea superne atro-viridia, inferne subviridia evadunt, longitudine tres, latitudine duas palmas facile superantia, insipida, inodora; à pediculo ad apicem folii costa insignis albicans decurrit, quæ plures undique emittit nervulos.

Flores brevi pediculo extremis furculis multi simul juncti insident, atque è calice viridi quadripartito prodeunt, quatuor crassis, oblongo-teretibus, flaccidis, viridifriatis foliis constantes, numerosis staminulis albicantibus, flavescantibus dotatis apicibus, mediam floris cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ stylus prodit oblongus, albicans: odor gravis ac foetidus, sapor amarus.

Fructus pyris haud ab similes, ac viridi, glabro, nitente, & duriore cortice cincti, intusque carne densa & albicante referti; intra quam oblongo-rotunda, glabra, rufa, densa, sapore castaneas æmulantia, locantur *semina*: fructus vero immaturi valde duri sunt, foetidi, saporisque ingrati; & quanquam maturiores saporis subdulcis evadunt,

dunt, non tamen ob venenatam, qua præditi sunt, qualitatem comeduntur.

Crescit arbor hæc ubique in Malabar, imprimis circa Cochinchina, & Porka; mensibus Mayo & Junio floret, & antiquis decidentibus, novis frondescit foliis, fructus vero sequentibus fert Octobri & Novembri, diuque frugifera manet.

Cæterum arbor hæc in Medicina ob venenosam qualitatem nullum habet usum; cortice tamen apri delectantur, quem in finem venatoribus in usu est.

T A B. 36.

Genus hoc *Pele* seu *Guayavos Sylvestris*, à nemine hætenus descriptum, tertia ejus species merito haberi potest.



Pelou. Lat.
പെലു Mal.
പെലു bram.
پهلوه Arab.




Covalam. Lat.

കവളം mal.

Belou bram.

കവള

كوفلام Arab.



COVALAM seu CYDONIA EXOTICA.

CASP. BAUH. in PIN.

TAB. 37.



Covalam Malabarenfibus, *Belou* Brachmanis, *Marmeleira* Lusitanis, *Slym-appels* Belgis, Arbor est procera, caudice ex albo flavescente variegato, crasso, præduro, multisque ramis donato; qui cortice crasso lignoso obducti, ac spinis oblongis aculeatis muniti sunt.

Rami autem vetustiores spadiceo-fusci, teneriores vero ab una parte virides, ab altera qua radiis exponuntur foliaribus, rubicundi, uti & ipsorum spinæ.

Radix fibrata, albicans ac rufo cortice tecta, odoris gravis, saporis dulcis, deinde amariusculi.

Folia terna simul ex eodem pediculo nascentia, oblongo-teretia, in ambitu crenata, communi virore nitentia, suaveolentia, austera, manibus conficta unctuosâ; à pediculo ad apicem folii costa insignis decurrit, quæ plures undique emittit nervulos.

Flores suaveolentes sex septemve uni pediculo inhærent, atque è calyce viridi in laciniâ secto prodeunt, & quinque oblongo-rotundis, crassis, reflexis, exterius viridibus, interius albo-viridibus constant foliolis, multis in medio subviridibus staminulis, viridibus apicibus dotatis, præditi; inter quæ stilius prodit oblongus, crassius, surrectus, qui ipsius fructus rudimentum est.

Fructus mala rotunda externâ formâ referunt, quos tegit subviridis tenuis cortex, cui subiectus alter prædurus lignosus, & pene osseus, carnem continens viscosam subflavam, humidam, saporis acido-dulcis; intra quam semina plana oblongo alba, gummoso pellucido succo intus turgentia, recondita sunt.

Nascitur frequenter in Teckenkour, Kalicolan, aliisque Provinciis Malabar, nec non in Infula Zeilan. Seminibus fata sexto vel septimo demum anno fructus fert, quos tamen singulis annis Decembri & Januario mensibus maturos exhibet, ac integrum seculum frugifera manet.

Hi autem fructus teneri saccharo vel aceto condiuntur; maturiores vero in deliciis comeduntur. Ex arboris cortice & radiculis cum aqua communi decoctum paratur, quod melancholiam hypochondriacam, cordis palpitationem, & lypothymiam sanat. Ex eodem cortice in subtilem pulverem redacto, & melli admixto Electuarium conficitur, quod mane sumptum alimentorum in ventriculo fermentationem juvat, capitis dolorem ac vertiginem tollit. Foliorum decoctum asthmati medetur. Ex floribus aqua destillatur cardiaca & alexipharmaca. Fructus denique vix maturi diarrhæam & dysenteriam sistunt.


T A B. 37.

Covalam si non ipsa arbor, quam exhibet *Bontius hist. nat. & Med. Indiarum orient. lib. 6. Cap. 8.* nomine *Mali Cydonæ Indici*, saltem species ejus est. *Garcias ab Horto aromat. hist. lib. 2. Cap. 14.* vocat *cydoniam* è *Bengala*, additque Lusitanos illam appellare *Marmelos de Bengala*, Bengalenses *Scrifole* & *Beli*; que nomina sane


cum *Brachmanico Belou*, & *Lusitanico Marmeleira* conveniunt. Insuper *Castor Duwantes in hortulo sanitatis fol. 576.* describit *Covalam* nomine *Marmelos de Bengala*. Estque hæc arbor *cydonia exotica* Caspari Bauhini in *Pinnace*.



Syalita. latin.



Sjalita. lat.




N. 3.



N. 2.



N. 1.



SYALITA.

TAB. 38. 39.



Rbor hæc Malabarenfibus *Syalita*, hoc est *Syneritas*, appellatur, Brachmanis *Karinbala-pala*, Lufitanis *Fruita Estrelada*, Belgis *Roos-appel*. Est autem procera, quadraginta aut quinquaginta pedes alta, caudice admodum crasso, cortice itidem crasso munito, qui cuticulâ cinereâ squamosâ obductus, intus albicans, aqueus, ac ubi inciditur copiosam aquam adstringentem exsudans.

Similiter *Radix* crassa est, & tenui rubro-nigricante squammoso, intus vero ad albicantem medullam purpureo cortice tecta, nec non fibris suis late per terram diffusa, sapor acris, odor nullus.

Folia oblongo rotunda singula crassis, intus cavis ac villosis seu lanuginosis suis petiolis inhærent, longitudine spithamam, latitudine palmam superant, superne splendent, inferne nequaquam, color ex atro-virescens; costa media crassa & in adversa parte alte extuberans, e qua nervi plures ordinatim ferme bini & bini perallelo ductu ad prominentes dentatasque oras exeunt; vetustorum odor ut & sapor sylvestris, novellorum acidus.

Inter ipsa autem folia e valido, crasso, quadrangulo caule *calyx* prodit, qui ad mali aurantii magnitudinem auctus sese aperit, constans e quinque cochleato-cavis, viridibus, crassis, validis, nitentibus foliis, seu potius cavis involucris *Florem* continentibus formosissimum & admirandum, itidem e quinque albicantibus, glabris, cavis,

Dellena indica
L. n. 755

rotundis, coriaceis foliis conflatum, plurimis in medio capillamentis albicantibus, aureis apicibus dotatis, præditum, quæ infuper albicante umbilico stellato, eleganter e viginti angulis formato, superius ornata sunt. Postquam vero flos ita apertus suavissimo ac liliaceo odore septem octove dies elegantiam suam orbi exhibuit, quinque ejus albicantia folia stellatum umbilicum, ut & albicantia capillamenta instar fativæ brassicæ arctissime constringunt; dein crassa cochleato-cava viridia nitentia calycis folia omnes illas floris partes occludunt comprehenduntque, quæ unita singularum, quæ in flore sunt, partium complicatio *Fructum* efformat prægrandi malo similem. At vero floris ut & fructus hujus varias partes, & multiformes earum imagines accuratius qui cupit intueri, duas hæc tabellas perlustret, ubi N^o. 1. adversa folii pars. 2. petioli, quibus folia inhærent. 3. costa folii media alte extuberans. 4. superior folii pars A. A. A. calycis folia crassa, cochleato-cava, viridia, nitentia. E. E. E. E. E. ipsius floris albicantia cava, rotunda, coriacea folia, acido ac vinoso sapore prædita, quæ quum calycis folia A. A. A. occludunt ac comprehendunt florem, plane mucosa fiunt. G. G. capillamentorum in floris medio congeries. F. F. albicans umbilicus stellatus, quo flos aut fructus in medio ornatus est, exhibentur. N^o. 6. idem flos, quum separatis crassis calycis foliis, basis ejus. M. apparet; & D. D. D. quomodo floris capillamenta G. G. ipsi basi. M. adhærent. K. L. separata quædam albicantia floris capillamenta. N^o. 7. conspicitur floris basin. M. ut & stellatum ejus umbilicum. F. F. ex pluribus albicantibus feminum folliculis inter se junctis conflari, quorum unus I. I. separatim delineatur, quemadmodum. P. exigua albicantia rotunda, quæ continet, femina adumbrantur; & N^o. 8. H. H. quo ritu feminales thecæ junguntur, ut floris basin, & stellatum ejus constituent umbilicum. Atque hæc omnes multiformes partes in flore recluso & ducto

ducto levi operâ separantur, quæ tamen in clauso non tam facile exhiberi queunt. N^o. 1. A. A. maliformis fructus perfectus ostenditur, in quo crassa cochleato-cava calycis folia, quæ diducta cum flore aperto *Tab. 1.* exprimuntur, tam exacte sibi mutuo junguntur, ac omnes floris partes ita occludunt, comprehenduntque, ut eorum vestigia vix discerni queant; adulto autem fructu, iisque demptis candidantia ipsius floris folia plane mucosa conspiciuntur: quibus porro detractis floridus exsplendet aster N. 2. B. B. B. viscidam in fructu æmulans carnem, sicuti floris capillamenta albicantia C. C. C. lubricis & mucilaginosi filis assimilari possunt. Sublato vero hoc stellato vertice inferiores designantur appendices, veræ seminum capsulæ N^o. 3. D. D. D. in quibus numerosa latent femina tenaci glutine tanquam piscium ova cohærentia, tabaci feminibus haud majora: adeo ut flos & fructus ab ortu ad interitum easdem partes, formâ equidem & situ, non vero essentiâ vel numero, discrepantes obtineant.

Cæterum fructus hi nostratibus pomis vinosis fere assilantur odore, sapore, & pulpâ; medullium tamen paulo aliter hic conformatur: etiam pulpa in fructibus hiscematurioribus factis molissima evadit.

Crescit hæc arbor in multis locis Malabar, præcipue circa Cochin, & Provincias Moutan; semel in anno, Decembri viz. & Januario mensibus, fructus fert, & a sationis anno circiter quarto ad quinquagesimum & ultra frugifera est.


Fructus hi ob nimiam aciditatem in deliciis vix comeduntur; sed in eduliis, præsertim indigenarum jusculis usurpantur. Ex arboris foliis lixivium fit, capillorum unctuositati, ac capitis fordibus absumendis, nec non argento decoquendo, adeoque depurando accomodum. Succus e radicibus expressus cum linteis applicatus tumores phlegmonosos ac œdematosos resolvit. E fructibus teneioribus expressus succus cum saccharo miscetur, ac inde

lyrupus conficitur, qui phlegmata incidit ac expellit, tussim sedat, nec non faucium inflammationem, & aphthas tollit: Fructus autem maturiores laxam reddunt alvum, & diarrhœam non raro excitant. Denique arboris cortex cum oryzæ infuso (quod indigenæ a *Ambatacansja* nuncupant) tritus, partique affectæ illitus arthritidi medetur.

a *Ambatacansja* Incolis vocatur illa oryzæ aqua, quæ per noctem super coctam oryzam infusa fuit.

T A B. 38. 39.

Arbor hæc, a nemine hætenus tradita, non male dici posset *Malus rosea Malabarica*.




Blatti. lat.

ਬੁੱਝ ਮਲ.

Ambetti. bram.

ਮਿਸਰ
ووتعطر Arab.



88
00

BLATTI seu JAMBOS SYLVESTRIS,

T A B. 40.



Blatti seu *Katon-Tsjambou*, quasi sylvestris *Jambou*, Malabarenfibus hæc arbor dicitur, Brachmanis *Ambetti*, Lusitanis *Jambou de Mato*, Belgis *Sterre-bollen*: Estque mediocris magnitudinis, quatuordecim circiter pedes alta, crasso cinereo lignoso cortice tecta, uti *Tengga*. lignum albicans, prædurum. Rami ac furculi geniculati, nec non teneriores quadranguli & alati, primum rubicundi, dein spadicei; vetustiores vero alis privati, ac rotundiores.

Radix nigricante cortice tecta, odoris ac saporis sylvestris.

Folia brevibus, planis, purpureis, ac alatis petiolis, ex adverso ut plurimum ramulis inhærent, oblongo-rotunda, glabra, densa, communi virore nitentia, nervis aliquot ex media costa in latera excurrentibus, longitudine sex, latitudine quatuor ferme pollices superantia; odor nullus, sapor austerus.

Flores inodori ac acidi floribus *Nati-tsjambou* part 1. fig. 18. exhibitæ haud absimiles, sex oblongo-teretibus, acuminatis, tenuibus, purpureis constant foliis, & singuli brevi ac quadrangulo pediculo extremis ramulis prodeunt; nec non lato, profundo, crasso, viridi, in sex lacinias secto, inhærent calyci, qui plurima insuper emittit stamina robusta, eminentia, oblonga, purpurea, rubicundis falcatis apicibus eleganter ornata.

Fructus mala sunt plano-rotunda ac lata, viridi-fusca & nitentia, in vertice stylo oblongo subviridi dotata; ad basin vero calyce plano, lato, crasso, ac viridi excepta, qui

Pars III.

S

ob-

oblongos suos cuspides late extendens, ac exteriora versus reflectens, stellam exactè refert. Cæterum fructus hi, quanquam maturiores, duri sunt, carne intus albicante & succulenta, saporisque valde acidi, referti, intra quam plurima angulata albicantia observantur semina. Insuper fructibus hisce transversim dissectis feminum folliculi, eleganter in speciosæ arboris formam per carnem dispositi, albicantes sese offerunt, qui tamen ab aëris actu mox plane nigrescunt, ac si atramenti liquore essent imbuti.

Circa Palourti & Tirpoutarè Provincias Malabar, in fluminum ripis, aliisque locis aquosis plurimum hæc arbor nascitur: semel in anno, mensè viz. Augusto, maturos exhibet fructus, & à sationis anno tertio aut quarto ad vigesimum circiter frugifera manet. Fructus vero hujus arboris ab indigenis coquuntur, & cum aliis cibis comeduntur: succus autem e fructibus expressus, & melli admixtus aphthis medetur, nec non febricitantibus æstum potenter compescit. E foliis contusis cataplasma conficitur, quod capiti raso in febribus continuis impositum somnum conciliando delirium solvit.

T A B. 40.

Arbor hæc Lusitanis *Jambou de Mato*, hoc est, quapropter malè hic loci traditur, sed potuisset describi *Jambou Sylvestris* appellatur; estque tercia *Jambou* species, in Parte prima post *Nati-Schambu* Tab. 18. cuius, cujus nullus Botanicorum hæctenus meminit.



Panitsjika maram. lat.


പനിച്ചി *mal.*

Tembiri, *bram.*

रेवरा

پانچيچ Arab.

Diospyros ambigof Pers.
Phanocarpus 403



PANITSJIKA-MARAM.

TAB. 41.



*P*anitsjika Malabarenfibus, Tembiri Brachmanis, *Fruita da grude* Lusitanis, *Lym-appel* Belgis, Arbor est procera, altitudine octoginta, crassitie vero quindecim pedum mensuram non raro superans, multisque ramis donata; Lignum prædurum, albicans, nigricante austerique saporis cortice obductum.

Radix itidem albicans nigricante cortice tecta, & fibris suis late per terram diffusa.

Folia oblongo-rotunda, glabra, densa, nitentia, crassis, brevibus, viridi-flavis petiolis rubicunda proveniunt, quæ tamen postea supernè atro-viridia, infernè subviridia evadunt, odoris & saporis sylvestris ac ingrati: à pediculo ad apicem folii nervus decurrit conspicuus, rotundus, viridi-albicans, infernè eminent, è quo plurimi exoriuntur nervuli contortuplicati, exigui.

Flores vel candidi vel albo-flavescentes, brevi pediculo extremis furculis multi simul juncti insident, atque e calyce viridi-flavescente prodeunt: constant ii unico folio, sed in quatuor aut quinque profundas lacinias diviso, sic ut plura videantur, numerosis fibris pallidis erectis mediam floris cavitatem & umbilicum occupantibus; odor suavissimus & aromaticus, nec non è longinquo nares feriens.

Fructus, qui etiam plures simul floribus succedunt, ac calyce viridi grandiusculo excipiuntur, exacte rotundi sunt, & pilarum obtinent magnitudinem, in vertice umbilico

Pars III.

T


præ-

præditi, & cortice primum viridi, dein rubro villoſo ſeu lanuginoſo, tandem vero glabro & cinereo cincti; carne intus albicante, ſubviridi, & aquoſa ſeu potius glutinoſa, ſaporisſque primum valde acidi, dein acido-dulcis, referri, intra quam octo aut decem *ſemina* rubicunda, plana, oblongo-rotunda; *fructuum Cacao* æmula, ac utriculis inclufa, in orbem locantur, eaque glutinoſâ fructus pulpâ artificialiſe obducta cernuntur. At vero immaturi cum hi fructus ſint humore glutinoſo, gummoſo, & aqueo-pellucido ita abundant, ut cortice pluribus foraminulis pertuſo guttatim exſudet, qui radiis ſolaribus in ſubſtantiam ſpiſſiorem concreſcens, ipſum fructum gummi inſtar obliniſcit: fructus autem quum indies matureſcunt, viſcoſitas hæc, ut & humor ipſe minuitur, donec tandem modico ac grato ſucco repleti eſui apti evadant. Naſcitur hæc arbor ubique in Malabar; quo viſ anni tempore fructus fert, quanquam Aprili & Octobri Menſibus ut plurimum floret; atque à ſeptimo circiter ſationis anno ad centeſimum & ultra frugifera eſt. Arboriſ huius ſolia tenella cum aqua trita (quam medicaminis formam plerique Aſiatici pro more habent) ac potui data, vel etiam ſuccus e fructibus tenerioribus expreſſus egregium eſt ad aphthas & linguæ fiſſuras remedium, ſi ore contineatur. Idem ſuccus oculis inſtillatus ophthalmiæ conducit. Arboriſ cortex in pulverem redactus ac cum oryſæ inſuſo, & expreſſo è matura nuce Indica lacteo ſucco mixtus, atque febricitantibus exhibitus æſtum potenter extinguit: inſuper decoctum ex hoc cortice paratur, cui mel admiſcetur, idque aſſumptum ventris tormina ſedat. E ſeminibus oleum exprimitur, quod cum zinzibere & ſemine cumini ſumptum hydropicis ſuccurrit; inſuper alvi cruciatus lenit, eandemque evacuat. Fructus vero maturiores cum incluſis ſeminibus ſeu nucleis

cleis ab indigenis comeduntur. Succus denique glutinosus, gummosus, pellucidus, qui è fructibus haud maturis exprimitur, radiis solaribus concrefcens ac rufescens, seu ex rufo-nigricans, & velut vitrescens, optimum evadit *gluten*, quo ad quæcunque arctiffimè conjungenda utuntur incolæ: quemadmodum Judæi & Lusitani in compingendis libris solo hoc glutine utuntur, quique ob id teredini nunquam obnoxii sunt: nec non piscatores eodem hoc glutinoso succo retia sua inficiunt, ut durabiliora evadant.

T A B. 41.

Panitsjika-maram describit *Piso hist. nat. & Med. Brasiliens.* lib. 4. cap. 16. nomine *Janipaba*. *Clusius Exoram*, saltem species hujus est. Insuper *Job. Bauhinus tic.* lib. 1. cap. 10. vocat *Junipapeywa Brasilianorum*; sed quoniam exsiccatum fructum ipsi solummodo licuit videre, accuratam hujus arboris non addit descriptionem. *Genipat Theveti* si non *Panitsjika-maram*, saltem species hujus est. Insuper *Job. Bauhinus tic.* lib. 3. cap. 4. & 5. plura hujus arboris genera, è variis auctoribus collecta, proponit.



N I I R V A L A.

T A B. 42.



Rbor hæc Malabarenfibus *Niirvala*, Brachmanis *Ranabelou* & *Pretonou*, Lufitanis *Pee do Morto*, Belgis *Bombeenen* appellatur: Estque vastæ magnitudinis, triginta aut quadraginta pedes alta, paucis ramis in orbem diffusis, cortice glabro, cinereo, albicantibus interstincto punctulis, obductis; lignum prædurum, flavescens.

Radix albicans, cortice cinereo tecta, graveolens est, at fere insipida.

Folia terna simul petiolis teretibus, longitudine spithamæquantibus, proveniunt, oblongo-rotunda, ac in mucronem desinentia, glabra, communi virore nitentia, subacida, manibus confrieta suaveolentia; e costa media insigni plures nervuli ordinato ac parallelo ductu exeunt, qui ad oras arcuatim in se invicem incurrunt.

Flores in ramorum extremis, tenuibus, oblongis, glabris, viridibus proveniunt petiolis; iique quatuor oblongo-rotundis, acuminatis, albicantibus, ac striatis constant foliis, quæ totidem intus exiguis, acuminatis, subviridibus foliolis sunt munita, numerosis viridibus ac rubris staminulis, purpureis oblongis apicibus dotatis, mediam floris cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ viridis prodit stylus oblongus, crassus, surrectus, apice rotundo, saturato-viridi eleganter ornatus, e quo dein fructus emergit: odor suavissimus & vinosus.

Fructus vero viridibus, oblongis, crassis, rotundis, lignosis pendent petiolis, qui articulatim florum junguntur pediculis, uti & hi geniculatim ramulis inhærent; suntque oblongo-rotundi, virides, cortice cinereo tenui obducti; intus carne humida, albicante, quadripartita, odo-


ris saporisque vinosi, referti; intra qua numerosa continentur *semina* flavescentia, prædura, angulata & plana.

Provenit hæc Arbor locis petrosis & arenosis in Malabar, imprimis circa Provincias Mangatti, & Poiga in fluminum ripis: mense Aprili folia decidunt, verum sequente Junio & Julio, dum floret, novis denuo frondescit foliis, at Novembri & Decembri Mensibus maturos fert fructus, vixque annos quadraginta frugifera manet.



Foliorum autem succus linteis exceptus, & inguinibus adhibitus urinam ciet: similiter fructus contusi & cum sale, comphora, & felis stercore in cataplasmatibus formam redacti, & dictis locis applicati eosdem præstant effectus. Cortex in aqua maceratus, & cum zinzibere & pipere longo in lacte vaccino & oleo sesami ad humidi consumptionem excoctus, egregium præbet exsiccandis frigidis humoribus linimentum. Semen cum orizæ infuso coctum, & dein cum butyro recenti contusum, ac cataplasmatibus formâ abscessibus applicatum potenter eos emollit ac maturat.

T A B. 42.

Piso hist. nat. & Med. Brasiliæ lib. 3. cap. 16. arborem describit, quæ Indigenis *Tapia* dicitur, & magnam cum *Nyroala* habet similitudinem, cum foliorum, tum florum & fructuum ratione, lignum tamen non ita durum, uti *Nyroala*, sed fungosum; quod discrimen forsan procedit à natali solo, ubique eodem modo haud constituto, uti non raro in aliis stirpibus id contingere observamus; quapropter putamus, duas hæc arbores si non easdem, saltem species esse perisimiles.




Tamara-tonga. lat.
 തമരകു malab.
 Carumbola. bram.
 कम्बला
 'طامغر طونجيا' Arab.



Tamarà-tonga. Lat.
കരവഴി മാല. mal.

Carimbola. bram.

कदम
طامرا طونقا Arab.



TAMARA-TONGA,

S E U

CARAMBOLA S.

*Arbutus Carambola
L. 4. 613*

TAB. 43. 44.



Arboris quæ Malabarenfibus *Tamara-tonga*, Brachmanis & Lusitanis *Carambola*, Belgis *Vyfhoeken* appellatur, duæ sunt species, quæ inter se vix distinguuntur, nisi quod altera dulcissimi plane sit saporis. Non altè, viz. ad duodecim aut quatuordecim circiter pedum altitudinem, excrescunt. Caudex pedis mensuram in ambitu vix superat, multisque ramis in orbem diffusis donatus, cortice scabro & fusco obductus; Lignum albicans, medulla intus albicante & molli refertum.

Similiter *Radix* albicans, nigricante cortice tecta.

Folia ordine parallelo ramulis inhærent, oblongo-rotunda, acuminata, crassa, mollia, glabra, viridia, superne splendentia, inferne nequaquam, nervis aliquot in adversa parte eminentibus, ex media costa in latera excurrentibus; odor sylvestris, sapor amaricans & adstringens.

Flores racematim ipsis ramis inhærent, atque e calyce rubicundo, in quinque lacinias secto, prodeunt, quinque tenuibus, oblongo-rotundis, purpureis foliolis constantes, quinque in medio albicantibus staminibus, flavescens apicibus dotatis, præditi; sapor subacidus, odor nullus.

Fructus oblongi, umbilico exiguo, at eminente in ver-

Pars III.

X

tice

tice præditi, quinque angulis crassioribus fulcati, qui tamen in medio eminentiores sunt, juxta utrumque caput non tam evidentes; cortice tenui, undique carni arctissime adhærente, glabro, nitente, primum viridi, dein flavescente cincti; carne primum albicante, dein eâdem flavescente, tenerâ, succulentâ, saporisque primum acerbi, dein acido-dulcis & suavis, intus referti. In pentagono ejus meditullio seu volva *Scribonio* dicta, Græcis *μῆτρα καὶ καρδία*, decem latitant *femina* oblonga, alterâ parte obtusa, alterâ acuta, rufa, glabra, membranaceis quibusdam atque duris pelliculis seu parietibus integerrimis, uti in malis, sejuncta, ita ut gemina in singulis latitent cellulis.

Arbor hæc in hortis & pomariis sæta, ubique in Malabar crescit; ter singulis annis flores fert, fructusque exhibet maturos: sobole aut feminibus sæta a primo triennio ad annum quinquagesimum usque frugifera est.

Succus autem è radicibus hujus arboris expressus, & assumptus, æstum febrilem compescit. E foliis contusis cum oryzæ infuso cataplasma conficitur, quod tumores quoscunque potenter emollit & resolvit; at vero è foliis hisce in oryzæ infuso decoctis aut maceratis egregium fit decoctum vulnerarium. Succus è fructibus expressus pruritem, impetiginem, psoram, similesque affectus cutaneos sanat, si linteis parti affectæ subinde admoveatur; idemque succus, si cum adusto nucis Indicæ vino (quod vulgo *Araque* dicitur) propinetur, alvi cruciatus lenit & diarrhœam sistit. Insuper è foliis hisce contusis, & cum succo è palmæ floribus expresso cataplasma paratur, quod inflammationibus quibuscunque medetur. E fructibus exsiccatis, & cum foliis Betelæ contusis pulvis fit, qui

Nirvāla. Lat.
निर्वाला *Mal.*
Rāna-bēlou *bram.*
रानबल
نير وال *Arab.*



qui cum nucis Indicæ vino adusto propinatus labores parturientium promovet, nec non fœtum mortuum & fecundinas expellit.

Adhæc fructus maturi in deliciis comeduntur; immaturi vero saccharo, vel muria & aceto condiuntur. Præterea e fructibus immaturis succus exprimitur, qui in vestes incidens suo acore colores exedit; atque ideo ad maculas quascunque e linteis delendas frequenter usurpatur; colores etiam ad lintea tingenda ex eo parantur; nec non cum fructibus immaturis Aurifabri vasa argentea decoquere & depurare solent.

T A B. 43. 44.

Arboris hujus, ejusdemque fructus mentionem faciunt *Garzias ab Horto lib. 2. Cap. 15 & Acoſta cap. 47.* Similiter *Bontius libr. 6. cap. 11.* breviter eam describit, sed imperfectè. Errat *Casparus Baubinus*, quum *Pinacis lib. 11. sect. 6.* *Carambolos* vocat *Mala Goënsia fructus octangularem* pomi vulgaris magnitudine; seductus nimirum illis quæ de octangularem horum fructuum figura male refert *Linschotus*. Adhæc arbor hæc in Decan *Camarix & Carambeli*, Malaccis *Bolimba*; Persis *Chamarock* nuncupatur.




Bilimbi. lat.

බිලිඹ්බි *mal.*

Malacki-Caramboli. *gram.*

मलाकिकरवली

بيليمبي *Arab.*





Bilimbi. Lat.
 බිලිබි *Mal.*
 Malacki-Caramboli *tram.*
 मलाकिकावली
 بيليمبي *Arab.*

B I L I M B I .

T A B. 45. 46.

Avicenna Bilimbi 2. p. 613

Bilimbi Malabarenfibus, *Malaki - Karamboli* Brachmanis, *Bilimbinos* Lusitanis, *Blimbynen* Belgis, Arbuscula est humilis, octo aut decem pedes circiter alta, caudice tenui, ramis in orbem diffusis eleganter ornato, qui cortice atro-viridi, primum hirsuto, & spinis tenuissimis subaspero, deinglabro obducti, atque molli & albicante medullâ intus referti sunt; Lignum tamen prædurum, albicans, insipidum, inodorum.

Radix similiter albicans, rufo cortice tecta.

Folia ordine parallelo ramulis inhærent, oblongo-teretia, crassa, mollia, viridia, supernè splendentia, infernè nequaquam, nervis aliquot, in adversâ parte eminentibus, ex media costa in latera excurrentibus; odor suavis, sapor subacidus.

Flores non furculis foliaceis, at ipsis ramis, nec non toti caudici inhærent numerosi, & quasi in fascias spithamam longas collecti, atque e calyce rubicundo, in quinquelacinias acuminatas secto, prodeunt, quinque tenuibus oblongo-teretibus, superne colore purpureo, inferne pallidiores nitentibus, reflexis foliis constantes, decem in medio rubicundis staminibus, albicantibus apicibus ornatis, mediam floris cavitatem & albicantem umbilicum occupantibus, quorum quinque elatiora extra florem prominent, quinque vero breviora sunt: odor violaceus, sapor subacidus & gratus.

Fructus, qui etiam plures simul floribus succedunt, fructibus *Tamaræ-tongæ* plane similes, oblongo-rotundi sunt, ovo gallinaceo magnitudine respondentes, quinque angulis crassioribus fulcati; cortice tenui; undique carni arctè adhærente, viridi, glabro, & nitente obducti;

carne primum viridi, dein flavescente, tenerâ, succulentâ, saporis primum acerbi, dein subacidi & suavis, intus referti, quæ uvarum carni haud absimilis est. In pentagono ejus meditullio *semina* latitant oblonga, alterâ parte obtusa, alterâ acuta, rufa, glabra, membranaceis quibusdam pelliculis seu parietibus integerrimis sejuncta, ita ut singula in singulis latitent cellulis, interdum etiam gemina. Arbor hæc, sobole aut feminibus in hortis fata, ubique in Malabar nascitur; per totum annum floret, fructusque fert, atque à primo sationis anno ad quinquagesimum, & ultra frugifera est.

Singulæ vero hujus arboris partes easdem habent vires, eundemque in medicina usum cum *Tamara-tonga*. Fructus maturi in deliciis quoque comeduntur, immaturi saccharo, aut aceto & muria condiuntur: Et quanquam maturi subacidi, gratique sint saporis; immaturi tamen acerbi, adeo ut stupor dentium ex acidorum esu contractus, hisce fructibus comestis obfussetur.

T A B. 45. 46.

Bontius libr. 4. cap. 42. hanc *Bilimbi* describit nomine *Billingbung*, atque obscuram ejus exhibet figuram. *Zo-nonius* quoque hujus arboris meminit, nullam tamen tradit descriptionem. Fructus ejus similitudinem quandam habere videtur cum *Carambolis*, cætera vero harum arborum inter se minimè conveniunt.



Tab. 47.

Neli-pouli.

Lat.

നെളി പുളി

Mal.


Amvalli.

अमवळ


Gran.

نهلی پوی

Arab.



Cicca disticha L.





NELI-POULI seu BILIMBI

ALTERA MINOR.

TAB. 47. 48.



Rbusculæ quæ Malabarensibus *Neli-pouli*, Brachmanis *Amvallis*, Lusitanis *Cheramela*, Belgis *Suercnoop* nuncupatur, duæ sunt species plane sibi confimiles, quarum altera quamquam floret, nullos tamen fructus fert, & peculiari nomine *ala-pouli* dicitur. Non alte, viz. ad octo aut decem circiter pedum altitudinem, excrescunt. Caudex albicans, pedis mensuram in ambitu vix superat, multifque furculis foliosis, glabris, viridibus, in orbem diffusis donatus, cortice crasso, furvo, intusque purpureo obductus.

Radix purpurea, cinereo tegitur cortice, ac succum stillet lacteum; sapor acris, odor nullus.

Folia, foliis *Bilimbi* plane similia, ordine parallelo quoque ramulis inhærent, cum quibus dein, novis foliis frondescente arbore, à ramis majoribus decidunt. Similiter *Flosculi* non furculis foliosis, non ipsi caudici, uti in *Bilimbi* cernitur, sed ramis lignosis racematim inhærent, exigui, uvarum flosculis haud absimiles, quatuor aut sex tenuibus, acuminatis, purpureis, atque in stellæ modum expansis, foliolis constantes, octo aut decem in medio albicantibus fibris præditi; odor suavis, sapor subacidus.

Fructus, qui floribus succedunt, ramis lignosis quoque racematim inhærent, plano-rotundi, ceraso nigro majori magnitudine respondententes, sex octove angulis fulcati, glabri, subvirides, nitentes, ac perlucidi, umbilico exiguo & concavo in vertice ornati, nec non carne succulentâ, (prunorum carni haud absimili) subacidi, gratique saporis, intus referti, ac pellicula tenui, undique carni ar-

Amvallis
C. 47. 48

ctè adhærente, cincti. Intra carnem *officulum* continetur, quod *nucleum* includit callosum, oblongum, è sex octove *feminibus*, tenuis cuticulæ ope inter se junctis, constantem, quæ detracta hac pellicula conspiciuntur, oblonga, supernè rotunda, infernè plana. Hi autem fructus subacidi & grati in deliciis comeduntur, & in eduliis usurpantur, nec non saccharo, aut aceto & muriâ condiuntur, vel in furno exsiccati ad varios usus conservantur.



Crescit hæc arbor. sobole aut feminibus in hortis fata, ubique in Malabar & Canana; per totum annum, uti *Bilimbi*, floret, fructusque fert, atque à primo sationis anno ad quinquagesimum usque frugifera est.

Cæterum radix hujus arboris cum semine finapi & cumini contusa, atque exhibita vomitum ciet, alvumque movet: at vero cum fructu *Tamara-tonga* si usurpetur, nimium alvi fluxum compescit, & dyspnœam sanat. E foliis cum aqua communi Decoctum conficitur, quod sudores movet, ac variolos expellit. Ex iisdem etiam cum croco Malabarico (quem *Manya Coua* indigenæ vocant) in aqua decoctis Balneum fit, quod quibuscunque membrorum doloribus potenter medetur. Ipsi autem fructus summopere refrigerant, atque ideo ad sitim ingentem in febris continua compescendam perquam utiles sunt.


Altera hujus arboris species, quæ vulgo *Ala-pouli* nuncupatur, in Medicina nullum habet usum.

T A B. 47. 48.

Arboris hujus descriptionem nemo hæctenus de-|species merito potest haberi, & dici *Bilimbi altera*
dit: cum florum, tum fructuum ratione, *Bilimbi minor*.



Panja. Lat.
न म्पु ३ म् Mal.
Sangori.
بنفجوري عرب.
संवरी Bram.







PANJA, PANJALA.

Sive ARBOR LANIGERA. BONTI.

T A B. 49. 50. 51.



Anja Malabarenſibus, *Sangori* Brachmanis, *Algodano* Luſitanis, *Kapock* Malaccis, *Donsboom* Belgis, Arbor eſt procera, quadraginta aut quinquaginta pedes alta, ramis decuſſatim in alios minores diviſis in orbem brachiata; ita ut velut alæ expanſæ videantur, ac (uti in abiete & pino obſervare eſt) ſuſum verſus magis magiſque gracileſcant frondes. Lignum albicans, molle, cortice glabro, atro-viridi variegato, inodoro, ac inſipido obduſtum.

Radix albicans, cinereo & glabro cortice tecta, fibris ſuis non late per terram diffunditur, ſed profundius ei in hæret; ſapor viſcidus & unctuoſus, odor nullus.

Folia longis, rotundis, glabris, nec non rubicundis petiolis plura ſimul juncta, ac in orbem expanſa inhærent, oblongo-teretia, glabra, denſa, longitudine ſpithamam, latitudine duos circiter pollices æquantia, communi virorenitentia, nervis aliquot in adverſa parte eminentibus ex media coſta, ordinato ac parallelo ductu, in latera excurrentibus.

Flores inodori ac inſipidi, plures ſimul juncti ruſis, rotundis ac hirtutis petiolis, ramis lignoſis inhærent, atque è calyce craſſo, viridi, in quinque lacinias ſecto, prodeunt, quinque ſubrotundis, denſis, intus lanuginoſis, extus glabris, nitentibus, & albicantibus foliis conſtantes, quinque in medio teretibus, craſſis, albicantibus ſtaminibus, flavoſcentibus ſalcatis ac diviſis apicibus eleganter ornatis, mediam floris cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ ſtylus prodit, flavoſcente globulo dotatus.

Fructus oblongo-rotundi ſunt, quinque angulis levioribus

bus fulcati, cortice primum viridi, glabro, & nitente, dein rufo, scabro, ac duro, obducti; intus in quinque loculamenta, albâ ac nitente lanugine ceu gossypio referata, divisi, uti in *Ericou* part. 2. Fig. 31. descripta cernitur; intra quam lanuginem, dehiscente demum fructu, numerosa observantur *semina* rotunda, glabra, nigricantia. Hujus vero arboris fructibus maturis pleræque ejus decidunt frondes, quo tempore solis fructibus ornata est arbor.

Provenit ubique in Malabar; semel in anno, viz. Januario & Februario mensibus fructus fert, Martio autem & Aprili denuo frondescit & floret, atque fata seminibus quadraginta annos non raro frugifera manet.

At vero fructuum horum lanugo seu gossypium colligitur, ex eoque lectuli & pulvinaria fiunt, quæ summam ob mollitiem pluris æstimantur. Arboris radix siccata gestatur ad spasinum præcavendum. Flores Fructusque teneriores in cataplasmatibus formam contusi, ac capiti impositi cephalalgiam & vertiginem tollunt.

T A B. 49. 50. 51.

Arborem hanc breviter describere videtur *Bontius* | *cies* ejus dici potest. Et forsan *Panja* est *lanifera arbor*
lib. 6. cap. 14. nomine *arboris lanigeræ* sive *Gossampini* *Ph-* | *peregrina* *Clusii* *Exotic.* *lib. 1. cap. 14.* & *Gossypium*
nii, sed rubicundos ei tribuit flores, cum *Panja* flores | *Javanense* *salicis* *folio* *Caspari* *Baubini* *pinacis* *lib. 11.*
candidi sunt; quapropter si non ipsa arbor, saltem spe- | *sect. 5.*



Moul-elavou. Lat.

മുല്ലി ലാവു Mal.

Valli sanvari.

वडिसवरी Bram.

مُولَلِي لَوَا Arab.



MOUL - ELAVOU

Sive ARBOR LANIGERA SPINOSA.

TAB. 52.



Arbor quæ Malabarensis *Moul - Elavou*, Brachmanis *Valli-Sanuari*, Lusitanis *Algodano do Mato*, Belgis *Wol-doorn* appellatur, procera est, admiranda, altitudine quinquaginta, crassitie octodecim pedum mensuram haud raro superans, antequam ullos diffundit ramos. Lignum molle, fragile, subrufum, cortice crasso, molli, cinereo, intus rubicundo, ac scabroso cinctum; qui squammis numerosis, rigidis, atris, glabris ac nitentibus spinis insuper dotatis, undique ornatur: hæ autem spinæ acutæ circa caudicis exortum demum decidunt, manent tamen in ramis superioribus, quos omni ex parte obducunt; atque hæc ratio est, quod simiæ nunquam hæc scandant arbores.

Radix crassa, fibrata, albicans, cortice subrufo, flavescente ac nodoso obducta; sapor acerbus, odor nullus.

Folia insipida, inodora, manibus confrieta unctiosa, *Panjsæ* foliis haud absimilia, longis itidem, rotundis, glabris, nec non viridi-striatis, ac in exortu nodosis, petiolis plura simul juncta, & in orbem expansa inhærent.

Flores suaveolentes, ac magnitudine palmum æquantes, plures simul juncti ramulorum extremis inhærent, atque è calyce crasso, denso, intus subviridi, extus flavescente, prodeunt, quinque oblongis, crassis, densis, undique colore purpureo nitentibus, extus lanuginosis, & reflexis foliis constantes, mucrosis in medio crassis, densis, longis ac rubicundis staminibus, atris falcatis apicibus dotatis, duplici ordine mediam floris cavitatem & umbilicum occupantibus; inter quæ stylus prodit fissus, qui ipsius fructus rudimentum est. Insuper in floris umbilico subcæru-

leus ac pellucidus observatur humor, qui dulcissimi gratissimi que saporis est.

Fructus oblongo-rotundi *Panja* fructibus plane similes, intus itidem in quinque loculamenta, albâ ac nitente lanugine ceu gossypio referta, divisi; intra quam lanuginem, dehiscente demum fructu, similia observantur *Semina* numerosa, rotunda, glabra, nitentia; non tamen triplici, uti in *Panja*, sed duplici ordine locata.

Crescit arbor hæc ubique in Malabar; feminibus fata anno circiter decimo sexto fructus fert, quos dein singulis annis, viz. Febuario & Martio mensibus, maturos exhibet, atque ad annum ducentesimo & ultra frugifera manet.


Insuper arbor hæc, quum lanuginem hanc in fructu recondit, ad genus earum, quæ gossypium dant, referenda: atque ex hac lanugine, uti de *Panja* fructibus innuimus, lectuli quoque & pulvinaria fiunt. Ex Arboris ligno naviculæ construuntur.

Arboris cortex pulverifatus, & cum succo limonum in linimenti formam redactus inflammationes compefcit quascunque, & ossium fracturas consolidat; cum adusto autem è nuce Indica vino si permisceatur, pro linimento ad herpetem usurpatur. Eradicis vero cortice egregium fit vomitorium. Humor ille dulcis, qui in floris sinu colligitur, cum *Balam-pulli* aut *Tamarindi* foliis exhibitus, quoscunque aquosos humores per alvum & vesicam potenter educit.

T A B. 52.

Arbor hæc *Panja* species est, ejusdemque nullus ha-
stenus meminit Botanicorum, adeoque errat *Casparus* *pinum arboreum caule spinoso*; sed rectius dici potest *aba-*
Bauhinn, quum *Pinacis* lib. 11. sect. 5. eam vocat *Gossy-*
lanigera spinosa Malabarica.

Belutta-triampakam. Lat.
 വെളുത്തു മലയാളം. Mal.
 Naga-tampo.
 नगातपो. bram.
 وبلوطي جيا مبرقظام. Arab.



BELLUTTA TSJAMPAKAM

Sive CASTANEA ROSEA INDICA.

T A B. 53.



Rbor hæc Malabarenfibus *Bellutta Tsjampakam*, Brachmanis *Nagatampo*, Lusitanis *Moroins Rosado*, Belgis *Castanie Roosen* nuncupatur; Estque vastæ magnitudinis, caudice furvo variegato, crasso, præduro, glabro, multisque ramis, *Tiliarum* instar, in orbem diffusis donato, qui cortice obducuntur crasso, glabro, fulvo, odoris aromatici, saporis amari & acerbi.

Radix fibrata, rufa, glabro & flavescente cortice tecta, sapor amarus, odor aromaticus.

Folia brevibus petiolis ordine parallelo ramulis inhærent, oblongo-teretia, glabra, densa, supernè viridia, infernè rore subcæruleo (uti in uvis cernitur) obducta, nitentia, nervis aliquot subtilissimis & visum penè effugientibus ex media costa in latera excurrentibus; odor itidem aromaticus, sapor amarus & acerbus.

Flores formâ & magnitudine rosis sylvestribus seu Eglen-tinis perfimiles, calyci quadripartito, exiguo, denso, viridi inhærent, quatuor candidis, rotundis ac teneris foliis constantes, tenuium ac albicantium filamentorum, flavescentibus apicibus dotatorum, congerie mediam floris cavitatem & umbilicum occupante: odor suavissimus, rosaceus ac violaceus, sapor amarus.

Fructus globosi, quatuor angulis eminentibus sulcati, in vertice acuminati, per initia cum maturefcere incipiunt glabri, & subvirides, maturitatem adepti rufi ac rugosi, cortice primum crasso & molli, dein rufo ac duro, castanearum cortici perfimili, obducti: intus autem tres qua-

Pars III.

Dd

tuor-

tuorve continentur *nuclei* cum formâ & magnitudine, tum substantiâ & sapore castanearum æmuli. Fructus vero teneriores circa basin tenax & glutinosum exfundant *gummi*, cujus odor acris est, & aromaticus.

Arbor hæc ubique in Malabar, præcipuè in Provinciis Mangatti, ob florum jucunditatem studiosè colitur, quos Julio & Augusto mensibus fert; à sexto sationis anno quotannis maturos exhibet fructus, atque non raro terna secula frugifera manet.

Cæterum radix hujus arboris cum Zinzibere recenti confusa si assumatur, sudores potenter expellit. Similiter arboris cortex cum assumptus, tum sub pulveris formâ vulneri adhibitus, serpentum morsibus medetur. Ex foliis in lacte dulci coctis, & addito oleo palmæ confusis, cataplasma conficitur, quod vertici impositum viscidos & pituitosos in cerebro collectos humores incidit, attenuat, & per nares expurgat, adeoque gravedinem & catarrhum sanat; ipsum vero foliorum decoctum potum phlegmata incidendo, attenuando ac expellendo tussim curat. Fructus recentes cum melle cocti alvum emolliunt & laxant; ficcati autem adstringunt, ex iisque oleum exprimitur, quod artubus illitum quoscunque illorum dolores jucundè tollit.

T A B. 53.

Arboris hujus descriptionem nemo hæcenus tradidit, habetur, & nostratibus in India *Castanea rosea* appellat, sed fructuum ratione castanæ peregrinæ genus merito latet.

Kāpa-māra. Lat.

കപ്പമാര Mal.

Casju.

കടല bra.

كاسيا Arab.



K A P A - M A V A

S I V E

ACAJOUS vel ANAGARDI alia species B. Pin.

T A B. 54.



Apa-mava feu *Kasjavo-maram* Malabarenfibus, *Kasjo* Brachmanis, *Cajous* Lufitanis & Belgis, Arbor eft mediocris magnitudinis, caudice craffo, candido, cortice cinereo, intus purpureo, odoris fubacidi, faporifque adstringentis, tefto, ac ramis atro-viridibus, eleganter in orbem diffufis, donato.

Radix albicans, cortice furvo, tenuibus filamentis per-texto, obdufta.

Folia fine ordine ramis adhærent, oblongo-rotunda, glabra, communi virore fplendentia, nervis aliquot infernè eminentibus è cofta media denfa in latera excurrentibus. Tenella vero hujufmodi folia manibus confricta glutinofa funt, & fragrantem fpirant odorem; vetuftiora autem priufquam decidunt, planè rufefcunt.

Flofculi fuaveolentes, ac melleum odorem fpirantes, racematim ramulis extremis inhærent, atque è calyce exiguo, viridi, in quinque lacinias acuminatas fefto prodeunt, quinque teretibus, reflexis, primum viridi-flavescentibus, dein-rufis, tandemque purpureis constantes foliolis, ftaminulis quibusdam tenuibus, flavefcentibus apicibus ornatis, mediam floris cavitatem occupantibus; inter quæ ftylus prodit, qui ex ipsius fructus germine emergit.

Fructus cum figurâ, tum magnitudine pyris nostratibus haud abfimiles, glabri, splendentes, primum rufi, dein virides, tandemque flavescentes, carne intus viridi-flavescente, fungosâ, & aquosâ referti, ac tenui pelliculâ cincti: odor suavis, sapor vinosus; acris tamen & austerrus, si nondum probè maturi sint. Hujus vero fructus alteri extremitati *Nux* quædam, figura & magnitudine leporinum renem referens, adnascitur, viz. parte altera gibbosa, oppositâ lacunam impressam habens, quæ cinereo tegitur cortice; & præter hunc corticem alius *Nucleum* complectitur pallidum, ea forma qua & totus est fructus, succulentum, amygdalæ dulcis sapore, substantia molliore: at vero inter duos hosce cortices, qui culmi fere latitudine invicem absunt, tophaceis cavernulis coërcetur melligo crassiuscula & lenta, sæpe ceraforum colore & consistentiâ, sapore primum adstringente, mox insigni acrimonia linguam & fauces vellicante, servata tamen adstrictione.

Provenit hæc arbor ubique in Malabar; singulis annis, viz. Augusto & Septembri mensibus, maturos fert fructus, manetque frugifera triginta circiter annos.

Cæterum è fructibus hisce potus exprimitur, qui debito modo fermentatus, vinosus evadit, & inebrians. Fructus in deliciis, uti Amygdalæ, comeduntur & usurpantur, saporemque non minus gratum habent quam amygdalæ aut castanæ; crudos vero nemo securè ore aperiet, quod continuo cutem abradant, magno dolore eorum, qui ignari temerè eos resécant: ideo cultro aperiuntur, aut, uti castanæ, sub cineribus affantur, ut manducari possint. Guttur autem peculiari natura cum deglutiuntur stringunt, gustu acri & austero; ideoque in orbes scinduntur, adjuncta aqua seu vino, saleque injecto, quibus modis acrimonia illa mitigatur, palato ita gratissimi. Hisce quo-

quoque nucleis leviter tostis incolæ vescuntur ad Venerem stimulam. Ex melligine quam gemini cortices continent, copiosum indigenæ eliciunt oleum, quod pictoribus, ad lintheamina quævis indelebili nigricante colore pingenda, in usu est; eodemque oleo si lignum ungetur contra putredinem præservatur, adeoque durabilius redditur. Insuper acri illo oleo nihil præstantius esse ferunt ad lichenes & impetigines tollendas, eodemque incolæ adversus scabiem, & vermes necandos utuntur, extrinsecus illito. Denique nuclei hi comesti ventriculum roborant, alimentorum fermentationem juvant, nec non vomitum & nauseam tollunt. Succus vero è fructibus hisce expressus Diarrhœam sistit, & Diabetem sanat.

T A B. 54.

Arbor hæcà variis describitur auctoribus, at imperfectè. Piso tamen *hist. nat. & med. Brasil. lib. 4. cap. 6.* & *Mantiss. aromat. cap. 16.* accuratam hujus arboris ejusdemque fructus exhibet descriptionem, additque eam in multis Brasiliæ locis provenire, & indigenis *Acajãba*, fructum vero *Acaju* dici. Estque *anacardi* alia species *Caspari Bauhini*. Adhæc *Rochefortius* ejus mentionem facit nomine *Acajou*, hujusque tria proponit genera, quorum unum fructus fert *Cajou* nomine vulgo notos.




Atti-arealou. Lat.

ഇരുമ്പിഴ *Mal.*

Dou-adeke-gôli.

अउकेगोळी *Bram.*

يَطْبِيْعُ عَلَاقُ *Arab.*



I T T I - A R E A L O U.

T A B. 55.



Itti-arealon Malabarenfibis, *Douadeke-goli* Brachmanis, *Arbore da Raijs menor* Lusitanis, *Cleyn Wortel-vyge* Belgis, in proceram excrescit arborem; cuius *Radix* fibrata, albicans, nigricante cortice tecta, qui ubi inciditur lacteum succum stillat.

Caudex, haud secus atque in *Itti-alou* part. 1. Tab. 26. & *Peeralou* Tab. 28. descriptis, observatur, plurimos undique diffundit ramos, qui (postquam annos quadraginta aut quinquaginta vixit arbor) tenues quasdam, easque singulares fibras seu filamenta, rufi ac cerei coloris, deorsum mittunt, quibus, ubi terram attingunt, firmantur, novamque quasi prolem generant, & velut in novos arborum caudices transeunt, qui rursus summâ sui parte novos ramos in latera spargentes, novis denuo fibris deorsum missis sese propagant. Sic alii deinceps rami in infinitum, ut interdum unica arbor suis propaginibus milliare Italicum in ambitu occupet, sitque difficile, quænam primaria arbor, sive omnium istarum prolium parens, dijudicare, præterquam ex trunci crassitie, quæ interdum tanta est, ut trium virorum ulnis vix apprehendi possit. Cæterum non modo inferiores rami similes spargunt fibras, sed etiam in arbore summi, atque ideo unica arbor sylvam efficit densissimam, & non raro plura superstes manet secula. Sub eas vero arbores aditum sibi parant incolæ, ac fibras jam in truncos conversas, tenuiores sc. rescindere solent, atque ea ratione veluti concamerationes & umbracula faciunt, æstus arcendi gratiâ: adeo enim densis ramulis reliqui majores luxuriant, ut folii radii nulla ratione penetrare queant; imo aliquot hominum millia sub tali arbore latere possint.

Folia similia sunt foliis *Itti-alou*, at minora.

Pars III.

Ff

Fructus

Fructus exigui, plano-rotundi, colore primum viridi, dein foris & intus sanguineo, granisque pleni uti vulgares ficus, dulces quidem, minus tamen grati saporis quam illæ, quapropter avibus potius quam hominibus cibo sunt; nascuntur inter folia quemadmodum vulgares ficus, *hoc est*, in novellis ramis, qua parte folia illis inhærent.

Nascitur ubique in Malabar, imprimis circa Warapouli; viret per totum annum, fructusque fert.

Cæterum ex arboris hujus cortice, radice, & foliis in oleo decoctis Balsamum paratur vulnerarium. Ex cortice in lacte ebutyrato cocto fit oris collutio, quæ aphthas absterget, flaccidas & erosas gingivas sanat, nec non vacillantes dentes firmat.

T A B. 55.

Arbor hæc, & sequentes *Alou* seu *Arbores da Rajz*; species sunt illarum, quæ part. 1. Tab. 25. 26. 27. 28. 29. describuntur, omnesque ad *Ficum Indicam* Clusii merito referuntur; cum eodem modo è ramis undique diffusis tenuia quædam filamenta deorsum mittant, quibus ubi terram attingunt, firmantur, novamque quasi prolem generant, & velut in novos arborum caudices transferunt: quod tamen *Eximius Botanicus Arnoldus Syen* p. 71. haud notavit in *comment. ad Alou species part. 1. exhibitas*. Interim hæc *Itti-arealou* genus est *Itti-alou*, & *Arealou*; ac, uti ex illius descriptione suspicari posset, forsan *Euzada Pigafetta*: sed fructuum ratione minor species videtur *Ficus Indica*, quam *Clusius* describit *Exotic. libr. 1. cap. 1.* Et nostro judicio vocari posset *Ficus Malabarica*, *Folio mali cotonei*, *Fructu exiguo, plano-rotundo, sanguineo*.



Isjérou-meerallou Lat.

മെറ്റമെറല്ല. Mal.

Parái.

पञ्चदश


bram.

چھرو عرب.



TSJEROU-MEER-ALOU.

T A B. 56.



Arbor quæ Malabarensibus *Tsjerou-meer-alou*, Brachmanis *Paray*, Lusitanis *Arvore da Raijs*, Belgis *Wortel-boom* nuncupatur, minor est ac humilior præcedentis species, eodemque modo crescit, & propagatur ut *Itti-arealon*.

Folia similia sunt foliis seqq. *Atti-meer-alou*; at minora, & numerosiora.

Fructus itidem fructibus *Itti-arealon* persimiles; sed minores, brevibusque petiolis inter folia novellis ramis inhærent.

Cæterum uti *Itti-arealon*, crescit quoque species hæc ubique in Malabar, præcipue in Provincia Warapouli; per totum annum viret, fructusque fert.

Vires autem hujus arboris eadem sunt, ac præcedentis, præterquam quod ex radice cum calce & curcuma in aqua decocta Balneum conficitur ad Epilepsiam & Leporam curandam.

T A B. 56.

Arbor hæc præcedentis species est, atque minabimus *Ficum Malabaricam*, folio & fructu à nemine hætenus tradita; quapropter nominis *Itti-arealon*.




Mystigoma mistorense Willd.

Tab. 57

Cātu-ālū. Lat.

കുറ്റിച്ച Mal.

فحاط علو Arab.



K A T O U . A L O U .

T A B. 57.



Atou-alou Malabarenfibus, *Doulo-vadhou* Brachmanis, *Rayseira vidriado* Lusitanis, *Glas-vijge boom* Belgis, in arborem excrefcit proceram, imo altio-rem quam *Itti-alou*, *P eeralon*, *Tsjercu-meer-alou*, aut *Ittiare-alou*, atque fibris fuis à ramis deorfum miffis propagatur eodem modo ac *Itti-arealon*. Cæterum quoad lignum, corticem, & radicem, fpecies hæc cum præcedentibus planè convenit.

Folia oblongo-rotunda, ac in mucronem definentia, denfa, fragilia, fupernè glabra, atro-viridia, fplendentia, infernè albicantia & lanuginofa, infipida, inodora; è cofa media infigni plures nervuli ordinato ac parallelo ductu exeunt, qui ad oras arcuatim in fe invicem incurrunt.

Fructus in novellis ramis, qua parte folia illis inhærent, fine petiolis proveniunt, rotundi, fructibus *Itti-arealon* perfimiles, fed majores, colore primum viridi, dein flavefcente, tandemque rubicundo, ac granis pleni, uti vulgares ficus, dulces quidem, fed minus grati faporis quam illæ.

Crefcit hæc *alon* fpecies in multis locis Malabar, præcipue in provincia Parakaroo; per totum annum viret, fructusque fert, & aliquot fecula fuperftes manet.

Porro ex arboris cortice in aqua decocto conficitur oris collutio, quæ aphthas maturat & abfterget, nec non dentes vacillantes firmat: idem decoctum potum renes expurgat, & urinam ducit. In fuper ex eodem cortice cum cancri pedibus in oleo cocto Balsamum paratur, quod auribus

instillatum earum exulcerationes fanat, nec non tinnitum & surditatem tollit. Denique ex radice & arboris cortice simul coctis Balneum fit, quod curandæ lepræ, nec non quibuscunque artuum doloribus mitigandis mirificè conducit.

T A B. 57.

Katou-alou est ipsa *Ficus Indica*, *Clusii Exotic. libr. 1. Pigafetta* pro hac arbore describit. Neque *Katou-alou* cap. 1. & *Ficus Indica* foliis mali *Cotonei* similibus, fructu est *Arbor da Rajz, Linscoti*, uti ex imagine ejus manifestus simili, quam describit *Casparus Bauhinus pin. lib. 12. festum* fit: sed forsan illa, quam *Rochefortus de plantis sect. 1.* Errat tamen idem *Bauhinus*, quum *Euzadam Americanis* proponit.



Atti-meer-álou Lat.

ആലു Mal.

पानाई Bram.

رُفْعَالُو Arab.



ATTI-MEER-ALOU.

T A B. 58.



Arbor hæc Malabarenfibus *Atti-meer-alou*, Brachmanis *Rauka-paray*, Lusitanis *Arvore da raijs ladrao*, Belgis *Wortel-dijgh* nuncupatur. Estque vastæ magnitudinis, caudice crasso, tenues quasdam & singulares fibras deorsum mittente, quæ ipsi caudici adhærescentes crassissimum eum reddunt; adhæc iisdem fibris arbor terræ firmatur, multisque ramis in orbem diffusis longè latè-que propagatur. *Lignum* albicans, molle, & flexile, cortice subviridi cinereo obductum, qui ubi inciditur succum stillat lacteum, acrem, inodorum

Radix albicans, glabro & nigricante cortice tecta, nec non fibris suis late per terram diffusa; læsa liquorem fundit candidum, unctuosum, qui dein cum incisa radice purpureus evadit.

Folia foliis *Atti-alou* part. 1. Tab. 25. descriptæ, haud absimilia, brevibus petiolis novellis ramis inhærent, oblongo-rotunda, acuminata, densa, communi virore nitentia, superne glabra, inferne nonnihil aspera, nervis aliquot è media costa, in duas inæquales partes folium dividente, in latera excurrentibus; sapor amaricans, & acerbus.

Fructus brevibus petiolis inter folia ramulis inhærent, fructibus *Are-alou* part. 1. Tab. 27. descriptæ, persimiles.

Provenit ubique in Malabar; per totum annum viret, fructusque fert. Initium sumit ex arborum quarundam caudicibus, aut erupibus, vel antiquorum murorum rimis & fissuris, e quibus convolvuli instar prodit; dein radix & truncus tenuia quædam filamenta deorsum mittunt, quibus caudex insigniter crassescit; cumque iisdem fibris terræ firmatur, longe latè-que propagatur; adeo ut arbor,

e qua initium suum duxit moriatur, hæc vero evadat maxima omnium arborum, quæ in Indiis adhucdum repertæ sunt, nec non secula aliquot superstes maneat.

Cæterum arbor hæc indigenis species habetur *are-alou*, quanquam illis sacra non sit, uti *are alou* Cingalensibus, quam *Bhoudou-gas* seu *Rboo-gas*, à quodam *Bhoudou* sacro ipsis Numine, appellant. In *Kandenato* Regionis *Cochin* Provincia, juxta templum *Baykam* hujusmodi habetur arbor, caudice crassissimo, quæ in circumferentia quinquaginta obtinet pedes geometricos, quamque incolæ bis mille annos ibidem crevisse affirmant. Porro ex arboris hujus radice decoctum fit, hepar obstruatum potenter aperiens; eodemque si os colluatur præstantissimum evadit adversus quoscunque oris affectus remedium: foliorum succus febribus medetur ardentibus. Fructus quoscunque alvi fluxus sistit.

T A B. 58.

Arboris hujus descriptionem nullus Botanicorum hactenus exhibuit. Videtur genus præcedentium *Alou* specierum; differunt tamen maximopere modo crescendi: Enimvero illæ è ramis tenuia deorsum mittunt filamenta, quibus terræ firmantur, novamque quasi prolem generant; hæc autem non è ramis, sed è caudice tenues quasdam fibras deorsum mittit, quibus non propagatur, verum caudex crassissimus fit.



Handur-álu. Lat. Tab. 59

കു ല Mal.


വോലു.

ഹട്ട

عَلَق

Gram.

Arab.



HANDIR-ALOU.

TAB. 59.



Rbor quæ Malabarenfibus *Handir-alou*, Brachmanis *Vodon*, Lufitanis *Figos de Buzio*, Belgis *Kray-vygh* appellatur, procera est, caudice crasso, candido, fungoso, cortice cinereo obducto, multisque ramis latè diffusis ornato.

Similiter *Radix* nigricans fibris suis latè per terram diffunditur; fapor acris, odor nullus.

Folia sine ordine novellis ramis inhærent, oblongo-rotunda, densa, glabra, fragiliâ, longitudine spithamam, latitudine quatuor circiter pollices æquantia, superne atro-viridia, inferne subviridia, splendentia; nervis aliquot in adversa parte eminentibus e media costa, ordinato ac parallelo ductu, in latera excurrentibus: fapor austerus, odor sylvestris.

Fructus itidem granis pleni uti vulgares ficus, ac fructibus *Atti-alou* part. 1. Tab. 25. descriptæ, perfimiles. Ab hominibus non comeduntur, sed desiderantur à fimiis & cornicibus; quam ob causam Lufitanis *Figos dos Buzios*, hoc est, *Simiarum ficus* fructus hi nuncupantur.

Nascitur ubique in Malabar, præcipue in fluminum ripis, & locis montanis ac petrosis Mangotti; viret per totum annum, fructusque fert, & aliquot secula superstes manet. Ab avibus feritur: eæ namque quum fructus comedunt, exigua illorum granula (in quibus germinandi vis consistit) cum excrementis iterum deponunt, è quibus denuo arbores excrescunt.

Cæterum arboris hujus foliorum tenellorum succus expressus ad erosas gingivas, similesque oris affectus egregium est remedium, si eo os colluatur. Ex eodem succo cum butyro recenti digestivum fit, Ulceribus mundificandis & consolidandis perquam utile. Ex radicibus & foliis simul in aqua decoctis Balneum paratur, quod sanandæ lepræ, & epilepsiæ conducere dicitur.

T A B. 59.

Hujus quoque arboris nullus meminit Botanicorum : Species est præcedentis; filamenta namque non è ramis, sed è caudice deorsum mittit, quæ ipsi caudici adhærentia crassissimum eum reddunt. Adhæc *Hamdir-alou* magnam habet similitudinem cum *Arbore Peregrina*, *Fru-ctum ficui similem gerente*, quam *Chusius* perfunctoriè describit; & referri forsitan potest ad *Tepearanai*, seu *Sycomoroxo Saxatit Mexicana*, quam *Rechbus* proponit.



T E R E.

Feregam. Lat.

എറുമ്പ. Mal.

حليج غنوم Arab.



T E R E G A M.

T A B. 60.

T *Eregam* seu *Terega-maram* Malabarenfibus, *Caravatti* Brachmanis, *Arvore da Raspa* Lufitanis, *Rijv-boom* Belgis, arbor est procera, triginta circiter pedes alta, caudice crasso, cortice atro-viridi, intus albicante obducto, nec non ramis lanuginosis ac asperis in orbem diffusis eleganter ornato; Lignum ex albo flavescens, molle, insipidum, inodorum.

Radix fibrata, albicans, cortice rubicundo, intus croceo tecta, inodora, insipida.

Folia rotundis, viridibus, ac hirsutis ramulis sine ordine inhærent, foliis mali citrii haud absimilia, atro-viridia, densa, spinulis quibusdam tenuibus & rigidis omni ex parte vestita.

Fructus ad ramulorum exortum ramis inhærent, Alou fructibus persimiles, rotundi, lanuginosi, cerasi nigri majoris magnitudine, viridi primum, dein flavescente colore, ac granis pleni, insipidi, inodori.

Provenit locis sylvestribus Malabar, imprimis circa Cochinchin; per totum annum viret, fructusque fert, ac diu superstes manet.

Folia autem hujus arboris usurpantur ad scrinia, ac quæcunque lignea, cornea, stannea, & argentea vasa fricanda, atque scabritie suâ polienda ac læviganda, quam ob causam Malabarenfibus *Terega*, Lufitanis *Folhas da Raspa*, Belgis *Rijv-bladeren* nuncupantur. Radix cum aceto è nuce Indica confecto contusa, & mane jejuno ventriculo assumpta viscerum ardorem compescit. Fructus itidem impensè refrigerant.


T A B. 60.

Nemo, quod sciam, *Teregam* fecit mentionem: adeoque nobis erit *Ficus Malabarica*, foliis rigidis, Fructuum ratione species *Ficus Indicæ* haberi posse; sed rotundo, lanuginoso, flavescente, cerasi magnitudine, modus crescendi cum præcedentibus planè discrepat.

Perim-teregam. Lat. Tab. 61.

പെരും തെരേഗം. Mal.

بَحْرُونٌ طِجْرِيٌّ Arab.



P E R I N T E R E G A M.

T A B. 61.



Arbor quæ Malabarenſibus *Perin Teregam*, Brachmanis *Meri Carabatti*, Luſitanis *Arvore da Raſpa major*, Belgis *grooterijv-boom* nuncupatur, præcedentis ſpecies eſt major, atque altior, caudice craſſo, candido, molli, multif- que ramis geniculatis donato, qui cortice cinereo, hirsuto ac ſubafpero cincti, intuſque medullâ coccineâ referti ſunt.

Radix albicans & lacteſcens, nigricante cortice obducta, nec non fibris ſuis latè per terram diſfuſa, inodora, inſipida:

Folia ſimilia ſunt foliis *Teregam*, at majora, & craſſiora.

Fructus vel ſolitarii, vel plures ſimul juncti ramulis inhærent, præcedentis ſpeciei fructibus intus ac extus perſimiles, ſed majores.

Nascitur in ſylvis Malabar, præcipue in Parou, per totum annum viret fructuſque fert, & integrum ſeculum frugifera manet.

Cæterum folia hujus arboris iifdem uſibus inſerviunt, ac folia *Teregam*: Fructus contuſi uſurpantur ad aphthas; inſuper ex iifdem in lacte caprino coctis potus conficitur, qui hepatis obſtructioni, ejuſdemque ſcyrrho potenter medetur: etiam ex fructibus hiſce cum arboris cortice in aqua coctis Balneum fit, quod endemiis corporis maculis leproſis tollendis conducit.

T A B. 61.

Etiam arbor hæc, fruſtuum ratione, præcedentis dictum, ſed quoniam nemo hætenus ejus tradidit deſcriptionem, plura addere non poſſumus. hæc non cæterarum *Alou* ſpecierum genus videtur; diſtinguitur tamen ab hiſ modo creſcendi, uti de *Teregam*

VALLI-TEREGAM.

T A B. 62.



Valli-Teregam Malabarenfibus, *Caravatti-valli* Brachmanis, *Arvore de Raspa pregirofo* Lusitanis, *Climmende Rijn-boom* Belgis, *Convolvulus* est arborefcens, humilis, fex feptemve circiter pedes altus, caudice tenui, candido, cortice furvo obducto, ramis tamen lanuginofis latè undique, aliorum convolvulorum in modum, proferpentibus donato.

Radix itidem fibrata, albicans & lactefcens, rubicundo cortice tecta, inodora, infipida.

Folia decuffatim ramulis inhærent, denfa, primum profundè incifa, dein oblongo-rotunda, acuminata, fpinulis undique veftita, ac foliis *Perin-Teregam* fimilia, fed minora

Fructus cum magnitudine tum figura prunorum æmuli, intus & extus *Teregam* atque *Perin-Teregam* fructibus haud abfimiles.

Crefcit etiam in fylvis Malabar; per totum annum viret, fructulque fert. Folia itidem hujus convolvuli iifdem ufibus inferviunt, ac folia *Teregam* & *Perin-Teregam*. Succus è radice expreffus & affumptus alvi cruciatus lenit: fimiliter e foliis cum lacte dulci contufus expreffus fuccus dyfenteriam curat. Radicis cortex cum coriandri femine in pulverem redactus & exhibitus, tuffi, afthmati, fimilibusque thoracis affectibus medetur.

T A B. 62.

Valli-Teregam duarum præcedentium fpecies eft, *montani candidi* C. B. haud abfimilia funt, ac dein ratione fructuum & foliorum; quæ novella foliis *aceri* aliam planè acquirunt formam.

Pars III.


Nn

T S 7 E L A.

Valli-teregam . Lat.

പള്ളി കെരക. Mal.

والليّ حُضْرَانَمُ Arab.



Tsiela.	Lat.
சிவ	Mal.
Asiatu.	
अशय	Bram.
جبل	Arab.



T S J E L A.

T A B. 6.3



Rbor hæc Malabarenſibus *Tsjela*, Brachmanis *Aſouatou*, Luſitanis *Morſegeiro*, Belgis *Vledermuys-boom* appellatur, eſtque vaſtæ magnitudinis, ſeptuaginta circiter pedes alta, caudice craſſo, octodecim pedum menſuram in ambitu haud raro ſuperante, multiſque ramis in orbem diffuſis donato. Lignum albicans, cortice craſſo, ſcabro, cinereo, intus ruſo obductum; cujus matrix prædura, crocea.

Radix albicans, flaveſcente cortice tecta, fibris ſuis craſſioribus profundè terræ inhæret; ſapor lacteus ac ſubſaluſus, odor nullus.

Folia rotundis ac ſubviridibus petiolis in novellis ramis denſâ congerie proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, communi virore ſupernè ſplendentia, infernè ſubviridia, inſipida, inodora; e media coſta nervuli plures ordinato ac parallelo ductu exeunt, qui ad oras arcuatim in ſe invicem incurrunt.

Fructus iſtis ramulis inter folia ſine petiolis adhærent, cum formâ tum magnitudine ribeſiis haud abſimiles, ſuntque exiguæ ficus, ruſis granulis plenæ uti omnes *Alou* & *Teregam* fructus, inſipidæ, inodoræ.

Nascitur locis ſylveſtribus, montanis, ac petroſis Malabar, præcipue in Ambalakatti. atque per totum annum fructus fert. Vespertiliones, quoniam fructibus delectantur, in hac arbore frequenter nidificare ſolent, quam ob cauſam Luſitanis *Morſegeiro*, noſtratibus *Vledermuys-boom* dicitur.

Cæterum ex arboris hujus radicis cortice cum pipere longo in aqua communi decoctum paratur, quod tuſſi inveteratæ, aliisque pulmonis affectibus medetur. Lacteus e radice & fructibus expreſſus ſuccus efficax in oculorum vitiis remedium eſt.

Isi'la. Lat.

වෙළ Mal.

Rana-rodu.

मानुष Bram.

جملع Arab.



T S J A K E L A.

T A B. 64.

H *Sjakela* Malabarenfibus, *Rana-vodou* Brachmanis, *Cordoeira* Lusitanis, *Heup-boom* Belgis, arbor est procera, caudice candido, præcrasso, multisque ramis crassioribus in orbem diffusis donato, cortice nigricante intus purpureo obducto, quo leviter inciso succus exstillat lacteus, acris, inodorus.

Radix fibrata, albicans, flavescente cortice tecta, incisa & vulnerata similem plane emittit lacteum succum.

Folia rotundis ac viridi-albicantibus petiolis in novellis ramis proveniunt, oblongo-rotunda, acuminata, densa, longitudine spithamam, latitudine palmum superantia, supernè communi virore nitentia, infernè subviridia, insipida, inodora, nervis aliquot albicantibus, ac eminentibus e media costa in latera excurrentibus.

Fructus præcedentis speciei fructibus similes sunt.

Crescit locis montanis Malabar, præcipue in sylvis Paracaroo; semel in anno, viz. Decembri & Januario mensibus fructus fert, atque sobole sata ad quinquagesimum usque annum non raro frugifera manet.

Porro ex arboris cortice peculiari artificio Chordæ torquentur, quibus arcus tenduntur. Nec non color paratur rubicundus, quo vestimenta *panos de Cambaya* ipsis dicta, tinguntur.

Cæterum arbor hæc eosdem habet in Medicina usus, ac *Atti-alou* part 1. Tab. 25. descripta.

T A B. 63. 64.

Haud dubitandum, quin duæ hæc arbores præcedentium sint species, sed à nullo Botanographo, quod sciam, descriptæ.

Pars III.

Pp

I N D E X.

A.	N.
A Nona - Maram, seu Anon Ovic- di. tab. 30. fol. 23	N Eli-pouli, seu Bilimbi altera mi- nor. tab. 47. fol. 47
Ansjei. tab. 32. fol. 25	Niti-panna. fol. 7
Atamaram. tab. 29. fol. 21	Nyrvala. tab. 42. fol. 49
Atti-meer alou. tab. 58. fol. 75	
B.	P.
B Ellutta Tsjampakam, seu Castanea Rosca Indica. tab. 56. fol. 63	P Anja, Panjala, seu arbor Lanigera bontii. tab. 49. fol. 59
Bilimbi. tab. 45. fol. 55	Panitsjica-maram. tab. 41. fol. 45
Blatti, seu Jambos Sylvestris. tab. 40. fol. 43	Pela, seu Guayabo pomifera Indica B. Pin. tab. 34. fol. 31
C.	Pelou, seu Guayabo Sylvestre. tab. 36. fol. 35
C Odda-panna, seu palma Monta- na Malabarica. tab. 1. fol. 1	Perin Teregam. tab. 61. fol. 81
Covalam, seu Cydonia Exotica Bauh. Pin. tab. 37. fol. 37	
H.	S.
H Andir-Alou. tab. 59. fol. 77	S Yalita. tab. 38. fol. 39
I.	T.
I Tti-Arealou. tab. 55. fol. 69	T Amara - tonga, seu Carambolis. tab. 43. fol. 51
K.	Teregam. tab. 60. fol. 79
K Apa-mava, seu Acajous. tab. 54. fol. 65	Todda-panna. tab. 13. fol. 9
Katou-alou. tab. 57. fol. 73	Tsjahela. tab. 64. fol. 87
Katou-Indel. tab. 22. fol. 15	Tsjaka-maram, seu Jaca. tab. 26. fol. 17
Katou-Tsjaca. tab. 33. fol. 29	Tsjela. tab. 63. fol. 85
M.	Tsjerou-meer-alou. tab. 56. fol. 71
M Alacka Pela. tab. 35. fol. 33	
Moul-Elavou, seu Arbor lanigera Spinosa. tab. 52. fol. 61	V.
	V alli - Teregam. tab. 62. fol. 83

ERRATA EMENDANDA.

P Ag. 1. lin. 13. lege *Karetala*. p. 2. l. 18. *exactè* p. 3. l. 8. *exactius*. & l. 17. *ex majori*. p. 4. l. 1. *emittit*. l. 3. *erumpant*. l. 7. *ramus*. l. 9. *obseptus*. l. 17. *genuina*. l. 23. *promissiondis*. p. 5. l. 15. *Malee*. lin. 26. *dele ad huc*. p. 6. l. 12. col. 1. *Carin-pannam*. col. 2. *Baubino*. p. 7. l. 3. *Nicol*. l. ult. col. 1. *dele &*. p. 9. l. 3. *Malabarensibus*. p. 11. l. 21. *singule*. p. 12. l. 29. *Courounada*. l. 31. *in*. p. 13. l. 14. *Soreetsou & nuncupant*. p. 18. l. 16. *reguntur*. p. 19. l. 25. *Kaungæ*. 27. *quocum*. 30. *Bubulis*. p. 20. l. 15. col. 1. *describit*. *ibid*. col. 2. *leg. jaceros nuncupantur*. p. 21. l. 6. *Atoeira*. l. 16. *diffunduntur*. l. 17. *Malak-tsjamlou*. p. 22. l. 2. *decerantur*. p. 25. l. 6. *sedecim pedum*. p. 29. l. 2. *leg. 33*. l. 22. *rufis*. p. 31. l. 1. *Guajabo*. p. 32. l. 4. *manezque*. l. 18. col. 1. *Guayavos*. col. 2. l. 17. *Pin. & Indica*. l. 28. *Plant.* pag. 37. l. 21. *in quinque lacinias*. l. 31. *oblonga*. p. 38. l. ult. *Serifole*. p. 41. l. 13. *deceguntur*. l. 22. l. *maturioribus mollissima*. p. 43. l. 5. *do Mato*. p. 44. l. 10. *Tirpontari*. p. 50. l. 11. *campbora*. p. 52. l. 28. *dele &*. p. 53. l. 17. col. 1. *Carambolas*. col. 2. l. 16. *Chamaroch*. p. 60. l. 11. *Aprili*. p. 61. l. 28. *numerosis*. p. 63. l. 5. *Maroin*. p. 69. l. 4. *Arvore*. lin. 12. *quinguzinta crevere* *zenus*. p. 71. l. 17. *conficiatur*. p. 74. l. 10. *Enzadam*. p. 75. l. 4. *Rouka-paray*. p. 76. l. 3. *font*. p. 77. l. 4. *do Buzio*. p. 87. l. 3. *Tsjahela*.

In Dedicacione pag. 2. lin. 15. lege *aliquamdiu*.

In Prefat. seu Epist. Municks ad Lectorem Botan. pag. 1. lin. 22. lege *celissimas*. lin. penult. *aliorum*. lin. ult. *accurata*.