


醫國壘元戎

七之八



庫文閣内	
函架	三
内閣文庫	
番號	漢 12422
冊數	6 ( 4 )
函號	300 215



Handwritten notes in the top right corner of the right page.



太陰證

醫聖元戎卷之七

王



仲景理中例

仲景理中湯

韓氏溫中湯

七物原朴湯

平胃散

易簡平胃散

調胃丸

易簡養胃湯

王氏易簡理中湯

溫中湯方

三物厚朴湯

陶隱居厚朴湯

調胃散

內應散

易簡滲濕湯

活人厚朴黃連香薷湯

局方香薷丸

四君子湯

白朮散

易簡四獸散

海藏黃耆湯

養脾丸

解酒毒例

葛花湯

不醉丹

錢氏異功散

易簡四君子湯

大半夏湯

易簡斷下湯

錢氏白朮散

調中人参湯

橙香丸

百杯丸

六五

局方勻氣散

局方七香丸

烏沉湯

益脾丸

七香丸

集香丸

易簡藜藿香丸

丁沉煎丸

調中沉香湯

桂枝湯

焦香丸

五膈寬中散

小烏沉湯

三製三黃丸

大七香丸

木香餅子

木香餅子

沉香降氣湯

金遺下痢病脈渣 并治

訶梨勒散方

匱

合

王朝奉治喘例  
活人舉萃德喘說  
潔古老人方

聖惠方

卷第八

大陰證

草薹寇散

草薹寇丸

易簡宿脾湯

橙皮丸

法製陳皮

姜麴丸

御方思食丸

思食丸

蘭省香爛飲丸

文委姜丸

大生

木瓜湯

三奇六神麵法

吧噦例

王朝奉吧論

大天橘皮湯

橘皮青竹茹湯

温中丸

海椒橘皮茯苓生薑湯

姜橘湯

活人大半夏湯

活人半夏生薑湯

桔梗半夏湯

活人橘皮竹茹湯

大橘皮湯

橘皮半夏湯

半夏茯苓陳皮湯

易簡二陳湯

易簡四七湯

赤茯苓湯

溫胃和疾湯

小七氣湯

青龍散

局方玉壺丸

易老水煮金花丸

定喘丸

消痰丸

仲景葶藶大東浮肺湯

三聖丸

乳和姜皮湯

大橘皮丸

活人小半夏加茯苓湯

活人橘皮湯

辰砂化痰丸

小炒丸

二炒丹

安知丸

仲景豬羔丸

仲景豬肚丸

補真丸

玄胡丸

無名丸

天麻辰砂丸

安先生傳易老解利二茶

解利傷寒嗜茶

四生丸

翻胃例

御醫楚侍茶白龍丸

豬肚丸

豬蹄湯

紫霜丸

無名丸料

楊氏內解丸

拾遺

姜末湯

姜艾丸

太極拾遺

時後辨脾胃所傷變易形法

海藏所定脾脉一十七道安方大畧

茯苓桂枝白朮甘草湯

耳草半夏湯

十棗湯

大青龍湯

防己湯

澤浮湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

防己椒目葶藶大黃丸

小半夏加茯苓湯

茱萸湯

半夏泻心湯

黃芩加半夏生姜湯

猪苓湯

茯苓飲

桂枝五味子甘草湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓白朮澤浮湯

文蛤湯

半夏乾姜散

生姜汁半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

太陰證 先足經從湯液 後午經從雜例  
仲景理中例  
仲景理中湯 主治條製並見金醫并  
人參 白朮 乾姜 甘草  
後本經加減八法 錢氏減乾姜為溫  
中丸 仲景甘草乾姜湯 仲景比霍  
亂改理中丸活人枳實理中丸 蜀方

醫聖元戎卷第七

趙妙教授兼提舉管内醫學王好古進之詮次

太陰證 先足經從湯液 後午經從雜例

仲景理中例

仲景理中湯 主治條製並見金醫并

人參 白朮 乾姜 甘草

後本經加減八法 錢氏減乾姜為溫

中丸 仲景甘草乾姜湯 仲景比霍

亂改理中丸活人枳實理中丸 蜀方

消飲丸 理中湯去人參加茯苓為調中丸  
亦為調中湯 並見陰陽論 桂枝湯解表 四逆湯  
溫裏 仲景加桂為人參桂枝湯 活人加  
青陳皮治胃膈病名和中湯 許學士蜜和  
此六味為補脾丸 虛則補其母末有子富  
而母禽老也

脾者大陰濕土脾不足陰濕之劑以補之如  
何用乾姜白朮以燥之是及泄濕也如何是  
補脾 海藏云黃耆湯加減陰證論與四物  
各半湯補氣血末方言丸不及湯海藏云大

便與者宜湯大便結者宜丸以其腸胃燥濕  
不同也 如何仲景用丸以治霍亂泄瀉  
理中去參加朴為和中湯  
衍義云今人便理中湯倉亭之間多不效者  
何也是不知仲景之意為必動之藥益胃藥  
之人自有差殊耳加治胃痺心下痞堅氣詰  
胃滿腹下逆氣搶心腹中湯主之人參白朮  
乾姜甘草四物等共十二兩水八升煮取三  
升每服一升三服以和為度或作丸須雞子  
黃大皆可奇効今人便一丸如楊梅許服之



病既不去乃曰茶不神非茶之罪用茶之罪也令引以為例他可知此然年高及素虛人當逐宜加減甘草飲冷傷胃吐血以理中湯理治中脘分利陰陽安定血脈口用本方並無血茶在王氏易簡條下楊氏飲冷浮血服對金散止亦理中脘分利陰陽安定血脈之意也飲冷酒過多啖炙煖食炙熱者溫中湯一料加川芎一兩服之平昔素不飲冷者梳子黃芩湯之類每歲云楊師三朝三大醉至醒奈大湯飲冷水三臣盃次又飲水

茶三碗後病便鮮血吹以約一盒先以吳茱萸九翌日又與平胃五苓各半散三大服血止復白痢又與神應丸四服白痢乃止其安如故或問曰何為不用黃連之類以解毒所用者濕熱之劑予曰若用寒芩其疾六變難療寒毒內傷復用寒芩非其治也泥血為寒所凝浸入大腸間而侵下得濕乃行所以用濕熱毒血自止經云治水病心求其本此之謂也胃既濕其血不凝而自行各守其鄉也衍義云有一男子暑月患血痢醫妄用冰涼

茶逆治專用黃連阿膠木香治之此茶始成  
便治則可今痢久腸濕理不可服踰旬不幾  
至委頓故曰理當劑茶知是論之誠在醫之  
通變身循經則萬無一失引此為例餘皆倣  
此海藏云暑月久血痢不用黃連陰在內  
也

王氏易簡理中湯

治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復吐逆  
或大病之後胃中有寒時善咳唾霍亂之後  
氣重水禁熱茶並宜服之

人參

乾姜

右吐咀每服四錢水一盞煎至六分服為寒  
氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯  
霍亂吐浮者加橘紅青橘各一兩各治中湯  
乾霍亂心腹作痛先以塩湯少許頓服候吐  
出令透即進此茶 吐者於治中湯內加  
丁香半夏一兩每服生姜十片煎泄瀉者加  
橘江茯苓各一兩名補中湯 溇泄不已者  
於補中湯內更加附子二兩右寧飲水穀不  
化者再加諸<sup>縮</sup>砂仁一兩共成八味 若霍亂

吐下心腹作痛手足逆冷於本方中去白木  
加熟附子各四順湯 若傷寒得曾先以桔  
椀枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後曾痞  
欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓  
各各一兩各枳實理中湯 若渴者再於枳  
實理中湯內加枳椀根一兩 一法霍亂後  
轉筋者理中湯加 煨石膏一兩 一脗上  
築者賢氣動也去木加官桂一兩半臣恐燥  
故去不恐作奔豚故加宮桂 悸多者加茯苓  
各一兩 渴欲飲水者添加木半兩 若寒

血

者添加乾姜半兩 腹滿者去木加附子一  
兩 一法飲酒過多及啖炙博熱食奈為鼻  
衄加川芎一兩 一法專治傷胃吐血以此  
茶能理中脘分利陰陽安定血脈只用本方  
中附子毒者亦用水方 或止用耳草乾  
姜等分煎服仍以烏豆煎湯解之

韓氏溫中篇

夫傷寒病之說始自重帝以開其端由至於  
仲景方陳其餘目自後層淺之學莫如其數  
立言者云病在表可發汗病在裡可下之或

云不可汗不可下即未嘗有溫中之說仲景  
傷寒論傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也  
尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微後厥陰受  
病也又辨大陰證云太陰病脈浮可發汗宜  
桂枝湯又自利不渴宜四物湯又腹滿轉痛  
桂枝芍藥湯辨少陰證云始得之發熱脈沉  
麻黃細辛附子湯又少陰病二三日麻黃附  
子甘草湯又少強病身體痛手足寒骨節痛  
脈沉附子湯又少陰病吐利手足厥逆冷煩  
燥欲死吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜

四逆湯今與仲景論中數條最是治三陰之  
良法于今世用之尚有來虛證者愚嘗校量  
自至和初年迄中今二十餘年不以歲之太  
過不及每夏至以前有病傷寒人十中七八  
兩手脈俱沉細數多且七曾膈滿悶或吐逆或  
氣寒或腹鳴或腹痛與仲景三陰之說脈  
理同而論不同因茲豈敢妄投仲景治三陰  
病某醫者方見脈沉及曾滿便投某下之往  
之不救嘗斟酌仲景理中丸與服之其病勢  
輕者即曾中便快病勢重者半日許滿悶依

然或有病人脉沉细迟投仲景世送湯温之  
 多某力大热後必發煩燥因按量此形證今  
 別立方以治之多得病不可傳焉  
 病人但兩手脉沉細數或有刀或無力或閉  
 脉短及刀小胃膈塞閉氣短不能相接者便  
 可隨脉證投温中某以治之  
 病人兩手脉沉遲或緊或緩皆為胃中寒也  
 若寸脉短及刀小子關尺者此是陰盛陽虛  
 也或胃膈滿悶腹中脹痛身體拘急手足逆  
 冷且急温之若立春以後至清明以前宜温

温中湯方  
 中湯之清明以後芒種以前宜橘皮湯主之  
 芒種以後至立秋之以前宜七物理中丸主

白木湯 橘葉湯 以上五方並見韓氏  
 橘皮湯 七物理中湯 厚朴丸  
 手足逆冷噦吐更加舶上丁香皮二分  
 五穗煎至七分去滓熱服如三兩服未快尚  
 右咬咀每服二錢水一盞入葱白三寸荆芥  
 舶上丁香皮 厚朴去粗及姜 乾姜炮  
 白木 陳橘皮 丁香各二分 各一兩

微旨及陰證論

仲景七物厚朴湯

厚朴 半斤 且草

大黃

生姜

桂各 二兩

大棗 十枚

枳實 五枚

右水一斗煎取四升去滓溫服八合日三  
者加半夏五兩 下痢者去大黃 寒多者  
加生姜至半斤

三物厚朴湯

治腹脹脈數

厚朴 半斤

枳實 五枚

大黃 四兩

右水一斗二升煎二物取五升內大黃四兩

再煎取三升溫服一升腹中轉動更服不動  
勿服

平胃散

此當在陽湯例以其無太陰相為表裏故例大陰條下

列

蒼朮 八兩

厚朴 五兩

陳皮 五兩

厚朴 五兩

加茯苓丁香白朮為調胃散此茶赤沔脾濕

一法加藿香半夏 加減數例並見活法

正氣飲續局方 扁方平胃散加乾姜為厚

朴湯 平胃散此方大抵治脈緩濕勝中寒

者効 溫瘦時氣溫毒傷寒頭痛壯熱加連

鬚葱白五寸豆豉三十粒煎三二服叙汗出

微

愈如未得汗以稀粥投之取汗為度若中風  
自行者不宜發汗 五勞七傷脚心熱煩  
燥不安肢節酸疼加柴胡 疼嗽瘧疾加乾  
姜製半夏 木氣氣痛加茴香 水氣腫滿  
加桑白皮 婦人赤白帶下加黃耆 酒傷  
加下香 飲冷傷食加高良姜 滑脫泄瀉  
加肉豆蔻 凡疼四肢沉困加荊芥 腿膝  
冷痛加牛膝 渾身揚急及虛墜加北骨及  
腿膝濕痺加兔腦子 白痢加芫荽更  
赤痢加芫荽 頭風加藜蘆 轉筋霍亂加

楠木皮 已上作使止加一銖此藥不問老  
幼胎前產後五方七傷六極八邪耳鳴眼昏  
夢泄盜汗四收浮腫眼膝酸疼婦人宮臟久  
冷月水不調者加官桂 若能每空心一眼  
注類容豈肌體調三焦 壯筋骨祛冷氣快心  
胃常助元陽益真氣健胃脾進飲食和氣祛  
疾自然榮衛舒暢寒暑不侵此藥去厚朴加  
防瓜療四時傷寒極有神効已上法並用水  
煎每服一兩許

陶陰居厚朴湯 治心下至小腹痞痛

厚朴

耳草

枳實

桂各小分

右細末每服二錢生姜湯調服

易簡平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脹助脹刺痛口  
若無味胃滿短氣吐噦惡心噫氣吞酸而

色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重

自利或發黃霍亂及五噎八痞膈氣反胃宜  
服之

蒼朮

耳草

厚朴

陳皮

右以咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚

煎至六分去滓食前服 惟大便秘小便多

中不寒者別加潤劑 常服調元湯緩胃氣

化食消痰飲避風寒冷濕四時不正之氣

一法加茯苓丁香各三兩共成六味 治胃

寒嘔吐多加生姜煎服 一法若其人氣不

舒快中脘痞寒加煨砂香附子各三兩共八

味虫姜煎服其効尤速 一方去蒼朮餘各

等分白水煎服 治酒食所傷服睛頭而遍

身黃色服之神効 一法加草草烏頭各一

枚治脾寒痞瘧平胃散與五苓散相合各對



散與六一散相合名黃白散與錢氏異功  
散相合名調胃散 故進飲食加神麩麥 散

吳茱萸蜀椒乾姜桂為吳茱萸湯

平胃散加減大畧 加藜木桔梗為和鮮散

加藿香半夏為不換金正氣散 已上二藥

通治傷寒吐利 腸滑者加肉豆蔻 瘧疾

寒熱者加柴胡小腸氣痛者加若諫根茴香

調胃散

藿香藿

陳皮

炙甘草

厚朴製

半夏製各等分

右為細末每服三錢生姜水並

調胃丸 已上調胃散細末姜糊丸梧桐子大

每服三十丸生姜湯下

內應散 治胃膈不快腹痛下痢不嗜飲食

青皮

去白

乾姜炮

甘草

炙各

二錢 生姜

陳皮

去白

各一錢

右作一服入東二枚水煎服之

易簡養胃湯

治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭疼目昏

肢體拘急不同風寒二證並宜服之先用厚

被蓋睡連進此茶數服加以薄粥熱湯之類  
佐之令四肢微汗漉然候乾則徐徐去被  
謹避外風自然解散若先自有汗亦須溫潤  
以和解之或有餘熱則以參蘂飲款之調之  
或尚頭痛則以濃煎生姜湯加葱白下聖餅  
子二證既除則不必服茶但飭其飲食適其  
寒溫自然平復大抵感冒古人不散輕易用  
茶汗者止緣麻黃能開腠理用或不得其宜  
則導泄真氣因而致虛變生他證此茶平和  
之劑而止能溫中解表而已初不致於妄復

也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫或飲食傷脾  
茶為咳瘧或中脘虛寒嘔逆惡心忪能治療

厚朴 蒼木 半夏 茯苓

人參 藿香 草菓仁各五錢

甘草一分 橘皮五分

右以咀每服四錢水一盞半生姜七片烏梅  
一枚煎至六分去滓熱服或茶寒瘧或感寒  
瘦及惡寒者並加附子足十味名不換金散  
藿香正氣散皆此茶也然不若此方大備

易簡滲濕湯

治寒湿所伤身重腰冷如坐水中小便或淡  
或利大便溏泄皆因坐湿处或因雨露所袭  
或因行出衣裡令湿久久得之腰下重疼两  
脚酸痛腿膝或腫小便利及不渴悉能治之

蒼朮 甘草 乾姜 白朮

茯苓 各 橘紅 各 丁香 各

右以咀每服四錢水一盞半生姜三片枣  
枚煎至六分去滓温服 此茶兼治脾胃不  
和吐逆惡心大便時々澀泄有 其宜  
方減橘紅丁香各腎著湯腰重而疼者又宜

服之 或不因湿气所傷止是風寒相搏以  
致腰疼宜服生料五積散加桃仁數箇煎服  
右腎虛致疼當服補藥

治人厚朴黃連香薷湯

治陰陽不順清濁相子气射中丘名為霍乱  
或飽食脉膾復飲酪漿海陸諸品每不食之  
或多飲冷或卧當風痛傷脾胃食結不消陽  
不能升陰不能降二气相反交錯不通取以  
變成吐利也百脉昏乱榮衛俱虛冷搏於筋  
轉筋位下

厚朴製黃連各二兩香薷葉一兩五錢

右厚朴黃連二味入生姜四兩同炒紫色將  
為細末與香薷同煎每服三大錢水一盞酒  
半盞同煎至七分去滓用新汲水浸換極冷  
頓服之冷則効連煎時不犯銅錢恐慢火熬  
非時病者亦治井中沉冷尤効

局方香薷丸 香薷散二葉 治於製並見本

錢氏異功散

人參 陳皮 甘草 茯苓 白朮

四君子湯

錢氏異功散內減陳皮餘四味是也

四君子湯

人參 甘草 白茯苓 縮砂仁

右方在四物八珍陽

易簡四君子湯

治大人小兒脾胃不和中晚停飲大病之後  
宜服此藥但味耳恐非快脾之例增損之法  
見於方後

人參 茯苓 白朮各一兩 甘草五錢

右吹咀水一盞薑七片末七枚煎至六分法

澤散 一方加橘紅等分名異切散宜病  
後調理 一方去人參加官桂等分耳草等  
減半名耳草湯治停食目眩 一方去耳草  
加枳殼橘紅等分名六君子湯專治素  
有痰飲胃膈痞悶脾胃虛寒不嗜飲食腹燥  
某有地者大宜服之 一方去耳草加本香  
熟附各加味四粒飲治大元臟氣虛真湯  
耗散兩耳驚鳴臍腹冷痛頭眩月暈四肢倦  
怠小便滑數泄瀉不止加姜朮並服大病之  
後尤宜用此調理 一方加黃耆白篇豆等

分大治腸風并五痔下血面色痿黃心忪耳  
鳴脚弱力之口淡無味善寒煎服為細末  
尤佳 北方人未治之服者頗效李冰仲云  
看不在面目有奇功

易簡惺之散

治小兒凡熱瘧疾傷風時氣頭痛壯熱目濕  
多睡咳嗽氣粗鼻塞清涕

白朮

桔梗

細辛

耳草

茯苓

人參

瓜蒌

各一兩

右吹咀每服二錢水一盞生姜三片入薄荷

三葉煎至半盞時之與服錢氏小兒壯熱昏  
睡傷風之熱瘡疹瀉食病皆相似未能辨認  
間服燥々散小柴胡湯升麻湯乾葛升麻芍  
藥甘草等分白水並服此散藥均能治療用  
之甚騷惟傷食則大便酸臭水穀不化畏食  
吐食且以下藥下之加包豆感應丸并麥蘊  
飲治諸般瘡熱丸為切尚并耳冷飢冷手足  
乍冷乍熱面赤噴嚏驚跳不安皆瘡疹之候  
也已矣未矣升麻湯消毒飲皆得其宜若三  
日未見形跡當以生酒塗其身上時々看之

狀如蚕辰者是也或癸不透或例醫黑陷極  
為利害紫草木通耳草桔梗等分白水煎服  
名曰如聖散 更有小兒頭昏頰赤口內熱  
氣小便赤澀大便秘結此為裡熱當用大黃  
當飯芍藥甘草等分白水煎服名曰煩飲若  
審是瘡疹之證不宜用此

易簡白木散

治小兒泄瀉胃熱燥渴不問陰陽煎宜服之

人參

藿香

甘草

乾葛

木香

茯苓

白木

各一兩

右以咀每服二錢水一盞煎至半盞量大小  
與服仍用香連丸間之渴欲飲水者時久煎  
服任意飲之弥多祿佳

白木散 一方治吧

白木

人參

半夏

各一

乾姜

耳草

茯苓

各五

右劉姜東水煎服

陳雜

錢氏方謂小兒吐瀉常溫補之每用理中丸  
以溫其中五苓散以導其逆連進數服兼用  
四君子加陳皮調之若以虛換用金後丹雜

以香列白丸子為末米飲調服多服乃有知  
吐瀉之後發熱心作驚風二藥服之累有神  
效若胃氣已生則施減金液丹劫以異功散  
等芋徐々調之若食不消脾胃虛寒嘔吐惡  
心者當服益黃散用陳皮半夏青皮訶子肉  
主草各一分丁香一錢量大小煎服小兒暑  
月吐瀉其證不一詳審用藥不可是謬 有  
伏暑者小便不利宜五苓散香薷散 有傷  
食其吐衄驚心酸鼻氣宜服感應丸 若虛  
冷者其泄瀉必多宜服六神散加附子服

用人參茯苓山茱白朮白扁豆甘草等分姜  
東煎服 瓜瓞加天麻 痢者加罌粟壳  
吐瀉初定當以天尚星為效末每服加冬瓜  
子七粒煎服以防變痢若瀉色青當用鴛菜  
小兒之病與大人無異用藥一同當量力用  
之惟中惡厥風夜帝重舌復蕪客忤驚癇解  
願魁痞疝氣不行數證大人益之並見錢氏  
方

大半夏湯 後有小七氣湯  
人參 白朮 甘草 半夏

右判姜枣水煎  
易簡四獸飲  
治五藏氣虛喜怒不節勞役兼致陰陽相勝  
結聚成飲與胃氣相搏發為瘡疾悉能至之  
兼治瘴瘧最有神効

人參 白朮 甘草 車草 草蓂  
半夏 茯苓 橘紅各等  
右周麥子烏梅生姜等分咬咀以鹽少許  
淹之項厚朴紙裹用水濕之慢火炮令香熟



焙乾每服半兩水二盞煎至六合去滓未飲  
前連進數服 一方治脾寒各快脾飲用草  
果人參白朮橘紅半夏厚朴縮砂仁附子等  
分甘草減半每服四錢姜十片烏梅一箇粳  
子一枚煎至六分去滓不以時候服用此藥  
下紅丸子丸炒 兼治脾胃虛弱中脘停塞  
不進飲食四肢乏力並熱多痰飲用前  
胡茶各一兩官桂桔梗厚朴各三分薑耆  
耳草乾姜各半兩古叻咀每服四錢水一盞  
半生薑五片棗二箇並至六分去滓煎服

一方名七室散用常山陳皮青皮梧柳葉果  
仁耳草各等分每服半兩酒水各一盞煎至  
八分於當祭日侵晨服之此藥既有常山必  
須吐人而後愈當日大作世謂知藥是也虛  
怯人不宜服此脾胃素虛寒者用小附子一  
箇炮以鹽浸再炮再浸如此七次去皮切作  
片水二盞姜七片棗七箇並至七分當發日  
空心溫服各七末湯 痞疾多因中脘有飲  
用常山作効者以其能吐之不若用辰砂薑  
丹筆而鑿之而佳 其方用薑丹一兩大蒜

去皮碾膏凡作三丸當全日臨晨嚼一丸用井水或熱水嚥下 一方用生碗蓋辰砂各為細末寒多倍碗蓋熱多倍辰砂寒熱相等者勻用每服三錢臘茶清調服臨祭日早晨進之當日或作或不作皆是其效洵早用之為佳

易簡斷下湯

治下前赤白每問新久長幼

白米 茯苓 甘草 連皮  
右以咀用罌粟壳十四枚去筋膜并芎藭剪碎用醋奄為粗末固並作一劑水一大碗姜

七片棗子烏梅各七箇煎至一大盞分二服服之赤痢者加烏豆二粒白痢者加乾姜半錢凡用罌粟壳治痢服之如神但性堅澀服之令人嘔逆既用酸製加烏梅不致為害然嘔逆吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遲止丸以已豆感應凡十餘粒用白梅茶下令大便微利仍以前茶服之無不忘于而効 若脾胃素弱用肉豆蔻橘竹罌粟殼各等分為末醋煮米糊丸梧相子大每服五

十九烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服即愈更令茱力相倍為桂如覺惡心却以理中湯四君子湯加豆蔻木香葶其胃氣仍以二陳湯水煮木香丸足甚吐逆大凡痢疾乃腹心之患尋年人尤非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必致危篤雖已欲服此則已晚矣其如地榆秦皮黃蘗若參木通之類其性若寒却難輕服血痢當服胃風湯并艾膠湯之類血者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之若五色雜下泄瀉

無時當用熟烏頭一兩厚朴耳枹乾姜各一分生姜煎服今人治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連阿膠其性本冷若所感濕瀉及餘痢休息不已則服之彌効若病積重非此可療若謂其穩當則悠悠服乃自取困頓也

### 海藏黃香湯

主治並見陰證略例本方無藿香治三焦氣虛自汗

人參

白朮

黃耆

茯苓

身草 陳皮 藿香 白芍藥

乾生姜

黃耆湯與四物湯各半名托裏湯 加桂名

十全散 本方去茯苓加川芎當歸為黃耆

解肌湯 去芍藥加白扁豆為四君子湯加

藿香葉以理氣此即補脾湯也

錢氏白朮散 和中散

養脾丸

人參

茯苓

身草

半兩

乾姜炮

縮砂仁

麥麩麩

各二兩

右為細末煉蜜丸彈子大細嚼生薑湯下

調中人參湯

人參 半兩

木香

二錢

茯苓

半錢

葛根麩

兩

身草

一分

藿香

一分

棟

兼治酒毒

加白朮

一味

右為粗末生薑水煎如細末生薑湯點服

解酒毒例

葛花湯 治傷酒之仙藥能上不分消其濕

葛根麩

小豆花

藿香葉

白豆蔻

益智仁

縮砂仁

香附子

木車前子

葛花

芎藭

白檀

木香

丁香

沉香

橙皮

陳皮

姜質

官桂

白朮

浮澤

茯苓

身草

人參

各等分

右為細末湯點服酒調亦得姜糊丸桐子大酒一之亦可服旱但晁準微汗即解

橙香丸

一名萬益丸

木香

沉香

白檀

甘草

橙皮

葛藟

橘紅

白豆蔻

益智仁

各三枚  
生薑  
四兩切破鹽淹一宿晒  
乾或焙乾研二錢半

縮砂仁

三十枚

右為細末水浸蒸餅為丸桐子大細嚼一二十丸白湯下或減身草用耳草膏子丸

不醉丹

白葛花

大門冬

白茯苓

牡丹莖

小豆花

縮砂仁

葛根

官桂

耳草

海鹽

木香

沃澤

人參

陳皮

枳殼

右為細末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼熱酒下一丸可飲十盞十丸可飲百盞

百益丸

砂仁 高茶各一兩 诃子一錢 麝香一錢  
肥子

右為細末煉蜜丸每服一兩作十丸米飲酒先  
細嚼一丸酒下

局方勻氣散

丁香 藿香 耳草 木香

檀香 諸砂 白豆蔻各等分

右共為末白湯調服

集香丸 海藏云檀其氣者以此茶接之

白豆蔻 縮砂仁 藿香葉 白茯苓

丁香 白檀 沉香 益智

烏朮 陳皮 耳草 人參

一法噎食如柿霜 一法加廣芪 一法加

香附子 一法加乾姜 隨證定等分兩為末

默服

局方七香丸 主治修製並見局方

丁香 廣成 益智 縮砂

木香 車松 耳草 香附

五疔寬中散 主治脩製並見本方

白豆蔻

縮砂

香附子

陳皮

丁香

青皮

耳草

木香

丁香各等分

烏沉湯

主治脩製並見局方

沉香

烏茶

耳草

人參

小烏沉湯

主治脩製並見局方

調中扶氣治心腹刺痛

香附子

二烏茶

耳草分

右細末姜湯默服

益脾丸

一名三花九飲酒不醉當在子醉丸

下

小豆花

一兩

綠豆花

五錢

一法加紅花二錢半

右為細末蜜丸桐子大每服十丸煎紅花湯

下夜飲津液下三五七丸則不醉

東垣先生治飲酒心下痞三製三黃丸

黃芩

去枯酒浸一半大炒一半生用一半

右三停分兩勻為細末糊為丸桐子大每服

三十丸溫水送下暈輕重加減治熱酒所傷

一傷冷酒則下袖應丸主之

七香丸 治脉伏不見心腹痛欲死者

人参 柝榔 各七錢半 木香 丁香

乳香 沉香 檀香 各五錢

零陵香 錢五 各半

右為細末蜜丸桐子大量數日細嚼米飲下

大七香丸

縮砂仁 半兩 香附子 一兩八錢二分 耳草

麥蘖 炒一兩 橘紅 藿香 肉桂 各二兩

丁香 二錢 耳草 右同為細末煉蜜丸桐子大每服三十丸每

一兩分八九丸每服一丸細嚼湯酒任下

集香丸

縮砂仁 下皮 各半 耳草 七錢 麥蘖 七錢

耳松 一兩二錢半 香附子 一兩 丁香

白檀 益智 各二錢半 白豆蔻 木香

蓬朮 廣茂 沉香 各三錢半 一方加

神麴 右為末姜汁浸蒸餅托如雞頭實大細嚼下

木香餅子 與前集香丸俱務寬中理氣消酒逐痰飲進

木香餅子



美飲食

香附子

川芎

木香

吳白芷 兩半

姜黃 炮

縮砂仁

牙松

桂 各二兩

耳草 半一兩

右為細末水浸蒸餅丸生薑湯白湯任下十

餅至十五餅

易簡蘘合香丸

主治製並見苟方

洛之法一本

白木

丁香

硃砂

白檀

沉香

烏犀

草擦

龍腦

广香

蘘合油

青木香

安息香

董陸香

香附子

訶黎勒子

右每服一大丸沸湯少許化服治卒中昏不知人及霍亂吐瀉心腹痛鬼疰客忤癰癩驚怖或跌撲傷損氣暈欲絕丸是倉卒之患悉皆療之此藥隨身不可暫闕辟瘴惡氣併禦山嵐瘴氣無以踰此若吊喪悶疾尤不可忘但市肆所賣多用肥子當用火土碎去能飲者以酒調服若用心過度夜睡不安尤宜服之功效最健筆右難窮

木香餅子

丁香 二錢

廣茂 一兩

木香 四兩

檀香 四兩

鎔砂仁 十一兩

耳松 五兩

右為細末并草膏丸每兩作二百五十九丸  
作餅子

丁沉煎丸

丁香 二錢

木香 一錢

丁皮 一錢

沉香 二錢

白豆蔻 九錢

右為末姜糊丸桐子大酒下二十九

沉香降氣湯 治服下支結脾濕瀆泄脚氣

沉香 一兩八錢

砂仁 四兩

耳草 十二兩

香附 四十兩

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯煎服已

上三味通治侵晨霧露之丸去惡邪諸瘴治

酒尤佳

調中沉香湯

沉香

木香

白豆蔻 各一兩

丁香 半錢

耳草 二錢

龍肥 研二錢

右為細末入龍肥和勻沸湯煎服半錢入生

姜一片鹽少許

金遺下痢疾脈證 并治

後代名醫諸書所說皆以此為法 夫六腑  
氣絕於外者午定寒上氣脚脛五臟氣絕於  
內者痢不禁不甚者手定不仁 下痢脈沉  
弦者下重脈大者為未止脈微弱數為欲自  
止雖然發熱不死 下痢手足厥冷急脈者  
灸之不溫者脈不還反微而喘者死少陰跖  
陽調者為瘳也 下痢有微熱而渴脈弱者  
當自愈 下痢脈數有微汗出今當自愈後  
脈緊為未解 下痢脈數而渴者當自愈故  
不解者必清膿血以有熱也 下痢脈反弦

發熱自汗者自愈 下痢氣者當利十便下  
痢脈反浮數人中自濡者必清膿血 下痢  
清穀不可攻其表汗出必脹滿 下痢脈沉  
而遲其人面少赤身微熱 下痢清穀者必  
鬱胃汗出而解 病人必微厥所以然者其  
面戴湯下虛故也 下痢後脈絕手足厥冷  
時々脈還手足溫者生脈不還者死 下痢  
腹脹滿身體疼痛者必溫其裡後攻其表溫  
裡宜血逆湯攻表宜桂枝湯四逆湯見上  
桂枝湯

桂枝 去皮 生姜 切 芍藥 各三  
炙甘草 二兩 大棗 十二枚 擘

右以水七升煮取三升去滓溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力取微汗

一下痢三部皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯方見陽明病中

一下痢脈遲而滑者實也利未止者急下之宜大承氣湯

一下痢脈反滑當有所去下乃愈宜大承氣湯  
一下痢瘥至年月日時復發者以病不盡故也

當下之大承氣湯以上數證皆承氣湯本虛者當以別議

一下痢膿語者有燥屎故七日小承氣湯主之方

大黃 四兩 枳實 三枚 厚朴 三兩

右以水四升煮成一升二合去滓分溫再服一服膿語止若更衣者停後服

一下痢便膿血者桃花湯主之方

乾姜 二兩 粳米 一升 赤石脂 一斤 碎

右三味以水七升煮米盡去滓溫取七合內

赤石脂末方寸七日再服若一服愈餘茶勿服

一 热痢下重者白头翁汤主之方

白头翁 二两 黄连 黄蘗 秦皮 各三两

右四味以水七升者取三升去滓每服一升不愈更服

一 下痢後更頓按之心下濡者为虚煩也枳实芍药散汤主之方

枳实 芍药 香豉 各四两 绵

右二味以水四升者煎取二升半内豉煮

取一升去滓分再服温进一服得快吐止後服

一 下痢清穀裏寒外热汗出而厥者通脉四逆汤主之方

炙甘草 二两 乾姜 三两 强人可四两

附子 一枚 破 去皮生用

右三味切以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈

一 下痢腹痛紫参汤主之方

紫参 五钱 炙甘草 二两

右二味切水五升先煮紫參取二升内其草

煮一升半去滓分温三服 疑非仲景方

主氣痢訶藜勒散方

右一味為末細粥飲和頓 疑非仲景方

大便不通噦數噦結小羊氣湯主之 見千金

乾吧下痢蒼芩湯主之方

人參 黃芩 乾姜 各二兩 桂皮 去皮二兩

大棗 十二枚

右五味切以水七升煮取三升去滓温服 分

三服見外臺

右此下痢一章内有治傷寒數方仲景用治

雜病今全錄之便後人知去治傷寒有法治

雜病有方者非也傷寒雜病内一法治矣

當在太陰下卷後今錄于此

王朝奉治喘例

夫喘者麻黃湯表證也小青龍湯挾水證也

麻黃湯主喘也大陽證下之喘者表證未解

桂枝加厚朴杏仁湯 喘家用桂枝湯加厚

朴杏仁亦佳兌汗下後不可更行桂枝若汗

出而喘益火熱者可用 黃杏仁甘草石姜

湯太陰桂枝證醫反下之痢不止脈促者表  
未解喘而出汗者宜者根黃芩黃連湯主之  
活人舉萃他喘說

活人舉萃他去喘者脈氣有餘也宜梔子黃  
芩湯主之

經之喘曰人有逆氣不得卧而息有音者有不  
得卧而息無音者有起為如故而息有音者  
又有得卧而行喘者有不得卧不能行而喘  
者有不得卧而喘者何臟使然願聞其故  
岐伯曰不得卧而息有音者足陽明之逆也

足三陽者不行今逆而上行故息不音也陽  
明者胃脈也胃者五臟之海也其氣亦不行  
陽明逆而不行從其道故不得卧也胃不和  
則卧不安此之謂也夫起居如故而息有音  
者此肺氣之脈絡脈也脈絡不得隨經上下  
故留經而不行脈絡之病人也微起居如故  
而息者音也夫不得卧則喘者是承氣之  
客也夫水者循津液而衍流也滑者水藏主  
津液主卧與喘也帝曰善

前大陽麻黃升麻湯壞症案後有王朝奉傷寒

喘例諸喘皆屬於上當在手太陽明然肉經  
去五藏皆有喘故例在此後

行云驚怒善怒勞動靜皆為之變喘是以夜行  
則喘出于腎淫氣于肺故隆恐喘出于肺淫  
氣傷脾故有所驚恐喘出于脾淫氣傷心度  
水跌作喘出于腎與骨當是之時勇者氣行  
則以怯者着而病也故動轉勇怯皆能成疾  
形志若集各有受病不可不知

聖惠方

治十種水氣喘滿不舒臥

右螻蛄五箇麩乾為末米飲調下半錢宜一

錢小便通快為度

嚟古老人方

右用螻蛄云頭尾與蒲菊心同搗露七日曝  
乾為末淡酒調下暑月濕用尤佳

喘飢脾胃虛調飲食持重少血飽食氣滯久勞  
飲食勞傷則主脾主氣不及接行動而大上  
行即氣上衝不下水飲也

諸病喘吐皆屬於上諸病吐呃皆屬於中諸病  
下痢皆屬於脾諸病腫滿皆屬於濕故手足  
太陰病手足陽明病吐喘促傷胃虛寒實



推傷寒雜病俱混說于太陰條下

醫聖元戎第七條

醫聖元戎卷第八

趙州教授兼提舉管内醫學士好古進之筌次  
太陰證

草豆蔻散

食前服思食食後服消食

草豆蔻

熟畏煨熟取茶  
去皮取仁

縮砂仁

各半兩

乾木瓜

一兩半  
去蒂子

益智仁

三錢

甘草

薑屑

陳皮

鹽

炒各三錢

右一法加神麩一兩麥蘗七錢半一法加烏梅肉三錢

局方草豆蔻散

主治脩製並見本方

草豆蔻丸

王海藏法

右以草豆蔻為細末生薑汁打糊為丸桐子  
大每服二三十丸米飲嚙服亦得

易簡縮脾湯

解伏熱除煩消暑上吐下利霍亂之後服  
枳朮過多煩燥宜之

草草

烏梅

縮砂

甘草

各四兩

乾姜 二兩

右以咀每服五錢水一碗生薑十片煎八分  
以熱水浸冷極冷旋服之一方治尊年人

加附子一兩一方加炒白扁豆二兩暑月多  
以代此熱水飲之極妙若傷暑頭痛發熱宜  
用兵下消暑丸若因飲食生冷過多至霍亂  
吐瀉者宜用此先以治中湯二陳湯之類煎  
服煩燥甚者方以浸冷香薷湯服之自然平  
治今人徃之屬香薷飲之證方見霍亂遽爾  
投之殊不知夏月伏陰在內因食生冷以致  
霍亂豈可投以浸冷之藥故合先治中脫方  
以此藥解其煩燥不可不知若飲水過多小  
便赤澀當服五積散 若盛夏於道塗間為

暑氣所回倒不省人事急扶在陰涼之處切  
 不可與冷水以布巾衣物等蘸熱湯熨脈下  
 及丹田氣海及續以湯淋臍上令徹脈脈濕  
 煖即漸甦醒若南實及僂顧之人倉卒無湯  
 栲路中熱上於臍上揅同作竅令弱其中并  
 以大蒜爛碾以水調灌下一法用道中熱土  
 急爛碾冷水調服仍次蒜少許置鼻中氣透  
 則甦續以白虎湯竹葉石膏湯之類凡覺中  
 暑者急嚼生薑一大塊冷水啣下暑氣中人  
 慎不可次冷水亦不宜單用冷水灌之未復

丹消暑丸皆可用也

橙皮丸 調中順氣生津止渴

烏梅肉一兩 乾生薑一分 木瓜

糖霜各二兩 白茯苓 白木半兩 橙皮

沈香各五錢

右為細末煉蜜為丸每兩作二十五丸欲作  
 漏水用水化用寒熱溫涼任意飲之噲化亦  
 可

法製陳皮消食化氣寬利胸膈

烏梅肉十兩 白檀二錢 茴香四兩 甘草二兩

乾生薑兩半青鹽炒一兩陳皮半斤白取四兩切細條  
右除陳皮外並為細末用水一碗菜末三兩  
同陳皮一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時  
列用乾菜杵勻焙乾每用不以多少細嚼啞  
下每時

善翹丸

此方與衍義同治下之後不能食之後必胸  
痞常服益氣消食衍義有陳皮  
善屑 麥蘖 神麴 未炒各等分  
右翹糊丸梧相子大米飲湯下三十丸

御方思食丸 並見活法

神麴 麥蘖 烏梅肉 各一兩  
人參 木瓜 茯苓 桂 各五錢  
甘草 七錢 乾生薑 二錢半  
右為細末蜜丸每兩作十丸  
熱則泄肝膽口苦舌乾柴胡 烏梅 寒  
則補脾胃

思食丸

白朮 陳皮 半夏麴 各五錢  
木香 一錢 沉香 烏梅 各三錢  
麥蘖 兩

栝柳

人參 各二錢

右料為細末煉蜜丸桐子大每服三十九米  
飲下一法者烏梅肉神麴麥蘖乾生薑為細  
末蜜丸

菊者香爛飲丸

丁香

神麴

三稜

青皮

各三錢

沈香

木香

白檀

陳皮

藿香

各二錢

益智仁

廣茂

麥芽

各五錢

耳松

耳草

香附末

各一兩

右為細末蒸餅丸

大生薑丸

補脾胃治口苦舌乾中脘不和脹滿嘔吐食  
不化酒病翻胃

丁香

栝柳

川芎

白朮

炙甘草 五錢

人參

良姜

丁香

桂心

縮砂仁 各一兩

右為細末蜜丸每兩作十五丸細嚼一丸米  
飲湯空心服日三

木瓜湯 此一方當在草豆蔻散後

木瓜 木瓜 一斤 去皮子  
白鹽 各四兩  
生薑 片切作  
甘草

右四味杵勻 瓶鉢內 淹一宿 焙乾 為細末 每  
服一二錢 點服 一法 加神麴

三奇六神麴法

白虎白麴 一百斤

味藿赤小豆 三斤 煮軟 去湯 碾  
細 與前件 相伴 和

勾陳蒼耳汁 三斤

青龍青蒿汁 三升 即黃  
蒿 自然汁

勝地野蓼子汁 四升

玄武杏仁 四斤 去皮尖 煮  
麴 乾濕 用之

右一處 拌勻 稍乾 為度 用大盆 淹一宿 子伏

內上 寅日 踏極 實為 度申 寅巳 卯庚 辰乃 三

奇也 全有 前物 為六 神少 則兆 也踏 乾光 用

得草 鋪地 上後 用蒿 鋪之 挑麴 於上 麴上 却

用蒿 草蓋 之勿 令透 凡候 一月 取虫 安在 見

凡處 更四 十九 日可 用如 作凡 麴方 踏下 用

桑葉 紙覆 窠過 懸在 凡道 中亦 須四 十九 日

每米 一斗 不過 十兩

吧噉例

嘔噦一條本出於胃當例陽明條下以其脾  
病連及於胃若食生冷硬物先入胃次傳脾  
所以中列之病並稱之曰脾胃故叔和云脾  
膈家中坤安和對胃門後又云二斤十四兩  
三斗五升存是為脾連及於胃也戊與乙合  
何嘗有二哉今此吧噦諸證湯丸等劑雜屬  
於胃姑例於大陰條下古人交經用芋何嘗  
相離

王朝奉吧論

吧者病源云熱在脾胃也胃家虛冷亦吧也

噦者胃家虛冷也又病人本虛伏熱在胃則  
胃滿故冷氣逆枚噦 傷寒證桂枝證小柴  
胡證合病葛根加米芩證黃芩加半夏證小  
青龍證四逆證真武證枳子芩湯證皆有吧  
各自主治然小柴胡湯專主吧也吧而熱  
者小柴胡也吧而物湯者吳茱萸湯乾吧吐  
涎沫者吳茱萸湯金匱諸吧不喘似吧不吧  
小半夏湯去茯苓胸中似喘吐壳不得下者  
似噦不噦微心煩然無奈者生姜汁半夏湯  
噦逆陳皮竹茹湯乾吧而利者黃芩加半夏

生薑湯嘔噦手足逆冷者小陳皮湯嘔噦胸滿虛煩不安大橘皮湯

仲景云傷寒咳逆脈散者死成注去大刑肺金

也朱奉議以噦者為咳逆非也噦胃也非咳

逆可知朱奉議小半夏茯苓湯生薑煎小半

夏橘皮湯生薑煎汁半夏湯橘皮湯陳皮生

姜二味煎

大橘皮湯 理氣調中

陳皮 甘草 生薑 各二錢 人參 五錢

右以咀分作二服水煎服之

橘皮青竹茹湯

陳皮 甘草 各二錢 人參 半錢 竹茹 二錢

右作三服姜煎

溫中丸 治脾胃嘔吐噎噦自利

半夏 湯泡 乾姜 各等

右為細末生薑汁和汁丸桐子六大每服一十九

水丸湯下姜湯亦可

海藏橘皮茯苓生薑湯 治咳逆解酒毒止嘔

吐 陳皮一兩 炙甘草 生薑 各三錢 茯苓 五錢



一法加葛根神麴半夏切生姜煎服  
治人治呃噦手足逆姜橘湯

橘皮 生姜

治人大半夏湯 治痞飲脾胃不和

半夏 生姜 茯苓

右先粗末水煎如熱痞加炙甘草脾胃不和

加陳皮

治人半夏生姜湯 治呃飲欲飽

半夏 生姜 二味同煎服

桔梗半夏湯

治冷熱不合令胸中痞痛痞澀不利氣逆嘔  
噦

桔梗 半夏 陳皮 各等分

右為粗末水煎細末姜糊丸亦可

治人橘皮竹茹湯 治呃逆

陳皮 竹茹 人參 甘草 各等

右剉姜棗煎服

大橘皮湯

治動氣在上不可下食入則吐隨證加減

陳皮 人參 甘草 生姜

竹茹 枣

右以咀水煎服

橘皮半夏湯

治積氣痞痞不下飲食呃吐不止

陳皮 半夏 各二兩 生薑 一兩

右以咀水五盞煎至二大盞去滓分二服食

後臨卧服

半夏茯苓陳皮湯 消飲食呃和中順氣

茯苓 去皮 半夏 泡 陳皮 去白 生薑 各二兩

右以咀水二盞半煎一盞去滓臨卧温服之

易簡二陳湯

治痰飲為患或呃吐惡心或頭眩心悸或中

脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

並宜服之

陳皮 去白 半夏 各五兩 茯苓 三兩 甘草 二兩

右以咀每服四錢水一盞半姜七片烏梅一

箇煎至六分者去滓熱服每時傷寒後不敢

進燥茶者亦宜服餅如痞疾加草菓一兩半

下如九子如因酒食所傷茶為黃疸亦宜用

此二芋吧吐甚者加丁香並服半硫丸一法

仍半夏為末每一兩入丁香一錢旋以生姜  
自然汁九如相子大先以湯二盞煎沸次下  
凡子茶者令極熱以起排服用草汁嚥下更  
服養正丹或來復丹里傷丹之類候大便利  
即愈如妊婦惡阻古方用茯苓半夏湯服者  
病及增劇不若用此茶極有神驗一方名枳  
實半夏湯治痰飲停留胸膈痞悶或咳嗽氣  
寒頭目昏喘嘔惡心煩背拘急半夏陳皮各  
一兩枳實減半加生姜煎服一方名丁香茶  
苓湯治久積陳寒流滯湯胃嘔吐痰沫或有

酸水金不思食用亦香丁香乾姜附子半夏  
橘皮肉桂縮砂仁等分加生姜煎服一方名  
白朮半夏湯治脾虛停飲疾逆惡心中腕  
刺痛腹脹視疼頭目昏暈肢節倦怠不思飲  
食用白朮丁香赤茯苓各一兩半夏六兩肉  
桂半兩陳皮二兩半亦加生姜煎服生姜乃  
吧家聖藥凡嘔吐宜多用之為性

### 易簡四七湯

治喜怒哀思驚恐憂之氣結成痰涎狀如破  
絮或如梅核在咽喉之間咯不出嘔不下此

七情之氣所為也。或中脘痞滿氣不舒快。或  
痰涎壅盛上氣喘急。或因痰飲中脘呃逆。惡  
心並宜服

半夏 五兩 茯苓 四兩 厚朴 三兩 紫蘘子 兩  
右以咀每服四兩水一盞。半夏七片。棗一枚。  
煎至六分。去滓。熱服。每時若因鬼應過度。陰  
陽不分。清濁相子。小便白濁。用此茶。下看折  
白。几子最為切當。婦人惡阻。尤宜服。之一名  
厚朴。半夏湯。一名大七氣湯。局方七氣湯。有  
半夏。二兩。人參。耳草。官桂。各一兩。生姜。煎服。

大治七氣。并小腹痛絞。然茶味大甜。恐未能  
止痛。順氣。一方治七氣所傷。中脘不快。氣  
不升降。腹脹滿。用香附子炒。半斤。橘紅六  
兩。耳草一兩。煎服。尤妙。好事者謂其耗氣。則  
不熱。蓋有此病。而服此茶也。

赤茯苓湯

順氣消痰。止呃調中。益氣補胃。祛濕。

陳皮

半夏

川芎

人參

白朮

赤茯苓

右為粗末。生姜水煎服。

衍義有人曾患氣嗽將期或教以服陳皮生  
姜炒乾神麴等分為末糊丸相子大食後臨  
卧服三十丸未飲下意有膀胱疾自此皆愈  
乳和姜皮湯 治赤白下痢神驗

陳皮 一兩 姜屑 三錢

右二味用牛乳一大盞和茶煎熟先滓入生  
牛乳一半頓服

治胃和痰丸 治中寒停飲胸膈痞塞痰涎

半夏 兩 洗 三橘皮 去白 乾姜 炮 白朮 兩

右為細末姜汁糊丸相子大每服二十九丸熱

湯每時下

大橘皮丸 趙十一郎家製

陳皮 白 茯苓 車草 鹽淹姜

葛根麴

右為細末煉蜜丸彈子大細嚼白湯下

小七氣湯

當在大半夏湯條下治虛冷上氣喘塞不通

半夏 兩 洗 六桂心 人參 錢 生薑 錢

右四味以咀水四盞煎至二盞去滓分三服

相繼每時服

治人小半夏加茯苓湯

治諸嘔噦心下豎滿胸間者疼大心悸

半夏湯洗七 茯苓去皮

右剉加麻豆大每服半兩水三盞煎一盞秤  
生姜四錢取自然汁投葑中更煎三兩沸契

服每時

青龍散

治咳嗽上氣不卧

人參

陳皮

紫葳葉

五味子

右為細末每服三錢水一盞生姜五片煎至  
七分去滓溫服

活人橘皮湯

治場寒疼逆惡心

陳皮

甘草

人參

右為粗末竹茹生姜棗煎如不惡寒者加竹

葉

玉液丸

玉芝丸

主治脩製並見局方

文路公生犀丸

並見華準

易簡消暑丹

見喝證附

局方玉壺丸

治頭風口眼喎斜及風痰等證並見活法机  
要

南星

半夏

天麻

白麩

辰砂化痰丸 主治脣製並見局方

辰砂

南星

白礬

半夏

易老水煮金花丸 主治脣製並見活法机要

南星

半夏

天麻

雄黃

生薑

白麩

寒水石

右為細末滴水丸相子大煑熟生薑湯下

小黃丸 主治脣製並見活法机要

黃芩

南星

半夏

生薑

右薑汁打糊丸

定喘丸

治虛人咳嗽胸滿及鼻息音大喘行坐每將連年不已或遠或近並能治之

人參二錢 南星三錢

右為末以生薑自然汁糊丸黍粒大每服三五十九生薑湯下漸如亦可小兒服減丸枚

二劫丹

治精滑夜夢鬼交洩出白液飲食少虛勞病或嘔或吐

半夏

木猪苓各半

右先以猪苓去皮切片子同炒微黄色半  
夏别为细末用陈米饮搜和为丸豌豆大凡  
凉一夜次日以猪苓为粗末炒熟下片子同  
炒稍乾为度乘热以纸裹至冷用于合子盛  
貯一法酒糊丸  
消疹丸

細辛 桔梗 陳皮 旋覆花  
神曲 枳实 半夏 白茯苓  
麥芽 白朮 各等分  
右為細末生薑汁打糊丸如梧相子大生薑

湯下三五十丸食後服

安和丸

治晚証虛弱嗽年光虛人尤宜服之

粟穀炒 陳皮 各二兩 炙甘草 二錢  
一法加烏梅半兩為細末為糊丸

玉芝丸

加生薑人參藿香各人參羊棗丸

芎藭參續斷 惺惺散

主治並見少陽柴胡例

仲景葶藶大寒 疫疔湯



治肺癰不吐臥棄治支飲不得息又見金匱

苦葶藶 炒香搗 大棗二十枚

右丸如彈子大每月水三升大棗十枚煎二

升化一九再煎一升頓服

三聖丸 治喘嗽面目微腫

甜苦二葶藶

右棗肉丸菜豆大每服三四十丸臨卧姜湯

下

仲景豬膏丸 此本少陰為豬膏故入猪肚膽

汁例

治少陰病下痢咽痛物滿心煩邪氣自少陽  
經傳入少陰客熱

右用豬膏一斤水一斗煮取三升去滓入白

蜜一升白粉五合焚香和粗得所分作六服

水畜入胃猪膏解熱潤燥除煩分次益氣軟利

仲景白通猪膽汁湯 並見仲景本經

仲景猪肝丸

白朮四兩 淋野燒研 苦參二兩

右為細末猪肚一枚內菜末纏定煮軟熟切  
碎碾泥成膏和凡桐子大每服三十九丸米飲

下

又猪肚黄連丸

見本草

本草

錢氏香連丸

橘連丸

無見本方

猪肚丸

治骨蒸唇紅頰赤氣粗口乾身壯熱多虛寒  
大便秘小便赤食減少

鱉甲醋炙

紫胡

木香

青蒿

黃連

生芩各一兩

青皮半兩

右為細末嫩大猪肚一枚入菜在內繫定蒸  
軟菜肚仍碾勻可丸如綠豆大每服三十丸未

飲下食前日之三服忌熱物濕麪

補真丸 一名天真丸

天門冬去心 三兩 羊肉 三斤 玄龜膜

肉從蓉二兩 去粗常歸 五兩 去芦

右已上俱作片子焙乾為半焙乾將羊肉煮  
去羊肉水洗淨再煮至熟去絲細筋膜研爛  
再入無灰酒煮至成膏入上項芋末及糯米  
粉子半斤再煮收十沸至稠粘膏子為度再  
入下項藥

黃耆六兩

遠志

白朮

枸杞各二兩

沈香 半兩 神曲 五兩 赤茯苓 四兩 乾山菜 兩

右為細末入上件膏子內同和更入宛薑餅  
麩十枚兩搜和成劑至可丸即止丸桐子大  
每服空心溫酒送下七八十九至百丸

猪蹄湯

知母

貝母

牡蛎 妙選赤粉各等分

右為末細猪蹄四箇慢火煮軟熟用調服三  
錢七後滋味汁一碗投之少時熟蹄任意食  
用或先食諸蹄飽後服亦得

海藏評解利傷寒丸茶雜例 並見本方肘後

玄胡丸

玄胡

青皮

陳皮

三稜

廣茂

當歸

雄黃

別研細入上未同研

乾姜 各五錢

右為細末醋糊丸酒糊亦得每服二三十丸

白湯無時下解利內外傷

紫霜丸

治傷寒溫肚內夾冷食或因得汗身熱不除  
及賣煎茶熱日久不解飲食成痼俗呼為食  
述凡

代赭石 火煨醋

杏仁 五十箇去皮尖

赤石脂 為末

巴豆 三十箇去皮心

右合礮臼湯浸蒸餅為丸黃米大小兒生三

十日以外可一丸一年二年可三丸乳下米

飲亦得

無名丸 解因外傷 與四生丸例相似在半夏條下

代赭石 貫衆 茯苓 寒水石

黑豆 去皮自然銅醋淬九次

右件共為細末水糊丸菜豆大每服三五十

丸姜湯下米飲亦得

每名丸料

寒水石 洗粉 里豆麩 去皮各一兩 貫衆

茯苓 名為代赭石 火燒同碎末 自然銅 酒淬七次 之 名三錢半

右無名丸此藥不知來例別無解利味 救止

是貫衆治頭凡有毒太抵解疫癘毒氣則効

若非古法之介經也本草云代赭石苦耳寒

治鬼疰賊凡自然銅辛平無毒療折傷散血

止痛貫衆治頭凡半夏治傷寒之熱巴豆辛

溫主傷寒溫瘧寒熱絞煎亦解利石此三藥

誰云治傷寒只治固內感而發者多効若  
外感一日太陽受之不宜用此等之藥性者  
不可執此以解利外傷此藥大抵只治內而  
不治外不能行經若果行經非湯液不能也  
代赭石自然訓二味兼以醋洋過煨以苦酒  
上火力同能上行故解也若以代赭石自然  
銅二石性論下行之體無疑更宜詳紫霜丸  
主治傷寒溫肚內夾冷食一旬即知無名體  
也

天麻辰砂丸

天麻 四兩  
巴豆 二百粒去皮膜油

硃砂 三錢

右為細末每服三五丸白湯送下溫酒亦得  
食後蠟和丸黍米大

玄胡丸內有雄黃乾姜苦酒與此一體解利在  
厥陰門木香枳榔例後

安先生傳易先解利二藥

狼毒 大戟 草烏 頭 生各等分

右為末醋糊丸桐子大每服五七丸或十九  
溫水送下

解利傷寒喘茶

乾山茶一兩

藜芦連鬚一錢

右為細末以紙捲噓之

楊氏內解丸

芫花

紅茶子各五分

右細末醋糊丸綠豆大溫水下二丸每時以

葱白醋末湯投之

四生丸

南星

半夏

芫花

自然銅

等分皆生用

右為細末醋打蕎麥糊為丸綠豆大如酒積  
痰飲胸膈脹滿飲食不消每用五丸臨臥溫  
水下忌熱物如傷寒時疾煎豉湯下一十九丸  
三服解如心氣大痛醋湯下海藏云此湯液  
一所用凡茶解利世多不同皆取此例  
拾遺

大腸泄

小腸泄

大瘕泄

食泄

洵泄

寒中

寒濕

溇泄

泄瀉

濕淫

燥濕

濕熱

凡濕

驚澹

胃泄

脾泄

脫肚

臟毒

瘀血

凡此數條俱見湯液大法後

翻胃例

御胃楚侍菜白龍丸

治膈氣翻胃吐食大便結硬要大便如常者

不可眠

輕粉 十錢

半夏

白麩

各三錢

右拌末和勻水和作碁子或瓦湯煮熟源虫

放溫臨卧作一服生姜湯下取下燥糞後為

度

生姜半夏湯 止嘔吐開胃消食

半夏 湯洗 生姜 各三錢

右剉量水多少煎至七分

雞屎醴散 治蓋脹且食不能暮食不已

帝曰膚脹鼓脹可刺邪岐伯曰先泄其脹血絡

後調其經刺其血絡也

姜來湯 此後二茶卒取即天五之氣

乾姜 一去核 甘草 三兩 生姜 五兩

右拌盆盛布蓋淹一宿焙乾為末每一盞入

鹽少許點服鹽二兩炒白別入茶

東艾丸 補胃

乾東去核熟艾入棗中

右以綿纏定濕紙裏渣灰火內煨紙焦為度

一日服三箇空心細嚼溫酒下每日加一箇

至九日後日減一箇至三箇依前再加一過

三遭當進飲食也胃氣壯即止不飲酒鹽湯

下

大陰拾遺

時後辨脾胃所傷變易形法

凡諸脾脉微洪傷苦澁物 微弦傷冷硬物

微澁傷辣辛物

微滑傷腥鹹物

微遲傷冷疼積聚惡物

弦緊傷酸硬物又主脾冷

微實主胸間有狀疼或吐 泄緩傷鈎爛物

緊惡膈間有硬積寒熱 單伏主物不消化

微浮胸中有小虫動又主寒熱 單緊主胸中急痛

單弦主胸中氣聚喘促 單滑主脾寒吐逆

草洪主寒熱吐逆不食 單淳胃寒不進食

淳洪而數皆中酒

海藏所定脾脉一十七通 安方大略



傷苦澁物經云鹹勝苦

傷辛辣物經云苦勝辛

傷酸硬物經云辛勝酸

傷耳爛物經云酸勝耳

傷冷硬物經云溫以克之

冷疼積聚惡物溫胃化疼

膈有伏疼春

夏吐之秋冬導之

膈間有硬積寒熱溫化

胃中有小虫檳榔之類

物不消化麴蘖三稜芫之類

胃中急刺痛理中丸之類

胃中氣聚喘促勻氣湯

寒熱吐逆不食橘皮半夏  
白木茯苓

脾寒吐逆枳實理中湯

胃寒不進食烏梅白朮

浮洪而數皆中酒黃根陳皮茯苓

金匱痰飲咳嗽病脈証治後代名醫所說皆取

以為法

同曰夫飲有四何謂也師曰有疼飲有懸飲有

曰溢飲有支飲又曰四飲何以爲異師曰其人  
盛今瘦水走腸間漼漼有聲謂之痰飲  
飲水流在腸下欬唾引痛謂之懸飲  
飲水  
流行於四肢當汗出而不汗出身體疼痛  
謂之溢飲 其人咳逆倚息短氣不得卧其  
形如腫謂之支飲 水在心心下緊築之短  
氣惡水不欲飲 水在肺吐涎沫欲飲水  
水在脾少氣自重 水在肝腹下支滿而痛  
水在腎心悸 夫心者有留飲其人背寒  
令大如手 留飲者腹下痛別缺盆欬軟真

輒已 一作轉是 胸中有留飲其人短氣而渴四肢  
歷節痛 脉沈者有留飲 膈上之病滿喘  
欬吐衄則寒熱背痛腰疼目眩自汗出其人  
振之自汗劇必有伏飲 夫病人卒飲水多  
必多暴喘兀食少飲多水停心下甚者則悸  
微者氣短 脉反弦者寒也皆大下後善虛  
脉偏弦者飲也 肺飲不弦但苦喘短氣支  
飲亦喘不能卧如短氣其脉平也 病痰飲  
者當次溫茶治之 心下痰飲胸膈支滿目  
眩以茯苓桂枝白朮甘草湯主之方

遂

滿續堅兩此為留飲欲去故也以耳草半夏湯

主之方

耳草 大者 半夏 二十枚 溫水洗次用水一  
升煮取半升去滓  
芍藥 三枚 炙草 大者 一寸  
右四味以咀水三升煮取半升去滓以蜜半

升和茶煎取八合頓服之

夫病懸飲者十來湯主之方

芫花 葵 耳遂 大戟 各等分

右三味搗節以水一升五合熬大棗十枚煮  
取八分去滓內茶強人一錢七弱人半錢平  
且濕服之不可者明日更加半錢下後糜粥  
以養之

病益飲者當發其汗宜大青龍湯方

麻黃 去節 桂枝 去粗皮 炙草 二兩 生姜 二兩  
石 六兩 杏仁 四十枚 大棗 十枚 核  
大細研

右七味呔咀以水九升先煮麻黃減二升去  
上味內諸菜煮取三升去滓溫服一升被覆  
合汗出汁者溫粉之一服汗出者勿再服  
若復服汗出多者亡陽逆虛惡風煩燥不得  
眠也

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之方見肺痿論

暈同支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈  
沈緊得之數十日胃吐下之不愈防已湯主  
之方

防已 二兩 桂枝 二兩 人參 四兩 石膏 雞子大十二枚

右四味呔咀以水六升煮取二升去滓分溫  
再服虛者即愈實者三日復愈如不愈者宜  
去石羔加茯苓芒硝湯方

防已 三兩 桂枝 三兩 人參 四兩 茯苓 四兩  
芒硝 三合

右五味呔咀以水六升煮取二升去滓內芒  
硝再微並分溫再服微利止

心下有支飲其人苦眩冒澤浮湯主之方

澤浮 五兩 白朮 二兩

右二味呔咀以水二升煮取一升去滓分溫

再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之方

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚

右三味以咀以水五升煮取二升去滓溫再服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之方條下 見肺癆

吧家不得令反不得心下有支飲故也小半夏

湯主之

半夏一升 生姜半斤 錫石半斤

右以水七升煮取一升半去滓分溫再服千金

小半夏加茯苓湯主之

腹滿口乾舌燥此腸間有水氣防己枳實葶藶

大黃湯主之方

防己 枳實 葶藶 大黃各一兩

右四味為末密和丸桐子大朱飲服一丸

三服稍增口中津液止湯者加芒硝半兩

卒吧吐心下痞膈間有水弦悸者小半夏加茯苓

湯主之方

半夏一升 生姜半兩 茯苓三兩 一兩

右以咀水煎服

師曰以發其汗令湯微觸氣虛脈乃數二為客  
 熱不能消穀胃中虛冷故吐也脈弦者虛也  
 胃氣無餘朝食暮吐變為翻胃寒在於上留  
 及下之今脈及或各曰虛寸口脈微而數則  
 無氣無氣則胃虛...則血不足...則  
 胸中冷路湯脈浮而瀦浮為虛瀦則傷脾胃  
 傷則不磨朝食暮吐宿食不化名曰反脈浮  
 而瀦真病難治 病人欲吐者不可下之  
 噦而後滿視其前後如何部不利利之則愈  
 吧而胸滿者茱萸湯主之方

吳茱萸升人參 二兩 生姜 六兩 大棗 二十枚  
 右四味以水五升煮取一升去滓溫服  
 七合日三則乾吧吐涎沫頭痛者茱萸湯主  
 之

吧而腸鳴心下痞者半夏厚心湯主之方

半夏 三升 黃芩 人參 灸草  
 乾姜 三合 黃連 一兩 大棗 十一枚  
 右七味以水七升煮取六升去滓再煎服一  
 升日三服

乾吧而利者黃芩加半夏中黃湯主之方

黃芩 三兩 炙草 三兩 半夏 洗半升 芍藥 三兩

大棗 十二枚 生姜 半兩

右以咀水一斗煮取一升去滓分溫三服日

二服夜一服

諸嘔吐穀不得化下者小半夏湯主之方 方見痰飲中

嘔吐而痛在臍上後思水者急予解之豬苓湯

主之方

豬苓 去皮 白朮 各等分 茯苓 各等分

右以咀水煎服

欬滿則止而後更渴衝氣後發者以細辛乾姜

為煎茶之法逐渴反不止者為支飲也支飲法常治胃之冷者必嘔水復與半夏以去其水方

茯苓 四兩 乾姜 三兩 三味子 半斤 細辛 三兩

炙草 三兩 半夏 湯洗七次 去清 半斤

右六味以咀水八升煮取三升分溫三服

去嘔則止其人形腫可內麻黃次其欲逐痺

故不內麻黃乃內杏仁也若逆而內麻黃者

其人必厥所以然者為其血虛麻黃發其陽

改也

茯苓四兩 乾姜三兩 五味子碎半斤 甘草三兩  
細辛三兩 半夏洗 杏仁去皮尖

右以水一斗煮取三升去滓温三服

面熱如醉狀者此為胃中熱上薰其面令

熱加大黃湯主之

茯苓四兩 乾姜二兩 細辛二兩 大黃二兩

五味子碎 半夏洗 甘草炙 杏仁去皮

等分

右八味以水一斗煮取三升去滓分温

三服並見于金方

渴

先湯却吧為折停心下此屬飲家小半夏加茯苓湯主之方見上

金匱吧噦下痢病脈證治後代名醫諸書率皆取此以為法

夫吧家者癰脹者不可治吧膿盡則已先吧

却湯此為欲解先湯却吧為水停心下此屬

飲家吧家本渴今反不渴者以其心下有支

飲故也此屬支飲問曰病人脈數之為熱

當消穀引飲而反吐者何也師曰以發其汗

令陽微曠氣虛脈乃數云見前



假令病人脉下有悸者吐涎沫而颠眩水也五

苓散主之方見

如心胸中有停飲宿水自吐去水後心胸中虛

氣滿不能食消痰氣令能食茯苓飲方

茯苓三兩 人參一兩 枳實炒二兩 生姜四兩

白朮二兩 橘皮二兩

右以咀以水六升煮取一升八合去滓分温

三服如人行八九里進之方見

咳家其脉弦為有水十棗湯主之方見

夫有支飲家咳煩胸中痛者不卒死至一百日

一歲與十棗湯久欬數歲其脉弱者可治

實大數者死其脉虛者必苦胃其人本有支

飲在胸故也治屬飲家欬逆倚息飲小青

龍湯主之方見肺 青龍已下多唾口燥寸沈

尺微手足厥逆氣小復上衝胸咽手足痺其

人面赤如醉因復下溜陰肢小便難時復冒

者可與桂枝五味子甘草湯治其氣衝方

茯苓去皮四兩 桂枝去皮四兩 炙甘草三兩 五味子半斤

右四味以咀用水八升煮取三升去滓分温

三服

衝氣即低而及更欬滿者茯苓五味子其草去

桂加乾姜細辛治之方一名其草五

茯苓兩四 炙草兩三 五味子半斤

細辛兩三 乾姜兩三

右以咀水八升煮取三升去滓分溫三服

吧吐而滿在膈上後思水者豬苓散主之方前

吧而脉弱小便後利身有微熱見厥者雖治四

逆湯主之方

炙草兩二 乾姜片一兩半 附子一箇去皮

右三味以咀咀以水三升煮取一升三合去滓

分溫再服強人可大附一枚乾姜三兩

吧而發熱者小紫胡湯方

紫胡 半夏 黃芩 生薑兩煨三

炙草 人參 大棗一十枚

右七味以咀咀水一斗二升煮取六升去滓再

煎取三升溫服一升分三服

胃反吧吐者大半夏湯主之方亦主膈

半夏洗用 人參兩二 白蜜一升

右三味以泉水一升二升和蜜揚之二百四

十遍煮茶取二升半去滓溫服一升餘分再

服千金云治胃反不受食食已即吐外臺云治心下痞硬者

食已即吐者大黃甘草湯主之方

大黃 四兩 炙草 二兩

右二味以咀以水二升煮取一升去滓分温

再服外臺云又治吐水

胃反吐而渴欲飲水者茯苓白朮澤瀉湯主之

方

茯苓 半斤 澤瀉 四兩 桂枝 二兩 炙草 二兩

白朮 三兩 生姜 鉞四兩

右六味以咀以水一斗煮取三升內澤瀉再

煮取二升半去滓温服八合日二服外臺云主消渴

脈絕胃反不食又有小麥一升

吐後渴欲得飲而食水者文蛤湯主之方兼主微風

脈緊頭痛

文蛤 五兩 麻黃 三兩去節 炙草 二兩 石羔 五兩

生薑 三兩 大棗 十二枚 杏仁 二十枚

右七味以咀以水六升煮取二升去滓温服

一升汗出愈

乾嘔吐逆涎味半夏生薑散主之方

半夏 洗

右二味杵為散取方寸七漿水一升羊煎取  
七合頓服之

病人胸中似喘不喘似吧不吧似噦不噦徹心

中憤然無余者生薑汁半夏湯主之方

生薑汁一升半夏洗半

右二味以咀以水三升煮半夏取二升內生

薑汁煮取一升半去滓水冷分四服日三夜

一若一服止停後服

乾吧噦若手足厥冷者橘皮湯主之方

橘皮四兩生薑

右二味切以水七升煮取三升去滓溫服一

升下咽即愈

噦逆者橘皮竹茹湯主之方

橘皮二升竹茹三升大棗三十枚生薑半斤

人參一兩灸草五兩

右六味以咀以水一斗煮取三升去滓溫服

一升日三服

右此疾飲嗽一章內有治傷寒教方仲景用

治雜病今余錄之便後人知三治傷寒有法

治雜病有方者此也傷寒雜病同一治矣

吧吐噓亦附錄之下刊數方錄在太陰上卷後

皆星元武卷第八終

