国立公文書館
National Archives of Japan





幼科證治準繩自序

醫家以幼科爲最難謂之啞科謂其疾痛不能自
說也稱黃帝之言曰吾不能察其幼小爲別是一家
調理耳吾猶謂不然夫幼小者精神未設七情之
攻脈未經八珍五味之漬役之以藥易爲見功
猶膏粱之變齏而慕藿之腹易効也何謂難哉
吾今是科書未有能善者如心鑑之燕穏翠之
粗可者則有古無今百問則荏一瀉皆行於世
未足爲幼科準繩也故吾輯爲是編而瘞痘一門尤
加詳焉平生聚珠痘書百數十家率人所寶欽千金

陳

不傳者然多猥陋不足采擇益可以見世之無見
矣戊曰夫人之病無論男女長幼未有能越五臟而
也子於它科不分五臟而獨幼科分之何居曰正以
精神未受七情六慾之攻臟腑未經八珍五味之滯
獨有氣虛實勝乘之病耳祖工不能精究而臆揣
之曰此為內傷此為外感此為痰此為驚此為熱矣
投湯先以去病為功使輕者重重者死亦有不重不
死幸而得愈者然已傷其眞元天其天年矣吾之獨
分五臟以此通天中水沈大素公從大梁寄余俸金
酉以助刻貲而是書稿適成遂鳩工刻之又喻年始
竣因序而識之使後之人有攷焉時
萬曆三十五年歲在丁未夏五十又三日念西居士
王肯堂宇泰甫書

王肯堂手泰甫書

萬曆三十五年歲在丁未夏五月念四日參西主人自序

幼科證治準繩目錄專備分證檢方之用今止
不互用故不復列覽者詳之

集之一　初生門　五臟病　五臟相勝
證治通論　五臟補瀉法
錢氏論五臟所主
潔古論五臟五邪相乘補瀉大法
察色　聽聲　脉法　死證　難禄
乳哺　雜將護法
初生　拭口法　浴兒法　斷臍法

灸臍法　裹臍法
服藥下胎毒法　甘草法　黃連法　韭汁法
朱蜜法　牛黃法　禾粉法
豬乳法　臍帶法
藏衣法　剃頭法
百壽散　兒初生日與平和飲子
生下胎疾　月內不測諸病
初生便不能啼　眼不開　不乳　生地黃湯　四聖散
洗眼方
朱砂丸　吐不止　木瓜丸　聖惠藿香散
不小便　葱乳湯　豆豉膏　不大便大小便不通
垂囊如聖散　一字散　重舌地黃膏
金朱飲　重舌重腫　聖惠牛黃散　口中有蟲
禁風定命散　辰砂全蠍散　張濱立聖散
鷩口張濱保命散　撮口　千金龍膽湯　急風散
辰砂僵蠶散　撮風散　辰砂膏
臍風控痰散　益脾散　宣風散
防風散　劫風膏　一字金
黑白飲　張濱封臍散　臍濕　封臍散三方
錢乙碟熏散　張濱胡粉散　臍瘡　異功散
龍骨散　張濱金黃散　臍突　外消散
二豆散　胎驚　獨活湯　驅風散

青金丸　太乙散　參蠍散
豬乳膏　朱銀丸　張漁聖星丹
白金散　烏金膏　天南星煎
祛風散　鐵粉散　胎癇風
麝香膏　胎癇　生地黃湯
木通散　釀乳法　甘豆湯　胎寒
四聖散　地黃膏　羌活膏
胎肥胎怯　浴體法　大連翹飲　胎黃　生地黃湯
地黃湯　地黃飲子　犀角散
胎赤二金散　眞金散　洗心散

瀉青丸　抑肝散　驚搐
大青膏　黃連安神丸　鎮心丸
驚參蘇飲　人參羌活散　悍惺散
獨活湯　木通散　已風丹
加味導赤散　仁齋犀角湯　通關散
噎驚散　芎先生奪命散　錢氏涼驚丸
局方夫麻防風丸　金嬰方睡紅散　定搐散

順搐散　瀉青丸　羅氏鎮肝丸
防風湯　宣風散　定命丹
踈風散　演山截風丹　定搐散
牛黃清心丸　鄭氏比金丸　利驚丸
太白散　防風丸　全蠍散
火府散　湯氏金星丸　芎先生朱砂膏
大黑龍丸　小黑龍丸　謝氏奪命丹
比金丸　利驚丸　演山青金丸
眞珠天麻丸　鄭氏驅風膏　睡安散
蛇頭丸　直指天麻丸　直指銀白散

定志丸　溫膽湯　加味地黃丸
五福化毒丹　安神丸　鴻氏五苓散
百解散　木通散　三解散
牛蒡湯　防風湯　半夏丸
寬氣飲　五和湯　茯神湯
鎮驚丸　截驚丸　朱砂膏
不驚丹　薛氏參木柴苓湯　安神鎮驚丸
慢驚瓜蔞湯　青州白丸子　溫白丸
釣藤飲子　羌活膏　海藏返魂丹
湯氏八仙散　醒脾散　釀乳方

撩痰方　陳氏方芳蠍散　油珠膏
補脾益眞湯　前朴散　曾氏冲和飲
七寶散　六柱散　曰生湯
固眞湯　醒脾散　沉香飲
天麻飲　薛氏木附湯　太乙保生丹
聚寶丹　金箔鎮心丸　天南星散
烏沉湯　沉香散　蘇青丸
銀白散　釣藤散　黑附子湯
生附四君湯　辰砂膏　七寶辰砂丹
觀音全蠍散　吉州醒脾散　本事醒脾丸

蝎稍丸　錢氏回生散　梓朴散
豆卷散　東垣黃芪益黃散　生氣散
王氏惺惺散　醒脾散
湯氏醒脾散　演山觀音全蠍散　直指星香全蠍散
烏蠍四君湯　調氣散　慢脾風黑附湯
金液丹　生附四君子湯　異功散
大醒脾散　實脾散　鎮驚丸
通治急慢驚湯氏奪命散
保命丹　濕驚丸一名粉紅丸　抱龍丸
琥珀抱龍丸三方　初氏奪命散　天麻散

雄黃散　天麻防風丸
褊銀丸　劫風膏
目睛瞤動　目直視
唇口瞤動　睡中驚動
腹蟬蛇釣藤飲　煩渴清心飲
潮熱似瘧　雜證類驚消暑清心飲
驚悸　目動咬牙
溫膽湯　寧志丸　泄瀉
治要茯苓補心湯　茯神散
酸棗仁丸　定志丸　茯神湯
朱雀丸　治要茯苓散
世傳蜜陀僧散　丹溪朱砂丸
本事辰砂遠志丸　加味歸膂湯
辰砂膽星膏　木通散
癎
錢氏五色丸　三因六珍丸　風癎
保安丸　獨活湯　散風丹
牛黃丸　化風丹　日辛大黃湯
蛇黃丸　鎮驚丸　驚癎
七寶鎮心丸　清神散　比金丹
天麻丸　蛇黃丸　食癎
龍腦安神丸　奪魂散　妙聖丹
虎睛丸
地龍散
雌黃丸

拔萃妙香丸　鎮心丸
代赭石散　神應丹
清神湯　養心湯
星蘇散　礬丹
朱砂滾涎散　琥珀壽星丸
斷癎丸　定癎丸
控涎丸　當歸大黃湯
沈香天麻湯　牛黃丸
紫河車丸　蜜陀僧散
中風　牛黃清心丸
妙香散
元戎二白丸
南星五生丸
碧雪丹
元戎小靈寶丹
斷癎丹

角弓反張
搖頭
清肝益胃丸
偏風口噤
錢氏全蝎散　胃風湯
口喎失音
朱砂丸　全蠍散
木通湯　寬氣飲
天釣
九龍控涎散　釣藤飲
一字散

雙金散　牛黃散
抵聖丹　鉤藤飲 四方
木香丸　牛黃丸　白銀丹
天漿子散　青黛丸　乳香丸
三仁散　再生散　塗頂膏
拘攣
鎖命湯　追風散　等拳不展
薏苡仁散　羚羊角散　胸拳不展
當歸散　乾地黃丸　海桐皮散
鷺灘鶴膝
大防風湯　獨活寄生湯　防己湯
祛風散　獨活湯　黑虎丹
辨風湯
眼目
目赤腫痛 導赤散　小防風湯
小菊花膏　通頂散　小流氣飲
三解散　草龍膽散　九仙散
金波散　黃連膏　明目飲
辟塵膏　速効飲　清涼膏
犀角飲　廣大重明湯　生熟地黃散
助陽和血補氣湯

柴胡復生湯　黃連羊肝丸　外障保命羚羊角散
東垣補陽湯　羌活退翳湯　五秀重明丸
鎮肝散　井泉石散　羅氏煮肝散
龍膽飲子　內障人參補胃湯　冲和養胃湯
滋陰腎氣丸　瀉熱黃連湯　千金補肝散　雀盲復明散
局方菊睛丸　真珠膏　眼白多睛
山茱萸丸　通睛湯氏生牛黃丸　眩劄
小便不通
錢氏撿頭散　湯氏木通散　冬葵子散
張氏葵石散　車前散　芎黃散
乞砂丹　朱砂散　清肺散
八正散　梔子仁散
淋
五淋散　局方五淋散　導赤散
葵子散　香芎丸　清心蓮子飲
金沙散　立効散　張渙石燕丹
石韋散　葵子散　滑石散
蒲黃散
遺尿
鷄腸散二方　益智丸
破故紙散

尿白便濁
君朮丸　茯苓散　三稜散
香砂丸

疝
茱萸内消丸　當歸散
曾氏白芍湯　烏梅散　川楝丸
金茱丸　散氣丸　金鈴散
木香飲　龍膽瀉肝湯　勻氣散

陰腫
桃仁丹　胡連散　海蛤散

桃仁丸　三白散　蚯蚓散
牡蠣散　牡蠣大黃湯　青木香湯
立消散　天花散

偏墜
黑散

陰瘡
臘茶散

不寐
仲景酸棗湯　本事鼈甲丸
人參竹葉湯　眞珠母丸

咽喉
甘桔湯　立効散　吹喉散
牛蒡湯　化毒湯　備急散
牛蒡子湯　抜萃桔梗湯　消毒飲

集之三　心臟部一

心
安神丸　八物定志丸　瀉心湯
導赤散　生犀散　祕旨安神丸
發熱
五臟熱　梔子清肝散　柴胡清肝散

柴胡飲子　龍腦飲子　滋腎丸
實熱　芎先生三解牛黄散　牛黄涼膈丸
虛熱　當歸補血湯　補中益氣湯
加味逍遥散　表熱　敗毒散　清解散
集驗荆芥散　一人參羌活散　羌活散
人參辛梗湯　紅縣散　裏熱　四順清涼飲
大黄朴硝湯　柴胡飲子　五和湯
寬熱飲　三黄丸　表裏俱熱　七寶散
白虎湯　半表半裏熱　餘熱　實脾散
參苓白朮散　安神散　簡易凝神散

壯熱地黃煎　火府丹
黃龍湯　牛黃膏
六物黃芩湯　五物人參散
二黃犀角散　牛黃散
甘露散　辰砂金箔散
地骨皮散　柴胡飲
靈犀飲　煩熱一粒金丹
地黃煎丸　竹葉石膏湯
田氏犀角散　秦艽散
十味人參散　曾氏百解散
金蓮飲子
梔子仁湯
温壯柴苓湯
驚熱天竺黃散
骨蒸熱人參生犀散
鄭氏犀角飲
絳雪丹
潮熱地骨皮散
人參葦歸散
當歸散

三解散　大柴胡湯
六合湯　豬膽丸
四物二連湯　積熱紅縣散
銀白散　桃枝丸
梔子湯　玉露飲
萬安飲　調胃散
變蒸熱紫陽黑散　柴胡湯
當歸散　平和飲子
心痛
錢氏靈礬散　聖惠芍藥散
茅先生金鈴散
晝龍膽丸
夜熱金星丸
六神散
梔豉飲子
益元散
寒熱
調氣散
參杏膏

煩躁
清熱解毒丸　橘皮湯
至寶丹　神朮丸
注夏
清暑益氣湯　清燥湯
舌
重舌　烏魚散　青液散
捻金散　綠袍散　舌白胎舌上蒼
川硝散
諸失血證
黃連解毒湯
酸棗仁湯
當歸連翹湯　木舌消黃散　舌上血出

人參芎歸湯　黃芩丸　芎花湯
吐血　四物湯　犀角地黃湯　黃芪芍藥湯
人參黃芪散　梔枝飲　辰膠散
紫參散　衄血　湯氏地黃湯　麥門冬飲子
龍膽丸　蘗皮湯　槐花散
膠黃散　大小便血　五倍丸　訶灰散
桃膠丸　火府散　車前散
語遲
錢氏菖蒲丸　張氏菖蒲丹　聖惠芍藥散
雞頭丸

汗
自汗香瓜丸　止汗散　薛氏十全大補湯
團參湯　牡蠣散　撲汗方
血餘散　盜汗錢氏黃芪散　白朮散
當歸六黃湯　沉香鼈甲丹　蓯蓉丹
升麻湯　牡蠣散　虎杖散
噫氣
木香枳殼散　四味黃連丸
下氣
壽衣撮空
生地黃連湯
喜笑不休
瘡瘍
四黃散　一抹金　解表消毒飲
攻裏消毒飲　連翹散　寄生散
玄參飲　涼膈散　托裏禁衛湯
秘方托裏散　仙方活命飲　神効解毒散
一玄參丸　犀角消毒丸　托裏消毒散
一托裏散　八味茯苓補心湯　天烏散貼方
青露散　驚毒掩　驚毒腫痛掩子

鐵籬散 神功散
犀角解毒散 防風升麻湯
防已散 化丹湯
藍葉散 升麻散
升麻膏 生料四物湯
解毒散 赤葛散
硝石散 綠袍散
碧雪 水黃散
五色丹 白丹 張滌香豉散
赤丹 升麻膏 張滌升麻膏 黑丹 張滌祛毒丹
天火丹 鬼火丹 張滌祛毒散 家火丹
殘火丹 張滌祛毒散 神火丹 焚火丹
廢竈火丹 赤旧火丹
尿竈火丹 赤流升麻湯 天竈火丹
晏元獻牛黃散 張滌大黃散
消腫散 身有赤處出丹參散
鉛霜散 二十種丹所起形候并治法 麥門冬散
赤白游腫 犀角散 升麻膏
胞入腹 丹毒 犀角升麻湯
疔瘡 二十種丹所起形候并治法 禁忌 禁法
沂飛龍奪命丹 時毒通氣散 流注 健脾滲濕飲
梔子仁湯 葛根牛蒡子湯

和血定痛丸　蔥熨法　隔蒜灸法
如聖餅　天蛇毒
加味解毒散　金黄散　天泡瘡　柴苓參苓散
王燭瘡　紅絲瘡　楊梅瘡　換肌消毒飲
没淫瘡　惡核瘰癧　大聖散
玄參飲　升麻湯　柴苓參苓飲
清肝益榮湯　加味小柴胡湯　益氣養榮湯
必効散　驚風結核瘡疥　加味逍遙散　皂角子丸　九味柴胡湯
琥珀膏
牛黄解毒丸　立効散　當歸飲子
苦瓠散　青金散　敷藥解毒散
癬疹　葛根橘皮湯

玄參升麻湯　化癖湯　荆防敗毒散
人參敗毒散　人參安胃散　犀角消毒飲
地龍散　黄水粘瘡　九味解毒散　加味清涼飲
人參消風散　連翹防風湯　和肝補脾湯
益脾清肝湯　三黄散　立効散
頭面瘡　養心湯　牛黄解毒散　抜毒散
眉瘡　青金散　耳瘡　水銀膏　胡粉散
蔓荆子湯　清上散　當歸龍薈丸
清黄散　清心丹　交感丹
禹餘糧丸　龍骨散　羊角散

滋陰地黃丸　白斂散　口瘡拔毒散
立效飲　黃金散　天竺黃散
地黃膏　清胃散　清熱消毒散
柳葉散　如聖散　牡蠣散
腮癰升麻防風湯　清咽利膈湯　臂癰白芷升麻湯
大連翹飲　腋癰　脇癰加味歸脾湯
腹癰　腿癰
肺癰小青龍湯　桔梗湯　丹麻湯
排膿散　射干湯　人參平肺散
參芪補肺湯　人參補肺湯　腸癰大黃湯

黃芪仁湯　桃仁湯　牡丹皮散
便毒內補黃芪湯　囊癰托裏清肝散　山藥膏
脚東瘡白斂散　湯火瘡神效當歸膏　乳香定痛散
豬蹄湯　翻花瘡熬蘆膏　多骨疽痛瘡

集之四　心臟部二

瘡疹上

溯源　預防　運氣　疫癘
辨疑似　五臟見證　部位　脉候
氣血　虛實　陰陽　形氣
輕重　順逆　動靜　形色

疎密　老嫩　乾溼　榮枯
標本　始終　日數　禁忌
汗下　證治大法　初熱證治　見形證治
預防
三豆湯　代天宣化丸　遡源解毒湯
養胛丸　消瘟丹　祕傳保嬰丹
滋陰三寶散　四製白朮散　八珍膏
衛元湯　內托至奇湯　滴滴金
犀角地黃湯　茯神湯　野仙獨聖散
參苓白朮散加減　固眞湯　龍金湯
紫霞黃露飲　龍旋散　貞元散
龍蟠散　穀精龍膽散　消導飲
磨積散　浚牛膏
大法
解毒防風湯　消毒救苦湯 又名東垣消毒散
參芪飲 即保元湯萬氏名調元湯　十神解毒湯
羌活散鬱湯　太乙保和湯　益元透肌散
保嬰百補湯　八味二花散　保生散
初熱
升麻葛根湯　惺惺散
荊芥散

羌活散　薄荷散
一人參敗毒散　李氏敗毒散　羌活散
調解散　蘇解散　正氣散
王朝奉四物解肌湯　和解湯
雙解散　葛根橘皮湯　防風蒼朮湯
桂枝葛根湯　柴葛桂枝湯　五積散
備急丸　加味四君子湯　和中散
六一散　大靈丹　七物升麻丸
小無比散　大無比散　無比散
犀角飲子　犀角湯　玳瑁湯
奪命散

牛蒡散　獨勝散　解毒疎痘湯
安癍散　西來甘露飲　渾元汁
蟬蛻膏　辰砂散
見形
快癍湯　消毒飲
發熱一二日便出　實表解毒湯
清地退火湯　熱五六日始出　托裏快癍湯
增損八物湯　勻氣散
加減調中湯　出太密　連翹升麻湯
犀角消毒飲　麻黃甘草湯　三　田氏調肝散

龐氏地黃膏 仙茅 快 消毒散 鼠黏子湯
化毒湯 透肌湯 九味羌活湯
辰砂五苓散 人參竹葉湯 白虎湯
紫草散 四聖散 紫草廻瘡散
紫草木通散 人參蟬蛻散 透肌散
紫草透肌湯 紫草快瘡湯 烏金膏
紫金散 蘿蔔湯 野通散
祕傳大透肌散 活血散 通天散
人參透肌散 升均湯 二花散
異功散 陳氏 二三 十補散 藍根散

絲瓜散 甘桔加梔子湯 水解散
胡荽酒 紫草飲 加味四聖湯
臙脂塗法 阮氏萬全散 化毒湯
解毒散 露桃花散 黃連解毒湯
加減犀角地黃湯 五龍湯 化斑湯
四仙散 玉泉散 出多熱不退 涼血解毒湯
加味犀角飲 該目神應膏 黃檗膏

集之五 心臟部三

痘疹中

起發證治 灌漿證治
收靨證治 落痂證治

發熱　瀉　煩躁　譫妄
驚搐　中風　自汗　失血
不能食　咳嗽　喘　涕唾稠粘
失音　嗆水　吐利　吐逆
瀉利　大小便閉
起發
活血散 即芎歸湯　參耆四聖散　胎元散
獨參湯　水楊湯　祛邪湯
玉樞正氣丹　九味順氣散　紫草飲子
內托散　廻陽丹　茵蔯薰法
末二散　快癍越婢湯　消毒化癍湯
羌活救苦湯 起發不透　雞鳴散　震墊丹
天元接髓丹　內托散
灌漿
辟穢香　六一湯　助漿丸
升天散　補漿湯　登泉散
轉環丹
收靨
回漿散　象牙散　敗草散
蕎麥散　滅瘢救苦散　百花膏

排毒散　升陽解毒湯　雄黄散
綿蜜散
落痂
四白滅瘢散　韶粉散
人參固肌湯　人參清神湯　馬齒莧散
羊髓骨髓
發熱
羌活湯　加味葛根湯　調元固表湯
柴胡麥門湯　連翹散　如聖湯
三黄丸　宣風散　梔子金花丸
通膈丸

渴
葛根解毒湯　人參麥門冬散　六味人參麥門冬散
退火回生散　人參白虎湯　竹葉石膏湯
麥門冬湯　人參白朮散　生脉散
神功散　紅花湯
煩躁
活人酸棗仁湯　梔子豉湯　黄連解毒湯
牛黄清心丸　人參蟬蜕散　人參竹葉湯
譫妄
安神丸　梔子仁湯

驚搐
紅綿散　麻痘風搐方　解毒丸
柴胡二連丸　括蔞散　保命丹
中風
消風散
白汗
浮麥散　敗蒲散　温粉撲法
失血
犀角地黄湯　二寶散　鮒血　吐血　玄參地黄湯
斬關散

不能食
四君子湯　六神散　七珠散
人參養胃湯　麥冬參朮散　二和湯
白朮苦參湯　陳皮枳實湯
咳嗽
白朮湯　五味子湯　人參清膈散
生地黄散　赤茯苓湯　桔梗湯
喘
杏甘湯　麻黄湯　前胡枳殼湯
葶藶丸　葶藶木香散　紫草甘草枳殼湯

葛根黃芩湯　五味子湯　六味凉血消毒散

涕唾稠粘

失音

補肺散　八風散　天花散

清肺散　梔子薑蒲湯　紫河車散

噙化丸

噎水

吐利

理中湯　香蘇飲　紫蘇本香湯

人參胃愛散　黃芩加半夏湯　中和散

竹茹湯　和中湯　藿香正氣散

吐逆

茱連散　橘皮湯二方　橘皮半夏湯

丁香煮散　加味鼠粘子散　燈心竹葉湯

瀉利

黃芩湯　九味理中湯　陳氏豆蔻丸

理中湯丸　參朮丸　香連丸

十一味木香散　治中散

大小便閉

八正散　滋腎丸　黃芩清肺飲

紫草木通湯　通關散
紫草冬葵湯　當歸丸
洗心散　三乙承氣湯
加味四君子湯　潤腸湯
集之六　心臟部四
瘟疹下
寒戰咬牙　厥逆
腰痛　腹痛
痛　身痛
黑陷　灰白
連翹湯
秦變百祥丸
膽道法
紫草麻仁湯
眼目　咽喉
腹脹　痛癢
癢塌　陷伏倒厥
夾疹　夾痧
瘟疹　瘟瀾
塞腫　潰爛
臭瘟　蛆瘟
驗唇口齒　驗喉舌
驗手足　驗寢卧
水瘟　麻疹
寒戰咬牙
柴葛桂枝湯　養衛化毒湯
清神化毒湯　無憂散
催瘡丹　滴滴金
厥逆
驗頭面　驗耳目鼻
驗頸項　驗胸腹
驗飲食　瘟後餘毒
袁氏獨附湯
透骨解毒湯

參附散 二神散
眼目
蟬蛻膏 治瘡疹入眼二方 海藏地黃散
決明散 撥雲散 蜜蒙花散
通聖散 蛤粉散 洗肝明目散
蟬蛻明目散 蟬蛻散 蜜蒙花散
兎糞散 兎糞丸 吹耳丹二方
洗肝散 防風散 加味四物湯
羌活防風散 秦皮散 仙靈脾散
蘇蠜散 蟬菊散 菉花散

浮萍散 羚羊角散
羚羊角飲子 撥雲散
咽喉
活人如聖餅子 甘草桔梗升麻湯
地黃丸 甘桔防風湯 玄參升麻湯
射干鼠粘子湯 玉鎖匙 加減射干鼠粘湯
利咽解毒湯 三黃熟艾湯
腰痛
加味地黃丸 羌活當歸湯 如神湯
腹痛

定痛散　桂枝芍藥湯　黃連湯
一味異功散　蟬蛻一物湯　桂枝大黃湯
桂枝芍藥湯　黃芪建中湯　化毒湯
牛黃散　和解湯
腹脹
紫草承氣湯　桔梗枳殼湯　二陳加枳殼湯
加味透肌散　紫草厚朴湯　紫草枳實湯
木通芍藥湯
痛癢
痛

五物木香散　青黛散
身痛
消毒飲　勻氣散
癢塌
參芪內托散　紫草木香散　一消風化毒湯
蟬花散　二物湯　盒肭散
震澤湯　天元二仙丹　七星散
白龍散　浴法
陷伏倒靨
麗氏鸞金散　四聖散　無價散

南金散　橄欖飲　白花蛇散

黑陷

冠氏麻黃湯　豬尾膏　龍腦膏子

四糞散　百祥丸　牛李膏

活人無比散　癍疹黑陷方　紫草散

奪命五毒丹　談笑博金丹　大造保命丸

一字金丹　至寶丹　一粒金丹

天眞膏　大成散　無價散

灰白

加減大紫萇散　補元湯　活血散

保生散　混元散　內助丹

助陽丹　回生起死丹

夾疹

荆防敗毒散　人參羌活散　清和散

夾癍

山梔子湯　陽毒升麻湯　陰毒升麻湯

痘疔

四聖散　二聖散

飛龍奪命丹　拔毒膏

痘瘢

苦參丸
癰腫
潰爛
牛黃丹　生肌散　金華散
白螺散　乳香韶粉散　祕傳茶葉方
蟬花散
臭瘡
定金湯　寒水丹
蛆瘟
瘟後餘毒

活血解毒湯　癘仙方活命飲　人參敗毒散
樺皮散　十二味敗毒散　保命集木香散
流氣飲　小柴胡加生地湯　六味活血散
五福化毒丹　犀角消毒丸　托裏散
托裏消毒散　東垣聖愈湯　濟生歸脾湯
拔毒膏　隔蒜灸法　替鍼丸
神效太乙膏　神效當歸膏　豆豉餅
如聖餅　神功散　三豆散　鐵箍散
癒齊連翹散　痘癮三黃散　癮疹單衣湯
蜆子氷　丹瘤玄參化毒湯　犀角消毒散

加味解毒散　蜈蚣法
望月沙散　芜菊散　發熱柴胡梔子散
養脾丸　小柴胡湯　嘔吐木香大安丸
槐花散　黃芪散　中風釣藤湯
枸攣當歸桂枝湯　咳嗽燥心湯　赤茯苓湯
寒熱太和散　腫脹五皮湯　塌氣丸
胃苓湯　失血桃仁承氣湯
狐惑化蠱丸　黃連陰蠱丸　吐利蓮肉湯
甘露飲　雄黃散　牙疳洗心散
人中白散　馬鳴退散
砒石散　赴筵散

水痘
麥湯散　麥煎散
麻疹
瀉白消毒散　加味金沸草散　防風解毒湯
黃連解毒湯　桂枝解毒湯　升麻解毒湯
麻黃湯　煙葉散　黃連湯
芎花湯　加味黃芩湯　銅壁山人黃芩湯
十全散　葛根麥門冬湯　白虎合解毒湯
養血化癍湯　大青湯
柴胡橘皮湯　柴胡麥門冬散　加味地骨皮散
柴胡四物湯

文蛤散　雄黃散　門冬清肺湯
清熱除痞丸　當歸養血湯　黃連安神丸

脾

益黃散　人參安胃散　瀉黃散
不乳食
平胃散　調中丸　八味地黃丸
參苓白朮散　健脾飲　藿香飲
芳先生勻氣散　調理衆病醒脾散　健脾散
調中飲子　神朮散　前胡散

張潔集香煎　調中湯　益胃丹
丁香黃芪散　千金地黃丸
脾弱多困
人參散
痰涎
半夏丸　白附丸　騰星天竺丸
牛蒡子散　萬全蠲金散　小朱砂丸
金朱丸　譚氏金珠丸　半夏丸
劉氏消乳痰丸
吐瀉

夏秋治裏 玉露散 香薷飲 車前子散
冬春治表 大青膏 守胃散 六和湯
不換金正氣散 二順散 釣藤飲
瀉黃多渴爲熱宜涼
理中丸 金液丹 豆蔻散 理中湯
瀉青不渴爲寒和胃丸
張漁勻胃散 助胃膏
瀉黃白似渴爲寒熱雜合病
補虛四君子湯 六君子湯
和劑觀音散 温中丸 和中散 曾氏和中散
治痰半粟散
銀白散
宿食消積丸 張漁三和散 香豆散
除濕津液少

丁時發人參散 入參散 肉豆蔻散
吐
寒吐萬安膏 朱沆丹 定吐紫金核
香銀丸 本事白术散 薑橘湯
熱吐
定吐飲 參香飲 香薷飲
竹茹湯 錢氏藿香散 本事麥門冬散
湯氏清膈飲子 聖惠麥門冬散 蘆根粥
大順飲 綠豆飲 益元散
濟生竹茹湯 傷風嗽吐 茯苓厚朴湯
傷乳吐 消乳丸 積吐 烏犀丸 風痰吐 青州白丸子 消食丸

半夏散　錢氏鐵粉丸　茯苓半夏湯
二陳湯　白附飲
挾驚張漁三香丹　珠聖歸命丹　定叶丸
田季散　王氏睡驚丸　萬安膏
全蝎觀音散　安胃六神湯　人參散
掌中金　釀乳法

瀉

茅先生香連丸　乳香散　令瀉守中湯
沒石子丸　張漁川椒丸　粟煎湯
熟瀉黃芩湯　張漁清胃散　香連丸

生薑瀉心湯　保安丸　杏霜丸
醫局開胃丸　水瀉聖惠厚朴散　張漁厚朴散
萬全龍骨丸　積瀉香橘餅　驚瀉至聖保命丹
定命飲子　朱君散　睡驚太乙丹
四神丸　二神丸　疳積瀉沒石子丸
暴瀉聖惠胡連散　龍骨散　張漁阿膠丹
玉粉丹　久瀉丁金七味散　聖惠丁香散
黃連丸　譚氏斗門散　嬰孺龍骨湯
龍骨湯　黃連煎　雞骨丸

温白丸　惺惺散　香蘇丸
殮聖惠厚朴散　地楡散　醫局胃風湯
赤白痢
羌活散　水浸丹　寛腸丸　熱痢黄連解毒湯
潑火散　芍藥檗皮丸　寛腸枳殼散
三黄熟艾湯　地楡散　地楡飲
川草散　錢氏黄檗丸　梔子丸
外臺子苓湯　聖惠梔子仁散　烏梅散
形證治開胃散　冷痢大順飲　養臟湯
雄朱散　玉脂散　治白痢艾湯

曽氏養臟湯　寒熱雜合　香連丸　金粟丸
白附香連丸　苦蔻香連丸　木香丸
小香連丸　吉氏香連丸　白膿鶴氏雞子餅
王氏脂附丸　丁時發附子散　純血聖惠黄連散
馬歯菜汁粥　張渙水蓼丹　張渙黄連丹
齒根湯　厚朴湯丹　聖効散
必效丹　吉氏地楡散　膿血相雜白頭翁丸
肘後乳母方　肘後近効方　千金黄檗湯
聖惠吳藍散　樗根皮散　人參散
雞屎礬丸　養生黄連阿膠丸　燔髮散

張漈建胃丹　青橘丹　王兗通神丸
五色痢　漢東王先生鮓湯丸　三霜丸
至聖丸　定粉散　休息痢　嚙口痢　石蓮散
香脯散
鹽痢　聖惠蘘荷散　聖惠黃連散　聖惠犀角散
嬰孺蘘荷根湯　嬰孺犀角煎　張漈白頭翁散
地榆丹　宣連丸　收澁雙金散
萬金散　神效散　補養升陽益胃湯
瀉痢兼證
渴　龍宵湯　麥門冬湯　外臺櫸皮飲子
聖惠黃芪散　黃芩散　當歸散
龍骨散　鹽葉散　地榆散
黃連散　櫸皮散　甘草散
黃芩丸　太醫局人參散　嬰孺子芩湯
茈薪湯　冬瓜湯　張漈建胃散
碧香丹　實鑑竹茹丸　人參白扁豆散
吉氏六神丸　腹痛　聖惠黃連散　黃檗丸
木香散　肉豆蔻散　龍骨丸
張漈順胃丹　建中丹　九籥衛生固氣丸
張氏聖餅子　吉氏紫霜丸　羸瘦　聖惠桔梗丸

雄黃散　雞子粥
浮腫惠濟論塌氣散
腹痛
寒痛調中丸　當歸散
指迷七氣湯　張渙寬中湯
温胃丹　橘香散
熱痛茯苓丸　積痛湯氏三稜散
安蟲丸　蕪荑散
化蟲飲　二聖丸
艦腸內鈎痛錢氏鈎藤膏
七氣湯
張渙龍骨湯
蓬莪朮丹
止渴聖効散
曾氏檾香湯
蟲痛錢氏安蟲散
史君子丸
鎖肚痛烏梅散
魏香散

蒜乳丸　畏參苓散
聖惠人參散　錢乙和中散
腹脹
塌氣丸　本事調中丸　訶梨勒丸
張氏温脾散　沉香煎　三因肥兒丸
六神丸　褐丸子　五疳保童丸
楊氏塌氣散　塌氣丸　塌氣散
分氣飲　三稜煎丸　三稜丸
阿魏丸二方　小阿魏丸　真珠天麻丸
大茱連丸　下蟲丸　遇仙丹

補虛芍藥甘草湯

中滿分消丸　消痞丸　升陽滋血湯

麻黃升麻湯

水腫

南星腹皮散　香蔻胃苓丸　赤蒼飲

三白散　商陸丸　滑川丸

榮衛飲子　分氣飲子　大效神功救生丹

金匱加減腎氣丸

集之八　脾臟部下

疳

肝病疳　天麻丸　生熟地黃湯　耆歸湯

張漁龍膽天麻丹　烏蟾丹

蘆薈丸　皂角膏　神妙觀音散

人參散　通神丸　茯神湯

心疳　朱砂安神丸　茯苓丸　朱砂丸

張漁參黃丹　天竺黃丹　睡驚丸

萬全真珠散　麝香丸　鹽脂丸

脾疳　桃花丸　四味肥兒丸　檳榔丹

神効換肌丸　張漁木香煎　詞梨勒丸

肉豆蔻丹　聖惠木香丸　大無羨湯

桃花散　大胡黃連丸

黃耆散 蘆薈丸
肺痈地黃清肺飲
補肺散 張漁麝香丸
五靈脂丹 胡黃連丸
腎痈調元散 丸味地黃丸
能膽膏 立聖膏
通五痈保童丸 大蘆薈丸
萬應丸 博濟青金丹
譚氏蝦蟆丸 張漁夜明丹
張氏香蟾丸 莊氏五痔丸
吳氏黃芪飲子 腸連丸
熱痈胡黃連丸 無辜痈 肥兒丸
張漁蠍虎丹 香甲湯
二肝丹 梅肉散
天靈丹 温臟湯
人中白散 朱砂丸
漏蘆散 漏蘆丸
聖惠乾蟾丸 麝香丸
乾蟾丸 熊膽丸
青黛丸 錢乙胡連麝香丸
虎睛丸
化蠶丸
靈砂丹
張國材肺痈散
張漁熊膽散
二金散
蘆薈丸
靈苑紅丸子
劉氏金蟾丸
王氏保童丸
珍熱痈木香丸
五痈出蟲朱砂丸
出蟲丸
定命散
錢乙榆仁丸

蛔痞 史君子散　蘆薈丸
除毒丹　豬肚丹
桃柳湯　苦楝丸
脊疳 聖惠金蟾散　地骨皮丸
蘆薈丸　青黛丸
腦疳 聖惠牛黃丸　龍腦丸
安息丸　龍膽丸
青黛丸　牛黃丸
青黛散　牛黃丸
東垣厚腸丸　張渙金粟丹　張渙三根散
穀精丹
下蟲丸
殺疳丸
朱砂丸
吹鼻龍腦散
乾疳 聖惠天竺黃散
胡黃連丸
內疳 史君子丸
本事芎朴丸

聖惠木香丸　蘆薈丸
胡粉丸　譚氏寶命丹　麝香散
秋霜散　外疳 紫金散
錢乙龍骨散　惠眼秋霜散　乳香丸
蟾灰散　茅先生崩砂方　定命散
李琬麝香散　聖散子　生金散
曾氏燒鹽散　黑神散　孔氏無比散
紅鉛散　內金散　蠻陀僧散
獨活飲子　演山蘭香散　傳齒立効散
檳榔散　三黃散　人參散
黃耆散　地骨皮散

茅先生朱砂膏　牛黃膏　天竺黃散
三解牛黃散　檳榔散　口齒瘡散
吳氏青霞散　鼻瘡湯氏五福化毒丹
澤瀉散　枇杷葉散　青金散
錢乙蘭香散　張渙石膽散　吹鼻蟬殼散
錢氏白粉散　眼瘡龍木殺疳散　退翳丸
玉訣瀉肝散　棗仁膏　靈苑羚羊角丸
譚氏退雲散　張渙井泉石散　豬膽黃連丸
濕瘡千金除熱結腸丸　張渙桃白散　薑蜜湯
杏仁湯　如聖丹

錢乙金華散　化匿丸　疳瘡豬張渙四珍丹
能膽膏　通治集驗一切瘡
集驗神效丹　元和痔瘡香丸　痔積散
太醫局蘆薈丸　錢氏膽礬丸　靈苑千金丸
丁氏蝦蟆丸　張氏神麴散
演山史君楝榔丸　胡黃連丸　肥肌丸
痘熱湯氏龜甲散　化蟲丸　豬肚丸　張道人守命丹
龍膽丸　烏犀丸二十丸　譚氏金瓜丸
蘆薈丸　茅先生藥胡散　六物黃芩湯
莊氏青黛丸　王氏史君子散　地骨皮散

豬肚黃連丸　柴胡飲子
雞肉煎丸　張氏三和飲子　犀角散
鼈血煎　黃連丸
五膈丸　胡黃連散
錢乙龍粉丸　張湲青香丸　痘疹吸門　防已丸
溫肺散　痘積錢乙牛黃丸　杏仁散　痘疹潤肺　聖惠大黃散
張湲褐丸子　換骨丹　莊氏參苓散
香甲丸　趙氏青高丸　青金膏
豆蔻散　痘瘡　仙人水鑑粉霜丸　知母飲　經驗檳榔丸
瀉　錢乙二聖丸

胡黃連飲子　莊氏黃連丸　錢乙如聖丸
博濟胡連丸　香蔻丸　錢氏木香丸
沒石子丸　聚寶方黃龍丸　吉氏蘆薈丸
良方吳婆散　痘痢　聖惠青黛散　殺疳丸
白龍骨丸　肉豆蔻丸　聖惠黃連散
蕪荑丸　八香丸　張道人沉香丸
木香丸　白朮散　胡黃連丸
痘腫脹　勻氣散　痘氣入陰　烏金膏
虛羸
補中益氣湯　聖惠黃芪丸　秦艽丸

麥門冬丸　燒黃瓜丸　大黃丸
豬肚丸　香甲丸　聖惠訶梨勒散
溫脾散　五香煎　蘆薈丸
露星膏　錢氏橘連丸　二聖丸
香蟾丹　萬全雷丸丹　孔氏神聖丸
豬肚丸　趙氏斧槌丸　玉柱杖散
蘆薈丸　吉氏益兒丸　朱氏肥兒丸
六味肥兒丸　秘方肥兒丸
鶴節
地黃丸

丁矢
十全丹　醍醐散　快活丸
聖惠赤芍藥丸　嬰孺芍藥丸　張渙大麝香丹
哺露
聖惠人參丸
宿食
保和丸　木香大安丸　消食丸
七聖丸　三稜散　莪朮丸
丁香脾積丸　三黃枳朮丸　聖惠訶梨勒散
朱氏木香丸　朱氏洗心散　養脾丸

痞結

聖惠前胡散　聖惠甘遂破結散　進食丸

枳朮丸　枳實理中丸　快膈湯

參朮陷胸湯

積

千金紫雙丸　茅先生青金丹　萬靈丸

一錢乙消積丸　紫霜丸　眞珠丸

消堅丸　白餅子　張渙萬靈丹

剪紅丸　真方五色丸子　下積丸

五珍丸　局方進食丸　六聖丸

烏犀丸　水晶丹　聚寶聖餅子

吉氏追魂散　沉香檳榔丸　集驗蓬朮丸

聖惠三稜散　張渙三稜散　聖惠化癖丸

丁香化癖散　青礞石丸　玉訣銀白散

快膈消食丸　莊氏紫金丸　莊氏軟金丸

劉氏桃紅散　王先生靈砂丹　小沉香丸

良方妙香丸　玆癖茅先生蓬莪散　聖惠龜甲散

化癖丸　木香丸　取癖丸

挨癖丸　聖惠前胡丸　朱氏知母丸

渴

三黃湯　聖惠黃連飲　麥門冬散
聖惠銀飲子　蒜薤根散　茅先生胡黃連散
聖惠蘆根散　嬰孺麥門冬湯　蘆根飲子
蒜薤湯　錢氏白朮散

黃疸

茵蔯湯　梔子檗皮湯　犀角散
連翹赤小豆湯　加減瀉黃散
張渙蘆根湯　子芩散　茵蔯湯
三黃散　雙連丹　當歸丸
小半夏湯　茯苓滲濕湯　消食丸

瓜蒂散　秦王丸　疸散
滯飲
張渙溫脾丹　溫胃散　金朱丹
牛蒡丹
大小便不通
神芎丸　錢氏郁李仁丸　犀角丸
惠眼芍藥散　握宣丸
大便不通
聖惠芎黃散

集之九　肺臟部　腎臟部

肺

阿膠散　瀉白散

咳嗽

麻黃湯　三拗湯

五拗湯　百部丸　加減三拗湯

華蓋散　金沸草散　九寶飲

小青龍湯　清肺飲　麥煎散

和解湯　錢氏葶藶丸　人參荊芥散

補銀丸　瀉肺湯　聖惠天門冬散

百部散　黃芩散　解表散

紫朔石膏湯

脾胃

養脾湯　菖蒲煎　木香半夏丹

順肺湯　聖惠陳橘皮散　麥門冬煎

茅先生妳豆膏　注脣膏　蜜瓜膏

生犀散　保肺湯　大麻防風丸

紫蘇子散　馬兜鈴丹　人參半夏丹

貝母湯　潔古黃芪湯　加味四君子湯

張漁蟬殼湯　白朮五味湯　人參平肺散

細辛五味子湯　黃芩半夏生薑湯　甘桔湯

芍藥甘艸湯　烏梅丸　赤石脂禹餘糧湯

麻黃附子細辛湯　茯苓甘草湯　天麻散

天麻圓　琥珀散
惺惺散　外臺四物湯
甘桔散　王氏解肌丸
雞清散　聖惠射干散
蘿蔔子散　蟬蛻散
知母湯　雄黃散
雄黃丹　玉訣貝母丸
惠眼內金丸　腦子散
金杏丸　勻氣散
不灰木散　桑白皮煎

貝母散　貝母湯
喘　張濱雄黃膏
碧玉丸　補肺散　坎離湯
聖惠杏仁煎　八味理中丸　張濱蟬殼湯
聚寶平氣飲　生白丸　枳實湯
半夏丸　大効雄朱化痰定喘丸
天麻定喘飲　紫蘇飲子　蘇葉子甘卿膏湯
一味青龍石膏湯　眞珠散　千金射干湯
梅花飲子　二聖散　定喘飲
馬脾風　牛黃奪命散　無價散

悲哭

錢氏蟬花散　本事龍齒散　乳香丸
木香丸　牛黃膏　青雲散
聖惠犀角散　羚羊角散
柏子仁散　臟躁啼養臟湯　嬰孺黃芪散
魏香散　開胃丸　白朮當歸煎丸
六神散　夜啼花火膏　錢氏當歸丸
張渙萬金散　田氏五味子散　釣藤膏
釣藤飲　聖惠乳頭散　吉氏朱砂膏
安神散　三因燈花散　茅先生抹唇膏

三因蒲黃散　黃土散

瘡

王先生通關散　千金大補心湯　張渙竹瀝膏
救生菖陽湯　醒脾散

鼻

消風散　薄荷湯　張渙辛夷膏
古氏葱涎膏　聖惠龍腦散　張渙清肺膏
張渙菊花散　聖惠菊花散　萬全芎藭散
聖惠木通散　張渙麻子仁散　萬全麥門冬丸
楊氏地黃散

龜胸
聖惠大黃丸　張氏白合丹
龜背
張氏松蔘丹
脫肛
張漁蕪荑丹　妙應散
聚寶象豆丸　紫古五倍子散　錢氏赤石脂散
曾氏蛤龍散　伏龍肝散　澁腸散
勝雪膏　蓖麻膏　苦參湯
肛痒

化蟲丸　雄黃散
腎
地黃丸
解顱頗陷頗塡總論
張漁封頗散
解顱
天南星散　曾氏調元散
嬰孺狗腦丸　小兒鍋頗藥　張漁玉乳丹
王氏封頗散　三字散　參苓散
頗陷

烏附膏　聖惠生乾地黃散
頗塡
行遲
張氏麝香丹　錢氏羚羊角丸　生乾地黃丸
虎骨散　三因五加皮散　柴胡飲
良方左經丸　丁時發續命丹
齒遲
張渙香附丹　湯氏芎黃散
髮遲
張渙菖勝丹　聖惠黑豆膏　香薷煎
髮黃
齒
清胃散　張渙蒿本散　雄黃丸
莊氏麝香散　聖惠蝦蟇散　聚寶黃龍散
耳
張渙通鳴散　聖惠細辛膏　麝香散
菖烏散　張渙紅藍花散　田氏紅玉散
五輭
金靈散　生筋散
湯氏龍黃散　竹茹散

貼頭起項膏　狼毒丸

五鞭

小續命湯

寒熱往來

太陽局小柴胡湯　張漁秦艽湯

人參前胡散　芍藥湯　王氏柴胡人參湯

全生荊芥散　全生備急丸　玉訣真珠丸

嬰孺六味湯　大黃丸　聖惠柴胡散

五味子散　人參散　黃芪丸

張漁香胃散

全生指迷薤薑湯

全生薑桂湯　草果飲　清脾湯　二薑丸　清脾飲子

胡黃連散　張漁桃仁湯　全生鼈甲湯

張漁烏梅丸　全生旋覆花丸　半硫丸

張漁知母丸　桂枝麻黃各半湯　知母麻黃湯

柴胡桂枝湯　白虎加桂湯　十味香薷散

養胃湯　四獸飲　鬼哭散

千金大五補湯　聖惠犀角散　三聖丸

二仙散　祛瘧丸　鼈甲飲子

經効瘧丹　瘧母丸
大腹皮湯　青皮湯
愧病
龍膽湯　聖惠甘草散
張渙虎骨丹　大黃丸
客忤
眞珠散　安神丸
張渙辟邪膏　消癖丸
中惡
薰合香丸　沉香降氣湯　眞珠散
聖惠桃奴散　聖惠鬼哭羽箭散
鬼箭羽湯　聖惠雄黃丸
卒死
鬼持
外臺深師五邪丸
疰病
太乙備急散　尸疰仲景走馬湯　聖惠木香散
犀角散　張渙雌黃丹　立効湯
蠱疰七物柴參丸　聖惠羧羊角散　升麻散
雄黃散　嬰孺雄黃丸　張渙雄麝散

證治通論

金壇王肯堂宇泰甫輯

心主驚 實則叫哭發熱飲水
而搐 虛則臥而悸動不安 肝主風 實則目直
大叫呵欠頭急頸強 虛則前俯後仰 綱目作多欠氣熱則
外生氣溫四肢內生 綱目有風字下皆
困睡身熱飲水 虛則吐瀉 肺主風 實則
煩亂喘促有飲水者有不飲水者 虛則咳氣長出

黃疸 發熱 小便不利 大便秘 黃汗 發熱 小便不利 大便秘 黃疸 發熱 小便不利 大便秘

氣腎主虛無實也惟慈
別虛實證假如肺病又見肝
肝虛不能勝肺故也若曰直大叫哭項急頓悶者
治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新
久虛實虛則補母實則瀉子

肝病

肝病哭叫曰直大頓悶項急病多
叫哭驚悸手足動搖發熱煩
思飲食肺病悶亂嘆氣長出氣短喘急腎
無精光畏明體骨重潔熱飲水
氣上從肺風從肝瀉從脾假令瀉兼嗽又氣上乃脾

肺病也宜瀉白益黃散合若
上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴幽幽者宜服理
中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴熱多者
宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白朮厚朴湯
其他五藏若有兼症皆如此類推之更詳後論四時
推移用藥

肝病秋見一作日晡肝勝肺也肺怯不能勝
肝當補脾治肝益脾者母能令子實也補脾益黃散
治肝瀉青丸主之肺病春見早辰作肺勝肝也肝怯
故受病當補肝腎治肺補肝腎地黃丸治肺瀉白散

主之　肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝輕者
肝病退重者唇白而死　肺病見春金旺肺勝肝也
當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者
當搐海藏云爲肝枯故目淡青色也　心病見冬火旺心勝腎也當
補腎治心輕者心病退重者腎病退重
腎病見夏木勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重
者悸動當搐　脾病見四旁皆倣此治之順者易治
逆者難治脾枯當面目赤黃五藏相反隨證治之
妻右五藏相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法
時論之旨實發前人所未發者也假如肝病見於春
及早晨乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡脯
之位知肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣
此　潔肝勝肺則肝病身熱發搐又見肺虛喘而氣
短病見於申酉戌時是肝氣眞強也內經云受所制而
不能制謂之眞強法當補脾肺而瀉肝導赤散瀉黃
散主之　劉宗厚云此皆五藏相勝病機不離五行
生剋制化之理者蓋小兒初生襁褓未有七情六慾
只是形體脆弱血氣未定藏府精神未完所以有藏
氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往遇是率指
爲外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫錢氏論時

有脫略者而潔古補之今特參附誠無窮之惠也

五藏子母虛實

在前者爲鬼賊微正者不易得而入焉　在前者爲實邪子能令母實拒賊傷於母也子又引母所惡者賊至由母能使使子虛也內經云子能令母實母能令子虛此之謂也　妻來乘夫爲微邪夫來乘妻爲賊邪法當瀉鬼補本藏自病爲正邪當虛血補之實則瀉之內經云滋苗者必固其根伐下者必拔其上逆其根伐其本則敗其眞矣　心主熱自病或大

熱瀉心湯主之實則煩熱黃連瀉心湯主之虛則驚悸生犀散主之　肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之　肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之

脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之　腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之　肺主燥自病則喘嗽燥則潤之實則喘而氣盛瀉白散主之虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之　心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之　肝乘肺微邪惡風眩冒昏憒嗽羌活膏主之　腎乘肺實邪憎寒嗽滿利百部丸主之　脾乘肺虛邪體重吐瘕泄瀉

嗽人參白朮散主之　肝主風自病則風搐拘急肝苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之實則風搐力大瀉青丸主之虛則風搐力小地黃丸主之　心乘肝實邪壯熱而搐利驚丸涼驚丸主之　肺乘肝賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本藏補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之　脾乘肝微邪多睡體重而搐先當定搐瀉青丸主之搐止再見後證則別立法治之　腎乘肝虛邪憎寒呵欠而搐羌活膏主之　脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦脾濕急食苦以燥之實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之　肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之　心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之　肺乘脾實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下導薩丸　腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之　腎主寒自病則足脛寒而逆人之五藏惟腎無實小兒瘡疹變黑陷則是腎實木赶退心火　心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之　肺乘腎虛邪喘嗽皮澁寒百部丸主之　肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中丸主之　脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

凡五藏虛弱是自已正令不行乃鬼賊之所乘害當補本藏之正氣假令肺病臨嗽時於初春見之法當補腎見於夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉木藏又名寒嗽大抵五藏各至本位即氣盛不可更補到所兒位不可更瀉

五藏補瀉法 錢

凡病先虛或已經下有合下者以先實其母後瀉其子也假令肺虛而痰實此可下之證先當益脾後方瀉肺也　瀉青丸又名瀉肝丸　錢氏謂肝無補法故無補肝藥王海藏以四物湯內加防風羌活等分爲細末煉蜜丸名補肝丸　又以瀉青丸去梔子大黃名鎮肝丸治肝虛　導赤散瀉丙小腸　瀉心湯瀉丁心　安神丸治心虛有熱神思恍惚　海藏入物定志丸補心正藥　益黃散又名補脾散海藏云此劑補脾以燥濕東垣云治胃中寒濕嘔吐腹痛瀉利清白之聖藥也　瀉黃散又名瀉脾散海藏云瀉脾熱　阿膠散又名補肺散海藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之類也　瀉白散又名瀉肺散海藏云治肺熱骨蒸自汗用此直瀉之梔子黃芩亦瀉肺當以氣血分之　地黃丸即金匱八味丸去桂附海藏云治腎虛解顱即賊病也

治脉毛而虛　錢氏謂腎無瀉法故無瀉腎藥海藏
瀉腎丸治脉洪而實即前地黃丸熟地改生地去山
茱萸是也此治左手本部脉若右尺洪實以瀉髓丹
瀉之（詳見五藏各門總論）

古稱望而知之謂之神而小兒醫號爲嘻科脉
來駛疾難於指下分明尤以察色爲要故首敘之
夫嬰兒惟察其面部必有五色以知病源人身五體
以頭爲首首中有面面中有睛睛中有神神者目也
光彩是也隱顯橫衝應位而見以應五藏五色者青
黃赤白黑五藏之色心赤肝青脾黃肺白腎黑五藏

所主病證藴於內必形色見於外故小兒有病先觀
其本部形色以論其五行生尅吉凶形色若不相應
然後聽聲切脉

錢氏上證　左顴爲肝（合左手關位肝膽之分
應於風木爲初之氣）右顴爲肺（合右手寸脉肺與大
腸之分應於燥金爲五之氣）額上爲心（合左手寸
口心與小腸之分應於君火爲二之氣）鼻爲脾（合右手關脉脾胃之
分應於濕土爲四之氣）頷爲腎（合左手尺脉腎與膀胱之分應於寒水爲終之氣）

黃者積也白者寒也青黑者痛也隨證治之　永類
鈐方云青色者爲驚積不散欲發風候　紅赤色者
爲熱爲痰積壅盛驚悸煩躁增進　黃色者亦爲熱

爲食積癥傷欲作疳候或作疳癖若神思昏沉其候
潮熱氣麤困倦或嘔噦或瀉痢　白色爲寒爲肺氣
不利大腸滑泄欲作吐利　黑色者爲痛所傳不煩
變證卽爲逆候榮衛失序爲疾危惡　全嬰方云左
頰屬肝東方之位春見微青者平深青者病白色者
絶赤色主身熱拘急肝熱生風青黑色主驚悸腹痛
淺赤色主潮熱夜間發甘中歇唇紅焦燥脉必緊數

右頰屬肺西方之位秋見微白者平深白者
病赤色者絶淺色主潮熱或大便堅而氣麤壅噦青
白色主咳嗽惡心青色主風入肺時時咳嗽青黑色
主驚風欲發或泄瀉盤腸內吊　額上屬心南方之
位火性炎上故居上夏見微赤者平深赤者病黑色
者絶赤色主心經有風熱心躁驚悸睡臥不安青黑
色主心中有邪驚風腹痛手足瘈瘲而啼叫青黑甚
至心腹痛黃色主驚疳骨熱渴皮毛乾燥夜多盜汗
頭髮焦黃　鼻上屬脾中央之位故居中而四季見
微黃者平深黃者病青色者絶赤色主身熱不思乳
食深黃色主小便不通鼻孔乾燥氣麤鼻衂夜間多
哭淡白色主泄瀉食不化青色主吐乳口鼻乾燥大
小便不利　下頦屬腎北方之位水性潤下故居下

冬見微黑者平深黑者病黃色者絶赤色主勝胱與腎爲表裏有熱則水道不利故小便癃閉永類鈐方肝部所主睛中瞳人內藏其神外究五輪眶睘屬脾熱卽生瘡兩眥總心熱痛如鍼白屬肺家熱赤生砂黃屬肝藏昏瞀翳障中心瞳人腎熱不明眼忽昨寫發風發驚心部所主顏面臉類皆屬心位黑卽沉困青卽驚悸赤心發風白卽泄氣虛黃衛積浮腫氣逆心絶何因大叫數聲過關不叫必作瘧癇加熱驚讝散熱清心脾部所主唇口見病人中承漿四圍上下合口脾鄉開口屬心心脾有熱唇裂舌卷三焦積熱唇紅如血深紅重鴉口慕口木舌重舌脾肺熱就口內噴臭脾腎氣寒色如死卽大驚一嚇口乾唇白常時積驚漸必傳心心氣不足令兒煩哭何知脾絶指甲皆黑目無神光定難用藥五種撮口驚風更惡不治証　肺部所主鼻準兩孔并連山根大小二竅肺部所主鼻孔黑煤卽肺經焦黑煤如墨肺經卽絶鼻中赤瘡疳盛蛔長或瀉白涎腦寒困寐或流清涕傷風喜睡肺熱鼻塞因息吹得或感風寒亦閉關隔鼻爛卽疳臭積熱　腎部所主耳穴之前名曰耳花耳孩名輪輪裏名廓輪廓焦黑腎家虛熱

其黑如炭腎絶死旦耳門生瘡衛積并常耳中膿出腎熱病極臭名聤耳膿汁不止瘡癢如烈其候虛熱忽聽不聰心腎氣壅常作閉閉熱氣上攻或如蟲刮榮虛衛熱耳輪如炙（史看耳後有紅絲）麻痘相侵耳輪紅熱傷寒是則熱極內痛腫氣相攻清心凉膈關竅通塞兒孩兩腎常虛無病切莫攻擊補更無益（潔肝病）

面白　肺病面青　腎病面黃　心病面黑　若肝病驚搐而又加面白痰涎喘急之類此皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風熱也宜用羌活防風或瀉青丸或瀉青丸導赤散下之立夏後熱也宜用三黃丸導赤散瀉合而服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用地黃丸主之謂腎不受瀉也

（醫書主驚積不散欲發風候紅主痰積驚悸黃者食積癥傷欲作疳癖白主泄瀉水穀更欲作吐黑主臟腑欲絶）　印堂青主初患驚瀉紅主大驚夜啼黑主客忤　山根青主二次驚瀉後發躁黑黃甚者死　年壽平階主天青主發熱生驚黑主利死紅主臊死微黃曰平黃甚曰霍亂　承漿青主食時被驚

黃主吐逆亦主血利黑主驚風　面眼黑睛黃主有
熱白睛青主食積疳痾白睛黃主食積疳痾白睛青主驚風黑睛黃主傷
寒　眉上青吉忽紅主煩躁夜啼黃主霍亂久病紅
者死　風氣一池青主風候紫主吐逆或發熱黃主
吐逆赤主煩躁夜啼　兩太
陽青主一次受驚青自太陽入耳者死紅主血淋
兩臉青主客忤黃主痰溢赤主風熱　兩頰赤主傷
寒兩頤青主吐蟲　兩金匱青主第三次驚風黑逆
口二日死青連目入耳七日死　兩風門紅主風熱
黑主疝青主水驚黑從眉入耳即日死唇黑不食者
死　面青眼青爲病面白赤心病面白肺病面黃脾病
面黑腎病　額間赤色主心經有熱煩躁驚悸若飲
水或叫哭屬本經實熱用瀉心散以清心火微赤困
臥驚悸熱渴飲湯屬虛熱用秘旨安神丸以生心血
青黑主驚風腹痛或瘛瘲啼叫用五味異功散加木
香柴胡釣藤鉤補脾肝青黑主心痛作痛此寒水乘
心用益黃散微黃主驚疳用安神丸　左臉青或兼
赤主肝經風熱項強頓悶目劄瘛瘲用柴胡清肝散
色微赤倏熱咬牙屬虛熱用地黃丸青黑主肝尅脾
而驚搐腹痛用六君子加薑桂微赤主潮熱血虛心

瘈先用秘旨安神丸次用地黃圓　右臉赤主風邪氣鬱咳嗽發熱飲水爲實熱用瀉白散若哽氣出氣唇白氣短屬虛熱用五味異功散若脾熱所傷用清胃散心火所刑用人參平肺散淡赤主潮熱心躁或大便堅秘用宣明柴胡飲子以疎導如潮熱未止更用鉤藤飲以清肝色青白主咳嗽惡心先用惺惺散解表邪健脾土更以六君子湯調補中氣色青黑主驚風腹痛盤腸內鈎用六君鉤藤鉤平肝補脾　鼻微黃爲平赤主脾胃實熱身熱飲水乳食如常用瀉黃散清熱理脾微赤主脾經虛熱身涼飲湯乳食少思用五味異功散補中健脾色深黃主小便不通鼻中乾燥氣麤衄血乃脾熱傳於肺腎先用瘥生犀角地黃湯後用地黃丸色淡白乃脾虛泄瀉乳食不化用六君子湯調補中氣青色主脾土虛寒肝木所勝用五味異功散加木香炮薑温中平肝黑爲死候顏間色赤主腎與膀胱氣滯熱結而小便不通用五苓散以分利鼻準微黃兼右腮微赤乃脾肺燥熱不能化生腎水用黃芩清肺飲脇胱陰虛陽無所生用滋腎丸若顏間微赤乃脇胱陽虛陰無所化用六味地黃丸若小腹脹滿或陰囊腫脹屬陰虛濕熱壅滯

用六味丸加車前牛膝脾肺氣虛不能通調水道者
亦用前藥其小便赤色久而尿血亦屬肝腎氣虛有
熱用六味地黃丸如不應則用補中益氣湯益脾肺
生肝腎若小便後出白津或莖中作痛屬肝經濕熱
先用龍膽瀉肝湯後用六味地黃丸 印堂青黑主
腹痛夜啼此脾氣虛寒也脾爲至陰故夜間腹痛而
啼用釣藤飲色淡白主泄瀉乳食不化屬脾氣虛弱
用五味異功散加木香 人中黃主傷乳胃逆青主
下利乳食不化噯氣酸腐此脾虛停滯先用大安丸
消食後用異功 散健脾 黑主蛔蟲咬痛 唇色白主

吐涎嘔逆 吐血便血乃脾氣虛弱不能攝涎統血
歸源急用六君子湯色赤乾燥而皺者主脾經熱渴
大便不通煩熱不寐先以清胃散治其熱次以四君
黃連山梔調其脾黃主食積泄瀉乳食不化以六君
子湯健脾色赤兼白主血乃脾肺虛熱不能攝血
歸源用聖濟犀角地黃湯清熱補血用四君子湯以
補脾氣如久不應用參門冬散或人參安胃散 口
畔色黃主脾經積熱用清胃散次病用四味肥兒丸
以治疳熱唇口抽動主驚熱不安用異功散加山梔
釣藤鉤補脾平肝若口流涎唇色紫乃脾氣虛寒用

異功散加炮薑木香若腹中痛口吐涎乃蟲作痛先
用蕪荑散後用調中丸不吐涎是積痛也用異功散
手足厥冷用理中湯加烏梅溫補中氣而痛自止或
吐後或大便去後而痛止者先用下積丸後用異功
散　白主失血死青主驚風死黑色繞口者不治耳
後微赤此少陽經風熱用柴胡飲子清肝生血微黃
主睡中驚悸咬牙用四君子加芎歸升麻以調理脾
氣　耳乾燥主腎病蒸熱作渴盜汗用地黃丸若小
便後出白津或玉莖瘡痛屬肝經濕熱先用龍膽瀉
肝湯後用地黃丸若禀賦腎氣不足或早近女色致
小便澀滯或作痛如淋者急用地黃丸補中益氣湯
滋其化源或大小便去後穀道窄扁者其虛尤甚用
前丸加牛膝車前肉桂如手足逆冷或畏寒少食陽
氣虛寒也急加附子多可得生大抵多因禀賦脏氣
不平或乳食寒暑失節或姙娠乳母飲食起居六淫
七情所致若初病元氣無虧乳食如常發熱壯熱二
便秘結作渴飲水睡不露睛者悉屬形病俱實當治
邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄
瀉肢體畏寒而露睛者悉屬形病俱虛當補正氣更
宜審胎氣之虛實臟腑之相勝而治之庶無悞矣

錢曰內證赤者心熱導赤散主之淡紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之淡淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸主之如見高目浮腫主久咳嗽乃脾受邪積也

凡小兒唇白主吐涎嘔逆吐血便血唇紅渴飲煩躁如久瀉瀉唇紅者是虛證也不可用涼藥唇黃主脾受積後發腫唇口紫及吐涎者主蟲痛不吐涎者是積痛唇口四畔黃如橘主口臭乃脾之積熱也唇青主血虛脾寒為疼所苦唇蓋唇生脾土木來剋土知脾弱不能食也

凡小兒舌乾舌白舌燥舌胎舌黃舌赤腫皆主大便不通或通利必色焦黃如舌裂舌上芒刺舌上出血皆熱極傷毒也舌上生瘡心脾有熱舌捲主驚久患瀉利舌黑必澗不可認為熱蓋久病上焦虛熱故也久瀉痢舌黑者必死

重實聲重實雄聲體熱為三焦氣壅在心脾傷風咳欬嗽咽痛結澼腸中糞出遲悲焦聲聲悲焦有燥恐怖欲生風重濁聲沉靜痃疾必耳聾

啼哭聲但哭無啼只是驚多啼不哭痛分明聲輕顫
嗄風癇病速緩聲頻吐瀉成
噫煎聲噫煎煩躁病難安燥促聲音爲感寒語短氣
微尿主澁長遲聲細痢多般
遲緩聲語短聲遲緩腸鳴泄瀉頻嗄聲多不響風熱

肺家因

脈法候兒脈當以大指按三部一息六七至爲平和
八九至爲疾熱五至爲內寒脈弦爲風癇沉緩爲傷
食促急爲虛驚弦急爲氣不和沉細爲冷浮爲風大
小不勻爲惡候爲鬼祟浮大數爲風爲熱伏結爲物

聚單細爲疳勞凡腹痛多喘嘔而脈洪者爲有蟲沉
而遲潮熱者胃寒也温之則愈訣曰小兒脈緊風癇
候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促驚神
不守冷則沉細風則浮牢實大使應秘久腹痛之候
緊而弦脈亂不治安可救緩蒸之時脈必亂不治自
然無過緩單細疳勞洪有蟲大小不勻爲惡候脈沉
而遲有潮熱此必胃寒內冦瀉利脈大不可醫仔
細酌量宜審究雲岐子云未及五歲不可視驗者未
遲數被錢氏論又別脈五歲已上九歲已下此脈別浮沉
不拘五歲上下也

脈應雜病

諸數脉　爲熱屬府
諸遲脉　爲冷屬臟
陽數脉　主吐逆不吐必發熱
陰微脉　主泄瀉不瀉必盜汗
沉數脉　寒熱寒多熱少亦主骨蒸熱
緊數脉　寒熱熱多寒少又主骨熱急則驚癎
沉緊脉　心腹痛短數同亦主咳嗽
沉細脉　乳食不化亦主腹痛下痢
沉伏脉　爲積聚亦主霍亂
微緩脉　乳不化泄瀉沉緩亦同

微澁脉　痺痙筋攣
微急脉　寒熱唾血
浮滑脉　宿食不消亦主咳嗽
浮緊脉　疳氣耳聾
浮弦脉　頭疼身熱
緊滑脉　吐血惡
心脉急數　驚癎不驚者疳淋
肝脉急甚　顛癎風癎癎痰涎流液
肺脉浮實　鼻塞幷大小便不通
關脉緊滑　主蛔蟲尺脉沉亦主蛔

尺脈微細 溏泄冷痢乳食不化
尺脈微澀 便血無血者必盜汗
脈過寸口入魚際 主遺尿
審脈逆順
驚搐脈 浮數順沉細逆身温順肢冷逆
夜啼脈 微小順洪大逆身冷逆
心腹痛 沉細順浮大逆身温順肢冷逆
傷寒脈 洪弦順沉細逆浮大順微伏逆
汗後脈 沉細順洪緊逆困睡順狂躁逆
溫病脈 洪大順沉細逆身熱順腹痛逆

咳嗽脈 滑浮順沉細逆身温順肢冷逆
霍亂脈 浮洪順遲微逆身温順肢冷逆
吐哯脈 浮大順沉細逆身温順肢冷逆
泄瀉脈 緩小順浮大逆身温順肢冷逆
諸痢脈 沉細順浮大逆身温順肢冷逆
諸渴脈 洪數順微細逆身温順肢冷逆
諸腫脈 浮大順沉細逆臟實順腸泄逆
腹脹脈 浮大順虛小逆臟實順泄瀉逆
痰喘脈 滑大順沉細逆身温順肢冷逆
寒熱脈 緊數順沉細逆倦怠順強直逆

疳勞脉　緊數順沉細逆臟實順脾泄逆
蟲痛脉　緊滑順浮大逆身温唇青逆
諸失血　沉細順浮數逆身温順發熱逆
中惡腹脹　緊細順浮大逆身熱順身冷逆
黃疸脉　浮大順沉細逆腹寬順泄瀉逆
火癇脉　浮洪順沉細逆身熱順身冷逆

錢仲陽云小兒之脉氣不和則弦急傷食則沉緩虛驚則促急風則浮冷則沉細脉亂者不治水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部分既別逆順難明若憑寸口之浮沉必乃横亡於孩子須明虎口辨別三關消詳用藥始無差誤未至三歲看虎口食指第一節名風關脉初見易治第二節名氣關脉見病深難治第三節名命關脉見死不治三關青是四足驚黑是人驚紫色瀉利黃色雷驚三關通度是極驚之症必死或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾必發驚熱左右一樣者是驚與積齊發有三條或散是肺生風痰或似斛斛聲有赤是傷寒及嗽如紅火是瀉紅黑相兼主下痢青多白痢紅多赤痢紫色相兼加瀉虎口脉紋亂主胃氣不和青黑驚與積青黑發慢驚脉入掌乃內

約指紋曲裏風盛彎外食積此論三歲以上之法
若三歲以下更用一指按高骨乃分三關定其息數
呼吸八至爲平脉九至不安十至危困浮主風沉遲
主虛冷實主有熱緊主癪癎洪主熱盛沉緩主虛瀉
微遲有積有蟲遲澁主胃脘不和沉主乳食難化沉
細主乳食停滯緊弦主腹中熱痛牢實主大便秘沉
而數者骨中有熱弦長是肝膈有風緊數乃驚風爲
患四肢掣顫浮洪乃胃口有熱沉緊主腹痛有寒虛
濡者有氣又主慢驚乳主大便利血　四歲以下共
一指叅轉尋三部以關爲準七八歲移指少許九歲
叅第依三關部位尋取十一十二歲亦同十四十五
歲依大方脉部位脁視　凡看脉先定浮沉遲數陰
陽冷熱沉遲爲陰浮數爲陽更兼看部位青主驚風
白主虛瀉赤主淡熱黑色病甚黃主脾疳以此相參
察病治療庶無誤矣　全幼心鑑云小兒半歲之際
有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指曲按
之兒頭在左舉右手在右舉左手食指爲上中指爲
中名指爲下三指俱熱主感風邪鼻塞氣麤發熱咳
嗽若三指俱冷主外感風寒內傷飲食發熱吐瀉若
食中二指熱主上熱下冷名中一指熱主夾驚之疾

食指熟主胸滿食滯又當參辨脉形主之　流珠形主胃虛停食胸膈脹滿煩渴發熱用五味異功散加山查枳實健脾消食後用六君子湯調養中氣　長珠形主脾傷飲食積滯肚腹作痛寒熱不食先用大安丸消其積滯次以異功散健其脾氣　來蛇形主脾胃濕熱中悗不利乾嘔不食此痰邪內作先用四味肥兒丸治痰後用四君子湯補脾　去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短喘急不食困睡先用六君子湯加枳實健脾消積次以七味白术散調補胃氣　弓反形主感冒寒邪哽氣出氣驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳嗽吐涎先用惺惺散助胃氣祛外邪後以五味異功散加茯苓當歸養心血助胃氣若外邪既解而驚悸指冷脾氣受傷也宜用七味白术散補之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治脾虛甚故也　弓反形主痰熱心神忧惚夾驚夾食風痫痰盛先以天麻防風丸祛外邪又用五味異功散調中氣　鎗形主風熱生痰發搐先用抱龍丸如未應用牛黃清心丸若傳於脾肺或過用

風痰之藥而見一切諸症皆專調補脾胃　魚骨形
主驚痰發熱先用抱龍丸治之如未應屬肝火實熱
少用抑青丸以清肝瞿隨用六味丸以補肝或發熱少
食或痰盛發搐及肝木
補脾土以制肝木　水字形主驚風食積胸膈煩躁
頓悶少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虛弱飲食
積滯而木尅土也先
鈎藤鉤補中清肝若已服消食化痰等劑而病不愈
者用四君升麻柴胡鈎藤鉤升補脾氣平制肝木
鍼形主心肝熱極生風驚悸頓悶困倦不食痰盛搐

搦先用抱龍丸祛風化痰次用六君子加鈎藤鉤牛
肝實肺　透關射指形主驚風痰熱聚於胸膈乃脾
肺虧損痰邪乘聚先用牛黃清心丸清脾肺化痰涎
次用六君子湯加桔梗山藥補脾土益肺金　透關
射甲形主驚風肝木尅制脾土之敗症急用六君木
香鈎藤鉤官桂温補脾土未應即加附子以回陽氣
多得生者嘗聞古人云小兒爲芽兒如草之芽水之
源蓋因臟腑脆嫩口不能言最難投劑當自察面色
而知其所屬次驗虎口以辨其所因實爲治法之簡
要也

虎口三關脉紋

十三指形

流珠形



長珠形



環珠形



去蛇形



來蛇形



云反外形



弓反裏形



魚骨形



鎗形



鉞形



水字形



透關射甲形



透關射指形



流珠只一點紅色環珠差大長珠圓長已上非謂圈子總皆紅脉貫氣之如此來蛇即是長珠鼓一頭大一頭尖去蛇亦如此分上下朝故曰來去角弓反張向裏爲順向外爲逆鎗形直上魚骨分開水字即三脉竝行鍼形即過關一二粒米許射甲命脉向外透指命脉曲裏雖然余常治之亦有不專執其形脉而投劑者蓋但有是症即服是藥而亦多驗

死證 凡小兒頤腫頤陷汗出不流如珠如油舒舌出口舌腫發驚瀉黑黯血髮直如麻皮膚無血色此心絶也竝壬癸日死　病重痊哭無淚及病不哭下淚爪甲青黑眼深如陷舌捲囊縮發搐目斜連唇口動手如抱頭之狀或脚面直素問云其華在爪其充在筋肝絶也竝庚辛日死　人中滿人中黑唇縮反張唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒血腫尿血舌縮或捲鼻孔開張齒禁冷涎如油噉口如囊高如土色四肢逆冷如濕石之狀吃乳不收瀉糞赤黑脾絶也竝甲乙日死　有熱嚥湯水并藥食喉中鳴是胃脫直不能蔭肺此證醫書少有蓋累曾試之有驗竝死不治目直青鮮氣喘不回吃食噎噦痰涎塞口喉中鳴響鼻塞不通鼻乾黑燥肺脹胃膈頭汗四肢冷此肺絶

也並丙丁日死　面黑神昏眼黑眼腫目無光彩耳輪青黃焦枯疳牙齒落髮疎黃燥皮膚黑燥驚風咬乳戞齒洩屁黑色逆口此腎絶也並戊己日死

小兒死證十五候　眼上赤脉下貫瞳人顏門腫起兼及作坑鼻乾黑燥肚大青筋目多直視視不轉睛指甲黑色忽作鴟聲虛舌出口齧齒咬人魚口氣急啼不作聲蚘蟲既出必是死形用藥速救十無一生

小兒病困汗出如珠著身不流者死　小兒病其頭髮皆上逆者必死　小兒病而顧陷其口脣乾目皮反口中氣出冷手足四垂其臥如縛掌中冷皆不

治　小兒中風熱喘鳴肩息脉緩則生急則死

兒痢疾脉浮大而腹痛者必死　乳子病熱脉懸小手足溫則生寒則死

千金論云小兒用父故絮著衣女用母故衣勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡癤癰皆自此始　巢氏云兒始生肌膚未成不可煖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易傷損　嬰兒若常藏在幃幙之內重衣溫煖譬如陰地草木不見風日軟脆不任風寒　嬰兒皆當以故絮著衣不與用新綿也天氣和煖無風之時令母將

抱日中嬉戲數見風日則令血凝氣剛肌肉硬密堪
耐風寒不致疾病　嬰兒又當習薄衣之法當從秋
習之不可以春夏卒減其衣則令中風寒　嬰兒
冬月但當著夾衣及衲衣之類極寒卽漸加以舊綿
人家多愛子乃以綿衣過厚適所以爲害也　嬰兒
又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜
寤寐皆當戒之　初生兒出月必須入襁褓襁褓之
道必須得宜如春夏之月乃萬物生長之時宜教令
地卽使之不逆生長之氣如秋冬之月乃萬物收藏
之時宜就温煖之處使之不逆收藏之氣然後血凝
氣和則百病無自而入矣　丹溪曰人生十六歲已
前血氣俱盛如日方升如月將圓惟陰常不足養之
之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳
裳下體之服帛温煖甚於布者也裘皮服温軟甚於
帛者也蓋下體主陰得寒凉則陰易長得温煖則陰
暗消是以下體不與綿絹夾厚温煖之服恐妨陰氣
實爲確論

湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者妳也哺者食
也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯
弱乳食相併難以尅化周歲以上必成乳癖食癖於

腹中作疼作熱宿病從此起也　丹溪曰血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄者稠粘乾硬酸醎甜辣一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絶只與熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生栗味醎乾柿性涼可爲長陰之助然栗太補柿太澁俱爲難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病治至成人筋骨柔弱有食則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不愼歟至於乳母尤宜謹節飲食下咽乳汁便通情欲中動乳脉便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瀉則熱或爲口瘡或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也　乳兒法　凡乳母血氣爲乳汁也五情善惡悉血氣所生宜戒喜怒一切禁忌不用狐臭癆瘵癩病者及身體疥癬頭瘡髮少緊唇耳聾音啞鼈鼻瘺病等方可乳兒　夏中盛熱時乳母浴後或兒啼不可與妳能使兒成胃毒秋成赤白痢浴後可令定息良久熱燥乳之故無患也　聶氏曰盛啼不可食乳

恐氣逆不順聚而爲嘔亦能成驚風也　千金論曰凡乳兒不可過飽飽則滯溢而成嘔吐若乳來多猛取出授後再乳切須乳時合先令捏去宿熟乳然後乳之如乳母欲臥寐當以臂枕之令乳與兒頭平母欲睡著時即奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒卧於側或驚起不可乳兒盖氣亂未定必能殺兒也　巢氏云小兒啼未定氣息不調母不可以乳飲盖恐乳不得下停滯胸膈則爲嘔吐也　顱顖經曰夏不去熱乳令兒嘔吐冬不去寒乳令兒泄瀉復痢尤不可不謹　夜間乳兒母起身坐抱兒餧之毋侵早欲飲乳皆須捏去宿乳　乳汁勿投於地蟲蟻食之令乳無汁可沃柬壁上住　乳令兒病證喜乳涎喘生驚　孫兆云令兒十氣顛狂亦令兒生痰喘急或生驚　悠乳疝氣腹脹　千金翼云悠乳氣痛鵕云女子則腹脹　史記華佗論云乳氣寒虛冷故令而啼　千金翼云令兒咳嗽　熱乳面黃不食　千金翼云令兒嘔吐張氏云熱乳傷損肺氣令兒龜胷　氣乳吐瀉腹脹　黃鑪云令兒面黃瘦骨蒸盜汗咳煎夜哭夜啼又病乳則發虛羸及生諸病　寒乳妳片不化　史記華佗云令兒生痰延涎維生驚　賢鑪云令兒面黃白乳哺減少腹急而瀉胷背皆如積塊　醉乳恍惚多驚　淫乳必發驚癎

寶鑑云乳母淫佚情亂乳兒令吐瀉身熱啼叫如驚不治　已上乳急欲乳兒能生諸病不可不忌也凡喜怒氣亂未定乳兒則成吐瀉腹痛疳黃不食寒熱雜積不散乳兒則成痰癖涎嗽肺脹嘔胃酔淫喘乳多發驚癎聖惠方云酔淫喘乳者夏不欲熱熱則致吐逆冬不欲寒寒則致下痢母不欲怒怒則令上氣顛狂母不欲酔酔則令身熱腹滿母力吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則變黃不能食新方而乳則瘦悴交脛不能行大抵乳食不便則生疾病　哺兒法附後云兒初生三日應開腹助穀神碎米濃作飲如酪與兒大豆許數令嚥之頻與三豆許二七日可哺

千金云兒哺早不勝穀氣令頭面體生瘡愈而復發又胝弱難養三十日後雖哺勿多不嗜食強與之不消復生病哺乳不進腹有痰癖四物紫丸微下之節哺數日自愈　寶鑑云兒五十日可哺如棗核百日彈丸早晚二哺莫抱檐下澡浴當風觧衣哭未斷而乳冒冷而哺又不可在親諸色物器並不可觸犯之若子如驚癎經云三歲已滿勿食雞肉子腹生蟲　錢乙云兒多因愛惜過當三兩歲猶未飲食致脾胃虛弱平生多病半年

後宜煎陳米稀粥粥面時時與之十月後漸與稠粥
爛飲以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物
等外臺崔氏初哺兒法以平定戌日丑寅辰巳酉
日大吉 男忌戊巳日女忌丙丁日 斷乳法小兒
年至四五歲當斷乳而不肯斷者宜用畫眉膏斷乳
之道方可漸與肉食則無疳癖之患

畫眉膏

山梔 叁箇燒存性 雄黃 少許 朱砂 少許

右爲極細末入生麻油輕粉各少許調勻候兒睡
著濃抹於兩眉上醒來便不食乳未効再用加黃

丹壹錢

萬全論田婦護兒絕無他疾警之草木生於深山大澤容易合抱至於異果奇材縱加培養間有不秀實者豈貴賤異哉兒數見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒以田舍兒較之相似大凡小兒過煖生熟熟極生風提抱生癮餵飼生癖最宜愼之 張渙曰乳母須每日三時摸兒項後風池若壯熟者即須熨之使微汗即瘉 諺云戒養小兒謹護風池風池在頸項筋兩轅之邊有病乃治之疾微切不可妄鍼灸亦不用輒吐下所以然者鍼灸

傷兒經絡吐下傷動臟腑故也　嬰兒暑中常令在稍凉處乳母勿禁新水卽不宜多　嬰兒春夏間有疾不可亂有動下使下焦虛上焦熱變成大病矣　嬰兒須看稟受南北之殊蓋地土寒温不同故也　嬰兒生後兩滿月卽目瞳子成能笑識人乳母不得令生人抱之及不令見非常之物　嬰兒百晬任脈生能反復乳母當有節喜怒適其寒温　嬰兒半晬尻骨已成乳母當教兒學坐　嬰兒二百日外掌骨成乳母教兒地上匍匐　嬰兒三百日臗骨成乳母教兒獨立　嬰兒周晬膝骨已成乳母教兒行步

上件並是定法蓋世之人不能如法存節徃徃抱兒過時損傷筋骨切宜戒之爲吉　羅謙甫曰一小兒五月間因食傷冷粉腹中作痛遂於市藥舖中贖得神芎丸服之臍腹漸加冷痛疼時發時止踰七八年不已因思古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其繩墨而更其道也據所傷之物寒也所攻之藥亦寒也重寒傷胃其爲冷痛可知矣凡人之脾胃喜温而惡冷況小兒血氣尚弱不任其寒故陽氣潛伏寒毒留連久而不除也治病必先甘本當用和中養氣之藥以救前失服之月餘方愈嗚呼康子饋藥孔子拜

而受之以未達不敢嘗此保生之重者也奈何常人拱默而令切脉以謂能知病否且脉者人之血氣附行經絡之間熱勝則脉疾寒勝則脉遲實則有力虛則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可不審其病源而已家亦不可不說其病源且此子之父不以病源告醫而求藥於市舖中發藥者亦不審病源而以藥付之以致七八年之病皆昧此理也孫眞人云未診先問最爲有準東坡二公只圖愈疾不欲困醫二公之語其有功於世大矣

初生門

初生

孩小兒在胎稟陰陽五行之氣以生臟腑百骸藉胎液以滋養受氣既足自然生育分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因發爲瘡疹須急於未啼時用軟帛裹指宅去其血用黃連豆豉硃蜜甘草解之後雖出痘亦輕矣有嚥入即時腹

脹嘔吐短氣不乳者用秘苓丸治之但黃連性寒若稟母氣膏粱積熱者宜服若滋味淡薄胎氣元弱者又不宜用其硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若只以牛黃分許蜜調與吮爲佳世多用犀角解毒丸其胎氣虛寒虛弱者反傷脾胃生氣甚致不育又有嬰兒因其難產或冒風寒而垂危者切不可便灸臍帶急烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用大紙捻於臍帶上往來燎之使暖煖氣入腹須臾氣復自甦九戒洗浴恐腠理不密元氣發泄而外邪乘之也

其四法 嬰兒新產出胎急以綿裹指揩拭兒口中古

上惡血穢露謂之玉衡若啼聲一發即入腹成百病又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉速以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活若舌下血出多者以燒亂髮灰同豬脂少許和塗之聖惠云看齒根有黃筋兩條以葦刀割斷點豬乳催如兒口無開先點豬乳兒上下唇與齒齦連處皆有一筋牽引若上唇筋緊即生上痓下唇筋緊即生下痓生後滿頭或右間如癬狀瘡瘍不已復流黃汁至處生瘡上來起腰背漸至四肢患亦如上若疾甚不治或頭面上下相連累年不輕又天折或成大病是唯勿日早辰拭口佳

浴法 兒生三日以桑槐榆桃柳各取嫩枝三寸長者二三十節煎湯看冷熱入豬膽汁二三枚浴之浴湯用豬膽蓋毋草不生瘡疥用金銀虎頭骨麝丹砂辟惡氣客忤驚搐用桃梅李楮根葉煎湯燒温壯之病須浴時煮湯須不冷不熱於無風密室浴之或以光粉蚌粉撲身避邪勿令久 浴訖以粉摩之 吉 紀用經浴法寅卯酉日吉壬午丁未癸巳凶不能生三日勿犯下三日五日七日浴ス 小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕瘡臍可免臍風瘡等證用清油調髮灰傅臍洗兒不可用水打濕臍

斷臍法 千金云臍不得以刀割隔單衣咬斷以煖氣呵七遍即纏結所留帶致兒足趺上斷訖連臍帶中多有蟲急剔撥去不爾入臍成疾臍當長六寸長則傷肌短則傷臟不以時斷及接汁不盡暖氣漸微即生寒令兒臍風 寶鑑論斷臍者用剪刀先於懷中令煖又水入臍多天釣痛苦啼叫面青黑臍傷動令久不乾傷外風即口噤不可救

炙臍法 聖惠云兒生一宿抱近明無風處看臍上有赤脉直上者即於脉盡頭灸二壯赤散無患矣

裹臍法千金論治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之裹臍調其緩急急則吐哭二十日乃解若十許日怒啼必衣中有刺或臍燥刺腹當更裹臍冬時須閉戶下帳然火令温煖換衣亦然仍以温粉粉之

服藥下胎毒法心鑑曰古方書言兒始生落草服汞粉朱砂白蜜黃連欲下胎毒今人率承用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之藥若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助養脾氣消化乳食然古人之法終不可湮沒今人用之而効者多或不至如心鑑所云者今次第列於左方

一日纔斷臍衲包訖看兒形色若面紅潤色赤啼聲響快若宜用汞粉法良久有臍糞便下爲佳次用甘草法次用朱蜜法臨時更看形色若面色多青白啼聲不響即不須服次用牛黃法

古方又有黃連法非法熟怯壯擇所宜而用之爾

甘草法用好原州甘草中指一節許拍碎以水二蜆殼煎一蜆殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁爲佳

若服一蜆殼不吐卽更服不問嬰兒虛實寒熱皆須服之（肘後方吐後更與兩服吐止須盡壹合）薛氏預以甘草細切少許臨產時以綿裹沸湯盞內覆溫收生之際以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口次用黃連法朱砂法

黃連法集驗方初生兒惡汁留胸臆壅塞易生蘊熱驚癎瘡癤用好肥黃連數塊搥碎綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁拈摩一二點兒口中惡汁自下乳食便美未盡用空綿別浸黃連後以朱蜜間與之（海藏）方淨黃連壹錢水壹盞預先煎下待兒生未出聲時便用灌下以去（腹中惡物臍帶不下解胎中蘊積熱毒）

終身不生瘡又去臍風等病

韭汁法本草云兒初生與韭根汁灌之卽吐出惡水聖惠方甘草後煖水浸韭子汁塗兒唇上乾又塗數次止不令入口

朱蜜法好朱砂一大豆許細研水飛煉赤蜜一蜆殼看稀稠和成膏每用一豆大乳汁化下時時滿口中三日內止三粒臨時更看形色若高色多青白啼聲不響卽不須服

牛黃法千金方朱蜜竟與牛黃不獨益肝膽除熱定精神止驚悸惡氣又除百病（張渙法眞牛黃一塊

好蜜煉熟和成膏每服一豆大乳汁化時時滴口中形色不實者不宜多服若嬰兒胎熱或身體黃色宜多服之

末粉法 張渙方兒紅潤色赤啼聲響快者用末粉半錢旋旋令兒吮之良久有臍糞便下爲佳 寶鑑銀粉抹口舌上下左右兩頰然後飼朱蜜

豬乳法 嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳滴口中佳 豬兒飲母次便提後脚離乳急捋之即得

臍帶法 用本兒落下臍帶兎上焙燥爲末入辰砂黃連甘草各末五分和勻蜜拌做三五次塗乳母乳上

俟兒吞之必使一口夜吞盡次日惡毒皆從大便而出日後不但瘡疹稀疎竟有不出瘡者俟臍帶落下即便製服在六七日之間爲效其辰砂必須研極細末以甘草湯飛過任服無害此方一以解毒一以補養蓋臍帶乃有生初之河車也繫於吐之命門兩腎之所生乃以腎補腎腎既充足即不受邪故無他日變黑歸腎之證亦無顖門不合之疾生一兒即得兒眞保生第一良法

藏衣法 即胞衣 崔氏云兒衣清水洗勿令沙土草污又清酒洗之仍內錢一文在衣中盛新瓶內青綿裹瓶

口容蓋置便宜處三日後依月吉地向陽高燥處入
地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸須牢築令兒長壽
智慧若不謹爲豬狗食令顛狂蟲蟻食令病惡瘡大
鳥食令兵死近社廟令見鬼近深水汙池令溺死近
故竈令驚惕近井灶令聾盲葉道路街巷令絶嗣當
門戶令聲不出耳聾著泳流下令盲盲葉火裏令生
爛瘡著林木頭令自絞死此忌須愼 每於天德月
空處埋之 正月天德在丁巳月空在壬丙壬餘計宜本曆日 若遇反支宜在宅
外福德上向陽高燥處待過月然後依法埋藏吉
甲乙日生丙丁日藏丙丁日生戊己日藏戊己日生
庚辛日藏庚辛日生壬癸日藏吉

剃頭法集驗方云小兒初剃頭俱不擇日皆於滿月
日剃之蓋風俗所尚前產婦未得出房於滿月自與
兒俱出謂胎髮穢惡有觸神竈令小兒不安故於此
日必剃頭而出凡剃頭就温煖避風處仍剃後須以
杏仁叁枚去皮尖研碎入清荷叁葉再同研却入生
麻油叁肆滴臙粉拌和頭上擦以避風邪免生瘡疥
熱盡其後小兒亦宜此法

附方

海百壽散小兒初生未滿月已裏用之者老無瘡疥

黃連 壹兩　硃砂 壹錢

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍身揉妙

顱顖兒初生日與平和飲子 指迷兒生三日後服

人參　茯苓　甘草

升麻 各貳錢伍分

水二盞煎一合半時時與之乳母忌油膩滿月及百晬加時冷加白朮熟加硝各半錢

生下胎疾 月內不測諸病

總論千金論曰芽兒出胎墮骨肉未斂肌肉未成猶尚是血血凝則堅而成肌肉也又云如冰上之泡卑頭之露天初生一臘之內天地八風之邪豈能速害良由在胎之時母失愛護或勞動氣血相干或坐卧饑飽相役飲酒食肉冷熱相制恐怖驚撲血脉相亂蘊毒於內損傷胎氣故降生之後有胎熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黃諸證生焉外因浴洗拭白斷臍灸顖之不得法或綳抱驚恐乳哺寒溫之乖其宜致冷噤口

国立公文書館
National Archives of Japan

臍風鎖肚不乳等證病患致此亦難救療坐視其斃良可哀憫故黃帝云吾不能察其幼小謂別是一家調理耳凡藥者必明消息形候審定生死察病患之淺深知藥性之寒溫而後與乎少失也

初生臍死 千金兒初生輒死視兒口中懸癗前上齶有胞者(一云胞赤)以指甲摘取頭次令遺去血勿令血入咽入咽殺兒慎之

不能啼 三因云小兒初生氣絕不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱襟中未可斷臍帶且將胞衣置爐炭中燒之仍撚六紙條蘸油點火於臍帶下薰之益臍帶連兒火薰時有火氣由臍入腹裏以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴了即斷臍帶 嬰兒哭遲者以慈白細鞭背上即啼一水鑑方云胎風生下不能啼須使園中小葉葵搗取汁調熊膽末纔交入口免驚 看舌下法見前兒生下地即不啼哭不能吞乳奄奄如死者急看喉間懸癗前膀上有一泡用指摘破以帛拭去惡血勿令嚥下即能通聲吞乳

眼不開 兒生眼閉口開常啼不乳因受胎熱用涼五藏藥天竹黃散方見重舌及與甘啜復以竹葉煎湯洗眼

小兒初生眼閉者由產母食熱物毒物致成斯疾治法當以熊膽少許煮水洗開用生地黃湯服仍須乳母服山茵蔯湯凡初生小兒須洗令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼眥中使眼赤爛至長不瘥

生地黃湯　治初生小兒眼不開

乾地黃　赤芍藥　川芎

當歸去蘆　瓜蔞根　甘草

右爲細末水許用燈心煎湯調抹入口中速服一

四聖散　治嬰孩胎受熱毒生下兩目不開

燈心　黃連

木賊　柬子各半兩　秦皮

右㕮咀每服一錢水一盞煎七分澄清去滓無時頻洗兩目自開

洗眼方

黃連　秦皮

大棗各一箇　燈心

右用竹筒煎湯

不乳　頭初出胞胎而不吃乳也嬰兒初出胎時其聲未發急以手拭其口令惡血淨盡不得下咽即無他

病若拭口不全惡穢入腹則令腹滿氣短不能吮乳或產母取冷過度胎中受寒致令兒腹痛也宜用茯苓丸及木香檳榔散治之

茯苓丸

赤茯苓　川黃連去鬚　枳殼炒
右等分爲末煉蜜丸桐子大每服一丸乳汁調下治穢惡入腹令兒嘔吐不已乳方

木香　乾薑生　茯苓
甘草　酸木瓜　丁香各等分
右爲麤末一撮水煎綿蘸滴與之

乳兩合葱白一寸煎一兩沸去葱喫飽乳

聖惠人參丸

人參　龍膽　黃連
馬牙硝　甘草炙微赤　枳實麩炒微黃各貳兩
右擣羅爲細末煉蜜丸如桐子乳汁研二丸漱口中日四五服差

朱砂丸　治三歲以下胃口開不欲乳

朱砂　牛黃　人參各壹分
丁香　甘草炙　麝香

犀角　黃耆
五靈脂各半

右搗羅研勻蜜丸如菉豆熟水下三丸日四五服
治兒生二七日內不吮乳名啼者客風中臍循流
心脾灸承漿在下唇稜下紋中次灸頰車在耳下
頰骨後灶如雀屎各七壯此非灸不療　兒喉中鳴
咽乳不利灸旋璣二壯在天突下一寸陷者中

吐不止　錢初生下吐因穢惡下咽故也用米瓜丸主
之凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物嚥下
致生諸病　田月裏生幅先用米泔丸下之如利後

錢木瓜丸

木瓜　麝香　檳榔各等分　臙粉

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服二丸甘
草水下無時

辟芽兒初生一患多因乳母不愼七情不節厚味
傳兒爲病當審其因以調治其前所用之藥恐
臟腑脆嫩不能勝受用者審之

聖惠藿香散　治兒生至半月嘔逆不止

藿香　紫蘇　洗去苗土各壹分　麥門冬參分去心焙　桂心半分　甘草炙赤半兩

右爲散每服一錢水一盞煎五分去滓温綿點滴口中

不小便 小兒初生不尿者多因在胎時母恣食噉熱毒之氣流入胎中兒飲其血是以生而臍腹腫脹如覺臍四旁有青黑氣色及口撮即不可救也如未有青黑色不飲乳者宜服葱乳湯

葱乳湯

葱白三四寸四破之以乳汁半盞煎灌一方葱生用搗爛入乳拌入兒口內再與乳吮嚥下即通

豆豉膏

黑豆壹勺　田螺拾枚　葱壹大把

右搗爛芭蕉汁調貼臍下

按觀丹溪治鄭雍彼之子患淋病乃因父服下部熱藥遺毒在胎留於子之命門而然以紫雪和黃檗末爲丸投之下如黍如粟者晚許而安則初生不尿非其當審因而治也治不言可知也

不大便 俗名鎖肚由胎中受熱熱毒壅盛結於肛門閉而不通無復滋潤所以如此至若第三日不通急

令婦人以温水漱口吸咂兒前後心幷臍下手足心共七處凡四五次仍以輕粉半錢密少許温水化開時時將少許服之以通爲度如更不通即是肛門內合當以物透而通之金簪爲上玉簪次之須刺入二寸許以蘇合香丸納入孔中糞出爲快若肚腹膨脹不能乳食作呻吟聲至於一七難可望其生也田氏治法先用硬葱鍼紅肛門如大便不下後用牛黃散方見送朱砂丸一時自見

大小便不通 小兒初生腹脹欲絶大小便不通亦如前法吸咂胷前背心手足臍下七處以紅赤色爲度須更自通

千金云小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清潔也若喉裏舌上有物如瘡簪盛永狀者若懸癰有膿起者可以綿纏長鍼留以處如粟米許大以刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者名重腭有著齒斷上者名重齦皆刺去血汁也　刺後用鹽湯洗拭急用如聖散或壹字散揩刷

如聖散

鉛霜　眞牛黃　太陰玄精石
朱砂水飛曝乾

右四味各研極細秤准各二錢五分拌勻入白龍腦五分再研勻每用藥抄壹字至半錢止摻兒口中時時用

壹字散

朱砂　鵬砂各半錢　龍腦
朴硝各壹字

右爲極細末用蜜調少許鵝翎蘸刷口內嚥下無

舌

重舌巢氏云心候於舌而主血脾絡脉又出舌下心火脾土二藏子母也有熱則血氣俱盛其狀附舌下近舌根形如舌而短名重舌　指爪摘斷及草刀子割法見前拭口法條　惠眼鵝口重舌重齶口瘡皆上焦熱因受胎時大受極熱急以難內金爲末乾摻口內及朱砂膏地黃膏輪流摻之仍服天竺黃散

地黃膏

鬱金皂莢水煮乾切焙　豆粉各半
馬牙硝研錢壹　甘草壹分炙

生地黃汁蜂蜜對合熬成膏和藥每服兩皂子大
香熟水含化或鵝翎掃口內
金朱飲 治驚壯熱傷寒伏熱上焦虛熱重舌口鼻
生瘡致赤眼方 本名竹黃煞
川鬱金 刺皂莢水煮乾細者如膽壯佳 天竺黃
甘草 炙 馬牙硝各半兩 朱砂壹分研
蟬殼 拾肆箇水洗去土 麝香少許

右爲末每服半錢至一錢蜜湯調下

重舌重腭 千金治法總前垂離門 刺去血汁後鹽湯洗拭壹字散塗刷法同前條 茅先生云心熱連

滯先用朱砂膏見驚積門塗舌上後用牛黃膏見腦熱門

聖惠牛黃散 一方無前二味有玄明粉

牛黃
鉛霜各壹錢
太陰玄精石壹兩
白龍腦

右細研爲散先於腫處以鍼鈹破出血鹽湯洗拭口後摻藥神効

口中有病 外臺療舌喉不穩七日以來壯熱顏色赤鼻孔黃恐作撮口及牙關蟲似蝸牛亦似黃頭白蚌螺用竹瀝半合和少許牛黃服差 又豬肉拭白即蟲出

噤風 巢氏云兒口内忽結聚生舌上如黍不能取乳名噤由在胎熱入藏心偏受熱 聖惠初生兒須防三病一撮口二著噤三臍風皆急病著噤尤甚過一朝方免牙關緊急吮乳不得啼聲漸小口吐涎沫有眼閉人見大小便通以爲冷熱所得不知病在喉舌狀亦極重善救療者十不得三四依將護法防於事先必無此患 但有此證急着兒上腭有黑子先以指甲輕輕刮破次服定命散辰砂全蝎散之類如口噤不開服諸藥不効者生南星去皮臍研爲極細末龍腦少許合和用指蘸生薑汁於大牙根上擦之立開

凡臍風撮口噤風三者雖異其受病之源則一也蓋抵裏氣鬱結壅閉不通故胎毒子金云小兒初生其氣高盛若有微患即須下之若不時下則成大疾難爲療矣紫霜丸量而與之定命散 治初生兒口噤不乳

蟬蛻貳朱(去嘴腳) 全蝎貳朱(去毒)

右爲極細末入輕粉少許和研用乳汁乳遠調化服

辰砂全蝎散 治初生兒口噤不乳

辰砂(水飛半錢) 全蝎(頭尾全去毒)

鵬砂　龍腦　麝香各壹字

右爲極細末用乳母乳調塗口唇裏及牙齒上或用豬乳少許調入口內

紫霜丸方見變蒸

張渙立聖散　治妊娠之時母服熱藥過多或食炙煿熱物等致令嬰兒初生下口噤不乳口舌上瘡如黍粟大啄唑多啼名曰口噤

乾蜘蛛壹箇去口足以新竹火上炙取油　乾蠍梢柒箇爲末　臘粉錢

右件並同研極細每服壹字乳汁調時時滴口中

千金治口噤未死者心噤白者肺噤

雞糞白裏大綿裹水一合煮二沸分再服聖惠用豆大參枚水下

又雀糞四枚末之著乳頭飲兒大十枚

外臺著噤病在咽如麻豆許令兒吮沫丞乳

水銀如黍與服下咽便愈以意量之不過小麻子許用

食療茶苗研汁灌口中死亦生生下濕莖端二葉花黃子赤似覆盆子

聖惠川椒一兩搜麵裹三角炙令黃熟以綿蓋兒口指去尖如筯頭使椒氣入口效未覺再作

蜈蚣方　治小兒口噤不開不能吮乳

赤脚蜈蚣半條去足炙爲末　麝香少許

右以豬乳和之蓋豬乳能獨主小兒口噤不開

蜘蛛方　治小兒口噤不開不能吮乳

蜘蛛壹枚去足炙黃爲末

用豬乳一合和爲三服徐徐灌之神妙入麝香治牙疳極好

牛涎方

取東行牛口沫塗小兒口及齦上即効

治噤摘鼻法用鬱金藜蘆瓜蒂爲末水調摘之

茅先生云兒生一百日內犯風噤病同着葉因而受驚有疾故受毒氣生來血氣未調又被風邪所擊致之治法先與奪命散吐風涎驚門見急慢後下醒脾散胃氣不和門一見慢脾風門夾白痢夾朱砂膏見驚常服郎愈如手捉拳噤口不開死

鵝口　巢氏云兒初生口裏白胎滿舌上如鵝之口故名由在胎受穀氣盛心脾熱氣熏發於口　治用髮纏指頭蘸井花水拭拭之睡時黃丹煅出火氣摻於舌上　如用前法其舌上白胎不脫可煮栗荻汁冷濃以綿纏指頭拭之若春夏無栗荻可煮栗木皮如

用井花水法　簡要用牙硝細研於舌上摻之日三
五度　祕録用桑白皮汁和胡粉傅之　雞胵胵黃
皮燒末水和服又
張渙保命散　治嬰兒初生七日內胎毒若北舌上
有白胎如米連舌下有白膜如石榴子大令兒語不
發名曰鵝口病
白礬燒灰　朱砂水飛各貳錢半　馬牙硝半兩
右各研極細再同研每服壹字取白鵝黃以水攪
取汁調塗舌上頷頰內未用藥時先以手指纏乱
髮揩拭舌上垢然後使藥傅之

茅先生論兒喉中壅一塊肉瘤閉却爲喉痺身大熱
舌硬不轉爲木舌口開滿口黃如膏名鵝口三候皆
熱甚生風風壅熱毒至此爲實熱明宜微與通吐惡涎後用勻氣散見不和門及用天竺
黃散見重門夾牛黃膏見發熱門與服愈如喉癰以鋸及眼
視面青黑不妳食死候
撮口　外證舌強唇青聚口撮面目黃赤氣息喘急
啼聲不出飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可
救療其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱
結不通致之治法貴乎疎利見痢疾門砂膏

免也

千金云小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也多不育若有如此者皆宜與龍膽湯也

龍膽湯方　治嬰孩小兒胎驚月內氣盛發熱臍風撮口壯熱

龍膽草　釣藤　柴胡去蘆　桔梗去蘆炒　黃芩炒　赤芍藥炒

茯苓去皮　甘草炙各伍錢　蝎梢貳枚去尖足炙

大黃壹分紙裹煨

右合研爲極細末用棗去核煎湯或加防風去蘆察門冬去心以導心熱食前調服

張渙云嬰兒胎氣挾熱赤因母有邪熱傳染或生下洗浴當風襁褓失度致令嬰兒啼聲不出乳哺艱難名曰撮口不開病七日之內尤甚急風散之

蛇蛻皮微炙　釣藤

朱砂壹分細研水飛

好麝香

乾蝎稍各壹分羅爲細末

真牛黃各半錢並研

右件都拌勻再研爲細末每服壹字取竹瀝一兩點同乳汁調下

辰砂殭蠶散　治初生撮口

辰砂水飛研半錢　麝香研半錢　殭蠶直口黑嘴炒壹錢　蛇蛻皮炙壹錢

右爲極細末少許用窗調傅唇口

撮風散　治小兒撮口

赤脚蜈蚣半條炙　釣藤貳錢　朱砂半　梔子各壹錢　麝香壹字

右爲末每服一字取竹瀝調下

辰砂膏

辰砂叁錢　鵬砂　玄明粉貳錢　全蝎　麝香壹字

右爲末和棗同好單包起自然成膏每服一字或一豆許治諸驚用金銀薄荷湯下潮熱甘草湯下月內嬰兒用乳汁調傳治亦妙

臍風鎖口方

金頭蜈蚣壹箇　蝎梢伍箇　馬牙硝各壹錢　麝香伍分　瞿麥半錢　直殭蠶柒箇　真珠末各壹錢

右爲末每一字吹入鼻中啼則可用薄荷湯調下一字然後服千金龍膽湯朱銀丸

殭蠶方

直殭蠶貳枚去嘴略炒爲末調傅唇口中

甘草方 治小兒撮口取吐

甘草壹錢

右煎服令吐出痰涎即以豬乳熙入口中即差

慶千金有癖風癖濕癖瘡三者皆因斷癖後爲風濕傷而成夫風入癖癖腫腹脹四肢不利多啼不能乳甚者發搐爲癖風腫濕經久不乾爲癖濕風濕相搏令癖生瘡久不差爲癖瘡有二不它入於經脉多變爲癇癇成作癇治 癖風者謂斷癖之後被水濕風冷所乘風濕之氣入於癖而流入心脾遂令肚腹脹滿癖腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吃乳甚則發爲風搐若癖邊青黑撮口不開是爲內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胸堂伸縮努氣亦令癖腫宜千金龍膽湯主之 方見前條

錢氏云小兒洗浴拭癖不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛冒氣不和宜調氣益黃散主之 方見脾部

類萃云宜先用控痰飲吐風痰次用益脾散和脾又用辰砂膏利驚即愈或

手足攣拳禁口不開者不治　曾氏法先投劫風膏
次以五苓散加寛氣飲入薑汁葱白燈心煎湯調服
與解風痰及用一字金煎荊芥湯或薄荷湯調抹口
内證輕卽快　如禀賦充實發熱有痰驚搐投黑白
飲温蜜湯空心調下微泄似茶褐色二三行進白芍
藥湯水薑棗煎服常用此法亦妙　若臍凸者迭肚緊
微有青色口撮不開肝風盛而脾土受制不可施治
凡有此候百無一治　縱使得安亦非長壽

蝎尾

銅青各半錢　朱砂壹錢

臟粉壹字　麝香少許

右爲末每服一字臙脂茶清調下先吐風痰然後和
胃或有腹甘草方吐痰隨輕重用

益脾散

白茯苓　人參　草菓燻
木香濕紙裹煨　甘草　陳皮
厚朴薑製　紫蘇子炒各等分

右爲末每服一錢薑棗水煎
辰砂膏方見前

宣風散

治初生兒因斷臍後外傷風濕唇青口撮

多啼不乳口出白沫

全蝎貳拾壹箇頭尾全去毒每用
無灰酒少許塗炙爲末

右研爲極細末用半字金銀煎湯或麥門冬去心
煎湯調化食遠服

防風散 治初生兒臍風

防風去蘆 羌活 黄耆
當歸 川芎 甘草各半錢

右爲極細末少許用燈心麥門冬去心煎湯調化
不拘時候服

劫風膏 治急慢驚搐臍風撮口牙關緊閉痰涎壅
盛咽喉腫痛

蔵靈仙去蘆壹兩半細
對焙研爲末

右用皂莢叁兩去皮弦搥損挪温水一盆絞濾過
慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候
冷用前藥末亭分乳鉢内杵勻丸芡實大先用鹽
梅肉擦牙根次以此膏一丸或二丸温白湯濃調
抹入左右牙關内即開續進別藥熬時得丸器爲
上銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少
與含嚥咽喉腫痛温茶清調下或薄荷湯

五苓散

寬氣飲 俱驚

一字金 治初生嬰孩一七之外欲成臍風撮口及卒中急慢驚風牙關緊閉窄上痰涎

殭蠶炒去絲 去葉細辛 甘草生用 蘆薈 各明白礬生用 仙半夏 各貳錢

右剉焙爲末每服壹字至半錢薑汁沸湯調勻以指抹入牙關內治卒中急慢驚證口禁不開用鹽梅湯調擦上下牙根二處

黑白飲 治臍風氣實者及急驚壯熱發搐

黑牽牛半生半炒 白牽牛半生半炒 大黃生用 陳皮去白 檳榔各半兩 甘草炙 各壹錢

右除檳榔不過火餘五味或曬或焙仍合檳榔爲末同玄明粉入乳鉢內再杵勻每服半錢至一錢溫蜜湯調化空心投服或無時此藥新合最妙久則效遲

白芍藥湯方見痘

張渙封臍散 治嬰兒初生因乳浴不謹洗浴水入臍中或兒尿在襁褓之內濕氣傷於臍中或解脫風冷邪氣所乘令兒臍腫多啼不能乳哺名臍風

病宜急用此

好川當歸半兩洗焙乾
亂髮壹錢燒灰存性

右件同搗羅爲細末入麝香壹字拌勻用藥壹字
至半錢傅臍中時時用

三因小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一効
坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證宜
兒齒齦上有小泡子如粟米狀以温水蘸熟帛裹捻
輕輕擦破卽開口便安不藥神効
小兒初生臍風撮口諸藥不効者灸然谷穴在內踝

前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立
効
臍風目上插刺絲竹空
臍濕嬰兒臍中腫濕經久不治
臍風撮口在百日內多不治者至百日卽危急宜
速療之
麝香研少許傅臍中
許拭臍乾用避風
各壹枚燒灰細研少許傅臍中
封臍散

乾蝦蟆牡蠣
白薑灰
亂髮灰
絡矢
乾蝦蟆
絡矢
白薑灰
亂髮灰

紅帛灰 四灰不得 鹹剔灰

白斂 當歸頭 南星

五倍子 血竭 赤小豆

雲母赤石脂 煅 海螵蛸 龍骨

臙脂各半錢 百草霜

右合研爲極細末 濕乾傅乾則清油塗忌生水浴

脐

又方

紅綿灰 黃牛糞灰 龍骨

髮灰

乾臙脂各半

月錢

右爲極細末濕乾摻乾清油塗臍

又方 治臍內出水汁不乾

當歸頭去蘆 綿紬臍帶燒灰

壹錢 壹錢半 綿壹小字同研少許乾摻臍

右爲極細末入麝香

錢乙蘗墨散

黃蘗 釜下墨 亂髮灰 各等分

右爲細末每用少許傅之

張渙胡粉散

胡粉 乾薑燒灰

右各等分研極細再同研勻用藥一字至半錢傅

腭中時時用

胜氣臍大如栗虛腫而軟疼用竹瀝塗日數上消兒臍濕淹破屋爛卓爲末頻摻効

臍瘡巢氏曰因浴兒水入臍中或尿濕衲致臍中受濕腫爛成瘡或解脫瘡風邪所襲入於經絡則成風痛若臍腫不乾久則發搖 肘後乾蝦蟆燒灰傳異功散 治臍中瘡

龍骨 煅 薄荷葉

輕粉 半錢 蛇床子 各貳錢

右爲極細末少許乾摻臍

龍骨散 治臍中瘡

龍骨 煅 黃連 去鬚壹錢半 輕粉 各半錢

右爲極細末少許乾摻臍

治兒滿月啼叫臍中出血用白石脂炒研極細末乾摻

治兒因剪臍傷於外風致臍瘡不乾方

白明礬 煅 龍骨 煅 各半錢

右研爲極細末乾摻

張渙金黃散 治臍瘡久不差風氣傳於經絡變爲

細末
川黃連貳錢半　胡粉
右各另研復合研爲細末每用少許傳擦口中時時
用之

初生兒臍風着噤口最爲急證十難救一須
治之法宜時用軟帛包指拭口中牙齦上有筋兩條
便用葦刀輕輕割斷以絡乳煎
黃連去鬚半錢　龍骨燒灰各壹錢
葱白貳寸　豆豉貳拾粒　甘草壹寸
右用童子小便煎綿蘸拭口中

抱兒向明看臍上有赤脈直上便赤脈頭上灸三壯
者生

初生之兒有熱在胸膈頻伸引吮吮作聲
努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏
無識之夫將謂斷臍不利而使之然者非也此由胎
中毋多驚悸或恣食熱毒之物所致宜對症攻藥其
熱自散其臍歸本不必以藥敷之恐反爲害　曾氏
曰臍突一證又非臍風此亦因初生洗浴繫臍不緊
濕水侵入於內產後旬日外臍忽光浮如吹捻動微
響間或驚悸作啼治用白芍藥湯加薏苡仁水煎空

心温服次以外消散塗貼自然平復

白芍藥湯 見痂

外消散 治嬰孩初生旬日外臍突或痛或不痛痛則啼聲不已及療小兒因濕熱搏致陰器膚囊浮腫 元甲

大黄 牡蠣各半兩 朴硝貳錢

右前二味㕮咀爲末仍入朴硝乳鉢内同杵勻抄一錢或二錢取田螺淨洗盡以水半盆活過一宿去螺用水調塗腫處自消其螺仍放水中勿害之昔賢有曰殺生去生遠矣物命雖微亦可戒

也治陰器膚囊腫車前子煎湯候冷調傅

二豆散 治嬰孩小兒腫突臍

赤小豆 不生皮 豆豉 豆豉

白斂 各壹錢

右爲極細末生錢用芭蕉白然汁調傅臍四傍一日一次二日二次若得小便白即安

胎驚 小兒壯熱吐哯心神不寧手足抽掣身體強直眼目反張是胎驚風證治驚者以妊婦調攝平常飲酒嗜慾忿怒驚撲刑有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘生氣生下即病也其候月内壯

熱翻眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚
啼腮縮頤開或頰赤或面青眼合凡胎風眼合不可
藥其有搭眼噤口之類亦此一種之所發也視其眉
問氣色赤而鮮碧者可治若黯青黑者不治虎口指
紋曲入裏者可治久出外者不治先宜解散風邪利
驚化痰調氣及貼頤法其間則以朱銀丸利之若面青
拳搐用保命丹通治急慢驚鈎藤散方見慢驚全蝎散方見褊口禁之
類人抵小兒臟腑脆弱不可輒用銀粉鎮墜之劑如
遇此候急取豬乳細研生黃麝香各少許調扶入口
中仍服導赤散以瀉肝火子則愈矣 石壁經歌未

出胎中一月來母驚成患子臨胎腰直哭時先口撮
面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急受氣時若陰氣
消甚陽氣弱胎難驚落手足細肌肉瘦皆不盡天年
若日月滿因驚落口撮腮臉起鼻塞口禁勿作驚治
微汗次治驚調氣乳母服調氣藥兒貼頤任與千聲耶不開退却風涎爲
治療涎去驚邪自不復失治則目瞑先治驚則吐瀉
治愈开不出生別候鳳髓烏屢九次生銀九並急慢驚門
不過三兩次必死假者頻發不爲重眞者內生驚癎
假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲
知假者口中氣出熱治之再發散大青青主之可用
塗顖法 田月裏生驚急取豬乳細研辰砂牛黃各

国立公文書館 National Archives of Japan

少許調抹口中神効乳母服防風通聖散三劑其驚自消

【主】小兒未滿月驚搐似中風欲死者用辰砂以新汲水濃磨汁塗五心上最効

【湯】治胎癇驚風皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線纏火上炙燥爲末別研生硃麝香各少許煎麥門冬湯調下

【辭】一小兒患胎驚諸藥不應用紫河車研爛如泥每用錢許乳化服之更以十全大補湯加釣藤鉤漏蘆與母服兩月餘舉發漸輕服年餘舉發漸稀服年餘不再發至出痘後復發取紫河車研爛入糯米粉丸小豆大每服百丸以乳送下服二具全瘥耶

如又發仍用前丸及十全大補湯六味丸加當歸黃耆肉桂五味子年餘喜甚能遠帷幕得痊後因勞役更作又用前丸及十全大補等藥不應用大劑獨參湯服數斤然後舉發稍緩乃用人參貳兩附子壹錢數服頓止仍用前藥間用獨參湯而痊

【一】小兒患胎驚用紫河車丸及十全大補湯及釣藤膏而愈畢姻後復發用大劑獨參湯六味丸加五味子黃耆當歸煎服半載舉發稍輕年餘不再發後每勞役怒氣仍發即用前藥隨愈又傷寒愈後復作虛症悉具莫能名狀用紫河車二具獨參煎湯十餘斤而痊後患

傷風咳嗽咽乾內熱用六味地黃丸料加五味子煎服及十全大補湯而痊

獨活湯　治胎驚發散風邪

獨活　羌活各壹分　天麻　麻黃去節各半錢　甘草各半分　檳榔

右剉散每服半錢煎服於仍加南星末蜜調下可貼顖用

驅風散

胡黃連貳錢半　全蝎去毒炒　天竺黃　麻黃去節各半錢　犀角　麝香壹字

右爲細末用乳汁調化食遠服

右二方發散之劑實有表證方可用之

青金丸　治嬰孩小兒解散胎熱化痰涎鎮驚邪

人參去蘆　天麻煨　白附子炮　牛膽南星炒各貳錢　甘草炙壹錢半　青黛壹錢　朱砂水飛半錢　麝香壹字

右爲極細末煉白蜜圓如梧桐子大用釣藤皂莢子煎湯研化不拘時候服

太乙散　治芽兒胎驚病證亦宜常服

天漿子去殼微炒　南星　白附子各微炮

天麻　防風
全蝎　朱砂各錢
右爲末每服半錢乳汁化下張渙方天漿蝎梢各
貳拾壹箇防風天麻朱砂各半兩麝香壹錢無茯
苓白朮
參蝎散　治小兒胎驚定心神
天漿子　天竺黃　人參
朱砂　全蝎　天麻
蟬蛻各等分　麝香少許
右爲末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

豬乳膏　治小兒諸驚馬胎癇
全蝎壹箇焙　琥珀
右爲末每服一字麥門冬煎湯調下
朱銀丸　治小兒胎風壯熱痰盛翻眼口禁取下胎
中蘊受之毒亦治驚積但量與之
水銀壹錢蒸棗研如泥　白附子半壹錢
南星　全蝎
蘆薈　天漿子
腦壹字　牛黃各半錢研
麝香少許　鉛霜半錢和水
右爲末煉蜜丸桐子大薄荷湯化下　銀煅研
直殭蠶炒米一百箇

張渙聖星丹　諸癇皆宜服之曾經大効
天南星一般大者四十九箇端午取活蝎四十九箇瓦器盛鹽泥固濟弔靜室中臘日取出揀南星蝎蛰着處有小窠子者其餘不用只將蝎蛰南星以酒浸一宿焙研細末次用
牛黄　麝香　龍腦各壹錢研細
辰砂細研水飛貳錢半
右件再一處研勻薑汁和桐子大服一粒至二粒人參薄荷湯化下
白金散　治諸癇潮發不省者

白殭蠶半兩湯洗炒微黄搗羅爲細末次用　天竺黄貳錢伍分
牛黄壹錢　麝香龍腦各半錢
細研拌勻每服半錢薑汁調放温灌之
烏金膏　治胎癇潮發頻併
烏梢蛇壹條取淨肉酒浸一宿焙　蠶紙壹張燒灰
蟬殼　全蝎　朱砂飛各半兩
金箔貳拾片　龍腦　麝香各半錢
右各取細末研勻蜜和如皂子每服壹粒人參薄荷湯化下
天南星煎　治胎癇潮發遲省

天南星 微炮 白附子 白花蛇 酒浸去皮骨炙
黄各壹兩 乾蝎炒 天麻各半兩
巳上搗羅爲細末用好酒兩大盞慢火熬不住
手攪以酒盡爲度次用
麝香 細研入膏内和如皂子每服一粒竹瀝化下無時
朱砂 細研水飛半兩 腻粉 貳錢伍分 牛黄
祛風散 治胎癎多啼叫
胡黄連 半兩 全蝎 麝香 各貳
天竺黄 麻黄去節 犀角
右各取細末和勻每服半錢入麝一字乳汁調下
鐵粉散 驚風面赤口乾大便不利尤宜服
鐵粉 半兩 鬱金 牛黄
真珠 胡黄連 各貳錢伍分
各研細拌勻每服一字温蜜湯調下
羌活膏 治胎癎昏困不省
羌活 獨活 各壹兩 天麻
全蝎 人參去蘆 白殭蠶微炒 各半兩
烏蛇肉 壹兩酒浸一宿焙
右搗羅爲細末煉蜜和膏每服皂子大麝香荆芥

湯化下

麝香膏　治胎癎不得安臥

麝香（研）　牛黄（研）　白附子

蠮螉（微炒）　白殭蠶（微炒各貳錢伍分）

全蝎（貳拾壹箇）

右取淨末更研細蜜和膏如皂子每服一粒人參荊芥湯化下

胎癎　會胎癎者因未產前腹中被驚或母食酸鹹過多或爲七情所沿致傷胎氣兒生百日內有者是也發時心不寧面微黄氣逆痰作目上視身反張啼聲不出先用參蘇飲和解次以不驚丹或琥珀抱龍丸

間投輕則可愈重者難全

參蘇飲（發熱）

琥珀抱龍丸（驚）

不驚丹（驚）

脾風　小兒初生其身有如湯潑火傷者此皆乳母過食膏粱所致也其所宜服清胃散（乃見雜病及遺遥散（乃見婦人科虛勞門）以清其氣血兒亦飲數滴可也有身無皮膚而不燃赤者皆由產母脾氣不足也用粳米粉傅之燃赤發熱者皆由產母胃中火盛也用石膏傅之經謂脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也如腦額

生瘡者火土相合遂成濕熱下流攻擊腎水也難治如脚上有瘡者陰虛火盛也此不滿五歲而斃如未滿月而撮口握拳腰軟如隨者此肝腎中邪勝正弱所致也三日內必不治如男指向裏女指向外尚可治倘紅亦不可治口禁方見鈎藤散方見慢驚等類治之若因大病虧損胃氣而諸臟虛弱所致者用補中益氣湯方見虛羸錢氏地黃丸方見腎藏若面唇赤色正屬腎水不足肝經陰虛火動而內生風熱爾當滋腎水以制陽光其身軟者內稟氣不足肌肉未堅也當參五軟而施治之 聖惠所云胎風原與胎驚

混淪故此不取

胎熱 兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物降生之後旬日之間兒多虛痰氣急喘滿眼閉目赤目胞浮腫神困呵欠呢呢作聲遍體壯熱小便赤色大便不通時復驚煩此因胎中受熱或悞服溫劑致令熱蓄於內蒸胎氣故有此證若經久不治則鵝口重舌木舌赤紫丹瘤自此而生宜先以木通散煎與母服使入於乳令兒飲之通心氣溫洗兩目開進地黃膏又竺黃散久牛黃湯當歸散亦令母服凡有胎疾不可求速效當先令乳母服

藥使藥過乳漸次解之百無一失若即以涼藥攻之必生他病乳母仍忌辛辣酒麪厭毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止曰熱如湯乃胎熱之候也

生地黃湯（湯氏）　治小兒在胎時因母有熱或恣飡酒麪熱毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止曰熱如湯乃胎熱之候也

生地黃　赤芍藥　川芎

當歸　栝蔞根

右件等分㕮咀每服半兩水一盞煎六分產婦亦可服以些少抹入兒口中

木通散　主小兒上膈熱小府閉諸瘡丹毒毋子同

木通　地黃（各半兩）　大黃

甘草　赤芍藥（各叁錢）　瞿麥

滑石　山梔子　車前子

黃芩（各貳錢半）

右水一鍾燈心三莖煎入薄荷同煎

釀乳法

豬苓（去黑皮）　澤瀉　赤茯苓（去皮）

天花粉　茵蔯　生甘草

生地黃　山梔（去皮）

右剉散用水煎食後令乳母捏去宿乳却服此藥

甘豆湯 治小兒胎熱

甘草壹錢 黑豆貳錢 淡竹葉 米煎

右㕮咀用水一鍾入燈心七莖煎不拘時候服

四聖散 主芽兒胎受熱毒生下兩目不開

燈心 黃連 秦皮

木賊 棗子 各半兩

右水一鍾煎澄清去查無時起洗兩目自開後服

地黃膏

地黃膏 治胎熱

山梔仁 綠豆粉 各壹兩半 粉草 陸錢

右爲末用生地黃爛杵壹兩半和好蜜壹兩半以薄瓦器盛在銅銚中煮成膏如稀糊相似候冷停分入前藥末同在乳鉢内再研勻次實大每以半丸麥門冬湯化服

天竺黃散 見口瘡

當歸散 見潮熱

牛蒡湯 見咽喉

清胃散 見雜病 薛氏治胎熱用此

胎寒 嬰兒初生百日内覺口冷腹痛身起寒栗時發戰慄曲足握拳晝夜啼哭不已或口禁不開名曰胎

寒其證在胎時母因腹痛而致產經云胎寒多腹痛亦有產婦喜啖甘肥生冷時果或胎前外感風寒暑濕治以涼藥內傷胎氣則生後昏昏多睡間或哯乳瀉白若不早治必成慢驚慢脾凡有此候宜以沖和飲當歸散合和永煖薑煎服使之微泄泄行進勻氣散調補泄止氣勻神安痛定手足舒伸次用參苓白朮散以養胃氣白芍藥湯去其寒濕乳母宜節生冷飲食庶易瘥也　又有手足稍冷唇面微青額上汗出不顧乳食至夜多啼頗似前證但無口冷寒戰名曰藏寒其疾夜重日輕腹痛腸鳴泄瀉清水間有不泄者此證亦在百日內有之皆因歸產在地稍久冷氣侵逼或以涼水參湯洗兒或斷臍帶短而又結縛不緊為寒氣所傷如此宜以白芍藥湯及冲和飲加鹽炒茴香炙黃水薑煎服并乳母同服　湯小兒胎中有寒生下不能將護再傷於風其候面色青白四肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒乘虛入藏作腹疼盤腸內吊治法詳寒腹痛條

冲和飲　方見

白芍藥湯　見痢

參苓白朮散　當歸散　方見潮熱

勻氣散　見痛

異功散方見 薛氏治胎寒用此

胎肥胎法 錢氏曰胎實面紅目黑睛多者善笑胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之

天麻貳錢 蝎尾去毒 珠砂各伍分

烏蛇肉酒浸焙乾爲末白礬各叁錢

青黛叁錢 麝香壹字

右研勻每用叁錢水叁碗桃枝壹握并葉伍柒枝同煎至十沸温熱浴之勿浴背

大連翹飲 治胎熱臍風小便不通及諸般瘡毒

連翹 瞿麥 荊芥

木通 赤芍藥 當歸

防風 柴胡 滑石

蟬殼 甘草炒各壹錢 山梔子

黃芩各半錢

右爲末每服二錢加紫草水煎熟甚加大黃更詳證加減

薛氏曰胎肥乃受母胃熱所致兒用浴體法以疎通其腠理乳母服大連翹飲

胎怯者生下面無精光肌肉薄時時哽氣多噦目無精采亦宜以浴體法主之　初虞世曰母氣不足則羸瘦而肉薄父精不足則解顱眼白多

胎黃 小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔汁乳食不思啼哭不止此胎黃之候皆因乳母受濕熱而傳於胎也凡有此證母子皆宜服地黃湯及地黃飲子有生下百日及半週不

因病後身微黃者胃熱也產後身黃者自生而身黃者胎疸也經云諸疸皆熱色深黃者是也犀角散主之若淡黃兼白者胃怯也白术散主之

生地黃湯 治小兒生下胎黃

生地黃　赤芍藥　川芎
當歸　栝蔞根　各等分

右㕮咀每服半兩水煎乳母服時時少抹入兒口中

地黃湯

生地黃　赤芍藥
天花粉

赤芍藥 去蘆 川芎 當歸 去蘆
豬苓 澤瀉 甘草
茵蔯 各等分

右剉散用水煎食前服
治小兒生下滿身面目皆黃狀如金色
地黃飲子
或面赤身熱眼閉不開大便不通小便如梔子汁
滿身生瘡

生地黃 赤芍藥 各貳錢 羌活 去蘆
當歸 去蘆 甘草 炙壹錢

右爲極細末用燈心煎湯食前服乳母宜服仍忌
酒麵五辛之物

犀角散 治小兒胎黃一身盡黃

犀角 茵蔯
升麻 煨 甘草
生地黃 寒水石 煅等分
枯蘘根
龍膽草

右㕮咀用水煎不拘時候服

胎赤 田氏云月裏生赤肌膚如赤丹塗者先用羊黃
散托裏續用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑
牛黃散或即牛黃奪命散方見喘門清涼飲方見腹痛

洗目令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼眥中使瞼赤

爛至長大不差者名曰胎赤宜用二金散（曾純陽）之子始生旬月忽兩目俱紅弦爛澁痛成翳此因在胎爲母感受風熱傳於心肝而得先以白解散加當歸散水煎燈心煎服次導赤散及牛蒡湯加黃連木賊蟬殼水煎服自効（有因難產胎氣頗澁轉側差緩其血壓於兒首遂至瀦血滲下盛則灌注其眼不見瞳人輕則外胞腫赤上下弦爛若投涼藥必寒膈脾宜與生地黃湯主之）

百解散（方見驚搐）

當歸散（方見）

導赤散（方見心藏）

生蒡湯（方見喉痺）

二金散方

黃連（去鬚）　黃檗（各壹錢）

右搗爲麤末以乳汁浸一宿焙乾每用少許以新綿裹用荊芥湯浸放温熱時時洗之

真金散　治小兒初生洗眼不淨則穢汁浸漬於眼皆中使瞼赤爛至長不瘥母食熱物熱藥名曰胎赤

黃連（去鬚）　黃栢　當歸

赤芍藥（各壹錢）　杏仁（去皮尖半錢）

右剉散乳汁浸一宿曬乾爲極細末用生地黃汁

調一字頻頻點眼新綿裹荊芥湯浸温時時洗浴
母服洗心散

洗心散

甘草生　當歸
芍藥　白朮
大黄煨各半錢　麻黄
荆芥穗

右爲極細末用生薑薄荷煎湯調化食遠服
生地黄湯見眼不開

幼科證治準繩集之一