

- 硫酸聖格尼涅(主治)解熱、強壯、健胃、
(用量)〇、〇四—〇、三
- 硫酸聖古尼實涅(主治)解熱、強壯、健胃、
(用量)〇、〇二—〇、一五
- 硫酸莫兒比涅(主治)麻醉、鎮痙、
(用量)一回〇、〇三—一日〇、一
- 律彪林(主治)麻醉、制淫、健胃、
(用量)〇、二—一、五
- 磷素(主治)骨病、神經病、
(極量)一回〇、〇〇一—一日〇、〇〇五
- 磷酸(主治)清涼、骨質病等、
(用量)〇、五—二、〇
- 磷酸那篤留謨(主治)緩下、解凝、
(用量)一五、〇—三〇、〇
- 林檎鐵丁幾(主治)強壯、
(用量)一、〇—五、〇
- 林檎鐵越幾斯(主治)強壯、
(用量)〇、二五—一、〇、五
- (カ)×チスミウム酸加里(主治)鎮痛、
(用量)〇、〇〇一—〇、〇〇二五
- 阿列布油(主治)緩和、緩下、配伍劑、
(用量)一五、〇
- 華列氏鐵丸(主治)強壯、
(用量)一丸—三丸
- 黃蠟膏(主治)膏藥、配伍料、
(外用)不定
- 黃降汞黃色酸化汞(主治)解凝、刺戟、
(極量)一回〇、〇三—一日〇、一
- 黃降汞軟膏黃色酸化汞(主治)解凝、
(外用)不定
- 黃色沃度化汞度化(主治)解凝、
(極量)一回〇、〇五—一日〇、二
- (キ)○華攝林(主治)軟膏、配伍料、
(外用)不定

- ×過チスミウム酸(主治)皮膚刺戟症、鎮痛、
(用量)〇、〇〇一
- (カ)○海葱(主治)利尿、祛痰、
(用量)〇、〇—二—〇、一
- ×カイリン(主治)解熱、
(用量)〇、〇五—一、〇
- 海葱醋(主治)利尿、祛痰、
(用量)一、〇—五、〇
- ×カスカラサクラダ越幾斯(主治)緩下、
(用量)一、五—四、〇
- ×カンタリザン酸加里酸(主治)結核諸病、
(用量)〇、〇〇〇、一
- 芥子(主治)麻醉藥解毒、皮膚、刺戟、引赤、
(用量)〇、〇五—一、〇
- ×カンナピノン(主治)精神病者、
(用量)〇、〇三—〇、一(△)
- 芥子紙(主治)麻醉藥解毒、皮膚刺戟、引赤、
(外用)不定
- ×可溶性蟻酸鹼基水銀液(主治)驅梅毒、
(用量)皮下注二回〇、〇一
- 加里石鹼野石鹼(主治)酸類解毒刺戟劑、洗滌料、
(用量)〇、三—一、〇
- 瓦爾技奴謨(主治)刺戟、興奮、祛痰、
(用量)〇、二五—一、〇
- 加兒拉健愛爾丹(主治)粘滑劑、滋養緩和、
(用量)二、〇—四、〇
- 加々阿脂(主治)軟膏、坐藥、配伍料、
(外用)不定
- 加刺拔兒豆(主治)麻醉、
(用量)原質ノ儘用ルヲ稀ナリ
- 加刺拔兒豆越幾斯(主治)麻醉、
(極量)一回〇、〇二—一日〇、〇五
- 加耶布的油(主治)刺戟、驅風、
(用量)〇、〇五—〇、一五

- 加麻刺(主治)殺虫、
(用量)八、〇一〇、〇
- 加密爾列(主治)發汗、驅風、
(用量)一〇、〇一〇、〇
- 煨製苦土鹽化麻錳(主治)制酸、解毒、下泄、驅風、
(用量)〇、一〇〇、五
- 煨製硫酸加兒叟煨製行膏(主治)繃帶料、
(外用)不定
- 煨製石灰(主治)腐蝕、除臭、
(外用)不定
- 葛斯加利刺(主治)苦味、收斂、健胃、
(用量)〇、五一二、〇
- 葛斯加利刺丁幾(主治)苦味、收斂、健胃、
(用量)一、〇一三、〇
- 葛斯加利刺越幾斯(主治)苦味、收斂、健胃、
(用量)〇、二一〇、五
- 苛性加里鹽化刺錳亞(主治)腐蝕試藥、
(用量)〇、〇一〇、一
- 甘扁桃(主治)緩和、
(用量)主トシテ外用ニ供スルノミ
- 含糖百弗聖(主治)健胃、
(用量)〇、六一二、〇
- 含糖沃度化鐵(主治)強壯、解凝、
(用量)〇、二一〇、五
- 羯答利刺(主治)利尿、刺戟、誘導、
(極量)一回〇、〇五 一日一、五
- 羯答利刺丁幾(主治)利尿、刺戟誘導、
(極量)一回〇、五 一日一、五
- 羯答利刺硬膏發泡膏(主治)誘導、
(外用)不定
- 羯答利刺軟膏(主治)誘導、
(外用)不定
- 羯答利刺格魯胃膜(主治)誘導、
(外用)不定

○乾答利刺紙發泡紙

- 乾燥炭酸那篤留膜(主治)制酸
(用量)〇、五一一、五
- 甘汞格魯化(主治)解凝、下泄、
(用量)〇、〇一〇、〇
- 甘草(主治)調味、配伍、
(用量)五、〇一一五、〇
- 甘草羔甘草(主治)調味、配伍、
(用量)配伍料ナルヲ以テ不定
- 甘草越幾斯(主治)調味、配伍、
(用量)配伍料ナルヲ以テ不定
- 肝油(主治)強壯、
(用量)八、〇一一五、〇
- 甘硝石精亞爾依知酸兒精(主治)興奮、發汗、利尿、
(用量)〇、二五一一、〇
- ヨドール(主治)防腐、
(外用)不定
- 沃度(主治)解凝、試藥、
(極量)一回〇、〇五 一日〇、二
- 沃度仿膜(主治)防腐、麻醉、
(用量)〇、〇二一〇、二
- 沃度丁幾(主治)解凝、鎮吐、試藥、
(極量)一回〇、二 一日一、〇
- 沃度化加留膜(主治)解凝、試藥、
(用量)〇、五一一、〇
- 沃度化加留膜軟膏(主治)解凝、
(外用)不定
- 沃度化汞第一沃度化汞(主治)解凝、
(極量)一回〇、〇五 一日〇、二
- 沃度化鐵丸(主治)解凝、強壯、
(用量)一丸一二丸

- 沃度化鐵舍利別(主治)解凝、強壯、
(用量)一、〇一五、〇
- 沃度化砒液度納般氏承(主治)變質、
(極量)一回〇、三 一日一、五
- 沃度化砒素(主治)變質、
(用量)一回〇、〇二 一日〇、〇五
- (た)○大麥(主治)緩和、香布料、
(用量)二〇、〇一五〇、〇
- 大黃(主治)健胃、下泄、
(用量)下泄ニハ〇、〇一〇、五
- 大黃丁幾(主治)健胃、
(用量)ニハ一、〇一五、〇
- 大黃丸(主治)下泄、
(用量)一丸一三丸
- 大黃越幾斯(主治)健胃、下泄、
(用量)健胃ニハ〇、一〇〇、五
- 大黃舍利別(主治)健胃、下泄、
(用量)下泄ニハ〇、五〇〇、二
- 大黃浸水製大黃(主治)健胃、
(用量)二、〇一四、〇
- 達刺賢篤護謨(主治)配伍料、
(用量)二、〇一四、〇
- 橙花(主治)調香、調味、
(用量)二、〇一五、〇
- 橙花油(主治)調香、調味、
(用量)〇、〇五〇、一五
- 橙花舍利別(主治)調香、調味、
(用量)三、〇一〇、〇
- 橙花水(主治)健胃、調味、
(用量)適宜
- 橙皮(主治)健胃、調味、
(用量)一、〇一三、〇
- 橙皮丁幾(主治)健胃、調味、
(用量)二、〇一六、〇

- 橙皮油(主治)調味、調香、
(用量)〇、〇五〇、一五
- 橙皮舍利別(主治)健胃、調味、
(用量)五、〇一〇、〇
- 答麻林度(主治)緩下、清涼、
(用量)五、〇一二五、〇
- 強力性格魯胃謨(主治)縑帶料硬着、
(外用)不定
- 單鉛硬膏(主治)收斂、
(外用)不定
- ×單寧酸亞酸水銀(主治)驅梅、
(用量)〇、〇五〇、二
- 炭酸利胃謨(主治)解凝、
(用量)〇、〇五〇、二五
- 炭酸加留謨(主治)解凝、
(用量)〇、〇一〇、〇
- 炭酸那篤留謨炭酸(主治)制酸、
(用量)〇、五一一、五
- 炭酸麻苦涅叟謨炭酸(主治)制酸、緩下、
(用量)〇、一〇〇、五
- 炭酸鉛(主治)收斂、
(外用)不定
- 炭酸鐵丸(主治)強壯、
(用量)一丸一三丸
- 炭酸安母紐謨(主治)興奮、祛痰、
(用量)〇、二五〇、五
- 單舍利別(主治)調味料、
(用量)調味料ナルヲ以テ不定
- (れ)×ソルサン(主治)防腐醱酵制止、
(用量)〇、二一〇、五
- (そ)○粗製硫酸(主治)消毒用、
(外用)不定
- 粗製炭酸加留謨粗製炭酸加留謨
(用量)脚湯ニハ一〇〇〇、三〇〇、〇
全身治ニハ二〇〇〇、〇一五〇〇、〇

○粗製硫酸鐵(主治)消毒用、
 (外用)不定

○粗製炭酸那篤儻酸(主治)洗濯用、
 (外用)不定

○粗製硫酸(主治)消毒用、
 (外用)不定

(な)×ナルツェイン(主治)鎮痛、
 (用量)〇、〇一〇、〇二
 (外用)千倍

×ナフトール(主治)防腐、
 (外用)千倍

×ナフタリン(主治)防腐、
 (用量)〇、〇五―〇、二五
 (外用)不定

(ら)○拉謨奴斯佛蘭德製皮(主治)下泄、
 (用量)二、〇―五、〇、
 (外用)不定

×ラノリン(主治)化粧料、
 (用量)〇、〇六―〇、二
 (外用)不定

○刺賢堙兒油(主治)刺戟、調香、
 (用量)一、〇―一、二
 (外用)不定

×ランタニン(主治)解熱、
 (極量)一回〇、三―一日二、〇

○刺賢堙兒精(主治)刺戟、
 (用量)一、〇―二、〇

(う)○刺苦委葛儻謨(主治)催眠、鎮靜、
 (用量)〇、〇五―二、〇、〇五

○ウレタール(主治)催眠、
 (用量)〇、〇五―二、〇

○茴香(主治)驅風、祛痰、調味、
 (用量)〇、〇二―〇、〇五

○茴香油(主治)健胃、驅風、祛痰、調味、調香、
 (用量)〇、〇二―〇、〇五

○茴香精(主治)同
 (用量)〇、三―一、〇

○茴香水(主治)全
 (用量)四、〇

○烏華烏爾失(主治)收斂、
 (用量)一、〇―四、〇

○勿拉篤里涅(主治)麻醉、解熱、
 (極量)一回〇、〇〇五―一日〇、〇二
 (用量)純品ヲ醫用ニ供スルヲ稀ナリ

(く)○苦扁桃(主治)麻醉、
 (用量)一%水 一日一、〇―二、〇

×クレオリン(主治)防腐、
 (極量)一回二、〇―一日八、〇

○苦扁桃水(主治)麻醉、殊ニ咳嗽、刺戟、
 (用量)〇、〇五―〇、一

×グアヤコール(主治)肺結核、
 (外用)十倍―二十五倍

○苦利砂羅並(主治)刺戟、皮膚病、
 (用量)二〇、〇―四〇、〇

○偪里設林(主治)密尿病、防護藥、溶解、
 (外用)不定

○偪里設林軟膏(主治)軟膏配伍料、
 (用量)〇、五―二、〇

○偪兒謨技兒撒謨(主治)收斂、皮膚病、
 (用量)〇、〇一―二、五

○括矢亞(主治)苦味、健胃、
 (用量)一、〇―一、五

○括矢亞丁幾(主治)苦味、健胃、
 (用量)一〇〇、〇―二〇〇、〇

○過硫酸鐵液硫酸ヲ化學式
 (主治)解毒劑ノ成分
 (極量)一回〇、〇三―一日〇、二

○過沃度化汞赤色沃度化 (主治)解癩
 (用量)〇、〇五―〇、一五

○過滿俺酸加儻謨(主治)消毒、防腐、試藥、除臭、收斂、
 (用量)純品ヲ內用ニ供スルヲ稀ナリ

○過格魯兒化鐵生格魯兒化鐵(主治)收斂、
 (用量)純品ヲ內用ニ供スルヲ稀ナリ

- 過格魯兒化鐵液(半格魯兒化鐵)(主治)收斂、止血、試藥、(用量)〇、二一〇、七
- 還元鐵水素元鐵(主治)強壯、(用量)〇、〇二一〇、五
- 偏荅百兒加トラウマチン(主治)繃帶、醫科用、(外用)不定
- 偏荅百兒加液(主治)繃帶料、(外用)不定
- 偏蘇青蘇花(主治)蠍虫、(用量)一五、〇一二〇、〇
- 枸橼酸(主治)清涼、(用量)五、〇
- 枸橼酸鐵(主治)強壯、(用量)〇、一一〇、五
- 枸橼酸鈣液(主治)強壯、(用量)〇、五一一二、〇
- 枸橼酸鐵安母紐護(主治)強壯、(用量)〇、二一〇、五
- 枸橼酸鐵規尼涅(主治)強壯、(用量)〇、一一〇、五
- 枸橼油檸檬油(主治)調味、(用量)〇、〇六一〇、二五
- 枸橼油佛手油(主治)調味、(用量)〇、五一一二、〇
- 苦味丁幾(主治)興奮、健胃、(用量)一、〇一五、〇
- 苦味酒(主治)興奮、健胃、(用量)一、〇一五、〇
- クエプライ(主治)呼吸困難症、(用量)〇、〇五一〇、一
- (極量)一回一、五二日八、〇
- (用量)〇、三一二、〇
- 葯刺巴根(主治)咬下、(用量)〇、三一二、〇
- 葯刺巴丁幾(主治)咬下、(用量)〇、五一四、〇

- 葯刺巴脂(主治)咬下、(極量)一回一、〇一日三、〇
- 葯刺巴石鹼(主治)咬下、(用量)〇、一一〇、五
- 藥用石鹼(主治)賦形藥、灌腸料、(用量)賦形藥ナル故ニ不定
- (用量)〇、五一二、〇
- 滿那(主治)下泄、(用量)一〇、〇一六〇、〇
- (外用)不定
- (用量)一日三百立方仙迷
- (用量)〇、五一一二、〇
- (量)五、〇一一〇、〇
- (用量)〇、〇五一〇、一
- (用量)〇、五一一二、〇
- (用量)五、〇一一〇〇、〇
- (用量)一回〇、一一日〇、五
- (用量)〇、五一一二、五
- (用量)一、〇一二、五
- (用量)〇、二五一、〇
- (用量)〇、〇〇一五、〇〇一五
- (用量)〇、〇〇一五、〇〇一五
- 鯨蠟(主治)膏藥料、
- ×ケフヒール(主治)健胃、強壯、(用量)〇、五一一二、〇
- 桂皮(主治)健胃、調香、調味、(量)五、〇一一〇、〇
- 桂皮丁幾(主治)健胃、調味、調香、(用量)〇、〇五一〇、一
- 桂皮油(主治)健胃、調味、驅風、(用量)〇、五一一二、〇
- 桂皮精(主治)調味、健胃、(用量)五、〇一一〇〇、〇
- 桂皮水(主治)健胃、調、調香、(用量)一回〇、一一日〇、五
- 結麗阿曹篤(主治)防腐、(用量)〇、五一一二、五
- 縹草(主治)鎮痙、(用量)〇、五一一二、五
- 縹草丁幾(主治)鎮痙、(用量)〇、二五一、〇
- 健質亞那龍腦(主治)苦味、健胃、(用量)〇、〇〇一五、〇〇一五
- 親羅謨臭素(主治)試藥、腐蝕、消毒、(用量)〇、〇〇一五、〇〇一五

- 親羅謨依質兒(主治)麻醉、
(用量)五、〇—三〇、〇
- 親羅謨化加爾母烏魯加里(主治)麻醉、
(用量)〇、二五—二、五
- 親羅謨化樟腦(主治)鎮痙、
(極量)一回〇、三一—二、〇
- 親羅謨水素酸規尼涅(主治)解熱、神經、諸病、
(用量)〇、二四—一、〇
- ×フヘナアツエチン(主治)解熱、鎮痛、
(用量)〇、五—〇、七
- 法列兒水亞砒酸加爾母(主治)變質、強壯、
(極量)一回〇、五—一日二、〇
- 沸騰枸橼酸麻個涅叟謨(主治)制鎮、瀉下、
(用量)一五、〇—三〇、〇
- 沸騰散(主治)制鎮、鎮吐、瀉下、
(用量)五、〇—一五、〇
- 藪方蘆薈丁幾(主治)下泄、苦味、健胃、
(用量)一、〇—二、〇
- 藪方刺賢堙兒丁幾(主治)刺戟、
(用量)一、〇—三、〇
- 藪方撒兒砂巴利兒刺舍里別(主治)解凝、
(用量)五、〇—一五、〇
- 藪方旃那浸(主治)峻下、
(用量)一〇、〇—一五、〇
- (、)呀囉仿謨(主治)麻醉、試藥、
(用量)〇、二—一、〇
- ×コロチンチン(主治)下劑、
(用法)皮下注〇、〇—一〇、〇二
- ×コニイン(主治)局所鎮痛、
(極量)一回〇、〇〇—一日〇、〇〇三
- 呀囉仿謨精(主治)麻醉、
(用量)一、〇—三、〇
- ×コト皮(主治)止瀉、
(用量)一、五—二、〇
- 格魯胃謨(主治)膠着藥、縛帶藥、
(用量)不定

- ×コトイン(主治)止瀉、
(用量)〇、〇〇五—〇、〇五
- 格魯兒那篤倫液(主治)試藥、防腐、刺戟、
(用量)〇、二—一、〇
- コルヒチン(主治)鎮痛、
(用量)〇、〇〇〇五—〇、〇〇二
- 格魯化那篤爾母食鹽(主治)止瀉浴料、癩癩、吃逆、
(用量)不定
- 格魯兒化亞鉛(主治)腐蝕、收斂、
(用量)〇、〇〇一五—〇、〇一五
- 格魯兒化安母紐謨補砂(主治)刺戟性祛痰、試藥、
(用量)〇、二五—一、〇
- 格魯兒酸加爾謨加那(主治)防腐、收斂、
(用量)〇、一—〇、五
- 格魯兒酸加爾謨加那(主治)防腐、收斂、
(用量)二錠—三錠
- 格魯兒石灰(主治)防腐、消毒、試藥、
(用量)〇、三—〇、五
- 格魯兒水(主治)防腐、消毒、試藥、
(用量)二、〇—五、〇
- ×コツファイエン(主治)利尿、
(用量)一日〇、〇五—〇、二
- 古魯聖篤(主治)峻下、
(極量)一回〇、三—一日一、〇
- 古魯聖篤丁幾(主治)峻下、
(用量)〇、二—一、〇
- 古魯聖篤越幾斯(主治)峻下、
(極量)一回〇、〇五—一日〇、二
- 古魯聖篤非沃斯失亞謨斯丸(主治)下池、
(極量)一回〇、〇五—一日〇、二
- ×コティン(主治)催眠、鎮痛、
(極量)一回〇、〇五—一日〇、二
- 古倫僕(主治)健胃、止瀉、
(用量)〇、五—二、〇

- 古倫僕越幾斯(主治)健胃、止瀉、
- ×コンツランゴ皮(主治)痲腫、
- 五倍子(主治)收斂、
- 五倍子丁幾(主治)收斂、
- 枯礬乾礬 乾礬亞兒密紐(主治)收斂、
- 格魯謨酸(主治)腐蝕、
- 古爾矢屈謨子(主治)變質、
- 古爾矢屈謨丁幾(主治)變質、
- 古爾矢屈謨酒(主治)變質、
- 骨湃波拔兒撒謨(主治)分泌制限、殺虫、
- 骨湃波膠囊(主治)淋疾、
- 骨炭(主治)瓦斯吸收藥、防臭、解毒、
- 護謨硬膏(主治)刺戟、收斂、
- 護謨安母尼亞幾安母尼亞幾(主治)刺戟性祛痰、通經、
- 護謨散(主治)配伍藥、
- 黑酸化滿俺滿俺(主治)消毒、蒸劑、萎黃病、
- 咖啡涅(主治)興奮、鎮吐、利尿、

- (用量)〇、五—一、〇
- (用量)一日二五、〇—三〇、〇
- (用量)〇、二—一、〇
- (用量)〇、七—一、〇
- (外用)不定
- (用量)〇、〇五—一、〇、二五
- (極量)一回二、〇 一日六、〇
- (極量)一回二、〇 一日六、〇
- (用量)〇、五—二、〇
- (用量)一日二箇—六箇
- (用量)〇、五—二、〇
- (外用)不定
- (用量)〇、二—一、〇
- (用量)四、〇—五、〇
- (用量)〇、二—一、〇
- (極量)一回〇、二 一日〇、六

- 胡麻油(主治)緩和、調劑料、
- 古埤乙涅(主治)催眠、鎮靜、
- (注)×鹽酸エフエドリン(主治)瞳孔散大、

- (用量)チレフ油ニ代用ス
- (極量)一回〇、〇五 一日〇、二
- (外用)十一—十五%

- 英法沸騰散(主治)清涼、鎮吐、
- 英法粘着硬膏粘着硬膏(主治)蓋硬着、
- ×エウラニミン(主治)下劑、
- 依的兒(主治)興奮、局所麻酔、試藥、
- 依的兒性鐵丁幾鐵丁幾(主治)興奮性强壯藥、
- ×エキサルギン(主治)鎮痛、
- 鉛糖糖酸鉛(主治)收斂、試藥、
- 鉛醋次醋酸鉛液(主治)收斂、試藥、
- 鉛醋軟膏次醋酸鉛軟膏(主治)收斂、
- 鹽酸(主治)腐蝕、試藥、清涼、健胃、
- 鹽酸亞剝莫兒比涅(主治)催吐、健胃、
- 鹽酸規尼涅(主治)解熱、強壯、健胃、
- 鹽酸聖古尼涅(主治)鹽酸規尼涅ニ全シ
- 鹽酸必魯加兒必涅(主治)發汗、吐瀉、瞳孔、收斂、

- (用量)〇、一—〇、二
- (用量)〇、三—一、五
- (用量)〇、五—二、〇
- (用量)〇、〇三—〇、四
- (極量)一回〇、一 一日〇、五
- (用量)五十倍—百倍トシ外用ニ供ス
- (用量)外用ナル故ニ不定
- (用量)〇、二—一、〇
- (極量)一回〇、〇一 一日〇、〇五
- (用量)和胃強壯〇、〇二—〇、一五
- (用量)一、〇—二、四
- (極量)一回〇、〇三 一日〇、〇六

○鹽酸莫兒比涅(主治)麻醉、鎮痙、
 ○鹽酸古加乙涅(主治)麻醉、鎮靜、
 ×エメチン(主治)祛痰、解熱、刺戟、

(極量)一回〇、〇三 一日〇、一
 (極量)一回〇、一 一日〇、四
 (用量)〇、〇〇一—〇、〇〇二
 (外用)不定

(て)○的列並底(主治)刺戟

○的列並底油(主治)神經病、肺壞疽、刺戟性祛痰藥、磷中毒(用量)〇、三—二、〇
 ×デルマトール(主治)防腐、

(用量)二、〇 外用不定

○鐵粉(主治)強壯、

○鐵酒(主治)強壯、

(用量)四、〇—一五、〇

○澱粉(甲)山藥粉(主治)配伍料、

(用量)配伍料ナルヲ以テ不定

(あ)○阿片(主治)麻醉、止渴、

○阿片(乙)罂粟(主治)配伍料、

(極量)一回一、五 一日五、〇

○阿片丁幾(主治)阿片ニ同シ

(外用)不足

○阿片硬膏(主治)麻醉、

(極量)一回〇、一五 一日〇、五

○阿片越幾斯(主治)麻醉、止渴、

(用量)一、〇—二、五

○阿片安息酸丁幾(主治)鎮痙、祛痰、

(用量)四、〇—一、五

○阿片舍利別(主治)鎮痙、止渴、

(用量)一日二、〇—三、〇

×アドニン(主治)心臟調節藥、

(用量)四、〇—八、〇

○亞硫酸(主治)防腐消毒、

○亞硫酸那篤留護(亞硫酸)(主治)防腐、繃帶料、
 ×アガリチン(主治)盜汗、
 ○亞兒尼加花(主治)衝動、
 ○亞兒尼加根(主治)衝動、
 ○亞兒尼加丁幾(主治)衝動、
 ×アヨニチン(主治)鎮痛、解熱、
 ×アンチチルウイン(主治)鎮痛、解熱、
 ○亞兒答亞根(亞兒答)(主治)緩和、配伍料、
 ○亞拉比亞護護(主治)緩和、配伍料、
 ○亞拉比亞護漿(主治)緩和、配伍劑、
 ×アンチピリン(主治)解熱、鎮痛、
 ○亞麻仁(主治)緩和、
 ○亞麻仁粉(主治)緩和、
 ○亞麻仁油(主治)緩和、
 ×アンチテルミン(主治)解熱、
 ○阿魏(主治)鎮痙、驅風、祛痰、
 ○阿魏丁幾(主治)鎮痙、

(用量)〇、五—一、五
 (用量)〇、〇〇五—〇、〇一
 (用量)〇、三—四、〇
 (用量)〇、三—四、〇
 (用量)〇、〇—一、〇
 (用量)〇、〇—一、〇
 (用量)〇、〇—一、〇
 (用量)二、〇—一、〇、〇
 (用量)三、〇—四、〇
 (用量)二、〇—一、〇、〇
 (用量)一、〇—一、〇、〇
 (用量)一、〇—二、〇、〇
 (用量)一回〇、五 一日四、〇
 (用量)五、〇—一五、〇
 (用量)五、〇—一五、〇
 (用量)五、〇—一五、〇
 (用量)未定
 (用量)〇、〇—一、〇、一
 (用量)一、〇—三、〇

- × テセプトル (主治) 防腐, (外用) 五—十%
- 亞砒酸 (主治) 變質, 強壯, (極量) 一回〇、〇〇五 一日〇、〇一
- 亞砒酸加留誤液 法列氏水 (主治) 變質, (極量) 一回〇、五 一日二、〇
- 亞硝酸亞密兒 (主治) 鎮痙, (用量) 二滴—五滴
- 阿仙藥 (主治) 收斂, (用量) 〇、五—一、五
- 阿仙藥丁幾 (主治) 收斂, (用量) 一、〇—三、〇
- 安知謨尼酒 杜酒 (主治) 祛痰, 吐催, (用量) 一〇、〇—二〇、〇
- 安息香 (主治) 只々薰蒸散トシテ用ユ、 (用量) 〇、二五—一、〇
- 安息香丁幾 (主治) 皮膚病, 化粧性洗滌水, (外用) 不定
- 安息香酸 (主治) 祛痰, 防腐, 興奮, (用量) 〇、〇五—一、〇、五
- 安息香酸那篤留誤 安息香酸 (主治) 祛痰, 解熱, (用量) 一、〇—二、〇、〇
- 安母尼亞茴香精 加亞溫水 (主治) 祛痰, 興奮, 調香, (用量) 〇、二五—一、〇、五
- 安母尼亞風謨 安母尼亞 (主治) 刺戟性祛痰, 通經, (用量) 〇、二—一、〇、〇
- 安母尼亞擦劑 擦劑 (主治) 刺戟, (外用) 不定
- 安母尼亞水 水 (主治) 興奮, 試藥, 腐蝕, 刺戟, (用量) 〇、一—一、〇、五
- 安知歇親林 (主治) 解熱, 鎮痛, (用量) 〇、一五—一、〇
- (さ) × サリチン (主治) 解熱, (用量) 一日二、五—一六、〇

- 撒里矢爾酸 (主治) 防腐, 解熱, (用量) 〇、〇五—一、〇
- × 撒里矢爾酸蒼鉛 (主治) 慢性腸胃諸病, (用量) 〇、三—一、〇
- × 撒里矢爾酸規尼涅 (主治) 解熱, (用量) 〇、一—一、〇、五
- × 撒里矢爾酸利胃謨 (主治) 解熱, 鎮痛, (用量) 一日四、〇
- × 撒里矢爾酸水銀 (主治) 驅梅, (用量) 一日〇、〇—一
- × 撒里矢爾酸麻偏涅失亞 (主治) 防腐, (用量) 一日三、〇—六、〇
- 撒里矢爾酸那篤留誤 (主治) 解熱, 發汗, (用量) 〇、五—七、五
- 撒里矢爾酸比蘇斯 知密涅 (主治) 麻醉, 眼內壓減少, (極量) 一回〇、〇〇一 一日〇、〇〇三
- × ザリピリン (主治) 解熱, 鎮痛, (用量) 一日三、〇—八、〇
- 撒里聖 (主治) 解熱, (用量) 〇、二五—一、五、〇
- 撒爾比亞 (主治) 盜汗, 強壯, (用量) 〇、五—二、〇
- 撒兒沙巴利刺 (主治) 變質, (用量) 一、〇—二、五
- 沙列布 (主治) 緩和, 包撮, (用量) 三、〇—五、〇
- 桑寶 (主治) 調味, (用量) 一五、〇
- 桑實舍利別 (主治) 調味, (用量) 二〇、〇
- 薩砂富拉斯 (主治) 解凝, (用量) 〇、五—一、〇
- 醋酸 醋酸 (主治) 腐蝕, 清涼, 防腐, 解毒, 試藥, (用量) 〇、五—二、〇

- 醋酸加留謨(主治)利尿、試藥、
(用量)一、〇—三、〇
- 醋酸那篤留謨（俗名）(主治)利尿、試藥、
(用量)二、〇—五、〇
- 醋酸安母紐謨（俗名）液（俗名）利精（俗名）(主治)發汗、
(用量)二、〇—七、五
- 泊笑蘭(主治)發汗、通經、驅風、健胃、
(用量)〇、五—一、〇
- 泊笑蘭丁幾(主治)泊笑蘭ニ全シ
(用量)〇、五—二、五
- 珊篤寧(主治)驅虫、
(極量)一回〇、一—一日〇、三
- 酸化麻偏涅（俗名）土（俗名）(主治)制酸、瀉下、酸類中毒、
(用量)〇、二五—一、〇
- ×酸化沃度蒼鉛(主治)防腐、
(用量)一日〇、二—〇、六
- 酸化鉛（俗名）膏藥料、
(外用)不定
- ×三鹽化沃度(主治)消毒、防腐、
(外用)千倍—千五百倍
- 酸化亞鉛(主治)收斂、神經藥、
(用量)〇、〇五—〇、五
- 酸化亞鉛軟膏(主治)收斂、
(外用)不定
- 酸化安知母紐謨(主治)祛痰、
(用量)〇、〇五—〇、一五
- 酸性芳香丁幾（俗名）樟腦（俗名）(主治)衝動、健胃、清涼、
(外用)〇、五—一、五
- ×サツカリ（俗名）ン(主治)嗜好品、
(用量)不定
- (キ)○揮發芥子油(主治)刺戟
(外用)不定

- 揮發苦扁桃油(主治)麻醉、
(用量)一回〇、〇五—一日〇、二
- 規尼涅(主治)解熱、強壯、
(用量)〇、〇二五—一、〇
- 規那(主治)強壯、收斂、
(用量)〇、三—二、〇
- 規那丁幾(主治)強壯、健胃、
(用量)一、〇—四、〇
- 規那越幾斯(主治)健胃、強壯、
(用量)〇、二—一、〇
- 規那酒(主治)健胃、強壯、
(用量)三〇、〇—一〇〇、〇
- 規納乙實涅(主治)解熱、
(用量)〇、〇五—七、二、〇
- 魚膠(主治)膏藥料、
(外用)不定
- 吉納(主治)收斂、
(用量)〇、五—二、〇
- 強安母尼亞水(主治)興奮、試藥、
(用量)吸入藥トナス故ニ定メカタシ
- 稀鉛液（俗名）見度（俗名）水（俗名）(主治)收斂、
(外用)不定
- 稀硫酸(主治)清涼、試藥、
(用量)〇、二五—一、〇
- 稀鹽酸(主治)清涼、健胃、試藥、
(用量)〇、四—二、〇
- 稀醋酸（俗名）純（俗名）(主治)清涼、試藥、亞爾加里中毒、刺戟瀉腸、
(用量)〇、五—二、〇
- 稀酒精(主治)製劑用、
(用量)製劑ナル故ニ不足
- 稀硝酸(主治)肝臟病試、清涼、止瀉、
(用量)〇、二—四、〇
- (セ)○有加里布丟斯(主治)下痢、間歇熱、下利、防腐、
(用量)一、〇—三、〇

- 有加利布丟丁幾(主治)間歇熱、
(用量)三、〇—三〇、〇
- 有加利布丟斯油(主治)有加利布斯ニ全シ
(用量)一、〇—二、〇
- 油精(主治)調味料、
(用量)調味料ナル故ニ不定
- 癒瘡木(主治)解凝、利尿、
(用量)五、〇—五〇、〇
- 癒瘡木丁幾(主治)利尿、解發、
(用量)一、〇—二、〇
- 癒瘡木脂(主治)解凝、發汗、
(用量)〇、三—一、〇
- (め)×メチレン青(主治)間歇熱、
(用量)一、〇
- 迷迭香油(主治)興奮、
(用量)〇、〇—五—〇、一
- ×メチラル(主治)催眠、
(用量)五〇、〇—一六〇、〇
- 綿馬(主治)織虫、
(用量)二、〇—二〇、〇
- 綿馬越幾斯(主治)織虫、
(用量)二、〇—一〇、〇
- (み)○密兒拉(主治)祛痰、通經、
(用量)〇、二—一、〇
- 密兒拉丁幾(主治)祛痰、通經、
(用量)〇、五—二、〇
- ×ミルトール(主治)消毒、
(用量)〇、三—〇、四五
- 明礬硫酸亞鉍經母加個(主治)收斂、
(用量)〇、一—一、〇
- (し)○柴檀赤檀木(主治)着色料、
(用量)純品ヲ醫用ニ供スルコトナシ
- ×商陸越幾斯(主治)利尿、
(用量)一日〇、四—〇、七

- 昇汞過錳化水(主治)解凝、防腐、消毒、試藥、
(極量)一回〇、〇三 一日〇、一
- 昇華硫黃硫黃(主治)緩下、解凝、
(用量)下泄ニハ〇、五—二、〇
- 樟腦反腦片腦(主治)興奮、神經藥、
(用量)〇、〇—三〇、三〇
- 樟腦精片腦丁幾(主治)興奮、刺戟、防腐、
(用量)〇、五—三、〇
- 松脂(主治)刺戟、膏料、
(外用)不定
- 松脂硬膏粘着硬膏(主治)刺戟、收斂、
(外用)不定
- 次炭酸鐵(主治)強壯、
(用量)〇、一—〇、五
- 支奈支奈(主治)蛔虫、驅虫、
(用量)〇、〇—五—四、〇
- 薔薇油(主治)調香、
(用量)純品ヲ醫用ニ供スルコト稀ナリ
- 朱赤色硫化水(主治)解凝、
(用量)〇、一—一、〇
- 縮砂(主治)健胃、調味、
(用量)〇、二五—一、〇
- 赤降汞赤色硫化(主治)解凝、
(用量)一回〇、〇三 一日〇、一
- 赤降汞軟膏赤色硫化汞軟膏(主治)解凝、
(外用)不定
- 止血綿(主治)止血、
(用法)空洞内ノ出血ニ止血ノ爲メ外用ス
- 蜀葵舍利別亞細亞舍利別(主治)調味緩和、
(用量)五、〇—一〇、〇
- 鞣酸鞣酸(主治)收斂、試藥、止血、亞爾加替乙度中毒、
(用量)〇、〇—二五—〇、五
- ×鞣酸大麻素(主治)催眠、
(用量)〇、二五—〇、五

- 鞣酸錠原藥(主治)收斂、止血、亞爾加乙度中毒、
(用量)一錠—三錠
- 麝香(主治)興奮、芳香、
(用量)〇、一—〇、七五
- 菖蒲泥菖根(主治)芳香、健胃、
(用量)〇、五—二、〇
- 生薑(主治)健胃、芳香、調味、香料、
(用量)〇、二五—一、五
- 生薑丁幾(主治)健胃、
(用量)〇、五—一、〇
- 生薑舍利別(主治)健胃、調味、
(用量)五、〇—一〇、〇
- 次亞磷酸加兒叟謨次亞磷酸石灰(主治)變質、
(用量)〇、三—〇、五
- 蓆酸攝留謨(主治)鎮吐、麻醉、
(極量)一回〇、三—一日一、五
- 酒精酒精(主治)興奮、製劑用、消毒、
(外用)不定
- 酒石酸酒石酸(主治)清用、試藥、
(用量)〇、三—一、〇
- 酒石酸加留謨(主治)清涼、緩下、利尿、
(用量)〇、五—二、〇
- 酒石酸加留謨那篤留謨糖尼同留謨(主治)緩下、利尿、
(用量)下劑三、七五—五、三〇〇〇
- 酒石酸鐵加留謨利亞留謨(主治)強壯、
(用量)〇、三—一、〇
- 次硝酸蒼鉛錐基性硝酸蒼鉛(主治)收斂、包攝、止渴、
(用量)〇、二五—一、二五
- 神効石銅鹽、砷化銅(主治)收斂、
(外用)不定
- 人工加兒爾斯泉鹽(主治)下泄、
(用量)六、〇—二〇、〇
- 蔓澄茄(主治)淋疾、實布的利亞、
(用量)一、〇—五、〇

- ×ピドロヒノン(主治)醱酵制止、解熱、
(極量)一回〇、八—皮下注二十倍
- ×ピリダン(主治)反射、興奮、
(外用)二、〇—五、〇
- ×ヒクロトキシン(主治)盜汗、
(用量)〇、〇〇八—〇、〇一
- 冰醋酸強酸水酸(主治)試藥、腐蝕、
(用量)〇、二五—一、〇
- ×ピトロアセチン(主治)解熱、鎮痛、
(用量)一日〇、一
- 非沃斯失亞謨斯非沃斯(主治)鎮痙、
(極量)一回〇、三—一日一、五
- ×ヒチアミン(主治)催眠、
(用量)〇、〇〇一—〇、〇〇三
- 非沃斯失亞斯越幾斯(主治)鎮痙、
(極量)一回〇、二—一日一、〇
- ×ヒプロン(主治)催眠、
(用量)〇、二—〇、五
- 葛麻子油カスカル油(主治)下泄、
(用量)一五、〇—三〇、〇
- ×ヒノリン(主治)防腐、解熱、
(外用)五百五十倍
- 砒石解毒劑(主治)藥名ノ如シ
(用量)一〇〇、〇—二〇〇、〇
- ×ヒロゲン(主治)解熱、
(用量)一回〇、二—一〇、二八
- 木炭(主治)瓦斯吸收藥、除臭、解毒、
(用量)〇、五—一、〇
- 木參兒(主治)防腐消毒、
(用量)〇、一—一、〇
- 制酸散(主治)藥名ノ如シ
(用量)〇、五—二、五
- 精製硫黃(主治)解凝、緩下、驅虫、
(用量)解凝ニハ一、〇—下泄ニハ四、〇

- 精製蜂蜜(主治)調味、包攝、
(用量)純品ヲ獨立シ醫用ニ供スルナシ
- 精製骨炭(主治)瓦斯吸收、除臭、解毒、
(用量)〇、五—二、〇
- 精製的列並底油(主治)神經病、肺壞疽、刺戟性祛痰藥、磷中毒、(用量)〇、三—二、〇
(外用)不定
- 精製綿(主治)繃帶用、
(用量)下劑ニハ七、五—三〇、〇
利尿ニハ〇、五—一三〇、〇
- 攝尼越篤鹽(主治)緩下、利尿、
(用量)五、〇—一〇、五
- 接骨木花(主治)發汗、
(用量)〇、五—一、五
- 攝涅瓦(主治)祛痰、
(用量)一〇、二
- 攝涅瓦舍利別(主治)祛痰、
(用量)〇、五—二、〇
- 小兒散若士夫黃散(主治)制酸、緩下殊ニ小兒ニ用ユ
(用量)〇、〇五—〇、三
- 消酸(主治)腐蝕、肝病、試藥、
(用量)〇、〇三—一、五
- 消酸加留謨硝石劑(主治)利尿、消炎、清涼、
(用法)一紙ヲ磁器ニ投シ焚燒シ吸入
(用量)硝酸銀一比スレバ作用一倍弱ナリ
- 硝石子紙(主治)喘息、
(用量)一回〇、〇三—一日〇、二
- 硝酸銀加硝石(主治)腐蝕、
(用量)一回〇、〇一—一日〇、〇二
- 硝酸銀(主治)腐蝕、收斂、神經病、試藥、
(用量)三〇、〇—六〇、〇
- 硝酸斯篤里幾尼涅(主治)刺戟、神經病、
(用量)五、〇—一〇、〇
- 石榴根皮(主治)蠶虫、
- 柘榴根皮越幾斯(主治)蠶虫、

- 石炭酸フェニール(主治)防腐、消毒、腐蝕、
(極量)一回〇、一—一日〇、五
- 石炭酸水銀(主治)驅蟲、
(用量)一日〇、〇二—〇、〇五
(外用)不定
- 石炭酸水(主治)防腐、消毒、
(外用)不定
- 石灰液石灰水(主治)制酸、骨病、試藥、實布の里、修酸、中毒(用量)五〇、〇—一〇〇、〇
(外用)不定
- 石炭擦劑(主治)包攝、
(外用)不定
- 石驗流動擦劑流動オボルタルトック(主治)刺戟、
(外用)不定
- 石松子(主治)丸衣料、散布料、
(極量)一回〇、〇三—一日〇、一
- 化汞(主治)解凝、
(用量)〇、〇三—一、〇
- 石油偏陳(主治)試藥、防腐、殺虫、麻酔、
(用量)二、〇—五、〇
- 旃那(主治)峻下、
(用量)一、〇—四、〇
- 旃那舍利別(主治)峻下、
(用量)三、〇—四、〇
- 旃那砥劑下劑(主治)峻下、
(用量)〇、一—〇、五
(外用)不定
- 水銀(主治)解凝、驅虫、
(外用)一、五—二、〇
- 水銀硬膏(主治)解凝、
(用量)解凝ニハ一丸 下劑ニハ三丸
- 水銀軟膏(主治)解凝、
(用量)二、〇—四、〇
- 水銀丸水銀丸(主治)解凝、下泄、
- 水製大黃丁幾(主治)健胃、

×ステノカルピン(主治)瞳孔散大、
 (用量)點藥五十倍
 ×ストロファンチン(主治)心臟調節、
 (用量)一回〇.〇〇〇〇〇一〇.〇〇〇〇三
 ×ストロファンツス丁幾(主治)心臟調節、
 (用量)一日四十滴
 ×ブルフサナル(主治)催眠、
 (用量)一回一.〇—三.〇

小兒老人藥物用量改算法

初生乃至一年	十分ノ一
二年乃至四年	八分ノ一
五年乃至七年	五分ノ一
八年乃至十年	四分ノ一
十一年乃至十四年	二分ノ一
六十五年乃至七十年	三分ノ二
七十年乃至八十年	二分ノ一

右藥物主治用量一覽表ハ醫士中川幡之輔氏ノ編纂スル所ニシテ醫事新聞第四百十五號附録ヨリ抄ニ轉載セルモノナリ

明治
 廿七年 二月廿六日 發行
 廿九年 二月廿九日 再發行
 卅二年 二月廿九日 再發行
 卅四年 二月廿九日 再發行
 卅六年 二月廿九日 再發行
 卅八年 二月廿九日 再發行
 卅九年 二月廿九日 再發行
 卅九年 二月廿九日 再發行

正金七拾五錢



著者兼發行者 恩田重信
 印刷所 東京市神田區通り新石町十六番地 木村信行
 印刷所 東京市神田區通り新石町十六番地 二六社
 發兌所 東京市京橋區南鍋町二丁目貳番地 東京醫事新誌局

賣 捌

東京本郷區湯島切通坂町	南	江	堂
同 日本橋區三丁目	丸	善	書
同 本郷區龍岡町	吐	鳳	堂
同 神田區鍛冶町	朝	香	屋
同 本郷區春木町三丁目	穆	々	堂
同 本郷區春木町三丁目	英	蘭	堂
大坂心齊橋筋一丁目	松	村	八
京都寺町通二條	若	林	茂
			一
			郎
			衛

91

278

終