

時ノミ又ハ内容全ク不<sub>レ</sub>管ニシテ謔妄ニハ應<sub>レ</sub>施セラレヌ<sub>レ</sub>アリ甚稀ニハ追跡家ノ影  
 ノ如キ形象ヲバ知覺スル<sub>レ</sub>アリ  
 其意識中ニ疾病性敵視機轉アルヤ之ガ反應トシテ感動<sub>レ</sub>ノ状態アル<sub>レ</sub>アリ時ニ甚  
 劇烈ナリ而モ其續發性感動ニアラザルハ(時ニ發呈スル)苦悶症ノミニシテ他ハ皆續  
 發性感動ナリ自家先ヅ妄想ノ爲ニ變化シ。感動ハ之ニ對シテ起ルモノニシテ云ハ、  
 生理上アルベキノ反應ナリ。偏執性ニ在<sub>レ</sub>リテ妄想ノ初發性ニシテ感動ヨリセズ自家  
 感覺ノ卑下軒昂ヨリセザルハ乃チ躁狂鬱狂ニテ妄想アルモノトノ區別トナルモノ  
 ナリ。夫レ此二病ニ在<sub>レ</sub>リテモ妄想ノ内容ハ同一ナル<sub>レ</sub>アリ而モ其動因ハ大ニ相異レ  
 リ。偏執狂者ハ何ガ爲ニ人ニ追跡セラル、ニ至<sub>レ</sub>リシヤヲ知ラズ自ラ其責ヲ辨ヘズ論  
 理上ヨリ次第ニ我惡圖ニ陥キリシ<sub>レ</sub>ヲ覺ルナレバ鬱狂家ハ其追跡セラル、所以、嘲  
 罵セラル、所以、殺戮セラル、所以ヲ知<sub>レ</sub>リ盡ク之ヲ我罪ニ歸シ自ラ責ヲ引クモノニ  
 シテ其妄想ハ即チ感動機轉ヨリ續發シ其卑下ナル自家感觸ニ纏綿シテ之ニ本ヅク  
 ナリ(微小妄想罪業妄想追跡妄想ヲ患フル人ノ行爲モ亦我命ヲ危クスルト誤想スル  
 ノ意識ニ對シ論理上當然ノ反應タリ  
 患者ノ其妄想ニ對スル<sub>レ</sub>状態ニ就キテハ所動性能動性ノ二期ヲ別ツベシ蓋シ患者ハ

當<sub>レ</sub>初<sub>レ</sub>ハ所動性ニシテ外界ノ妄想ノ爲ニ一變スル<sub>レ</sub>己ハ防禦回避ノ位地ニ立チ窓戶  
 ヲ閉ヂ鎖鑰ヲ固クシ數其住居ヲ改メ自ラ炊ギ自ラ煮或ハ生卵ノミヲ食ヒ常ニ反對  
 毒ヲ懷ニシ遠ク地ヲ避ケ姓名ヲ變シ以テ其所謂追跡家ヲ防ギ自ラ免<sub>レ</sub>ントス然  
 レ其久キニ及ビ事狀ノ益迫ルヤ苦痛漸ク甚ク遂ニ堪ユベカラズシテ其所動性位  
 地ヲ脱スルニ至<sub>レ</sub>ドモ未<sub>レ</sub>タ遠ニ旁人ニ危カラズ危害迫來ノ標號ヲ舉<sub>レ</sub>グ之ガ爲ニ騷  
 擾ナルノミ然レバ旁人多クハ之ニ注意スベキヲ知ラズ患者ハ其誤認セル追跡家ヲ  
 脅嚇シ又或ハ保護ヲ裁判ニ托シ其心ノ如クナラザルヤ乃チ自救<sub>レ</sub>フノ已ムベカラザ  
 ルヲ見テ救急防禦ノ道ヲ講ズルニ至<sub>レ</sub>リ是ニ於テ患者ハ初メテ甚<sub>レ</sub>旁人ニ危險トナリ  
 彼ハ幻覺感動錯覺ノ爲或ハ稍異ムベキノ面貌、舉止、微談ニ接スルヤ忽チ以テ危急薄  
 來ノ暗號トナシ爲ニ人ヲ殺傷スルニ至<sub>レ</sub>ル其舉動タル稍、正當防衛ノ觀アリテ其人ヲ  
 殺スニ決シテ秘密ニセズ白晝稠人中ニ之ヲ屠殺シ其理由ヲ明言シテ憚ルコトナク  
 却テ事ノ遂ゲタルヲ喜ビ揚々之ヲ語り時トシテハ又全然故ナク人ヲ犯襲シ之ニ犯  
 罪上ノ行爲ヲ加ヘ以テ法庭ニ出デ、其追跡家ノ爲ニ辱メラレ公職ヲ免<sub>レ</sub>視セラレダ  
 ル<sub>レ</sub>ヲ明ニスルノ機會ヲ得<sub>レ</sub>ントスル<sub>レ</sub>アリ或ハ又自殺シテ以テ其堪<sub>レ</sub>ベカラザル  
 ノ苦惱ヲ終<sub>レ</sub>ラントスル<sub>レ</sub>アリ



此ノ如クニシテ患者ノ状態ハ直ニ末期性精神衰弱ニ移リ又ハ其前ニ譫妄ノ轉化アリ  
 追跡妄想ハ一變シテ誇大妄想トナリ從來抑壓追跡ヲ蒙リタルモノ乃チ王侯トナ  
 リ將校トナリ祖師大士トナリ世界統御者トナリ宇宙大王トナルヲ見ルナリ此ノ如  
 キノ本人變遷ハ趣味甚多ク少クモ全數ノ三分ノ一ニハ之アリ而シテ皆遺傳アルモ  
 ノニ來ルノミ(くらふとびんぐ)其機轉ノ整然轉化スルハ疑ナク而モ其何ガ爲  
 ニ然ツカハ未タ詳ナラズ唯其中ニハ此代補性誇大妄想ハ識領性心理方法ニヨリテ  
 生ジ患者ガ身ノ不幸ナル爲メ自慰自適ヲ宗教又ハ空想ニ求ムルヨリ來リ又或ハ患  
 者ガ衆人ニ側目セラル、ヤ其他人ト異ル所アルベシトノ考ハ起リ易キモノニシテ  
 注察妄想中ニハ心理上既ニ後ノ誇大妄想ノ地ヲナスベキ原素アリト云フベキナリ  
 又此妄想轉化ニ機質性ノ基礎ナカラズシテ直接ニ神經機制ヨリ出デ不意識性ニ獨  
 自ニ生ズルコト亦多シ

妄想轉化ハ卒然トシテ倏ニ起ルコトアリ感觸變化(例ヘバ磁氣性流過)アリ又ハ患者ガ  
 一定ノ意識状態中ニテ死亡シタリト感ジ其後卒然蘇生シ自家一變シテ新生活中ニ  
 醒覺シ來リタリト覺エテ然ルコト稀ナラズ又或ハ昏迷狀ノ状態消魂大悅狀ノ状態夢  
 ノ如クナル半睡状態臆躁性譫妄中ニ妄想轉化ヲ致スコトアリ然レモ此ノ如キノ急劇

轉化ハ希ニシテ多クハ漸次ニ前驅期ヲ以テ初マルコト猶ホ追跡妄想期ニ前驅症アリ  
 シガ如クナリ患者ハ漸ク世人ガ己ノ高大ナルヲ認メ貴人ガ我ガ爲ニ扈從ヲ止メ敬  
 禮ヲ施シ新聞紙ニハ我血統ノ貴キヲ偶言シ他人又屢之ヲ口ニシ且我ニ鉅萬ノ財產  
 ヲ奉備スルコトヲ語リ路旁ノ人家内ノ人皆己ニ恭敬ナルコトヲ覺エ不意識性ノ精神作  
 業ハ之ニ加ハリテ益之ヲ繁錯糾紛ニシ妄想ハ初メ夢像ニ現ハレテ夢ニ公侯ノ書翰  
 ヲ見偶存ノ譫妄偶讀ノ稗史ノ殘餘ハ之ト交纏シ妄想ハ終ニ事實トシテ或ハ直接ニ  
 或ハ妄覺トナリテ意識ニ上リ之ニ於テカ之ヲ從來ノ追跡妄想ト論理上ニ聯結シ患  
 者ハ初メテ其仇敵ガ高位繼襲者タル己ヲ除カントスル所以ヲ知リ從前ノ追跡ハ其  
 位職ニ堪ユベキト否トヲ考定試驗スルノ時期タリシコトヲ悟ルナリ是ノ故ニ其症狀  
 タル誇大妄想ヲ主トスレモ亦時々追跡妄想ノ發スルアリ二種ノ原發妄想ハ相離レ  
 相駢ビ或ハ又却行ス此經過ヲナセシモノモ亦末期性衰弱ノ期トナルナリ  
 診斷 躁狂ナドヨリ發セシ續發偏執狂ト異ナル所ノモノハ誇大妄想追跡妄想ノ紛  
 ヲ雜糅ナルコト叙智障礙少キコト病候ノ變動少キコト妄想ノ内容ノ稗史ニ似タルコトナリ  
 他ノ麻痺狂ニ來ルガ如キ誇大妄想ニ對シテハ偏執狂妄想ハ變動少ク且系統性ナル  
 ヲ以テ區別スベシ



追跡妄想性偏執狂ノ種類

(ア)理學上ノ追跡妄想アル偏執狂 此症ニ在リテハ諸種ノ感覺異常ニ相當シテ理學上化學上ノ技術機械器具ヲ以テ苦メ惱マサル、ノ妄想アリテ幻覺又ハ諸覺官ノ妄錯ノ之ニ加ハルコアリ

其病ノ發育ハ急性ナルコト屢ナリ大要、旁人ガ己ヲ敵視シ監視スルヲ疑ヒ又幻聽患者ノ所謂電信電話ヲカクル等ハ前ヨリ之レアレモ追跡家ガ直接ニ我身ニ害ヲ加フルモノアルヲ發見スルハ幻聽ノ累堆シテ患者爲ニ大ニ感動シ又身體ニ種々ノ感覺異常アルヲ其仇讐ノ害ヲナスニ歸スルノ後ニアリ是ニ至リテ我ガ仇ハ遠隔ノ地ヨリ我身ニ種々ノ變化障礙ヲ起スベキ方法ヲ用フルコト明白トナリ其想像力ノ活盛ナルヤ其作用方ヲ委細ニ陳述スルコト常ナリ追跡家ノナス所ハ魔語咒文又ハ噫氣タルコトアレモ磁氣、電氣、發光器、大ナル鏡、ナルコト多ク患者ノ屢之ニ接遇スルヤ能ク自ラ詳ニ其構造形狀ヲ寫出スルコトアリ其器械タルニアラズ患者ガ受クル所ノ感覺亦一ニアラズ、皮膚ニ球子又縫針ヲ通シ、細キ毒霧ヲ吹キ、身體諸所ニ灼痛、刺痛、錐摩痛ヲナシ、耳ニ磁石ヲ入レ、四肢ヲ意ニ逆ヒテ動カシ、嫌フコトヲ話サシメン爲ニ舌ヲ引キ、胸中ニ車ヲカケテ身ヲ偶人ノ如クニ使ヒ、臟腑ハ毀敗セラレ放棄セラレ、汚物ヲ食物中血

液中ニ灌注シ、便通ヲ止メテ糞ヲ腦ニ注ギ、陰部ヲ刺突シ、精液ヲ搾出シ、齒ヲ毀摧ス、等  
其他一一僂舉スベカラズ或ハ其精神、仇敵ノ爲ニ縱マ、ニセラレ考慮皆爲ニ彼ニ知  
ラレ世ニ知ラルト云フモノアリ(二)重考慮又或ハ患者ガ其加害自家ヲ覺エズシテ其  
結果ノミヲ知覺スルコト少ナカラズ敵或ハ夜間患者ノ眠レル時ニ來リ嫌フベク惡ム  
ベキコトヲナシ陰ヲ弄シ精液糞便ヲ口中ニ入レ骨ヲ交換スレモ患者其時目未ダ醒メ  
ズ明朝ニ至リテ初メテ汚物ノ口ニアリ骨節ノ脱換セラレタル等ヲ知リ而モ皆想像  
ノ結撰スル所ニ過キザルナリ時ニ又誇大妄想ノ混シ來ルコトアレモ必、追跡妄想ヲ以  
テ其主ナルモノトス

(イ)附憑妄想アル偏執狂 憑依妄想ハ理學上追跡妄想ノ一別種ニシテ其仇敵ヲ其身

體中ニ措クナリ此症ハ文明史上ニ興味アルコトニシテカ、ル觀念ハ殆常ニ宗教上ノ  
性質ヲ帶ビタルモノナリ西洋ニ於テハ主トシテ鬼魅ノ憑依ヲ妄信スルニ基キ我邦  
ニ於テハ狐狸ノ憑附ヲ妄信スルニ基クナリ追跡家或ハ耳ニ入り叫喚飛舞シテ患者  
ヲ絶倒セシメ、或ハ多クハ腹中ニ入りテ頭ニ上下シ喉ヲシメ血ヲ凝シ頭ヲ敲キ強テ  
奇異ナル行爲ヲナサシメ腹内ヨリ醜惡褻瀆ナル言語ヲ發スルアリ又或ハ此仇敵ノ  
他ニ我黨與タルモノ入り來リテ他ヲ推排シテ長ク之ト相爭ヒ相罵リ其性善良ニシ



テ己ヲ救助シ彼ニ抗拒スルモノ、如シ是レ所謂本人三重ノ症ナリ  
 妄想ハ患者ノ感應行為ニ影響ナカラズ二者之ガ爲ニ左右セラレ感憤激怒シテ其常  
 ニ己ヲ苦ムルモノ、名ヲ聞クモハ其人空想ナルニ對スル暴行ヲナシ又ハ苦悶激  
 越ノ甚キ片(病初)ニハ自ラ害セントスルヲアリ其仇敵ノ強盛萬能ニシテ抗スベカラ  
 ザル片ニハ種々ノ方法ヲ考ヘテ以テ姑息ノ安キヲ得ントシ奇異ナル容貌舉止姿態  
 ヲナシ又ハ一定ノ語ヲ反覆シ或ハ其寢牀ニ特別ノ防備ヲ設ケ以テ之ガ害ヲ避ケン  
 一ヲ謀ルノミ又同様に目的ヲ以テ自ラ虐シ自ラ傷クルヲモアリ

(ウ)色事上追跡妄想アル偏執狂ニ在リテ色事界ノ感覺ハ證候ノ主位ニ居ルナリ其追  
 跡妄想ハ其原因ニ從ヒテ種々ノ色容ヲナス其誘因ハ大抵皆生殖器ノ機能性疾病機  
 質性疾病ニシテ男子ニ在リテハ手淫過度強迫性色事禁斷麻疾慢性後部尿道炎、及  
 ビ之ニ因スル陰部神經衰弱症、全身神經衰弱症、ナリ(神經衰弱性偏執狂篇參看)女子ニ  
 在リテハ之ト同キモノ、又ハ變位轉位等ノ生殖器病ナリ

其病狀ハ局所又全身ノ神經衰弱症ヲ譬喩狀ニ換想シテ無論理ナルニ在リテ加フル  
 ニ遺精、幻聽、理學上追跡妄想ヲ以テス女子ニ在リテハ「人己ヲ私窺子ト思テ追從ス」  
 「カ、ル風評世上ニ流布シ爲ニ家人友人主人ニ賤棄セラル」ト云ヒ多クハ色情ノ合ハ

ズ契情ヲ破ルニヨリテ來リ初ハ沈鬱憂愁シ頻ニ其理由ヲ疑ヒ漸クニシテ其情郎再  
 ビ己ト何カ關係ヲ得ントシ又ハ己ニ仇報セントテ己ヲ追跡スナド云フ妄想生ズ其  
 初ニハ旁人ノ注視路上ノ事件新聞ノ所載ニ之ヲ推想スルノミナレド既ニシテ漸ク  
 其事實ナルヲ知リ其實證ハ殊ニ夜ニ存シ毎夜其人半醒半睡昏朦ナル時ニ來リテ  
 己ニ淫交シ極メテ汚瀆ニ極メテ狡猾ナル犯襲談話ヲナス醒覺スルニ及ビテハ彼已  
 ニ窓戸ヲ排シ去リテ形影見ルベキナク此ノ如キヲ數度反覆シ遂ニハ晝間目醒ムル  
 時ニ當リテ其無形無影ナル墮子ノ爲ニ色事性犯襲ヲ被ムル(ト妄想スル)ニ至ルナリ  
 此症或ハ兼ヌルニ妊娠妄想ヲ以テシ夜間夢ノ如クニ分婉シテハ又懷孕スト信ズル  
 アリ而シテ患者ノ不安ナル睡後ニモ倦憊ヲ覺エテ唯益其妄想ヲ固フスルアルノミ  
 男子ニ在リテハ此症甚稀ナレドモ亦之ニ相當シテ夜間人來リテ辜丸ヲ抉シ精液ヲ  
 漏ラスナド、信ズ反應上ニハ沈鬱アリ自殺スルアリ旁人ニ衝動性犯害ヲナスヲア  
 リ或ハ憤激シ暴怒シ重器ヲ破壊シ罵詈訛奔馳シ感動ノ甚キ錯亂ノ狀ヲナシ遂ニハ  
 (後期)其舉止全ク濫妄トナルニ至ル或ハ又發揚原素ノ加ハルヲ希ナラズシテ毎夜無  
 數ノ子ヲ婉シ高貴ノ人ト交接シ帝王ヲ姪ミタリナド云フ意想起ルナリ

(エ)嫉妬妄想アル偏執狂 色事上追跡ト甚相似タルハ嫉妬妄想ナリ此症ハ殊ニ女子  
 Paranoia mit Eifersuchtswahne



ニ多ク其經竭期ニ發スルモノナリ其夫ヲ疑フノ心ト身體ニ刺戟ノ消失セルノ意識トノ爲ニ潜伏期トシテ種々ノ沈鬱症、故ナキ恐懼、アリ。刺戟性トナリ狐疑性トナリテ後患者ハ其夫トノ關係ノ一變シ夫、己ヲ冷遇シ其心、他ノ婦ニ傾クヲ覺エ夫ガ隣婦ト談話シ、夜間長ク他處ニ在リ、隣人ノ目撃談話ノ異シキ、吾夫ノ陰險ナル言語、等其他故ナキ、ハ皆其見解ヲ助ケザルナク而モ其絶テ實事ナリトセラ、ルハ夜間他ノ婦ガ敵夫ト寢ヲ共ニスルヲ聽キ又感ズル(妄覺)ノ後ニアリ夫ニ對スル感觸ノ冷却、仇敵狀ノ嫌惡、ハ益甚ク吾面前ニテ夫ガ姦通ヲ濫ニスルノ破廉耻ナルヲ怒リ其耳目ニスル所ノモノハ盡ク其疑惑ヲ深カラシムルモノナラザルナシ

此妄想ニ尋ギテ感應ノ刺戟性仇敵性トナルハ固ヨリニシテ夫ノ後ヲハ追跡シ之ヲ詰責シ甚キハ之ヲ虐待毒殺シ或ハ陰部ヲ犯シ以テ報仇ヲ謀ルニ至ル其症ノ發生ハ準他、速ニシテ後ニハ感動ノ消殺シ又精神衰弱漸ク加ハルニ至ル蓋シ此癡狂ハ偏執狂ノ結果症狀ニアラズシテ女子ニハ屢、經竭期後ニ自發スル精神衰弱ナリ此ニ似タルノ病態ハ男子ニモ屢、之アリ多クハ皆生來癡愚ニシテ前ヨリ嫉妬ニ傾キ姪力微弱ナル人ニ發シ或ハ淫慾盛ニシテ少モ交接セザルモノニ發ス要スルニ此ノ如キモノニ在リテハ妻ノ冷遇又ハ自身ノ淫好感觸ナキ、大ニ妄想ノ發生ニ與力アリ妄想ノ

發成ハ聯合性ニシテ偶然ニ屢、來訪スル人アレハ之ヲ以テ密夫トナシ妻ノ會鬱歎スルヲハ酒ミ來レル密夫ニ謀スルノ暗號トナシ其他夜間ノ音響ハ盡ク皆此ノ如クニ指定セザルナク其妻ヲ排斥シ虐待シ暴行ヲ加フルニ至リ妄聽(時ニハ)妄視ハ妄想ヲ助長シ路上ノ人ハ嘲笑ノ面貌ヲナシ一種ノ舉止ヲ以テ密通スルモノアルヲ示シ己ガ兒女ハ己ニ親マズ己ニ似ズシテ我兒ニアラザルヲ覺エ其後ノ經過ニ於テ妄想ハ一般追跡妄想トナリ被盜妄想、妻ノ密夫ニ金錢財物ヲ授ケンヲ疑フ(被毒妄想トナリ其妻又ハ其誤信スル密夫ニ對シテ甚キ殘暴行爲ヲ加フルニ至ル酒客ニ發スル標式性嫉妬妄想ハ中酒狂ノ篇ニ於テ之ヲ論ゼン

(オ)好訴狂 好訴狂ハ遺傳性神經病ヨリ發スルモノニシテ生來又ハ極メテ幼キ時ヨリ性質ノ發成常ナラズ事毎ニ狂グ可ラサル忌疑アリ生レ付タル道德ノ缺損アリ年長ズルニ從ヒテ其異常ノ性質ハ益較著トナリ法律生活社會生活ニ接スルニ及ヒテ僅微ノ誘因ニヨリテ妄想結成シテ一種ノ悖德狂症トナリ無限ノ自恣アリ他人ノ權利ニ關スル感情ハ減退シ自權利ト他權利トヲ分別スルノ充分ナル智性能力ナシ心理上ヨリ之ヲ見レバ好訴狂ハ追跡妄想ニ入ルベキモノナリ(追跡妄想アル特發偏執狂)唯之ニ異ルハ生命ヲ危クセラル、ヲ恐ル、ヨリモ權利ヲ侵犯セラル、ヲ恐ル



ニアリ妄想ノ起點トナルモノ空想事ニアラズシテ眞實事ナルニアリ又患者ガ被  
 犯者ニアラズシテ自ラ犯侵者タルニアリ實ニ又間尋常偏執狂者ノモノ、如キ被害  
 妄想ノ合併スルコアリ或ハ其妄想ノ一變シテ被害妄想トナルコアリ  
 好訴狂ヲ生來異常アルモノトスルハ其血統及ビ身體精神ノ發育如何ニヨリテナリ  
 べるふるらうすくらふとるびんぐ諸氏ハ其實驗セシモノニ皆祖先血統ノ遺傳素  
 因アリト云ヘリ然レモし<sup>ゆ</sup>れ<sup>の</sup>氏カすべる氏ハ血統ノ遺傳ハ必シモ存セズト稱セリ  
 又少幼發育時ニ神經中樞ノ榮養障礙アルガ爲メニヤアラン頭蓋ノ異態(菱狀頭)又後  
 天性腦髓發育障礙(頭傷)急性腦病多飲殊ニ手淫過度多シト云フ最緊要ナルハ幼時ヨ  
 リシテ精神ノ異常ナルモノニシテ其中又最注目スベキハ其道徳觀念ノ不完全ナリ  
 此病アル者ハ若年ヨリ騙詐偽詐爭論ヲ好ミ教師ヲ換ヘ學校ヲ更メ行ク所ニテ人ト  
 争ヒ人ニ聽カレザレバ動モスレバ己ノ權利ヲ侵害サレタリトシ權利ニ關スル意識  
 ハ充分ナルモ道徳上ノ見解ハ充分ナラズ自恣トナリ憤激性トナリ剛愎驕負ニシテ  
 更ニ謙遜スルコナク自家ノ似而非ナル考慮ヲ固執シテ他人ノ權利範圍ヲ破ルヲモ  
 覺ラズ唯々自恣ノ目的ヲ達セント欲スルニ過ギズ此病アル者ハ又其智力モ多クハ  
 平均以下ニアリ然ラザルモ其論法正キガ如キモ偏ヨリ論斷確ナルガ如キモ僻シ甚

キ謬見ニ陥キリ詭辯トナリ易シ加之觀念ノ障礙アリテ再生觀念ハ原觀念ノ眞寫タ  
 ルコ能ハス爲ニ大ニ事實ノ靚妝ヲ代ヘテ之ヲ是非スルモノナリ此ノ如キ自負心強  
 キ患者ニ取リテ最モ堪ヘ難キハ自驕レル所ニ他ニ卑メラレ自正トスル所ニ他ニ不  
 正ト認メラルコナリ要スルニ此患者ハ年益長シ交際益廣ク一個ノ權利者トナル  
 ニ及ビ他人トノ紛紜ハ常ニ絶ユルコアラズ人世ノ航海ニ舵壞レ橋摧クル迄ハ廢止  
 スベクモアラズ敗訴破産ナドヨリシテ他人ガ刑法上ノ損害ヲ己ニ加フルトノ錯覺  
 起リテ遂ニ被害妄想者トナリ果ルナリ  
 好訴狂ノ第一<sup>◎</sup>次<sup>◎</sup>誘<sup>◎</sup>因<sup>◎</sup>ハ人ト權利ヲ争ヒテ敗レ又ハ誣妄ナル要求ノ拒絕サルコナ  
 リ強項ト無謀トニテ他ト争ヒ己ガ權利ノ爲ニ奮勵シテ法ニ背ク迄モ忌憚スルコナ  
 ク訴狀ヲ却下セラル、毎ニ訴訟ニ敗ル、毎ニ益權利伸張ノ合ハザルコトヲ苦慮シ或  
 ハ控訴ヲナシテ諸法術ニ逼リ自負自信ノ甚キ或ハ辯護人ニテハ足レリトセズシテ  
 自ラ法律書ヲ講ジテ訴訟ノ道ヲ究メ自ラ訴狀ヲ作り自ラ辯論セントスルアリ敗訴  
 ノ爲ニ省慮スルコハナクシテ唯抵抗ト侵犯トヲ益スノミ或ハ被害妄想ヲ起シ來リ  
 勝訴後ニハ非法ナル誹謗ヲ受ルノ感觸ニ移リ敗訴後ニハ怨恨ノ爲メニ禍セラルト  
 ノ考慮ヲ發スルモアリ此際若シ監禁ノ罰ニ遇フコモアラバ其ヨリ無數ノ辨難文章



ヲ草シ色ヲカヘ形ヲカヘテ同一問題ヲ縷陳シ放免セラレ、ヤ忽チ復タ身ヲ此無用ノトニ委ネ毫モ家産職業妻子ヲ顧ルコトナシ此ノ如クニテモ猶ホ志ヲ得ザルヤ自家ノ方正ヲ覺フルノミナラズ他人一般ノ權利ヲ保護スル爲ニモ中止スベカラザルノ義務アリト覺エソレ迄ハ抑ヘシ自覺ハ一時ニ發揚シテ見解省慮理性皆亡ビ從來心理上ノ感情ノ如クナリシモノモ今ゾ純然タル一箇ノ精神病トナリ潛匿セル被害ノ妄想ハ茲ニ初メテ明ニ發現シ己ノ爲メ人ノ爲メ權利ハ伸ベザルベカラズ奸惡ハ發カザルベカラストテ敗訴者一般ノ爲ニ前驅トナリテ力ヲ盡サントシ己ノ不正ヨリ事ノ敗ル、ヲモ覺ラズ法官ニ偏頗黨同收賄アリトシ些細ノ事ヲ舉ゲテ其證左トシ之ヲ怨ムノ極、訴件ヲ棄テ人身攻撃トナリ罵詈訾ト職權侮辱トヲ以テ法庭ノ尊嚴ヲ亂リ己ノ罪ナキヲ掩ハンガ爲ニ罪ナキヲ陷キレ正キヲ誣ヒタリトテ強項厚顔ニ宣告ノ不當ヲ争ヒ罰金償錢租稅ヲ納ル、ヲ肯ゼズ終ニハ法官ヨリシテ法律制度、國務大臣迄ヲ賤惡、奸暴、非行、背盟ノ人ト罵リ甚キハ國家ノ主權者ヲモ云々スルニ至ル此ノ如キ刺戟性ノ悖德性症狀ハ患者ノ言語文章ニヨリテ知リ得ベシ然レモ此ニ至リテモ世人ハ猶此者ノ精神病者ナルヲ知ラザルコトアリ是レ其行事ハ不倫不當ナルヲ免カレザレモ辯論法ノ巧ニ法律ニ通ゼルガ爲ニ誤ラル、ナリ若シ其論辯スル

所ヲ事實ニ比シ其訴訟損害ヲ小權利ノ損害ニ比セバ其健疾常變ハ略明白ナルヘシ好訴狂ハ又危險ノ症狀ヲ發スルコトアリ其疾病ノ爲ニ權利ヲ争ハザルベカラズトスル感觸ハ患者ヲ刑事ニ誘致スルコト稀ナラズ自家ノ權利ヲ侵害スルモノト思ヒ誤リテ他ヲ殺シ又傷ケタルコトハ文書ニ多ク見ル所ナリ  
癡狂院ハ好訴狂ニ在リテハ嫌疑ノモノナラズ蓋シ患者ノ一日モ訴訟ノ外ニ心ヲ安ズル能ハザル院内ニ於テハ自家ノ訴件ヲ痛言放論スルノ機會ヲ得ルコト多ク其間ニハ之ヲ筆録シテ無數ノ書類ヲナスニ違ナキ故ナリ其初メニハ疾病ノ疑ヲ免レテ速ニ出院シ醫士ヲ黨與トシテ鬱積セル新銳ノ氣ニ乘リテ對手ヲ打破ラント心組ムヲ以テ其感應最穩和ナレモ健全ナリトノ診斷モナク己ノ主張ニ與ミスルコトモナキニ及ビテ患者ノ攻撃ハ一轉シテ醫士辯護人ニ向ヒ非法ナル自由褫奪、書翰差押、報告ノ誣妄等ヲ辯難シ又ハ書キ出シ患者ノ慣用セル詐僞、盜賊、不道等ノ名ヲ以テ醫長ヲ罵シリ他ノ不平患者ト黨與シテ抗辯シ又公ニ殊ニ參觀者ニ之ヲ訴ヘナドシ甚キニ至リテハ醫士辯護人ノ生命、病院ノ安全ヲ害センコトヲノミ謀リ其院中制度ニ反スルノ極度ハ時々憤怒、躁暴、破毀、劇甚ナル抵抗、飲食ノ拒絕トナル  
此ノ如キハ經過ノ不良ナルモノナレモ他ノ場合ニハ在院中ノ經過善良ニシテ患者



猶ホ數年來ノ訴件ヲ苦慮シテ權利ノ途ヨリ歩ヲ轉ゼズト雖凡往時ノ感動ハ日ニ消磨シ權利ノ抗辯ヲナスコアルモ醫士ノ箴言又一掬ノ烟草ニテ口ヲ緘スベキ程穩ニナルアリ一見スレバ經過甚良キガ如キモ是レ實ニ進行性遲鈍ノ經過ナリ

治法◎ 好訴狂ノ治療ハ癲狂院ニ托スルノ他ナシ但此處ニ於テ其疾病ノ治療スベシトハ思ハレズ惟リ之ヲ病人トシテ處治スベク其症勢ヲ殺グヲ得ベキノミ然レモ其病院ニ入ルハ多クハ財産ヲ訴訟ノ爲メニ殫亡シ法應ヲ煩勞ニ疲レシメ國制ヲ妨礙シ法庭ニ厭斥セラレ其家人ガ多クハ其妄想ノ侵染ヲ受ケ甚キハ人ヲ傷ケ殺ス等ニ及ビタルノ後ニアリテ病院治療ノ其前ニ及ハザルハ吾人ノ遺憾トスル所ナリ

(一)發揚性偏執狂 (Paranoia expansiva.)

コハ鬱抑性追跡性形種ノモノヨリ希ナリ妄想ノ内容ニ從ヒテ別テ三種トナス發明性偏執狂。宗教性偏執狂。好色性偏執狂。是ナリ

(5)發明性偏執狂 (Paranoia inventoria.)

證候◎ 此病ニカ、ルモノハ通常既ニ素累アリ生來偏僻ニシテ多クハ精神薄弱ニ然ラザルモ(少ナクモ)稟賦ノ偏頗ナル人ニシテ其病症ノ中心ハ自家本人秀拔セリトノ妄想ニシテ其妄想ハ誇大ナル自家感觸アルモノニ發シ且(一部ハ)此ニ基キ其未タ病

ヲナサハル前既ニ其原來ノ性質考慮方直觀方ニ潛藏スルナリ

此ノ偏執狂種ハ主ニ意想結合ヨリ發シ希ニハ幻覺ヨリス其前驅期ハ甚長クシテ其人ノ茫莫夢ミル如キノ本質發明發見未來ノ貴富等ノ架空ナル夢寐。何カ超拔卓越ノ天分アリトノ想考世俗ト懸隔セリトノ誇負等ヲ其徵トス妄想ハ詩人、美術家、發明革命家、宗旨開基者等盛烈ナル事業ニ終始シ其意想ハ精神ノ賦稟ニ從ヒテ奇絶異偏少ナク凡特異奇拔ニシテ一見人ヲ驚カシ且其精神機能ノ偏僻及ビ不調和ナルニ關セズ一定ノ賦稟アルヲ表スルガ爲ニ人多ク之ヲ誤リテ英物ナリトスレモ是レ會其外狀ノ似タルノミ精神力ノ發育ハ調和性ナラズ重厚ニシテ適當ナルヲナク其ノ考慮ノ奇抜ナルモ之ヲ論理上ニ有用ニ應施スルヲ能ハズ現在事物ヲハ批評シ破壞スルノ能ハアレドモ之ヲ創作スルノ能ナキモノナリ此ノ如キ者世間誠ニ多ク現在ノマニテハ甚其心ニ慊ラズ常ニ心ヲ其改良ニ勞シ常ニ世人ガ我英物ナルヲ知ラザルヲ慨シ我不幸ヲ感シ爲ニ或ハ屢偏執狂ノ壘ニ摩シテ將ニ之ニ入ラントスルコアリ其激越時ナドニハ終ニ其殘餘ノ思慮ヲモ滅却シ社會上政治上ノ新系統ノ發明家トナリテ世ヲ救ハントシ絶美ナル國政法ノ創造家トナリ新宗教ノ開基者トナリ以テ此心ヲ成サントスルニ至ル而シテ此ノ如キモノ亦今古史上ニ少ナカラザルナリ



カ、ル人ニ於テ偏執狂ノ發育スル方法ハ妄覺ヨリ發スルモノ稀ニシテ多クハ誤謬ナル意想結合ヨリ生シ論理ノ倒錯追想ノ舛誤原發譫妄ノ卒然發起スル等ニ助ケラレテ之ヲナスナリ

彼ハ漸次ニ特別ノ事情アリテ世ニ生レタルヲ知リ其知覺スル所ノモノ大トナク小トナク他故ナキモノマデモ皆之ガ證左トナリ之ニ兼ヌルニ妄覺ヲ以テシ幻視ニ於テハ、窓中ヨリ異形ヲ望ミ天上ニハ未タ見ザリシ星斗ヲ仰ギ隕石ノ燦爛トシテ空ニ引クヲ瞻、夜間靈光ノ室ニ滿チ盛裝麗容ナル天女神靈ノ降臨スルヲ見、幻聽ニ於テハ其諭言警語ヲ耳ニシ轉徙結婚絶食ヲ命ゼラル、<sup>ト</sup>アリ之ニ由リテ妄想ハ益恢弘シ上命ヲ受ケタル改命家王侯ナリト感シ天語帝言ヲ證トシテ之ヲ實施センヲ求メ其文書演說等ヲナシテ憚ルナキ途ニ病院ニ入ル、<sup>ト</sup>ノ已ムベカラザルヲ致ス此ノ如クニシテ患者ガ世人ト抵觸シ狂院ニ致サル、<sup>ト</sup>ノ追跡ノ如クニ見解スレ<sup>ト</sup>而モ本來ノ追跡妄想ヲナス<sup>ト</sup>ナシ即チ其誇大妄想ニヨリ其生來癡愚性ナル奇僻ト論理倒錯トニヨリテ之ヲ以テ其反對家ノ惡待トシ大器ヲ猜惡シ宏才ヲ忌憚シ或ハ之ト爭ハンガ爲ニ出ヅルトシテ其偏執性誇大意想ヲ益張皇シ獨自ラ虛幻ナル未來ノミヲ事トシテ其實事トナルヲ待ツノミ感應ハ多クハ前後均同ニ或ハ一般

ニ發越性ニ又或ハ世俗ニ抵觸スルガ爲ニ憤怒性又ハ沈鬱性トナルヲアレモ皆是レ一時ノ<sup>ト</sup>ニ過キズ思慮ハ清明ニシテ事ニヨリ物ニヨリテハ作能大ニ優レテ人ヲ驚カス程ナルアリ記憶モ亦完存ス疾病持久ノ後ニハ精神衰弱ノ速ニ進行スルヲ明ニシテ其誇大妄想ハ絶大隔異、不倫ノ極トナリ復當初ニ於ケルガ如クニ聯貫本末アルヲナシ上帝トナリ天子侯伯トナリ自家新作ノ詞ヲ以テ其神聖叡智ナリトスル政令勅諭ナドヲ下スニ至ル

(ろ)宗教性偏執狂 (Religiose Paranoia)

證候 此病ニカ、ル者其發病前既ニ精神病殊ニ此種ノ病ニ素性アルヲ較明ニシテ、幼ヨリ絶奇絶僻、宗教上ニ偏スルノ性質アリテ其病ハ其性質ノ大ニ發育セシニ過ギヌ<sup>ト</sup>多シ其人生來癡鈍ニシテ宗教道德上ノ原義ヲ解スルヲ得ズ宗教上儀式ノ外形燦爛ナルニ心ヲ動カシ愚蒙ト怠惰トノ爲ニ宗教規則ヲ誤解シテ之ヲ施履スルヲ正カラズ生來ノ奇異偏頗ハ益増進スルアリ僧侶ノ說法激語等モ亦此ニ影響少ナカラズ時トシテハ其命運ノ幸不幸モ亦之ヲシテ宗教ニ陷溺シ俗界ニ背馳スルアラシムニ多クハ其破瓜期ニ於テ既ニ精神興奮状態アリ其人ヲシテ宗教ニ熱心シ薙髮シ寺院ニ入り廻國巡禮スルノ心情ヲ興發セシメ時ニハ又宗教上ノ幻視ヲ兼ヌルアリ



此病狀ノ前驅期ハ數月數年ニ延クコアリ身體症トシテ女子ニ萎黃症、臍蹠症、月經障  
礙アリ男子ハ心氣症アルコアリ男女凡色慾ノ異常アリ其ノ亢盛夙發シテ手淫ヲ致  
スコ頗ル多シ此時期ニ於テ患者ハ業務ヲ好マズ自ラ考慮ニ失シ好ミテ經典教文ヲ  
讀ミ寺觀ニ出入シ佛閣ヲ巡拜シテ社會上ノ義務ヲ怠リ宗教性發揚ノ時々甚キヲ加  
フルトキ(女子ニハ必經行ノ時ニアリ)亦常ニ好色ノ症狀アリテ手淫トナリ男子ト交  
會シ或ハ淫事ニ沈溺スルナリ  
本病ノ發スル前ニハ身體ヲ薄弱ニスルノ要素アリテ之ヲ致スモノニシテ急性病、色  
荒又ハ齋戒斷食、飢乏ノ如キ皆之ナリ精神上ノ誘因ニテハ情契ノ意ニ違ヒ甚キ禍難  
ニ會ヒ又說教法話ノ爲ニ感激悔責スル等ノコアリ  
病初ニハ妄覺ノ發スルヲ微トスルアリコハ不眠ヲ附隨スル精神興奮狀態ノ一分症  
ナリ其興奮殊ニ甚キ時ハ消魂大悅ノ狀態ヲ起スニモ至リ神佛ノ靈妙ナル意氣、罪業  
深キ我心骨ニ沁透スルノ感觸アリ世間塵俗ノ感興配慮ヲ脱却シ神佛ノ呵護冥佑ア  
リト信ズルニ至リ女子ニ在リテハ多クハ同時ニ色事興奮ノ感觸アリ甚キハ交媾感  
觸ヲ致シ後ノ神佛ヲ分婉セリ)妄想ニ應施セラル、アリ此ノ如キ皆消魂大悅狀態中  
ニ見ル所ニシテ其間又強硬症狀ヲ來スコアリ

妄覺ハ初メハ視官ニ限り天道ノ洞開シ神佛己ヲ鍾籠シ天上ノ異彩靈光身邊ニ滿ッ  
ルヲ視後ニハ之ニ類スル聲ヲモ聽クニ至ル此ノ如キノ妄覺ハ持久シテ疾病ノ後期  
ニ至リ供<sup>Asker</sup>行、手淫ハ時ニ之ヲシテ再大ニ起ラシムルナリ

此病機ノ爲ニ生ズルモノハ主ニ妄想ニシテ男子ニハ救世主タリ女子ニテハ神佛分  
婉家タルコ妄想ノ中心タリ其妄想ハ發成極メテ速ナリ其本源タルモノハ原發妄想  
妄覺ニ次ギテ患者ノ論理倒錯アリ爲ニ經文ヲ誤解シテ自家本人ニ關係アルモノト  
シ其妄想ノ猶ホ新暴ナルヤ之ニ由リテ感動妄覺ヲ附起シ其相當ノ行爲ヲナスニ傾  
キ以テ或ハ己ガ說法家、宗教改革家、救世主タルノ事ヲ明ニシ又ハ尊神奉佛ノ爲ニ危  
險ナル所行ヲナス

宗教性偏執狂ニモ追跡偏執狂ノ如クニ二病期ヲ別ツベク一ハ所動性病期ニシテ患  
者ハ蒿目袖手シテ我卓越ナル感觸ト妄覺トニ對シ靜處シテ之ヲ受クルノミ一ハ能  
動性病期ニシテ其妄想ヲ施應センコヲ求メ爲ニ實世界ト抵觸スルヲ致スナリ其他  
經過中注意スベキハ精神激厲ニシテ甚キハ消魂大悅ニ至ルモノ、他苦痛煩惱兼自  
家感觸卑下ノ發作期、神佛タベルキノ品格ノ有無ヲ疑惑スルノ病期、罪業感觸ノ病期、  
齋戒懺悔(絶食ス)ヲ須要トスルノ病期ニシテ此間或ハ絶食シ或ハ緘默シ或ハ供行シ



甚キハ自ラ傷クルニ至リ或ハ怔忡及ビ幻視ノ爲ニ鬼神ニ窮迫セララルト稱スルモノアリ然レモ此ノ如キノ症ハ皆烟雲過眼ノミ忽ニシテ來リ忽ニシテ去ルナリ爾後ノ經過ハ諸症ニ類シ世上ニ身ヲ措クベキ所ナク多クハ身ヲ癲狂院ニ托スルナリ其經過ノ良好ナルモノニ在リテハ癲狂院中ノ隔離方殊ニ神佛ノ供具行事ヲ除クヲ云フノ爲ニ宗教上ノ發揚退キ其鎮靜トナリ幻覺ノ止ムトモニ其症ハ退キテ從前ノ宗教上奇僻ノ程度ニ復スルアリ然レモ猶精神身體ノ誘因ニヨリテ病候ノ再發スルノ素性ハ固ヨリ之アリ若シ夫レ入院後其妄想退カズ其自由ノ褫奪サル、ヤ或ハ此ヲ以テ苦行ノ所、考試ノ所トシ以テ自ラ慰藉スレトモ時々信仰歸依、宗教濫溺ヲ以テ傍人ニ強ユルアリ後ニハ遂ニ靜穩トナリ院中ノ勤勉沈靜ナル佳人トナルナリ其鬱抑性發作期ニ於テハ惡鬼ヲ按拒シ供行ヲ爲ス爲ニ絶食スルヲ常ナレトモ其強迫榮養ヲ要スルヲ稀ナリ患者ハ又自家ノ驅動又ハ神佛ノ命令ニヨリテ自傷舉丸抉出ヲナスノ傾アルヲ以テ危險ナリ他人ニ對シテモ亦供具ノ行爲ヲナシ神佛ノ命令ニ從ヒ經文ヲ誤解スル等ノ爲ニ危險ナリ

轉歸◎ 宗教性偏執狂ノ轉歸ハ精神衰弱狀態ニシテ妄想ハ猶ホ套語トナリテ殘存シ復妄覺又ハ消魂大悅性感觸ノ爲ニ興發セララル、コナシ然レモ其ノ完全懦弱性癡狂

ニ轉歸スルコト亦之ナシ

(ハ)好色性偏執狂 (Erotische Paranoia)

證候◎ 好色性偏執狂ハ他ノ偏執狂種ニ比スレバ研究未タ備ニ至ラス此病ヲ受クル人ハ生來奇僻自ラ人ニ異リタルモノナリ其性質ノ異常ナルハ遺傳素累又ハ兒時ノ腦病ノ爲ニ然ルニテ其證候ノ中心ハ他性ノ人高貴眞然又ハ誤想ノ人ニ擬テラレ鐘愛セララル、ノ妄想ナリ其所謂愛戀ハ過濫荒唐小説ノ如クナリ

其人少キヨリ嫌避性ニシテ交際ニ拙ク殊ニ他性ノ人ト交ルコトヲ好マズ色慾ノ盛ニ發呈スルコト之ナク或ハ却テ男子ニ在リテハ色慾缺乏又ハ倒錯(手淫ニテ適充ス)多ク其感情ハ溫柔刺戟性ナリ夙ニ既ニ(少クモ)破瓜時後來ノ原發譫妄ノ痕跡アリテ一理想ノ人ヲ作リテ之ニ濫溺シ見シコトモナキ(多クハ老女人一タビ瞥見シタル一女人ヲ戀ヒ慕ヒ其本質ハ委靡無氣力ニシテ世ヲ厭ヒ屢、又心氣性狀アリ夢ニ見シ所、神史ニ讀ミシ所ノモノハ殘遺シテ其戀愛ノ事歴ヲ益恢宏ニシ一日遂ニ卒然トシテ高貴(他性ノ)人中ニ前日理想セシ所ノ意中ノ人アルヲ見ルニ至ル是ニ於テカ本病ノ潜伏期トハナレリ患者ハ其人ノ目視容止ニ於テ甚我ニ冷薄ナラザルヲ見思慮ノ極メテ早ク銷却スルガ爲ニ他人ノ爲ス所ノ無故ノ事歴ヲ以テ盡ク



己ヲ愛戀親昵スルノ記號トナシ人ノ言フ所書ニ記スル所ニシテ彼ト己トニ關セザルモノモ皆之ヲ我身ニ引付ケ以テ自ラ幸福トシ自ラ優越トシ自家感觸大ニ亢舉シ誇大ノ原發妄想ヲ致ス(殊ニ對手ノ高位ナルモ亦稀ナラズシテ爲ニ社會上地位ノ差等均平セラレタリトス)

此ノ如クニシテ患者ハ其妄想ニ相當スルノ行爲ヲ敢テシ社交上ニ奇異不倫ニシテ之ト抵觸ヲ來タシ癡狂院ニ入ルノ已ムベカラサルニ至ル情契ノ遮絶ハ追跡性原發譫妄ヲ致ス(稀ナラザレモ是レ唯一時附起スルモノノミ)

其病ニモ亦增劇寬解ノ二態アリ妄覺ハ或ハ一時其妄想ヲ盛ニシ或ハ患者ヲ緘黙セシメ或ハ其ノ遂ニ退去スルコトアリ間歇狀態モ亦之アリ其症ノ治癒スルモノナシト云フ

身體證候

生來偏執狂以下遺傳素累多キモノニ來ルガ故ニ頭顱顏顱ノ異常ヲ初メトシ發育中止變質ノ徵候ナキニアラザレモ是レ固ヨリ重視スベキモノニアラズ會其預後ヲ推スノ材トナルアリ瞳子不均モ屢見ルコトアリ筋肉弛解ハ一時之アルコトアリ(顔面運動) 羈束及強梗ハ希ニ之アリ其他顫振麻痺痙攣等ハ偶然發呈スルコトアリ脊髓病等ナク

シテ尿閉秘結ノ隨意ニ致スベキアリ(糞中ニ重質チ夫ヲ放尿セバ他) 覺ノ之ヲ妨グルナクバ安堅ナリ食思循環呼吸榮養モ亦宜キヲ得テ之ニ病候アルコト殆ト之ナシ

(丁) 發來

偏執狂ハ其生來素性ヨリ發シ疾病推移ノ明ニスベカラザルモノヲ除キテ多クハ破瓜期經竭期ニ尋ギテ發スルモノニシテ十五歲乃至二十二歲四十歲乃至五十歲ニ多シ男女ヲ以テ之ヲ見ルニ男子ニテハ若年期ニ多ク女子ニテハ後年ノ期ニ多ク之ヲ統ブルニ女子ニハ男子ヨリモ稍多キガ如シ是レ經竭期ニ起ルモノ、爲ナリト云フ經竭期ニハ多少精神上素累アル婦人ハ幻覺性興奮ニテ此病ヲナシ易キガ爲カ人或ハ之ヲ以テ殆ト標式性經竭期精神病トナスベシト云フ程ナリ(さるる氏)

(戊) 經過及ビ轉歸

其臨牀上發育ノ狀ヲ見ルニ此病ノ障礙ハ主ニ精神界ニ在リテ身體症狀ハ極メテ微ナルモノニシテ其經過ハ慢性ニシテ前後齊同ナレモ其ノ弛張性增劇性ナルモノモ亦必シモ希ナラズ幻覺盛起シ感動激起シテ爲ニ意識ノ錯誤ヲ増スコトアリ此ノ如キ增劇狀態ニハ身體症狀モ亦加ハラザルニアラズ經過ノ持續ハ殆之ヲ定メ難シ



轉歸<sup>◎</sup> 腦髓機轉自家中ニハ偏執狂ヲシテ死亡ニ終ラシムベキモノナシ治癒ハ甚稀ニシテ多クハ殘缺性治癒ニ移リ多少高度ノ精神薄弱ヲナス妄想ハ益濫妄益無關聯トナリテ遂ニハ崩解シ然ラザルモ其感動及ビ行爲ニ作用スルヲ復從前ノ如クナラズ之ヲ談ズルモ甚關心セザルガ如ク之ヲ益恢弘スルヲナシ要スルニ偏執狂ノ末期ハ癡鈍ノ極度ニ至ルヲナシ叡智ノ虧缺ニ比スレバ感情ノ遲鈍トナルヲ甚キモノニシテ其技巧其製作ノ能力其辨別裁決ノ能性ハ甚損敗セズ院内ニテ業務ヲ授クルヤ能ク之ニ服シ之ニ從フ妄想ノ稀薄トナリ妄覺ノ減退シ此二者ノ感動ヲ興スコトナキニ至リテ益然リ要スルニ偏執狂ハ其本質其機轉上癡狂トナルベキモノニアラズ若シ之アラバ合併症アリテ早發ノ老衰酒荒手淫過度ノ結果タラズンバ他ノ合併精神病ノ轉歸ナリ他ハ十年所モ長ク停止性ニシテ次第ニ緊張狂狀ヲナシテ言談行爲ノ常同不變ヲ致スヲ見ルナリ

(己) 預後

預後ハ不良ナリ次第ニ治癒スルハ破格ニシテ極メテ稀ニハ大抵五月六月ノ後ニ之ヲ見ルコトアリ是モ殆ト常ニ再發スルモノナリ故ニ治癒ト稱スルモノモ實ハ一寛解狀態ニ過ギサルナリ又時ニ患者ノ病未タ治セザルニ治癒ヲ伴作スルコトアリ

(庚) 解視

此病ハ本人性ノ中心其人ノ性質ニ根柢スルモノナレバ病理解剖上ノ成績ハ方今猶ホ甚僅微ナリ頸動脈椎骨動脈頭顱腦髓等ノ左右發育不均腦髓ノ萎縮ヲ見シコトアリ<sup>うるねる氏</sup>ハ顆粒性腦室膜炎ヲ見<sup>ひる氏</sup>ハ小腦大脳ノ發育異常及ビ頸動脈ノ細小ナルヲ見<sup>柳博士</sup>ハ細胞周場及ビ血管外膜場中ニ黃色ノ小塊ヲ見タリ然レバ此諸者未ダ其病狀ト相副フベキニ至ラズ要スルニ解剖所視ハ本來ノ疾病機轉ヲ指定スルニ足ラズ蓋シ此病ニハ疎大ナル解剖變化局在ノ疾病機轉ハアルベカラズシテ意識機官特ニ其經驗材ヲ受領撰成スルノ所ニ於テ較明ナル機能障礙アルナランまいねると<sup>氏</sup>ノ說ニテハ皮質及ビ皮質下中樞ノ充血ヲ以テ妄想妄覺等ノ發成原因トスレバ亦未ダ病機ヲ説明スルニ充分ナラズ偏執狂ノ後期ニ於テハ腦髓萎縮機轉ノ痕跡アリ是レ即チ吾人ガ益研究スベキノ所ナリ

(辛) 診斷

偏執狂ノ診斷ハ其全經過ヲ見テノ後ニハ難カラザレバ其病初ニ當リテ之ヲ察スルハ易カラズ<sup>妄覺狂</sup>トハ疾病ノ外因ナクシテ發育スルヲ叡智障礙妄想ノ較明ニシテ著キ感應異常ナキヲニテ別ツベク<sup>麻痺狂</sup>トハ發揚性妄想鬱抑性妄想ノ併存スル遺



傳素累アル患者ノ若齡ナル神經性障礙ノ缺亡スル其發育ノ慢性ナル疾病進行ノ徐  
徐ナル其妄想ノ似非正確ナル論理ニヨリテ意想結合ヨリ生ジ病項ニ發スル一時ノ  
幻覺錯覺ニ助長セラレ内容ノ奇怪絶異甚小説ニ似タル思慮ノ永ク存スル等ニテ區  
別スベシ

(五) 治法

偏執狂ノ治療ハ病牀上其用固ヨリ廣カラズ要スルニ對症方守視方ノミ  
入院ハ最要ノ處置ニシテ患者自家並ビニ旁人ノ危險ヲ防護スルモノナリ蓋シ偏執  
狂者ハ時時其苦悶性憤怒性ノ激越状態ニ於テ極メテ危險ノ患者タルベケレバナリ  
安靜懇切忍耐ナル看護殊ニ病院治療ハ其適當ナル精神轉導ノ方法職業ヲ具ヘ其急  
症ノ證候ヲバ消殺セシムベキナリ且夫レ院中ニ於テハ外界ノ嘲罵冷遇ヲ杜絶シ(猶  
屢用フベキトアル)精神能力ヲバ興起スルノ機會多キナリ然レモ當初ノ良効ハ後ニ  
及ビテ全ク反覆シ來ルコトアリ退院ヲ要望シテ不堪忍刺戟性トナリ時ニ暴行ヲ以テ  
シ人權ヲ不法ニ犯侵スルト誤信スルヤ被害ノ妄想益長スルコトヲ致スナリ精神衰弱  
ノ症ヲ呈シ感動ノ消殺スルニ至ラバ之ヲ其家ニ歸シ又ハ私家治療ニ托スベシ若シ  
夫レ靜温ニシテ危險ナラザル慢性偏執狂者ニシテ家内關係適好ニ監護モ亦盡スベ

キナラバ自宅治療ノ却テ入院治療ヨリ良キモノ多シ  
妄想ハ之ヲ論拒スベカラズ又贊助スベカラズ一ハ患者ニ敵視セラレ一ハ其妄想ヲ  
助長ス唯靜ニ單一ニ其病ナルヲ諭シ時ニヨリテ甚キ錯誤ヲ正スコトヲ要スルノミ隔  
絶セル談話團樂遊戲ニテ注意ヲ轉導シ讀書職業ニテ健全ノ感興ヲ發舒スルハ極メ  
テ必要ナリ

妄覺ニハ別ニ良治方ナシ聽神經ノ電氣療法モ效アラズ  
對症方全ク效ナキニアラズ色事上刺戟状態及ビ之ニ基ク痛覺倒錯性妄覺妄想アル  
キハ多量ノ臭剝水治方脊髓平流電氣方効用アリ手淫アラバ守視ヲ嚴ニスベシ  
莫兒比涅ノ皮下應用ハ臭剝ノ用ヲ助ケ痛覺倒錯及ビ之ニ基ク妄想アルキ妄覺ノ主  
專ナル偏執狂(經期ニ多シ)ニハ殊ニ大ニ病勢ヲ殺グナリ

第七 遲鈍狂又名初發性治療性癡狂 *Stupiditæet od. Primaere heilbare Dementia.*

(甲) 總說

遲鈍狂ハ臨牀心理上ヨリ之ヲ察ルニ後天性精神機能ノ經過ノ艱澁トナリ甚キハ其  
缺無ニ至リ且感應缺亡ヲ併呈スル治療スベキノ疾病ナリ



合併症トシテハ昏迷、血管運動性神經作用異常(血管痙攣、血管麻痺)、運動神經作用ノ障礙(所謂緊張狂性)及ビ一過性ノ精神運動性興奮狀態アリ又妄覺ノ來ルヲアリ。病態中ニ此等ノ症ノ入ル(妄覺性昏迷)ハ其形種ノ妄覺狂ニ推移スルナリ

(乙) 原因

其精神機官ノ作能ノ廢スルハ其(腦ノ)虛脱ニヨリ精神上ノ震盪(即感動)ニヨリ又機制上ノ殘損ニ因スル振盪ニヨルモノニシテ三者中前兩者ニハ其腦髓ニ於テ抵抗能力微弱ニ生來ノ素質薄弱ニ又ハ種種ノ原因ニテ異常ニ刺戟性且虛脱性トナリタル等其索性アルヲ要スルナリ

(丙) 種別

病性上及ビ臨牀上此病ヲ別テ飢乏性遲鈍狂、感動性遲鈍狂、頭傷性遲鈍狂ノ三種トス  
(一) 飢乏性遲鈍狂(精神機官虛脱ノ標證タル遲鈍狂 Stupidi-taet durch Inanition, Stupidi-taet als Ausdruck der Erschoepfung des psychischen Organs.)

總說 此種ハ遲鈍狂中最モ多キモノナリ  
原因 潛力ヲ補填スルノ缺乏及ビ之ヲ活力ニ換化スルノ障礙ハ精神機官ノ機能ヲ

妨遏乃至廢絶スルノ原因ナリ而シテ此ノ如キ虛脱狀態ヲ患フルモノハ薄弱、軟脆、神經病性ナル若年ノ人ナリ其他小顱及佝僂ノ顱形アルモノ亦大ニ此ニ索性アリ年齡ニ視ルニ三十歳以後ニハ此病之ナキガ如シ破瓜ノ齒ニ於ケル急速ノ成長殊ニ精神身體ノ激勞、榮養ノ不充分ハ又之ガ發成ニ宜キノ約制ナリ又此狀態ハ重症腦衰弱症ノ病頂期タルヲ稀ナラズ

誘因トシテハ產褥ニシテ大失血アルモノ、重症急性疾病、殊ニ窒扶斯、色荒殊ニ手淫等其主ナルモノナリ近時見ル所ノ頸瘤切除後、甲狀腺腫後惡血症、酸化炭素中毒、ニ起ルノ症モ亦恐ラクハ飢乏遲鈍狂ニ屬スルモノナラン躁狂後ノ虛脱昏迷ノ狀態モ亦病性上此ニ屬スクラフとビんぐ氏ハ屢、遲鈍狂ノ鬱狂躁狂ニ放血、刺絡、水蛭等峻劇治療法ヲ施シタル結果トシテ生シタルヲ見タリト云フ

證候 此症ハ其發育、漸次ナリ日一日毎ニ患者ノ考慮及ビ作能ハ緩徐艱澁トナリ其狀沈思默考夢ミルガ如クニシテ數時間一所ニ佇立シ業ヲナシナガラニ眠込ミ數日數週ノ後遂ニ昏迷性癡狂ノ狀態ニ沈淪シ殆ンド自家又外界ヲ識領セズ其特自性ヲ失ヒテ終ニハ植物性生活ヲナスノミトナリ事毎ニ物毎ニ最要最緊ノコトニテモ之ニ強推セザレハ能ク之ニ處セズ食物ヲ其前ニ置クモ殆ト自覺セズ他人之ヲ口ニ餌シ



以テ或ハ纒ニ反應ヲ喚發シ之ヲシテ嚙下作用ヲ起サシムベキノミ  
 顔貌ハ錯亂シ思考ノ外標ナク目視ハ瞠乎トシテ物ナキ所ニ瞞シ瞳孔開大シテ反應  
 鈍ク皮膚反射著ク減ジ膝反射ハ多クハ著ク亢進シ感覺ハ減退シ多クハ消失シテ強  
 キ電氣刺戟ニテサヘ感受ナキ程ナリ  
 筋肉緊張ハ減ジ態度弛緩シ他人之ヲ犯襲スルモ抗拒セズ希ニハ筋肉ニ一過性緊張  
 状態強極状態ヲ見ルヲアリ重症ニハ飢乏顫振アリ舌ニ顫振アリ又筋肉ノ纖維性攣  
 縮モ多ク心臟動作ハ薄弱ニシテ心音鈍ク脈ハ多クハ遲徐遲徐ニ擊性乃至一擊性ナ  
 リ患者ヲ導キ動カシムレバ心搏ハ甚頻數トナル四肢ニハ厥冷乃至膚蒼アリ長ク(數  
 時)直立スレバ水腫ヲ來シ横臥スレバ直ニ消失ス每朝醒起ノキ顔面ハ屢々腫脹ナ  
 リ體温ハ尋常下飲食多クシテ妨ナキモ榮養體重ハ著ク下リ出院時ト入院時トノ間  
 ニ十基瓦迄ノ差アルヲ屢ナリ病頂期ニハ屢尿中磷酸鹽ノ大ニ増スヲアリ榮養障礙  
 ノ甚キハ他症モアレド手ノ乾枯脆弱ナルニテモ知ルベク又痔瘡ノ傾性アルヲアリ  
 女子ニハ病中月經ノ閉止アリ靜脈性鬱血ニヨリテ腸加答兒子宮加答兒ヲ來スヲ希  
 ナラズ呼吸ハ淺表不充分ニ意識障礙ノ深キヨリ不潔ニシテ尿矢ヲ遺放シ流涎ス  
 經過ハ弛張性増劇性ニシテ平常緘黙癡鈍無反應ノ状態中ニ數時又ハ數日間精神

興發シ言談多ク運動及ビ知覺能力ノ増スヲ見ルアリ増劇症并ビニ合併症ハ一時性  
 ノ完全昏迷症ナリ又一時或ハ驚異性ノ錯亂症ニシテ濫妄ノ舉動アルモノト來ルヲ  
 アリ(合併性タル妄覺ニヨリ又ハ病中苦痛ノ状態ヲ茫乎ニ自覺スルニヨルモノカ)希  
 ニハ數時數日間ノ精神運動興奮状態ニシテ陰歌シ肉笛シ貌言多發アリ濫ニ行動シ  
 衝動性動作ヲ施シ其衣ヲ扯裂シ時ニ又旁人ニ對シテ批擻性トナリ殆ト躁狂ノ如ク  
 ナルモノアリ能ク差別セザルベカラズ  
 轉歸ノ好良ナルモノニハ寛解状態ハ漸ク長ク漸ク深ク面貌ハ活發トナリ片言隻句  
 ヲ話シ初メ初メハ擬似運動後ニハ獨自運動ヲナシ又其精神運動性不能ヲ痛ムニ至  
 リ其回復ハ段落狀ニシテ時ニハ之ニ尋ギデ一時虛脫状態アリ然ル後榮養復シ體重  
 増シ血行障礙消失シ尿中磷酸鹽多ク體温舊ニ復シ徐徐ニ治癒ニ向フナリ病中ノ追  
 想ハ殆ト全ク之ナク然ラザルモ極メテ概括性ナリ  
 持續ハ數月以内ナリ最早ク治スルハ失血ノ爲ニ起リシ症ナルガ如シ  
 預後 患者ノ年齢若クシテ其病機ノ性質機能性ナルモノハ其預後幸良ナリ機能上  
 虛脫ヨリシテ回復スベカラザル癡狂ニ移行スルヲハ稀ニシテ肺勞及ビ肺炎ノ爲ニ  
 死亡ニ轉歸スルモノハ益稀ナリ



解視。其原因及ビ證候ニ考フレバ精神機官ニ大貧血アルモノナルベシあると  
 氏ノ檢眼鏡所視モ亦貧血ノ症ナリ後ノ期ニハ眼底ニあると  
 氏ノ水腫アリ  
 ぶらうん氏ハ死亡ニ轉歸セシ二症ニテ一ニハ軟腦膜ノ靜脈性充血アリ他症ニハ軟  
 腦膜ノ水腫及ビ數條ノ廻紋ノ萎縮アルヲ見タリト云フ  
 ぬんみんぐばうす氏ノ視シ  
 ハ回歸熱後ノ急性ノ癡狂ニシテ腦皮質神經節細胞ノ溷濁性腫脹アリシ  
 診斷。此病狀ハ住時ハ屢昏迷性癡狂又ハ白癡ト同一視シタルモノニシテ之ガ正確  
 ノ診別ハ緊要ナリ白癡トハ其既往症ヲ省ミ其後天ナルニヨリ決シテ之ト誤ルコトナ  
 シ初發性進行性癡狂トハ發病ノ急速ニシテ重腦病腦出血腦粥腫等ノ表タル運動障  
 碍ナク年齢ノ同ジカラザル等ニヨリ區別スベシ  
 診斷ニ難キハ腦髓ノ多發性病竈性硬化又ハ蔓延性硬化ノ初發症ニシテ若年ニ多キ  
 モノナリ多發性硬化ニハ病態漸漸ニ發育シ精神ノ荒墜ハ準他局部性ニシテ感動機  
 能及ビ(殊ニ)道德機能ノ如キハ長ク保存シ感情生活ノ刺戟性薄弱アリ運動殊ニ脊髓  
 性障礙運動失常注思顛振筋肉強硬膝反動ノ過度ノ亢進等ノ較著ナル不構音性言語  
 及ビ眼球振蕩症等アリテ以テ差別ヲ明ニスルヲ助クルアリ蔓延性硬化ニ因スル初  
 發性進行性癡狂ハ病ノ經過ヲ見テ初メテ差別スベキノミ

遲鈍狂ト昏迷性癡狂トノ鑑別ハ下ノ數條ニヨル(一)癡狂ハ初發性ニシテ其發生多  
 クハ急卒ナレド昏迷性癡狂ハ尋常癡狂ヨリ漸次ニ發生ス(二)遲鈍狂ニハ感應缺亡ア  
 リテ昏迷癡狂ニハ意識ノ分明ニ疼痛性ナルアリ(三)顏貌ハ遲鈍狂ニハ遲鈍茫味ニシ  
 テ昏迷癡狂ニハ苦悶性ニ緊張ス(四)遲鈍狂ニハ意思中樞ノ業作大ニ減退シテ態度弛  
 解筋肉緊張廢シ意思缺亡シ他人之ヲ犯襲スルモ抗拒セザレモ昏迷癡狂ニハ筋肉ニ  
 一種ノ緊張狀態アリテ外來ノ犯襲アルキ殊ニ増劇ス(五)遲鈍狂ニハ時ニ精神自發運  
 動性興奮狀態アリ昏迷癡狂ニハ反射動作ノ筋肉緊張及ビ精神運動制止ヲ破リテ暴  
 發シ旁近又ハ自身ノ生命ニ對スル暴行稀ナラズ(六)遲鈍狂ニハ自覺性感覺脱失アリ  
 昏迷癡狂ニハ感覺性刺戟ニヨリテ凝縮ノ増劇シ顔面ニ起皺スル等ノコトアリテ感覺  
 ノ存スルヲ明知スベク(七)意識ハ彼ニハ廢絶シテ病中ノコトヲ記セズ此ニハ疼痛性觀  
 念ノ統領スルノミニシテ追想頗ル其真ヲ得タリ(八)彼ハ自覺薄弱ニヨリテ自ラ食ヲ  
 取ルコト能ハズ此ニハ妄想及ビ不樂ノ感觸ニ基キ積極性ノ不食症アリ體重ノ減量甚  
 著シ(九)睡眠ハ彼ニ安堅ニシテ此ニハ廢絶シ(十)脈搏ハ彼ニハ緩徐軟ニシテ此ニハ多ク  
 ハ促進シ數急ニシテ動脈脈線ノ如ク收縮ス(十一)彼ニハ早クヨリ厥冷膚蒼水腫ア  
 リテ此ニハ後期ニ至リテ初メテ此ノ如キモノヲ見ル(十二)彼ハ多クハ甚不潔ニシテ



此ハ多クハ清潔ニ且括約筋ノ神經作用増加ニヨリテ兩便ノ閉止ヲ兼ヌ(十三)其回復スルヲ遲鈍狂ニハ徐徐ニシテ昏迷鬱狂ハ時ニ急卒ニ治癒ス

治法 重症榮養障礙ノ爲ニ減退シタル腦髓皮質ノ機能ヲ回復スル爲ニハ好良ナル空氣強健ナル食物酒赤酒安靜ヲ給シ呼吸ヲ奮興シ不用ノ失温ヲ避ケシムベシ藤臥

ハ病頂期ニハ缺クベカラザルモノナリ

手淫ハ此病ニ稀ナラザルモノナレバ善之ヲ守視スルヲ要ス

砒石鐵規那製劑肝油麥芽劑ハ用フベク

對症上ニハ皮膚ヲ濕布(冷ニ過キズ)ニ拭摩シテ血管神經作用ヲ反射上ニ興奮スベシ

電氣性按摩方モ緊張方トシ又物質代謝呼吸ヲ興發スルモノナリ

中樞性平流電氣方(五乃至二十原)モ効アルコアリ

回復期ニ於テハ患者ノ疲憊シ易キ故之ヲ掩護シ精神身體ノ過勞ヲ加ヘザルベシ

(二)感動性遲鈍狂(精神上ノ振盪ニ因スル遲鈍狂 Stupidietaet

durch psychischen Shok.)

總說 コハ臨牀上原因上一病種ヲナスモノニシテ前者ニ類シ後者ニ推移ス

原因 其誘因ハ感動(多クハ驚愕)ナリ病原上ノ要素ハ恐ラクハ之ガ爲ニ起リタル血

管運動障礙(血管痙攣)ナラン素質ハ每常之アリテ前症ヨリモ著クシテ(神經衰弱症臟躁等)精神振盪(感動)ハ能ク直ニ精神機能ノ完整ナルヲ敗ルナリ之ト相類スル機能上病症ニシテ而モ限局性ナルハ臟躁家ノ驚駭失語及一肢麻痺ナリ

證候 發病ハ常ニ急卒ニシテ直ニ昏迷ヲ以テ初マリ又ハ數時數日間ノ疾病感動狀態苦悶性錯亂狀態譫妄妄覺ノ有ルコトモ無キコトモアリ(ニテ發シ其症ハ單一ナル錯亂

及ビ精神衰弱ノ輕症ヨリ重キハ精神朦朧乃至昏迷ニ至リ其重キ症ニハ痙攣脈アリ

屢其反對狀態即血管麻痺(劇キ衝逆)アリ體温昇上シテ三十九度以上ニ至リ不定ノ譫妄アル苦悶不安アリ又滲漏機轉ノ表トシテ最深ノ昏迷症アリト交承發呈ス輕症ハ

大抵數週間ニシテ退ケル重症ハ數月ヲ經寬解狀態及ビ増劇狀態アリテ後ニ退症シ

然ラザレバ長續性血管麻痺ノ症狀アリテ失神性癡狂トナルナリ

診斷 虛脫遲鈍狂トノ區別ニハ其初メニ感動ヲ惹起シタル事件ガ譫妄狀ニハアレ

ル時時其經過中ニ發呈スルコアリ

(三)外傷性遲鈍狂(機制上ノ振盪ニ因スル遲鈍狂 Stupidietaet

durch mechanischen Shok)

總說 腦震盪ノ症狀ニ尋ギ之ガ爲ニ時ニ直ニ深重ナル精神衰耗ヲ惹起シ甚キハ本



入意識ノ消失ヲ致スヲアリ之ヲ外傷性震盪ノ精神病ト云ヒ皮質下中樞及ヒ自發運動性中樞ノ機能回復シテ後精神機官ノ長ク震盪ヲ蒙ルノ徵ト做スベク外傷昏迷ニ類シ外傷ノ爲ニ腦皮質ノ分子狀況ニ障礙ヲ起セシニ基クモノ、如ク機能上ヨリ言ハ、精神機官中ノ制止機轉ナルベク腦震盪ガ都テ腦髓ノ制止性神經病タルガ如シ此ノ如キヲ又縊首ノ爲ニ之アルガ如シ

證候 外傷性遲鈍狂ハ腦皮質ノ諸中樞ニ於ケル制止機轉ノ合一ヨリスルナルベク少ナク其標式症ニハ各中樞ノ機能脱落ノ各其強弱ノ度ヲ異ニシテ發呈シ又其機能ノ各時ヲ異ニシテ再現スルヲ見ルナリ

預後ハ幸好ナルガ如シくらふとえびんぐ氏ハ治癒セシモノ五例精神衰弱ヲ殘セシモノ二例ヲ見シト云フ

治療 食養生ヲ謹ミ回復期ヲ將護スルヲ治療上最緊要ナルモノ、如シ

第八 續發性精神衰弱 (Secundare psychische Schwachzustände)

續發偏執狂及ヒ末期癡狂 (Paranoia secundalis, Dementia terminalis.)

(甲) 總說

機能性精神病(鬱狂躁狂、妄覺狂、遲鈍狂)ニシテ治セザリシモノハ其極遂ニ精神生活ノ進行性分解機轉ヲ致シ經歷上内容上一貫聯ナリシ本人性ノ漸ク崩潰スルニ至ル是レ實ニ憐ムベク悲ムベキノ精神荒墜機轉ニシテ身體漸ク滅亡ニ歸セントスルノ前段タリ時トシテハ腦髓變化ノ深重ナル標トシテ極メテ急ニ發呈スルヲアリ其躁暴狂ニ於ケルガ如キモノ即チ是ナリ其然ラザルモノハ大抵之ヲ致スヲ徐徐ニシテ初ニハ道德上作能廢シ之ニ尋ギテ叙智作能殊ニ記憶及ヒ論理機轉ノ虧缺ヲナシ終ニ自覺機轉、感動性、興發迄モ沈墜シテ之ヲ往時ノ生涯ニ比スルニ纔ニ其皮殼タル身體中ニ自發運動性機能及ビ醇然植物性ノ機能ヲ殘スノミ

(乙) 主徵

精神荒墜ノ徵候ハ早ク其面貌ニ發シ一種頹頹ノ狀アリ或ハ齊名筋肉ノ神經作用均カラザルニヨリ或ハ顔容筋ノ拘攣ニヨルナリ面相ハ之ガ爲ニ少シク年齒ヨリ長ケ、衰荒性ニシテ目ノ緊張狀態一變シテ目視一種強硬トナルガ爲ニ稍不安ノ狀アリ其癡成期ニ入ルヤ面貌ハ感動其他精神上興發ノ發呈ナキガ爲ニ恬淡空虛ノ狀ヲナス感動性疾病ニハ神明運動及植物性ノ機能ニ分明ナル障礙アレ此續發狀態ニハ此等ノ證候ナク植物性機轉、睡眠、飲食等ハ身體合併症ナキ以上ハ障礙ノ見ルベキナ



ク榮養ニハ障礙少ナカラズ一言之ヲ覆ヘバ夙發老衰症ニシテ患者ノ狀貌ヲシテ其年齒ヨリモ長タルガ如クナラシム其徵トシテ特ニ毛髮皓白トナリ脂肪ノ消失シ皮膚ノ乾涸ニシテ新銳ノ色ナク毛細管路ノ血行遲緩トナリ水腫糠粃疹耳血腫ノ傾性アリ諸機官殊ニ心臟ハ脂肪變性ヲ起シ動脈硬化ノ夙發スルアリ彼患者ガ瘦削及ビ平均命數ノ短キハ問ハズシテ知ルベキナリ

(丙) 種別

此精神ノ崩潰機轉ハ人ニヨリテ其性質モ程度モ極メテ異ナリ普通ノ臨牀上病態ヲ立ツベカラザルガ如シ大概之ヲ別テ二種トナス一ハ續發偏執狂一ハ末期癡狂ニシテ乙ニハ又二別種アリ激越性ナルト失神性ナルト即チ是ナリ

(一) 續發偏執狂 (Paranoia secundalis)

總說 續發偏執狂トハ初發性感動性ノ病期中ニアリシ妄想ニシテ其發生ニ大與力アリシ感動ノ消却セル後迄モ持長續存シテ(多少)停止性ノ疾病觀念群トナリ以テ新ナル本人性(健時)ノ我トハ全ク異ナル生活ヲナスモノヲ云フ  
證候 其緊要ナル證候ハ妄想猶其意識中ニ存シナガラ之ニ從ヒテ行爲ヲナスノ衝動ノ缺亡スルヲナリ此症ニハ感動精神病ニ特有ナル感觸觀念欲向三者ノ適合一致

ナク精神上本人性ノ合一即我ナルモノナシ經歷上單一ナルベキ我ハ分解シテ個々ノ妄想ト其數ヲ同フシ我ヲ分解セルヤ其妄想數個アリ其内容完ク互ニ相抵牾シ時間上場所上論理上經驗上全ク相背馳スルアリ之ヲ如何ニカシテ關聯セシメントスルモ得ベカラザルナリ

此ノ如クニシテ其相異ナルヲ均平シ抵觸スルヲ解クベキノ途ナキハ即チ其高等ナル叙智機轉論理上ノ辨別(又多クハ)記憶等ノ大ニ衰弱スルガ爲ナリ是故ニ病前ニ爲セシ精神業作ハ復ナスベカラズ深厚ナル志欲モ事物ノ創作モ之ヲナスコ能ハズシテ唯其固着意想ノ範疇中ニ彷徨シ其自家觀世界觀全ク一變ス然レモ外形上觀念機制ニハ猶ホ障礙ナクシテ感動機轉ニ妨碍セラレズ健康時生活ノ殘跡餘功猶ホ多キガ爲ニ或ハ猶ホ少シク對話ニ勝ユレモ銳敏ト談話トハ之アルヲ見ズ此ノ如キ患者ハ整序アル精神業作ヲナスコ得ズ其固着意想ノ範疇ニ復シ來リテハ強迫性ニ其中ニ彷徨スルノミ殊ニ著キハ道德上ノ冷淡及ビ感情ノ漸滅ニシテ家族及ビ交朋ニ對スル感情ハ全ク廢ミ旁人ノ安苦ヲ見テ心ニ動クコナク前病症ノ感動殘餘ハ猶ホ其證候ニ多少ノ着色ヲナセモ活發ナル感動ノ發呈ナク初ニハ猶ホ其妄想ノ中心ヲ觸犯スレバ感動ヲ起スコアレモ亦時ヲ以テ消殺シ益稀疎益薄弱トナリ其妄想



ハ意識ニ入ルモ其義不明ニシテ終ニハ紛雜トナリ外界刺衝又ハ聯合機轉ノ爲ニ意識ニ喚起セラル、アルモ毫モ感動ヲ附起スルナキニ至ル然レモ時ニヨリ暴動發作狀ニ激越シテ荒暴ナル舉動ニ至ル、亦固ヨリ之ナキニアラズ

偏執狂ノ極度ニ於テハ其觀念ハ固着思想ノ爲ニ猶ホ疎鬆ニ聯附セラレ濫妄、無貫聯ニ意識中ニ上下起滅スルアリ是時ニ當リ猶ホ幻覺アリ又活潑ナル觀念ノ妄想觀念ヲバ再提スル、アレモ感動性精神病又ハ初發性偏執狂ト異ナリテ新觀念ヲ產出スル、ナク能動性ニ創作シ想像ニヨリテ恢廓シ論理上ニ結撰、弘構スル、ナク其妄想ハ實ニ廢殘ノ觀念群集ノミニシテ變改恢弘アル、ナシ其癡狀ノ益進ムヤ妄想ハ離離タル片斷トナリ内容ハ落莫トナリテ復其妄想上ニ感觸シ考慮セシ、ヲ實施履踐スルノ心迫ナシ

身體證候ニハ衰耗アル、屢ナル他ニハ異ナル所アラズ殊ニ患者ガ衛生上關係ノヨクシテ整然業ヲナスノ時ニハ身體機能ハ大ニ整フモノナリ

發來 偏執狂ノ續發狀態タルモノハ多少較明ナル妄想ノ殘餘アリ有妄想ノ精神病ニシテ治セザルモノハ皆續發偏執狂トナル、ヲ得ベシ其ノ有妄想性鬱狂ニシテ治癒セザリシモノハ轉歸タル、ハ通例ニシテ躁狂ノ轉歸タル、ハ彼ヨリハ甚稀ナリ

蓋躁狂ニテハ精神機轉ノ經過急促ニシテ妄想ノ固着シ系統ヲナスヲ得ル、稀ナレバナリ

經過 續發偏執狂ノ狀態ハ時トシテ數年間同一ノ程度ニ止リ後癡狂性衰弱ノ益稀疎薄弱無味トナルニ至ルナリ

診別 其續發性末期性ナルヲ知ルハ其症ノ既往症明ナラスキニハ難シ其經過ヲ通覽シナバ叙智上衰弱ノ分明ニ進行シ感動鈍麻ノ增益シ精神生活ノ散亂無貫聯多ク審美上及ビ社會上ノ顧慮ノ缺乏蒙汚不潔甚キハ動物ノ如クナルニ至ルアリテ其症ニ固有ノ形象ヲナスナリ加之鬱狂ヨリ出デシモノニハ妄想ノ殘餘、時時ノ苦悶狀態、暴動發作及ビ他ノ初發期殘症ノ之ニ加ハルアリ躁狂ヨリ生ゼルキハ癡狂トナリテ後期ニモ猶ホ其症ヲ發シ來ル、アリ其妄覺狂偏執狂ヨリ出デシモノニ就テ其續發狀態ニ推移スルノ時ヲ定ムルハ程度ノ論ニシテ一定ノ繩尺ナシ妄覺狂ニテハ感動消失シ體重増シ而モ妄想ノ退カザルヲ界トシ偏執狂ニテハ妄想ノ系統聯貫ヲ失ヒ其精神生産力ノ止ムキヲ界トス

(二)末期性癡狂 (Dementia terminalis)

總說 精神病ノ治癒セズシテ而モ其生活ノ長ク存スルヤ其終末ノ轉歸ハ單一ナル



精神ノ作能力及ビ精神抵抗力ノ衰弱ニシテ妄想性原素ノ混セザルモノ即チ單一ナル癡成トナルナリ之ヲ腦皮質ノ萎縮ト認ムベキ形質機轉ノ標候タルベキモノトス然レモ解視上ノ事實ハ未ダ臨症證狀ト副フモノアラズ是レ今日ノ方法ノ豫メ期シナガラ未ダ得ザル所ナリ

解剖機轉ノ性質ニ從ヒテ其來ル極メテ急速ナルアリ例ヘバ重症躁暴狂後ニ於ケルガ如シ或ハ全ク徐徐ニ數年經過ノ中ニ來ルアリ例ヘバ偏執狂ノ轉歸トシテ來ルモノ、如キ是ナリ

證候。臨牀上ニハ精神衰弱ノ強弱廣狹ニ關シ無數ノ程度アリ其甚キヲ失神性癡狂トス其程度ノ如何ハ乃チ其人叡智生活ノ諸機能殊ニ道德上及ビ審美上作能ノ種性廣狹如何辨別及ビ論理概念ノ銳鈍如何意思ノ萎靡不振ノ度如何自覺觀念結合動作ノ遲速如何記憶ノ作能ハ其諸性質ニ於テ如何等ヲ考試シ之ヲ準繩トシテ以テ之ヲ定ムベシ重症鬱狂及ビ躁狂後ニハ其輕度ナルモノ稀ナラズシテ人目ニ入ラザルヲアリ初發狀態ヨリ精神作能力ノ漸ク減却スルハ病院ニテハ分明ナラズ退院シテ後其回復ト不トヲ公衆生活職務生活ニ試ミントスルニ至リテ表ハル、一屢ナリ醫家ノ其患者ノ往時ノ本人ヲ精知スルモノハ能ク其道德ノ作能ノ殊ニ全カラズ從

前貴重セシ事物ニモ關心セズ感情遲鈍ニシテ其風儀上原理疎放ニ人ノ爲スニ從ヒ易ク自ラ欲スル薄キヲ見ルベシ加之記憶ノ眞ヲ得ル少ナク業務能力遲緩トナリ業務ノ好樂少ナク性情一變シテ刺戟性トナルヲ以テセバ精神ノ衰弱ハ既ニ分明ニシテ火ヲ賭ル如クナリ其風儀上動機ノ發起スル全カラズ行爲ニ傾動シ易クシテ感動ヲ抗拒スルノ能少ナキヤ之ガ法醫上ノ判別亦無用ニアラズ

續發癡狂ノ症ハ臨牀上別テ二種トスベク激越性癡狂ト失神性癡狂ト是ナリ

(S) 激越性癡狂 (Agitirter Bloedsinn, allgemeine Verwirrtheit.)

此症ニハ精神衰弱シテ而モ持續性ニ多少ノ興奮アリ即觀念モ欲向モアレドモ精神機制全ク擾亂混敗シテ其精神機制ノ各節各片ハ零零離雜トナリテ意識又ハ我ノ之ヲ總括シテ一ニ歸スルヲナク觀念ハ離裂疎濫ニシテ偶然ニ發起シ意想聯合ナクシテ淺薄ナル音響類似ニテ排次スルノミ詞語ノ論理上ノ意義理趣サヘ辨ゼズ自己ニハ無意無義ナル詞語ヲロニスルノミ往時ノ觀念及運動直觀ハ唯所謂語彙ヲ殘スノミ其激越ノ片(語ノ意味ヲ存セズ)其濫罵饒舌ノ片ニ方リテハ其狀屢躁狂者ニ似タリ而モ其似タルハ唯外表ノミ躁狂者ニハ活潑ナル感動アレモ此症ニハ貌相遲鈍ニシテ無味ノ微笑ヲ帶ビ又哭クガ如キノ懨容アリ奇異ナル行動ノ兒輩ニ類スルアリ



狂ニハ錯亂ノ甚キ時サヘ觀念群ノ相ヒ聯附シ論理上ニ聯結シ又觀念連合能力ノ起ルヲアレモ此症ニハ其觀念ニ本末ナク(多クハ)毫モ聯合ナキモノタリ躁狂ノ寛解状態ニ於テハ往時ノ精神完備力ノ發呈アレモ此症ニハ癡狀ノ狀アルノミニシテ且其能動性ナルニ關ラズ欲向ナク隔絶缺漏ナル觀念ヲ結合シテ辨別、裁決、適切ノ行爲トナスコト能ハズ躁狂ハ一時性弛張性ナレモ此症ハ末期性持續性ナリ  
カ、ル全般錯亂タル末期状態ハ主ニ妄覺狂并ビニ癡躁狀病期アル躁狂ニシテ治セザリシモノ、轉歸タリ

(ろ)失神性癡狂 (Apathischer Bloedsinn.)

失神性癡狂ハ精神荒墜ノ最極期ニシテ重症不治ノ鬱狂(殊ニ能動性鬱狂、昏迷性鬱狂)及ビ重症躁狂ノ發作ヨリ直ニ發スルモノ、如キ是ナリ  
面貌ハ完ク空虚ニシテ伸筋ノ神經作用ハ麻木シテ身體ハ重量ノ法則ニ從ヒテ其態度ヲナスノミ勝ハ胸ニカ、リ四肢輕ク屈シ唾ハ口ヨリ流レ精神界ニ於テハ完全ノ沈安アリ自覺ハナクシテ單ニ知覺トナリ感覺及ビ反動興奮性ノ極微ニシテ精神作能ノ缺無ナルハ其人ヲシテ腦髓切除ノ動物ニ均カラシム其腦皮質ハ實ニ機能以外ニアリテ飢餓ヲモ危險ヲモ覺エズ傍ヨリ之ヲ食カヒ衣キセ其二物ニ注意セザレバ

死ニ至ルマデモ平然タリ此症ノ極ニハ運動直觀モ亦消殺シテ言語ナキニ至ル(眞個健忘性失語)此ノ如キ精神死亡ノ状態ハ時トシテ猶ホ數年間ニ延及シ身體死亡ニ至リテ初メテ止ム要スルニ其生命ハ此ニ至リテ復甚長カラズ精神中樞ノ麻痺ハ遂ニ呼吸中樞血行中樞ニ延及シ運動ノ缺亡シ呼吸ノ不充分ナルハ血行及ビ榮養ノ著キ障礙ヲ惹起シ遂ニ肺炎衰弱性下痢等ノ爲ニ死亡ス

第四卷 機能神經病性精神病ノ論

體質性機能性神經病ヨリ生シタル精神病 (Irresin aus constitutionellen Neurosen.)

精神病ノ素質トナルベキモノ一ナラザレモ機能性神經病タルモノ亦多シ殊ニ神經衰弱症、心氣病、臟躁及ビ癲癩ヲ然リトス此數者ハ決シテ偶發ノ症ニアラズシテ其素有病累ノ一分症タルナリ夫レ機能神經病ハ(精神上身體上ノ)本人性ノ素性及ビ發育ニハ離ルベカラザル要力トナルモノニシテ其生涯ノ大部分ニハ大抵此煩累アリテ其之ナキハ希有又ハ一時ノミ且加之種種ノ精神障礙ヲ惹起スルナリ



是等機能神經病ハ深重ニシテ體質ヨリ出テ神經中樞系統ノ素質及ビ發育ノ異常ニ基クテ分明ニシテ他ノ嗜好ナル一過性治療性ノ機能性神經病トハ其症モ異ナリ其豫後モ大ニ逕庭アリ蓋シ素累ノ有無ニヨリテ其病ノ原因證候預後ニ差別アルハ猶ホ單一性精神病ニ於ケルガ如キモノナリ産後又熱病後ノ亞急性神經衰弱症ヲ以テ之ヲ假令輕症ナリト體質性ナル神經衰弱ト比セヨ其難易輕重間ハズシテ既ニ明ナリ神經衰弱ニシテ若年時ヨリシテ兆アリ破瓜機轉ト齊發シ其素既ニ淺劣ナル神經中樞ヲ侵觸シテ全生涯ノ間ニ附隨シ時ニ或ハ潛藏スルヲアレト微害ニテモアラバ直ニ發呈スルモノハ多クハ皆其症益發育シ益變質ニ趣キテ遂ニ其末期狀態トナリ了スルナリ

### 第九 神經衰弱狂 (Neurasthenisches Irresein.)

#### 神經衰弱症 (Asthenische Neurose.)

(一)總説 神經衰弱ハ全身神經系統症ニシテ現今益多キヲ致スヲ見ルナリ其本症ニハ臨牀上神經機能ノ異常ニ興奮シ易ク而モ極メテ急速ニ虛脱スル狀態ヲナスモノナリ蓋シ是レ神經中樞ノ榮養障礙アリテ潛力ノ集成充分ナラズ消費セル潛力ノ補填足ラズ且遲滯ナルヲ致スガ爲ナラン

神經衰弱家ハ其物質代謝此ノ如ク其機能作用此ノ如クナレトモ時ニ其人ヨク飲

食シヨク消化シ或ハ盛容アリ榮養宜キヲアルヲ見ルニ彼ノ所謂神經中樞ノ榮養障礙ハ蓋シ頗ル細微ナル者ナルベク其レ或ハ神經節細胞ニ榮養異常アリテ其榮養料ヨリ作ル所悉ク劣下ナル化學産物ノミニシテ中樞神經系統ヲシテ其機能具ハラズ高等中樞ノ制止作用ヲ全カラザラシムルヲアルニアラザルカ若シ果シテ此ノ如クナラバ亦以テ轉達作用及ビ反動作用ノ異常ニ起リ易キヲ説明スベキナリ蓋シ此二者ハ殊ニ泌尿生殖器界植物性機能界及ビ腦髓ニ於テ發呈スルヲ多ク此反動ハ血管運動神經系統及ビ心臓神經系統ニ於テ較明効現アリテ爲ニ血壓及ビ血管ノ絶ヘズ變換スルヲ致ス

神經衰弱症ガ特立ノ機能性神經病ナルカ中樞性神經系統ノ一種固有ナル疾病性反動狀態ナルカニ關シテハ爭論アリ蓋シ神經衰弱症ハ一種固有ナル臨牀證候群ニシテ鑒別甚難カラザルモノナリ

神經衰弱病ハ全身機能精神病ニシテ全身神經系統ヲ犯侵スルモノナレトモ精神體狀ハ其中最モ較明ナルモノナルガ故ニ又之ヲ機能性精神病ト稱スルモ可ナリ

(一)經過 其病症好良ニシテ其人素質ナク其本タル禍害ノ經過性ニシテ除去スベキモノニシテ之ニ由リテ偶然ニ生ツタルモノナラバ其經過急性ニシテ遅クトモ數月ノ後ニハ治癒ニ轉歸スルヲ常トスレトモ此編ニ論ズル所ノ如キ體質性ナルモノハ慢性ニシテ數年乃至數十年ニ延及シ弛張性増劇性ノ經過ヲナシテ以テ精神病ニ終ルヲ稀ナラズ

(二)症候 其發病ハ急卒ナルヲ稀ニシテ此ノ如キトニハ必較著ナル素性ト震盪狀ニ作用スル劇甚誘因トアルモノナリ其症多クハ神經系統ノ刺戟症狀虛脱症狀ヲ以テ徐



徐ニ初マリ此等ノ症モ初メハ安靜又ハ睡眠ニテ退消スレモ途ニハ常存性トナリ中  
樞機官ハ復、神經力ノ產出消費ノ平衡ヲ持スルヲ能ハザルニ至リ其疲憊症狀ハ總覺  
障礙トナリテ全身ニ發シ全身ノ倦憊、虛憊、不快、精神制止、感觸、精神業作、難澁ノ感觸、睡  
眠、食物、飲料、刺戟材、嗜好品ノ需要等ノ症狀ヲナス

感應ノ障礙ハ頗ル早ク患者ハ重病ノ薄迫スルヲ覺エ爲ニ恐怖ノ甚キアリ  
興奮症狀モ亦早ク彼ノ疲憊症狀ニ併呈スルアリ感情刺戟性トナリ(膈皮質ノ興奮)觀  
念生活ハ爲ニ異常ニ強ク興奮シ一定ノ考慮(主ニ苦痛性内容)ノミ常ニ累積シテ出  
テ夜間ニモ睡中ニモ虚脱腦髓ヲシテ休ムヲナカラシメ睡眠之ガ爲ニ安堅ナラズシ  
テ屢、中斷シ屢夢多クシテ半醒ムルガ如ク醒後ノ新銳ヲナサズ

其他ノ夙發症狀ハ血管運動ノ症狀ニシテ血液ノ過充(頭中充血、衝逆、心悸、閉急感觸等)  
及ビ貧血(血管痙攣乃至局所ノ脈絡、厥冷等)ノ所ヲ換ユルモノアリ

經過中ノ最要ナル症狀ハ身體力、精神力、荒墜ノ感觸及ビ之ニ對スル反應性ノ鬱抑ニ  
シテ未來ニ關スル慘憺タル直觀ヨリ甚キハ慰藉スベカラザル長疾性ノ沈鬱ニ至ル  
モノアリ原病ノ猶存スルヤ其症狀ノ發呈及ビ所在ハ之ニ從テ轉換スルヲアリ又屢  
時時ノ禍害ニ左右セラレルモノニシテ不攝食ハ一時胃患ヲシテ主症ヲラシメ感動  
ハ心臟神經ノ病患ヲシテ主症ヲラシメ相對性精神激勞ハ腦髓憊患ヲシテ主症ヲシ  
ムルガ如シ

今猶ホ更ニ其證候ヲ委細ニ記セシム

感情生活ノ障礙ハ内容上ニハ慘憺タル感應ニシテ身體ニ重病アリトノ感觸ニ基ク  
モノアリ外形上ニハ感動興奮シ易キノ症アリ加フルニ感動ノ異常ニ持續シ異常ニ

強度ナルヲ以テシ且感情生活ト密着ノ關係アル血管運動機能ニモ影響ヲ及ボシ以  
テ其禍害ヲ長ズルアリ感動ノ本源ハ主トシテ疾病ノ感觸ヨリス(夥多ノ嫌惡ナル感  
覺、筋肉緊張ノ減殺、精神身體作能力ノ減退ニシテ自信力モ爲ニ大ニ減損ス)

觀念力ハ此感觸内容ノ範疇内ニ步趨スルヲ必然ニシテ爲ニ長疾性トナリ一時或ハ  
強迫觀念ノ狀ヲナスニ至ル其内容ハ通例之ヲ身體機轉ニ歸スベキモノニシテ悟性  
失却ノ觀念ヲ致シ頭中ノ壓感、考慮機轉ノ制止ヲ長疾性ニ換解スルヲ多シ卒中其他  
急難薄迫ストノ意想ハ心悸、閉急感觸、梅核氣等アルキ起リカ、ル患者ハ安シテ家ヲ  
出テ車ニ馳セ閑室ニ居リ無人ノ地ヲ躡ムヲ得ズ暴風雨ノ起ラントスルキ毒、刀、犬  
等ヲ見シキナドニモ又同様ノ觀念起ルヲアリ

注目スベキハカ、ル觀念ガ感情ニ影響シテ苦悶、閉急ヲ致シ考慮ニ影響シテ錯亂ヲ  
致シ意思ニ影響シテ動作ノ不能ヲ致シ血管系統ニ影響シテ血管痙攣、蒼白、心悸ヲ致  
シ分泌器ニ影響シテ下痢、膀胱痙攣、唾分泌ノ閉止、發汗ヲ致シ筋肉緊張、度ニ影響シテ  
脚搖動、顫振ヲ致スヲナリ而シテ其感情ノ劇キト危難ニ關スル觀念トハ直ニ現ニ其  
危難ヲ被ムルトノ妄想ニ迄ナルヲアリ觀念ノ經過ハ制止機轉ノ爲ニ都テ澁滯シ自  
覺ハ澁滯トナリ一時感觸ノ附帶ヲ缺クテ屢ナリ考慮ハ澁滯シ且疲勞スルヲ早ク  
觀念再生ハ微茫ニシテ多カラズ(健忘)裁決辨別ハ艱澁ニシテ不確ナリ其ノ衰弱セリ  
疾病アリトノ感觸ハ此患者ノ氣力及ビ事業力ヲ麻木シ之ヲシテ怯懦、優柔、不斷、匪喪、  
萎靡、疑懼ニシテ一時或ハ自處スル能ハザラシム

睡眠ハ精神刺戟(膈髓興奮症)ヲ致スアリ其精神機官ノ安休ヲ得ザルガ爲又身體機  
轉(心悸、脈搏、感觸、筋肉不穩)及驚異ノ爲ニ常ヲ失シ大都安堅ナラズ醒後ノ新銳ヲナサ



ズシテ麻酔劑ニテ強致セシ半醉状態ノ如ク或ハ異常ニ深且長ナルコトアリ(貪眠症) 神明障礙ニハ刺激性衰弱ノ症(感覺過敏アリ刺衝アルキ異常ニ強キ感觸ヲ附帶スル)アリ其機能極メテ早ク弛解シ一時ノ虚脱ニ至ルアリト主觀性興奮(飛蚊症、幻聽等)ノ症トアリ殊ニ煩惱ナルハ神經衰弱性弱視ナリ

感覺障礙ハ極メテ多ク皮膚、筋肉、内臓ニアリ痛覺倒錯最多ク神經痛之ニ次ギ感覺倒錯又之ニ次ギ稀ニハ感覺脱失アリ皆一定ノ神經路ニ固着スルノ症ニアラズ此種症狀中殊ニ緊要ナルハ脊髓刺戟症ナリ

總覺障礙ノ標症ニハ甚キ倦憊虚備アリ早速虚脱アリ此症ハ疲勞ノ爲ニ起リシニアラザレバ朝起ノ後ニ最強キモノナリ要スルニ精神上ノ影響ヲ受クルコト大ナリトスル中樞性迷走神經症狀モ屢之アリテ數食症不食症、消化又ハ分泌ノ備ハラザル胃症タリ注目スベキハ嗜好品(酒精、煙草)ノ需要ニシテ爲ニ一時神經症狀ヲ退クルアリ從テ又其濫用及ビ慢性中毒ヲ致スノ虞アリ食物ニ對スル特異反應症、一定ノ藥品(鐵、麻酔劑)ニ對スル不堪症モ亦稀ナラズ

色事生活ハ多クハ減損ス

血管運動ノ障礙ハ緊要ナリ其刺激性衰弱(血管運動神經ノ異常ニ容易ク興發シ且ツ急ニ虚脱スルヲ云フナリ)アルコトハ顔色ノ轉換シ血液配分ノ處ヲ轉シ四肢ニ於テ屢ニ痙攣脈乃至局所絶脈アリ寒熱ノ感觸、交承轉換シ心臓閉塞乃至胸痛症及ビ怔忡(心臓動脈ノ域中ニ血管痙攣アリ)アルニテ知ルベク奪乏、頭中壓感等ノ苦痛性感觸(痛覺倒錯)及ビ精神作能ノ制止并ニ大ナル精神ノ感應遠和ヲ附隨スルコト多シモ恐ラクハ

局所性血管痙攣ニ基クナラン

分泌障礙トシテ磷酸鹽尿、尿酸尿、牛身又局所ノ多汗症、脂腺ノ分泌減却(皮膚乾燥、關節諸液ノ分泌減却(關節受感)アリ)

運動障礙ニテハ筋肉緊張性ノ減却シ筋肉ノ早ク虚脱シテ其硬變セシテ感觸スルアリ其作用不全トナリ又實際筋肉神經作用減却スルアリ(弱キ低キ聲ナド)又頭振、纖維性攣縮アリ反射運動ハ制止機制ニ機能性衰弱アルガ爲ニ亢進ス(廢入ラントスルハ)

攣縮アリ、皮膚反射、膝反射亢進シ、臍肚痙攣、早時射精、夢洩、膀胱痙攣等アリ)

(四)原因 慢性神經衰弱病ハ殆皆神經病性素累アルモノニ發シ其素累ノ臨牀症狀中最緊要ナルモノニシテ又其素累ヨリ生ズル機能神經病(男ニハ主トシテ心氣病、女ニハ主トシテ臍躁病)及ビ精神病ノ基礎タリ然レモ亦其後天ナルモノナキニアラズ急性重病精神身體ノ過勞、道徳上及ビ身體上ノ震蕩(鐵道)、累出產孽、色事過荒殊ニ手淫過度ニヨリテ起ルモノ是ナリ

(五)種別 神經衰弱病ニ三種別アリ腦性、脊髓性、内臓性はナリ此三者ハ或ハ齊存シ或ハ錯綜シ或ハ相尋ギテ來ルコトアリ

腦性神經衰弱病ハ諸種ノ腦過勞精神過勞(殊ニ其感動ト結ハルモノ)ニヨリテ生ジ易ク其病狀ハ主ニ精神及ビ神明症狀ナリ精神症狀ニテハ其制止ハ其甚キ動作不能ノ度ニ迄至リ感觸ノ制止ハ其甚キ精神感覺脱失ニ至リ自覺ノ制止ハ其甚キ一時性精神官能神經ニ至リ健忘性失語及失音症サヘ致スコトアリ鬱憂ハ必存ノ症ニシテ其反應性ナルヲ以テ鬱狂ノモノト異ナレモ而モ之ト相推移スルモノアリ強迫觀念モ多ク之アリ鬱憂著キモニ方リテハ其内容ハ自殺又ハ外界敵視タリ神明證狀ニテハ



頭壓ハ殆ト之ナキトナク通例腦軟化トナリ狂疾トナルナドノ畏疾性意想ヲ帶ビ來  
 リテ感情ヲ不穩ニス。又弱視アリ。膀胱、嚙、モ稀ナラズ。  
 脊髄性神經衰弱病ハ多クハ身體過勞、重病、產後、色荒、感動等ノ結果ニシテ患者ハ疲勞  
 シ易ク困憊ノ感ヲ起シ皮膚、筋肉、關節ノ痛覺倒錯ヲ告ヘ少シク業作スレバ直ニ虛脫  
 シ其血管運動神經、分泌神經、心臟神經ニ轉達波及スルガ爲ニ心悸、發汗、閉塞感、苦痛  
 感觸ヲ致ス。膝蓋腱反射ハ亢進シ就眠ハ屢擧縮ノ爲ニ妨ケラル。又屢醒成ノ感觸アリ  
 筋肉ノ意思刺激ニ應ズルヲ難進ナリ殊ニ多キハ脊髄刺激症ニシテ他ノ脊髄機能障  
 礙ノ症ト合シテ屢頑固トナリ脊髄病起ルナドノ意想ノ基本トナルモノナリ。  
 内臟性神經衰弱病 心臟神經衰弱病、胃神經衰弱病、陰部神經衰弱病、アリ  
 Visceric Neurasia  
 心臟神經衰弱病ハ神經衰弱ノ要素アル人又ハ既ニ其症アル人ニシテ感動ノ爲、過温  
 浴ノ爲、吹煙過度ノ爲ニ起リ其症ハ心臟神經作用ノ障礙ノ發作ト間歇時症候トニシ  
 テ其發作トハ心動停止スベシトノ感觸ヲ呈シ心部ノ痛覺倒錯、壓搾振動ヲ併起シ迷  
 走神經及舌咽頭神經ヘ分散傳達スルヤ呼吸困難、梅核氣等ヲ生ズルナリ患者ハ卒中  
 ノ爲ニ死ニ瀕スルナリト信シテ危疑不安トナリ其感動ノ爲ニ益、其症ヲ劇クス既ニ  
 シテ其症狀消散シテ患者ハ疲羸トナリ虛脫シ而モ感情動キ易ク血管運動性機能變  
 動シ易ク再ビ新發作ヲ致スノ傾性アリ心臟病アリトノ意想ノ爲ニ劇ク不穩トナリ  
 心部ノ痛覺倒錯症ノ爲ニ畏疾性觀念及ビ感應遲和ヲナスハ殊ニ然リ。  
 胃神經衰弱病ハ一部ハ消化機轉ノ反應症狀ニシテ尋常程度ヲ過ケルモノナリ(反動  
 Neurasia gastrica  
 興奮性及ビ刺激ヲ移傳スルヲ殊ニ之ヲ血管運動神經系統ヘ移傳スルノ異常ニ易キ  
 ニテ知ルベシ)一部ハ消化機轉ニハ無關係ナル病患タリ(胃痛、嘔吐、噯氣、時々ノ水、粘液

嘔吐、梅核氣狀感觸、數食症、不食症ノ交承轉換、秘結、遲徐ナル脈搏、睡眠ノ障礙、感情刺戟  
 性、及感應遲和)消化ノ病患及ビ其反應症狀ハ昏憊、頭壓、酩酊狀ノ頭中奪乏ニシテ衝逆  
 アルモノ、目閃、耳鳴、神經亢奮、心悸、冷感熱感ノ交承轉換、食眠、等ナリ其他殊ニ消化不真  
 ノ病患アリ(胃窩中ノ盈填、心窩搏動、噯氣、惡心、嘔吐)カ、ル患者ハ小食ニシテ其甚キ途  
 ニ飢乏ニ至ルヲアリ精神過勞及ビ感動ハ此症ノ必要ナル原因ナリ。  
 色事性神經衰弱病ハ最モ注目スベキ症ニシテ男子ニ在リテハ其原因ハ色荒、殊ニ手  
 淫、多淫ニシテ色事ヲ禁斷スルヲ(時ニ尿道後部ノ慢性痲疾ニシテ其初(陰部)ノ局所性  
 機能神經病ノ期)ニハ腰髓ナル射精中樞ノ興奮性ノ亢進ノ爲ニ遺精アリ(或ハ初發性  
 ニシテ生來ノ症又ハ荒淫ノ爲ニ生ゼズ或ハ續發性ニシテ尿道攝護腺薦骨叢ノ感覺  
 過敏ナド末梢性刺戟機轉ニヨリテ惹起サル)又交媾時ノ射精過早アリ爲ニ交媾不能  
 トナリ其人ヲシテ沈鬱ナラシムルアリ遺精ハ又震蕩狀ノ害ヲ中樞機官ニ及ボシ患  
 者ヲシテ脊髓病初期ヲシテカチ恐レシメ途ニ深重ナル心氣症又ハ鬱症ヲ致シ此  
 感應此考慮ニヨリテ物起中樞ニ制止作用ヲナスヲアリ(精神)上陰萎(爾後ノ經過中ニ  
 於テハ腰髓中樞ノ刺戟性衰弱加ハリ腰髓性機能神經病期諸種ノ刺戟ハ多ク累積ノ  
 遺精ヲ致シ刺戟性衰弱ハ爲ニ彌増シ而モ其(多クハ)多淫ナル屢、勃起ヲ致セヒ其中樞  
 ノ刺戟性衰弱スルヲ充分ナル交媾ニ堪ユルノ勃起ヲナサズ此ノ如クニシテ遺精ト  
 交媾トハ脊髓性神經衰弱ノ症ヲシテ日ニ益、較明ナラシメ此ト陰萎ト併セテハ大ニ  
 其人ヲ沈鬱ニシ脊髓勞タルノ考慮及ビ心氣性沈鬱ヲナシ腰薦骨神經叢ノ痛覺倒錯  
 及神經痛ハ之ニ加ハリテ色事性脊髓衰弱症ノ症候ヲ完備ニス其人若シ素累アラバ  
 ソハ遂ニ全身神經衰弱症トナリ其偶然ノ約制ノ異ナルニ從ヒテ腦性神經衰弱症、胃



神經衰弱症等トナルナリ色事上ニ基キタル神經衰弱症ニハ其人嫌避性屈抑性ニシテ自家感觸卑下トナリ心氣性沈鬱ニシテ脊髓勞タランカト恐怖スルアリ態度ハ弛解シ筋肉緊張ノ度ハ減却シ全身榮養良ク而モ膚色蒼白ニ飢乏顫振及ビ慌忙顫振アリ運動ノ不整又失節トナルニ至ル等皆其特徵タリ其他ニ消化不良、放屁、便秘、脈數大變動(感情又身體過勞ニテ一百二十至ニ及ア)等ノ傾向、血管運動性機能ノ平衡易傾性乃至全身血管痙攣ノ發作ニシテ劇キ心部苦悶及ビ閉塞ヲ兼メルモノアリ又末梢性陰部性及ビ腰髓性神經衰弱病ノ症アリ爾後ノ射精ノ爲ニ統全病患殊ニ精神病患ノ増進ヲ附帶スルアリ女子ハ、色事性神經衰弱病モ其疾病發生ノ狀及ビ症候ハ男子ト相似陰荒殊ニ手淫精神上手淫ハ少カラザル影響アリ交媾忍久交媾中絶モ亦其影響決シテ之ニ下ラズ男子ノ遺精ニ相當シテ快夢ノ爲ニ輸卵管及子宮ノ緊張性收縮ヲ起シ淫好性興奮ニヨリテ陰部ノ分泌液ヲ排出スルアリ此機轉ノ震盪狀作用ハ神經衰弱ノ症ヲナス男子ノ遺精ト同シ其他原因上緊要ナルハ子宮及卵巢ノ機能性及機質性疾患ニシテ其感覺過敏ヲ致ス男子ノ尿道攝護腺ノ同症ノ如クナリ解剖上ヨリ云ハハソハ陰部ノ腫瘍、楔狀出血、轉位、侵蝕等ノ神經ヲ壓迫シ牽列シ又ハ露出シテ之ニ刺戟作用ヲナスガ爲ナリ(Hegar氏)又陰部薦骨神經叢ノ司掌スル機官(膀胱ノ病、直腸裂傷、痔疾)ニモ又之ニ似タル一アリ其本症ハ陰部ノ局所性機能神經病、脊髓刺戟症ノ必存スル腰髓性機能神經病及ビ全身性機能神經病ナリ(神經衰弱症ニシテ臟躁ノ症混ズ)病候ハ破瓜時又ハ經期起ルル希ナラズ其神經病性疾患ハ常ニ月經時ニ高進スルアリヘガール氏ハ色事上ニ起リシ神經病ニ付キ論シテ曰ク「其病ハ腰髓症候ヲ以テ初マリ腰髓ヨリシテ推弘シ其症候ハ主ニ色事域ト密着ノ關係アル所(胃、

咽頭、乳房、喉頭、甲状腺、三叉神經)ニ發シ其發作ハ(其發成ノ本タル身體他部ノ異常及疾病ハ之ヲ除キ)腰神經叢及薦骨叢ノ神經路中ノ前兆證候ヲ以テ初マルモノナリト

◎治療ハ第一ニ精神療法ニシテ且其原因ニ處スベシ刺戟性衰弱ニ直ニ施治スルニハ緊要劑ヲ用フ食物ハ強壯ニシテ蛋白質多ク脂肪多キモノヲ選ビ刺戟品嗜好品ハ之ヲ避ケク理學療法中ニハ換氣法(山中移住)水治法(按摩、脚浴、河浴、海水浴)電氣法(全身感傳電氣方、電氣浴)ハ多ク用ヒラル藥治方ハ鐵、砒石、サトリヒニン、磷素、麥奴、阿片、亞鉛、古加乙温、だみあゐ、規那等其症ニ從ヒテ之ヲ施シ對症上ニハ有效ナル鎮定藥トシテバチぢあ(流動越幾斯)及臭素鹽類アリ催眠藥ニテハばるあるてひとチ首トシ抱水あみれん、するふおなる之ニ次カ抱水くるらるるハ一時用トスベキノミ榮養甚衰ヘシキ(胃神經衰弱症ノ一定種)ハ強制餌養法(ぶれふ、ヤ氏)ヲ用フベシ

### 神經衰弱狂ノ種別

神經衰弱病ハ他ノ全身神經病ニ同ク大ニ經過性精神病又ハ末期性精神病ノ發生ニ素性ヲナスモノナリ其中ニハ精神素累ノ僅微又缺無ニシテ神經衰弱ノ狀態ハ後天性ニ起リ多クハ經過性ニシテ然ラザルモ體質性ニハアラザルモノ所謂機能性精神病ト重キ素累アリテ慢性體質性神經衰弱症ハ初メヨリ其主徵タルモノ所謂變質性精神病トアリ其ハ一時性トナリ(一時性精神病)又ハ長續性トナリ長續性精神病ニハ鬱狂、遲鈍狂及ビ妄覺狂アリ(上文參看躁狂ハ稀ナリ是レ神經衰弱症ニハ緊張力ノ



缺乏スル爲躁狂ヲ起スニ充分ナラヌナリ神經衰弱症ニ基キシ鬱狂ハ多クシテ之ヲ手淫性鬱狂ト稱ス其他猶ホ神經衰弱性偏執狂強迫觀念狂アリ此二者即チ所謂變質病症ニ屬スルナリ

(一) 一時性神經衰弱症 (Transitorisches Irresein auf neurasthenischer Grundlage.)

總説及ビ原因 コハ時トシテ腦髓性神經衰弱症ノ病頂ニ來リ腦髓虛脫狀態ノ最高點トシテ飢乏及ビ虛脫(頭振尋常下溫度)ノ外徵ヲモ附髓スルモノニシテ多クハ後天性神經衰弱症ニシテ多少急性ニ發生ス一時狂ノ直接近因ハ連夜不眠ノ殘餘ノ緊張力ヲバ消盡スルモノナレバ睡眠復シ榮養復スルヤ乃忽ニ解去ス  
證候 精神機官ノ虛脫ハ發シテ意識溷濁乃至無意識ニシテ相當ナル追想虧缺アルモノトナリ又神明機能域ノ缺落症狀乃至自覺ノ廢絶トナリ又言語直觀運動直觀ノ滅亡トナリ苦悶譫妄性觀念ハ時時發起シ來リテ之ヲ夢ノ如キ濫妄ナル行爲ニ致シ其狀朦朧狀態夢寐狀態昏迷狀態譫妄狀態等ノ癡癡ニ似タルモノアリ然レモ其預後治療及ビ患者ノ未來ノ社會上位地トニ關シテ明ニ之ト區別セザルベカラズ腦虛脫症多クハ充分ナル睡眠ニヨルノ去ルヤ意識ノ清明及ビ反正ハ速カナリ

其原因トシテ腦髓貧血症ノアルハ瞳孔ノ多クハ開張シ且反應遲鈍ナルニ表ハル唯血管緊張性腦貧血ノアルハ動脈ノ時トシテ鐵線狀ニ收縮シテ且脈ノ小キニヨリテ考フベシ  
持續ハ數日以内ナリ其前後ニハ分明ナル重症腦性神經衰弱症ノ症狀アリ再發ハ稀ナリ

(二) 長續性神經衰弱症 (Profahntes neurasthenisches Irresein)

(S) 神經衰弱性鬱狂又名手淫性鬱狂 Melancholia neurasthenica s. M. masturbatoria.)

總説 神經衰弱性鬱狂ハ色事性神經衰弱症ヨリ出デシ腦脊髓性神經衰弱症アルモノニ發生ス  
證候及ビ經過 潜伏期ハ神經衰弱症ニシテ鬱憂症(必有ナル)頭壓及ビ考慮制止癡狂溼迫ス脊髓刺戟症脊髓勞トナル)色事機能ノ障礙(不治ノ陰萎症トナル)ヲバ畏疾性ニ換想錯解スルノ症アルモノニ均ク其狀態ハ漸次ニ増益シテ精神病ノ程度ニ至リ或ハ精神震盪等殊ニ驚愕其病症結果ヲ聞知スルコノ爲ニ急ニ狂疾ヲ致スヲアリ自家感觸ハ深ク卑下シ他人己ガ手淫スルヲ視テ爲ニ己ヲ卑ムナリト信シ他人ニ注目セ



ラルト感シテ大ニ之ヲ愛痛シ幻歟ノ之ニ加ハルヤ己ニ惡臭アリテ人鼻ヲ掩フテ  
避クト考フ其心痛ハ特發症タルコト少ナクシテ精神制止症狀ノ反應タルコト多シ患者  
ハ痛歎感動シテ其疾病其罪責ヲ縷陳スルコト演劇ノ狀ノ如ク而モ彼ハ自ラ其罪アリ  
トテ恨憾懺悔スルコト少ナクシテ信仰家ナルモ危禍ヲ蒙フリタリトシ宗教上ノ巡禮  
ヲナスコトアリ其危疑不安ノ甚キニ及ビテハ劇度ノ刺戟症アリ旁人ニ批擧ノ行爲ヲ  
ナスニ至ル

注目スベキハ苦悶發作(心臟神經衰弱病、血管運動性胸痛症)乃至鬱狂性暴動發作ニシ  
テ時時發起シ殊ニ夜ニ多シ自殺企圖モ通常極メテ多キ症狀ナレバ能ク之ニ注意ス  
ベク懺悔ト自救ノ急迫トヨリシテ自ラ陰部ヲ毀傷スルコト稀ナラズ凡ソ其酸鼻ナ  
ルコト此ノ如クニシテ而モ手淫ヲ止ムル能ハザルハ患者ノ最モ恐レ甚ダ嫌フ所ニシ  
テ而モ亦自ラ之ヲ控制スルコト能ハズ又意思及ヒ考慮ノ制止ヨリ苦痛ヲ覺エテ之ヲ  
惡敵ノ爲ニ牽制セラル、モノト自覺シ或ハ真個鬼憑症ニシテ相當ノ譫妄及ビ妄覺  
アルモノヲ成スコト稀ナラズ

此症ハ深重ナル素累アルモノナレバ不潔作嘔物ヲ食ルノ急迫(糞、矢、蚯蚓、唾壺)ノ内容  
ヲ食フ(衝動性暴動發作、強迫觀念、原發譫妄) 内容多クハ宗教性ナリ 頗ル多キヲ見ルナリ

其一時或ハ妄覺狂ニ移行スルハ此狀態ノ神經衰弱症ニ基クヨリ考フルモ稀有ニア  
ラザルハ明ナリ二者ニ通有ノ特別ナル原因タルハ其本人性ノ委懦ニシテ精神身體  
共ニ完整ナラズ人ヲ嫌避シ情ニ冷淡ナルコト感情ノ過敏ナル(屢之アリ)コト宗教及ビ秘  
法妖術ニ傾向多キコトナリ身體上ニハ神經衰弱症殊ニ頭壓、脊髓刺戟症並ビニ幻歟ア  
リ幻歟ハ此症ニハ殆之ナキモノナシ

預後ハ不良ニアラズ  
治法 緊張劑兼阿片ハ効アルコト多ク水治法ト手淫ノ守視ハ治療ノ主ニ居ルナリ

(ろ)神經衰弱性偏執狂 (Paranoia neurasthenica)

此種ノ偏執狂ガ標式性偏執狂ト區別スル所ハ患者ノ意識、偏執狂性ニ變化シ之ニヨ  
リテ神經衰弱病ニアル感覺障礙ノ諸證ヲ無論理性ニ錯想誤認スルヨリ妄想ヲ生ズ  
ルニアリ患者ハ其諸症ヲ以テ盡ク外界ノ影響ニヨリテ然ルモノトナスナリ故ニ頭  
壓ハ之ヲ其敵人ガ毒氣ノ惡計ヲ以テ冥濛セシメントスルニ歸シ其考慮障礙ハ之ヲ  
仇敵ガ隱巧ナル奸策ヲ以テ我悟性ヲ滅シテ狂院ニ致サントスルニ歸シ其消化不良  
ノ病患ハ之ヲ己ヲ毒セント謀ルモノアルニ歸シ其夥多ノ感覺異常(脊髓刺戟症、痛覺  
倒錯、筋肉及ビ皮膚感覺過敏等)ハ之ヲ理學上化學上ノ技術ヲ以テ我ニ加フルモノア



リテ我生活力ヲ奪ヒ我ヲ疲憊困弊セシメントスルニ歸シ其他ノ症皆一ニ此ノ如キノ説明ヲ蒙ラザルモノナシ其ヨリノ後ニハ妄覺ヨリシテ益々妄想系統ヲ構成スルノ偏執狂ノ他症ニ於ケルガ如クニシテ妄覺ノ臨牀上内容ハ殊ニ此症ノ陰部神經衰弱症ヨリ發セシモノニハ(過淫殊ニ手淫過度ニヨルモ多淫ニシテ色ヲ禁シタルニヨルモ又女子ニ生殖器病ヨリ神經衰弱症ヲ發シタルモ)豊多饒富ナリ經竭期ニ生ズル偏執狂モ亦其發成方多クハ之ニ同シ臟躁症ハ女子ニシテ其病ノ陰部神經衰弱病ヨリ發成セルモノニハ大抵之アリ且偏執狂ノ妄想城府ノ建築材トナリテ爲ニ臟躁性偏執狂ノ類症ト臨牀上相推移スルモノアリ醇然神經衰弱ナル病種ニテハ時ニ強キ異疾性色容アル機能神經病性前驅期アリテ直ニ注察妄想追跡妄想ニ移ルナリ

神經衰弱性偏執狂ノ最較明ナルハ陰部神經衰弱病ヨリ出デシモノニシテソハ實地上殆ト手淫性偏執狂ニ同シ

(は)手淫偏執狂 (Paranoia masturbatoria)

證候及ビ經過 潜伏期ハ陰部神經衰弱病ノ證候ノ全身ニ恢弘シツ、アルモノニシテ其畏疾性觀念ハ脊髓勞癩狂、腦軟化等起ランカト云フニ出入シ其經過中ニ特異ナルハ理學上追跡妄想、幻覺及ビ苦悶發作ナリ

手淫偏執狂ノ病初ハ多クハ之ヲ定ムルヲ得ズ社會交際上精神ノ牢確ナラザルヲハ手淫家ニ固有ニシテ誰カ我秘事陰行ヲ見タリトノ苦痛感觸之ニ加ハリ以テ發病ヲ速ニス患者ハ他人我爲ス所ニ注目シ竊ニ之ヲ窺ヒ知リ由テ又己ヲ追跡スト感シ堅ク之ヲ信ジテ外界ナル萬般ノ一ハ皆我ト關係アラザルナキヲ覺エ他人ノ言談辭色舉止ヨリ新聞廣告貼紙ニ至ルマテ皆諷刺嘲罵ノ意ヲ寓スルモノ、如ク之ニ由リテ精神不確ト猜忌危疑トハ彌々増益シ錯聽錯視ハ益々其妄想ノ成ラントスルヲ助長シ病初ヨリ發リシ幻覺ハ己ニ惡臭アリテ人我ヲ惡疾ニカ、ルトスル故ニ他人ノ己ニ遇フキ我前ニ回避シ惡心ノ貌狀ヲナスナリナド、想考スルニ至ル

此ノ如キノ潜伏期アルヲ數月數年ニシテ而ル後漸次又急卒ニ其病頂期ニ達スルアリ病頂期ハ多クハ追跡ノ音聲ニヨリテ發起セラレ患者ハ「彼ハ惡漢ナリ除カザルベカラズ」之ヲ殺戮スルノ盟誓成レリ」ナド云フノ聲ヲ聽キ又種種ノ神經衰弱症狀アリテ豊多ノ材料ヲ追跡妄想ニ給シ食後ノ消化不良症狀ハ被毒トナリ精神制止ノ感觸ハ仇敵ガ我悟性ヲ亡ボシテ狂院ニ致サントスルノ惡計ニ出ヅルトシ血管運動障礙ノ爲ニ昏惰感觸頭壓アルモ亦同様ノ計策ニ歸セラレ或ハ嘔囉仿謨青酸等ノ幻覺ト併呈シテ奸策惡術ノ結果トシ其無意識トナルハ他人己ヲ奪ヒ去ラントシ其策ヲ完



フセシガ爲誓約ヲ消サンガ爲ニ然カストナスアリ殊ニ緊要ナルハ神經痛性感覺痛覺倒錯性感覺ニシテ手淫ノ爲ニ脊髓感覺路ノ機能性刺戟過度ナリシ症狀ナリ感覺過敏ハ時ニ神明域及ビ五官域ニ延及シ感覺アル毎ニ相當ノ譫妄性觀念ヲ起シ考慮アル毎ニ相當ノ感覺ヲ起シ五官ニ在リテハ最微ノ刺戟アルモ幻覺ヲナスノ傾向アリ皮膚、筋肉、總覺等ノ種々ナル感覺異常ハ患者ノ沒論理ナル推想ニ從ヒテ應施セラレ身體或ハ重キヲ加ヘ輕キヲ致シ或ハ強硬トナリ空間ニ飛揚シ諸器官中空トナリ又重キヲ鉛ノ如クニナリ、神魂身ヲ離レ(離魂)磁氣身中ヲ流過スル等ノ感觸アリテ反射運動乃至局所又全身ノ痙攣狀證候(緊張狂)ヲ致シ患者ノ意識ヲ促シテ之ガ説明ヲ試マシムルナリ此感覺異常ハ何人ニモ同様ニ解セラル、極メテ驚クベキモノアリテ教育アル人ハ仇敵ヨリ秘密ナル電氣磁氣ノ機械ニテ害ヲ加ヘラルトナシ教育ナキ人ハ噫氣、妖術、毒氣、毒藥ヲ以テ害ヲ加ヘラルトナス又陰部ノ局所神經症(毒丸刺戟症、精系神經痛、尿道感覺過敏)ヲバ同義ニ應施スルヲ希ナラズシテ敵人己ニ手淫ヲ施シ遺精セシメ我輩丸ヲ引キ又刺スナド、妄想ス

此病ハ寛解狀態増劇狀態ニ出入スルモノニシテ増劇狀態ハ通例手淫過度アルノ時ニ來リ累積ノ幻覺、感覺違常、脊髓反動興奮性増進、乃至強直性間代性發作、強梗狀發作、

癲癇狀發作ト附隨ス其他ノ經過ハ標式性後天性偏執狂ノ他症ト同シ妄想ノ誇大妄想ニ轉化スルヲ稀ナラズ精神衰弱ハ偏執狂ノ他ノ原因ヨリスルモノヨリモ早ク又強ク起ルナリ

治法 神經衰弱病ノ症狀及ビ脊髓刺戟症ニハ緊張療法(水電氣療法等)効アリ莫見比涅及ビ臭剝ハ感覺過敏痛覺倒錯、幻覺ヲ滅殺シ對症上價直ナカラズ

(2)強迫觀念狂 (Irrisen mit Zwangsvorstellungen.)

總說 強迫觀念狂ニ於テハ強迫觀念ハ長續性ニ又豊富ニ本人性ヲ犯襲シ精神生活ヲ諸方面ニ於テ或ハ制止シ或ハ振撼シ又ハ強迫スルヲ其ノ素累アル神經病家又鬱狂者ニ於テ原障礙又經過性障礙タルモノト異ナリ且又一種固有ノ經過ヲナシテ爲メニ一種特別ナル徵候アル病態ヲナスナリ

其考慮ニ作用スルヤ能ク之ヲ制止シ感觸ニ作用スルヤ之ヲ振撼シテ其甚キ危疑不安ヲ致シ精神運動上ニ作用スルヤ其強迫觀念ノ内容ニ從ヒテ或ハ行爲ヲ衝動シ又ハ爲サントセシ行爲ヲ妨遏スルアリ

原因及ビ病性 此強迫觀念狂ニハ機能神經病ノ基礎アリ其基礎ハ通例體質性神經衰弱症及遺傳性神經衰弱症タルコアリ或既ニ業ニ此基礎アリテ加フルニ強迫觀念



ノ機轉ト附隨シテ臟躁病症狀又ハ心氣病症狀ノ發スルヲアリ又神經衰弱病ニシテ著キ臟躁又心氣症狀アルモノモ然ラザルモノモハ希ニハ後天性精神過勞、感動、重症虛脫病、累尋ノ分娩授乳、色荒、殊ニ手淫等ニヨリタリ此ノ如キノ症ハ時ニヨリテ經過性ナリ發病又ハ時々再發ノ誘因タルモノハ即チ是等衰弱ヲナスノ要素ナリ其素累(遺傳)アルモノニ發セシハ生理上ノ生活期(破瓜、經竭)ニテ既ニ病ヲ起スニ足リ或ハ生來偏執狂ノ如クニ破瓜前又ハ兒時ニ發スルヲアリ又其疾病ガ神經衰弱ニ基キテ其經過ヲナスコハ感動、失血、月經、嫌惡、不樂、蕩淫等腦髓ノ緊張度ヲ減シ衰弱ヲナスノ要素ヲ以テ發病ノ近因トナスコ其病ノ再發及ビ増劇狀態ハ之ガ基礎タリ附隨症タル神經病ノ再發増劇ト相追從スルコ、神經衰弱ニ對スル治療ニシテ効ヲ奏スレバ精神症モ亦輕良トナルコ等ニテ知ルベキナリ

此病ハ男女ニ發スルコ其數相同シ  
 證候 其強迫觀念ハ偏執狂ノ原發譫妄ト似テ又之ト通有ナル所アリ其初發性ニシテ感動性基礎更ニナク(感動ニヨリテ増進)不意識生活ノ深底ヨリ發育シテ意識性論理法觀念内容ヲ驚慌シ妨礙シテ之ト對峙シ之ニ隔異ニシテ之ヲ強迫シ之ヲ克制スル所即チ是ナリ其差別ノ要ハ偏執狂ノ原發譫妄ハ速ニ是認シ類化シ(系統性)妄想列

ニ編入セラルレモ強迫觀念ニ在リテハ(少ナクモ通常ハ)意識長ク之ヲ疾病性ナリト感覺シ他ノ妨礙ヲナシ且類化セラレザル竄入物トシテ特立スルニアリ經過ヨリシテ之ヲ見ルモ亦二者ノ相類スル所アリ二者トモニ眞個體質性持續性狀態ナレモ大都停止性ニシテ進行シテ重症ノ精神衰弱狀態トナルコナキナリ  
 潛伏期ニハ精神症狀ノ呈露スルコナシ精神ノ健安中ヨリ全ク無關係ノ考慮起リ感動ノ爲ニ起リシニモアラズ又感動ヲ附帶スルニモアラズ疾病性ノ強劇ト長久トヲ以テ意思ノ氣力聯合ノ氣力ニ反抗シテ意識中ニ特立シ其獨自ラ退去スルニ至テ初メテ止ムモノアリ其去ルヤ乃チ患者ハ一時沈靜安寧トナリ然ラザレバ又別ニ一新考慮ノ固着不拔ニシテ患者ニ煩累惱苦ヲナスモノ起リ來リテ彼ニ代ルアリ其從前ノ強迫觀念ニヨリテ感情ノ興發シ易キ狀態ヲ生ジ爲メニ意思及ビ聯合作能ヲ制止スルノ能力減却シ發作アル爲ニ腦髓ノ業作過度トナリテ考慮機官ヲ一時益、神經衰弱ノ狀態ニ致スノキニ於テハ益、此處アルナリ  
 強迫觀念ヲ發シタル直接ノ誘因ハ其ノ分明ナルコ甚少ナシ其起ルヤ心理上ニナルコアリ五官知覺ヨリ驚慌スベキ事件又讀書對話中ノ語ヨリシテ意想聯合ノ道ニヨリテ生ジ又時ニ反對觀念トシテ起ルカ如キ是ナリ然レモ通例ノ發成路ハ生理上、機



質上ニシテ原發譫妄ニ同シ強迫觀念ノ發生ノ動因モ亦之ヲ舉グルヲ難シ時トシテハ其好色淫佚ナル觀念ト月經機轉色事興奮機轉トノ關係ノ證明スベク破壞性觀念ト身體ノ不快感覺(例ハバ神經痛)トノ關係ノ證明スベキヲアリ

強迫觀念ノ内容ハ頗ル多種不同ニシテ各人ノ精神生活ノ豊少富賤ト性向トニ相當スルモノニシテ生來ノ性質異常ハ其内容ニ與力アリ例ヘハ宗教上ノヲ疑惑穿鑿スル強迫考慮ハ信仰篤キ人ニ來リ蒙汚不潔ノ考慮ハ臟躁及心氣性素質ノアル人ニ來リ諸物整頓シテ其存ルベキ所ニアルカヲ疑惑穿鑿スルノ考慮ハ小故ニ拘泥シ甚ク秩序ヲ好ムヲ以テ夙ニ人ニ異ルモノニ來ルナリ然レモ又一方ヨリ之ヲ見レバ人ニヨリテ生活ノ位地男女教育ノ度等ノ大ニ異ルニモ關セズ其内容多クハ標式性ニ相類似シ其時間上ノ繼承マデモ一致スルヲ猶ホ生來偏執狂等ノ標式性原發妄想ノ如クナルハ大ニ吾人ヲ驚カスニ足レリ

此症中初メニハ穿鑿症ヲ以テシ多クハ宗教又形而上ノ事物ニ付後ニハ金屬動物ニテ汚瀆セラルトノ強迫觀念ヲ以テシテ此二者ノ標式性ニ發呈スルモノアリ之ヲ以テ此病群中ノ一箇獨立ノ病態るらんどもと云ふる氏ノ所謂觸覺ノ妄錯アル疑問症トスルハ理アリト云フベシ

此種ノ強迫觀念ハ最多シ宗教上ノ内容ナルハ「神トハ何ゾ」神ナルモノ果シテ有ルカ「未來永劫トハ何ゾ」何故ニ鬼物アルカ「鬼ナルモノ眞ニ之アルカ」豫言ナルモノアリヤ「如何ニシテ三寶ヲ合シテ一人ニ歸スルカ」等ノ問題ニ終始シ之ニ似タルハ形而上ノ問題ニシテ如何ニシテ人間ハ發生セシカ「如何ニシテ世界ハ生セシカ」等ヲ疑惑シテ已マズ又絶エズ算數上ノ問題ヲ究ムルモノモ多ク最難キ胸算ヲナシテ困弊スル迄ニ至ルアリ或ハ五官ニ知覺アル毎ニ其見聞セシ事物ノ理由ヲ問ヒ又ハ之ガ爲ニ事生ズルナキカヲ問フ「アリ刀ヲ見レバ自ラ刃子又ハ人ヲ刃子トスルノ思慮來リ從テ又斬ラバ直ニ死スベキカ死サバ如何ニシテ死ニ就クカ失血ノ爲ニ死センカナド種々ノ問題ヲ起シ來リ河畔ヲ行クキニハ誰チカ水中ニ墜陥スベキカ不チ思ヒ從テ又之ヲ擠シナバ游泳シテ死チ免レンカ直ニ死亡センカナドノ問題ヲ起スナリ強迫觀念ノ内容或ハ人世ノ利害ニ關係ナキ「アリ例ヘバ今遇ヒシ婦人ハ美ナルカ醜ナルカ未婚ナルカ既婚ナルカナド云フ問題ノ如シ又他人ノ人ニ在リテハ日常ノ仕事ニ就キテ絶エズ我がナセシ事ノ宜ク整ヒタルカ手紙ニハ文字分明ナリシカ文字語格ノ誤ハナカリシカ墨塗汚染ハナカリシカ宛名ハ分明ニ書キシカ手書ハ郵便箱ニ入レタルカ如何又錢量ハ正ク教ヘシカ算用ハ正カリシカ戸ハヨク閉ゲタルカ火ハヨク消エシカ盗入リハセヌカ等ノ考慮續々發起シテ止マザル「アリ之ヨリモ苦惱チナスノ強迫觀念及疑惑亦之アリ我爲セシ所ノ「我身又ハ他人ノ健康ヲ害セズヤ」如キ即チ是ニシテ火寸留針玻璃碎片墨染斑チ疎末ニシテ他人ヲ害ハズヤトノ考慮ハ大ニ患者ヲ苦メ其想像ハ空想無實ナル我過失ヲ思ヒテ其結果ヲバ絶奇絶異ニ畫キ出シ橋上ニ於テハ忽然人チ水ニ擠シタリトノ考慮來リテ通行ノ人誰カ水ニ落ハセヌカト瞰下シ法庭ニ證言シテハ言語正



シカラズ偽證ヲナセリトノ考慮起リ社會交際上ニハ他人ノ密約ヲ語リ又ハ秘密ヲ爲シタリト考ヘ業務上ニハ約定證紙ヲ失ヒタルヲ思ヒ商店ニ臨ミテハ物品ヲ秋ニシ又ハ衣ニ貼シテ窃ミタリト配慮シ街上ニテハ人前ニ報顔スベキヲアリト思ヒ或ハ又數時間モ兒童ノ轎過セラレザルカ屋瓦ハ落チザルカ橋梁陷ラザルカ通行ノ人ハ無難ナリシカトテ佇立觀望スルノ已ムヲ得ザルアリ

其後ノ經過ニ至リテハ屢汚物毒物ニテ身ヲ澁シタリトノ強迫觀念ニ至リ犬猫ヲ見テハ痰狗毒ノ觀念起リ銅器又金銀鐵器等ヲ見テハ銅膏ノ觀念起リ或自ラ毒セラレト思ヒ或ハ家人ニ毒ヲ傳フト考ヘ或ハ諸物皆毒ヲ被ムルトナスナリ

強迫觀念ハ必スシモ奇怪隔異ノヲナラズシテ又眞ニアルベキノ危難哲學問題又ハ算數問題ニ出入スルヲアリ唯其常ヲ失スルハ其疑惑ヲ終結スルヲ能ハズ其疑フ所ノ疑フベキニアラズ行ハルベキニアラザルヲ知リナガラ止メントスルモ止マラズニ發起シ來ルニ在リ

強迫觀念ハ觀念ノ外形上障礙ニシテソハ精神生活ノ他ノ機能ニモ影響ヲナスモノナリ觀念經過ノ方面ニ於テハ其聯合ノ自在ナルヲ控制シテ苦ヲ解キ安ヲ致シ其違ヘルヲ矯正スベキノ觀念ヲ抑制シテ之ヲ起スヲナシ必要ナルハ其行爲ヘノ影響ニシテ意識全ク清明ニ其機轉ノ疾病性ナルヲ覺リ考慮強迫ノ無益ニシテ且己ヲ苦ムルヲ覺ルニモ關セズ患者ハ常ニ疑惑シ尋問シ從テ又之ヲ注視シ確認スレモ其事タルヤ皆徒勞徒作ナルノミ後ノ期ニ及ビテハ其行爲衝動ハ漸ク強迫觀念ト結附シ之

ニ從ヒテ行爲ヲナスニ至ル

患者ハ其強迫觀念ヨリ自家又他人ノ爲ニ危險ヲ防ガザルベカラズ是ニ於テカ室匪ノ破壞ヲ延バシ街上ノ石ヲ拾ヒテ人ノ足ヲ折傷セザランヲ謀リ自殺他殺ヲナシ罪惡ヲ行ヒタルノ強迫觀念ノ起リ之ニ從ヒテ自ラ訴フルニ至ルアリ或ハ其事他人ニ利害ナク常ニ秩序ヲ持シ器具ヲ所々ニ齎置シ計畫ヲ色々ニ變ヘ絶エズ身ヲ洗ヒ衣上ノ(假想)塵垢ヲ除クヲアリ此ノ如クニシテ患者ハ多ク時日ヲ失ヒ漸ク職業不能トナリ毒ヲ恐レテハ銅器鐵物ニ觸ルハ能ハズ他人ヲ妨害スルヲ恐レテハ街ヲ行キ橋ヲ過ケルヲ得ズ一定ノ街衢物品ハ之ニ接スル毎ニ恐ルベキ強迫觀念ヲ惹起スルヲ以テ其街ニ遊ビ其物ヲ見ルヲ背テセズ人ナキ町ヲ選ビ又ハ晩ニノミ出遊シ橋ヲ過ケルニ急走スルナドノヲアリ

殊ニ必要ナルハ強迫觀念ノ感情生活ニ反動作用ヲナスヲニシテ之カ爲ニ劇キ反應性苦悶乃至危疑不安ノ發作及ビ神經性病候癩癩脈搏顫振心悸卒倒ニ至ルナリ其ノ苦悶アルハ強迫觀念ノ爲ニ苦痛ナル精神緊張狀態ニアリ其觀念ノ強迫ヲ打破スル氣力無キヲ感觸シ其觀念ノ内容苦痛性(瀆神猥褻犯罪)ナル等ヨリ之ヲ説明スベク之ニ加フルニ彼ノ非行ヲナスノ衝動ニ從ハザルベカラザルノ苦悶ヲ以テス猶ホ又其苦痛狀態ヲ告白スルノ危險ト諸事ノ爲ニ狂疾ヲ發センカノ感觸トハ其苦悶ヲ加フルモノナリ



患者ノ其強迫觀念(無利害ノ行爲ヲ起スモノナラバ)ニ從ヒ其衝動ヲ實施スルヲ得又ハ號哭スルヤ此運動上分泌上ノ反應ニヨリテ苦痛ノ病候ハ忽チ去リ直ニ爽快ヲ感ズルナリ

經過ハ寛解増劇ニ出入スルモノナリ間歇數年ニ及ブモノ稀ナラズ發作ハ急卒ニ作リ急卒ニ去リ各發作ノ相累積シ來リシ後ニハ鎮靜及ビ安息ノ時ノ長キヲ多シ身體障礙ハ此病ノ基タル機能神經病(神經衰弱病、臟躁、心氣病)ニ屬スルモノニシテ機能神經病ニハ凡テ自發性苦悶發作及ビ癲癇様證狀アルヲ稀ナラズ此症ニモ亦然リ經過中一時ハ鬱狂ノ起ルヲアリ又一時患者ノ批評力ハ其強迫觀念ニ對シ減弱シ之ヲシテ妄想ト品價ヲ齊フセシムルヲアリ

轉歸 此病ノ轉歸狀態ハ三アリ治癒偏執狂、又ハ精神衰弱ノ狀態是ナリ後天性ニシテ素質ナキノ症ニハ治癒アリ然ラザレハ決シテ治セズ而モ間歇狀態ナキニアラズ精神衰弱ハ癡狂トハ誤ルベカラス其癡狂ニ轉歸セルモノハ從來未タ之アルヲ見ズ治法ハ第一ニ其機能神經病性、神經衰弱性ノ基礎アルヲ省ルベク冷水氣候療法、海水浴、全身感傳電氣方、緊張劑(鐵、機那、ゑるごちん、砒素)ニテ神經系統ヲ強健ニスルハ治方ノ主ナルモノナリ深重ナル體質性ノ症ニサヘ一時奏効アルナリ

精神狀態ニ對シテ好良ナルハ社交、旅行、遣散、執業ニシテ其意ニ適シ感情身體精神ヲ過勞セザル程ノモノ、最必要ナリ。精神機官ノ疾病性感受性亢進ハ臭剝(四乃至六〇)又ハ抱水あみれんヲ長用シテ之ヲ減退スベク之ニヨリテ發作殊ニ其月經時ニ起リシモノヲ除キ又ハ頓挫シテ輕易ナラシムルナリ  
發作中ニハ臭剝ノ大量(六乃至十瓦莫兒比混注射、抱水くろらる、飲酒殊ニ旁人ノ慰藉、信用アル人ノ其事ノ然不ヲ確論スルハ之ヲ靜ムルノ作用アリ

### 第十 心氣狂 (Hypochondrisches Irresein)

#### 心氣病 (Hypochondrische Neurose)

(一)總説 心氣病ハ機能神經病トスベキカ精神病トスベキカハ學者ノ論争スル所ナレトモ蓋、後者ニ決スルモノナルベシ心氣病ノ精神病界ニ於ケル地位ニ就テモ諸説一ナラスぐり、ちんげるハ之ヲ鬱狂ノ一種輕和ナルモノト解シタリ之ヲ事實ニ徵スルニ心氣病者ニハ心痛及ビ制止症狀アルヲ誠ニ之アリ然レモハ初發性ニアラズシテ結果症狀ナリ總覺障礙、痛覺倒錯及ビ之ニ附帶スル苦悶ノ觀念(強迫觀念)ニ同ク他ノ觀念ヲ妨遏シ患者ヲシテ絶エズ其身ノ障礙機轉ニ心ヲ盡サシムルナリ(ニ對スル反應ナリ此強迫タルヤ一ハ身體上感、觸(總覺)ノ種性如何カ感應及ビ觀念ニ影響アルト(生理上ニモ然リ)ヨリシテ説明スベク一ハ意識ニ充溢スル觀念ノ内容(病重ク命危キ



〔一〕ヨリモ説明スベキナリ心氣病ハ本感覺性神經病(總覺機能神經病)ニシテ必精神界ノ之ニ反應性關與アルモノヲ云フナリ若シ感覺性機能神經病ノ時ニ却退スルガ爲ニ意識ニシテ疾病性感覺ニ統制サルトナクバ精神ニハ當ニ制止モナク鬱抑モナカ  
ルベキナリ是レ心氣病ガ心氣性鬱狂ト區別スル所ニシテ心氣性鬱狂ニハ初發性ノ  
痛憂及ビ制止(微小妄想罪業妄想ヲ有ス)アリテ總覺ノ深障礙(通常之ガ原因タリ又附  
隨症タル身體病ニ基ク)ヲ兼テ之ヲ疾病性鬱憂及疾病性制止ノ説明企圖ニ應施スル  
モノナリ

心氣病ト神經衰弱病トハ種々相交觸スル所アリテ神經衰弱病ハ心氣鬱憂及妄想ヲ  
結構スル所以ノ身體基礎タリ又其本源タルト希ナラズ而レモ二者ノ別亦自明ニシ  
テ心氣家ハ必シモ神經衰弱家ナラズ神經衰弱家ハ又必シモ(其常ニ畏疾性ナルトハ  
アレモ)心氣家ナラズ

(二) 證候 心氣病ノ證候ニシテ精神界ノ緊要ナル證狀タルハ精神機官ノ自覺能力ノ輕  
易トナレル事ニシテ之ガ爲ニ他ノ(多クハ病變セル)機官ノ神經興奮機轉(既此症ノ原  
因タリ)ヲ分明ニ識領シ且之ニ較明ナル不快感觸乃至感動ヲ附帶スルアリ(精神上感  
覺過敏)意識ハ之ガ爲ニ絶エズ不安ニシテ或ハ他ノ感觸觀念ヲ制止シ其感觸ヲ誤釋  
スルニ至ルナリ其解釋タル固ヨリ各患者ノ箇人性意識狀態並ニ其原因タル身體病  
ノ種類ニヨリテ重病アルノ觀念トナリ又奇絶異絶ノ推想ヲナスニモ至ルナリ其感  
覺ヲ轉想誤釋スルノ此ノ如ク奇異ナルニ至ルハ觀念機轉從テ又批評思慮ノ常ナラ  
ザル(制止機轉)ヨリ説明スベシ又患者ノ本人性ノ多クハ生來既ニ沒論理ナルヨリ説

明スベク此點ニ於テハ心氣家ハ大ニ偏執狂者ニ似タル所アリサレバ人或ハ心氣病  
ヲ以テ偏執狂ノ一種輕和ニシテ外形上猶思慮ヲ備フルモノナリトセルハ以ナキニ  
アラズ之ヲ事實ニ徵スルニ心氣病ト心氣性偏執狂ノ一定狀態トノ推移ハ漸チ以テ  
スルモノナリ心氣病ノ病頂ニ於テハ再生觀念ニモ活潑ナル感觸乃至感動ヲ帶ビ神  
明性感覺過敏アリテ其觀念アルヤ之ニ關スル感覺(總覺幻覺)ヲ提起スルナリ  
意識ノ感觸ニ影響ヲナスヤ絶エズ益増長シテ制止機轉ヲナシ其結果ハ精神生活ノ  
諸方面ニ及ブナリ(智ヲ於テハ其感覺ヲ譬喻狀解釋スルト益奇異トナリテ觀念及  
ビ感觸ニ於テハ好樂感覺ノ制止セラルハヤ慰藉スベカラザル精神感覺脫失ヲ致シ  
五官知覺ニモ亦之ヲ致シ道徳觀念道徳感覺ノ制止ハ我ノ病機狀態ト兼テ自恣自  
縱ヲ致シ審美上感觸觀念ノ起ラザルヤ凡テ身體機轉ヲバ人ニ告ケ人ニ談シテ其不  
禮亡狀ヲ願ミズ精神作能力ノ凡テ制止セルハ慰藉スベカラザル失神無氣力ヲ致ス  
ナリ

心氣家ノ考慮欲向ハ唯身ヲ其誤想セル痼疾沈痾ヨリ救ハントスルトニ限り之ガ爲  
ニ數多ノ醫人ヲ招待シ諸方ニ赴キテ徒ニ處方ヲ要望シ治方療材ヲバ擇アテナクシ  
テ我身ニ試ミ益自窘迫シテ巧藥ノ病トナリ其効用更ニ之ナキヤ其懣苦日ニ益長ズ  
感覺過敏ハ諸感覺路ニ及ビテ病患彌甚キチ加ヘ其想像ノ過度ニ刺戟性ナル疾病中  
最恐ルベキモノヲ舉ゲテ我身之ニ罹ルトシ其觀念ハ又相當ノ刺戟ヲ身體ニ加ヘテ  
相當ノ感覺ヲ起スナリ其病頂ニ於テハ其所謂痲瘋ナル身體機轉ニノミ汲々トシテ  
其發矢ヲ抓シテ繼蟲ヲ搜求シ舌ノ肉嘴ヲ檢シテ痲瘋球子ノ増殖スルヲ見唾中ニハ



結核ヲ辨シ尿渣ニハ膀胱石アルヲ證シ無故ノ皮疹ハ微毒ノ證左トナリ心悸ハ心臓  
麻痺ノ前兆トナリ神經衰弱ノ症ハ脊體勞チ表シ頭壓頭痛ハ腦軟化ノ將ニ起ラント  
スルヲ疑ハザラシメ是ガ爲ニ患者ハ常ニ感動充多ナル與奮状態ニアリ恐ルベキノ  
死亡ニ瀕スルヲ苦慮シテ已ム時ナシ合併症トシテハ時ニ自發性苦悶發作ノ來ル  
アリ甚キハ暴動發作トナリ或ハ自殺ヲ致スコトアリ

心氣病ヲ約制シ或ハ之ニ附隨スル神經病性障礙ニハ感覺過敏アリ神經痛アリ痛覺  
倒錯アリ感覺倒錯アリ時ニ又脊體交感神經腦髓交感神經ノ感覺脫失アリ五官ノ感  
覺過敏アリ一時幻覺サヘモ起ルコトアリ腦髓性神經衰弱症脊髓性神經衰弱症ノ症狀  
群ヲ見ルコト希ナラズ運動障礙(反動痙攣、呼吸痙攣、梅毒核氣)血管運動及ビ分泌ノ障礙モ  
亦稀ナラズ

(三)經過 心氣病ハ他ノ諸機能神經症ノ如クニ弛張性増劇性ニシテ内外ノ要素ニヨリ  
テ屢ニ再發スルモノナリ素累ナキモノニ在リテハ多クハ經過性ニシテ治癒スベク數  
週數月ノ持續ナリ體質性心氣病ハ病態間歇チナスノミニシテ其轉歸ハ重症精神病  
タルヲ稀ナラズ

(四)發來 心氣病ハ殊ニ男子ニ多ク其經過性ナルト輕和ナルトハ總覺ガ身體病ニテ障  
礙サレシキニハ何人ニモ之アルアリ而レモ此ノ如キハ體質性ニシテ多クハ遺傳素  
累ニ基キ既ニ兒時ニ初マリ其生涯中ニ附隨シ色々ノ機質性原因(生活ノ時期、慢性腸  
病、胃病、肝病、心病、時ニ全ク無故ナル生殖器病、泌尿器病、神經衰弱病等)精神上ノ原因(嫌  
厭、非職生活、心氣家トノ交際、一定ノ普通學術書ノ讀過、流行病等)ノ爲ニ提起セラル、

モノニ比スレバ殆ド病ニアラズモ云フベシ

(五)診別 心氣病ノ病候タルモノ及ビ一個獨立病タルモノト混スベカラザルハ重症腦  
病(麻痺、狂ナド)ノ經過中ニ一症候トシテ發スルモノナリ

(六)治法 心氣病ニハ必身體病ノ之ガ基タルモノアルモノナレバ先ツ之ヲ發見シ之ヲ  
治療スベシ是レ多ク實地家ノ誤マル所ニシテ心氣家ヲ以テ病ヲ空想スルモノトス  
ルナリ然レモ是レ決シテ然ラズ夫レ心氣病者ノ患フルトスル所ハ空想ノ病ニハア  
ラズシテ實際ニ相當セザル病覺(感覺過敏)アリ之ニ基ケル自恣及ビ病ヲ好ムコトアル  
ヨリ其病ヲ適當ニ表白スルノミニ心氣家ノ感覺ハ空想ニアラズ其謬妄ハ他ノ(多ノ)精  
神病者ノ如クニ身體基礎ヲ缺クコト少ナク唯其解釋ガ迷ヒ誤リ大ニ奇異ナルノミ  
治療ハ身體上及精神上ノ二ツアリ患者ノ感覺過敏ナル其精神上治療ハ先ツ鎮定、轉  
導、遣散ヲ求ムベシ而シテ精神治療ノ要ハ先ツ患者ノ信用ヲ博スルニアリテ其病ニ  
同情ヲ表シ之ヲ精究シ之ニ注意シ細ニ身體ヲ検査スルハ其信用ヲ得ルノ一助ナリ  
若シ一旦之ガ信ズル所トナレバ又嚴ニ我命ヲ用ヒシムルヲ得ベシ之ニ接遇スルノ  
正實的確ナルハ患者ヲ感服セシメ嘲笑戲弄ハ之ヲ憤懣セシムルナリ其誤リ信ズル  
所ヲ論理上攻破セントスルノ効ナキハ偏執狂者ニ於ケルト同シ極メテ必要ナルハ  
其精神ヲバ日常整習スル業務ニ轉導スルコトナリ蓋、勞作生活ヨリ安坐生活ニ移ルノ  
時ニ病ヲ生ズルモノニハ從前熟習ノ業務ハ多少其心ヲ轉シ其身ヲ練ルニ最宜キナ  
リ然レモ其業ハ決シテ精神身體ヲ激勞セズ又醇然機制上ノモノナラズ無目的ナラ  
ズ嫌厭性ナラザルヲ選ブベク小旅行、温浴、體操、騎馬等ハ多クハ効アリト稱セラル病



頂期ニハ(全身感覺過敏アルキ)安靜又就碌サヘ必要ナリ藥方モ亦精神上適用方タル  
モノニシテ心氣家ハ藥方ナクハ安ンセズ身體上藥ヲ要スルヲナクモ假裝ノ藥ヲ與  
フベシ而モ之ヲ以テ藥方病者(藥方ヲ濫請スルノ意カ)トナスベカラズ

身體治療ハ其原因タリ又附隨症タル身體病(腸胃病、生殖器病、神經衰弱病)ニ對スルモ  
ノニシテ其治法ハ病理學各論ノ所說ニ從ヒテ執行スベク然レモ決シテ區々規度ヲ  
踏襲セズシテ其體質、生活狀況及精神上需要ニ從ヒテ適宜之ニ處スベシ然レモカカ  
ル患者ハ多クハ生來精神異常アリ其精神器質ハ大ニ治療ノ執行ヲ難クスルナリ身  
ヲ薄弱ニスル處治、中性鹽類ノ長用(深ク物質代謝ヲ害スル)ハ、ナ泉療法ハ心氣家  
ノ體質及神經性狀態(刺戟性衰弱神經衰弱病)ノ堪ユル能ハザル所ナリ水治法、電氣療  
法、氣候療法、海水浴、衛生及食療(食養生)、緊張劑ハ概シテ其ナリ對症法ニハ一時鎮定劑  
ノ必要アリ殊ニ感覺過敏、不眠、苦悶發作アルモノニ然リ又第一ニ試ムベキハ臭素劑  
胃酸ニシテ阿片ヨリモ堪ユベキナリ

### 心氣狂ノ種別

#### (一)心氣性精神衰弱狀態 (Geistige Schwachheitsstaende aus Hypochondrie.)

重症多クハ體質性心氣病ノ轉歸狀態及ビ其益發育セシ狀態ハ精神衰弱ノ狀態タル  
ヲ稀ナラズ麻痺狂ノ心氣形ナルモノトハ異ナリテ之ト誤ルベカラズ決シテ完全ノ

癡狂迄トナルヲナシ

證候ハ毫末ノ慰樂モナキ失神及ビ意思缺亡ノ狀態ニシテ此症狀ハ唯機質上ヨリ苦  
悶感觸ノ發セシキ一時退却スルノミ自ラ救治ヲ求メントスルノ感動欲向モ減却シ  
往時貴重セシモノニモ更ニ關心セズ人ニ對シテ審美上ノ省慮ナルモノナク其狀貌  
穢汚トナリ其身體需要ヲ適充スルニハ毫モ省顧スルヲナク我身ノ痼痾ノミ心ニシ  
テ爲ニ種種ノ疎濫無益ナル習風ヲ生シ時ニ感動ノ起ルヲアレバ之ヲ呈露スルヲ宛  
然、小兒ノ如ク其疾病狀態ヲ縷述シ解釋スルヲ益奇異ニ益怪誕トナリ爾後時ヲ以テ  
其症候漸ク廢シ身體ハ消削ニ陥キリ殊ニ腦髓ニハ其甚キヲ見ルナリ(早老狀態)

#### (二)心氣性偏執狂 (Hypochondrische Paranoia.)

他ノ轉歸ハ心氣性偏執狂ナリ醇一ナル心氣病ニ在リテハ其異常ノ感覺ハ猶ホ之ヲ  
論理上ニ結構シ其病患ヲ以テ猶ホ有リ得ベキノ疾病狀態ニ擬スレモ後來ノ經過ニ  
於テハ纔ニ殘存スル思慮サヘモ缺亡スルニ至リ其感覺ヲバ解釋スルヲ極メテ隔絶  
奇異ニシテ物理上醫學上有ルベカラサルノモノタルニ至ル之ヲ醇一性心氣性偏執  
狂トシ其此ニ至ルニハ感覺ガ謬妄性觀念ニ變ズルノ容易ナルト又逆ニ觀念ガ感覺  
ヲ惹起スルノ容易ナルト大ニ與力アルナリ妄想既ニ成リタルキハ幻覺ハ大ニ其構



成ヲ助クルモノナリ  
 之ニ加フルニ種々ノ療法ヲ以テスルモ毫モ効ナシ患者ハ醫治ノ足ラザルニアラザルカヲ疑ヒ諸方ノ醫家ヲ歴訪シテ頻ニ治ヲ托シ無數ノ賣藥ニ効ヲ収メンコトヲ求ム其間證候益加ハリ病名益多ク身體諸部ハ鐵杖ヲ以テ挫キ裂キ振ラレ脊髓ニハ振轉切斷アリ頭ハ空虛ニシテ藪ヲ填ムル如ク腹中ニハ焚キ刺シ流レ攀ルアリ四肢陰部ハ死潰シ呼吸ニハ惡癘ノ臭アリ批評欠乏ノ益加ハルニ及ビテヤ病性ハ益絶異驚クベキモノトナリ患者ガ初ニ症候ヲ述ブルガ爲ニ取リシ譬喩比較ハ遂ニ眞實トナリ脈中ニハ血液ナクシテ犬毒、糞氣アリ心臓ハ石トナリ食道直腸ハ離斷シ又閉塞シ腹中ニハ生活動物(蜘蛛蟾蜍蛇)アリテ其臟腑ヲ食フ其身既ニ完カラズ食フコトヲ得ズ眠ルコトヲ得ズ感ズルコトナク身ハ既ニ長ク死滅シテ全ク他ノ人間、木塊、動物植物ニ化シタリ人目ニ入ラヌ程小ク卷縮セリト云フニ至ル蓋シ其異常ナル感覺ガ妄想ノ想像性構成ヲ致スヲ見ルニソハ大ニ此ノ如キノ状態ヲナスニ與カラシ然レモ其體內ノ感覺ハ單ナル感覺妄錯ノ爲ナラズシテ之ヲ妄想上ニ解釋スルガ爲ナルコト亦誠ニ見易シ是レ正ニ假裝治療ヲ以テ此妄想ヲ矯正スベカラザル所以ナリ其感覺ハ通常沈鬱、危疑、刺戟性ナリ行爲界ニ於テハ疾病性意思缺亡、弛靡、心氣性感觸

ヲ克制スルノ不能、職業ヲ敢行スルノ不能アリ其生活狀況ノ節約及ビ(苦惱性)整齊ナルヲ亦特徴ナリ  
 多少苦惱性ナル心氣病ト此種偏執狂トノ推移ハ漸ヲ以テス夫レ或ハ患者ノ批評力ノ衰退スルヨリ感覺ヲ外界ニ倒置シテ其仇敵性影響ノ爲ニ然リトナシ(追跡ノ症)此ヨリシテ心氣性偏執狂ヲ養成スルコトアリ此ニ在リテモ亦妄想ノ益發育スルハ他ノ偏執狂ト同ク幻覺ニヨルナリ

第十一 臆躁狂 (Hysterisches Irresein.)

臆躁性質 臆躁性原障礙 (Hysterischer Charakter. Elementale psychische Störungen der Hysterischen.)

(一)總説 臆躁病ハ精神神經病性障礙ニシテ運動及ビ感覺ノ病症ヲ有シ其諸症ハ精神上ニ根本シ生理上ノ配合ヲナシ而モ其解剖上ニ基クコトヲ表スル所ノモノナシ臆躁ノ症狀ハ豐候多態ニシテ神經系統ノ之ニ關ルモノ或ハ此部分ニ於テシ或ハ彼ノ部分ニ於テスレモ其必存ナルハ精神ノ異常ニシテ就中其原障礙ノ狀ナルモノ多シ  
 (二)原因 下ナルベキモノハ多クハ精神素性ナリ時トシテハ一タ、ビ興奮シテ忽チ臆躁ヲ喚起シ時トシテ反復性、長續作用ノ刺戟アリテ初メテ之ヲ致スアリ此ノ如キモノハ即チ失常ナル教育、刑罰ノ恐惶、宗教上想像ノ興奮、催眠術等是ナリ又事禍ニヨリテ神經震蕩ヲ起シ以テ之ヲ致スコトアリ第二類ノ原因ハ全身病傳染病(霍亂、肺炎、猩紅熱)



急性關節痠痛、尿酸病、間歇熱、微毒ニシテ特ニ微毒ノ如キハ潜伏性又ハ輕和性トナリシ癡癡ヲ再撥挑スルナリ蓋此諸病ハ直ニ癡癡ノ挑動者タルト少クシテ之ヲ神經衰弱ノ状態ニ陷井レ以テ癡癡神經病ノ好發生ノ地ヲナスナリ何ノ病モ皆此ノ如クナラザルナク唯前ノ數者ハ其最顯著ナルモノナリ

又癡癡ハ身體ノ大衰弱ヲ致スノ疾病ニモ尋起ス出血、精神過勞、身體過勞、手淫及色荒、貧血、及萎黃病ノ如キモノ是ナリ中癡ノ癡癡トノ關係ハ近時漸ク其說起リシヨシニシテマリー氏ノ說ニヨレバ癡癡症狀ハ中癡、中鉛、中汞、硫化炭素中癡ニモアリ概スルニ慢性中癡ニ多クシテ急性中癡ニ少ナシ龍腦(二十五)ノ中癡、嘔嘔仿謨癡醉後、ニ癡癡ノ起リシ例モアリト云フ自家中癡ニシテ癡癡ヲ致スアルハ甚疑ハシ

其他誘因タルハ生殖器及神經系統ノ病ニシテ多發性硬化、脊髓勞、ふり、ぢら、い、ひ、氏病、進行性初發性筋肉病、(三)氏病、等是ナリ以上諸者ハ悉ク皆癡癡ノ誘因トナルベキノミニシテ遺傳素性アルニアラズンバ此諸者アリハ癡癡ノ病ヲ起ストナシ

(三)證據 本症狀ハ精神機能ノ平衡ノ傾覆シ易キヲ感情ノ甚興發シ易キヲ其反應ノ非常ニ強剛ナルヲ興奮ノ急劇轉換スルヲ(刺戟性衰弱)ニシテ其主ニ居ルハ感情生活ノ異常ナリ患者ハ内外ノ精神刺戟ニヨリテ動カサルトシ甚ク病頂期ニ於テハ感情ハ感應トナラズシテ直ニ感動ニ發シ(精神感)覺過敏其精神機轉ハ專ラ不快感觸ヲ附帶スルガ爲ニ感應及ビ感動ハ主ニ鬱抑性ナリ而レハ觀念ノ急速轉換スルト感情興奮性ノ高進セルトハ感應ヲシテ常同ナラシメズ感觸感動ノ紛紛轉換シ哭泣喜笑ノ倏忽翻覆スルト通常ナリ觀念ニ活潑ナル感應ノ附帶スルヨ

リ欲望類ニ發リ而モ其絶エズ轉換スルヤ患者ハ感情輕動家トナリ人又ハ物ニ對シテ傾好嫌忌甚ク變轉シ物ヲ欲認スルト甚劇キトアリ(嗜)異症之ヲ嫌棄スルト亦然リ又感觸附帶ノ倒錯モアリテ特異反應性アリ疼痛性精神刺戟ノ居多ニシテ疼痛性感覺ノ頻累ナルカ、ル患者ハ自ラ甚困難不幸ナリト感シ爲ニ自恣家トナリ他人ノ困苦ニ無感覺トナリ自家ノ安寧ニノミ焦心シテ社會上及道德上ノ感觸運鈍トナリ發務ヲ放棄シ家人ノ安寧ヲ顧慮セズ己ガ病苦ヲ告ケルト己ムレナク傍人ノ傾意モ之ガ爲ニ漸ク疎冷トナルヤ患者ハ途ニ己ガ病ヲ過張シ伴稱シ以テ傍人ノ注目感興ヲ惹起サントス(鹹)チ飲ミ色彩ヲ塗抹シ自ラ傷ケ故ラニ暴行スル等其想像力ノ疾病性ニ亢進セルハ大ニ之ガ用ヲナシ而シテ風儀心ノ衰弱セル諸詐偽言ニ逡巡スルトナク人ノ之ヲ顧ミズ之ヲ放棄スルヲ見ルヤ患者ノ感動スルト最劇シ

觀念界ニ於テノ原障礙トシテハ思想ノ進行或ハ急促或ハ遲徐或ハ飛躍ス患者ノ感情上觀智上ノ刺戟性ナルハ強迫觀念ヲ致シ易ク觀念再生ノ眞ヲ得難キハ想像ノ亢進ト相ヒ結ビテ追想ヲ錯マリ患者ヲシテ食言家ノ狀アラシム時ニ(殊)ニ月經時及ビ感動ノ高劇ナルキ追跡性原發妄想ノ起ルトアリ色事界ニモ亦癡病ヲ受ケ色事上ノ感覺ハ増進シテ直ニ淫好感覺トナリ(交)媾、(幻)覺、或ハ絶異絕奇ノ行爲ヲ致ストアリ(裸)ニシテ行キ、益ナキ化粧品、又尿ヲサヘ塗抹スルノ傾向時ニハ又淫交嫌避アリ或ハ特異反應性トシテ男子ニ對シ特ニ又情夫ニ對シテ然ルアリ又或ハ一時倒錯性色事感觸ニシテ相當ノ欲動又ハ宗教性發揚ノ代理症狀アルモノアルト稀ナラズ血管運動界ハ大抵障礙ヲ受ケテ怔忡及ビ苦悶發作ノ因タルナリ想像ハ多クハ疾病性ニ亢進



シ觀念ノ活潑ナルハ幻覺トナリ易ク然ラザル迄モ患者ハ想像ト實事トチ區別スルヲ得ザルニ至ル幻覺ノ獨自ラ生ズルト亦展ニシテソハ殆ト皆視覺界ニアリ其内容ハ主ニ不快ノモノナリ(死首、幽霊、動物、死セシ親族ナド)錯視モ亦之ヨリ少ナカラズ(傍人ノ面容頗顯シ、傍人ノ實際ヨリモ小ク見エ又ハ大キク見エ)皮膚ノ錯覺モ亦然リ(蛇、蟻、甲蟲等牀中又皮上ニアリ)恐ラクハ眞個ノ感覺アリテ之ヲ誤ルモノナルベシ自由意志界ハ風儀上ノ薄弱、意思ノ衰弱ニヨリ、觀念ノ揮發性、表性ナルニヨリ、感覺方ノ外形上内容上ニ變化セルニヨリ、又強迫觀念ニヨリテ狹隘限縮セラレ、患者ハ多クハ唯其感情、嗜欲、衝動、空想ノ爲ニ戲弄セラル、ナリ緊要ナル義務ヲ怠リ、高尚ナル感觸傷レテ、極メテ奇異ナル偶意、動機ニモ追隨スルナリ。

此ノ如クニシテ精神神經病性ナル基礎ノ上ニハ著キ癲癩狂状態ノ發スベキハ解シ易キナリ。特ニ感情界、中樞五官界、觀念界ノ容易ニ興奮スル性狀、及ビ血管運動性機能ノ平衡傾覆シ易キ性狀ナリトス。癲癩性質ノ顯著ナル、感覺、運動、血管運動、色事等、機能障礙ノ夥多ナル(是等ハ癲癩ノ普通證候ニシテ且譫妄ヲ致スニ大與力アルナリ)人ナシテ一見其精神病態ノ癲癩性神經病ヨリ發成シタルトナ知リ爲ニ癲癩狂ト云ハザルヲ得ザラシム

(四)發來及ビ預後 癲癩ハ男子ニモ女子ニモ來レトモ女子ニハ男子ヨリ甚多シ殊ニ若年ニ多ク最多キハ二十乃至三十歳ニシテ二十歳以前之ニ次ギ第一乃至十歳又之ニ次グ兒時ノ癲癩ハ其數漸次ニ増加スト云フ

預後ハ之ヲ概言スベカラズ各其症ニヨリ其原因、發育、持續、經過、遺傳ノ關係、年齡等ニ

ヨリテ同カラズ

(五)診察 癲癩ノ診斷ハ主トシテ從前ノ性質異常、梅核氣、哭泣痙攣、鼓脹、軟明ナル痙攣發作、所ノ感覺脫失、感覺過敏、麻痺、等ニヨル此等ノ症アルモノハ又大ニ神經病、萎黃病、月經異常、陰部局所病、等ノ素性アリ癲癩發作ハ舞蹈發作トハ寛解狀態(數月間)無發作アルト意識障礙ノ起ルトアルトニテ區別シ癲癩發作トハ無意識狀態ハ徐徐ニ起リ一瞬時性ニシテ又ハ眞ニ此ヲ致サズ(癲癩ニハ急起ニシテ全ク無意識)顔面ハ潮紅シ又ハ變化セズ。口味ヲ吐カズ。(癲癩ニハ顔面土黃、口涎沫ヲ出ス)瞼閉ザ、眼球強直シ、齒齒ナク、齧舌ナク、瞳孔ノ反應尋常ニシテ(癲癩ニハ瞼半閉キ、眼球旋轉シ、齒シ舌ヲ咬ミ、瞳孔光線ニ對シ多少反應ナシ)顔貌平常ノ如ク(癲癩ニハ顔貌ス、欠伸シ笑ヒ又ハ嘆シ)癲癩ニハ感覺ナシ(癲癩梅核氣アリ)癲癩ニハ癲癩前兆アリ(抽搐左右ニ同ク間代性ナリ)癲癩抽搐ハ一側ニ強ク、間代性ヨリハ緊張性ナリ)發作ノ持續長ク(癲癩ニハ短シ)發作ハ必モ睡眠ヲ奪起セズ發作後ハ展醒起シ感應憂抑シ(癲癩ニハ發作後昏醉狀ノ深睡眠アリ頭痛精神遲鈍アリ)其發作夜中ニ稀ニ(癲癩發作ハ展夜間ニ起ル)腰子宮病又ハ月經障礙ヲ兼ヌ(癲癩ニハ此トナシ)等之ガ分別ノ標準ナリ(モ氏ノ所謂癲癩兼癲癩症トハ區別難甚シ抽搐ニハ差別ナケレトモ癲癩者ニハ其後ニ深眠アリ癲癩兼癲癩家ハ大息シ劇ク行動シ譫妄シ殊ニ幻覺多シ又前兆卵巢部ヨリ上リ屢此處ヲ壓シテ發作ヲ惹起スベシ(是レ癲癩ニ見ザル所ナリ))

(六)治療ニ付テハ藥方、外用方、局所方及ビ精神療方アリ

(七)藥方ハ其人ニヨリ機宜ニ從ヒ之ヲ用フルモノトス、臭素、劑、臭素加留、臭素那、篤留



誤。臭素安母紐誤。臭素リチウむ。臭素亞鉛。臭素規尼涅等ハ身體精神ノ興奮性増進ニ用  
ヒ其尋常ニ復スルヤ直ニ之ヲ用フルヲ止ムベシ。ふる、ちんハ血管緊張不充分ノ爲  
ニ神經系統ニ充血アルハ宜ク阿片ハ感覺過敏ノハ沈痛劑又催眠劑トシ用フベク  
時ニ或ハ興奮ヲ増ストアリ砒石ハ效多シト稱セラル、モ長用セザルベカラズ神經  
衰弱症ノ起レルモノニハ規尼涅及ビ其製劑、鐵及ヒ其製劑ヲ用フベシ。鐵劑ハ又貧血  
ニ基クモノニ其シ亞鉛ハ搐搦アルハ鎮定劑タリ對、癡、藥トシテハ阿魏、續草、ササ  
れ、む、らうつらす藥水、稱用セラル。

(3) 外用方 平流電氣ハ鎮定方トシテ用フベク神經痛ヲ退ケ苦惱感覺ヲ殺グニ足リ  
感、傳電氣ハ神經力ヲ舉ゲ筋肉緊張ヲ起サントスルハ全身電氣浴又ハ局所ニ用フ皮  
膚不仁及癡躁麻痺ニモ用フベシ。水治ハ新症ニハ鎮定方ヲ用ヒ舊症ニハ刺戟方ヲ用  
フベシ。過度ニ刺戟性トナリ又ハ衰弱セルモノニハ施ストナカレ灌水、被水ニ感傳電  
氣ヲ兼用スルハ初期ニ在リテハ重キ發作ヲ止ムベシ。皮膚刺戟方ニハ神經性頭痛、  
眩暈、脊髓性刺戟症アルハ發胞膏ヲ用ヒ又ばくりん兵ノ器又硝酸銀ニテ輕灼スルモ  
ヨシ。或ハ反射性ニ效應アリ或ハ精神上ノ作用アルアリ按摩ハ癡躁性憂鬱及ビ貧血  
ニテ衰弱セシ患者ニ試ミ以テ血行ヲ起シ溫熱ヲ興シ蠕動ヲ激シテ消化便通ノ宜カ  
ラザルヲ整フベキナリ神經性食思不寔、消化障礙、瀉瀉ニハわいる、みちる、療法ヲ宜ト  
ス。飲食ハ之ヲ精選スベク運動及熟睡ハ其力ヲ復ス。  
(4) 局所療方ノ奏效ニヨリテ癡躁ノ輕減スルト多シ卵巢、子宮、胃、腸、肝、ノ病ノ如キ是ナ  
リ男子ニ在リテハ酒荒、手淫過度ハ此ニ匹類スルモノナリ癡躁麻痺ハ之ヲシテ勉メ

テ使用ニ習ハシメ以テ四肢ヲ制御スルノ能ヲ復セシムベク旁ヲ食療、電氣、冷水拭摩、  
浴ヲ以テ之ヲ助クルヲ可トス。癡躁、抑鬱ハ按摩、所動性運動及ビ平流電流ニテ之ヲ常  
ニ復スルヲ得ベシ。  
(5) 精神療方ノ癡躁ニ及ボスモノ之ヲ推服方ト云フ醫ノ患者ニ接スルヤ其推服方ニ  
二種アリ一チ意識性トシ一チ不意識性トス。不意識性推服トハ醫ノ人トナリ其態度  
氣性ノ如何ニアリ患者之ニ遇フヤ其聲語ヲ聽キ其形影ヲ見ル既ニ其病ノ輕キヲ覺  
エ其處治大ニ効アリ數月不食ノモノ之ガ爲ニ飲食ニ強クラレ或ハ兩脚ノ麻痺セル  
モノ之ガ爲ニ再起ツトサヘアリ。

### 癡躁精神病ノ種別

癡躁性精神病ハ之ヲ分チテ三トス曰ク一時狂ノ狀態曰ク長續性譫妄狀態曰ク癡躁  
精神病

#### (一) 一時性癡躁狂 (Transitorisches hysterisches Irresein.)

總說 一時性癡躁狂ハ癡躁病ノ痙攣發作ニ尋ギ其代理症又ハ獨立症トシテ發ス  
誘因ハ精神上ノ刺戟、神經痛ノ反復并ビニ月經ノ機轉タリ  
證候 其臨牀形種ハ癡躁ノ病性ノ多種ナルヨリシテ亦甚一定セズ殊ニ屢ナルハ疾  
病感動、鬱狂性暴動發作、至急性躁狂ニシテ好色性及ビ宗教性ノ妄想アルモノ、夢中遊



行症消魂大悦性幻覺性譫妄ニシテ内容ノ宗教性好色性又ハ驚異性(多クハ又鬼憑性ナルモノ等ナリ)意識ハ皆深昏ナル夢寐ノ階級ニアリテ追想ハ缺亡シ然ラザルモ概括性ナリ

前驅期症トシテハ梅毒核氣、恐怖、感應抑鬱、感情刺戟性ノ亢進、下腹部ノ筋肉痛等アリ

持續 此症ノ持續ハ數時乃至數日間ニシテ専ラ譫妄ノ狀ヲナシ多クハ緊張性痙攣間代性痙攣ニシテ臟躁性、臟躁癲癇性、強梗性、大舞蹈病狀ナルモノヲ合併ス

種別 臨牀上ノ區別ニハ左ノ五種アリ

(S)劇性苦悶狀態ニシテ意識溷濁セルモノ 患者ハ死ニ瀕スル如キノ苦悶ニアリ

激越シ旁近ヲ誤察シテ驚異性トシ之ヲ疑ヒ危ミテ之ニ抗拒ス又經過性ニ妄覺ノ起ルヲアリ鬼ノ形ヲ見犬ノ嚙付カントシ氷ノ如ク冷ナル手ノ己ヲ捉ヘントスル等タリ追想ハ概括性ナリ

(三)臟躁癲癇性譫妄 意識ハ廢絶シテ追想ナシ譫妄ノ中心タルハ多クハ元病ヲ發シタル驚異スベキ事件(強姦、呵責等)ニシテ病後幻覺性ニ再生シテ神史狀譬喩狀ニ

變想セラル、モノナリ患者ハ之ニ對シテ危疑シ抗拒シ躁暴シ亂打シ叫號シ旁、大舞蹈狀及臟躁癲癇性痙攣アリ(屢流行性ニ發スル)臨牀上別種トシテハ鬼憑性譫妄

アリ

(ハ)消魂大悦性幻覺狀態 患者ハ深重ナル夢寐狀態ニアリ其中心ニハ極メテ高劇ナル感觸生活乃至消魂大悦アリテ磁氣ノ貫流シ、神人ニ交會シ、天上極樂ノ幻視アル等ノ譫妄ヲ致ス、或ハ天上ノ洞開スルヲ見、言ヲ厲マシテ說教シ或ハ他國語ニテ

談論シ或ハ預言スル等ノヲヲナシ一時、強梗狀態アルヲアリ追想ハ概括性ナリ

(ニ)躁癲癇ノ狀態 臟躁性痙攣發作ニ數時モ先チテ發スル狀態ニシテ歌、笑、叫號、踏舞、濫収症等アルモノナリ

(ハ)精神朦朧狀態ニシテ強迫性ニ經歷シ、閱讀セシ、再生、輕易トナルノ症、其譫妄ハ言談如流症ニ似、内容ハ主ニ近時閱歷セシ、ニ關シ單ニ日常ノヲ再生、喋舌スルノミ意識ハ夢寐狀態ニアリ甚概括性ノ追想アルノミ

(二)臟躁性譫妄ノ長續狀態 (Prothahiter hysterischer Deliriumzustand.)

總說 臟躁家ニハ譫妄ノ來ルヲ稀ナラズ頗ル豊多ノ幻覺アレモ意識ノ著ク溷濁スルヤ其系統ヲナスニ至ラズ而モ一二譫妄ノ聯絡及ビ臟躁性感覺異常ノ譬喩性換想ナキニアラズ此狀態ハ臟躁性幻覺性譫妄ト稱スベク前記ノ一時性臟躁狂ノ發作



長續シ又ハ度々再發スルモノトスベキコ多ク或ハ離レ或ハ合ヒ以テ一病態ヲナスアリ

證候 此狀態ハ急性ニ發シ急卒ニ解ケ數週數月間持續シ著ク増劇弛張性ナル經過ヲナシ或ハ相對上清明ナル病期ヲナスコアリ増劇狀態中ニハ常ニ著キ意識障礙アリテ錯亂朦朧狀態甚キハ消魂大悅ノ狀態ヲ呈スルニ至ル

此症ハ臟躁發作ニ附聯シテ起リ經過中ニ此等症狀アルコハ稀ナリ此症又臟躁ノ輕症ニアリ時々強直痙攣ヲ起ス外經過中決シテ重症臟躁性運動症狀アルコナシ

臟躁性妄覺狂ハ一時性虛脫狀態ニ基キ月經ニ尋發シ又ハ之ト併起シ產褥期中ニモ發シ殊ニ經期ニ多シ感動ハ其發生ヲ促ス如シ再發多ケレバ治癒モ亦頗ル多シ

譫妄ハ種種ノ原發譫妄追跡罪業色事宗教等ノ混淆ナレド最多キハ追跡妄想ニシテ屢劇キ反應性苦悶アルモノナリ宗教性妄想之ニ次ギ好色性妄想又之ニ次グ諸覺官

ノ幻覺ハ希ナラズ最多最要ナルハ妄視之ニ次グハ妄嗅之ニ次グハ妄觸ナリ幻視ハ殊ニ屢動物葬式行列想像性儀式ニシテ死人鬼幽靈等ノ繽紛タルモノナリ錯視ハ絶

エズ變更シ傍人ノ面及身體奇怪動物ノ如ク又其色ノ變ズルニ在リ幻聽ハ單一ノ音響呼喚ノ聲雜響爆聲又ハ眞個言語トナリ多クハ色事性内容ナリ結婚ノ相談褻瀆ナ

ル誹謗殺兒ノ告責等幻嗅ハ硫黃烟草屁臭等ニシテ快キ(薰香薔薇香)ハ稀ナリ

其病態ノ臟躁病ナルヲ表スルハ幻視錯視ノ内容ノ固有ナルコト色事譫妄ノ較明ナルコト附隨ノ臟躁性感覺及病患ニシテ意識障礙ノ爲ニ多ク譬喻性妄想ニ應施サルコト

強直痙攣哭泣痙攣笑痙攣消魂大悅等ノ經過性症狀アルコト等ナリ  
治法ニ關シテハ妄覺狂ノ篇ニ參攷セヨ

### (三) 臟躁性精神病 (Protuberantes hysterisches Irresein)

(5) 臟躁性鬱狂ハ怔忡ヲ主症トシ鬱狂性暴動發作及ビ自殺ノ傾向多ク臟躁性感覺異常(即梅毒核氣神經痛筋肉痛)ヲ妄想ニ應施スルコト多ク幻視多ク鬱抑性感動ヲ演戲狀ニ

發呈スルアリ嬌媚求愛ニシテ苦惱痛憂ヲ兼ヌルノ症ヲナス

(6) 臟躁性躁狂ニハ鬱愛性前驅症ナク經過亞急性ニシテ感應ノ轉換甚ク概スルニ感應ノ平衡大ニ傾覆シ易ク好色妄想宗教妄想アリ

診別 以上二者ハ其臟躁性ナラズモノト比スルニ經過短ク臟躁ノ症ノ混ジ又臟躁性症候ヲ譬喻性應施スルニヨリテ異ナレリ

預後ハ稍良ナリ  
(7) 臟躁性偏執狂ハ初ヨリ體質性ニシテ多クハ遺傳ノ素質アリ通常破瓜時ニ萌シ益



増悪シ且變態シテ或ハ臟躁癲癩ノ形種トナリ不知不識ノ間遂ニ精神病ニ移ルナリ其種類ハ追跡性ナルアリ好色性ナルアリ宗教性ナルアリ

其經過ハ臟躁性ナラヌモノニ同ク追跡性ナルハ屢々妄想ノ轉化宗教妄想好色妄想スルヲアリ抑臟躁患者ハ感情觸胃シ易ク疎已鄙已ノ感觸起リ易ク中樞五官面ハ殊ニ幻覺性ニ興奮シ易ク高等精神作能ノ衰弱ニヨリテ想像及幻覺ノ象ヲ批正スルヲ難ク之ガ爲ニ偏執狂殊ニ其追跡性ナルモノヲ生ズルノ素性アリ加フルニ病機ノ増進スルヤ意識内ニテ感覺ヲ妄想ニ移スニ毫モ制止ナキト觀念力ノ興奮性著大ニシテ觀念ノ強盛ナルヤ之ニ附隨スル感覺ノ幻覺性強度ニモ至リ易キトヲ以テス其臨牀上ノ特色ハ四アリ

(ア)臟躁性感覺ハ相當ナル譬喩性妄想ヲナスニ應施セラル、ノ夥多ナルヲ(梅毒核氣局在頭痛、筋肉痛、神經痛、痛覺倒錯、内臟痛、脊髓刺戟症)ヲバ追跡性ニ解釋シ特ニ物理ニ關シ電氣磁氣等ニ歸スルヲ多ク筋肉感覺脫失ハ身ノ浮搖又ハ異常ニ輕キヲ想シ皮膚ノ感覺脫失、内臟ノ感覺脫失ト合シテハ臟府ノ竅ニ抽出セラル、等ノ想ヲナス)

(イ)幻視(動物、死亡、屍、色彩轉換等)ノ不臟躁性偏執狂ニ比シテ多キ

(ウ)妄想ガ譫妄性一時性ニシテ特異ナル臟躁狀態ニ接シテ起ルノ多キ。其症ハ屢々カ、ル一時性譫妄ヨリ飛躍狀ニ發生ス

(エ)色事界ノ主ニ其症ニ關與スルヲ。此影響ノ直ニ機質上ヨリ來ルヲハ意識機官ニ於テ陰部ノ興奮機轉ヲバ好色性追跡又ハ發揚ノ色ヲ帶ブ及ビ宗教性譫妄ヲ提起シ又ハ之ヲ識領シテ之ヲ譬喩狀ニ應施スルヲ見テモ知ルベシ

子宮異常ヨリ起リシ腦脊髓性感覺異常ハ多クハ感覺過敏及神經痛ニシテ追跡磁氣電氣ノ妄想ノ因トナリ陰部感覺異常ハ懷孕妄想、情夫又ハ神人ト交媾スル妄想、又ハ色事上ノ名譽ヲ侵犯セラル、ノ妄想ノ因トナル臟躁性偏執狂婦人ガ毎夜褻瀆ナル所業ヲ受クルト告クルハ病院中毎常アルヲナリ子宮性興奮ノ爲ニ視神經及ビ聽神經ニ反動シテ相當ノ幻覺(色事上嘲罵又ハ昵愛ノ聲、褻瀆ナル幻視、宗教上ノ幻視)ヲ致スヲ亦多ク殊ニ多キハ幻覺ナリ其内容ハ不快ナルモノ(旁人己ヲ嫌ヒ又追跡スルノ證トシテ惡臭、汗加之昏憒感、脚卒倒、發作ヲ之ニ應施ス快ナル(宗教偏執狂ニハ花香、薰香等)ヨリ多シ)偏執狂ノ起ルヤ重キ身體症狀殊ニ痙攣ノ退去スルヲ通例ナリ消魂大悅性(又ハ強梗性)サヘノ狀態ハ屢々好色性偏執狂宗教性偏執狂ノ後來ノ經過中ニ來ルアリ其病ハ長キ寛解狀態乃至間歇狀態ヲナスヲ多ク病頂期ニ於テハ増劇狀態ハ殆ト整



然トシテ月經機轉ト相附隨ス

預後ハ好良ナリ

治法 臭剝及ビ莫兒比涅ハ子宮神經系統ヨリ發セシ感覺及ビ激越狀態ヲ輕減シ患者ヲ鎮靜ニス

### 第十二 癲癇狂 (Epileptisches Irresein.)

癲癇性質 癲癇性機能神經病 (Epileptische Neurose. Epileptischer

Charakter u. elementare psychische Störungen der Epileptischen.)

(一) 癲癇及ビ癲癇候 癲癇性神經病ノ義ハ古昔ヨリモ大ニ恢弘シタリ今ノ神經病理學ハ癲癇病ニシテ全身ノ緊張性間代性痙攣兼意識消失ナクシテ之ニ代フルニ一見標準性癲癇發作ト通有ナル症少ナク又ハ此ノ如キモノナク而モ癲癇症ト同一視スベキ神經偶發症ヲ以テスルヲアルナリ是レ所謂代理症ニシテ其種左ノ如シ  
意識ノ連續ノ缺漏ニシテ數秒數分間ニ巨ルモノヨリ意識ノ潤濁ニシテ顔面ノ蒼白ヲ兼メルモノニ至ル(精神昏滯狀態ニシテ運動障礙殊ニ痙攣狀ノ障礙ナシ)  
意識ノ虧缺又潤濁ニシテ局部性筋肉痙攣ヲ兼メルモノ 此痙攣ハ瞬時ノ斜視顔  
顫頭又四肢ノ振盪種々雜多ノ詞ヲ吃語スル等ニ限レリ  
同一ノ意識障礙ニシテ夢寐狀ナル自發運動性衝動性行為ヲ兼メルモノ 例ヘハ  
放尿シ手ニ入りシ器具ヲ破擢シ盲暴ニ奔驅スルガ如キモノ是ナリ

眩暈發作 音ニ以上ノモノノミナラズぐりじんげる氏ノ經驗ニヨレバ眩暈發作ニシテ末梢身體部ヨリ頭方へ上ルノ性質アリテ頗ル前兆ニ類シ苦悶瞬間ノ意識障礙考慮ノ醜陋狀錯亂心悸自發運動性昏運動嚔下運動ヲ附起スルモノモ癲癇發作タルノ徵アリ殊ニ患者ガ紛亂ナル夢ノ後ニ彷徨シ不倫ナル談話ヲナシ不倫ナル行為ヲ施スノキニハ此眩暈發作ノ累積シ來ルヲアリ

發汗 ぬんみんぐばうす氏ノ說ニヨレバ發汗發作ノ症モ誘因ナク特ニ筋肉ヲ勞スルトモナクシテ來リ或ハ眩暈ヲ兼子或ハ之ナク且運動性神經作用ノ弛解頭振ノ弛解ヲ附隨スルモノアリ恐クハ癲癇ノ發作症狀ト看做スベキナラント云フ  
一種特異ナル睡眠發作 癲癇性機能神經病ニシテ意識潤濁及ビ其他標準性搐搦發作ノ附隨症狀アル發作(多クハ肋間神經痛)ニシテ意識潤濁及ビ其他標準性搐搦發作ノ附隨症狀アルモノヲ見タリ其他數度反復性ノ卒倒(偶發)症ニシテ意識ノ急卒ニ缺亡シ急卒ニ復歸スルモノ(後來癲癇發作ヲ起スベキ人)ノ夜中驚起症夢中遊行症ナドモ亦此ノ如キモノナリ

臨牀上ノ經驗ハ此ノ如クニ恢弘シタレ而モ猶甚不完全ニシテ癲癇發作ノ特徵ヲ確立スルヲ猶ホ難ク而モ其甚緊要ナルトハ固ヨリナリ  
癲癇發作ガ疾病變化アル腦髓ノ特別反應狀態タリ又其ノ一病候團ニシテ一症候ニテ之ヲ蓋フベカラザルモノナルハ疑ナシ其臨牀狀態ハ癲癇發作ノ基タルベキ腦髓機轉ノ亂布廣義ニ關係スルヲ多クシテ眩暈發作ハ大脳半球ノ血管痙攣ニ關係アリ標準性發作ハ病機ノ運動性皮質部及ビ皮質下中樞ニ襲及スルニ關スルガ如キ是ナ



方今ノ科學上經驗ノ程度ニヨレバ少クモ精神昏滯症及眩暈發作ハ通常ノ癲癇發作ト同價ノ症狀トスベキモノト如ク其他ノ癲癇者又ハ癲癇ノ疑アル人ニ來ル發作症狀ハ(其代理症タルノ意義ノ確定スル迄ハ)癲癇様發作ト稱スベシのまとなげらるる氏曰ク癲癇様發作トハ癲癇發作ト同一ノ生理狀態ニシテ微弱ナルモノト爲ニ起ルモノナリ且又發作症狀ハ病態中ノ主症ニシテ其際ニハ間歇時症狀ハ見ルベカラズ又早晚眞個ノ癲癇發作ヲ來タスベキモノナリト然レモ此說ハ稍鑿ニ失シタリ夫レ癲癇發作ノ本タルベキ生理狀態ハ未ダ決シテ分明ナラズ且間歇時症狀ハ發作症狀ト同價ナリ何ヲ以テ違ニ此ノ如ク論定スルヲ得ン况ンヤ(稀有ナリトハ云ヘ)標準性癲癇發作ハ癲癇病態タルヲ疑ナキ症ノ全經過中ニ欠クルヲアルニ於テチヤくらふこぼびんぐ氏ハ癲癇及癲癇様發作ニ通有ノ標徴タルベキモノヲ擧ゲテ曰ク「前ニ掲ゲシ諸種發作ノ反復スルヲ其發作持續ノ間意識ノ潤濁乃至死亡スルヲ急卒ニシテ恐ラクハ血管痙攣ノ爲ニ起ル腦髓血行障礙ノ症狀(顔面又眼底ノ薄白トナレルモノニテモ局部又ハ全身ノ痙攣狀運動障礙アルモノニテモ)アルヲナリ要スルニ癲癇ヲ診斷スルニハ唯一箇ノ症狀ニヨルベカラズ又一箇ノ發作ニヨルベカラズ之ヲ實地ニ徵スルニ何ノ發作ヲバ癲癇性トスベキヤハ未ダ甚明瞭ナラズ其發作ハ種態極メテ多ク確乎タル癲癇發作ノ實際之アリテモ之ヲ看脫スルヲ往々アリ皆診斷ヲ困難ニスルモノナリ是レ殊ニ夜發ノ眩暈發作ニ然リトシ患者モ傍人モ身ニ重症神經病アルヲ想ハザルヲアルナリ夜癲癇ニ疑テ置クベキノ症狀ハ時々反復スル夜尿、洋牀下墮落、

面皮殊ニ鞏膜ノ皮下溢血。舌ノ負傷。頭痛。考慮ノ遲鈍及錯亂。疲憊。醒覺時ノ沈鬱等ナリト診斷上〇重〇視〇ス〇ベ〇キ〇ハ〇癲〇癇〇者〇ハ〇其〇發〇作〇中〇ノ〇病〇アル〇ニ〇アラ〇ズ〇シ〇テ〇持〇續〇性〇慢〇性〇ノ〇疾〇病〇ニ〇シ〇テ〇其〇發〇作〇ハ〇中〇樞〇神〇經〇系〇統〇ノ〇疾〇病〇狀〇態〇ニ〇シ〇テ〇間〇歇〇時〇ニ〇モ〇之〇アル〇モノ〇特〇ニ〇較〇明〇ト〇ナ〇リ〇シ〇モ〇ノ〇ナ〇ル〇ヲ〇ナ〇リ〇此〇所〇謂〇疾〇病〇狀〇態〇ト〇ハ〇遺〇傳〇性〇ノ〇殘〇損〇又〇ハ〇腦〇髓〇ニ〇加〇ハ〇シ〇殘〇損〇ニ〇ヨ〇リ〇テ〇惹〇起〇サ〇レ〇シ〇モ〇ノ〇ニ〇シ〇テ〇是〇レ〇其〇ノ〇僅〇微〇ノ〇副〇因〇(例ヘハ驚愕)ニテモ癲癇ヲ換起スベキ所以ナリ試驗病理解學ニヨレバ脊髓又ハ末梢神經ノ外傷(ぶらうんせう)氏(腦震蕩)うすさふる氏(腦皮質ノ一部ノ外傷(ひつちひ)氏)等ヲ以テ癲癇發作ノ提起ニ必要ナル疾病性腦狀態(癲癇性變化)ヲ惹起スルヲ得タリ而シテ其疾病狀態アルトハ腦髓殊ニ血管運動中樞及ヒ癲癇性中樞ノ機能上興奮性ノ亢進アルニテ知ルベキナリ持續性ニ腦髓變化アルハ癲癇者ニ間歇性症狀頗ル多キニテ知ルベク之ニヨリテハ一般ニ腦ニ疾病性狀態アルヲ推スベク又經驗上癲癇病ノ存スルヲ推スベク且診斷上或ハ義理ノ不明ナル發作症狀ヲ補綴スルナリ神經病アルノ標徴トシテハ神經病性體質アリ刺戟性衰弱アリ頭痛アリ眩暈アリ酒精不堪アリ顫振アリ時々ノ痙攣アリ筋肉緊張殊ニ腿肚痙攣アリ血管運動性症狀(面ノ紅蒼相交換)アリ四肢ノ厥冷膚蒼眼球震蕩症アル等ニテ知ルベキナリ若シ夫レ癲癇性神經病ナルトハ概察スベキハ一定ノ特異性質(所謂癲癇性性質)ノ多ク之アルヲナリ此ニ屬スルモノハ異常ノ感情刺戟性輕動性ニシテ精神鬱抑(暗喑性)心氣性沈鬱ニシテ強迫觀念ノ有ルモノ、無キモノ、精神ノ感情亡失。萎靡弛惰。全然故ナ



キノ恐慌乃至苦悶沈鬱危懼ト發揚兼疾病性意思亢進トノ兩極端ニ轉動シ而モ主ニ狐疑、癡閉、悲憤、驚異ノ狀難解ノ狀アリ發揚易怒、自恣ナル人ニシテ自家ノ妄想ヲ頑守固執シ、事アルト正當ニ身ヲ處スルヲ能ハズ、患者ヲシテ一家ノ暴君ヲラシメ、嫌人家ヲラシメ不信ナル友人ヲラシムルナリ、癲癇家ニハ又其性妄ニ神ヲ信シテ病ト云フベキ程ノ信仰濫溺アリ何事ニモ満足セズシテ非似信仰ノ狀アリ其症ノ發揚ナルト鬱抑ナルトニヨリテ宗教性ノ昂揚又挫屈ヲ呈シ而シテ此濫妄ナル信仰ト虛飾ナル耐忍トハ其刺戟性、不堪勝性、猛暴、道德上虧缺ト全ク相背馳シ經文ヲ執ニシ神佛ヲ口ニシ而シテ心中ノ賤劣ナルヲ驚クニ堪ヘタリ

此ノ如キノ持久性異常ノ他ニ癲癇性又癲癇樣發作ノ前驅症アリ又發作經過後ノ結果症狀アリ其多クハ標式性ニ發作ノ前後ニ起ルヲ以テ診斷上甚緊要ナリ

前驅症狀ハ發作前數時數日ニ及ビ多クハ前兆ノ性質アリ四肢又上腹ヨリ頭ヲ指ス上向感覺ニシテ厥冷ノ感觸及眩暈ヲ兼ヌルモノ、他視聽(時ニ)聾ノ驚異性幻覺アリ又耳中沸聲、眼前光明、眼前色彩(殊ニ紅火色)ノ如キ自覺性五官感覺アリ怪怖兼激憤性衝動、精神沈鬱、感情刺戟性亢盛、觀念ノ外形障礙、錯亂、考慮經過ノ澁難、強迫觀念、酩酊狀ノ意識朦朧アリ時ニ又躁狂狀爽快ニシテ、觀念經過ノ急促及ビ窃盜症ヲ兼ヌルアリ、癲癇發作後直ニ發スル精神障礙トシテハ精神ノ大墮廢ニシテ考慮ノ不能、深甚ノ錯亂、自覺ノ障礙、甚キハ昏迷狀態(半時乃至數時間續ク)アリ其感情大ニ鬱抑シ過度ノ感情刺戟性及暴動發作狀ノ驅動アルヲアリ此ハ驚異性ノ幻視、仇敵性ノ自覺又ハ苦悶ノ爲ニ約制セラレ以テ患者ヲ自殺殺人放火ニ致スヲアルナリ窃盜ノ驅動ハ又躁狂

狀發揚狀態ノ一分症トシテ起ルヲアリ此ノ如キ意識障礙、昏迷、心痛等ノ癲癇後病期ハ淺モナク從前ノ精神清明ノ狀態ニ移行スルヲ常トス而シテ癲癇狀態ノ累積スルモノハ發作間ニ睡遊症ニ似タル一種固有ノ朦朧狀態アリテ患者ハ外見上全ク自辨識スル如ク言談聯繫アリ行爲秩序アリ其業務ヲサヘナシ而モ其實自辨識セズ自家意識ハ忘却シテ其行爲ノ追想更ニナキモノアリ此ノ如キハ數多時間持續スルヲアリ

(二)原因 原因中首ナルモノハ遺傳ナリ兩親ノ酒精濫用、慢性中鉛症ハ其兒ニ癲癇ヲ提起スルアリ酩酊中種痘ノ兒モ亦屢癲癇性トナルナリ(而モ其癲癇白癡トナルト之ヨリ多シ)其他ノ原因ハ幼時ノ腦病、胎生時ノ腦病之ニ次カハ頭顱外傷、腦震蕩ナリ(モリ)氏ハ癲癇ノ原因ヲ論シ外來禍害ヲ以テ其最重キモノトシ謂ラク「神經病素累アリト云フニ一定ノ病之ニ併發シテ初メテ其症ヲナスベシ其多クハ熱性病(產褥熱、梅毒)ニシテ先ニ之ヲ患ヒ後年ニ初メテ癲癇ヲ起スモノナリ」Lemoineト云ヘリ

ナ恢廓シテ「特發性癲癇ナルモノナシ」ト云ヘリ

驚愕ガ癲癇ヲ惹起スルヲアルハ疑ナク殊ニ遺傳素累アル人ニ然リ或ハ驚愕後直ニ起リ或ハ時經テ後(癲癇前症候アリテ後)ニ發ス

(三)解剖 癲癇ノ解剖ハ未タ甚明ナラズ種種ノ所視アリ腦髓ノ生來發育障礙、腦皮質ノ膠腫、殊ニ局所腦質炎(海馬角ノ硬化ナドモ)ハ恐ラクハ之ガ基タラン又其精神障礙ノ解剖基礎タルモノハ血管運動障礙ナリト考フベシ之ヲ要スルニ癲癇ハ中樞機官ノ血管運動性機能神經病ナリ、癲癇性變質ノ極ニ在リテハ要スルニ腦髓萎縮、腦膜潤濁



アリ又以テ其精神生活ノ荒廢アルヲモ説明スベキナリ  
 標準性特發性ノ癲癇ニ當ニ併存スルハ顔面ノ左右平均ナリ頭顱ノ左右不均ハ癲癇  
 病ノ原因ト看做スベカラズ兩半球ノ發育ノ失常又ハ不同ノ結果ト看做ス正トス  
 (四) 治法ハ腦髓ノ疾病與蓄性ヲ減シ其中樞ヲシテ發作惹起ノ刺激ニ對シテ興奮セシメ  
 ザルヲ謀ルニアリ最良キハ臭剝ニシテ其長用(數月數年間)ハ腦髓ノ反動與蓄性ヲ減  
 シ發作附隨ノ脈管痙攣ヲ減シテ發作ノ數ヲ減ズルヲ多ク其量ハ男子ニテ六瓦女子  
 ニテ四瓦ヲ最少量トシ其諸鹽類ヲ合用シ一日二三瓦ヲ反復シ稀薄ニシ用フルヲ最  
 宜シ其發作及全身ヘノ作用如何ヲ視ツト十二瓦ニ迄増スベシ急卒廢用スベカラズ  
 此クスレバ發作累發シ甚キハ危險ナル癲癇劇發症ヲ致スナリ其使用中粉刺又消化  
 障礙起ラバ臭剝ヲ廢シ發作稀ナラバ初ヨリ用フルヲ勿レ數週間之ヲ用ヒ効ナケレ  
 バ他藥ニ代ユベク縲草、酸化亞鉛、硝酸銀ノ如キ對癲癇藥ハ臭素劑ニ比スレバ効少ナシ  
 ありるびん丸劑(其〇〇五ヲ五十九丸ニ配分シ一日一丸ヲ用フ)ハ數月間施シテ害ナク  
 其効或ハアリ或ハナシ硫酸亞鉛ハ効ナシ亞硝酸ありるハ前兆中ニ用ヒ發作ヲ止ム  
 ト云ヒ或ハ之ヲ非トスなすみうむ酸ハ稱揚シ難シ安知必林、安知歐林ハ未、試用多  
 カラズ水治力、電氣力ハ効ナシ。癲癇劇發時ニハ莫兒比、注射、抱水くろるる(三四瓦)ノ  
 灌腸直ニ奏効ス抱水ありるハ發作累起ノ臭剝中毒症劇キ之ヲ止ムレバ直ニ起  
 ラントスル)ハ夜發癲癇ノ臭素ト交代シ又ハありるびんと併用スニ用フ  
 靜息、戶外運動、長濯溫浴、兼灌水、冷纏包、催眠劑、溫和ナル看護ハ甚良シ精神過勞ハ嚴ニ  
 之ヲ禁ズベク咖啡、茶、酒、煙草ハ之ヲ避クベク植物主食ハ効アルヲアリ

### 癲癇精神病ノ種別

癲癇ハ原素性精神障礙ヲ附起スルノミニアラズシテ屢、持續性ノ深重ナル精神機能  
 障礙ヲ致シ其合併症又發作代理症トシテ急性譫妄症(稀ニハ)眞個精神病アリ  
 癲癇狂トハ持續性又經過性ノ精神病狀態ヲ包括スルモノニシテ之ヲ別テ癲癇者ノ  
 一時狂(多クハ譫妄性精神障礙)長續性精神代理症、癲癇精神病トス

#### (一) 一時性精神障礙ノ發作 (Transitorische epileptische Anfaelle)

此症ハ一貫聯ノ病狀ニシテ時限明ニシテ多クハ數時乃至數日ノ經過ヲナシ急卒ニ  
 起リ急卒ニ解去ルモノナリ或ハ癲癇發作ノ前驅症トナリ或ハ(猶屢)其結果狀態トシ  
 テ其後直ニ發シ又ハ數時數日內ニ來リ或ハ(稀ニハ)獨立ノ間歇時發作タリ其發スル  
 ヤ殊ニ癲癇發作累積ノ後ニ多ク殊ニ長月日發作ナカリシ時ニ多シ時トシテハ眩運  
 發作又ハ標準性癲癇發作ノ此症ノ起ルキヲ以テ廢止スルヲアリ精神發作ハ即チ以  
 テ彼ノ代理症ト看ルベキモノナリ此ノ如キモノ或ハ多年間モアルヲアリ(もれる等)  
 之ヲ潜伏性癲癇又精神病癲癇ト稱ス  
 機能神經病ノ形態ノ此ノ如ク變更スルハ殊ニ眩運性癲癇ニアリ易ク癲癇本來ノ症  
 候ヲシテ將ニ見ルベカラザルモノナラシメントス尋常癲癇發作ノ臨牀上形狀ヲシ



テ益豐多繁般ナラシムルハ蓋シ精神發作及代理症ニシテ吾人ハ未ダ悉ク其全班ヲ知ラズ彼ノ一時性躁狂鬱狂性暴動發作短時發作ヲ以テ定期性反復スル精神病等至急性病症ハ多クハ其發生上癲癇性神經病ト關係アルモノナラン

此症ノ臨牀上形態ハ極メテ多種ニシテ種種ノ代理症ガ同一人ニ交換シ來リ又同一發作中ニ合併シ來ルナリ然レモ癲癇ノ身體證候ハ極メテ多種ナルモ唯一徵候(意識ノ溷濁乃至缺無)ノ常同ナルモノアルガ如ク精神發作ニモ亦然ルモノアリ意識ノ溷濁乃至缺無ニシテ追想ノ溷濁性概括性虧缺性又ハ全缺スル即チ是ナリ

其意識障礙タルヤ昏迷症及ヒ朦朧狀態ニシテ衝動性動作譫妄妄覺苦悶狀態及ビ其他ノ原障礙ノ之ニ合併スルアリ意識溷濁ハ其際患者ノ行爲及ビ譫妄ヲシテ殆ト此症ニ特徴タルベキ程變轉性ニシテ夢事ノ如クニ錯亂セルノ色ヲ帶バシム

一時性精神癲癇發作中單一意識障礙ノ症又ハ爾他ノ精神原證候トノ合併セルノ症ニシテ最緊要ナルハ昏迷ト朦朧狀態トナリ

(5)昏迷 (Stupor)

昏迷ハ獨立ノ症タルヲ稀ニシテ多クハ發作ニ尋ギテ發シ半時乃至數日間持續スルモノナリ其醇然自立ナルヲ少ナク驚異性譫妄及妄覺アルヲ多シ時トシテハ又内容

ノ發揚性ナル宗教性譫妄ニシテ其轉變シ奇隔ナルヲ夢事ノ如クナルモノアリ夢狀ノ深甚錯亂ノハ音誦如話症モアリ(おんむと氏)トイヘド多クハ鍼狀ナリ(さんむと氏)ノ説ニヨレバ此癲癇性昏迷ノ他ノ諸昏迷症ト異ナル所ハ自覺ノ澁滯シ意識障礙ノ甚キ錯亂アリ急卒ノ暴行迸發アルニアリト云フ

(6)朦朧狀態 (Daemmerzustände)

此症ハ或ハ發作ニ尋ギテ發シ或ハ發作ノ間歇時ニ發シ或ハ又數時乃至數月ノ獨立精神障礙タリ其經過中症狀ノ甚ク轉換スルアリ其醇症タルハ稀ニシテ多クハ他ノ原障礙ト合併ス

臨牀上及ビ法醫上緊要ナル病態タルモノ左ノ如シ

(ア)朦朧狀態ニシテ苦悶アルモノ(ふるれ氏)ノ所謂小發作(意識半清明ナル狀態ニシ

テ甚キ精神鬱抑アリテ深キ心痛ヲナシ甚キハ鬼憑性比喩ニ至リ苦悶アリ考慮ノ錯綜アリ多クハ其觀念再生危懼性觀念界ニ限局強迫セラレテ爲ニ又苦痛ヲ覺ユルアリ此ノ如クニシテ患者ハ意識朦朧トシテ危懼苦悶充滿シ加フルニ心内閉急ヲ以テシテ爲ニ興激シ驚駭シ騷擾ス多クハ四周ヲ仇敵ト自覺シ之ニ對シテ刺戟性ニ苦悶又強迫觀念ニ動カサレテハ自身ニ對スル衝動性殘壞行爲アリ又仇敵性ノ自覺ヨリ



シテ傍人ニ對スル殘壞行爲アリ其發作時ニ方リテ深重ナル精神錯亂アリ意識溷濁アルニ相當シテ追想ハ概括性溷濁性ナリ

此障礙ハ多クハ自立性ナルヲ癲癇發作後ニ尋發スルヨリ多クふるれるノ經驗ニヨレバ癲癇性癲癇ヨリハ眩暈性癲癇ニ多シ

(イ)急卒發起スル憤怒性妄覺性追跡性譫妄 意識障礙益深ク且譫妄及ビ幻覺ノ合併スルアルモノナリ妄想及ビ妄覺ノ驚異性内容妄覺ハ主ニ驚駭スベキノ幻視夜又ナルナドノ形象及ビ顔死ノ危險等ナリト錯亂及ビ意識ノ障礙アルトハ此症ヲシテ特色アラシメ若シ加フルニ稀有ナル一時

ノ昏迷症(時トシテハ)又宗教性原發妄想ヲ以テセバ益其然ルヲ致スナリ意識障礙深ク其内容ノ驚異性苦悶性ナルヤ之ガ反應トシテ劇キ精神運動性迸發トナリ其幻視スル鬼物ニ對シ又仇敵ト誤認スル旁人ニ對シテ亂暴ナル反拒ヲナシ猛暴憤怒性ノ興奮状態トナリ荒暴ニシテ近ヅクベカラズ瀕死苦悶及ビ危疑不安ノ爲ニ旁人ヲ視テ之ヲ斬リ之ヲ嚙ミ之ニ唾シテ極メテ危險ナリ

此症ニ屬スルモノニシテ稀ナルハ心氣性譫妄ナリ

此症ノ解去少ナク凡其譫妄ノ退クハ急卒ナリ而シテ譫妄ノ後ニ持存スルハ錯亂性朦朧状態ニ後ル、ト數時數日ナルヲ常トシ或ハ昏迷性状態ヲ通ジテ清明ノ状態ニ

移ルナリ

發作ノ全經過ハ數時數日ナリ病後ハ重夢ノ醒メタルガ如クニシテ其追想甚概括性ニ多クハ發作ノ全經過中ノ追想虧缺ス

此譫妄ハ主ニ搖擗性癲癇ニ之アリ且多クハ標準性發作ノ前驅症トシ或ハ其數列ニ尋ギテ發スルナリ

(ウ)朦朧状態ニシテ宗教性發揚性譫妄アルモノ 此譫妄ハ癲癇者ニ稀ナラズ而モ之ヲ識別スルニ至リシハ近時ナリコハ前者ノ代理症ト看做スベク一時發作又ハ一貫

聯ノ發作ヲナス其譫妄ハ神事神物ニ關スルモノニシテ患者ハ自ラ神佛耶蘇豫言者ナリト稱シ筋肉感覺脫失及ビ之ニ基ク飛翔ノ妄想ハ之ニ與カリテ自ラ天上ニ在リト想スルアリ或ハ其譫妄ノ間幻覺ニテ神ト應接シ其豫言命令其家族ヲ某土ニヤル

爲ニ之ヲ殺セナド命令ス等ヲ受ケ旁人ヲ屢異端ノ人ト誤リ認メテ之ニ危害ヲ加ヘントスルコアリ或ハ其幸福ナル譫妄ハ忽然一變シテ地獄閻應ヲ目撃シ自ラ苛責ノ罪業人ナリトナス然レモ是レ一時症ニシテソハ又遂ニ去リテ患者ハ再ビ神祐ヲ蒙ルニ至ル

此宗教性譫妄ハ非常性ニシテ稗史ノ如クナルヲ以テ著ハレ意識障礙ハ多ク甚深

機能病性病性精神病ノ論 癲癇狂 一時性精神障礙ノ發作

二百八十三



カラズ少クモ概括性ニ謔妄中ノ經歷ヲ追想シ或ハ追想ノ全ク虧缺スルモノアリ一時或ハ増進シテ消魂大悦ニ至リ其間又昏迷状態ノ發スルヲアリ昏迷状態又ハ朦朧状態ヲ通ジテ遂ニ清明状態トナリテ止ム

(エ)一種固有ノ朦朧状態ニシテ内容ノ多クハ發揚性ナル夢ノ如ク稗史ノ如キ妄想アルモノニシテ意識ノ状態ノ如何ニ從ヒ或ハ強迫觀念トナリ或ハ謔妄トナルナリ患者ハ自我力アル如ク識領性ニ行爲シ言語スル如ク而モ夢ノ如キ朦朧状態ニ在ルハ猶ホ夜遊症ノ状態ニ似タルアリ其行爲ハ其夢ノ如ク稗史ノ如キ意想ニ從ヒテスルガ爲ニ實事及ビ其實在界感興ト紛々抵觸シテ妄ニ遊行シ遁逃シ遊蕩トナリ浪費トナリ窃盜トナル患者ノ追想ハ概括性ニ又ハ全ク缺亡ス

此状態ノ持續ハ數時乃至數月ナリコハ標準性ノ癲癇發作ニハ希又無ニシテ其代リニ眩暈又ハ苦悶發作アルモノニ來ル

(オ)朦朧状態ニシテ癡躁ノ興奮アルモノ 是ハ癲癇性一時性障礙中最稀ナルモノニシテ數時乃至數日ノ持續ナリ其中ニハ患者ハ癡躁ノ如ク(奇異ナル騷動笑無味ナル戲謔頻頗放恣ナル舉止)而モ意識ノ深障礙ト追想ノ虧缺トハ分明ニ之ヲ此ト類スル單一ナル躁狂ノ状態ト區別ス

(ハ)鑑識

其症狀ノ一ナラザルコト此ノ如クナレバ之ガ基タル機能神經病ノ鑑識ハ極メテ重要ナリ其鑑識ニ緊要ナルコトハ其症ノ原因、既往症、間歇時症候ノ精察、發作ノ症候及發作ノ相互ノ比較ナリ

(一)原因上ニハ明ニ遺傳素累、頭傷、佝僂病アリ

(二)既往症ニテハ癲癇ヲ起スノ疑アル特種發作ノ存セシカ不ヲ搜求スベシ其重要ナルモノハ癲癇性發作又癲癇狀發作、兒時ノ搖擲夜中驚起ノ發作、睡遊症ナリ特ニ夜中、睡中ニ於ル發作ノ徵跡ハ注意スベキナリ

(三)間歇時證候、癲癇性質ハ最緊要ニシテ原素性精神腦髓性障礙、癲癇性變質ノ證候モ亦然リ

(四)精神上發作ノ癲癇性タルベキノモノ

(五)他ノ通常癲癇發作ノ如ク前兆狀ノ症狀ヲ以テ開始スルコト

(六)其急速ニ發シ持續短クシテ急卒ニ解去スルコト

(ハ)發作中甚驚異スベキノ謔妄及ビ幻覺アリ深キ意識障礙アリ夢狀ノ錯亂アリ經過性ニ昏迷アルコト



(に)發作中ノ機轉ニ追想ノ溷濁又ハ缺無ナルヲ 其レ或ハ追想ノ發作ノ後ニ存スルヲハアラン而モ少焉ニシテ消却スルナリ(ざんむと氏)

(は)發作ハ標式性ニ同似シ又ハ少ナクモ種種ノ代理症アリ其相同キ發作ノ反復スルモノナルヲ見ル

(へ)發作中ノ患者ノ行爲ハ意識ノ夢狀又ハ朦朧狀態タリ觀念ノ錯綜糾紛タリ其譫妄妄覺ノ驚異性質ナルヤ(少クモ小發作大發作ニ於テハ)動因ナク企策ナク省慮ナク急卒ニ濫妄ニ其方法ヲモ熟慮スルヲナクシテ多クハ全ク衝動性ニ起リ荒暴發作及ビ破壞發作ヲ致ス

(二)長續性代理症 (Protahirte epileptische Aequivalente.)

癲癇者ニハ數週乃至數月持續ノ譫妄狂ノ發作ニシテ其癲癇ニ基ケルヲ明示スル特徵アルモノナリ是レざんむと氏ノ創唱セシ所ニシテ同氏ハ癲癇狂ノ特異ナル性質ヨリシテ前時癲癇症ナキモノニモ之ヲ斷言スベシトセリ

ざんむと氏ノ所謂癲癇狂ノ特徵トハ凡ソ九アリ曰ク發來ノ急性ナルコトナリ苦悶狀態ニシテ驚異性ニ出スル際ノ譫妄及ヒ妄覺アルヲ(妄覺ハ癲癇ニ多キ衆人共來犯襲迫スルモノニシテ而モ其間ニ誇大妄想殊ニ宗教上ノモノヲ交ニ二ナリ刺戟性

ノ強度ナルヲ三ナリ朦朧狀態實存シナガラ意識ノ準他ニ清明ナルヲ四ナリ發作ノ次第ニ滅殺スルヲ五ナリ發作中機轉ニ關シ種々ノ追想虧缺ナルヲ六ナリ省慮ナキ極端ナル暴行アルヲ七アリ特異ナル言語ノ反應ヲ存スル強弱數等ノ昏迷症アルヲ八ナリ其錯亂ノ狀態ニ諸程度アリ或ハ意識ノ一分清明ナルアリ或ハ夢ノ如キ奇絶異絶轉變性ナルニ至リ或ハ顛振譫妄狀ノ錯覺性幻覺性錯亂症ニ至ルヲ九ナリ

此種ニ屬ニルモノハ多クハ長續性代理症ニシテ(正ク云ハ、恐ラクハ反復再發性ニシテ且同時ニ長續スルモノナリ)又癲癇性妄覺狂ト稱スベク小發作アリ大發作アリ宗教性譫妄アリ昏迷アリ

此狀態ニ通有ナルハ意識(殊ニ自覺)ノ持長性深障礙尋常精神病ヨリモ重シアリ觀念ノ大錯亂アリ譫妄ノ甚ク弛張シ間歇スルヲ朦朧狀態昏迷狀態ノ(多ク)間作アルヲ發作機轉ヲ追想スルノ極メテ概括性又ハ缺無ナルヲ其忽卒ニ發來スルヲ朦朧期昏迷期ヲ通過シテ治去スルヲ等はナリ

(三)慢性癲癇狂 (Chronische epileptische Psychosen.)

癲癇者ニハ準他希有ナレドモ又慢性精神病アリゆるぎあるぐなるく等Gannok而モ癲癇ニ基カザルモノト區別スベキ所ナクシテ之ヲ癲癇



性ト稱スルヲ得難シ然レモ亦癲癩ノ基アルキニハ尋常精神病ノ病態ヲシテ其經過ヲ易ヘ其症候ヲ變ズルコトアラシムルナリ

預後。癲癩ノ各發作ノ預後ハ幸良ナリ精神障礙アル癲癩全體ノ預後ハアシク其一タビ所謂癲癩性變質トナルヤ殆ンド治癒ノ望ナシ

治法。ハ先ニ述ブル所ノ如シ

### 第五卷 中毒性精神病ノ論

夫レ毒物ノ之ヲ長用シテ機生體ノ神經系統特ニ精神機能ニ障礙ヲ起スモノ亦多シ然レモ其中實地上最必要ナルモノハ嗜好品トシテ用ヒラレ精神ノ爽快狀態ヲ興發シ兼チテ又反復施用ノ已ムベカラザルヲ致スノ作用アルモノナリ殊ニ其廢用ニシテ所謂禁斷證候Abstanzsyndrome即チ機生體ニ不快不安ナル障礙ヲ起シ反復服用スル毎ニ益其證候ノ甚キヲ加ヘ遂ニ生活機能ノ經過ヲ開爽ナラシムルガ爲ニ毎ニ反復彼有害ナル刺戟材ヲ攝取セザルベカラサルノ厭フベキ傾性ヲ生ズルモノヲ然リトス

此等ノ毒物ニシテ精神病學上必要ナルモノハ固ヨリ少ナカラズ其中最要ナルヲ酒

精莫兒比涅古加乙涅等トス鉛ハ職業上ヨリシテ屢中毒症ヲ發スルモノナリ

### 第十三 慢性酒精中毒狂又慢性中酒狂 *Alkoholismus chronicus*

#### (甲) 總說

慢性中酒狂ハまぐぬすふつす氏ノ命名ニ係リ常習性酒精濫用ノ爲ニ起リシ諸種ノ精神身體ノ持續性機能障礙ヲ包括スルモノナリ

#### (乙) 原因

中酒狂ノ原因ニ就テハ遺傳ヲ頗ル重要トスぞるりいる氏ノ說ニヨレバ中酒狂者アル家族三百五十中遺傳ノ證明スベカラザルハ五十九七分Solter(二百九家遺傳ノ證明スベキハ四十二九分)百四十一家ニシテ其有遺傳ノモノニ付キテ其遺傳ノ同名ナルモノ(即先世ニモ中酒狂アルモノ)百六家不同名ナルモノ(即神經中樞系統ノ重病アルモノ)三十五家ナリシト云ヒ又三百人ノ白癡兒ニ付キテ調査セシニ其一百四十五人ニハ兩親ノ酒客ナルモノアリシト云フぞるりいる氏ハ之ニ由リテ中酒狂ヲ二種ニ別チ一ヲ遺傳アルモノトシ其定期性ニ中毒症ヲ發スルモノヲ嗜酒狂家ト云ヒ持續性ニ之ヲ發スルモノヲ中酒家ト云フ二遺傳素性ノナキモノトシ遺傳性中酒家ハ遺



傳素質ナキモノヨリモ酒精謔妄多キガ如シト云ヘリ

夫レ酒精ノ濫用ハ或ハ直ニ神經組織ヲ害ヒ或ハ先ヅ重要ナル分泌機官排泄機官ヲ害ヒ血液ヲ醇汚ニスルノ機ヲ無ミシ以テ腦髓ニ嗜好ナル榮養ヲ爲スコトヲ妨グルトヲ致スサレバ酒精濫用ハ或ハ精神病ノ素因トナリ或ハ其誘因タリ諸種ノ精神病ハ飲酒ノ爲ニ惹起セラレレ亦其一定症狀ニシテ神經系統ノ酒精中毒ト聯繫セルモノアリ縱飲症ハ或ハ心氣家ニ在リテ食思不振ト併呈シ麻痺狂ニ在リテハ慾望充制力缺亡ノ一分症トシテ來リ妊娠ニ在リテハ懷孕嗜異症ヨリ發シ經竭時ニ在リテハ心身不快ノ爲ニ起リ或ハ又直ニ父母ヨリ遺傳シ又ハ遺傳性神經病性素累ノ結果ナルヲアリ然レ嗜酒ニシテ精神病ノ第一症タルヤ之ヲ以テ直ニ精神病ノ原因ト稱スルコト亦多シ

(丙) 解視

病理解剖上ノ變化トシテハ腦膜ノ慢性痙衝性變化アリ腦皮質ノ萎縮機轉アリ酒精及ビ其分解產物ノ腦髓組織ニ化學上刺戟作用ヲナスト腦室腦髓腦膜ノ淋巴場ニ衝逆機轉鬱血機轉アルトニヨリテ然ルナリ腦髓中ノ血液配分ノ異常(充血、貧血)外腦水腫、內腦水腫、顱骨肥厚、內硬腦膜炎アリ他ノ機官ニ於テ動脈硬化、心臟肥大、脂肪心臟、慢

性腸胃加答兒肝臟變質、腎臟變質アルハ之ガ結果證狀合併證狀ナリ

腦髓及ビ腦膜ノ機質變化ハ時久シテ後初メテ起リ且必有ノモノニアラズ本、腦皮質ノ榮養障礙(酒精濫用ノ爲榮養及血行ノ障礙)ノ轉歸及ビ殘餘タル現象ニシテ其腦髓ニシテ抵抗力充分(血管壁尋常)ナラバ縱酒症ノ徵候ハ長ク機能病タルノ範圍ニ在ルモノ、如シ故ニ其早期ニ於テ疾病ノ回復スベキコトハ解シ易キナリ之ニ由リテ是ヲ觀レバ中酒狂其他中毒精神病ハ機能狂及機質狂ノ間ニ漸次ノ推移ヲナスモノナリ

(丁) 證候

(一) 精神障礙ノ本性ハ精神衰弱即道德作能、叡智作能ノ進行性作用不全ナリ

(二) 第一證狀ハ道德界ニ表ハル、ヲ常トス縱飲酒酒ノ人ハ名譽、風儀、禮習ヲ等閑視シ廉耻ヲ知ラズ風儀上ノ抵觸家族ノ破滅ヲ顧ミズ同胞ヲ賤棄シテ顧ミズ疎暴ナル自恣家無賴家ナリ(中酒性不徳症)

(三) 感情刺戟性ノ増進 眞個憤怒ノ性情ハ之ト相附隨シ來リ極微ノ誘因ハ酷烈ナル感動乃至猛暴ナル發動ヲ致シ道德作能ノ進行性衰弱モアルガ故ニソハ全然羈制スベカラザルモノトナリテ疾病感動ノ狀アリ(中酒性暴虐症)

(四) 深甚ノ感應違和アリ時々殊ニ朝ニ方リテ疾病性憂鬱ヨリ厭生希死ノ狀態ニ至



リ而シテ一時ノ飲酒ハ以テ之ヲ消却スルニ足レリ(中酒性沈鬱症)

(に)意思薄弱ハ早發ノ症狀ニシテ職業上及公民上ノ義務ヲナスコニ於テ表ハレ其不徳ヲ改ムルノ決斷ヲ執行スル能ハザルニ於テ最モ較明ナリサレバ中酒家ニシテ其睿智ノ猶ホ未ダ全ク荒廢セザルヤ其病ノ危慘ナルヲ知リ且ハ又意思薄弱風儀薄弱ニシテ能ク自ラ之ヲ避クルノ力ナキヲ感ジ爲ニ切ニ入院ヲ要望スルモノアルナリ

(は)睿智業作全體ノ進行性衰弱ハ又之ト齊發スルアリテ早ク既ニ記憶ノ薄弱考慮ノ澁滯自覺ノ遲鈍ニ現ハレ甚キハ完全ノ癡狀トナルニ至ル

(へ)色事上詐陷セラレハノ妄想ハ較明ナル症狀ニシテソハ色事上關係アル慢性中酒家ニ見ル所ナリ或ハ妻ノ爲ニ情婦ノ爲ニ誤ラル、トス(嫉妬妄想)又代理症トシテ旁人ガ褻瀆ノ所行ヲナストノ妄想ノ起ルコアリ

此所謂嫉妬ハ慢性中酒症ヲ合併スル精神病ニ於テ他ノ妄想例ヘバ他ノ追跡妄想ト併呈スルニアラズシテ通常獨立ノ妄想タリ精神上ノ變質機轉ヲ通ジテ一貫絲ノ如クニ夙ニ發呈スルコトモ多ク其不辜ナル配偶ヲ殘忍酷薄ニシ或ハ之ヲ殺害シ其誤想スル情夫ヲ殺傷スルニ至ル

道徳作能ノ荒墜精神衰弱及ビ感情刺戟性ハ此妄想ノ發育スルニ必要ナリ此妄想ノ機質上約制タルモノハ恐ラクハ酒客ノ淫快銷殺及ビ陰萎症ニ在ラン希ニハ又感動中酩酊中ノミ不義密通ノ幻覺トナリ患者ノ精神衰弱シ感情刺戟性ナルヤ無意ノ詞言無故ノ貌言又ハ事件ヲバ妄想ノ義ニ見解應施スルコト多シ

(二)神明障礙ハ精神症狀ニ次ギテ慢性酒精中毒狂ノ早發症狀タリ多クハ腦髓ノ血行障礙慢性充血ニ歸スベク頭痛眩暈昏惚精神ノ抑鬱精神ノ紛亂奪乏アリ眠不安ニシテ重キ苦悶性ノ夢アリ

(三)五官ニハ緊要ナル障礙アリ一部ハ其機官ノ血管障礙ニ歸スベクシテ初メハ感覺過敏原素性主觀性感覺乃至幻覺トナリ後ニハ感覺脫失トナルアリ其多ク病ムハ視官ニシテ之ニ次グハ聽官ナリ妄視ハ視蚊症視火花症視蝕症タリ妄聽ハ水沸キ金鳴リ火ニ灌グノ聲ノ如ク分明ナル聽神經感覺過敏ト併呈スルコト希ナラズ此ノ如キ視聽兩官ノ妄錯ヨリシテ錯覺ヲ發シ之ヲ誤リテ幻覺トナスコト屢アリ眞ノ幻覺モ亦之アリ初メハ就眠後直ニ起リ後ニハ病中衰弱ヲナスノ影響アルキ經過性ニ起リ(酒精缺乏)睡眠障礙榮養不足等多クハ中樞ナル五官感覺面ノ貧血ニ基キテ其内容ハ驚異性ニシテ苦悶ヲ起スベキモノナリ(醜惡ナル鬼物動物等)殆ント皆視官ニ之アリテ聽



官ニ發スルコトハ希ナリ  
 疾病經過中ニ弱視症ヲ起スコトアリ忽ニ發呈シテ視力著ク減シ患者ハ近視トナリテ  
 晩ニ向ヒテ却テヨク見ルナリ  
 時ニ又重視症多視症アリ恐ラクハ調節筋ノ痙攣症ニヨルナラン一時性色盲モ亦稀  
 ナラズ瞳孔ハ開大シ屢不均ニ反應鈍ク檢眼鏡検査ニハ獲ル所ナク之アリトスルモ  
 網膜ノ水腫動脈ノ狹縮ヲ見ルニ過ギズ視覺障礙ハ酒精飲用ヲ廢スレバ數月ノ後ニ  
 消却スベキナレド多クハ然ル能ハズシテ遂ニ視神經ノ消殺黒内障ヲ來スナリ  
 (四)運動機能ノ障礙モ亦夙ニ起ル最要最早最多最長續ノ障礙ハ隨意筋ノ顫振ナリ舌  
 唇面手ニ最モ著ク而モ經過性ニ全身性トナリ甚キハ全身ノ顫振痙攣トナルアリ眼  
 球震盪症モ亦希ナラズ酒精顫振ノ標徴ナルハ其形狀及配布ノ他其酒精飢乏狀態殊  
 ニ朝ニ最甚クシテ酒ヲ蒙ムレバ輕キヲ致スコナリ  
 病ノ初ニハ脊髓ノ反射運動性興奮ノ亢進ニ基キテ全身攣縮及ビ腿肚ノ局所性强直  
 性痙攣ヲ致スコ稀ナラズ將ニ眠ラントスルノキニ來ルコト多クシテ幻視ト共ニ此患  
 者ノ就眠ヲ難フスルモノタリ慢性中酒ノ後期ニハ顔面神經域并ビ四肢ノ痿弱症  
 狀ヲ致シ兩手ハ力ヲ失シ膝ハ沈陷シ步行ハ搖動スルアリ其原因脊髓ニアルカ大脳

皮質ニアルカハ未ダ詳ナラズ

(四)感覺障礙ハ慢性中酒ノ増進期ニ屢之アリ其初ニハ感覺過敏及ビ神經痛ニシテ感  
 覺過敏ハ皮膚又ハ筋肉性ニシテ一肢節ニ限ルコト多ク脊髓ノ反射機官ノ興奮性亢進  
 セルキニハ恐ラクハ彼急劇電光ノ如クナル腿肚筋ノ痙攣狀攣縮其強直性痙攣ヲ發  
 スルナラン其後期ニ及ビテハ痛覺脫失及ビ感覺脫失アリ多クハ前膊又ハ指ノミニ  
 限リ或ハ下肢ニ於テ膝以下ニ限リ又或ハ胸ニ廣ガルコトアリ其甚キハ半身ノ感覺脫  
 失ニ至ル時トシテハ又感覺ハ尋常ニシテ自覺ノ滯滯スルコトアリ其意識ノ溷濁セル  
 ヤ諸種ノ感覺及ビ其障礙ヲバ譬喩狀ニ換解シテ之ヲ妄想ニ應施スルコトアリ電光狀  
 ニ奔躍スル神經痛ハ時ニ電氣ヲ以テ害ヲナスノ妄想ヲ致シ神經痛及ビ感覺過敏ノ  
 感覺ハ蛇蟲ガ皮ヲ行クノ觀念ヲ致スナリ

(六)血管系統障礙 多年酒精ヲ用フレバ脂肪ハ諸臟ニ沈着シ動脈ハ粥腫變質ヲ致シ  
 且其内腔開弘シテ心臟ノ業作増シテ代補性ニ左室ノ肥大ヲナシ後又心筋ノ脂肪變  
 質加ハリ遂ニハ營養不及全身飢乏ノ爲ニ心萎縮ヲ致ス動脈硬化脂肪心臟左室肥大  
 等ハ又夙ニ全身血管域ニモ血行障礙ヲ起シテ血管麻痺之ガ爲ニ起リ主ニ顔面ノ血  
 管開張及ビ血行遲滯ニ發呈シ之ト淋巴鬱滯トノ爲ニ皮膚ノ榮養ヲ障礙シ以テ酒皸



鼻ヲ致ス脈搏ハ稀且(多クハ)徐トナル腦髓ハ益薄弱トナリ其血管緊張痰弱シテ衝逆ニ反抗スル能ハザルヤ次第ニ酒精ニ堪エ難ク少シク過飲スレバ直ニ著キ衝逆性充血ニシテ壓迫症狀刺戟症狀アルモノヲ致ス(病醜ヲ見ヨ)

(七)淫快及ビ淫力ノ減却乃至絶滅ハ通例酒客ノ早發症狀タリ

(八)植物機官ノ機能深障礙モ亦持久ノ酒精濫用ノ爲ニ來リ早老狀態殊ニ榮養及ビ血行ノ障礙トナリテ發シ之ニヨリテ動脈ノ粥腫血管麻痺脂肪心臟慢性腸胃加答兒肝臟變質腎臟變質ヲ起ス皮膚ハ蒼白汚色貧血ニシテ毛細管開張及靜脈鬱血アリ眼光曖昧シテ瞳孔ハ多クハ開大シ目視ノ茫乎トシテ中心ヲ發スルナク面貌ニ癡鈍ノ狀アリ顔面神經作用變ジ易ク或ハ痿弱トナリ姿態弛解シ蕩搖定マラザル等ハ酒客ノ精神身體ノ變質ヲ表スルモノナリ

(戊) 經過

經過ハ進行性ニシテ途ニハ精神身體荒墜ノ極度ニ至ル遲鈍痰弱植物機能ノ虛弱ノ如キ是ナリ然レモ酒客ノ能ク此期ニ達スルハ稀ニシテ多クハ植物機官ノ附隨病特ニ肝硬結水腫尿管毒癩腦出血及癩癩ノ殘損急性癩衝病殊ニ肺ノ顛振譫妄等ノ爲ニ此ニ至ラズシテ死ス酒客ニ在リテハ多少重キ病ハ單一ナル氣管支炎ニテモ大ニ其生

命ヲ殆クスルヲアリ

(己) 預後

預後ハ不良ニシテ其治癒スルハ稀ニ自ラ克ク其病弊ヲ脱スルヲ能ハズ合併症ノ爲ニ死ニ至ラズバ次第ニ其心身荒廢スルヲ致スナリ

(庚) 治法

第一ニ原因療方ナルベク永ク酒精ヲ嚴禁スルヲ即是ナリ是レ私家治療ニハ行ハレズ癩癩院ニ於テ爲スベキノミ歐羅巴ニ於テ人民ノ盡ク火酒ヲ濫用スル邦國ニテハ酒客院ヲ立テタリト云フ是レ實ニ其人其社會ニ對スルノ慈仁ニシテ不慮ノ禍害ヲ除キ犯罪ヲ減ジ其人ヲ酒ノ爲ニ變質セントスルニ救ヒ酒毒ノ惡質ヲ遺傳スルヲ防グニ足レリ要スルニ此等醫院ニ在リテ酒精包有ノモノヲ禁ジ規律ニヨリテ神經刺戟劑ニ脱習シテ初メテ治癒ヲ云フベキノミ酒精禁斷ハ卒然之ヲナシテ初次ノ障礙(不眠、幻覺、食思缺乏)ハ數日內ニ已メモ或ハ又爲ニ顛振譫妄ノ兆アルヲアリ故ニ卒然之ヲ廢セザルヲ要トス  
實地醫ガ已ムヲ得ズシテ施用スル火酒兼機那丁幾硫酸又ハ吐酒石等ハ無効ニシテ或ハ有害ナリ



實地醫ノ知ルヲ要スルハ衰弱ヲナスノ處治ハ酒客ニ在リテ合併病殊ニ酒客譫妄ヲ致シ易ク急性病ハ虛乏性惡液性トナルコナリ

### 慢性中酒狂ニ間作スル腦病

慢性中酒狂ノ地ニヨリ數多ノ腦病ノ間作合併シテ實地上甚緊要ナルモノアリ顛振譫妄酒客妄覺症中酒性精神病及ビ中酒性癲癩是ナリ

#### (一)顛振譫妄 (又酒客譫妄 Delirium tremens)

總說 慢性中酒狂ノ間作病中、最要最多ナルハ顛振譫妄ナリ其本症ハ譫妄ト顛振トニシテ其他必有ナル證候ハ不眠ト幻覺トナリ

原因 此病ハ常習性ニ酒精ヲ過飲シテ多少既ニ慢性中酒ノ症狀アル人ニノミ發シ一回ノ飲酒ニテハ假令強荒ナリモ顛振譫妄ヲ來タスコトナシサレバ慢性中酒ノ基タル腦病ハ盡ク皆顛振譫妄發生ノ地ヲナスモノト云フベシト雖モ其病ノ迸發スルニハ又種種ノ誘因アリ皆腦髓ノ既ニ衰弱シテ抵抗能力ナキヲ又更ニ衰弱ナラシムルノ要素タリ其中最重要ナルハ累重ノ飲酒、常習ノ神經刺激物(酒精)廢止、食物缺乏又ハ慢性胃加答兒ノ増進ニ因スル榮養不充分、劇甚ナル感動、重症ノ疾病(殊ニ肺炎)過多ノ下利、化膿、失血、守夜不寐、疼痛性疾病及ビ創傷(殊ニ骨傷)等ナリ

證候 顛振譫妄ノ發起ハ決シテ急ナラズ其前驅症トシテハ屢胃加答兒症狀アリ不眠ニシテ驚愕性幻覺、苦夢、頻回ノ驚起、不穩ノ恍惚アルモノアリ溼鬱不快アリ刺戟性狀態アリ心窩閉塞乃至劇甚ノ怔忡アリ耳ニ噪鳴幻聽アリ聽神經視神經ノ感覺過敏アリ頭痛、眩運アリ神經性不穩アリ手及舌ノ輕度ナル顛振アリ前驅期ノ持續多クハ數時ニシテ時ニ數日ニ亘リ長キハ十二日ニ至ルアリ

本來ノ病候ハ精神障礙、運動障礙及ビ植物性機能ノ障礙ニシテ精神障礙ニハ激越狀態ヲ以テ起リ次グニ譫妄狀態兼意識濁濁ヲ以テス其初メニハ長續ノ不眠アリ精神ノ激越アリ苦悶性感應アリ感情興奮性五官興奮性ノ増加アリ其考慮機轉ノ外形上障礙ハ考慮結撰ノ不能、頭中ノ紛亂ヲ致シ甚キハ意識ノ濁濁又ハ譫妄トナル意識ノ濁濁ハ常ニ淺輕ニシテ朦朧夢ノ如ク劇ク話シ掛クレバ一時之ヲ正キ言談應接ニ喚起スベク而モ又直ニ其譫妄ニ陷ケルナリ追想ハ大抵皆概括性ナリ譫妄ハ主ニ幻覺ニ係リテ患者ハ屢逆旅ニアリト稱シ酒ヲ要望シ又ハ自ラ其職業ヲ取ルト信ジテ力ヲ盡スアリ幻覺ハ初メハ視官ニアリ、又暗所ニテアルノミナレド後ニハ晝間モ來リ形態分明ニシテ主ニ驚異性ノ内容ヲ有シ動物ヲ視ルコト多ク殊ニ箇箇ニアラズシテ其羣集タリ蜘蛛蟻、蝮蛇、馬、犬、狐鼠等數多目前ニ現シ均患者ヲ批擻スルノ位勢ニア



リ患者ニ向ヒテ群集シ邀迫シ薄來シ咬啮セントス又奇怪異詭醜惡ノ形狀アリ亦皆夥多ナリ感覺過敏及ビ痛覺倒錯バ患者ニ小蟲皮下ニ在リテ刺螫シ苦責シ蟻蝨蛇蝎蠕蟲蜘蛛ノ皮上ニ在ルヲ錯覺シ之ニ由リテ病頂ニハ通常牀ヲ摸シ膚ヲ拭フコアリ瘡癰外傷等モ亦譫妄ノ義ニ於テ知覺シ屢動物ノ咬傷殺害等ナド、スルナリ凡テ彼幻視ハ暗所ニ於テ累積シテ來リ回復期ニ於テモハ譫妄ナキニ至ルモ眼ヲ閉ヅレバ則チ之ヲ見ルナリ經過中又幻聽ノ來ルコアリ紛雜ナル音響鳴動喧噪爆聲煩聲叫喚ノ聲談論ノ詞ニシテ多クハ驚異性ニ又淫靡ナル内容ナルコモ稀ナラズ幻視ニ比スレバ經過性ノミ是等幻覺ハ即患者ヲ常ニ激越ナラシメ之ヲ原索性追跡妄想ニ擠陷スルコ稀ナラズ又錯覺タルコモ多クシテ壁上ナル斑點裂文塗抹等ヲ視テ動物トナシ又旁人ヲモ病頂ニ於テハ其譫妄ノ義ニ於テ誤認スルナリ妄覺及ビ自覺ノ驚異性仇敵性ナルヤ或ハ自家生活及ビ旁人ヘノ暴行ヲナスコアリ又カ、ル譫妄家ニハ口腔加答兒胃加答兒併存シテ爲ニ中毒妄想ヲ致シ一時絶食スルコ稀ナラズ身體證狀 運動障礙ハ頭振ニシテ殊ニ指ヲ開キ及舌ヲ延バスキニ分明ニシテ屢又顔面筋四肢ニ推弘シ甚キハ全身ノ顫振痙攣ヲ致ス面貌弛緩シ時ニ不隨意ノ攣縮及ビ共同運動アリ言語不明ニシテ舌澁リ談話蓋搖シ然ラズハ詢語ナリ其歩行ハ盪搖

踏跟ニシテ確ナラズ痛覺ハ屢屢シ痛覺脱失ノ状態ハ感覺過敏ノ状態ト交換ス反動興奮性ハ屢亢進シテ臥牀中ニテ故ナク身ヲ動搖シ四肢ニ攣縮アリ又亂打シ局部又全身ノ間代性痙攣サヘアリ呼吸ハ頻數脈搏モ亦頻數ニシテ一百至又其以上ニモ至リ汗分泌ハ多クハ過溢ニ尿ハ僅少或ハ變化ナシト云フ人モアリ(穢厚ニシテ比重高ク又ニ蛋白ヲ出ダスコ稀ナラズ或ハ曰ク硫酸増シテ磷酸尿素減ズト)大便ハ秘結シ通常又胃腸合併症アリ睡眠ハ病頂ニハ全ク之ヲ缺ク興奮ノ絶ユルコナク之アルモ甚短キガ爲ナリ

頭振譫妄ハ本無熱ノ病ナレモ亦他ノ重症神經病一般ニ於ケルガ如ク急卒ニ體温ノ甚ク上ルコ稀ナラズ是レ植物機官ノ合併病アルモノ、他腦髓ノ調温中樞ノ神經作用異常ニ歸スベキモノナリ榮養ハ都テ苦悶性不安ノ爲胃加答兒合併ノ爲被毒妄想ニテ絶食スル等ノ爲ニ大ニ廢墜ス

頭振譫妄ハ屢虛乏ノ性質トナリ脈搏ハ軟小トナリ心音ハ鈍ク甚キハ第一音ノ消失スルニ至ル心身虚脱シ發汗過溢ニシテ嗜啞性ノ譫妄稀ニハ憤怒性譫妄トナリ蹠躍動及ビ撮空理線アリ舌ハ乾燥煤狀トナリ意識ハ全ク消失シ或ハ昏憤トナル

經過ハ弛張性増劇性ナリ



持續 頭振譫妄ノ持續ハ平均三乃至八日ナリ或ハ一二週ナリト云フ人アリサレド  
 屢再發シテ持續ヲシテ數週間モ長カラシム  
 轉歸 頭振譫妄ハ重病ニシテ其凡ソ十五乃至二十分ハ死亡ニ機轉ス死亡ハ虛脱ニ  
 ヨリ又腦合併症水腫急性譫妄榮養機能病殊ニ沈下性肺炎ニヨル合併病中殊ニ恐ル  
 ベキハ腦水腫ニ搖擗アルモノナリ其他慢性狀態飢乏譫妄ニ推移シ慢性精神病ニ推  
 移シ又治愈ニ轉歸スルモノアリ治愈ハ極輕キ症ニ在リテハ分利性ニ深睡後ニ來レ  
 其恢復多クハ漸徐ニシテ激越ト譫妄ト漸ク退キ多眠ナル數時間ノ病歇時アリ又  
 其治愈ニ至ルニハ身體及ビ精神ノ衰耗意識ノ濁濁乃至昏迷自覺ノ衰弱ノ期アリ譫  
 妄ハ猶未タ全ク批正サレズ時ニ猶妄覺アリ此ノ如キモノ漸ク其譫妄妄覺ナルヲ變  
 識シテ復之ガ爲ニ不安トナルヲナシ頭振譫妄ニ繼發スル精神病ハ妄覺狂長續性昏  
 迷狀態鬱狂及ビ躁狂ニシテ其然ラザルモノト異ナルハ慢性中酒ノ痕跡及ビ急性譫  
 妄妄覺ノ殘餘アルニヨルノミ  
 解視ニハ慢性中酒ノ變化(軟腦膜ノ濁濁淋巴鬱滯等)ノ他ニ軟腦膜及ビ腦髓ノ靜脈性  
 充血及ビ水腫アリ  
 診斷ハ之ヲ精檢スレバ甚難カラズ若シ之ト誤ルモノアラバ其ハ或ハ麻痺狂ノ激越

狀態ナランカ既往症ノ他麻痺狂者ノ錯亂ノ甚キヲ其障礙ノ持續ノ長キヲ運動症狀  
 ノ性質ノ異ナルヲハ之ガ差別ノ繩尺タルベシ要スルニ麻痺狂ノ激越ニ於テ病ノ爲  
 ニ過荒スルヤ中酒症狀ト麻痺狂症狀トノ混同シテ分ツベカラザルヲ往々之アリ  
 治法 療治ハ原因療法ヲ主トシ對症療法ヲ次トス原因療法ニ付キ最重要ナルハ預  
 防ナリ病院監獄ノ醫ハ能ク之ヲ實行スルノ機會多シ酒客ノ入院スルヤ其慣用神經  
 刺戟劑(酒精)ヲ直ニ全廢セズ少ナクモ重病又ハ前ニ舉ゲシ誘因アリシキ酒精ヲ處方  
 ニスルヲ怠ルベカラズ且又重症ノ病疼痛ノ病外傷ノアリシキハ衰弱ヲナス處放  
 血法峻下劑等ヲ以テセズ興奮劑強滋食物ヲ用フベシ  
 酒客ハ皆頭振譫妄タルノ虞アレバヨク其前驅症殊ニ不眠ニ注意シ之アラバ直ニ催  
 眠劑阿片阿片兼酒類抱水格魯刺兒抱水格魯刺兒兼莫兒比涅はるゐるでひど抱水わ  
 みれんするふなるヲ處スベシ本病既ニ發シナバ凡テ衰弱ヲナス處治ヲ避ケ睡眠ヲ  
 早クスルヲ謀ルベシ是レ或ハ其症ノ全然虛乏性ナルト從前處治ノ成績宜カラザル  
 トニヨリ或ハ此症ハ深長新銳ヲナス睡眠後ニハ治去スルノ實驗アルニヨルナリ  
 催眠劑ヲ選探スルニハ其患者ニヨリ又其全病狀合併症熱痲衝病殊ニ心臟ノ狀態(脂  
 肪變性心機衰弱ニヨル)ベシ其病初度ニシテ年若ク身強ク脂肪心臟ナク動脈硬化ナ



ク要スルニ中酒ノ後進症狀ナク合併症ナク熱ナキモノニハ酒類處方ノ旁抱水格魯刺兒ヲ可トス小量一〇乃至一五ヲ頻用三四時毎ニスルヲ殊ニ宜ク或ハ一回毎ニ莫兒比涅〇〇一ヲ加フベシ二三回服用ハ既ニ効アリ若シ効ナク或ハ却テ激越スレバ之ヲ止ムベシ作用前者ニ近ク効徐ニ而モ險少ナキハ阿片ナリ皮下使用ハ内服ニ優レリ〇〇三ノ水製亞片越幾斯ヲ毎三四時ニ注射シテ以テ眠ヲ催スニ至ル分利性睡眠アルモ數日間ハ猶ホ其少量〇〇一乃至〇〇二ヲ持用セザルベカラズ然ラズハ再發ノ恐アリ皮下ニ用フベカラザルニハ灌腸又ハ坐藥ニス合併病肺炎重傷アリ然ラザルモ熱高ク又ハ酒精瘦削諸臟心ノ脂肪變質心機衰弱(多ク音鈍ク心動弱ク脈數アラバ抱水格魯刺兒ハ延髓ヨリ心臟麻痺ヲ起スノ虞アリ阿片ヲ用ヒ且興奮劑赤酒必要ナラバ醋酸依的兒退泥子安門水ニテ心衰弱ヲ護スベシ。はるゐるでひと一日一二)〇迄抱水あみれん(六〇)モ用フベシ若又其症ノ長續再發合併症等ニテ虛乏状態トナリ深重ナル意識障礙アリ舌煤ノ如ク顔容虛脱シ嗜啞性譫妄アリ撮空理線アリ蹠躍動アリ心衰弱アリ脈弱クシテ一百二十至以上ナラバ魔醉劑ハ危險ナリ興奮強壯劑纔ニ其急ヲ救フベキノミ催眠ト安靜トノ効アルハ赤酒ナリ心作用不充分ナランニハ龍腦麝香ヲ投シ昏慣アラバ灌水法可ナリト云フ既ニ其死ヲ救ヒナバ心動作ニ心

ヲ用ヒテ阿片又めちらるヲ用フベシ  
催眠ノ他ニハ精良ノ榮養品ヲ給スルヲ主トス然レモ胃症狀ハ頗ル之ヲ難クスルナリ病頂ニ於テハ乳食最ヨシ牛乳ヲ曹達水又ハ天然酸水ニ混シ用フベシ  
激發又ハ屢脱離ノ爲ニ虛脱セントスルニハ強迫性藤臥ノ已ムベカラズ或ハ少シク其動行ヲ拒ムノ備ヲナスベキヲアリ自他ニ危險ナル片ハ温暖ナル室ニ隔離シ守視ニ心ヲ盡スヲ要ス  
回復期ニ入ラバ睡眠ヲ充分ニシ榮養ヲヨクシ胃加答兒等ヲ除クハ最緊要ナリ食療方ノ他ニ規那劑ヲ用フベク殊ニ規那煎加鹽酸ヲ可トス

(二)中酒性妄覺症 (Trunkfaelige Sinnestäuschung.)

總說及ビ證候 酒客ノ大ニ妄覺殊ニ妄視ニ素性アルヲ既ニ述ブル所ノ如シ妄覺ノ其病ニ於ケル通常ハ唯原素性障礙ニシテ離斷裂スルモノナレモ稀ニハ累堆疊出シ來リテ一聯貫ノ幻覺性譫妄トナルヲアリ譫妄ハ幻視及ビ幻聽ニシテ其内容ハ驚異性ニ又幻響喧躁噪鳴及ビ怔忡アリ意識ハ朦朧狀夢寐狀ニシテ幻覺ヲ鑒識スルヲ能ハズ而モ病中ノ經歷ヲハ概括性ニ追想スルヲ亦必シモ無キニアラズ幻覺錯覺ノ爲ニ外界ヲ誤認シ之ニ對シテ甚キ暴行ヲナスヲアリ



原因 酒荒及ビ熱害ノ累積セルハ之ヲ惹起スヲ得  
經過 一時性ニシテ數時ヨリモ長キコトハ稀ナリ

(三)中酒性精神病 (Alkoholpsychosen.)

酒客ニハ稀ニ一定形ノ精神病ノ來ルコトアリ其病タル必シモ皆特異ノ種狀アルニア  
ラズ鬱狂ト云ヒ躁狂ト云フモ其他ノ由來ノモノト區別スベキハ機質性基礎アリテ  
之ニ重症特異ノ性質ヲナスニヨルノミ鬱狂ハ專ラ昏迷性鬱狂ニシテ躁狂ハ劇ク上  
衝性ニシテ甚キ意識障礙アルモノタリ其他ニ慢性中酒狂ノ地ニハ特異ノ狂疾アリ  
一度ノ酒荒ニテハ大量ニテモ決シテ起ラズ或ハ酒客腦髓ノ荒墜セルヤ酒荒ニハ關  
係ナク他ノ身體上精神上ノ副因ヨリシテ此症ヲ發スルコト猶ホ前ノ酒客譫妄ノ如ク  
ナルモノアリ左ニ其數者ヲ舉ゲン

(5)中酒性鬱狂 (Alkoholmelancholie.)

總說及ビ證候 發起急激ニ經過急性ニシテ八乃至十日ナルヲ常トシ數週ニ延クハ  
希ナリ意識著ク溷濁シ豊多ノ幻覺アリ劇甚ノ怔忡乃至諸事恐怖アリ鬱狂性暴動發  
作アリ自殺企圖アリ概括性追想ヲ以テ急速ニ解去スルアルハ此症ノ特標ナリ  
系統性ノ譫妄ヲナシ又之ヲ自家罪業ノ義ニ結撰スルコトハ意識ノ障礙アルト經過ノ

急性ナルトノ爲ニ殆ト之ナク會其長續スルモノニ於テ之ヲ見ルノミ其苦悶性豫期  
感動中幻覺ノ豊多疊積スルアリ或ハ責誣ノ聲トナリ(殺人者ナリ竊盜ナリト稱シ色  
事上ノ罪惡ヲ告ゲ又ハ死亡幽囚ヲ以テ脅迫ス)或ハ幻視タリ(白キ物、鬼、幽靈、怪物、動物  
等多クハ夥多)二者ハ多クハ經過性ニシテ妄想ニハ應施セラレズ

身體上多クハ急性中酒症狀、慢性中酒症狀、頭痛、劇甚ノ衝逆、不眠、アリ

原因 中最モ多キハ感動(殊ニ驚駭)及ビ酒荒ナリ

預後 ハ甚幸好ナリ

治療 不眠苦悶ニ對シテハ阿片ノ効アルコト猶ホ頗振譫妄ニ於ケルモノ、如シ衝逆  
ニハ浴兼氷罽ヲ可トシ心作用亢進ニハ實荛答利斯ヲ可トス

(5)中酒性躁暴狂 (Alkoholische Tobsucht)

總說 特異ノ躁狂性病態ニシテ慢性中酒症ノ地ノミニ發シ證候ノ配合、其各徵候經  
過ニ特異ナル所アリ

證候 鬱狂性前驅期決シテナク其發起タルヤ或ハ急卒ニテ分明ナル上衝症狀アリ  
或ハ麻痺狂ノ初期躁狂性興奮ニ似テ唯精神衰弱ノ左程分明ナラヌニヨリテ之ト區  
別ス



初期症狀ハ刺戟性増進性質ノ變更、衝逆、睡眠ノ障礙時ニ廢絶、動行不息、遊蕩、過飲、累積ノ傾向等ニシテ又夙ニ自家感觸ノ大ニ亢盛スルアリテ病候直ニ躁暴狂ノ地ニ至リ或ハ躁狂狀興奮ノ期アリテ後此ニ達ス躁狂性發揚ハ尋常發揚狂ト異リ自家感觸亢盛彼ヨリモ甚ク刺戟性ナルヲ亦彼ニ過ギ旁人ニ最大荒暴ヲナスニ至リ誇負自高ク買收症アリ金錢揮散ヲ好ミ遊蕩シ荒暴顧慮スル所ナク屢又好色症アリテ甚キハ我娘ニ對シ又ハ街路ニ於テ之ヲ發呈ス誇大妄想モ亦夙ニ發ス

躁暴狂症狀ニハ大錯亂アリ意識障礙アリ刺戟性アリ非常ノ自家感觸増進アリ運動動作ハ殆皆性慾狀ニ涎潮、唇顫振、舌顫振、顔面神經半麻痺、瞳孔縮小又ハ瞳孔不均モ多ク唇運動失節ノ爲ニ言語障礙アリ皆此病機ノ重クシテ特異性機質性ナルヲ表ス之ニ加フルニ多クハ皆誇大妄想アリ其放佚ナル殆ト麻痺狂者ノ誇大妄想ニ肉薄シ而モ彼ノ如ク怪誕ナラズ彼ノ如ク雜駁ナラズ其内容多クハ宗教上ニシテ自ラ上帝神佛ト云ヒ或ハ帝王ト稱シ富鉅萬ヲ累スト云フ時トシテハ荒誕ナル追跡妄想殊ニ被毒妄想又ハ嫉妬妄想ヲ發ス

病頂ニハ夥多ノ幻覺アリ殆ト皆幻視、鬼神極樂ニ關スニシテ幻聽之ニ次グ躁暴性動作ハ甚荒暴ニ破壞ノ急迫アリ吼叫、躁踴奔、汚塗、扯裂アルヲ以テ著ハレ經過性ニハ又

一時性憤怒性躁暴ノ發作アリ身體上ニハ多クハ著キ衝逆不眠アリ

經過持續及ビ轉歸 病頂期ニハ疾病ノ經過ハ増劇性弛張性ニシテ寛解時ニハ發揚症狀ニテ誇大妄想ノ固執、濫収症、動作不息症(之ニハ衣服及ビニハ衣服及ビ)アリ而モ精神虛脱ノ主ナルヲ屢ナリ

病頂ノ持續平均數週ニシテ幸良ナルホハ睡眠アリ興奮性弛解シ寛解狀態ハ益深キヲ致シ躁暴狂ハ憤怒性躁狂ノ期ヲ經テ然シテ後治療ニ移ルナリ然レモ又病頂ニ於テハ病狀増進シテ急性譫妄トナリ遽ニ死ニ致スヲアリ或ハ其病慢性トナリ興奮去リテ後精神衰弱日ニ加ハリ感動ハ爲ニ薄弱、兒狀ノ如クナリ忽ニシテ誇大妄想アリ忽ニシテ兒狀ノ啼泣アルヲ少ナカラズ時トシテ猶ホ憤怒性躁暴發作又ハ上衝性躁暴發作アリ精神及ビ運動ノ中樞ニ深障礙アルハ持續性性慾狀ニ故ナク破壞シ扯裂シ塗糞スルニ益、較明トナリ誇大妄想ハ微茫斷裂トナリ感動消失シ又ハ奇異外發ヲナス夫レ或ハ此ノ如キモノ、恢復スルヲモアリ然レモ精神機官ノ障礙ノ深重ナル決シテ其常ニ復スルヲ能ハズシテ多少虧缺性ニ精神薄弱ニシテ酒精刺戟感情刺戟ニ對シテ甚刺戟性タリ多クハ腦髓ノ深重ナル變質ヲ致シ進行性癡狂ニシテ性慾性衝動(破壞舉動)アルモノトナル榮養遽ニ廢シ脈搏緩ニシテ一擊性ニ心音鈍ク血管



系統ノ緊張退キ尋常下體温ヲ呈シ癰、皮下蜂窠織炎(是ハ塗便ノ患者ガ自ラ引求スル所  
 リ)アリ又顔面神經麻痺、瞳孔不均、半身發汗、四肢運動ノ緩漫不確アリ數月又ハ數年  
 ヲ經精神身體削瘦ニ陥キリテ後痔瘡、衰弱性下利、沈下性肺炎ノ爲ニ死亡ス  
 解。視。ハ病進ミシ症ニハ顱骨肥厚症ニテ障板ノ消失アルモノ、薄腦膜ノ(淋巴鬱滯ニヨ  
 リ)溷濁、貧血ナルモノ、及ビ腦髓水腫、アリ加フルニ萎縮ノ開初(廻紋ノ狹縮ヲ以テシ腦  
 中ノ血管腔ハ洞開恢廣シ腦室少シク恢弘シ時ニハ内膜ニ顆粒ヲ生ス  
 病態ヨリ之ヲ推セバ病初病頂ニハ血管痿弱性充血アリ猶治癒ヲ望ムベキモ病益進  
 ムニ及ビテ血球血管周淋巴場ニ遊出シ、淋巴鬱滯シ、腦ノ退行性變化ヲナスアリ  
 預。後。ハ良ト云フベカラズ其半數ハ治癒スルコトアレモ第一期ニ於テ然ルノミ且屢精  
 神虧缺ヲ致ス  
 治。法。初期ニハ長浴兼水器法、阿片注射及ビ他るごちん注射ヲ可トシ心動作ノ著ク  
 亢盛セル片ハ實麥替利斯ヲ用フベシ續發期ニハ幕臥、溫被、血行ノ興發、榮養ノ選良、幕  
 瘡ノ防護ハ必要ナリ

(ハ)中酒性妄覺狂 (Alkoholischer Wahnsinn.)

總說及ビ證候。妄覺狂ハ稍多ク見ル所ニシテ特異ノ徵アルヲ以テ鑒別スベシ

酒。伏。期。ハ甚短ク其證狀ハ頭痛、眩暈、睡眠障礙、衝逆性症狀ニ限ル  
 本。病。ノ。發。ス。ル。コ。ト。多。クハ急卒ニシテ驚異性幻覺殊ニ幻聽ヲ以テス本病ノ證候ニハ幻  
 視ハ無キコト稀ニシテ且妄想ニ應施セラレ稍持久性ナリ其內容主ニ驚異性ニシテ劇  
 キ反應性苦悶ヲ致ス旁又形像及ビ內容ノ不關係ナル動物幻視アリ幻嗅及ビ幻味ハ  
 多カラズ亦不快ノ內容ヲ以テシテ被毒妄想ヲ致ス最緊要ナルハ幻聽ナリ內容淫猥  
 ナルコト甚多ク陰部ノ小弱ヲ稱シ(小陰莖、陰萎)色事上ニ嘲誣脅嚇スル(鷄姦者、獸姦者、兒  
 女誘姦者、手淫家、閹刑近ニ在リ等)ヲ聽ク  
 妄。想。ハ追跡及ビ誇大タリ追跡妄想ヲ殊ニ緊要トシ初發性ニシテ多クハ色事性內容  
 ヲ有シ嫉妬妄想、旁人淫褻ノ妄想アリ或ハ加之他ノ追跡妄想、毀害、盜竊セラル等ニシ  
 テ相當ノ幻覺(犯罪人ナリ殺害近キニ在リ等)アルモノアリ慢性中酒症ニ多キ痛覺倒  
 錯、感覺過敏ハ殊ニ之ヲ物理上追跡(電氣等)ノ妄想ニ致スコトアリ患者ハ概シテ甚無感  
 動ナレモ追跡性ノ妄想幻覺ニ尋ギテハ屢劇キ反應性苦悶症狀ヲ起スコトアリ誇大妄  
 想ハ初メニハ經過性ノミ後ニハ相當ノ幻覺ヲ以テスルコト多ク富豪貴族等ニ出入ス  
 宗教性內容ノモノ亦多シ  
 身體證候ハ慢性中酒狂ニ見ルモノナリ



經過ハ急速ニシテ或ハ治癒シ然ラザレハ精神衰弱ヲ致ス  
預後ハ急性經過ノ症ニハ好良ニ慢性ノモノニハ良カラズ多クハ唯、殘缺性治癒妄想  
妄覺ノ退キシ後不完全ノ病覺ヲ以テ精神衰弱ヲ殘スアルノミ然レモ治癒モ亦必無  
ニアラズ

(乙)中酒狂偏執狂 (Alkoholsche Paranoia.)

總説及ビ證候 中酒狂偏執狂ハ希有ノ症ニシテ追跡妄想ノ範域ニ在リ時ニ誇大妄  
想ニ轉化スルヲアリ此症ニ特有ナルハ其妄想ノ中心、色事性ナルニ在リ種々雜多ノ  
色事上嘲罵ヲ耳ニシ自ラ社會舉世ノ人ヨリ獸姦者、鴉姦者、女兒誘姦者トシ追跡サル  
ト稱スルナリ加フルニ中酒症ノ身體精神症狀特異ノ妄覺、殊ニ他ノ追跡妄想アル  
偏執狂ニハナキ幻視ヲ以テス兒時既ニ見ルベキノ精神薄弱ノ徵モ亦注目スベキナ  
リ感情ノ粗暴ナルト刺戟性ナルトハ其誤想スル追跡家ニ對シテ荒暴ノ反應ヲナシ  
或ハ患者ヲシテ公衆ニ危險ナラシム

(丙)中酒性麻痺狂又名酒精麻痺狂 (Alkoholparalyse.)

總説及ビ證候 慢性中酒ハ時ニ麻痺癲狂ニ轉歸スルヲアリ尋常麻痺狂ニ在リテハ  
酒荒ハ之ト原因上關係ナク又ハ其共同原因タルノミナルニ此症ハ之ニ異リ中酒狂

ト麻痺症トノ合併ニシテ健忘、感情鈍麻ハ妄覺、嫉妬妄想ト齊呈シ運動失節ハ頭振及  
ビ中酒性神經炎症狀ト並存ス

診別 中酒麻痺狂(所謂似非麻痺狂?)ト麻痺狂トノ診別トナルベキハ經過ノ急性ニ  
シテ多クハ數月間ノミナルヲ頭振ノ高度ニシテ多クハ全身ナルヲ腦出血發作癲癇  
様發作ノ屢ナルヲ感覺脫失又感覺過敏ニシテ殊ニ下肢ニ限リタルモノ多キヲ病初  
及ビ病中ニ頭痛ノ劇キヲ誇大妄想ノ準他稀ナルヲ從前ノ嫉妬妄想ノ殘餘アルヲ幻  
視ノ分明ニ中酒性ナルモノ屢ナルヲ言語障礙ノ著甚ナラズ主ニ唇失節ニ基キテ蹉  
跌言語ニ基クヲ少ナキヲ等はナリ  
經過及ビ轉歸ハ凶險ナルヲ少ナクシテ全ク退消シ又ハ殘缺ヲ以テ治スルヲアリ  
解視ニハ麻痺狂ノ尋常所視アリ唯他ニ通常之アルベキ腦室膜顆粒ナキヲ異トス(く  
らつふとるびんぐ氏)

(四)中酒性癲癇狂(又名酒精癲癇 Alkoholepilepsie)

總説及ビ原因 酒荒ヨリ腦變化ヲ致スアルハ既ニ之ヲ述ベタリ癲癇モ亦酪酊性  
飲料ノ中毒ヨリ發スルナリ酒客癲癇ヲ致スノ素因ハ遺傳ノ素質、兒時ノ搖擲、外傷ナ  
ルヲ稀ナラズ夫レ癲癇ハ機能上、腦髓ノ一定中樞ニ持續性ノ神經作用異常所謂癲癇



性變化アルベキモノナレバ一回ノ過飲ニテハ假令劇過ナルモ之ガ爲メ惹起サル、  
一少ナクシテ其ノ長續ノ過荒ヨリ由來スルハ猶ホ顛振譫妄ノ如クナリ若シ夫レニ  
回ノ酩酊ニテ癲癇發作ノ起ルヲアラシカ是レ必ズ前ヨリ既ニ癲癇性變化(即癲癇)ノ  
アリタルノ證ナリ癲癇者ニ於テ癲癇發作ノ一時ノ酒精過飲ノ爲ニ反復スルヲハ頗  
ル多キガ如シ酒精癲癇ニシテ一たび其症ヲナスヤ其發作ヲ反復セシムルノ機會原  
因トナルベキモノ、中重要ナルハ酒荒ナリ

慢性中酒家ノ凡ソ十%ニハ癲癇性偶發症アリ皆概シテ其後ノ期ニ來ルナリ

證候。其癲癇性發作ハ屢不完備ニシテ一二筋群又ハ半身ニアルノミ且此症ハ活潑  
ナル上衝ヲ附隨スルヲ多シ意識ハ發作中ニ全ク消失セザルヲ屢ナリ然モ亦眩運性、  
搖擗性ニシテ尋常ノ癲癇像ト區別スベカラザルモノアリ之ト善ク差別スベキハ其  
發作ノ發呈スルノ狀勢如何ニアリテ存シ其發作ハ長久ノ間歇時アリテ來リ其來ル  
ヤ相累積シ且過飲ト相關繫シ反復スルヲ常トス大抵カ、ル發作連起ニ尋グニ癲癇  
性譫妄夢寐狀態又ハ昏迷狀朦朧狀ナル精神障礙ヲ以テシ時トシテハ顛振譫妄ト中  
酒性妄覺症ノ齊時合併ヲ見ルヲアリ酒精癲癇ノ起ルヤ患者ノ睿智上變質ハ急速ニ  
増進ス

預後。ハ不良ナリ蓋シ癲癇自家既ニ然ルガ上ニ加フルニ酒荒ノ常ニ反復シテ益索性  
ヲ増進シ以テ新發作ヲ惹起スルヲ以テナリ  
治療。臭剝ハ酒癲癇ニ對シテモ奏効アルガ如シ然レモ數多ノ中酒家ハ臭剝ナクモ  
病院中ニ於テ其幸好ナル衛生上約制殊ニ酒精禁斷ノ爲ニ發作ナキナリ

### 第十四 莫兒比涅中毒狂 (Morphinismus)

#### (甲) 總說

莫兒比涅ハ方今治療上鎮痛劑トシ(殊ニ皮下ニ)多用セラレ、モノナリ而シテ其用多  
クハ疼痛ヲ殺グノミニアラズシテ又精神及ビ身體ノ安康ノ感觸ヲ惹起シ且其興奮  
性ヲ増進ス此興奮作用ハ殊ニ神經病性體質アルモノニ較明ナリ故ニ莫兒比涅ハ鎮  
定劑(麻醉劑、催眠劑)タルノミナラズ又刺戟劑タリ嗜好品タリト云フベシ夫レ莫兒比  
涅ハ之ヲ持久シ用フレバ無故ノ劑ニアラズシテ酒精ノ長ク過用セシニ同ク慢性中  
毒ヲ致シ神經中樞ハ之ガ爲ニ榮養機能ニツナガラ害セラレ若シ之ヲ慣用セシ人ニ  
卒然其常習量ヲ減シ又ハ之ヲ全廢スレバ深重命ヲ危フスルノ症禁斷症狀發スルア  
リ患者自之ヲ止メントスレハ禁斷症狀ノ直ニ起ルアリ刺戟劑嗜好品トシテ其需要  
其求望多ク其濫用ノ一結果トシテ意思衰弱ノ慰藉スベキナキモノヲ致ス等ニヨリ



テ患者ノ自、此邪毒ヲ脱スルコト甚難ク病院ニ於テ纔ニヨク之ヲナスベキナリ  
莫兒比涅中毒家ニ在リテハ大抵皆慢性中毒ノ病患、其好快作用ニ過ギテ其ノ好快ノ  
感觸ヲナスハ誠ニ一時ノミニシテ莫兒比涅ノ多量ヲ用テ初メテ強テ之ヲ致スベキ  
ニ至リ患者ノ健康ト生活ト頗ル危険トナルニ及ビテ初メテ醫治ヲ求ムルナリ

(乙) 原因

莫兒比涅中毒ノ發成ノ本ハ第一ニ莫兒比涅給用ヲ快トスル特異ノ體質ナリ其施用  
ヲ誘起スルハ疼痛、神經痛、坐骨神經痛、齒痛又ハ不眠アル諸疾ニシテ長續スルモノナ  
リ此ノ如キモノニ於テ若シ醫ノ輕卒ニ藥ヲ患者ニ委スルアルカ又ハ患者ノ身分、莫  
兒比涅ヲ獲ルニ容易ナルキハ莫兒比涅中毒症ヲナシ易シ莫兒比涅中毒家ノ七割五  
分ハ男子ニシテ其半數ハ醫ナリ

(丙) 證候

慢性中毒ノ證候ト禁斷ノ證候トノ區別アリ  
(一) 中毒證候ハ莫兒比涅施用後三月ヲ經ズシテ起ルコト希ニシテ抵抗強キ人(從前強健  
ニシテ素累ナキモノ)ニ在リテハ其發スルコト多クハ之ヨリ頗ル遅ク(數年ニ及ブ)且輕  
クシテ神經中樞ニ疾病アルハ禁斷ヲ待テ初メテ明ハル、ナリ是モ亦酒精中毒ト同

ク其深重ニシテ變質性ナル作用ヲナスハ多少其人ニ疾病素質アリテ然ルナリ要ス  
ルニ其中毒ト否トハ一日ノ用量其濫用ノ時日ニヨラズシテ其箇人性ニヨルナリ慢  
性莫兒比涅中毒ノ症狀ハ精神症狀及ビ身體症狀ニシテ此ニハ精神症狀ヲ主要トス  
精神證候 莫兒比涅ハ決シテ酒精ノ如クニ甚ク精神機官ヲ害セズ而モ亦精神尋常  
ナルモノアルナシ、敏智ハ或ハ纔ニ常ノ如クナルヲ得ベシ最高ノ精神機轉性質、道德  
心、自裁力、精神ノ氣力及動作力ニ至リテハ必障礙ナクンバアラズ莫兒比涅中毒家ハ  
性質薄弱ニ意思衰弱シ氣力ナク法醫上、常ニ減刑ヲ至當トセラルベク其感興及義務  
ヲ遂グルニハ常ニ補助ヲ要スルナリ若夫重症ニアリテハ健忘アリ、殊ニ再生其實ヲ  
得難ク精神作能ノ難澁アリ或ハ遲鈍ニ至リ時ニ又精神沈鬱悲苦乃至厭世希死アリ  
或ハ興發性甚ク感動ヲ制スルノ能大ニ減ズルアリ加之經過性ニ神經性不安、激越、  
(恐クハ血管運動性ニ起リシ)苦悶發作、時時ノ幻覺ヲ以テス感應モ之ニ從テ變動シ或  
ハ抑鬱阻喪、心氣性トナリ或ハ自ラ厚信誇負ス睡眠ハ多クハ甚ク妨礙シ就眠前ニ時  
時幻覺殊ニ幻視アリ數時間牀中ニテ睡ラズ強迫性想像性ノコトヲ遣リ之ニ代ルニ晝  
間ニ於テ卒然、執業中、談話中、抑ユベカラザル困憊アルナリ  
身體證候 大抵ハ莫兒比涅ノ分泌減退作用及廣ク云ハ、血管收縮作用ニ歸スベシ



唾液分泌ノ減却ハ口中及咽頭ノ乾涸脈フベキヲナシ脂腺分泌ノ減却ハ皮膚ノ乾燥  
 脆弱ヲナシ腺中ニ皮脂ノ滯停スルヤ癩ヲ起シ胃液腴液ノ分泌減少ハ消化及類化ヲ  
 妨ゲ蠕動減却ト合シテハ脱糞ヲシテ宜キヲ失セシム又夙ニ經閉ヲ致セテ撥卵ノ已  
 ムヲ稀ナリ故ニ經閉アリト雖モ能ク屢懷孕スルナリ精液缺亡亦之ヲ見タリ尿ニ  
 ハ蛋白アルヲアリ特ニ異ナルハ汗分泌ノ屢甚增多ナルヲナリ運動障礙モ亦頗ル多  
 シ筋肉緊張ノ沈退アリ顫振アリ調節ノ障礙ハ甚キハ著明ナル失節ニ至リ括約筋ノ  
 薄弱アリ瞳孔ニハ縮小アリ調節筋弱アリ複視アリ膀胱ニ痙攣アリ心臟ノ神經作用  
 ノ障礙(心臟神經衰弱症、胸痛症狀ヲ偶發ス)アリ心悸アリ脈搏促ニシテ時ニ不正ナリ  
 活態ノ沈退、額上ノ蒼白肉落、皮膚ノ厥冷、温暖需要ノ大ナル等ハ一ハ血管、麻痺性ノ障  
 礙ニ歸スベキナリ耳鳴、奪乏、眩暈、卒倒、冷汗、惡寒等モ亦然リ反動興奮性ハ増加スレモ  
 膝蓋跳反射ノナキヲ希ナラズ感覺障礙ニハ感覺過敏、神經痛、感覺倒錯等アリ(殊ニ心  
 部胃、部膀胱部ニ屢又淫好ノ夙ニ衰へ或ハ勃起ノ機能廢スルアリ全身榮養常ニ甚ク  
 廢シ體重減シ皮下脂肪殺グ中毒ノ後進期ニハ不食症及頑固ノ不眠症アリ呼吸障礙  
 殊ニ喘息樣苦患アリ發熱モ亦稀ナラズ或ハ晩ニ輕キ熱度變動アリ(時ニ室扶斯樣熱  
 ニ似、而モ熱ノ三十八度三以上ナルヲ稀ナリ)或ハ間歇性熱發作ヲナシ間歇熱ト臨牀

上區別ナシ此等諸障礙ノ結果タルヤ増進性瘦削ヲナシ早老症ヲナシ心筋肉ノ脂肪  
 變質及ビ心臟麻痺ノ爲ニ死ニ就クアリ

(三)禁斷證候ハ之ヲ禁斷スルノ漸ナルト急ナルトニヨリテ輕重一ナラズ

漸次禁斷ノ證候ハ分量ヲ大ニ減ズルモ起リ莫兒比涅飢餓ノ第一症狀ハ欠伸、皮膚神  
 經性不安、苦悶、嘔吐、及下利ニシテ尋グニ甚キ衰憊、顫振、四肢及內臟ノ神經痛、惡寒、温暖  
 需要ノ増進、流汗ヲ以テシ血管運動機能變換シ易ク脈數ノ大ニ増シ大ニ減ジ反動興  
 奮性都テ亢進シ五官ノ感覺過敏アリ(幻覺アリ單色ヲ見、單響ヲ聽、不眠ニシテ意識溷  
 濁シ妄覺ヲ批正スル能ハズ爲ニ一二濫錯ノ行爲アリ不安堪ユベカラズ苦悶性錯亂  
 ニ至リ鬱憂ノ甚キヤ脈世希死トナル記憶ニ一種固有ノ障礙アリテ前事ノ推時、正シ  
 カラズ且又顫振譫妄狀ノ狀態ニ至ルヲ完全禁斷ノキノ如クナルヲアリ又幻覺性譫  
 妄妄覺狂ノ亞急性經過ヲナシテ來リ又ハ禁斷方ノ過ギタリト思フ後ニ來ルヲアリ  
 豊多ナル驚異性幻覺(味覺ニモ嗅覺ニモ)アリ豊多ナル皮膚感覺異常アリテ之ヲ仇敵  
 狀ニ應施スル(理學上追跡妄想、電氣ヲ以テノ追跡)アリ  
 急卒完全禁斷ノ證候ハ凡ソ六時間後ニ起リ患者ハ倦憊シ筋肉薄弱トナリ直立スル  
 能ハズ類似虎列刺狀トナル渴甚アリ多汗アリ全身顫振アリ苦悶堪ユ難ク不安アリ



甚キハ啼泣、躁暴、莫兒比涅ヲ猛暴ニ請求スルニ至ル(蓋シ直ニ禁斷ノ諸患ヲ除カントスルニ出ヅルモノニシテ之ヲ得ル爲ニハ罪犯ヲモ避ケズ)之ニ尋グニ多クハ數日間ノ持續ナル幻覺性譫妄、眞個飢乏譫妄ヲ以テスルヲ稀ナラズ、幻覺ハ視聽ニ多ク其中酒性顛振譫妄ト甚似タルヲ以テ(多數ノ動物ヲ幻視シ譫妄ハ淫靡ナルモアレモ)主トシテ驚異性内容ニシテ且不眠、顛振アリ)又莫兒比涅中毒ノ顛振譫妄ニ稱スベシ其他(第二三日ニハ)麻疹疹ヲ發シ瞳孔ニハ調節ノ痿弱左右不均アリ複視アリ腸胃症(下利嘔吐)モアリ重症ニ在リテハ禁斷症狀及飢乏症狀ハ危險ナル心臟薄弱呼吸薄弱虛脫昏睡ヲ致シテ莫兒比涅ヲ投ズルノ救生回死ノ爲ニ已ムベカラザルヲアリ中毒證候、禁斷證候(ニシテ精神原障礙タルモノ)不食、神經衰弱等ハ禁斷療方後猶長ク續存シテ數月ニモ及ブヲ屢ナリ

(丁) 預後

預後ハ頗ル艱重ナリ其重キ痼疾トナリ以テ(慢性腎臟炎ニテ)死ニ至ルモノ多キニアラズ莫兒比涅ヲ禁斷スルノ方モ重キ身體症(脊髓癆、肝病)ノ合併ナクバ之ヲ推行スルヲ難カラザレモ而モ其常ニ反復シテ已マザルヤ途ニ其命ヲ促スニ至ルヲ極メテ多ク莫兒比涅中毒家ノ四分之一以上ハ永ク其毒ヲ禁絶スル能ハズト云フ又莫兒比涅中

毒家ニ在リテ危險ナルハ他ノ類劑以テ之ニ代用シ又ハ併用スルヲナリ酒類ヲ禁斷症狀ヲ輕クスル爲ニ用ヒテ酒精中毒トナルヲ少ナカラズ古加乙涅ヲ主トシ抱水くるらる、依的兒、嚙囉仿謨亦之ニ同シ

(戊) 診斷

診斷ハ身體證候(瞳孔縮小、食思缺亡、榮養障礙)注射ノ殘痕(光輝アル卵圓形ノ創痕、疣狀硬結)又ハ潰瘍(精神狀態ノ轉變)注射後ノ新銳、作能力增加、感應高揚ハ幾ナラズシテ疲憊、弛靡、憂鬱トナル)ニヨリ其原因ヲ確知スルニハ既往症ニヨルベシ尿中莫兒比涅ノ檢明ニ付キテハ現時猶ホ一定說ナク其一部ハ尿中ニ分解セズシテ入ルモノ、如ク而モ動物體中ニハ分解產物ニシテ莫兒比涅中毒ト類似ノ症ヲ發スルモノアルガ如シ故ニ莫兒比涅中毒ナルヲ確知スルハ之ヲ隔離スルノ後ニアリテ禁斷證候ノ起ルト不トハ明ニ能ク之ヲ決スベシ

(己) 治法

莫兒比涅中毒ノ治法ハ醫家監督ノ下ニ其藥毒ヲ禁斷スルニアリ其然カスルヲ得ザルハ不治ノ極メテ疼痛アル疾病ニシテ莫兒比涅治療ノ已ムベカラザル時ニアリ蓋シ此ノ如キ時ニ在リテハ莫兒比涅中毒ハ一微恙ニ過ギザレバナリ



患者ガ能ク自ラ斯毒ヲ完全ニ持續ニ脱習スルヲ得ルハ絶テ無クシテ極メテ希ニア  
ルヲナレバ禁斷ノ實効ヲ成サントスルニハ必ズ患者ヲ擧ゲテ醫士ノ手ニ委テ彼毒  
ヲ絶テ嚴禁スルヲ得ベキノ地ニ置クベシ

莫兒比涅禁斷方ニニアリ一ハ急卒禁斷方ニシテ一ハ漸次禁斷方ナリ急卒禁斷方ト  
ハ莫兒比涅ノ常習量ヨリ一時ニ之ヲ盡ク止メ漸次禁斷方ハ次第ニ其量ヲ減ジ又ハ  
間歇ヲ長クシテ以テ注射ヲ全ク止ムルニ至ルナリ二方ニ大ニ之ヲ主張スル人ア  
リ第一方（れうんすたん氏）ニテハ禁斷症狀急ニ起リ譫妄ヲ致シ重症虚脱ノ虞ヲナス  
トモアレバ其症狀ハ數日内ニ終リ第二方（ふるかるど氏）ニハ症狀ノ發スルヲ徐ニ其  
去ルモ亦遅々タリ而シテ禁斷症狀ノ長キハ正ニ治方推行ヲ難クスル所以ノモノト  
ナルナリ是ニ於テカ又折衷方アリ（えるれんまいえる氏）第一方ノ危険ト第二方ノ弊  
トヲ併セテ之ヲ避ケンガ爲ニ二者ノ間ヲ行クモノナリ（らふとえびんぐ氏）言ニ  
曰ク莫兒比涅中毒家ヲ治スルニハ先ヅ存在極小量（即患者ガ堪勝スベキ一日ノ最小  
用量ヲ定メ其人ハ大抵必要ヨリモ多量ヲ用ヒ居ルモノナレバ最初ノ減量ハ頗ル之  
ヲ大ニシ）從前一日量ノ二分一又ハ三分一其ヨリ後慎重シテ十日乃至二十日ニ其量  
ヲ零ニ下スベシト

莫兒比涅禁斷ノ治療ハ常ニ醫師ノヨク長ク注意スベキ所ニシテ殊ニ脈ト心トニ意  
ヲ用ヒ虚脱ノ虞アラバ直ニ興奮劑（灌水、感傳電氣筆）又ハ芥子泥ニテ強ク皮膚ヲ刺戟  
シ依的兒又ハ龍腦ノ注射（ぶんし酒、しんぱん酒）ヲ處スベシ危急ノ際ニハ莫兒比涅注  
射ニテ重症ヲ却クルニ躊躇スルヲ勿レ頑固ナル不穩不眠アラバ頭上水罌（微温浴、臭  
剝（三〇）加阿片）ヲ用ヒ時トシテ抱水あみれん、ひぶのんヲ用フ抱水格魯刺兒ハ用フベ  
カラズ種々ノ疼痛ニハ寒冷ヲ局所ニ施シテ効ヲ奏スベク嘔吐ハ氷丸ト粥糞法トヲ  
施シ裏急後重下痢ハ微温灌注肛門坐藥加菴蓐ニテ和ラグベシ

禁斷症狀ヲ輕クセンガ爲ニ莫兒比涅ノ注射ニ代フルニ其内服ヲ以テシ又ハ鹽酸こ  
でいん注射、水製阿片越幾斯注射、阿片越幾斯内服ニテ補填スルノ法アリ近時大ニ賞  
揚サル、古加乙涅ハ莫兒比涅禁斷症ヲ減ズレバ其効アル實ニ少時ニシテ且後來莫  
兒比涅兼古加乙涅中毒ヲ起スノ虞アリ故ニ之ヲ用スル頗ル不可ナリ近時別ニ又硝  
酸儼里設林（すばるていん）ヲ用ルモノアレバ實驗未ダ足ラズ此等處治ニ比シ緊要  
ナルハ藤臥滋食肉ヲ嫌フモノ故牛乳加こんに（く酒殊ニ宜シ）注射後爽快時ノ食事、赤  
酒（べすと、まふ）丁幾、列氏二十八度ノ浴ハ禁斷ノ症狀ヲ減弱スルナリ  
禁斷症狀ハ急卒廢用ノルニハ數日ニシテ止ミ漸徐廢用ノルニハ數週數月ニシテ止



ム食思復シ體重増シ睡眠ハ初メハ藥方浴方ニテ後ニハ自ラ來リ患者ハ漸ク強健ト新銳トヲ覺フ而レモ莫兒比涅中毒ノ虞ハ之ヲ以テ止ムニアラズ莫兒比涅脱習後數月又數年ノ後卒然多クハ外因アリテ身體ノ不康寧莫兒比涅ノ一回注射(又ハ從前ノ境涯過激ノ業作ニ復スルキ)莫兒比涅ノ傾好ノ已ムベカラザルコアリサレバ莫兒比涅中毒家ハ少ナクモ一年間ハ家人ナリ朋友ナリ看護人ナリヨリ之ヲ守視シテ惡習ノ再發セザルヲ謀ラザルベカラズ殊ニ醫ニシテ此病アリ將ニ治セントスルモノニハ決シテ其自ラ注射スルコヲ禁スベキナリ是レ危險再迫ノ機ナレバナリ

第十五 古加乙涅中毒狂 (Ocanismus.)

(甲) 總説

古加乙涅中毒狂ハ莫兒比涅中毒ニ續發シ屢其ト合併シ來ルモノナリ蓋シ古加乙涅ハ莫兒比涅ノ不快ナル禁斷症狀ヲ除キテ且心身ヲ開爽ニスルガ爲ニ不幸ニモ其用大ニ弘マリタレバナリ聞ク西洋ニ於テハ此醇症ナク(莫兒比涅中毒ヲ兼テ)此症ハカノ產地タル白露ニ多キコト猶ホ阿片中毒ノ支那ニ多キガ如シト云フ

(乙) 證候

(一)精神證候 古加乙涅ハ少量ナレバ精神機能ノ興發ヲ起シ人ヲシテ作能多ク堪勝

性ナラシムルモ之ヲ廢スレバ甚キ不快不安閉急心悸卒倒等アリテ長用セザルベカラザルヲ致ス是レ長續性ノ神經興奮狀態ニシテ輕キ意想奔逸アリ精神業作ヲナス能ハズ氣力衰へ健忘發リ五官ニハ妄覺アリ殊ニ幻視多ク(小動物小器具ヲ多數ニ)幻觸幻聽モアリ其内容ハ主ニ驚異性ナリ又追跡妄想嫉妬妄想アリテ按拒行爲ヲ致スアリ要スルニ其狀甚中酒狂ニ似タル所アリ

(二)身體證候ニテハ體力遽ニ衰へ羸瘦甚ク睡眠殆ト廢シ食思缺乏シ顔色蒼白態度弛靡瞳孔ハ大ニ開キ歩行確ナラズ運動機官ニハ多少高度ノ失節運動アリ時ニハ癩癩狀痙攣ヲモ起シ皮膚域ニ於テハ感覺過敏感覺倒錯アリ(皮上蝨アリ疥癬蟲アリ)脈管系統ニ於テハ脈數血壓ノ増加アリ粘膜ニハ分泌減却シ尿水亦減ジ甚キハ閉止シ次グニ多尿ヲ以テスルアリト云フ(Overdiuresis) 時ニ廢劑後數時ニ起リ數週數月間持久スト云フ

(丙) 預後

古加乙涅中毒ハ醫治ヲ受ケザレバ早ク心身ノ荒墜ヲ來タシ易ク其預後ハ莫兒比涅中毒ヨリモ惡シ、之ヲ禁斷スルハ莫兒比涅ヲ禁斷スルノ難キガ如クナラザレモ之ヲ廢用スルノ後急性症狀ハ止ムモ其精神變化(性質ノ衰弱妄想)ハ猶ホ殘存シテ再發



ヲナスコ最モ多ク殊ニ莫兒比涅ト併用セシトニ然リ

(丁) 治法

治法ハ速ニ斯毒ヲ禁斷スルニアリ酒類長浴通常催眠劑ハ兼用シテ効アリ心動作ニハ注意スルヲ要ス莫兒比涅兼古加乙涅中毒ニ在リテハ治方ハ當ニ莫兒比涅中毒ト同カルベク先ヅ古加乙涅ヲ禁斷シ然後莫兒比涅ニ及ブベシ古加乙涅中毒モ亦患者ノ能ク自ラ救フベキ所ノモノニアラズ

抱水格魯刺兒濫用後ノ精神病 (Inescin nach Chloralhydratmissbrauch.)

總說 抱水格魯刺兒ハ慣習ヲナスコ莫兒比涅ノ如クニ早カラズ又多カラザレド長ク之ヲ持續濫用スレバあるこほる及ビ阿片ニ於ケルガ如ク妄嗜症ヲ喚起スルモノナリ

證候 精神證候ニハ意思ノ障礙風儀上ノ變質ヲ致シ精神力爲ニ大ニ減却シ氣力消耗シ之ニヨリテ沈鬱憂悶心窩ニ心氣性感覺アルニ至ル強迫觀念アルモノナラバソハ其濫用以前ヨリモ増劇シ臟躁家神經衰弱家ハ其濫用後益不穩興奮性トナリ劇キ苦悶ヲ呈シ甚キハ奪乏及ビ妄覺アル妄想ヲ致スコアリ禁斷方ノ際ニハ妄想狂ヲモ見タルコアリト云フ

身體障礙中ニテハ不眠アリ血管麻痺性障礙アリ(殊ニ頭部及ビ頭部神經節ニ於テ)發疹ノ傾向アリ發黃アリ腸胃障礙アリ食思缺亡アリ又種々ノ皮膚病(紅斑濕疹壞疽)爪甲ノ變質アリ全身ノ不穩四肢ノ疼痛アリ希ニハ粘膜口咽喉ノ痲衝下痢羸瘦甚キニ數食症アリ小便閉アリ著キ脈搏ノ促進遲滯アリ頭振アリ癲癩性痙攣アリ下肢時ニ四肢ノ麻痺ヲ見タリト云フ

第十六 中鉛狂(鉛中毒狂 Psychopathia saturnina.)

(甲) 總說

中鉛狂ニハ二種アリ一ハ速ニ經過シ去リ一ハ持長シテ遂ニ或ハ死亡ニ至ル共ニ一箇獨立ノ病トシテ急卒又ハ漸次ニ發シ或ハ他病ニ繼發スルモノナリ

(乙) 原因

中鉛狂ノ原因ニ關シテハ數說アリ或ハ癲癩發作ノ直前又ハ其間ニ排尿ノ著ク減ズルヨリ推シテ此病機ノ尿毒症ニ似タルヲ稱ヘ(トリスラベ氏)或ハ腦貧血ヲ以テ中鉛狂ノ搖擲昏睡ノ原トシ或ハ鉛ノ腦髓ニ沈着シテ血管及ビ毛細管ノ平滑筋纖維ヲ興奮シ以テ貧血ヲ致スニヨルト云ヒ(スミゼンすたいん氏)或ハ之ヲ水腫ニ歸シ鉛ノ爲ニ尿通減シ血管ノ側壓増スガ爲ニ腦ノ水腫狀態(試驗上證明セシ)水分増加ヲ致シ腦髓毛



細管ノ之ニヨリテ壓搾セラル、ガ爲ニ然リト云フ(Haber氏)水腫モナク貧血モナ  
キモノニハ尿成分尿素、加里鹽類ノ血液ニ逆歸スルヲ以テ搖擗ノ原トシ或ハ之ヲ以  
テ鉛ノ腦髓ナル諸中樞ヲ興奮セシムルニ歸セリ

(丙) 證候

前驅症ノアルヲモナキヲモアリ若之アラバ尋常神明性障礙ニシテ劇頭痛、眩運、耳鳴、  
不眠又ハ叙智意思ノ輕障礙タリ

本症狀ハ主ニ譫妄、昏睡、搖擗ノ三者アリ譫妄狀ニテハ意想奔逸、錯亂ニシテ幻視、幻  
聽アリ全能靜穩ナルモノアリ或ハ發作狀ニ躁暴ニシテ批擻性ノ舉動アリ叫喚奔騰  
蔚中屋中ニ安居セザルモノアリ昏睡狀ハ他ノ中鉛症狀アリシ後、一二日間持續シ  
閉目動カズ劇聲之ヲ喚起セバ纔ニ目ヲ開キ忽又昏憤狀トナルモノニシテ或ハ治シ  
或ハ譫妄搖擗ヲ起シテ終ニ死ニ至ル搖擗狀ハ此二者アリテ後ニ發シ其狀尋常ノ  
癲癇又子癇ノ變縮ニ似タリ急速相ヒ累承シテ五乃至二十分間持續シ發作中ト發作  
後トニハ全ク無意識ナリ

(丁) 預後

搖擗發作ノ強弱ト多少トニ關シ昏睡ノ長短ニ關シ發作少ナク長ク弱キハ預後ヨロ

シ死亡ハ凡ニ割三分ニ居ルト云フ

(戊) 治法

治方ハ對症ノミ

第六卷 機質性精神病ノ論

機質性精神病ハ精神病ト腦病トノ推移ヲナスモノニシテ其腦病トハ精神障礙ノ主  
專ナルニテ區別スルノミ而シテ其精神障礙ハ他ノ精神病ニ於ケルガ如ク獨立ノ障  
礙ニアラズ解剖機轉ノ強弱廣狹ニ左右セラル、モノニシテ心理上ノ發育及ビ尋常  
精神病ノ經過ヲナサズ其證候ハ深重ナル腦髓病機アリテ精神機官ノ侵犯ヲ被ムル  
ヨリ出デ此病機ノ通例、進行性ナルヲ以テ其病機ノ生命、中樞ニ推及セザル以上ハ精  
神機官ノ障礙次第ニ増シテ遂ニ均平スベカラザルニ至ル

彼病機ハ又腦皮質ノ域ヲ踰越シ皮質下中樞及ビ皮質下神經路ヲモ犯スモノナレバ  
病態モ精神及ビ精神運動症狀ノミニ限ラズ之ト同價對等ノ症狀トシテ運動障礙、感  
覺障礙、血管運動障礙アリ



### 第十七 急性譫妄 (Delirium acutum.)

#### (甲) 總説

急性譫妄トハ其較明ナル證候及ビ經過ニ從ヒテ名ツケタルノ重症腦病ニシテ多クハ死亡ニ轉歸シ運動ノ深障礙心身安康ノ深障礙ノ他精神障礙ヲ以テ主要證狀トスルモノナリ而シテ解屍ノ際必ズ肉眼ニテモ識別スベキ程ノ所視ナクンバアラズ(常同ニハアラザルモ)

#### (乙) 解剖

之ヲ解視スレバ腦髓及ビ其血管膜ニ血液過溢アリテ多クハ脊髓ニモ延及ス然レモ其充血ハ屢臨終時ノ水腫性排泄ノ爲ニ掩蔽セラル、1アリ解視ノ全態ハ中樞機官ノ靜脈性鬱血ナリ腦髓多クハ腫起挺出シ腦皮質腫脹スルモノ、如ク薄腦膜中ノ大血管ニ沿ヒ屢白條アリ恐ラクハ血管鞘中ニ淋巴鬱滯シテ然ルナリ  
血液鬱滯ノ徵候ハ又血球ノ數多遊出スルヲ致シ顯微鏡ニテ検査スレバ淋巴鞘中ニハ白血球ノ充盈填塞スルアリ赤血球ノ之ニ混ズルモノ亦稀ナラズ所々ノ毛細管ニ血管外出血ヲ致スコサヘアリ淋巴鬱滯ハ一ハ血管鞘ヲ通ジテ薄腦膜ノ淋巴場ニ及ビ一ハだゞてるす氏液細胞網ニモ神經節周場ニサヘモ及ブ神經節細胞ニハ屢溷濁

性腫脹アリ或ハ顱骨肥厚アリ(導血管ノ狹隘)或ハ頸靜脈孔ノ異常狹隘アリ  
頭顱以外ノ機官ニテハ屢肺ニ血墜アリ心臟弛解シ心筋脆弱薄色ニシテ脂肪性變質又ハ微粒性變質ヲナシ血液著ク暗色稀薄トナル1アリ2るすとねる氏ハ隨意骨間筋ノ微粒狀蠟狀ニ變質スル1猶室扶斯等重症急性全身病ノ如クナルヲ見2じるりい氏ハ激越セル患者ニテ肺ノ脂肪栓ヲ見タリト云フ

#### (丙) 原因

疾病ノ原因タルモノ一ナラザレモ皆直ニ害ヲ腦髓ニナスモノナリ此疾ハ男女ヲ齊犯シテ強年ニ多ク(三十九乃至四十七歳。女子二十三人ニシテ年齢廿七乃至四十六歳ナリキ)之ガ一時ノ誘因トナルハ感動、酒荒精神ノ劇勞、火熱等ナレモ之ニ比シテ甚緊要ナルハ間接ノ素因ニシテ生業ノ爲ニ心身ノ過勞スル、多年ノ勞苦過飲衣食ノ計ヲナス榮養ノ不充分ナル分娩疾病ノ身體ヲ薄弱ニスル、經期ノ機轉アル等即是ナリ又頭傷中囑腦性合併症アル質扶斯幼時ノ腦髓發育不全、又ハ精神病アリテ其殘跡ノ分明ナルモノアリ此ノ如キモノニハ屢顱頂ノ顱骨肥厚、薄腦膜ノ慢性溷濁及ビ肥厚、腦皮質ノ局所萎縮アルヲ見ルナリ之ニ比スレバ又更ニ緊要ナルハ遺傳ニ出ヅル神經病ノ素性ニシテ感情上殊ニ血管運動上殊ニ刺激性ナルモノナリ







起ラントスルヲ前知シ刺戟性激越性トナリ屢又危懼性嗜唸性ニシテ劇苦悶アリ精神制止ノ甚キ一時或ハ昏迷ニ至ルコアリテ屢之ヲ痛ムコアリ他覺上ニハ衝逆症狀アリ面貌ノ苦悶錯亂ヲ表シ瞳孔縮小シ歩行確ナラズ蕩搖シ易ク睡安カラズシテ屢驚起アリ或ハ眠ラズ光響ニ對スル感受性増進アリ時トシテハ又嘔吐アリ病頂ハ急卒ニ發來シテ風雨遮ニ至ルガ如ク其來ルヤ劇キ上衝症狀ヲ以テス意識ハ沉深夢狀ノ如ク譫妄躁暴次第ニ起ルアリ其病狀初メハ混淆性躁暴狂又ハ憤怒性躁暴狂(殊ニ之ヲ起セシ原因ノ)ニ隸シ若シ夫レ重キ意識障礙アリ精神機制ノ鬆放トナリ衝動性性慾狀ナル運動急迫ノ專ナルアラバ其狀亂雜ナル譫妄ニ似其運動ハ強迫性ニ機質上ヨリ發スルモノ、如シ是レ衝逆ノ劇ク意識ノ障礙深キ強劇ナル精神上及ビ精神運動性刺戟ノアルヲ表スルナリ其觀念ノ經過ハ極メテ急促ニシテ錯亂症ヲ致シ然ラザルモ類音ニ從ヒテ之ヲ聯合アルノミ其譫妄ハ極メテ紛雜ニシテ興奮ノ甚キ片離雜ノ片言半語又ハ叫聲ニ發スルノミ考慮ノ聯屬ハ常ニ離裂シテ而モ精神運動性急迫ノ持續スルガ爲ニ或ハ一時、音誦如話症ヲ致ス

譫妄ハ主ニ危懼性、驚異性ニシテ多クハ世界ノ荒敗、萬物ノ滅亡、死亡又ハ中毒ノコトヲ内容ニシ諸物ノ我ニ向ヒテ墮倒シ焚燒シ吾身ノ其灰燼中ニ埋沒セラルベキヲ見吾

身決シテ此世ニ在ラズ吾身決シテ存在セズト信ズ本人意識ノ滅却或ハ又卒然經過性ニ誇大妄想ノ併發スルコアリ殊ニ屢アルハ血液幻視及ビ火燄幻視ナリ運動上反應症狀トシテハ己ヲ脅嚇スル妖魔ヲ驅斥セントスルノ舉止アリ精神上ニ起リシモノナレト意識ノ深ク障礙セラレ(之ト附隨スル)筋覺及ビ運動直觀ノ缺乏スルガ爲ニ其動作ハ一種目的ナク強迫性ニシテ準確ナラズモノナリ又夙ニ精神運動中樞ノ刺戟症狀ノ起ルアリ故ナク身ヲ投ゲ足ニテ頓シ頭ヲ枕ニ穿テ口ニテ鼓吹シ鼻息シ瘡瘻狀ニ呼吸シ其次益急促ナルノ狀ヲナス此ノ如キモノハ猶多少ノ意思アルガ如クナレト其後ニ及ベバ又皮質下中樞ノ刺戟症狀ヲ起シ齟齬、面癩、斜視、牙關緊急、鼻息瘳、四肢ノ攣縮、突擊、轉動ヨリ全身ノ緊張性及ビ間代性瘳攣アリ、言語障礙モ起リテ吃シ、詢シ(運動失節、筋肉作用不全及ビ口腔乾渴ノ爲)鼻音ヲ帶ブ(口蓋帆ノ痿弱ノ爲)反射興奮性ハ概シテ亢進シ其身ヲ突擊シ轉動スルハ一ハ之ニヨリテナリ其身體ヲ執フルノミニシテ全身ノ搖擗ヲ致スコト猶ホ恐水病者又ハすどりきに、ぬ中毒者ニ於ケルガ如ク嚥下作用亦甚障礙セラレテ食物ハ瀰泄シ吐出セラル若シ反動興奮性ノ亢進ナクバ飲食ニハ妨ゲナク又一時、牙關緊急アリ被毒妄想ヨリ齒ヲ相切スルコアリ皮膚感覺及ビ五官感覺ハ多クハ亢進シ睡眠ハ全ク無ク短キ半醒半睡狀態ニシテ數



度ノ驚起アリ體温ハ病初ヨリ昇騰スルヲ多ク然ラザルモ疾病増劇時ニハ増スモノナリ其度ハ三十八乃至三十九ノ間ニ在ルヲアリ四十乃至四十一度或ハ之ヨリ上ルヲ稀ナラズ温度ノ行歩ハ甚ク上下シ不整ナリ

榮養ハ熱モナク食モ充分ナレモ急ニ廢シテ數日内ニ脂肪層亡ビ活態ヲ失ヒ唇及ビ舌ハ早ク既ニ乾燥シ口腔ハ煤色ノ苔ヲ被フリ脈ハ小軟數多クハ一百以上トナリ其病狀ハ無氣力委頓ニシテ心臟衰弱ノ徵及ビ肺血墜症ノ傾向アリ面上從來充血性ナリシ者蒼白トナリ又時ニ膚蒼ヲ呈シ餘命猶長クアラバ多クハ紫斑、皮下溢血、痔瘡ヲ致ス涎潮モ稀ナラズ病初ニ大抵之ナキヲナキハ便秘ナリ尿ニハ屢蛋白アリ

經過中常ニ之アルハ數時數日間ノ寛解狀態ナリ其間ニハ譫妄ハ消却シ又ハ批正セラレ意識ハ清明ニ開駁シ體温下リテ或ハ尋常トナリ運動性刺戟狀止ミ患者ハ著ク清明トナリ輕ク昏迷性ニシテ單ニ虚脱セル者ノ如ク或ハ頭痛ヲ訴フルニ過キズシテ恢復ニ向フモノ、如シ然レモ寛解狀態ノ益深ク益長クシテ終ニ回復ニ至ルヲ稀ニシテ其輕快ハ多クハ假ニシテ之ニ尋グニ益強劇ナル増進狀態ヲ以テス

其後ノ經過ハ衝逆性増劇狀態ト虚脱狀ノ寛解狀態トノ交承ニシテ患者ノ氣力ハ漸ク消殺シ其病益委頓ノ性質ヲ取ルナリ充血說ニヨレバ初メハ能動性衝逆性腦髓刺

戟症狀アリシモノ終ニ滲漏性所動性充血トナリ昏迷退キテ昏慣來リ運動性刺戟症狀去リテ運動失節筋肉作用不全、痿弱、摸索理線不確ナル撫按拭摩、顔面兩手ノ顫振、嘔下困難等之ニ代リ躁劇ナル譫妄ハ嗜啞性トナリ瞳孔ノ從來多クハ狹縮止ミテ開大シ其反應ハ遲鈍トナリ眼球及ビ皮膚ニハ感覺脱失アリ兩頰ハ淡白ニシテ膚蒼ヲ帶ビ心音ハ濁リ脈ハ益軟數百五十搏又ハ以上ニモ至ルトナリ患者ハ終ニ虚脱ニ陥リ皮上ニハ粘稠ノ汗ヲ被ヒ痔瘡起リ肺血墜症發シ體温ハ下リ所謂虚脱温トナリテ後死戰ニ至リ又時ニ四十度ニ上リ或ハ此ニ過グルヲアリ

死亡ハ深重ナル昏慣狀態ニテ心搏ノ止ムガ爲ニ來リ其前ニハ多クハ猶ホ一タビ衝逆症狀アル増劇狀態ノ存スルアリ

(己) 持續

發病ヨリ死亡ニ至ルハ十日以下ナルヲ少ナク二十一日以上ナルヲ稀ナリ若シ命アラバ數週乃至數月ノ後ニ回復シ而モ持續性輕度ニテモノ精神衰弱大ナル感情興奮性ヲナサルモノナキガ如シ人或ハ續發癡狂ニ轉歸セルヲ見タリト云フ

(庚) 預後

大都宜カラズ女子ニハ猶幸好ナリ(くらふとえびんく氏曰ク)四十五症中二十六ハ死



シ其中男子二十二人ニテ死セシハ十五人、女子二十三人ニテ死セシハ十一人ナリト  
殊ニ凶悪ナルハ其慢性中酒ノ地ニ發セシモノナリ其症狀ヨリ云ハ、發育ノ急ナル  
モノ、暴ナルモノ、意識障礙及ビ錯亂ノ甚キモノ、運動性刺戟症狀ノ劇キモノ、其發スル  
部域廣ク、其發スル時期早キモノ、全身障礙ノ著キモノ、不眠症ノ頑固ナルモノ、其度ニ  
從ヒ益其預後ヨカラズ深長ナル寛解狀態ナキモノ凶徵ニシテ持久ノ畏食症モ亦然リ  
熱ハ確乎タル繩尺トナラザレバ四十度又之ニ過ギタル熱並ビニ虛脫溫度ハ決シテ  
惡候ニシテ脈ノ久キ間百以上ナルモ然リ

(辛) 診別

此症ハ(無經驗ノ醫師ハ)躁暴狂ト誤リ易ク或ハ又頭室扶斯トテ曖昧ナル診斷ヲ下サ  
ル、モノニシテ之ヲ能ク早ク鑒識スルハ極メテ緊要ナリ  
躁暴狂トノ區別ニハ其重キ(當時猶不明ナルモ)中樞疾病ヲ以テ初マリ甚キ意識障礙  
アリ病初ヨリ錯亂アリテ而モソハ意想奔逸ノ爲ニ起ルニアラズ運動性刺戟症狀ニ  
シテ精神上ヨリスルガ如クナラズ皮質域ノミニ發セズ皮質下中樞モ之ニ關與スル  
モノアリ爾後ニ至リテハ深ク全身ノ安康ヲ害ナヒ熱ヲ發シ寛解狀態ノ清明ニ迄モ  
至ルベキモノト意識ノ深障礙、精神運動性刺戟症狀アル増劇時トノ交換相承アルハ

其診斷ヲシテ疑ナカラシム  
自發性腦頂面膜炎ト誤マルヲアリ而レモ此病ハ多ク男子ニ發シ其發スルヲ極メ  
テ急ニシテ初期ニハ寒戰多ク昏憤夙ニ發シ項瘰ノ症狀アリ全身感覺過敏アリ劇キ  
搖擗アリ經過中寛解狀態ノ較明ナラスヲ以テ區別ヲナスニ足レリ

(壬) 治法

刺戟期ニハ水囊、微温浴、耳後蛭子(慎ミ用)皮膚導引、腸中導引ヲ用ヒテ充血ヲ防クベク  
阿片ハ効ナシ抱水格魯刺兒ハ用フルヲナカレ。ばるゝるで、ひと、ひよすちんは猶可ナ  
リ莫兒比涅ノ小量(〇一乃至〇一五)ヲ一日數回注射スルハ精神刺戟症狀並ビニ  
躁擾動行ヲ減シ經過ヲ短クス(殊ニ反對興奮性ノ際  
礙アル者ニ於テ然リ)そりうらと氏ノえるごちん注射  
亦効多シ(其一瓦ヲ六瓦ノ蒸餾水ニ融シ之ヲ一日三回ニ用フ)其他、絶對ニ安休ニシ、光  
線ヲ蔽遮スベク食物ノナルベク強壯ニシテ刺戟セザルモノ(卵乳、肉羹汁)ヲ給スベ  
シ  
虚脫期ニハ赤酒、機那ヲ投ジ心動不充分ニシテ虚脫症狀アラバしんばん、依的兒ヲ授  
ケ危急ノ際ニハ龍腦、麝香ヲ試ムベシ膀胱直腸ノ閉止、痔瘡等ハ注目ヲ要スルモノナ  
リ



第十八 麻痺狂 (Dementia paralytica)

(甲) 總説

麻痺狂ハ臨牀上ヨリ之ガ定義ヲ下セバ通例慢性ノ腦病ニシテ血管運動上精神上及  
 ビ運動上ノ機能障礙アリ經過ノ進行性ニシテ平均二三年間持續シ殆ト常ニ死亡ニ  
 轉歸スルモノナリ

精神障礙ハ叡智作能全體ノ進行性減退乃至失神性癡狂ノ最モ甚キヲ呈スルニ在リ  
 之ニ基キテ鬱狂、躁狂、躁暴狂、誇大妄想、微小妄想、追跡妄想、心氣妄想、昏迷等ノ状態ノ種  
 種變易スルアリ

運動障礙ハ運動ノ調整障礙ノ全身ニ來リ轉換性ニシテ概シテ進行性ニ遂ニハ完全  
 ノ調整運動不能トナルモノナリ其間又種種ノ筋肉ノ作用不全、痿弱、麻痺、卒中樣發作、  
 癱痲樣發作等アリ

血管運動障礙ハ血管運動神經ノ進行性痿弱乃至麻痺ニシテ之ニ由リテ經過性ニ眩  
 運發作、上衝發作、躁暴發作等ヲ來スアリ

解視上ノ見解ヨリハ或ハ慢性腦膜炎トシ(Alzheimer's chronic Meningitis)或ハ腦萎縮トシ(Atrophie cerebri)或ハ皮質全般ノ腦炎トシ(Corticis cerebri generalis Inflammation)或ハ慢性蔓延性腦皮質腦膜炎トシ(Chronic diffuse Encephalomyelitis)或ハ慢性延性腦皮質腦膜炎トシ(Chronic diffuse Encephalomyelitis)かゝるめいる

かるめいるノ説ハ最モ總括性ニシテ標準性麻痺狂ノ症ニ當ルモノナルベシ臨牀上  
 ノ見解ヨリハ有麻痺癡狂運動障礙ハ合併症ニアラズシテ其病ノ須要症狀ナレバ此  
 説正カラズ或ハ狂者ノ全身性進行性運動失節、狂者ノ全身性進行性麻痺、麻痺性癱狂、  
 麻痺癡狂ノ稱アリ Dementia paralytica Alzheimer's progressive Bewegungsstörung Paralytisches Irresein

(乙) 解視

解視上ニハ中樞機官ニ種種ノ變化アリラテハ概スルニ一定度迄其病ニ特有ナリト  
 稱スベキナリ之ヲ舉グレバ軟腦膜及ビ腦質ノ慢性蔓延性疾病ニシテ加フルニ脊髄  
 ノ一定變化ヲ以テス顱骨ノ肥厚症、瘤起症ハ時ニ之ヲ見ルアレモ主要ノモノニアラ  
 ズ頭顱全體ノ肥厚ハ後期ニ多ク腦髓萎縮ノ代補性肥大ト稱スベキモノ、如シ腦髓  
 ハ全體ニ萎縮シ腦室弘廓シ腦殊ニ腦半球外層ノ量減ジ皮質ハ染色シ堅緻トナル  
 溝腦膜及ビ腦表面ノ慢性焮衝性變化ハ頸動脈、頰葉及ビ之ニ接近ノ部ノ分布域ニ限  
 リ椎間動脈ノ血管域ニ及ボス極メテ希ナリ其機轉ハ即主ニ前腦ノ慢性蔓延性腦  
 皮質腦膜炎ニシテ或ハ腦膜炎強ク或ハ腦萎縮強キナリ厚腦膜ニハ内厚腦膜炎、血  
 性厚腦膜炎、慢性薄腦膜炎ノ領域ニ付セズ、腦膜血腫アリ或ハ重厚ナル數層ノ硬被ヲ  
 ナシ或ハ柔キ薄紗狀ノ添加ヲナス(多クハ頂部ニアリ)腦膜ハ細胞浸潤ノ爲ニ白色ヲ



帶ビテ混濁シ肥厚シ(大血管ニ傍テ最強シ)時ニ骨板ノ散處スルヲアリ。腦髓ニハ久病  
 症ニテ常ニ皮質萎縮アリ(腦量ハ身長尋常ナルモノニテ九百瓦ニ至ル)廻紋狹マリ或  
 ハ窪然トシテ穿ツ如ク陷キル如ク腦溝膨開ス(殊ニ前頭ニ)或ハ處所薄腦膜ト癒合シ  
 テ物質摧烈ナクハ剝離スベカラズ然レモ腦膜ノ病機ト腦質ノ病機ト其強弱ノ部位  
 ヲ齊フセザルハ此二者ガ互ニ直接ノ關係ナキヲ知ルベキナリ合併症又ハ結果症ト  
 シテ腦皮質ノ軟化(皮質ノ薄層又ハ全層ハ白質ヨリ剝離シ易シ)アリ慢性腦室(殊ニ第  
 四室内膜炎アリ多數著大ノ顆粒ヲ形成スルヲアリ内外腦水腫アリ時トシテハ視神  
 經腺神經ノ灰白變質モアリ(バヒをん氏顆粒ノ甚多キヲ稀ナラズ其末期ニ及ビテハ  
 海腦膜及ビ腦髓ノ水腫アリ)

顯微鏡検査ハ皮質ニ於テ著キ變化アルヲ示シ其脈管大ニ其數ヲ増シ擴張シ。周壁肥  
 厚シ。血管周場擴張シ。血球ノ潛出アリ。血管外膜ニ核増殖アリ。血管ノ新生。填塞ヲモ見  
 ル。神經膠質(即腦髓原質)ニ於テハ慢性脈衝核増殖シ。結締細胞ノ腫脹増殖シ。所謂蜘蛛  
 細胞ノ數多ク發育ヨキモノアリ)アリ。甚キハ硬化ヲモ致スベク。最モ必要ナルハ神經  
 原素ノ變化ナルヲ固ヨリナリ。神經細胞ノ變化ハ或ハ刺戟機轉タリ(核増殖或ハ變質  
 機轉タリ)而シテ其極常ニ乙者タラズンバアラズ細胞體及ビ突起ハ卷縮シ突起ハ尋

常ヨリ數少ク發育アシ、原形質ハ脂肪變質色素變質ノ諸程度ヲ呈シ其極細胞數ハ  
 大ニ減少シ。遂ニハ皮質中機能アル原素ノ殆ド見ルベカラザルニ至ル。神經纖維ノ萎  
 縮ハ細胞ヨリモ甚ク。久病ノ症ニハ(白質ヨリ腦皮質ニ入ル)輻行纖維モ腦表面ノ最外  
 皮質層ニ並行ナル)帶行纖維モ微粒性潰崩又ハ澱粉樣變質ニヨリテ萎縮シ。遂ニハ皮  
 質中ニ神經纖維ノ求ムベカラザルニ至ル。或ハ此纖維潰却ハ腦ノ前部ニ甚シト云ヒ  
 或ハ部域ニ關涉ナシト云フ。或ハ曰ク「血管變化ト纖維消滅トハ必シモ相附隨セス。纖  
 維萎縮ハ麻痺狂ノミニアラズ之ニ類スル老耄狂其他癲癇狂癡狂ニモアリ」ト要スル  
 ニ其萎縮ハ麻痺狂ニ於テ他ノ精神病ヨリモ多ク強ク廣ク見ルナリ。夫レ一方ニハ  
 神經原素ノ萎縮機轉アリ又一方ニハ結締組織ノ強ク増殖スルアルガ故ニ麻痺狂病理  
 ニ於テ二個ノ説明アリ相持シテ下ラザルナリ。一ハ彼ヲ以テ初發トシ。一ハ此ヲ以テ  
 初發トスル。即是ナリ。

腦髓皮質ト同様ノ變化ハ又他ノ腦部ニアリ。半球髓質ニ大抵蔓延性纖維消滅アリ(時  
 トシテ所ニ殘ス所アリ)散處セル變質病竈アリ又ハ一定ノ皮質損處ニ接スル)一定  
 傳達路ノ索ノ如クニ變質スルハ之ヨリモ稀ナリ

又大神經節延髓ノ神經核ニモ變化(硬化ナド)アリる(バヒをん氏ノ說ニ從ヘバ額葉中連



斯核中、時ニ又顔面神經核ノ地方、橄欖體ノ周圍ナドニ見ルベシト云フ  
脊髓ニモ殆ンド皆變化アリウ<sup>す</sup>と云ふ<sup>る</sup>氏初メテ之ヲ精究シタリ肉厚腦膜炎及ビ  
薄腦膜ノ慢性脈衝性變化ハ稀ニアラズ其他主トシテ左ノ二機轉アリ

(イ)後索ヲ上下ニ通シテ灰白變質アリ常ニ<sup>こ</sup>る氏楔狀索ニ最強ク頸部ニテハ此ノ  
ミニ限ルコトアリ

(ロ)側索ノ後片ノ慢性脊髓炎 細胞間質ナル結締織ノ增殖機轉ニシテ細粒細胞ノ  
形成ヲ兼ネ神經纖維ノ萎縮ハナキモノナリ

後者ハ恐ラクハ其傳達路ノ中樞タル運動榮養皮質域ノ殊ニ強キ疾病ヨリ續發性ニ  
生ゼリ(下行性變質?)トスベキナリ其他ニモ散在性變質蔓延性脊髓炎等ノ變化アリ  
末梢神經ニモ亦時ニ變化アルヤ不<sup>未</sup>ダ精究ヲ經ズ近時ノ檢索ニヨレバ麻痺狂ノ後  
期ニシテ脊髓勞又高度ノ筋肉萎縮アルモノニハ末梢神經ニモ變質機轉多シト云フ  
其他ノ機官ニ見ル所ノモノ(肺勞、肺炎、腎楔狀出血等)ハ麻痺狂病機ト直接ノ關係ナケ  
レモ血管粥腫ハ殆常ニ之アリ全身血管變化ノ一分症ト看ルベキナリ

(丙) 原因及ビ發來

麻痺狂ノ原因ニ付キテハ素因アリ誘因アリ素因中ニハ遺傳、年齒、男女、身分、職業ヲ考

フベシ麻痺狂ハ頗ル多キ症ニシテ平均入院者ノ十乃至十二分ハ是ニシテ(而モ此數  
甚異動アリ)現時日ニ益增加スルモノ、如シ(文化進ミ智育盛ナルニ從フト云フ)大都  
府ニハ村落ヨリ割合多シ遺傳ハ麻痺狂ニテハ他ノ精神病ノ如クニ重要ナラズ僅ニ  
凡十五乃至二十分ニ存スルノミ年齒ヨリ云ハ、麻痺狂ハ腦髓完全發育及ビ最大作  
能時ノ腦病ニシテ三十五乃至五十五歲四十歲ニ最多ク三十歲以前六十歲以後ニハ  
稀ナリ(百中四ハ既ニ二十六乃至三十歲ニシテ來ルト云フあるの事 (Arnund)ハ麻痺狂初發  
ニ多キヲ見<sup>す</sup>ミ<sup>り</sup>人<sup>へ</sup>るノ如キハ脊髓ト遺傳(Child)ハ四十四年トス近時ニ至リ漸ク幼者  
ニ多キト合併セルヲ十三歲ノ女兒ニ見<sup>タ</sup>リト云フ)男女ヨリ云ハ、其男子ヲ犯ス<sup>ル</sup>ノ多キ  
女子ノ凡ソ七倍ナリ(子<sup>一</sup>百十三女子十三ノ麻痺狂アリト云フ)而シテ男子ニハ婚セル  
モノニ多ク女子ニハ寡婦ニ多シ男子ニハ高等社會ニ多ク女子ニハ下等社會ニ多シ  
殊ニ此男女ノ差ハ高等社會級中ノ罹病數ニ關シテ較著ニシテ高等地位ノ婦人ノ麻  
痺狂ハ極メテ稀ナリ職業ニテハ酒荒色荒及ビ精神激勞ノ多ク附帶スルモノ精神ノ  
勞動身體ノ勞動ニ過グルモノニ多ク西洋ニテハ士官商人、火工、鐵道官吏、娼妓等ニ多  
シ後天性素因ハ精神及ビ身體過勞、虛脫病、過荒、微毒ヨリ得タルモノナリ其中最重キ  
ヲ微毒トス夫レ微毒ノ麻痺狂ノ素因タル影響ヲナスヤ猶其脊髓勞ニ於ケルガ如ク  
Rieger氏ノ說ニテハ微毒アルモノハ之ナキモノヨリモ麻痺狂ニ病ム<sup>ル</sup>十六七倍ナ



リト云ヒGraf氏ハVernik氏ハうつるねつ病院ノ麻痺狂者ノ四十分ハ嘗テ微毒ニ罹リタリト云ヒゆんでる氏ハ麻痺狂者ニテハ七十五分ニ他種ノ狂者ニハ十八分ニ微毒アリタリト云ヒテ之ヲ微毒ガ血管疾病ヲナスニ歸セリ或ハ曰ク是等比例ニハ麻痺狂ニシテ微毒ノ疑アルモノヲモ容レタリ蓋シ微毒ノ其病發ヲ早クシ經過ヲ促スハアラシ又其他因ト共ニ合併作用スルハアラン言前ノ如キハ統計上ノ假想ニ誤マラルルノミト要スルニ微毒ト麻痺狂トノ關係ハ確乎タリ而モ麻痺狂ノ原因ノ一タルニ過キザルノミ然レモ麻痺狂ヲバ之ト相類スル脊髓勞ト同ク單ニ神經中樞ノ微毒病トシすとりんべる氏ガ説ニテハ又微毒微菌ガ微毒ノ第一期經過後ニ一ノ化學毒ヲ生シStramonium神經系統ノ一部域ニ一種ノ壞敗作用ヲナスト云フガ如キハ抑亦鑿ニ失スル極端説ノミ蓋シ麻痺狂者ニシテ既往症中微毒ナキモノアリ又微毒ニ因スル麻痺狂トテ別種ノ病形ヲナスニアラズ

其他誘因トシテハ酒荒色荒アリ精神及身體ノ過勞アリ之ヨリ稀ナルハ久深ノ感動(憂悶苦慮不安激越)熱ノ害及ビ頭傷ナリ頭傷ニハ其病ノ直ニ繼發スルヲアリ或ハ時經テ後ニ發スルヲアリ故ニ頭傷ハ又素因トナスベキモノナリ女子ニテハ累出難産并ビニ經竭期ニ麻痺狂多シ

(丁) 病理

其原因ニヨレバ素因アリ誘因アリ臨牀上ノ研究ニヨレバ其前期ノ症狀ハ血管運動神經作用ノ障礙タリ解視上ニハ腦髓及ビ腦膜ノ慢性痙衝ノ徵候アリ此三者果シテ如何ノ關係アルヤ麻痺狂ノ機轉ニ於テ先ヅ起ルハ血管運動神經衰弱るびもふしれ及ビ之ニ基ケル充血ナリ酒荒色荒暑熱外傷精神過勞及感動ハ悉ク皆之ガ起ルヲ助ケ其發スルハ殊ニ腦髓自家ノ生理上充溢(即機能上著ク動作)スルノ時ニ於テ容易ナリトス是レ麻痺症ガ殆ト皆頸動脈ノ血管域(人間精神生活ノ最高業作ノ中樞タル額腦)ニ發シ又其殆ト皆腦髓ノ生理上充溢ノ年齡(三十乃至六十歳)ニ起リ專ラ男子ヲ犯ス(生存競争ノ劇キ、腦業務ノ多キ、外傷、暑熱、酒荒、色荒ノ害ヲ受クルヲ多キ是ハ男子ヲ著シ)所以ナリ

神經病性充血ハ腦髓腦膜ノ組織變化ノ發點ニシテ初ニハ先ヅ腦髓及ビ薄腦膜ノ淋巴路ノ鬱滯ヲ致シ膠樣質蛋白質及ビ血球ノ血管壁ヲ通ジテ血管周淋巴場ニ出ヅルヲ致ス此ノ如キモノ、ヨク通過シ出ヅルハ疾病ノ素因タル禍害ノ爲ニ血管壁ニ榮養障礙アリテ之ヲ容易ニスルナリ(其所謂素因タル禍害トハ遺傳素質、微毒、中酒、精神過勞、頭外傷、火熱等衰弱ヲ致スベキノ要素ヲ云フナリ)血管周場中ノ淋巴鬱滯ハだい



てる氏液細胞網ニ及ビ(薄)腦膜ノ淋巴路ハ腦髓ノ淋巴路ト連ルヲ以テ又(薄)腦膜ノ(肥)厚等ヲ致シ(薄)腦膜ノ淋巴路ハ又之ガ爲ニ梗塞シテ腦中ノ淋巴鬱滯ハ増甚ク彼ハ此ノ因トナリ果ハ又因トナリ以テ益甚キヲ加フルアリ又或ハ慢性腦膜炎ノ初發ニシテ腦髓ニ初マリ還流性淋巴鬱滯アルノ症稀ナラズ淋巴鬱滯及ビ之ニ附帶セル組織殊ニ液細胞網ノ(腫)脹ヨリシテ腦膜神經膠質及ビ血管ノ結締組織増生シ膠質ハ硬化シ血管ハ萎縮シ神經原素ハ減却ス

(戊) 證候及ビ經過

麻痺狂ノ證候タル極メテ多端ニシテ之ヲ此ニ盡スベキニアラズ前諸篇中ノ例ニ倣ヒ先ヅ其前ニ經過及ビ證候ノ全態ヲ概論セントス

(一)精神症狀 精神病態ノ大本ハ進行性精神衰弱ノ症狀ニシテ精神諸域ニ存シ殊ニ感動ノ淺薄、執意ノ萎靡、論理及ビ批評ノ薄弱、記憶ノ減退等概スルニ(智)及ビ道義作能ノ弛廢意識ノ深障礙ニテ知ルベキナリ此等ノ虧缺ハ(麻)痺癡狂ノ地上ニ發セル精神病態ニ全然特別ナル標候ヲ與ヘ之ニヨリテ初メハ精神衰弱ノ地ニ在ラヌモノト區別セシメ又事ニヨリテハ運動障礙ノ一時ナキハモ其病種ノ何タルヲ徵スル

ニ足ルナリ

觀念界ニ於ケル障礙

しれぬ氏

管テ麻痺狂者ニテ其精神上本人性ノ漸ク著キ進行

性ノ缺落症狀ヲ呈スルヲ見之ヲ形容シテ曰ク「患者ハ全ク他人トナリ而シテ自ラ之ヲ知ラズ」ト蓋此點ニ於テノ最確最要ノ症狀タルハ

意識ノ(濁)濁ニシテ精神朦朧狀態タリ此狀態タル初ニハ屢一時性開駁アルモ又既ニ一時自家意識ノ缺無トナリ爲ニ精神上存在ノ(聯)貫性ナルベキモノ中絶シ其症ノ進行性ナルヤ患者ハ復(智)智記憶性質ニ受クル夥多ノ障礙及ビ缺落ヲ(識)領セザルニ至ル此意識(濁)濁ハ臨牀上先意識ノ二主域時間及ビ場所ニアリ即時間上及ビ場所上ノ紛迷トナリ患者ノ來ルヲ過早過晚時ニ夜ヲ晝トナシ慣レタル道ニ迷フニ至リ又社會生活ト種々ノ撞突ヲ致シ儀式ニ於テ作法ヲ舛ヘ街上ニ寢衣ヲ穿テ貴客ニ接シテ(箕)踞シ室中ニテ帽ヲ戴クナドノコアリ

意識障礙ニ附起シテ又注意力ノ衰弱アリ患者ハ注意ヲ長ク強ク堅持スル能ハズシテ神明散亂ノ狀態トナリ疲勞シ易クシテ動モスレバ長久ノ弛靡ノ狀態ニ陥キリ從前ノ如ク觀念ヲ(凝)集シ傾注スル能ハザルガ爲ニ精神ヲ勞スルニ堪ヘズ平生慣熟セル業作サヘナスヲ難シ彼ハ又從前ノ如クニ身邊ノモノヲ明確ニ見解セズ其平生ノ



位置勤務ニ於テモ能ク正當ニ處理スルヲ難ク甚キハ全く自辨ズルヲ能ハズ  
 記憶ノ障礙ハ多クハ皆深重ニシテ且殊ニ麻痺狂ニ特異ナル所アリソハ即チ長久過  
 去ノ經歷其再生猶ホ眞ニ稱ヘモ最近時ノ經歷ハ直ニ忘却スルニアリ蓋シ其病初ニ  
 在リテハ外來刺衝ノ領受精確ナラズ茫味夢ノ如クナルガ爲ニ其ノ追想ニ銘スルヲ  
 短暫ナルナラン故ニ患者ハ尋常記憶機轉ニ異リテ新近過去ノ事歴ヲバ忘却スルナ  
 リ彼ハ數日前ニナセシコヲ知ラズ一昨日誰ト散步セシカヲ知ラズ何ノ書翰何ノ事  
 務ヲナスベカリシヲ辨セズ遂ニハ又十五分前ニ何ヲナセシカ日々來訪ノ醫ヲ嘗テ  
 見シコアルカ午飯セシカ來訪人アリシカ盡ク想ヒ起スヲ能ハザルニ至ル其不精當  
 ニシテ健忘性ナル患者ヲシテ時ニ自ラ之ヲ感ジテ些末ノコ迄ヲ筆記シテ自ラ迷フ  
 コナキヲ期セシムルコアリ殊ニ早ク消却スルハ推時ノ能ナリ吾人ガ諸事歴ノ現在  
 コ距ルコ幾干ナルヲ推定スルハ其知覺スル所ヲ精確ナル追想像ノ聯鎖中ニ箝置ス  
 ルニヨルモノナルニ患者ハ發病以來ノ經歷事ヲバ過去ノ事歴中ニ排序スルコ能ハ  
 ズ故ニ某某事件後又ハ入院以後何月ヲ過ギ何年ヲ經ルカヲ明ニセズ遂ニハ今ハ何  
 月何日ナルカ年次ノ幾何ナルカヲ知ラズ彼ニハ實ニ曆日ナシ然ラザル迄モ試ミニ  
 之ヲ言ハシムレバ其大ニ迷ヒ大ニ誤マルヲ見ルナリ

管ニ新事歴ノミナラザルナリ後ニハ必次第ニ遠隔過去ノコヲモ忘却スルニ至ル固  
 有名ハ最モ忘レ易ク數及ビ曆日殊ニ然リ彼レ往事ヲバ内容ニヨリテハ稍ヨク再生  
 スルモ其年月ニ至テハ大ニ之ヲ錯リ誕辰ヲ誤リ我兒ノ名ヲ違ヘ運算確ナラズ(是人  
 及官吏等ニ在リテハ歴甚數  
 明ニシテ且其結果輕カラズ)之ヲ要スルニ最モ熟習セル記憶事ハ概シテ進行性忘却ニ  
 反拒スルモノナレモ其甚キ途ニ己ニ婦アリヤ兒アリヤ嘗テ何ノ職業ヲナセシカ我  
 年齢若干ナルカ住居ハ何レ姓名ハ如何ヲモ辨ゼザルニ至ル  
 或ハ又往往ニシテ全斑ノ健忘ナラズシテ其缺漏ヲナスコアリ其範域タル或ハ大ニ  
 或ハ小ナリ則チ過去ノ事歴中ニ於テ其一定時間ノコヲ記セザルモノヲ云フナリ追  
 想ノ缺落ハ想像ヲ以テ之ヲ補填スルコ頗ル多シ蓋シ實際ノ追想像稀薄トナリ遂ニ  
 又銷殺スルハ正ニ放縱ナル新想像ヲ容ル、ノ地多カラシムル所以ニシテ夢ミシコ  
 讀ミシコ聽キシコ皆之ヲ經歷事トスルノミニアラズ時ニ自ラ作ル所ノ醇然タル想  
 像ヲモ然カスルアリテ大怪異ニ遇ヒ劇戰圖ヲナシ數多ノ古英賢ト親交懇話シ數千  
 年來數多ノ歴史上ノ事件ヲ親驗實歴シタリナド稱シ實際ノ追想ノ極メテ不完全ナ  
 ル之ヲ最近時ノ事トシ三十分前ニ來訪者アリ昨日帝ト食セリナドト稱スカ、ル談  
 話ハ通常ノ問題ヲ以テ之ヲ提起シ之ヲ左右スベク且其際患者ハ初メハ之ヲ言フニ



稍確ナラヌガ如キモ次第ニ其實際ナルガ如クニ證明シ語ルナリ  
 妄想 麻痺狂患者ニハ經歷ニ得タル確乎ノ標準ニシテ外界ヲ辨別判斷スル所以ノ  
 モノナク又眞實ノ事狀ヲ觀察シテ以テ想像ノ虛構スル所ヲ矯正スル所以ノモノナ  
 ク此二者並ビニ漸ヲ以テ銷却ス故ニ彼ガ世界ヲ觀ルヤ事皆其觀念シ冀望シ恐懼ス  
 ル所ニ相當セザルナク宛トシテ夢生活ノ如ク彼ガ身邊彼ガ情景ハ倏忽ニシテ盡ク  
 一變スルヲ見ル蓋シ其異眼ヲ以テ察シ而モ其見ル所ノ色容ノ甚其實ニ副ハザルヲ  
 知覺セザルヲ以テナリ主觀性前提ニヨリテ世界觀ノ全然錯誤スルモノ是レ其機轉  
 ハ即チ妄想ナリ麻痺狂者ノ妄想ガ妄覺狂偏執狂等ノ妄想ト異ナルハ初ヨリシテ麻  
 痺狂ニ特異ナル精神衰弱ノ性質ヲ帶ビタルニアリ妄覺狂偏執狂ニ在リテハ其外界  
 ヲ受領スルノキ之ニ混入スル想像原素ニハ皆相互ニ近密ノ關係アリ又ハ單一ノ系  
 統アルガ故ニ益之ヲ結撰シテ益之ヲ確執スレハ麻痺狂ニ在リテハ種々ノ意想ハ恒  
 同ニアラズ紛然トシテ興起シ甚相抵觸スルモノアルモ更ニ之ヲ省ミズシテ之ヲ類  
 化編列シ復直ニ之ヲ忘却スルナリ故ニ其系統ノ崩解シ全然奇異不可有ノ觀念ノ發  
 スルハ彼ニ在リテハ疾病長續ノ後ニアレハ麻痺狂ニテハ甚早く多クハ妄想アル初  
 ヨリ之アルナリ麻痺狂者ノ妄想ハ當ニ其恒同ナラザルノミナラズ屢内界抵觸ト外

來影響トノ爲ニ絶エズ變化スルモノナリ偏執狂者ニハ(少)ナクモ其初期ニハ(其)系統  
 益豐富トナルモ主要ノ點ハ凡テ同ケレハ麻痺狂者ノ妄想ハ前後大ニ異リテ多ク違  
 フナリ昨日俟タリシモノ今ハ帝トナリ明日ハ又中將トナルガ如ク擬似ノ問題ヲ授  
 ケ又ハ之ヲ簸弄スルキハ數分間ニ其意想ヲ甚キ處ニマデ簸揚スルヲ得ルヲ多シ此  
 ノ如キヲ偏執狂ニモ多少之アレハ甚限制セラレ且精神衰弱ノ甚キ後又ハ劇感動ノ  
 アルキノミ誇大妄想ハ麻痺狂ノ經過中ニ極メテ多キ症狀ナリ然レハ人ノ思フ如ク  
 ニ初發性ナラズ主要ナラズ特異ナラズ其診斷上緊要ニシテ其麻痺狂ノ地ニ發シタ  
 ルヲ知ルベキヲ稀ナラザルハ其精神衰弱ノ地ニ發呈スルヲ以テナリ  
 (イ)麻痺狂者ノ誇大妄想ハ非常ナリ想像性ナリ可有ノ域ヲ大ニ踰越シテ無可有ノ  
 域ニ入り時間場所ノ存在上限界ヲ排却スルモノナリ患者ノ批評ハ荒墜シテ矯  
 正ナク又系統ヲナス能ハズ爲ニ想像ハ大ニ其地ヲ得テ益豐富多ニ益恢廓シ爲ニ考  
 慮ハ直ニ冀望トナリ冀望ハ直ニ實事トナリ其想像ハ勢威鉅大ノ像ヲ惹起シテ底  
 止スル所ナク其形容ト氣勢トハ其處置實施トハ甚ク又愚ニモ一致セザルナリ此  
 ノ如キ患者ハ曰ク『余ハ今日ハ神トナレリ』『天ニ上ルガ爲ニ繩楷ヲ彼處マデ建テ  
 ン』『余ハなばれをんなナリ』『びすまろくナリ』『豊公ナリ』『此三人ノ合一ナリ』『我四



邊ノモノ皆金ナリ皮糠モ金ナリ小便ハ神水ナリ』余ハ金剛石ノ城ニ居リ地球上ニ八方ニ石路ヲ作り其路頭ニ在リテ世界ヲ統御ス』月界ニ至ラントスル爲ニ陰莖ヲ不測ノ長ニ延バシ之ヲ彼ニ振りカケ其上ヲ車ニノリテ赴ク』ナドト稱ス

(五) 麻痺狂者ハ精神薄弱ノ爲ニ其妄想ノ動因ヲ作り之ヲ調整スルヲ知ラズ其妄想ノ無論理ニシテ首尾前後ノ天地程懸隔スルヲ察スル能ハズ

(六) 彼ハ自ら妄想ノ領有ト勢力トニ擅ニスルノミニテ其妄想ノ義ニ於テ動止セントスル正當ノ執意ナシ會此アルモ健忘意識障礙批評荒墜ノ爲メ旁ヨリ之ヲ非トシテ直チニ之ヲ中止セシムルニ足レリ又批評ノ衰弱シテ考慮ノ活潑ナル直ニ之ヲ實事トシテ且人ヲ信ジ易キガ故ニ濫妄ノ妄想ヲバ患者ニ傳施スルヲ難カラズ

(七) 麻痺狂老耄狂ニ多ク存スル症ニハアラザレモ此ノミニアル故診斷上緊要ナルハ原發性誇大妄想ノ微小妄想ト交換スルヲナリ微小妄想モ非常ナル内容ナルヲアリ余ハ侏儒ナリ身長寸ノミ度々死セリ等ノ如シ

誇大妄想ノ内容ハ或ハ其自家身體精神ノ作能力ニ關シ(強健ナリ若シ美シ聲美ナリ力強シ體重シ胸臆鐵ナリ一分千里ヲ走ル飛ブヲ得尿ハ酒矢ハ金諸學ヲ究メ數邦ノ語ニ通ジ詩ヲ作り病ヲ治シ死ヲ起ス)或ハ其位地財產計圖ニ關シ(王侯ナリ上帝ナ

リ諸國ノ勳章ヲ佩ブ世界ヲ統御ス富鉅萬ヲ累ヌ金屋銀屏中ニ居ル飛翔器ヲ作り世界ヲ廻ラン海底電線ヲ濠洲ニ敷カン)又全ク患者ノ教育ノ度社會ノ階級ニヨル時トシテ其殘餘ハ末期癡狂ノキマデ存ス女子ニハ誇大妄想ハ少ナク之アルモ輕穩ニシテ男子ノ如ク非常無可有ノ地ニ至ラズ平常生活事ヲ誇張倍蓰スルニ過キズ面貌ノ美ナルニ誇リ珠玉冠履ノ多キニ伐ルガ如キモノナリ又屢色事ヲ色ヲ帶ビ世ニナキ美兒ヲ生メリ幾度カ雙兒ヲ生メリ日毎ニ分娩スルナド云フノ類是ナリ

心氣性妄想 之モ亦一種異様ニシテ尋常心氣狂ノト異リ意識批評ニ深障礙アルガ爲ニ其非常奇隔ナル狀アルハ固ヨリナリ尋常心氣家ハ可有ノ域中ニ妄想シ麻痺狂者ノ妄想ハ無可有ノ界ニ入ル我身ハ小トナレリ三角トナレリ頭舌ナク臟腑ハ燥枯シ竅孔皆塞テ食フ能ハズ糞スル能ハズ數月間後便ナシ腦ハ一氣泡タルノミ腦ハ腹ニ落タリ腹ニハ電氣充塞ス腦ハ太陽トナリ之ニテ世界ヲ焚キタリ喉頭ハ胃ニ落チ灌腸ニテ腸皆脱シ舌ハ絲ニテ口中ニ懸ルノミ脊椎折レ血ハ青素ニテ毒セラレ

是等妄想ハ一ハ原發性ニ起リ一ハ癡鈍ノ爲ニ實際ニ存スル感覺(感覺脫失等)ヲ誤リ譬フルヨリ生ズルナリ

妄覺 麻痺狂ニハ妄覺ハ頗ル少ナキモノニシテ若之アラバ診斷ノ當不ヲ疑ヒ先ヅ



酒精麻痺ナラズヤト考ヘザルベカラザル程ナリ要スルニ麻痺狂ニハ妄覺ナキモノ多ケレモ亦其著キモノアルコトナキニアラズ麻痺狂ノ標準性ナルモノニハ視官ノ妄覺アリ殊ニ激越状態ニ於テ人ト應對スルニ似テ而モ妄覺ニハアラザルコトアリ病覺ノ有無ニ至リテハ固ヨリ論ヲ須タズ患者屢却テ從前ヨリ強健ナルヲ覺エ然ラザル迄モ其現狀ヲ過去ト比較スルノ能ナキガ故ニ何ヲ以テカ其精神全體ノ荒墜スルヲ知ランヤ然レモ病初ニ於テハ又其病性其後果ヲバ明ニ知ルモノナキニアラズ又不治ノ重症將ニ起ラントスルヲ感ズルコト希ナラズ神經性病患又ハ醇然想像上ノ病患アリテ其病ノ症狀ヲモ辨ゼズシテ病アリト稱スルモノ、如キハ固ヨリ病覺トハ云フベカラズ

感觸界ニ於ケル障礙モ又決シテ觀念界障礙ヨリ輕カラズ麻痺狂ノ初期ニハ刺戟性亢進ノ較明ナルアリ患者ハ感情傾動シ易ク沈鬱厭惱多ク少シノコトニテ急ニ不相當ノ劇感動ヲ起シ之ニヨリテ行爲ヲナスニ至ル而モ又一方ニハ此時既ニ諸感興ニ對スル一定ノ遲鈍無感觸アリ道德及ビ審美ノ機能ニ關スル缺落症狀ヲ示シ其感情ハ職務家族從來精神上感興美術學問等ニ對シテ遲鈍トナリ疎雜ナル肉體ノ嗜好飲食睡眠ヲ重ズルニ至ル此症狀ハ患者ガ從來感觸ノ柔緻ニシテ精神上ノ嗜好ヲ重ゼシ

人ナリシキ殊更著明ナリ爾後ノ經過ニ於テハ習儀風俗法律職務家政社會地位ニ對シテ甚キ衝突ヲ來シ患者ノ最高精神作用ニ甚ク障礙アル爲メ彼ガ如何ニ身ヲ處スベキカヲ覺ラズ家族朋友前輩ノ其行狀ニ付キ倣戒スルコトアレバ之ニ疎硬ナル反應ヲナシ或ハ荒暴ニサヘナルナリ

興奮性亢進ト高等感觸ノ缺亡トハ多ク爾後ノ經過ニモアリ且感應ノ色容ハ善ク妄想ノ内容ト並馳ス蓋シ妄想ノ内容ハ感應ノ爲ニ定メラル、ナランカ誇大妄想ニハ充適幸好ノ感應アリ心氣性妄想ニハ沈鬱又ハ苦悶状態アルヲ見ルナリ全經過ヲ通貫スル感應ハ通常前後同一色ナラズシテ喜悅溢ル、許ナル中ニ卒然トシテ涕ヲ流シ心氣性苦惱ハ忽ニシテ兒ノスル如キ喜悅トナルヲ見ルナリ殊ニ注目スベキハ相當ノ觀念ヲ興發セシムルニヨリ或ハ聲色面容ニヨリテ屢此忽卒ノ變轉ヲ起スヲ得ルコトナリ妄想ノナキモノ又ハ稀薄トナリシモノニハ其感應多クハ較明ノ色容ナク然ラザルハ癡狀性満足又ハ不快樂ガ感情遲鈍ノ甚キニ至ル迄モ附隨スルコトアリ

意思界ノ障礙 意思衰弱アリ柔懦ニシテ從前ノ如ク確固獨立ノ風ナク癡狀性衝動性ノ自恣家トナリ外ヨリシテ偶之ヲ誘發スレバ無慮濫妄ナル行爲甚キハ犯罪ヲモ敢テシ而モ少シモ其結果意義ヲ察スルナシ熟慮モ推考モナク其妄想ニ從ヒテ計畫



シ而モ偏執狂ノ如クニ秩序アリ本末アリ長ク準備シテ之ヲナスコトナク思考起レバ  
 輒チ直ニ之ヲ實施セントシ一事未ダ全ク畢ラズシテ又他ノコトニ移ルナリ故ニ麻痺  
 狂者ハ同時ニ無數ノ計畫企圖ヲ懷抱シ其無謀ナル事業ヲ施スコト極メテ速ナリ  
 精神甚朦朧ニシテ道德及ビ叡智作能ノ不全アリ健忘アリ神明散亂アリ動行遲緩ア  
 リ意思衰弱アリ審美及ビ道德上辨別ノ弛廢アリ職務生活家族生活ノ最要義務ヲ放  
 怠スルアリ放佚濫費ノ傾向アリ爲ニ其社會上存在ハ益困難トナルナリ患者ノ舉止  
 ヲバ適當ニ看破スルト否ト患者ヲシテ長ク自家近傍ニ害ヲナサシムルト否トハ一  
 ニ傍人ノ辨別力如何ニヨルナリ故ニ官吏ノ如キ甚不潔怠慢ニ其下吏ヲ御スルヲ濫  
 安疎斥ニシテ而モ之ヲシテ猶ホ長ク職務ニ從ハシメ躁狂性激越状態起リテ初メテ  
 之ヲ斥クルコトアリ又或ハ今日癡癡狂院ニ致サルベキ人ニシテ昨日ハ猶ホ其職ニ在リ  
 之ヲ精察スレバ既ニ數月以來勤務不整ニシテ其業務淹滯シ期日ヲ遺忘シ商議中ニ  
 眠リ緊要ナル書札ヲ失ヒテ長ク發見スル能ハズ他人會之ヲ紙籠中ニ發見スルコトナ  
 ドアリ商人ニテハ一旦其破産ノ事至ルニ及ビテ初メテ其永ク既ニ登簿ヲ怠リ屢錢  
 鑰ヲ遺失シ商約ヲ誤マリ證文ヲ失ヒ其手書中ニハ久ク既ニ年月ノ誤謬計算ノ舛違  
 文字ノ脱落筆跡ノ亂蕪紛雜アルコトアリ

色慾ハ病初ニ在リテハ激越状態ノキニ増進スルコト多ク時ニ倒錯症アリ末期ニハ淫  
 快モ淫力モ消殺ス

身體症狀 癡癡狂ヲシテ臨牀上一種態アラシムルハ主ニ

神經性障礙ニシテ全經過中ニ附隨シテ之アリ病初ニ殆トナキコトナキハ頭痛ナリ多  
 クハ極メテ甚キ鈍脹痛ニシテ極力腦髓ヲ壓セラル、モノ、如ク額部ニ局在スルコ  
 多シ屢上衝ノ徵候之ニ加ハルアリ耳鳴視花火眩運

五官ニ於テハ初ニハ甚興奮性ナルコト屢アリ後ニハ多少ノ感覺鈍成ヲ致スコト稀ナラ  
 ズ其主ニ精神狀態殊ニ注意ノ缺乏ニ歸スベキハ疑ナシ興味アル症狀ハ視神經ノ皮  
 質域ノ缺落症狀即所謂精神盲ニシテ眼底ニ所見ナク而モ物體ノ認識所在ヲ知ルコ  
 甚難キモノナリ麻痺狂發作後ニ屢之アルヲ見ル(ふるすどねる氏)弱視ハ視神經路ノ皮  
 質下障礙ニヨルモノ稀ナラズ一ハ前驅症狀トシ一ハ經過中症狀タリ眼底ニハ見ル  
 ベキナキモ視神經萎縮アリ(モメリ氏)ハ四乃至五分或ハ十三分ニ之ヲ見タリト云フ  
 又神經性網膜炎乳頭周ノ水腫アリ嗅覺脫失ノ症モアリ或ハ嗅神經ノ灰白變質ヲ見  
 ルコトアリ  
 感覺障礙ハ血管運動障礙、運動障礙ニ比スレバ輕キモノナリ四肢、鎗刺痛ハ脊髓勞



形種ノモノニアルノミ或ハ曰ク『前驅期ニ於テハ、癱瘓質斯性疼痛（肩骨下ニ裂クガ如ク）又ハ異常感覺アリト麻痺狂ノ進ミシ期ニハ早晚諸種感覺ノ減殺アリ而モ其機能ヲ精檢スルコトハ患者ノ癱瘓ナルト意識ノ障礙アルトノ爲ニ甚難シ最多キハ痛覺脱失ナリ又觸覺ハ存シテ痛覺ノミナキコト少ナカラズ此ノ如キキニハ自傷ノ虞アルニヨリテ能ク守視スルコトヲ要ス痛覺脱失セル麻痺狂者ガ最凶ノ火傷ヲ蒙リ舌ヲ咬切リテ其ヲ咀嚼シ己ガ手ヲ食ヒ下腿ノ骨傷ヲ合併シナガラ彷徨スルコト往往ニシテ之アルモノナリ

運動障礙ニテハ其廣敷ナルコト不完全ナルコト其強弱廣狹ノ轉換スルコト調整障礙ノ性質ニテ進行性ニ廣ガルコトヲ以テ其通有ノ標徴トシ言語音聲眼筋四肢ノ諸域ニ之アリ言語音聲ニハ最早ク來ルナリ

言語障礙ハ調節障礙（即構音障礙）ト失語性障礙（即中樞性障礙）トアリ失語症ハ經過性ニシテ長續スルコト稀ニ卒中發作後ニ屢之アリ初メハ醇然健忘性失語ニシテ後ノ經過中ニハ屢失節性失語症錯語症アリ錯語症ハ失語症ニ比スレバ頑固ニシテ數月間モ輕減セザルコトアリ彼ニ在リテハ事物ノ名稱ヲ忘却シテ之ヲ呼稱スル能ハズ此ニ在リテハ不正ノ名稱ヲ以テ之ヲ指定シ又ハ一定ノ同一稱呼ヲバ事毎ニ再復ス或ハ

言語ハ反復多キ濫誣ナル音響ノ配列トナル語疊症ハ頗ル稀ニシテ且患者ノ癱瘓ノ爲ニ之ヲ確診スルコト難シ構音障礙（差跌言語ハ失語障礙ヨリモ多ク一ハ詞語ノ運動直觀ノ荒墜ニヨリ聽覺上詞像ヲ得ズ一ハ腦皮質ノ構音上調整機官ニ障礙アルニヨリ之ヲ別テ二種トス一ヲ痿弱性トシ一ヲ失節性トス痿弱性構音障礙ニ在リテハ唇舌ノ運動澁滯ニヨリテ繁錯ナル音ヲバ急ニ結合スル能ハズ音ト音ト相延牽シ相滑轉スルガ爲ニ不分明ニ曖昧トナルモノニシテ賦滑言語詢語延髓球性言語障礙ニ似タレバ延髓殊ニ顔面神經舌下神經ノ損傷ニ基クナラン失節性構音障礙ハ一ハ唇失節ニ基キ環口筋鼻翼上唇舉筋舉頤筋ニ共同運動纖維性攣縮アリ後ニハ上唇ノ痿弱アリ殊ニ唇音齒音ヲ行フ行ハ行ハ行及サ行ノ音ヲ分明ニ別ツコト能ハズ兩唇ヲ過度ニ相壓スルキ言語ノ錯誤スルアリ早ク話サントシ又ハ激越スルキニハ其障礙ハ益較明トナリ口ヲ少シ開キタルキニハ幾分カ掩蔽スルヲ得ルナリ之ヨリ必要ナルハ差跌言語ト稱スル舌構音性調節障礙ニシテ麻痺狂ニノミ來ルガ如シソハ發音自家ニハ障礙ナク而モ音ト音ト錯誤謬置シ或ハ一二ヲ脱スルコトニシテ誦讀ノ際ニ殊ニ明ナリ（リゲル氏）其ハ或ハ一二音ヲ飲ミ込ミ又ハ極不完全ニ言ヒ出スコト屢ナリ是レ前音ヲ發セン爲ノ神經作用衝動ガ殘續シ後音ノ神經作用衝動ガ早發スルニヨリ



一音ヲ反復スル(吃)ハ發言運動ガ痙攣狀ニ反復スルニヨリ一音ノ長ク引ク(延長言語)ハ言語機制ニ未タ確當正實ノ神經作用ナキニヨルナリ此ノ如クニシテ其誦讀正カラザルモ而モ患者ハ自ラ正ク讀ミタリトシ又自ラ其讀ミシヲ解スルヲナシ末期ニ於テハ言語ハ延長シ緩徐トナル是レ患者ガ不知不識徐長且劇強ノ神經作用ニヨリテ調節障礙ヲバ克服セント試ミル爲ナリ此期ニモ決シテ調節言語ナシ調整障礙ノ爲ニ又屢音ニ調ヲ添ユルヲ不同不正ニシテ一ヲ甚低クシ他ヲ極メテ高クシ而モ其實ニカナハザルナリ舌及ビ唇ノ筋ハ言語ヲナスニハ大ニ障礙アレモ他ノ諸機能ヲナスニハ猶ホ用フベキナリ

以上諸障礙ハ多クハ麻痺狂發作ニ繼起シ一時性失語吃等ハ多ク後ノ經過中ニアリ末期ニ至リテハ言語缺亡ハ癡狀失語完全調節麻痺ノ齊呈スル所ナリ

言語障礙ハ安靜時及ビ朝ニ強キヲ通常トスモシ言語機制少シク動キ又ハ假ヘバ激越時ノ如ク之ニ強キ衝動加ハレバ言語障礙ハ初期ニハ猶ホ退却スルナリ

誦讀障礙ノ一種錯讀症ニ似タルアリ麻痺狂者ハ物ヲ讀マントスルヤ時ニヨリ極メテ濫妄ナルヲフ呢喃シ又新作ノ語ヲ以テ刻字ニ代ヘテ誤モ知ラズ讀ムヲアリコハ屢失語言語障礙等ノナキ前ニ發シ且麻痺狂ノミニ發スルモノ、如クナレバ診斷上

緊要ナランカ(わいす氏) Hubner (ばす氏)

文言障礙モ早來ノ緊要症狀ナリ之ヲ早來ト云フハ其言語猶能ク整フキニ當リテスデニ此ノ變調アルヲ見レバナリ之ヲ緊要ト云フハ蔓延性皮質病殊ニ麻痺狂ヲ標示スレバナリ然レモ亦麻痺狂ニシテ文書障礙ナキモノアリ(しゅれ氏)若シ之アラバ診斷上疾病ノ形種輕快惡増ニ關シ必要ナリ(えるれんまいえる氏)其障礙ハ一ハ精神覺官上ノ障礙癡狀追想ノ像運動直觀ノ缺亡ニヨルニシテ一ハ描寫機制上ノ障礙ナリ(失節書ト顛振書相混ス)○上卷書態附表參看彼ニハ文言ノ内容全キヲ得ズシテ或ハ缺落シ或ハ不必用ニ反復シ或ハ錯語例置スルアリ(健忘性失書失節性失書及ビ錯書症)意識障礙ノ爲ニ文書ノ義ノ誤リタルヲ知ラズ此ニハ描寫ニ關スル形容ノ作能即手跡全キヲ得ザルナリ彼障礙ハ常ニ此障礙ニ先ダチ發スルヲ常トス副障礙トシテハ患者ガ紙上經濟ヲ顧慮セズ一點一劃ヲ以テ紙ヲ填ムルモ縱ニモ横ニモ關ラズ亂塗濫抹滿紙汚穢トナリ殆ト讀ムベカラザルヲアリ末期ニハ他ノ運動直觀ノ缺亡ト共ニ書寫ノ能ハ全ク失フ(完全失書症)

音聲筋肉モ亦屢早ク失節ト痿弱トノ爲ニ機能障礙ノアルアリ或ハ第一症狀トナリ發呈ス聲ハ爲ニ巖濁枯焦トナリテ尋常ノ響ヲ失ヒ聲帶麻痺トナリ山羊ノ鳴クガ如



キノ調トナリ歌フキ聲音轉ジ易シ(語ノ中ニカなきリ)口蓋帆ノ神經作用障礙ニヨリテ又鼻音ノ性質ヲ得ルヲモアリ

眼筋ニハ時ニ殊ニ脊髓形種ニハ經過性ニ痿弱麻痺アリ複視症ヲ兼ヌ眼球震盪症、眼險下垂症モ經過性症狀トシ來ル

虹彩膜筋肉ノ神經作用異常ハ屢ナリ而モ病中ニ入り初メテ生ジタルヲ明ニシテ眼内ニ原因ナキヲ確乎タルキニ緊要ナルノミ初期殊ニ躁狂期ニハ瞳孔ノ縮小稀ナラズ、おとろびんニテ除クベシ之ヨリモ多キハ一側ノ瞳孔散大ナリからばるヲ用フルモ止マズ殊ニ緊要ナルハ瞳孔ノ不均ト虹彩膜ノ神經作用障礙トノ交承ナリ又反應ノ遲鈍強直アリ

顔面神經域ニハ屢風ニ痿弱アリ交換シテ一二筋枝ニ來リ殊ニ唇筋ニ限レリ廣キ顔麻痺ハ唯一時、卒中發作癲癇發作後ニアルノミ顔面筋殊ニ口部ノ纖維性攣縮震搖ハ夙ニ發スルモノニシテ殊ニ面容及ビ構音ノ衝動アルキニ起リ一時或ハ面上痙攣ヲ致スヲアリ顔面弛緩シテ鼻唇皺其跡ヲ失フ心意ノ標出ナク之ヲシテ代種ノ調節運動目ヲ閉チ、口ヲ開キ舌ヲ出スヲナサシムレバ屢纖維性攣縮及ビ共同運動アリ時トシテハ又顔面ノ左右不均アリ舌ハ屈曲スルヲ稀ナラズ強キ纖維性痙攣アリ其運

動巧ナラズ突擊性ニシテ種種ノ共同運動(眼ヲ開、額ヲ蹙)ヲ附帶シ甚キハ手ヲ以テ自ラ之ヲ牽出スルニ至ル

病ノ進ミシ期ニハ三又神經神經小枝モ之ニ與リ其時一種固有ノ自發運動性ノ痙攣狀ノ咀嚼運動トナリ又齧齒トナルコハ殆ト麻痺狂ノ特徴トセラル末期ニハ嚥下筋肉モ一時作用不全トナリ誤リテ嚥下スルヲ多ク喉頭門ノ不感覺ナル爲ニ早ク之ニ反應スルナク往往ニシテ窒息スルノ危險アリ

四肢ノ運動障礙ハ一ハ腦症ニヨリ一ハ脊髓症ニヨル腦傳達ノ缺落ハ顫振筋作用不全、失節時ニハ又注察顫振ヲナシ而モ主ニ運動直觀ノ缺乏ト筋肉感覺應施ノ缺乏トニ發シ稽熟セシ運動モ之ガ爲ニ遲滯不巧トナリ手ニテ物ヲ執リ之ヲ結ビ又壓スル際ニハ(其運動突擊性ニシテ神經作用段落狀ヲナシ來ル)精細ナル運動調整ノ不能ナルヲ示シ而モ疎力ハ稍尋常ナリ(發作後ノ衰弱ハ之ヲ除ク)歩行ハ平衡宜ヲ得ザル如ク兩脚左右ニ廣ク支ヘタリ是等腦髓傳達路障礙ノ症ノ他猶ホ脊髓中傳達路ノ變化ニヨル障礙アリ脊髓ノ後索ノ灰白變質ニ基キテ歩行明ニ脊髓勞性ニシテ膝蓋腱反射ナク多クハ瞳孔反射ノ缺亡又瞳孔収縮ヲ兼テタリ而モ此ノ如キモノニ比スレバ歩行稍緊張性又強硬ニシテ木作ノ如ク頓足スル如キモノ多シ膝蓋腱反射ハ亢進シ時トシテハ足攣縮モアリ踏舞狀ノ



反射痙攣アリ(足指ヲ牀ニ着クルキ)其歩行ハ主ニ標準性痲痺狂ニ見ル所ニシテ或ハ  
 腦水腫ニテ反射制止ヲ妨ゲラル、ニヨルトスベク又ハ側索ノ後片ニ變化アルニ歸  
 スベキナラン(反動與奮性ハ通常亢盛シ時トシテ患者ノ面ニ對シ劇運動ヲナセバ患  
 者ノ全身ノ劇動スル程ナリ)睫反射ハ脊髓病變ノ所在ニヨリテ或ハ甚亢進シ或ハ消  
 失スルヲ前述ノ如ク(Daly, Dallenourt)ニ氏之ヲ研究シビ(Daly)氏ハ六十五人  
 ニテ十八人ニハナク二十六人ニハ亢進スト云ヒべらんくる氏ハ六十八人ニテ十一  
 人ニハナク四十三人ニハ亢進セリト云フ  
 筋肉ノ電氣興奮性ハ初ニハ増進シ後ニハ減退ス  
 膀胱ニハ發作外ニモ屢障礙アリ或ハ失禁タリ或ハ滯留アリ失禁ハ多クハ滯留ノ結  
 果ナリ(小便淋瀝)  
 直腸ニテハ甚キ糞便堆積ニ至ルヲアリ或ハ又末期ニ近ヅキ便通忍堪ノ不能アリ是  
 レ一ハ括約筋ノ痲痺ニヨレ而モ又大ニ患者ガ脫糞ノ迫來ルヲ知ラザルヲ膀胱ノ  
 臍マデ充ツルヲモ知ラザルガ如クナルニヨルナリ  
 痲痺狂發作ハ緊要ナル經過性證候ナリ其最輕キハ急速經過スル眩暈發作ニシテ屢  
 短暫ノ言語不能又ハ舌本橋固又ハ輕度ノ半側痿弱ヲ附隨ス之ヨリ重キハ卒中樣發

作及ビ痲痺樣發作ナリ  
 卒中樣發作(或ハ眩暈發作ヲ併稱ス)ハ尋常卒中發作ニ類シ急ニ無意識トナリ卒倒シ  
 痰ノ塞ガルガ如キ呼吸ヲナシ尋グニ半身不遂ヲ以テス之ト異ナルハ唯痲痺ノ速ニ  
 去リ且體温ノ増スノミノモノナリ此發作ノ爲メ生命ノ忽チ損スルモノモ亦多シ  
 痲痺樣發作 痲痺本症ノ發作ニ同キヲアリ之ヨリ多キハ唯局局部性、半身性ニシテ完  
 全ノ意識缺亡ヲ附隨セズ多クハ前驅症狀トシテ昏憤甚キ失神、運動澁滯、身體ノ一方  
 傾欹アリ而シテ後發作トナリ其痙攣其局在ノ一種固有ナルハ皮質ノ本源ヲ推察ス  
 ルニ足ルナリ初ニハ顔面ニ輕キ攣縮アリ眼球ヲ旋轉シ或ハ其震盪症ヲ附帶シ次デ  
 興奮ハ頸ニ及ビ上肢ニ及ビ呼吸筋、腹筋ヨリ下肢ニ至リ皆其側ヲ同フシ其ヨリ後又  
 他側ニ延及シ而シテ初次發作ノ所ハ既ニ止ムナリ此發作症ハ固ヨリ何レニモ必發  
 セザレ而シテ或ハ續續相接シテ廿四時内ニ二十回三十回百回モ起リ或ハ多少ノ間歇ヲ  
 ナシ來リ其間患者ハ昏睡性又ハ不知不識手足ヲ以テ動作ス其各發作ハ概シテ一時  
 又數時後ニ去レ而シテ又數日(十四日モ)ニ及ブヲモ稀ナラズ此發作ハ屢、血管痲痺ノアル  
 状態ヨリ出デ腦ノ劇キ衝逆ト頭温度ノ腋下温度ヨリ一五度高キ(らいんはると氏)ト  
 フ兼ヌ體温ハ多クハ少ク昇リ甚昇ルヲ稀ニアリ尿中ニハ蛋白アルヲ甚多シ膀胱直



腸ハ麻痺シ便通ハ屢之ナシ能ク早ク之ヲ知リテ排洩セシメザレバ其結果トシテ腎孟炎、腎臟炎、直腸炎ヲ致スコアリ嚥下筋麻痺ノ爲ニ他人ノ助ナクバ食ヲ得ズ喉頭反射屢完ク缺ケタルガ故ニ分解産物多キ口内(時ニ耳下腺炎アリ)ヨリ唾ヲ吸入シテ頗ル危険ナカラズ實際此發作ニ尋ギテ屢肺ノ脈衝(加答兒性)及血墜性肺炎發スルコアリ之ヲ説明スルモノハ或ハ曰ク『其咽頭又口中分泌液ガ反應ナキ患者ノ氣道ニ入りテ機制上ニ起ル』或ハ曰ク『神經病性ニ胸部交感神經域ノ血管麻痺ニテ生ズ』ト未ダ孰レカ是ナルヲ知ラズ稀有ナルハ強直樣發作及ビ臍躑躅性發作ナリ此ノ如キ患者ニハ又痔瘡極メテ起リ易クシテ爲ニ死ニ就クコト少カラズ發作ヨリ醒覺スルハ常ニ漸徐ナリ或ハ甚キ錯亂忪乏ヲ經過シテ以テ此ニ至リ又發作後ニ精神衰弱大ニ増シ又ハ急ニ甚キ癡狀ニ陥キルコアリ且半身痿弱舌下神經麻痺顔面神經麻痺強迫運動言語障礙、失語等種々ノ身體障礙ヲ殘スコアリ是等ハ多クハ幾ナラズシテ消却スレモ又持續性ナルモノアリ

發作ハ必シモ疎大ナル解剖變化ニヨラズ卒中樣發作ハ恐ラクハ一定ノ腦域ニ局所水腫ヲ將來スベキ一時性血管麻痺アルニヨリテ生ズルモノ、如ク癲癇樣發作ハ皮質運動部ニ時々再覆スル刺戟機轉アリテ之ニ約制セラル、ナラン此刺戟ハ直接ナ

ルコアリ(ベヒテモ氏ハ蜘蛛膜ト腦表面トノ間ニ囊腫アルコト多シト稱ス)或ハ末梢性ニシテ(膀胱ノ充盈ナド)皮質運動域ノ興奮性増進ノ爲ニ之ヲ効スナリ

是等麻痺狂發作ハ病中何レノ時ニモ發呈スベシト雖モ概スルニ輕キハ病初ニ多ク重キハ後ノ期ニ多シ其發呈數ハ病症ニヨリテ一ナラザレモ其甚キハ隔日又二三週毎ニ之アルアリ全ク之ナキモノハ稀ナリ吾人ノ親驗スル所ニヨレバ麻痺狂ニ發作ノ多カラサルハ甚特異ニシテ其何ノ故タルヲ知ラズ發作ノ外誘起トナルハ感動過荒甚キ消化不良後便堆積等ナリト云ヘモ未タ詳ナラズ多クハ其誘因全ク搜知スベカラズ

麻痺狂發作ト幾分ノ關係アルハ強梗證狀ニシテ時ニ之ヲ見ルコアリ其極輕キモノハ發作後ノ忪乏時ニハ甚稀ナラズ時ニハ長キ間著キ蠟屈症ヲ以テスルアリ(數週數月ニモ至ル)カ、ル患者ハ事ニヨリ緊張性妄覺狂又偏執狂ト誤認セラルルコアリ而モ既往症ニ視、後ノ經過ヲ察スレバ此處アルコトナシ

**(三)血管運動性障礙**ハ脈搏ノ早ク、一擊性ニシテ緩徐ナルニ察スベク此病ニハ進行性血管痿弱アリ頸部交感神經域ニ於テ經過性ニ完全血管麻痺ヲ致シテ眩暈發作、卒中發作、局所又全身溫度昇騰、半身發汗等アリ亦皮膚ノ局所性血管麻痺(腦膜炎性斑紋



(三) <sup>さる</sup>氏ヲ呈スルアリ末期ニハ全身血管麻痺トナリ肺、膀胱、腸ノ神經麻痺性充血ノ他皮膚ノ膚蒼厥冷水腫及ビ尋常下體温ヲ致ス

(四) 榮養障礙ハ血管障礙トシテハ帶狀水泡疹、血汗、末期ノ羸瘦、耳血腫、骨脆症兼尿中磷酸鹽質ヨリス榮養障礙トシテハ帶狀水泡疹、血汗、末期ノ羸瘦、耳血腫、骨脆症兼尿中磷酸鹽増加、臨終ノ褥瘡等ハ其擧グベキモノナリ、<sup>ん</sup>氏曰ク「是等ノ障礙盡ク皆内因ヨリ生ゼズシテ外來傷害ノ爲ニ發スルモノナリト然レモ麻痺狂者ノ生體反拒力ノ減却ハ之ヲ助クルノ要素タルハ疑フベカラズ僅微ノ刺戟アリテモ甚重キ症狀ヲ來スナリ褥瘡ノ生ズルハ患者ガ感覺缺亡ノ爲ニ健人ノ如ク不快ノ壓覺ヲ覺ヘズシテ身位ヲ屢換エザルニヨリ又ハ自助ケテ運動スルヲ能ハザルニヨルナリサレバ一二時間モ瘦セシ足ヲ累子又ハ牀上ニ坐スルヲアラバ大ニ潮紅、蕁麻疹、又起泡ヲ生ズルアリ或ハ一夜守視セザル中ニ深數仙迷ノ脱疽ヲ生ズルヲアリ肋骨傷、耳血腫ハ割ニ麻痺狂ニ多シ時トシテハ甚深重ナリ是レ患者ガ動行巧ナラズ不穩ニシテ且自ラ防ギ自ラ告グルヲ能ハザルニヨリ而モ素因ノ之ニ與カルハ固ヨリナリ肋骨ノ脆弱、耳軟骨ノ榮養障礙、初ヨリ之アリ而モ看護人ノ養成ト看護トハ大ニ是等合併症ノ數ヲ減スルモノナリ

(五) 其他ノ機能ニシテ障礙アルハ睡眠、食思、體重ナリ睡眠ハ初期ニ於テハ障礙多ク其後ニハ興奮状態ニテ時ニ全ク不眠ナルヲアリ末期ニ向ヒテハ安堅ナリ然レモ患者ノ精神朦朧ナレバ此事甚明確ナラズ食思ハ初期ト激越時トニ減ジ後ニハ縱食トナルヲ常トス體重モ之ニ似テ病初ト病頂トニハ減ジ後長ク安靜トナルニ及ビテハ脂肪ノ稍集着スル爲ニ體重大ニ増シ末期ニ及ビテ瘦削最甚、死ニ至ル迄瘦削已マズ

(六) 體温行路ニモ異常アリ、<sup>いん</sup>はる<sup>ん</sup>氏ハ温度ノ午時ト晩トニ朝ヨリモ高キヲ見タリ一時體温ノ昇騰スルヲ又稀ナラズ而モ之ニヨリテ直ニ病機ヲ以テ激衝性ナリトスベカラズ時々皮質ノ温熱調整中樞ニ機能障礙アルニヨリテ然リトスベシ神經病性熱度四十度迄ニシテ充滿セル膀胱又ハ腸管ヲ排通セシ爲ニ急ニ尋常ニ歸ヘルモノ及ビ死戰ニ於テノ常熱以上ノ温度四十三度迄ノ如キ即是ナリ麻痺狂ノ興奮状態ニハ四十度迄ノ温度サヘ稍尋常ト看做スベク上衝發作、頸部交感神經域ノ血管麻痺、卒中様發作、癲癇様發作ノ附隨症狀トシテモ亦之アリソハ發作前十時乃至十二時間ヨリ發作後數月或ハ數日ニ延及ス體温ノ異常ニ低キハ心氣性、脊髓勞性、癡狀性ノ形種ニ見タリ、<sup>くれ</sup>め<sup>る</sup>氏末期ニ於テハ體温ハ尋常下ニ又身體ノ兩側温度ノ差異(二度迄)アリ殊ニ發作後ニハ稀ナラズ死戰前ニハ自覺上健安ニシテ而モ虛脱温度ナ



ルコアリ(二十四度迄) 是等諸症狀ノ配合及ビ強弱如何ニヨリテ種々ノ病態ヲ構成シ相互ノ推移アレテ而モ一定ノ標式性形狀アリ 最早ク現ハルハ血管運動ノ證候ニシテ之ニ尋グハ精神證候及ビ運動證候ナリ 精神證候ハ運動證候ト齊發シ或ハ之ニ前チ又稀ニハ之ニ尋ギテ發ス此等症狀ノ本タル腦皮質ノ變化ハ多クハ極メテ漸徐ニ發育シ一定ノ強度ト廣袤トニ達シタル後初メテ精神界ト運動界トニ著キ缺落證候及ビ刺戟證候ヲ致スナリ故ニ此病ノ發育期病熾期躁狂誇大妄想等ヨリ社會上精神上ノ存在條件ノ壞敗スルニ至ルニハ數年ヲ要スルナリ 前驅期ノ證候ハ初メニハ不明確ニシテ長キ間蔓延性腦病ノ診斷ヲ下スベキノミナルコト屢ニシテ或ハカ、ル機質病タル意義サヘモ初ニハ疑ハシク其症狀ハ重キ腦性神經衰弱症精神上虛脫精神作能ノ澹滯精神急卒ニ疲勞シ注意早急ニ委頓シ追想能力ノ澹滯感情生活ノ刺戟性衰弱不眠症頭壓上衝眩運等ト同キコトアリ是レ一ニハ病初ニ著キ寛解狀態アリテ精神作能完キガ如ク殊ニ記憶作能ノ存スルニヨリ又一ニハ神經衰弱家ニ無キコト稀ナル心氣性ノ憂鬱苦痛性ノ自覺病患ヲ過重視スルノ症重

病腦軟化薄迫ノ妄想倦厭ノアルニヨリテ益其似タルヲ致スナリ

其然ラサル症ニハ第一症狀ハ上衝頭痛眩運又ハ固有ノ偏頭痛發作(眼球痛尋常偏頭痛トハ頭搖性視野暗黒症半盲症劇キ顛頭痛及病眼ニ疼痛性緊)アリ漸々ニ意識溷濁ノ症ヲ發シ之ニ加フルニ注意辨別記憶ノ障礙ヲ以テシ多クハ決斷ノ缺亡健忘症アリ注意ノ衰弱ハ自覺ヲシテ缺漏又不全ナラシメ追想ノ衰弱ハ同時ニ人物事歷ノ錯認ヲ致シ批評思慮記憶作能ノ衰弱ハ追想ヲシテ錯誤ナラシメ夢ニ見書ニ讀ミ心ニ考ヘシコトヲ實歷セシコト誤リ過去ノ推時ノ正カラザルヲ致シ病腦ハ益新刺戟ヲ執記スルノ能力ヲ失ヒ最近過去ノ事直ニ之ヲ忘却シ一訪問一食時一事務ノ少時前ニアリシモノ皆然ラザルコトナク患者ハ即チ同ノコトヲバ同一夜ニ數度モ物語ルナリ管ニ一個一個ノ事歷ヲ忘却スルノミニアラズ近時過去ハ盡ク之ヲ忘却シテ痕跡モナキニ至ルコトアリ

道德審美ノ機能ノ障礙モ亦早ク發呈シ職業家計等ヲ抛チ精神上ノコト學藝ノコトヲ好マズシテ心身ヲ肉慾ノミニ委ヌルアリ又感情興發ノ輕易症アリ感情ノ刺戟性アリ此等蔓延性證候精神證候ノ他又早ク竈病狀アルコト稀ナラズハ一時ノ(多クハ)健忘性失語又ハ(稀ニハ)失節性失語タリ又運動直觀ノ缺落ニヨリ習熟運動ノ不精巧タ



リ(患者自ラ異ム程ナリ)同様ノ約制ニテ舌本ノ橋硬シ、言語ノ澁碍シ、言ヒ聞カセシ文句ヲ正確妥當ニ反覆スルノ不能等アリ。

前驅期ノ身體證候ニテ舉グベキハ瞳孔縮小、瞳孔ノ不均、脊髓勞ノ徵候、顔面兩半ノ神經作用ノ不均及轉換、舌筋ノ纖維性攣縮(時々四肢ノ顫振、痛覺倒錯性惱患、緩脈、上衝、酒精及ビ火熱不堪症、頭痛、眩暈、卒倒發作、眩暈發作、數時ノ精神錯亂アル卒中發作、言語障礙アリ)而モ諸證候ノ麻痺症狀ヲモ殘サズシテ速急ニ退キ去ルコトナリ。

前驅期ノ結末ハ卒中様又ハ癲癩様發作タルヲ稀ナラズ。

此ノ如キ前驅期ナキモノ。麻痺狂ノ其盛期ニ達スルヤ稀ニハ此ノ如キ前驅期ヨリセズシテ脊髓勞ヨリシ(上行性麻痺狂)又ハ他ノ精神障礙、麻痺ニ前チテアリ麻痺狂ハ其經過中ニ來リテ(續發性麻痺狂)唯彼ノ精神病ノ合併症ニシテ猶ホ從來健康ナリシ人ヲ犯セシキト全ク同ク或ハ他ノ精神病ノ全癒又ハ殘缺性治癒(精神衰弱症狀ノ殘存ニヨリ)セルニ尋ギ發スルコトアリ此場合ニハ前ニアリシ機能性精神病ハ麻痺狂ノ前驅期ニハアラザリシヤノ問題起ルナリサレバ此一事ハ精神病ノ諸症ノ診斷ヲシテ頗ル難カラシムルナリ蓋シ其後ノ經過中ニ於テ麻痺狂ノ病態ノ發スルコトアルヲ得ベケレバナリ。

精神<sup>○</sup>上<sup>○</sup>疾病<sup>○</sup>熾<sup>○</sup>盛<sup>○</sup>期<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>症狀<sup>○</sup>ハ<sup>○</sup>三種<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>異ナル<sup>○</sup>コト<sup>○</sup>アリ

(一)發揚<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>症<sup>○</sup> 此症ハ前驅症ニ尋ギ、長短ノ鬱憂期アリテ後發揚期アリ開活富贍ナル誇大妄想ト發揚爽快ノ感應トヲ以テシ其症益増進シテ急ニ躁暴狂ノ程度ニ達シ躁暴狂ハ又増進シテ急性ノ譫妄ノ程度ニ至リ終ニ死亡ニ轉歸スルアリ若シ癲癩院ニ於テ衛生條件ノ幸好ナルヤ躁暴ハ退キテ誇大妄想アル躁狂狀發揚トナリ興奮狀態ハ進行性癡狂ニ推移シ其經過中猶ホ躁狂性興奮及ビ誇大妄想ノ再起スルコトアリ他ノ症ニテハ又其間ニ寛解狀態ノ數月數年ニモ及ブモノアリ誇大妄想アル發揚性興奮止ミテ本症ハ早晚復發來シ其結局ハ即チ前者ト同一歸ナリ(所謂標準性麻痺狂)鬱憂期ハ或ハ全ク微ニシテ人目ヲ惹カザル程ノコトアリ或ハ較明ナルコトアリ兩ナガラ共ニ妄想アリ其ハ劇感動ト夜間ノ幻像トニテ起リ其内容ハ鬱憂性病狀ニ同ク心氣性追跡性ニシテ殊ニ罪業妄想タリ生命廢絶シ名譽地ニ墜ッ等ノ考アリ此期ハ數日或ハ踰年ニシテ漸次ニ稀ニハ急卒ニ數日内ニ止ミ感動沈淪シ妄想退却シテ而モ患者ノ精神ハ自在巧練ナラズ其事態ヲ批評シ理解スルコト充分ナラズ其嫌疑人症ハ止ミテ活潑トナリ多言トナリ從前ノ業ニ復シ他人ヨリ之ヲ見レバ一時全ク治セルガ如クナレ能ク之ヲ知ルモノニハ其本人性ニ深重ナル變化アリ殊ニ其本質舉措ニ



現ハル、ヲ見ルベク患者ハ其外貌ヲ怠リ疎放トナリ無秩序トナリ社會ニ對シ長上ニ對シテ不禮儀トナリ淫靡ノヲ語リ一面識ナキ人ト無二ノ親睦ヲ結ビ己ニ需要アレバ之ヲ充適シテ旁ニ人ナキガ如ク感應ハ昇進シ甚多幸多福ナルヲ覺エ而モ又甚キ刺戟性無顧慮ノ反應ヲナスノ傾向アリ

此際ニハ通常甚キ運動ノ不穩ト多勞作トアリ先ヅ種々ノ過荒及放佚ノ傾向起リ性行堅固ノモノ忽チ烟草酒類ニ慣レ衣服ヲ鮮奇ニシ華美ヲ好ミ逆旅ヲ歴訪シ富貴ノ交契ヲナス爲ニ離婚セント欲シ或ハ私窩子ヲ捕ヘ之ヲ擅マ、ニセントス

麻痺狂ニ特有ナル誇大妄想モ亦時ヲ同クシテ起リ初メハ考フベク有ルベキノ域ニアレモ忽ニ絶奇絶怪異トナリ感應ハ之ト並馳シテ最高度ノ發揚トナリ極メテ多幸多福ナルヲ覺エ心大ニ之ニ満足シテ言ニモ盡サレズ泣ヲ垂テ天地山岳ノ恩渥ヲ拜シ其隆運トナルヲ謝ス己ガ四邊ハ優越高貴之ニ過グルモノナク飲食衣服住居ハ帝王ノ如ク朋友知己ハ貴ク賢ク挺拔ノ人タリ兒女ハ教育ト智識トノ模範タリ

此感觸ハ他ノ辨別辨知ノ缺亡ト合シ患者ヲシテ大ニ動作ヲ廓弘セシメ思慮モナク無數ノ計圖ヲナシテ智力ニモ財産ニモ及バズ或ハ到底爲スベカラザルヲモ願ミズ然レモ其濫妄ナル動作ハ其ノ未ダ緒ニ就カザルニ先チ後圖ノ前計ヲ推排スルガ

爲ニ中止スルナリ主權者ニ打電シ財産ヲ顧ミズニ物ヲ注文シ見ルモノヲ買ヒ猥ニ貴キヲ贈リ所有者ノ目前ニテ淺愚ニシテ容易ク看破ルベキ詐僞竊盜ヲナシ後單ニカ、ルヲヲナセシヲナシトナシ爲ニ刑法ニ觸ル、ニ至ル要スルニ患者ハ一見猶ホ清明ナルガ如キモ其思慮ニ重障礙アルハ其際色事需要ヲ充適スルニ著ク放佚疎慢ナルトカ、ル患者ノ舉止ニ注意スルニ道義上冷淡アルトニテ知ルベシ其他ニ著明ノ意識障礙及記憶缺亡アリテ爲ニ姓名又事實ヲ忘レ熟レシ路ニ迷ヒ我家ナリト思ヒテ他家ニ走リ入り遊蕩荒佚ニ故ナク金錢ヲ失ヒ帽傘荷物ヲ忘レ之ヲ掠奪シ或ハ甚疎放ニシ遂ニ或ハ人ニ護セラレテ家ニ歸ルナリ此興奮狀態ニハ又竊盜症ヲ附隨シ其物ヲ取り人ヲ詐ルノ迂愚抗顔ナルハ明ニ神明散亂意識障礙及健忘ヲ標ハスト少ナカラズ

此ニ至テ旁人モ今ハ其ノ病タルヲ知レモ猶ホ或ハ未タ障礙ノ深重ナルヲ知ラズ神經激越症トノミ誤信シテ温泉行冷水治療所又ハ精神遣散療法ヲ以テ之ヲ靜メントシ患者ヲシテ金錢ヲ揮發シ安慢ナル約定買收其他ノ投機ニテ其家ノ財産ヲ盡盡シ腦興奮ト過荒トノ絶エザルニヨリテ回復ノ望ナキニアラザルヲモ不治トナス

麻痺狂者ノ躁狂症ハカ、ル躁狂狀興奮ヨリシテ内外刺戟ノ統合ニヨリテ生ジ多



クハ急卒ニ蹶起シ來リ急ニ熾盛期ニ至リ又急卒ニ再ビ鎮靜ニ移ルナリコハ病ノ經過中反復シテ發シ末期癡狂ノ期ニモ來ルヲアリ其持續ハ數日乃至數週ニシテ屢ニ管麻痺ヲ附隨シ又熱ト刺戟狀(斷齒)トヲ帶ブルヲアリテ軟腦膜及ビ皮質ノ衝逆性機轉ノ表ナルガ如シ其症ハ合併病ノ性質ノ深重特異ナルガ爲又意識障礙ノ甚キガ爲ニ多クハ極メテ劇甚ニシテ咆哮叫喚猛暴ノ破壞塗抹食糞等ノ症狀ハ極メテ多ク大抵之アリ且錯亂甚ク意識障礙深シ

(二) 鬱愛性麻痺狂ハ鬱愛性感應ト鬱愛性妄想トノ全經過中完全癡成迄ニ附隨スルニテ特異ナリ麻痺狂ノ鬱愛狀態ニハ重キ機質性障礙アルヲ見ルベク即昏迷性鬱狂又ハ激越性鬱狂ニシテ劇苦悶乃至萬事恐怖症アリ且夙ニ血管麻痺及ビ運動障礙ノ症狀ヲ合併スルナリ心氣性又鬱愛性病態ハ前驅期ヨリ發育シ其心氣性ナルハ屢前驅期ノ病覺ニ淵源ス謔妄ハ内容虛無性(屢)又心氣性ニシテ醇然タル原發謔妄タリ初メニハ猶ホ可有ノ境ニアレハ次第ニ不可有ノ地ニ至リ其ハ益結構恢弘スルヲハナケレハ多ク其舉止ヲ左右シ其舌其肛其陰部ニ疾アリトスルヨリ甚ク苦慮勞作シ喉閉ガルトテ物ヲ通ズルニ勞シ足玻璃トナレリ觸レナハ屈折セントテ恐ル、ガ如ク又或ハ追跡妄想アリ時ニ妄覺ヲ兼有シ其内容モ鬱愛性ニシテ患者爲ニ恐苦シ錯亂シ

爲ス所ヲ知ラズ言語ヲ出スヲナク或ハ時ニ罪業妄想ヲ致シテ捕吏ヲ恐レ抵刑ヲ恐レ旁人ヲ以テ探偵刺客トナス而モ極單ノ一當然ノ一モ自ラ決スルヲ難ク襦袢ノミヲ被ヒテ多時飲食スルニ躊躇スル等ノ一アリ遂ニハ室ヲ出デズ藤ヲ出デズ深ク被ニ入りテ身顛ヒ汗浹ク外ヨリ之ニ觸ルレバ濫ニ危懼抵抗ス或ハ又妄覺起リテ人聲風聲履聲盡ク已ニ薄迫シ己ヲ詰責スルノ語トナリ爲ニ自殺スルニ至ルヲ希ナラズ感情ハ追跡妄想アルハ殊ニ甚クシテ苦悶狀態ニシテ他疾ニ見ザル程劇甚ナルモノアルニ至リ所謂危疑不安ト豫期感動トアリ叫喚號動一微聲ニモ甚ク恐怖シ或ハ臥シ或ハ立チ或ハ衣ヲ穿チ又之ヲ脱ギテ完全錯亂ノ狀トナル而レハ是レ一時ノ症ノミニシテ之ヲ概スレバ抑鬱沈思ニシテ其間時ニ感應昂揚誇大妄想ヲ呈スルノミ要スルニ其感動ハ他ノ麻痺性ナラヌ鬱愛狀態ノ如ク常同ナラズ經過中妄想ノ内容漸ク寡弱トナリテ遂ニ完全癡成ノ狀態ヲ致スモノナリ其初ハ猶ホ感應異常ト時々ノ苦悶トノ殘剩アレハ遂ニハ是迄モ消失シテ失神性癡狂ノ狀トナル此症ノ寛解狀態ニ於テ其病宛然治癒セシガ如ク而モ心氣性又標準性麻痺狂ノ經過症狀ガ早晚又再ビ來ルアリ

鬱愛性又誇大性妄想ガ標式性ニ交承シ來ルヤ又回歸性麻痺狂ノ稱ヲ立テタリ

Organic Paranoia