

校註婦人良方

五

中國醫學大成第九集

婦科類

校註 婦人良方

五

上海大東書局印行

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯

明 古吳 薛 己立齋補註

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷十二

妊娠數墮胎方論第一

夫胎乃陽施陰化。榮衛調和。經養完全。十月而產。若血氣虛損。不能養胎。所以數墮也。凡妊婦腰痛多墮胎。

愚按。丹溪先生曰。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛乏。不能榮養。其胎則墜。譬如枝枯則果落。藤痿則花墜。嘗治賈氏婦。每有孕。至三月前後必墜。診其脈。左右大而無力。重則瀋。知其血虛也。補其中氣。使血自榮。時正初夏。教以濃煎白朮湯。下黃芩末二錢。與數十貼。得保而生。因而思之。墮於內熱而虛者。於理爲多。曰

熱曰虛。蓋孕至三月。上屬相火。所以易墮。不然。何以黃芩、熟艾、阿膠等爲安胎之妙如此也。大抵治法須審某月屬某經。育養而藥之。

附治驗

一妊婦五月服剪紅丸而胎墮。及腹脹痛。乃服破血之劑。痛益甚。手不敢近。予曰。此峻藥重傷脾胃也。用八珍倍加參耆。半夏、乳香、沒藥。二劑而痛止。數劑而安。吳江庠吏萬湖仲子室。年二十餘。疫疾墮胎時咳。服清肺解表之藥。喘急不寐。予以爲脾土虛而不能生肺金。藥復損而益甚也。先與補中益氣。加茯苓、半夏、五味、炮薑。四劑漸愈。後往視之。用八珍加五味。及十全大補湯而愈。

一方。鯉魚二觔者一尾。粳米一升。用鹽醬煮食甚善。月食三次。

附方

十全大補湯

八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

妊娠不長方論第二

夫妊娠不長者。因有宿疾。或因失調。以致臟腑衰損。氣血虛弱。而胎不長也。當治其疾。益其氣血。則胎自長矣。

愚按前症更當察其經絡。審其所因而治之。

附治驗

一。妊婦胎六月。體倦懶食。面黃晡熱。而胎不長。因勞欲墜。此脾氣不足也。用八珍湯。倍加參朮茯苓三十餘劑。脾胃漸健。胎安而長矣。

一。妊婦因怒。寒熱往來。內熱晡熱。脇痛嘔吐。胎至八月而不長。此因肝脾鬱怒所致。用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗。病愈而胎亦長矣。

黃耆湯 治妊娠不長。更安胎和氣。

黃耆炒

白朮炒

陳皮

麥門冬去心

白茯苓

前胡

人參各五分

川芎

甘草炒三分

右薑棗水煎服。

又驗方。用鯉魚長尺許。如食法。飲其汁。其胎漸大而長矣。

附方

六君子湯 方見二十四卷第六論

八珍湯 方見二十四卷第四論

妊娠胎動不安當下方論第二

夫人以胃氣壯實。衝任榮和。則胎得所。如魚處淵。若氣血虛弱。無以滋養。其胎終不能成也。宜下之。以免其禍。

愚按前症宜用第十二卷十四方論主之。其胎果不能安者。方可議下。慎之慎之。

附治驗

鴻臚張淑人。痢疾後胎動。心神不安。肢體殊倦。用八珍散。二十餘劑漸愈。因勞加煩熱頭痛。以大劑補中益氣湯。加蔓荊子治之。熱痛頓止。仍用前散。又五十餘劑而安。其後生產甚易。

桂心散 治妊娠因病。胎不能安者。可下之。

桂心

瓜 萋

牛 膝

瞿 麥 各五

當歸一錢

用水煎。

又方。牛膝一兩。酒一鍾。煎七分。作二服。

小品方。用麥蘗一升。搗碎。水二升。煮一升。服之神效。觀麥蘗能損氣破血如此。脾胃虛弱。飲食不化者。不宜用明矣。

文仲取雞子一枚。鹽三錢。服之立下。

佛手散。服之。胎死者即下。生者亦安。方見十二卷第七論

附方

八珍散方見二十四卷第四論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

妊娠墮胎後血下方訕第四

墮胎後。復損經脈而下血不止。甚則煩悶至死。皆以調補胃氣為主。

愚按。前症若肝經血熱。用四物。參朮。山梔。肝經風熱。用防風黃芩丸。肝經怒火。用加味逍遙散。脾經氣虛。用四君。歸地。脾經鬱滯。用加味歸脾湯。氣滯不和。用

紫蘇飲。胃氣下陷。用補中益氣湯。

附治驗

一妊婦墮胎昏憤。不時吐痰。自用養血化痰之劑。昏憤不省。自汗發搐。痰涎湧出。彼以為中風。欲用祛風化痰。予曰。此屬脾氣虛寒所致。遂用十全大補湯。加炮薑二十餘劑。尋愈。

治妊娠損動。下血腹痛。

阿膠炒一兩

艾葉半兩

用水一大盞煎。

治墮胎下血煩滿。寒熱狂悶。鎊鹿角炒為末。每服三錢。水調下。日三服。或家雞翎燒為末。每服二錢。溫酒下。良久再服。以效為度。

附方

四物湯

補中益氣湯二方見二十卷第六論紫蘇飲方見十二卷第八論

防風黃芩丸方見十二卷第六論

加味逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯三方見四卷第二十論

妊娠未足月欲產方論第五

妊娠未足月而痛如欲產。或應產而難。或爲子煩。用知母一味。蜜丸。桐子大。粥飲服之。或槐子、蒲黃等分爲丸。酒服。或蒲黃水調錢許。並效。

愚按。小產重於大產。蓋大產如瓜熟自脫。小產如生採。斷其根蒂。豈不重哉。而人輕忽。死於是者多矣。大抵治法。宜補形氣。生新血。去瘀血爲主。若未足月。痛而欲產。用芎歸補中湯。倍加知母止之。產而血不止。人參黃耆湯補之。產而心腹痛。當歸川芎湯主之。元氣弱而欲產。八珍湯固之。出血過多而發熱。聖愈湯治之。若汗不止。或昏憤喘咳。急用獨參湯。若發熱煩躁。或肉瞤筋惕。用八珍湯。大渴面赤。脈洪而虛者。用當歸補血湯。身熱面赤。脈沉而微者。用四君。薑附。以回其陽可也。

附治驗方藥

一妊婦八月。胎欲墜如產。臥久少安。日晡益甚。此氣血虛弱。朝用補中益氣湯。加茯苓。半夏。隨愈。更以八珍湯調理而安。

當歸川芎湯 治小產後瘀血。心腹疼痛。或發熱惡寒。

當歸 川芎 熟地黄自製 白芍藥炒

玄胡索炒 紅花 香附 青皮炒

澤蘭 牡丹皮 桃仁

右水煎。入童便。酒各小半盞服。

若以手按腹愈痛。此瘀血為患。宜用此藥或失笑散消之。若按之不痛。此是血虛。宜用四物參苓白朮。若痛而作嘔。此是胃虛。宜用六君子。若痛而作瀉。此是脾虛。宜六君子送二神丸。

芎歸補中湯 治氣血虛而欲產。

艾葉代薑 阿膠炒 川芎 五味子杵炒

黃耆炙 當歸 白朮炒 芍藥炒

人參 杜仲炒各一錢 甘草炙五

右每服五錢。水煎服。

若脾氣虛弱。須用補中益氣湯。若氣虛而有火。宜用安胎飲。

人參黃耆湯 治小產氣虛。血下不止。

人參

黃耆炒

當歸

白朮炒

白芍藥炒

艾葉各一錢

阿膠炒二錢

右作一劑。水煎服。

當歸散 治產後氣血虛弱。惡露內停。增寒發熱。宜服此藥。

當歸

白芍藥炒

川芎

黃芩炒各兩

白朮五錢

右爲細末。溫童便調下二錢。

聖愈湯方見二十四卷第九論

獨參湯方見十三卷

當歸補血湯

八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

斷產方論第六

易曰。天地之大德曰生。然婦人有臨產艱難。或生育不已。而欲斷之。故錄驗方。以備所用。若服水銀、蝨蟲、水蛭之類。不惟孕不復懷。且禍在反掌。

愚按前症用蠶故紙尺許燒灰爲末。產後酒服之。血虛者終不復孕。大抵斷產之劑。多用峻厲。往往有不起者。是則產之害。未若斷產之害也。吾聞閣老張羅峰。太常李恆齊。俱因服斷產之劑。自謂形體俱怯。遇勞必病。有由然矣。千金斷產。用油煎水銀。一日方息。空心服棗大一丸。永斷其孕。且不損人。千金去胎。大麩五升。清酒一斗。煮二沸。去滓。分五服。隔宿勿食。旦再服。其胎如糜。母無所苦。千金不傳。

四物湯。每服五錢。加芸臺子二撮。於經行後。空心溫服。

妊娠咳嗽方論第七

夫肺內主氣。外司皮毛。皮毛不密。寒邪乘之。則咳嗽。秋則肺受之。冬則腎受之。春則肝受之。夏則心受之。其嗽不已。則傳於腑。妊娠病久不已。則傷胎也。

愚按前症若秋間風邪傷肺。用金沸草散。夏間火邪尅金。用人參平肺散。冬間寒邪傷肺。用人參敗毒散。春間風邪傷肺。用參蘇飲。若脾肺氣虛。用六君芎歸。桔梗。若血虛。四物。桑皮。杏仁。桔梗。腎火上炎。用六味丸。加五味子煎服。脾胃氣

虛風寒所傷。用補中益氣。加桑皮、杏仁、桔梗。蓋肺屬辛金。生於己土。嗽久不愈者。多因脾土虛而不能生肺氣。而腠理不密。以致外邪復感。或因肺氣虛不能生水。以致陰火上炎所致。治法當壯土金。生腎水爲善。諸臟腑嗽。見六卷第十
一等論。

附治驗

一 妊娠氣喘痰甚。諸藥不效。素有帶下。始於目下浮。兩月餘。其面亦然。此氣虛而有痰飲也。用六味丸料。數劑而愈。

一 妊婦嗽則便自出。此肺氣不足。腎氣虧損。不能司攝。用補中益氣湯以培土金。六味丸加五味。以生腎氣而愈。

一 妊婦咳嗽。其痰上湧。日五六碗許。諸藥不應。予以爲此水泛爲痰。用六味丸料。及四君子湯各一劑稍愈。數劑而安。

一 妊婦因怒。咳嗽吐痰。兩脇作痛。此肝火傷肺金。以小柴胡湯。加山梔、枳殼、白朮、茯苓治之而愈。但欲作嘔。此肝侮脾也。用六君子。加柴胡、升麻而痊。

桔梗散 治風寒咳嗽喘急不食。

天門冬去心

赤茯苓各一錢

桑白皮

桔梗炒

紫蘇各五分

麻黃去節三分

貝母

人參

甘草炒

右薑水煎。

馬兜鈴散 治咳嗽氣喘。

馬兜鈴

苦梗

人參

甘草

貝母各五分

陳皮去白

紫蘇

桑白皮

大腹皮黑豆水浸洗各一錢 五味子五分

右薑水煎。

百合散 治咳嗽胸膈煩悶。

川百合

紫苑

麥門冬

苦梗

桑白皮各五分

甘草三分

竹茹二分

右薑水煎。

治妊娠傷寒。涎多咳嗽。

知母

杏仁

天門冬

桑白皮各五

用薑水煎服。

旋覆花湯。感冒喘嗽。胸滿痰盛。方見二十二卷第四論

華蓋散。治症同上。或項背拘急。鼻塞頭眩。時發寒熱。方見六卷第十二論

參蘇飲加杏仁。五味子。治症同上。

附方

金沸草散方見六卷第十二論

人參平肺散方見二十四卷第十二論

人參敗毒散方見二十四卷第十論

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯三方見二十六卷第六論

六味丸方見二十四卷第十一論

小柴胡湯方見二十四卷第十二論

妊娠吐血衄血方論第八

妊娠吐血。繇七情臟腑所傷。氣逆於上。致血上溢不止。心悶甚者多死。或墜胎也。

宜用局方必勝散。

愚按前症若肝經怒火。先用小柴胡、山梔、生地。次用前藥合四物。後用加味逍

遙散。肝經風熱。防風子芩丸。心經有熱。硃砂安神丸。心氣不足。補心湯。思慮傷心。妙香散。胃經有火。犀角地黄湯。膏粱積熱。加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘇飲。子氣不攝血。用補中益氣湯。腎經虛火。加味六味丸。仍以七卷第五論互用。

附治驗方藥

一妊娠因怒吐血。兩脇脹痛。小便淋瀝。此怒而血蓄於上。隨火出也。用小柴胡合四物。四劑血止。用六君子安胎飲。調理而安。

紫蘇飲 治妊娠失調。胎氣不安。上攻作痛。或逆氣失血。方見十二卷第八論。若肝脾氣血虛而有火不安。宜兼逍遙散。若脾氣虛弱而不安。宜用四君芎歸。

小柴胡湯 方見二十四卷第一論

四物湯

補中益氣湯

六君子湯 三方見二十四卷第六論

加味逍遙散

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

防風子芩丸 方見十二卷第六論

硃砂安神丸 方見三卷第十論

養心湯 方見三卷第十論

妙香散 方見三卷第十一論

安胎飲 方見十二卷第一論

犀角地黄湯 方見七卷第六論

加味清胃散 方見二十四卷第一論

黃芩清肺飲 方見八卷第一論

加味六味丸 方見二十四卷第十一論

妊娠子煩方論第九

論曰。妊娠苦煩悶者。以四月受少陰君火以養精。六月受少陽相火以養氣。若母心驚膽寒。多有是症。產寶云。是心肺虛熱。或痰積於胸。若三月而煩者。但熱而已。若痰飲而煩者。吐涎惡食。大凡停痰積飲。寒熱相搏。吐甚則胎動不安。愚按前症。若因內熱。用竹葉湯。氣滯用紫蘇飲。痰滯用二陳。白朮、黃芩、枳殼。氣鬱用分氣飲。加川芎、脾胃虛弱用六君、紫蘇、山梔。

附治驗

一妊婦煩熱。吐痰惡食。惡心頭暈。此乃脾虛風痰爲患。用半夏、白朮、天麻湯。以補元氣。祛風邪。數劑漸愈。惟頭暈未痊。乃用補中益氣湯加蔓荊子。以升補陽氣而愈。

竹葉湯 治子煩。

防風

黃芩 炒

麥門冬 各一錢

白茯苓 二錢

右竹葉數片。水煎服。

人參散 治熱乘心脾。煩熱乾渴。

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮

乾葛 黃芩炒 犀角一鎊各 甘草五分

右水煎。

竹茹湯 治妊娠煩躁。或胎不安。淡竹茹一兩。水煎服之。

益母丸 知母炒為末。棗肉丸。彈子大。每服一丸。人參煎湯下。

附方

分氣飲 治脾胃虛弱。氣血不和。胸膈不利。或痰氣喘嗽。飲食少思。

陳皮 茯苓 半夏炒 桔梗炒

大腹皮 紫蘇梗 枳殼麸炒 白朮炒

山梔炒各一錢 甘草炙五分

右薑水煎服。

紫蘇飲 方見二十四卷第八論 二陳湯 方見二十四卷第五論

補中益氣湯 四卷第六論 六君子湯

妊娠煩躁口乾方論第十

足太陰脾之經。其氣通於口。手少陰心之經。其氣通於舌。若臟腑不調。氣血不和。以致內熱乘於心脾。津液消燦。故心煩口乾也。與子煩大同小異。宜用益母丸。愚按前症若胃經實火。用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用人參黃耆散。若胃經氣虛。用補中益氣湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經火動。用加味逍遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。加味地黃丸。

附治驗

一妊婦煩熱兼咽間作痛。用知母散。加山梔。以清肺經而愈。後內熱咳嗽。小便自遺。用補中益氣。加麥門、山梔。以補肺氣。滋腎水而痊。

知母

麥門冬

黃耆炒

子芩炒

赤茯苓

甘草

右水煎。入竹瀝一合。更煎二沸而服。

人參黃耆散 治身熱煩躁口乾。

人參

黃耆炒

葛根

秦艽

赤茯苓

麥門冬各一錢

知母

甘草五分

右薑三片。竹葉二七片。水煎。

補遺。人參白朮散、黃耆六一湯皆良。

附方

竹葉石膏湯

石膏一錢

半夏一錢五分

甘草

人參各一錢

麥門冬

竹葉各五分

右薑水煎服。

補中益氣湯

方見二十四卷第六論 紫蘇飲

方見十二卷第八論 加味逍遙散

加味歸脾湯二方見二十四卷第四論 加味地黃丸二方見二十四卷第十二論

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛 己立齋補註

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷十四

妊娠中風方論第一

論曰。四時八方之氣。爲風也。常以冬至之日候之。若從其鄉來者。長養萬物。否則名爲虛邪。賊害萬物。體虛中之。客於皮膚。則頑痺不仁。入於筋脈。則攣急啞僻。若兼濕熱。則弛縱痿軟。若入臟腑。氣隨所傷。經絡而爲諸病。妊娠中之。必須早治。庶免墮胎之患。

愚按。病機機要云。風本爲熱。熱勝則風動。宜以靜勝其躁。是亦養血也。治法須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損其榮。雖有汗下之形。而有中臟中腑

之分。中腑者。多着四肢。則脈浮惡寒。拘急不仁。中臟者。多着九竅。則昏緩失音。耳聾鼻塞。目瞽便秘。中腑者宜汗之。中臟者宜下之。表裏已和。宜治在經。當以大藥養之。此中風之要法。妊婦患之。亦當以此法治之。而佐以安胎之藥。仍參三卷首論主治。

防風散 治妊娠中風。卒倒口噤肢強。或痰氣上升。

防風

桑寄生

葛根各五分

家菊花

細辛

防己

秦艽

羚羊角鎊

當歸

桂心

茯神

甘草各三分

右水煎。入竹瀝半合服。

白朮酒 治妊娠中風。口噤不語。

白朮一兩

獨活一兩

黑豆一合

右酒煎。分四服。灌之。得汗即愈。

補遺。治妊娠中風。排風湯。續命湯。參蘇湯。加羌活。風引湯。皆可選用。方見第三卷中風類

妊娠風痺方論第二

論曰。妊娠體虛受風。而傷足太陽經。遇風寒相搏。則口噤背強。甚則腰反張。名之曰瘕。須臾自醒。良久復作。又名子癰。子冒。當審察其因而治之。
愚按。前症若心肝風熱。用鈎藤湯。肝脾血虛。加味逍遙散。肝脾鬱怒。加味歸脾湯。氣逆痰滯。紫蘇飲。肝火風熱。鈎藤散。脾虛痰滯。二陳薑汁。竹瀝。若兼症相雜。當參照子煩門。

附治驗

一妊婦出汗。口噤。腰背反張。時作時止。此怒動肝火也。用加味逍遙散漸愈。又用鈎藤散而止。更以四君加鈎藤。山梔。柴胡而安。
一妊婦因怒。忽仆地。良久而甦。吐痰發搐。口噤項強。用羚羊角散漸愈。更用鈎藤散始痊。又用歸脾湯而安。

羚羊角散 治妊娠冒悶。角弓反張。名曰子癰風瘕。

羚羊角鑊

獨活

酸棗仁炒

五加皮

薏苡仁炒

防風

當歸酒浸

川芎

杏仁去皮尖

茯苓

神去木各五分

木香

甘草炙各二分

右薑水煎。

附方

鈎藤湯

方見十二卷第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

紫蘇飲

方見十二卷第八論

鈎藤散

方見四卷第四論

二陳湯

方見二十四卷第五論

四君子湯

方見二十四卷第六論

妊娠瘕癥方論第二新附

竊謂瘕者筋脈急而縮也。癥者筋脈緩而伸也。一縮一伸。手足相引。搐搦不已。大抵與嬰孩發搐相似。謂之瘕癥也。此症多屬風。蓋風主搖動。駱龍吉云。心主脈。肝主筋。心屬火。肝屬木。火主熱。木主風。風火相熾。則為瘕癥也。治法若因風熱。用鈎藤湯。加柴胡、山梔、黃芩、白朮。以平肝木。降心火。養氣血。若風痰上湧。加竹瀝、南星、半夏。若風邪急搐。加全蠍、僵蠶。虧損氣血。用八珍湯。加鈎藤、山梔為主。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠者。肝氣絕也。皆不治。

附治驗方藥

一妊婦四肢不能伸。服祛風燥血之劑。遺尿痰甚。四肢抽搐。余謂肝火血燥。用八珍湯。加炒黑黃芩爲主。佐以鈎藤湯而安。後因怒。前症復作。小便下血。寒熱少寐。飲食少思。用鈎藤散。加山梔柴胡而血止。用加味逍遙散。寒熱退而得寐。用六君子湯。加芍藥鈎藤。飲食進而漸安。

八珍湯

方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

妊鬼胎方論第四

夫人臟腑調和。則血氣充實。精神健旺。若榮衛虛損。精神衰弱。妖魅之精乘之。亦如懷妊之狀。故曰鬼胎也。

愚按前症因七情脾肺虧損。氣血虛弱。行失常道。衝任乖違而致之者。乃元氣不足。病氣有餘也。若見經候不調。就行調補。庶無是症。治法以補元氣爲主。而佐以雄黃丸之類。行散之。若脾經鬱結氣逆者。用加味歸脾湯調補之。若脾虛血不足者。用六君芎歸培養之。肝火血耗者。用加味逍遙散滋抑之。肝脾鬱怒者。用加味歸脾逍遙二藥兼服。腎肝虛弱者。用六味地黃丸。

附治驗

一婦人經閉八月。肚腹漸大。面色或青或黃。用胎症之藥不應。余診視之曰。面青脈瀋。寒熱往來。肝經血病也。面黃腹大。少食體倦。脾經血病也。此鬱怒傷脾。肝之症。非胎也。不信。仍用治胎散之類。不驗。余用加味歸脾逍遙二藥。各二十餘劑。諸症稍愈。彼欲速效。別服通經丸。一服下血。昏憤自汗惡寒。手足俱冷。嘔吐不食。余用人參炮薑二劑。漸愈。又用十全大補湯。五十餘劑而安。

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛。

雄黃

鬼白去毛

莽草

丹砂細研

巴豆去皮油

獾肝炙黃各半兩

蜥蜴炙黃一枚

蜈蚣炙黃一條

除。右為末。蜜丸。桐子大。每服二丸。空心溫酒下。日二服。或下如蛇蟲之類。其病乃除。

治鬼胎。及血氣痛不可忍。

斑蝥去頭翅足製 延胡索妙各分

右為末。以溫酒調下半錢。以下穢物為度。

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

十全大補湯三方見二十四卷第四論

六君子湯方見二十四卷第六論

六味丸方見二十四卷第十一論

妊娠傷寒方論第五

夫時令嚴寒。體虛所傷。即成傷寒。輕者洒淅惡寒。翕翕發熱。微咳鼻塞。數日而愈。重者頭疼體痛。寒熱交作。久而不愈者。多致傷胎也。

愚按前症為害匪輕。當審經絡表裏而治之。不可輕忽。

加減四物湯 治妊婦腹痛。或月事不調。胎氣不安。產後血塊。或亡血過多。或惡露不下。

當歸

川芎

白芍藥炒

熟地黄各一兩

右每服四五錢。水煎。日二三服。下血加艾葉。阿膠。虛熱口乾加括蕁根。麥門冬。兼血腹痛加當歸。芍藥。血崩血淋加熟地。蒲黃。因熱生風加川芎。柴胡。頭昏項強加柴胡。黃芩。大便秘結加大黃。桃仁。嘔吐惡心加白朮。人參。虛煩不眠加竹

葉、人參、煩躁大渴。加知母、石膏、水停吐逆。加猪苓、茯苓。虛煩傷寒。加人參、柴胡、防風。

阿膠散 治時氣。先服此以安胎。却以主藥間服。

阿膠炙

白朮炒

桑寄生

人參

白茯苓

右爲末。等分。每服一錢。用糯米飲調下。日三服。

前胡湯 治傷寒頭痛壯熱。肢節煩疼。

石膏一分

前胡

甜竹茹

梔子炒

黃芩炒

大青

知母各五錢

右用葱白水煎服。

蘇木湯 治傷寒時行。洒淅寒振。或兼噦者。

赤芍藥

橘紅

黃芩炒

黃連

甘草

蘇木各五分

右用水煎服。汗出卽瘥。如胎不安。兼服阿膠湯。

黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼。嘿嘿不食。脇痛嘔痰。及產後傷風。熱入胞宮。寒熱如瘧。或經水適來。勞復熱不解散。

柴胡二錢

黃芩炒

人參

甘草各一錢

用水煎服。

柴胡石膏湯 治頭痛惡寒。身熱拘急口乾。

柴胡二錢

甘草一錢

石膏三錢

用薑水煎服。氣虛加人參。

枳實散 治傷寒四日至六日。腹脹少食。腰疼體重。

枳實炒三錢

陳皮一錢

麥門冬半錢

用生薑葱白水煎服。

旋覆花湯 治傷寒頭目旋疼。壯熱心躁。

旋覆花

赤芍藥

甘草各五錢

前胡

石膏各一錢

白朮

人參

麻黃節去根

黃芩各三錢

右用薑水煎服。

麥門冬湯 治傷寒壯熱。嘔逆頭疼。胎氣不安。

人參

石膏各半

前胡

黃芩各五分

麥門冬

葛根各一錢

右薑棗竹茹一分。用水煎服。

梔子大青湯 治發斑變黑。尿便血。

升麻

梔子各一錢

大青

杏仁

黃芩各三分

右用葱白三寸。水煎服。

白朮湯 治傷寒煩熱。頭痛胎動。或時吐逆不食。

白朮

橘紅

麥門冬

人參

前胡

赤茯苓

川芎

甘草

半夏各五分

右用生薑竹茹一分。水煎服。

夏方白朮散 治傷寒。

白朮

黃芩各二錢

右用薑棗水煎服。若四肢厥逆陰症也。不可用。

芎藭散 治外感風寒。壯熱頭疼。心胸煩悶。

紫蘇葉

川芎

白朮

白芍藥

麥門冬去心

陳皮

乾葛各五分

甘草分三

右用生薑葱白水煎。

參蘇飲

去木香

治證同前方見六卷第十二論

妊娠時氣方論第六

論曰。四季之間。非其時而有其氣。謂春寒夏冷。秋熱冬暖之不正也。所感者不拘長少。其症相類。故云時氣。妊娠患之。重者多致傷胎。

愚按。前症與前傷寒互相主治。

秦芎散 治時氣五六日。不得汗。口乾飲水。狂言嘔逆。

秦 朮

柴 胡各五

石 膏一錢

犀 角銹

赤 茯苓

前 胡

甘 草

葛 根

升 麻

黃 芩各四

右用淡竹茹一分。水煎服。

葛根飲子 治時氣煩熱。口乾頭痛。

麻 黃去節

乾 葛各半

石 膏一兩

豉一合

白 米半合

梔 子二十

葱 白二莖

右用水煎。分三服。汗出為效。

消熱飲子 治時氣六七日。大小便不利。

芒 硝一兩 細研 葵 子二兩

右如前煎服。以利為效。芒硝即朴硝

人參敗毒散方見二十四卷第十論

妊娠熱病方論第七

冬時觸冒嚴寒即病。為傷寒。藏於肌骨。夏至發為暑病。即熱症也。妊娠患之。多致墮胎。熱病與中暑相似。但熱病者脈實。中暑者脈虛。治當審察。不可概施。愚按此症與前後三症同治。

治妊娠熱病頭痛。嘔吐煩悶。

人參無一方

竹茹

葛根各一

蘆根二兩

知母三兩

麥門冬去心一兩半

右每服四錢。連根葱白三寸。水煎。

梔子仁飲 治熱病發斑黑色。小便如血。氣喘急。胎欲落。

梔子

升麻

生地黄

石膏各二錢

黃芩

大青各一兩

右每服半兩。葱白七寸。豉四十九粒。水煎。

大黃飲 治熱病六七日。大小便秘澀。

大黃

石膏各一兩

知母

前胡

赤茯苓各三兩

梔子

甘草

黃芩各半兩

右每服五錢。生地一分。煎服。

又方。伏龍肝細研。每服一錢。水調下。外用。水調塗臍下。

又方。葛根煮汁。時服一盞。

補遺蘆根湯。治熱病頭疼。心煩嘔吐。

知母四兩 青竹茹三兩

右每服五錢。生蘆根一握。糯米一撮。水煎。

梔子五物湯。治妊婦傷寒。壯熱頭痛。

梔子 前胡 知母各二兩 黃芩一兩

石膏四兩

右每服五錢。用水煎服。

升麻六物湯。治傷寒斑黑。溺血。

升麻 梔子各二兩 大青 杏仁

黃芩

右每服五錢。蔥頭水煎。

妊娠傷寒熱病防損胎方論第八

論曰。非節之氣。傷於妊婦。熱毒侵損胞胎。若不早治。多致墮胎漏血。則子母之命。亦不能全矣。

愚按前症當分察六經為主。而參於前後方論。

治妊娠傷寒身痛壯熱。

葱 白朮一

前胡

葛根

石膏各十

青黛六分

升麻八分

梔子十二

右用水煎分三服。

治妊娠傷寒大小便秘結。

前胡十分

大黃

石膏各二分

梔子仁十枚

知母

黃芩

茯苓

生薑各八分

右用水煎分三服。

治妊娠傷寒發斑忽黑。小便如血。胎欲落。

梔子 升麻各四兩 青黛二兩 石膏八兩

黃芩三兩 葱白切一升 生地黄二十枚

右用水煎。分三服。忌熱物。

又用井中泥塗心下。乾則易。二方出本事再錄有效

補遺。治妊娠熱病。先以白朮散安胎。前方見前

妊娠熱病胎死腹中方論第九

論曰。熱病以致胎死不能出者。但服黑神散。胎自下矣。

愚按。陳無擇先生曰。前症當視產母。若面赤舌青。知其子死。面青舌赤。知母死。子生。唇青吐沫。子母俱死。若雙胎。或一死一活。用黑神散。竊謂前症。宜補助產母。使其胎自下。黑神散。恐其太熱。不宜輕用。果一胎已死者。用平胃散。朴硝水。銀下之。最為穩當。庶不錯傷生者。平胃散方見後

黑神散又名烏金散。靈苑方名。肉桂散。

桂心 當歸 芍藥 甘草炙

乾薑炒

生地黃各一兩

黑豆炒去皮二兩

附子炮去皮半兩

右爲末。每服二錢。空心。用溫酒調下。

補遺。胎死用紅花酒煮汁。飲二三碗。

又方。伏龍肝爲末。溫酒調下二錢。白湯亦可。

又方。朴硝末。童子小便和熱酒調下三錢。立出。

妊娠瘧疾方論第十

論曰。妊娠病瘧。乃夏傷於暑。客於皮膚。至秋而發。陽盛則熱。陰盛則寒。陰陽相離。寒熱俱作。其發晏者。由風邪客於風府。循膂而下。衛氣至一日一夜。當大會於風府。故發日晏與早者。衛氣之行風府。日下一節。二十一日。下至尾臑。二十二日。入脊內。上注於俠衛之脈。其行九日。出缺盆。其氣既止。故發更早。其間日發者。風邪內搏五臟。橫連募原。其道遠。其氣深。其行遲。不能日作也。妊娠而發。多傷於胎。愚按。前症因脾胃虛弱。飲食停滯。或外邪所感。或鬱怒傷脾。或暑邪所伏。審係飲食停滯。用六君子加桔梗。蒼朮。藿香。外邪多而飲食少。用藿香正氣散。外邪

少而飲食多。用人參養胃湯。勞傷元氣。用補中益氣湯。若鬱怒所傷。用小柴胡兼歸脾湯。若木侮土。久而不愈。用六君子爲主。佐以安胎藥。乃參三陰三陽經而治之。

附治驗

一婦人因怒發瘧。舉發無期。久而不已。胸腹不利。飲食少思。吞酸吐痰。用六君子加柴胡、山梔。二十餘劑尋愈。但晡熱少食。又用四君子加柴胡、升麻爲主。佐以逍遙散而痊。

一妊娠瘧久不已。噯氣下氣。胸腹膨脹。食少欲嘔。便血少寐。此屬肝脾鬱怒。用歸脾湯加柴胡、山梔。漸愈。又用六君子湯加柴胡、山梔、升麻而愈。

一妊婦患瘧已愈。但寒熱少食。頭痛。晡熱內熱。此脾虛血弱也。用補中益氣湯加蔓荊子。頭痛頓止。又用六君子湯加芎歸。飲食頓進。再用逍遙散加參朮。而寒熱愈。

七寶散 治瘧疾一日一發。或一日兩發。或間日一發。

常山

厚朴薑製

青皮

陳皮

白並去

甘草炒

檳榔

草果等分

右每服半兩。酒水各一碗。煎至一盞。去渣。露一宿。發時面東溫服。良久再服。一
妊婦先寒後熱。六脈浮緊。用前散一劑而愈。

人參養胃湯 治妊娠瘧疾。寒多熱少。或但寒不熱。頭痛惡心。身痛。面色青白。脈

弦遲者。又有驅邪散。治證亦同。方見七卷第十八論

清脾湯 治妊婦瘧疾。寒少熱多。或但熱不寒。口苦舌乾。大便秘澀。不進飲食。脈

弦數者。

青皮

厚朴薑製

白朮炒

草果

茯苓

半夏炒

黃芩

柴胡

甘草炙各五分

右用薑水煎。

附方

交加散 治食瘧神效。

肉豆蔻生一箇一煨

草豆蔻生一箇一煨

甘草炒半生

厚朴炒半生

生薑一兩半煨半生

右用薑水煎發日五更服。

仲景白虎加桂枝湯 治溫瘧。

知母六錢

桂枝

黃芩各一錢

栝樓根二錢

甘草炙

牡蠣

乾薑各一錢

右用水煎服。汗出即愈。此少陽經藥也。

桂枝羌活湯 治瘧處暑以前頭痛脈浮惡風有汗。

桂枝

羌活

防風

甘草各一錢五分

右水煎發服。吐加半夏麩。

麻黃羌活湯 治症如前。但惡寒無汗。

麻黃去節

羌活

防風

甘草各半兩

右如前服。加法同二方。太陽經藥也。

白芷湯 治瘧身熱目痛熱多寒少脈長。先以大柴胡下之。微利為度。餘熱不盡。

當服此湯。

白芷一兩 知母七錢 石膏四兩

右粗末。依前服。陽明經藥也。

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱不論先後。此太陽陽明合病。寒熱作則必戰。經曰。熱勝而動也。發熱則必汗泄。經曰。汗出不愈。知內熱也。乃陽盛陰虛之證。此湯主之。否則久而傳於陰經矣。

桂五分 黃耆 知母 石膏

芍藥各二錢

右粗末。水煎。此太陽陽明經藥也。

桂枝黃芩湯 如服前藥轉甚。三陽合病也。宜此和之。

柴胡五分 黃芩 人參 甘草各八分

半夏 石膏 知母各五分

右每粗末。依前服。如外邪已解而內未已。再服下藥。從卯至午發。大柴胡下之。從午至酉發。邪氣在內也。大承氣下之。從酉至子發。或至寅發。邪氣在血也。桃仁承氣湯下之。微利後。更以小柴胡湯徹其邪氣。按此太陽陽明少陽經藥也。

以上諸方。並係發風寒暑熱之氣。自外而入。中於三陽之經者也。

桂枝石膏湯 治瘧疾隔日。先寒後熱。寒少熱多。

桂枝五錢 石膏五錢一兩 知母五錢一兩 黃芩一兩

右分三服。水煎。此太陽陽明經藥也。隔日發者。邪氣所舍深者也。

麻黃黃芩湯 治瘧發如前症而夜發者。

麻黃一兩 黃芩五分 甘草三錢 黃芩五分 桂枝二錢

桃仁三十箇 去皮尖

右依前服。桃仁味苦甘辛。肝者血之海。血驟則肝氣燥。經所謂肝苦急。急食甘以緩之。故桃仁散血緩肝。謂邪氣深遠而入血。故夜發。乃陰經有邪。此湯發散血中風寒。治風暑深入陰分。乃血受病。邪氣所舍尤深者也。麻黃、桂枝、桃仁等。乃太陰經血藥。非三陰經藥也。

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

藿香正氣散

方見二十一卷第十論

人參養胃湯

方見七卷第十八論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

逍遙散

加味歸脾湯二方見二十四卷第四論

妊娠霍亂方論第十一

夫飲食過度。觸冒風冷。陰陽不和。清濁相干。謂之霍亂。其間或先吐。或腹痛吐利。是因於熱也。若頭痛體疼發熱。是挾風邪也。若風折皮膚。則氣不宣通。而風熱上衝爲頭痛。若風入腸胃。則洩利嘔吐。甚則手足逆冷。此陽氣暴竭。謂之四逆。妊娠患之。多致傷胎也。

愚按前症。若因內傷飲食。外感風寒。用藿香正氣散。若因飲食停滯。用平胃散。果脾胃頓傷。陽氣虛寒。手足逆冷者。須用溫補之劑。治當詳審。毋使動胎也。

附治驗

一妊婦霍亂已止。但不進飲食。口內味酸。泛行消導寬中。余曰。此胃氣傷而虛熱也。當用四君子湯。彼不信。乃服人參養胃湯。嘔吐酸水。其胎不安。是藥復傷也。仍與四君子湯。俾煎熟。令患者先嗅藥氣。不作嘔。則呷少許。恐復嘔。則胎爲釣動也。如是旬餘而愈。

人參散 治脾胃虛寒。霍亂吐瀉。心煩腹痛。飲食不入。

人參

厚朴薑製

橘紅各一錢

歸

乾薑炮

甘草炙各五分

右用棗水煎服。

人參白朮散 治脾胃虛弱吐瀉。或吐瀉作渴不食。

白朮

茯苓

人參

甘草炒

木香

藿香各五分

乾葛一錢

右用水煎服。吐甚加生薑汁頻飲之。

縮脾飲 解伏熱。除煩渴。消暑毒。止吐瀉。宜沉冷頻服。

草果仁四兩

烏梅肉三兩

甘草炒二兩

右每服半兩。用薑十片水煎。

木瓜煎 治吐瀉轉筋悶絕。

吳茱萸湯炮

生薑切各

木瓜木刀切

右每服二三錢。用水煎。