

醫方類聚卷之二百十八

婦人門 十三

心腹痛 二

朱氏集驗方

血氣

附諸痛

十味養榮湯治婦人氣血不足臍腹疝痛月

水不調

熟地黃酒洗 黃芪蜜炙各二兩半 牡丹皮炒 五味子
 肉桂去皮 白芍藥炒 白茯苓各壹兩 當歸酒浸 川



芎各一兩半 甘草七錢

右咬咀煎服

四神散治男子婦人壹切氣痛不可忍者

白芍藥 良薑煨 甘草炙各壹兩 香附子壹兩半炒

右為末每二錢酒調服煎亦好水瀉紫蘇

生薑煎赤白痢米飲下

活血飲子治婦人血氣衝心

當歸 菖蒲

右二味等分為細末酒調下壹錢

香桂散治婦人血刺心腹疼痛

當歸 肉桂各等分

右為末每服二錢水壹盞入醋少許煎七

分空心熱服

通隔散治婦人心腹刺痛寒熱往來

蓬朮 延胡索 北芍藥 當歸 川芎

甘草 牡丹皮

右等分細末每服貳錢薑酒調服

分經散治婦人血氣心痛及遍身手足疼痛

及經血不涌前皆治之

紅花 蘇木 乳香 沒藥 敗薑 薑
黃 當歸 芍藥 川芎 木通 甘草
蓬朮煨 生地黃 玄胡索 牡丹皮 川凌
霄花

右為細末每服二大錢空心溫酒調下壹
日三服加血竭玳瑁尤佳湘中黃應明三
世業醫用之有效

大烏金丸治婦人心腹刺痛身體疼痛心惡

產前產後惡露不下疼痛不已如經盛行則
去白芷延胡索

當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 附子

肉桂 沉香各壹兩 延胡索 粉草 香附

子 乳香 縮砂仁 敗姜 白芷 蒲

黃 薑黃 檳榔各半兩 白茯苓 丁香

白朮各二兩 沒藥 人參各二錢

右細末酒糊為丸如彈子大百草霜為衣
每服一粒當歸酒下或嚼薑嚼下或作糖

桐子大則加丸數真有奇効

玄胡索散治婦人血氣攻心痛不可忍併走

注

蓬莪朮

半斤麻由煎
乘熱切片子

玄胡索

二錢

右細末淡醋湯調下空心

加味建中湯治女人虛敗腹痛小黃耆建中

湯加當歸琥珀木香煎見効

神保丸治婦人小腹痛服諸藥不愈遂服

神保丸利數行而愈又有婦人小腹痛服

經進 金露丸而愈此不可不知

神功八味丸治中年婦人氣衝心小腹痛飲

食不納脉沉緊左尺虛遍藥不効梁國佐

方蘇子降氣湯下八味丸此藥自合方好

加味四物湯治經候不調腹中疼痛或脚氣

衝心四物湯加琥珀煎見効并醋壹合煎

立効

單方治婦人遇月經來則小腹痛脚膝疼遍

服藥不効

香附子 半酒半醋浸
培又浸炒

右為末或為丸任意空心下病猶未除後
用艾脇湯加少附子併此藥服梁國佐已
効方

香附子飲治婦人真心痛大范張醫方

良薑 麻油炒 蒼朮 鹽炒 香附子 石灰炒
各等分

右為末用燈心煎湯空心調下

加減四物湯治婦人慾念不遂心膈迷悶刺

痛四物湯壹貼加 橘紅 香附子 玄

胡索 各半
兩

芍藥湯治婦人脇痛 得効方治
冷証脇痛 丸藥不進

香附子 肆兩黃子
為度 得効方 三椀作二升 肉

桂 延胡索 炒 白芍藥

右細末每服二錢沸湯調無時服常壹婦

人年八十餘忽兩脇痛甚服此而愈

嚴氏濟生方

散其血氣 不歸血氣

玄胡索湯治婦人室女七情傷感遂使血與

氣併心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搖擗經候不調但是一切血氣疼痛並可服之

當歸去蘆酒浸剉炒玄胡索炒去皮蒲黃炒赤芍藥

官桂不見火片子薑黃洗○醫方集成承類鈐方叁錢南北

經驗方方袖乳香集成沒藥木香不見火

珍方半兩甘草錢半

右咬咀每服四錢水壹盞半諸方壹盞生薑七

片煎至七分去滓食前溫服吐逆加半夏

橘紅各半兩得效方同

琥珀散治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍

腹疔痛不可忍及惡露不下血上攻心迷悶

不省應有血氣腹痛並皆治之

牡丹皮去木赤芍藥 蓬莪朮剉荆三稜剉

得效方各用煨劉寄奴去梗熟地黃酒蒸○得效方酒炒醫方集成

南北經方玄胡索炒去皮當歸去蘆酒浸烏藥

官桂不見火各壹兩○袖珍方壹方用菊花蒲黃炒各壹兩

右用前五味用烏豆壹升生姜半斤切片

米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味
同為細末每服二錢用溫酒調服空心食
前

三神圓治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心
端經行澁少或經事不調以致疼痛

橘紅兩

二玄胡索

去皮醋

當歸

去蘆酒浸制
略炒膏兩

右為細末酒煮米糊為圓如梧桐子大每
服七十圓加至膏百圓空心艾湯送下米
飲亦得

得效方衛生易簡方同醫方集成
南北經驗方袖珍方永類鈔方徐

氏胎產方
艾醋湯下

婦人大全良方

婦人血氣心痛方

雞舌香散治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑

判細麻
油炒

桂心

赤芍藥

等

右為細末每服二錢水壹錢入塩木瓜三
片同煎七分溫服鹽湯點亦可血氣痲痕
痛用熟醋湯調下忌生冷

應痛散治心脾痛不可忍者婦人脾血氣作

心脾痛尤効方同只無桂心用醋煎醋湯
點亦可 乙丑年春初次女年十五經脉
未行忽壹日心痛如刺吐飲不止脉沉緩
弦細以蘇合香元沉香元神保元理中元
呵子散七氣湯皆無効僕思之此證非由
即飲作梗非局方九痛元則不可遂合就
服壹二元即愈

陳氏二神元治婦人血氣不和作痛不止及
下血無時月水不調

真蒲黃炒 葶撥炒

右等分爲細末煉蜜員如梧桐子大每服
三十員空心溫酒吞下如不能飲米飲下
兩服即止得效方同

陳日華抽刀散治婦人血風血氣等疾武興
我司機宜候愷云見一道人用此方療病不
壹而足遂以爲獻真是奇妙

五靈脂炒 莪茂 桂心 雲臺子炒

右爲末每服二大錢酒半瓊水半瓊煎至

八分病作熱服得效方同

失笑散方見產後

呵子散見方霍亂

靈苑方治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂

為細末每服膏錢酒壹瓖煎沸熱服

婦人血氣心腹疼痛方

沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露

不行兒枕塊痛出經驗方

血竭 沒藥並細研○得效方火熨細研 桂心 當歸

得效方 蒲黃 紅花 木香 延胡索

去尾 乾漆炒 赤芍藥等分

右為細末每服二錢熱酒調下食前服按

方同

治血塊衝心叫噉其痛至危者如嗅不得可

灌下未詳

右用真大順散三錢熱酒調服立止按梓方同

瑞金散治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔

吐疼痛及月信不通

片子薑黃兩牡丹皮 莪茂 紅花 當

歸 赤芍藥 川芎 桂心 延胡索各

半。永類鈔方已上八味各半兩

右為末每服二錢袖珍方水壹錢酒三分

煎七分袖珍方溫服日三次袖珍方去滓通口食前

八僊散治血氣心腹疔痛立驗

當歸 厚朴 芍藥 枳殼製人參各四

甘草 茯苓各五分肉荳蔻二分

右為末水二升煎取八合空心分三服永類

鈐方同

八僊散治婦人血氣心腹疔痛立驗靈苑方

棕櫚二兩當歸乙兩並判碎一麝香乙錢細研

右同研令停每服壹錢溫酒調下

不換金散治婦人血刺痛不可忍者靈苑方

三稜 莪茂並細巴豆去皮各乙兩

右三味以醎醋壹椀熬醋成膏為度先將

糠固濟壹罐子陰乾後將藥并醋膏一處

置罐子中外用泥裹以平瓦子壹片蓋之

用炭火五七斤煨常看守却候煙急出即取出看通黑則止不得燒過了便入乳鉢內細研爲末有患者炒生薑酒調壹錢服定命散治婦人急血氣

靈苑方

大生烏頭去皮尖牡丹皮

桂心各乙兩

右爲細末每服壹錢酒半錢童子小便半錢煎至七分溫服如婦人血瘦血氣胎血積聚上衝心膈須臾欲絕者用酒壹錢生薑壹片煎至七分去滓通口服

大効琥珀散治婦人心膈迷悶腹臧拍撮痛疼氣急氣悶月信不調等疾

靈苑方

烏藥 莪茂

各二兩○補常歸一兩

右並生爲細末溫酒調二錢服服後以食壓之忌生冷油膩等物如是產後諸疾炒生薑酒調下

承類方同

治血氣不調臍下痛

桑耳 菴藺子 桂心 土瓜根 赤茯苓 大黃

各四分

甘草 牛膝

赤茯苓

各五分

大黃

白芍藥各六分 乾地黄八分

右為末煉蜜元如梧桐子大醋湯吞下二十元

獨痛散治婦人血氣刺痛壽域神方壯腹血氣刺痛

荔枝核燒存性半兩 香附子去毛炒乙兩

右為細末塩湯米飲調下二錢不拘時候

服永類鈔方同袖珍方壽域神方食前服

沒藥散治婦人血氣疼痛不可忍者出博濟方

紅花 沒藥 當歸 延胡索炒

右等分為末每服二錢童子小便酒各半

蓋同煎至六分熱服只用秤錘淬過袖珍方用

秤錘火調亦可常服只用盪酒朱氏集驗方同

牡丹散治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼

痛不思飲食出衛生方

牡丹皮 桂心袖珍方 當歸 延胡索各

兩 莪茂 牛膝 赤芍藥各二兩 荆三稜乙

半○拔粹 方半兩

右爲粗末每服三錢水壹錢酒半錢按粹

酒各前七分溫服永類鈔方同補珍方每

煎至八分去滓服八錢水壹盞酒半盞

至聖湯治婦人血氣產前產後百疾出全

當歸 芍藥 乾薑 莪茂 桂心 地

黃 蒲黃炒各半兩 黑豆炒去皮乙兩

右爲細末空心熟酒調下貳錢永類鈔方同

天僊散方見產後 葱白散方見積聚 琥珀散方見調經

治婦人腹脇刺痛以局方七氣湯加延胡索

少許同煎服 若胃膈不快惡心更間服

局方烏沉湯兼治月水不調或前或後

菖蒲元治婦人脾血積氣及心脾疼男六德續添

菖蒲攻節者陸兩 吳茱萸炮 香附子炒去毛各四兩

右參味並剉細以醞醋五升煮乾爲度焙

乾爲細末以好神麴打糊爲元如梧桐子

大空心食前以淡薑湯吞下四五十元日

三服橘皮湯亦好永類鈔方同

治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月水不

調面色痿黃喫袖珍方作飲食減少及產後諸疾

並皆治之延胡索散

延胡索生三稜生當歸去蘆酒浸莪朮醋浸少時各等

分

右為末每服貳錢空心温酒調如血氣發

甚者及月水不調並皆童子小便酒紅花

同煎調下

治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦乏力月候

不調當歸煎元

當歸二兩別未檳榔 赤芍藥 牡丹皮 延

胡索各壹兩

右除袖珍方作用當歸末用米醋熬成膏入眾

藥末和負如梧桐子大空心温酒下二十

元午食前再服

治婦人積年血氣攻刺心腹疼痛不可忍者

及多方醫療未差宜服神聖北亭元靈苑方

北亭去砂石研沒藥 木香 當歸各壹分 芫花

莪朮各半兩 巴豆去皮膜心肆十粒

右先研北亭沒藥巴豆如粉用好米醋參
 升同煮為稀膏然後將餘四味為細末入
 於膏內搜合成塊用新瓦合盛之臨時加
 減元數用酒醋各半殘煎數沸通口服不
 得嚼破仍須喫盡酒醋立差或男子元氣
 亦依前方服食如急喉閉者男左女右以
 豈元鼻中嗅之立愈其中云臨時加減員
 數皆不云大小數目詳之古人亦鹵莽也
 既有北亭芫花巴豆合當員如綠豆大每

服只五元

治產前產後血氣不和及一切痰琥珀散

當歸微炒川芎各壹兩赤芍藥二兩莪茂壹兩

右為末每服二錢空心溫酒調下如腰腹

痛加陳皮去白半兩乾薑炮半兩為末同

和停如不喫酒以水壹錢煎至七分溫服

婦人血氣小腹疼痛方

追氣元治婦人血刺小腹疼痛不可忍靈苑方

芸臺子微炒桂心各乙兩良薑半兩

右爲細末醋糊元如梧桐子大每服五員
無時淡醋湯下常服補血虛被氣塊其有
效

石灰散治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方
出婦人經

方驗

右取猪貼瘡血半錢於湯上煖用杖子攪
停後用石灰於火上燒令黃爲末羅過入
灰壹錢同血攪停放温服立愈

婦人兩脇脹痛方

人參紫金元治婦人榮衛不和心腹刺痛胃

膈脹滿不思飲食饒武博方

紫金皮 蒼朮 石菖蒲各乙 香附子二兩

人參半兩 木香錢三

右爲末米糊和員如梧桐子大每服三十
元食後薑湯下

痛 氣針元治久積風壅疎利滯氣空胃膈止刺

木香 青皮去白 大黃炮 檳榔各乙 黑牽牛

二附半
生半炒

右爲末煉蜜員如梧桐子大溫水下三十元鄧安人年五十忽然氣痛投神保元愈不壹二日再痛冉服神保元六七十粒大腑不通其疾轉甚亦有要用沉香木香姜桂等藥而未敢投痛甚則築心築背築定兩脇似有兩柴十字插定心脇叫聲徹天召僕診之六脉沉伏乍來乍去衆問僕診脉吉凶何如荅曰夫九痛之脉不可準也

但以證辨用藥觀其人質肥偉問其大腑數日不通僕曰實痛也其腹必脹但以人按之痛甚手不可向邇此大實也經云大滿大實者可下之用氣針元五六百粒是夜卽愈又己未在金陵有家提幹之上下巽內人病心腹脹痛衆醫投木香沉香檳榔大腹芍藥姜桂之類病益甚召僕診之六脉弦緊而和不似病脉但診之時兩手如火以此知其實痛也衆問如何治療僕

日大凡心腹刺痛不可便作虛冷治之有二醫答曰非冷而何熱即生風冷生氣是也僕曰不然難經云虛則拜實則痛又仲景云腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯家提幹云荆布素來質弱僕曰有可辨處遇痛時使壹婢按之若痛止是虛寒證也若按之轉甚手不可近此實痛也即令壹婢按之手不可近叫喚異常僕曰此實熱無可疑者當用大柴胡湯治之

衆皆不許僕責狀而投之八服愈逍遙散亦妙男壹正補遺

論脇肋疼痛服木通散亦可治男子

理方

心下脇肋少腹疼痛皆素有積寒而溫煖湯散亦可主治甚者以溫藥下之心下與小腹痛諸書並有效方而脇肋下痛鮮獲治法此木通散治脇肋苦痛偏効併心下脇肋并小腹牽引痛者皆主之

類聚 卷六 十一

木通去皮 青皮去 川練子去皮核各乙兩

豆半兩砂黃 蘿蔔子炒 舶上茴香乙兩 莪

茂 木香 滑石各半

右為細末煎葱白酒袖珍方 調三錢壹服

愈甚者不過再服得效

三腕散治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮

腫大便祕澀兼治脚氣

大腹皮 紫蘇 沉香 乾木瓜 獨活

各一 白朮 川芎 木香 甘草 陳皮

檳榔各三分 袖珍方

右咬咀每服三錢水壹錢煎至七分去滓

三空心熱服日中服袖珍方 右咬咀水二盞

後戊午秋在京城有一婦人中焦虛痞腹

脇脹痛大便祕結六脉虛弱更數醫服藥

無効僕投此藥不終劑而愈

婦人心腹脹滿方

檳榔散治婦人稟賦實熱一方作 心腹脹

滿不欲飲食

類聚書

檳榔 前胡 川芎 青皮三分 赤芍藥

桂心袖珍方 大黃 苦梗 木香 枳殼

各半 甘草乙

右為收阻每服四錢薑三片煎至七分袖珍

方每服一兩姜三斤 去滓溫服無時

局方分心氣飲亦妙方見

三腕散亦妙方見

御藥院方

靈寶散治血氣刺痛引兩脇疼痛及疝瘕刺

氣醫方大成集戌南

丁香 木香 乳香各壹兩半 當歸 玄胡索

白芍藥各半兩

右件為細末每服壹錢袖珍方 溫酒調下

食前

抽刀散治婦人心腹脇助疼痛不可忍者產

前產後用尤佳

川烏頭炮去皮臍 牡丹皮 芍藥 乾姜炮 桂

心 沒藥 當歸此方無分兩

類聚書

右為細末每服二錢熱酒調下下過三服
輕可壹服効產後加紅花藥
得効方

血氣
失笑散治血氣心腹刺痛欲死諸藥不效服
此頓愈

五靈脂 時後方淨好者 蒲黃 微炒各等分

右為末先用二錢醋調熬成膏入水壹盞
煎七分 附後方用好醋壹杓熬成膏再入水壹盞同煎至七分 食前

熱服 衛生易簡方同

奇方治血氣痛遊走及腰痛右用莪朮切片
乾漆打碎各二兩同炒令漆蕉香取出漆
不用只以莪朮為末溫酒調下三錢腰痛
胡桃酒下遊走痛冷水調下 經驗良方同

手拈散治血氣刺痛不可忍者及諸般氣痛
方見大方科心痛門

煮附圓治血氣絞刺痛 方見經
三稜煎圓治血氣痞滿刺痛大效 方見大方科諸氣門

類聚書

三

心痛

九痛圓治九種心痛一蟲二疰三風四悸五
食六飲七冷八熱九者去來此悉主之又治
連年積冷流注心胃疼痛并療冷氣衝上落
馬墮車瘀血等疾

狼毒半兩 乾薑

人參

各乙兩

附子

炮去用皮三兩

柴

黃乙兩

巴豆

去皮心膜炒乾取乙兩

右為末煉蜜和圓梧桐子大每服壹圓空

心溫酒下卒中惡心腹脹痛口不能言者

服二圓立安

奇方治血刺心痛右用玄胡索不以多少新

瓦上炒微黃不可焦為末每服三錢酒壹

盃煎服或陳米飲不炒亦可用酒服効速

經驗良方同澹軒方為細末酒煎半盞

又治急心痛南康真蚌粉為末炒赤以酒調

熱服經驗良方同

腹痛

北亭圓治久積冷氣腹痛傍攻兩脇或上心

間刺痛發歇無時羸弱減食經年不愈或加

嘔吐

方見大方
科諸虛門

當歸建中湯亦效

方見大方
科心腹痛門

奇方治臍腹刺痛不省人事壹服立止若因
為心氣痛誤矣

白芍藥 五靈脂

木通

去皮用
各五錢

右剉散每服四錢醋壹盞煎一二沸再入
水壹盃再煎三沸去滓空心溫服

經驗良
方同

脇痛

廉氣散治兩脇刺痛攻心

方見大方
科諸氣門

澹軒方

心腹痛

布裏搥如壹彈丸燒紅酒服便心寬不然炒

豆熱投酒急服當時病亦安

半血氣痛

婦人腹痛實難當等分烏梅并白姜存性燒

灰為細末米湯溫酒服之良

肘後方

腹常絞痛者甘草炙芍藥各二兩伏苓桂心各三兩水七升煮取二升半分再服之

經驗方治血氣攪撮不可忍者黑狗膽壹箇半乾半濕割開以篋子排丸如菉豆大蛤粉裹過每服五丸燒生鐵淬酒下其痛立止

圖經曰治婦人內傷痛楚又治血暈及臍腹疔刺者沒藥一物研細溫酒調膏錢便止

衛生易簡方同

衛生寶鑑

臍脹治驗

范郎中夫人中統五年八月二十日先因勞役飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿且食則嘔暮不能食兩脇刺痛診其脉絃而細黃帝針經五亂篇云清氣在陰濁氣在陽亂於胷中是以大惋內經曰清氣在下則生殮泄濁氣在上則生臍脹此陰陽返作病之逆從也至夜濁陰之氣當降而不降臍脹尤甚

又云臟寒生滿病人抵陽主運化飲食倦勞
損傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故
爲脹滿先灸中脘穴乃胃之募引胃中生發
之氣上行次處
木香須氣湯治之

蒼朮 吳茱萸 各五分 湯洗 木香 厚朴 薑陳

皮 薑屑 各三分 當歸 益智仁 白茯苓

去澤瀉 柴胡 青皮 半夏 湯升麻

草薺 各二分 麵裏煨

右拾五味咬咀作壹服水貳錢煎至壹錢
去粗稍熱服食前忌生冷硬物及怒氣數
日長愈內經云留者行之結者散之以柴
胡升麻若干行少陽陽明二經發散清氣
運行陽分故以爲君生薑半夏豆蔻益智
辛甘大溫消散大寒故以爲臣厚朴木香
蒼朮青皮辛苦大溫通順滯氣當歸陳皮
人參辛甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不
降以苦泄之吳茱萸苦熱泄之者也氣之

薄者陽中之陰茯苓甘草澤瀉鹹平氣薄
引導濁陰之氣自天而下故以為佐使也
氣味相合散之泄之上之下之使清濁之
氣各安其位也

居家必用

破氣湯治婦人氣上逆作痛脘膈滿悶

烏藥 香附子各一兩 紫蘇葉 橘紅 檀

香 片子姜黃 縮砂仁 甘草各半兩

右為粗末每服半兩生薑三片葱白二枚

水二盞煎至壹大盞濾去滓入磨化沉香
汁木香汁各壹呷服之

拔粹方

勻氣散治脇痛

山梔子 熟地香 大扶苓 細辛 桂

川芎各等分

右為末羊脂煎服

瑞竹堂方

沉香散治婦人一切血氣刺痛不可忍者及

男子冷氣痛並皆治之

沉香 木香 當歸 白茯苓 白芍藥

已上各一錢

右爲咬咀每服壹錢水三盞於銀石器內不用銅鐵器文武火煎數沸入全陳皮壹个又煎十數沸入好醋壹盞又煎十數沸入乳香沒藥如皂角子大壹塊同煎至一盞去滓通口服不拘時候

袖珍方

婦人血虛心痛

四物 加炒黃栢 牡丹皮 青皮

右咬咀每服八錢水盞半紅花少許煎至八分去滓通口服不拘時候服

通經散

班毛去翅 蚩虫各四十枚 杜牛膝一兩 當歸 紅花各三錢 滑石一錢

右爲細末每服一錢用桃仁七个研細溫酒調下食前服

永類鈴方

血氣心痛血氣心腹疼痛血氣少腹疼

痛心脾痛脇痛

和劑大温經湯

方見調經

吳茱萸湯

方見通治

椒紅元

方見調經伏龍肝散

方見調經

聚寶丹內炙散

方並見通治

紅花當歸散並治血氣刺痛等証

方見調經

御藥院靈寶散治血氣冷氣疼痛攻引兩脇

楊氏磨積元治血積氣膨脹刺痛

三因小三稜煎治癥瘕瘦塊刺痛

方並見積聚

大全通經元琥珀散

方並見調經

本事異功散治婦人血氣虛冷時發刺痛頭

目昏悶四肢無力寒熱往來勞倦

牡丹皮 芍藥 白芷 乾姜 各二錢 當歸

玄胡索 陳皮 桂心 川芎 烏藥

苦梗 各半兩

右為末每二錢姜三片酒水各半盞煎溫

百服 蘇合香散 人參血八分 蘇合香散

濟生三神元當歸煎卷柏元 方並見調經 琥珀元

方見六合湯方見
積聚調經

百一選方桂香散婦人脾血久冷時作腹痛

泄瀉

草薺寇去殼炒甘草白朮良姜炒砂仁

各乙青皮淨炒訶子肉各半兩肉桂生薑

厚朴製棗肉各壹兩小壹碗爛煮

右為末每三錢入塩少許空心沸湯點服

大全交加散治榮衛不和月經湛濁大能滋

養血絡逐散惡血臍腹撮痛腰腿重墜

生薑十二兩生地黄壹斤研取自然汁白芍藥延

胡索煨去皮當歸桂心各壹兩紅花炒無惡血不用

沒藥別研各半兩蒲黃壹兩隔紙炒

右細末每二錢温酒調月經不調蘇木湯

腰痛糖棗子煎酒調下

經驗良方

手拈散治婦人血氣刺痛不可忍者亦治諸

般氣痛

草菓煨玄胡索炒五靈脂揀去砂石炒各壹兩沒藥

五錢

右為末酒調二三錢服

治婦人血氣刺痛

香附子

壹二斗
皆可

右法春令極淨用沙罐張盛米醋煮令極久壹日夜取出炒乾為末壹兩用甘草三錢為末鹽湯煎酒任下亦治血崩不止

治婦人血氣撮痛

芸薹子

隔紙炒
半兩

沒藥

三錢

赤芍藥

當歸

莪朮

各壹兩

右為末每服二錢熱酒調下

紫金散治婦人血氣刺心痛

紫金藤

壹兩米泔浸
壹宿焙乾末

右每服二錢用鐵秤槌燒紅淬酒溫下

丁香湯治婦人卒心痛右取室女頭髮一塊

如雞子大燒為灰入丁香七箇同研細熱

酒調下半錢

吳氏集
驗方同

芸薹散治婦人血氣疼痛不可忍

芸薹子 紅花 五靈脂 延胡索 各半兩

三稜 莪朮 各壹兩

右為末每服二錢熱酒調下

抽刀散治婦人一切冷血氣

大川烏 壹兩炮去皮尖炒黃色 五靈脂 良姜 芸

薹子 隔紙炒各半兩

右為末酒醋各半盞煎至七分溫服

治婦人血氣刺痛

神麩 香附 各炒赤

右等分為末熱酒下

治老婦血氣痛不可忍

老松皮 用醋煮乾 延胡索 各等分

右為末秤錘燈紅淬酒調下愈再進酒

治婦人血氣衝心欲死者

芫花 三錢 吳茱萸 五錢 雞查干 細薑 各

右為末炒姜酒下

治婦人血氣痿痛不用火塘煤壹掬細末炒

令煙起再用生薑壹塊連皮槌碎炒至煙

起入久審酒壹升同煎至壹半濾去滓通
口服

治婦人血氣腹痛經候或多或少

蔓荊子 香附子 猴查子 晚蠶沙 各分

右咬咀炒焦酒淬去滓服未愈再服即愈

內灸散治婦人血氣刺痛不可忍者

莪朮 良姜 等分

右爲細末熱酒調服無時

醫林方

如聖丸治婦人心腹痛氣衝上不省人事邪
風透入小腸咳嗽兩脇積血成片

馬兜苓 兩 山梔子 一兩 紅芍藥 一兩 沒藥 錢二

歸 兩 定風草 兩 防風 兩 乳香 錢二 五苓脂 兩

玄胡索 兩 乾漆 兩 令煙出

右爲細末酒麩糊爲丸如桐子大每服三

艾十丸空心服如腹痛乳香湯下咳嗽人參

杏仁湯下人血尿發寒熱

走馬散治婦人血氣發來似刀攪腸胃刺痛及血氣衝心痛死

當歸一兩沒藥 紅花 官桂 芍藥 蘇

木 青皮湯浸去皮已上各二錢半

右為細末每服三錢酒壹中盞同煎和滓温服來日再服未止再服

聖金散治婦人一切心腹脇肋痛疼不可忍者血虛痛諸藥無效者一服即愈

御米殼半兩鳳眼草三錢甘草二錢陳皮二錢

夫縮砂三錢白

右為細末每服三錢水壹中盞乳香同煎至八分和滓温服治痛之仙藥也

和血膏治婦人乾血氣癆

輕粉半錢硃砂二錢白馬駝半兩大麥節芭草

兩半白麵兩神麴兩惜苓兩脂兩巴豆四十個去皮麩裏燒拾个醋煮拾个油沙拾个漿水煮拾个

右為細末小油調合子內盛之每服壹錢紅花酒調下服取下黑水為效後服滋血

湯

血極膏治婦人乾血氣

川大黃

一兩 醞醋一升

右二味熬成膏子丸如雞子大每服壹丸

熬酒化開臨卧温服大便利一二行後紅

脉自下此藥是破婦人經水之仙藥也不

可不用

治婦人血氣刺痛不可忍者

雲臺子

肉桂

良薑

沒藥

各等分

右為末每服二錢乳香酒調下熱服不拘時候

煙霞聖効方

治婦人患心疼

蓮蓬

去蒂 倍乾

右為末每服壹錢熱酒調服乾即愈

吳氏集驗方

當歸散治血氣心腹痛

備預百要方 名四神散

當歸 芍藥 二川芎

各壹兩 乾姜 壹分 〇百要方半兩

右為末每服二錢溫酒調下

事林廣記

婦人心痛荔枝核燒灰存性為末淡醋湯下
仙傳濟陰方

腹常痛

經年積血在關元日夜呻吟不得眠青皮烏
藥姜香附莪朮三稜方得痊

凡婦人腹中常痛上下不足經年積血也
立効散

青皮 陳皮 烏藥 干姜 香附子

莪朮 三稜

右醋煮焙乾為末空心陳皮湯下

消痛元

干漆半兩 良姜一兩 三稜半兩 斑猫三介

右醋壹升煮干焙為末醋糊丸每服三十
丸醋湯下姜湯亦可

又方三稜 莪朮各四兩 青皮 麥芽 半夏

各四兩

右醋六升煮干焙為末醋糊丸每服二十
元醋湯或姜湯下

脇下刺痛

兩旁脇痛氣不通或時冲下氣連胸烏沉香
附玄胡索七氣湯中加減功

凡婦人兩脇痛小腹疼至胸背乃氣不順
也

加減七氣湯

人參三錢桂三錢半夏四錢甘草二錢沉香二錢玄胡

索二錢烏藥五錢香附子二錢

右姜煎不拘時煎服

小腸滿痛

血在三焦滿腹間或時淋瀝小便難萬靈散
子通神用熱酒調加三兩食

比婦人小腹痛是血也熱也氣也注於三
焦之內流於膀胱之中小便淋也或大小

產後是遺經敗血所致

萬靈散

桂半當歸兩一莪木半香三錢地黃六

右為末熱酒調下又以小建中湯補之小

便淋瀝八正散本事方桃仁煎

背心疼痛

心生血者資脾養或因怒氣在於心就使背

心相對痛烏頭妙劑最為靈

凡婦人心能生血脾能養血或因怒氣冲

犯於心致使氣血相搏在於胸膈故背心

相對痛烏頭元主之

烏頭丸

川烏一川椒一桂一赤石脂半附子兩

炮一介狼毒半良姜兩

右為末蜜丸每服十九空心溫酒米湯任

下

腹內脹痛

腹脹因緣氣血虛因而食積損於脾硯砂丸

子頻頻服不得消時蠱有餘

凡婦人心生脹或腹內脹虛劣血氣因食

生冷傷於脾或月候不行血注於脾致使然也若不甦脾順氣終成蠱疾難治

硃砂丸

硃砂三兩三稜三錢青皮三錢川椒三錢干漆三錢

厚朴二錢

右為末醋糊丸每服三十丸姜湯下

衛生易簡方

治婦人小腹痛面青或黃或赤或黑不能喘息用苦參壹兩為末醋壹盞半煮八分作

二服

又方用禹餘糧石為末每服二錢匕米飲調下日二三服極効

醫集
三

朱氏集驗方

腰脚

附臂痛 項筋強痛

目錄

論

聖惠方

治婦人腰脚疼痛諸方

酸棗人散 骨碎補散 仙靈脾散 藁

本散 琥珀散 敗龜散 附子丸 虎

骨丸 革薺丸 海桐皮丸 牛膝丸

附子散 葳靈仙散

朱氏集驗方

項筋強痛

三

虎骨散 紅花四物湯

婦人大全良方

追風散 急風散 蝎附散 都梁負

木瓜煎 如神湯 獨活寄生湯

婦人臂痛方

栝子仁圓 舒經湯 茯苓圓 控涎丹

白芥子散 流氣飲子

得効方

痛臂

交加散 神保圓

拔粹方

獨活湯

仙傳濟陰方

腰脚痛

流經散

餘藥無名者散見本方

新法

風濕

除新舊

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

治病百法

腰跨疼痛

夫婦人腰跨疼痛兩脚麻木惡寒喜暖者內經曰乃是風寒濕痺先可服除濕丹七八十丸量虛實以意加減次以禹功散投之瀉半余行清冷積水青黃涎沫為驗後以長流水同生姜棗煎五苓散服之風濕散而血氣和也

十形三療

脛膀痛

戴人女僮冬間自途來面赤如火至潯陽病
腰膀大痛裏急後重痛則見鬼神戴人曰此
少陽經也在身側爲相火使服舟車丸通經
散瀉至數盆病猶未差人皆怪之以爲有祟
戴人大怒曰驢鬼也復令調胃承氣湯二兩
加牽牛頭末壹兩同煎服之大過數十行約
一二缶方捨其杖策但發渴戴人恣其飲水
茜苳黎柿等戴人曰凡治火莫如冰水天地

之至陰也約飲水壹二桶猶覺微痛戴人乃
刺其陽陵穴以伸其滯足少陽膽經之穴也
自是方寧女僮自言此病每壹歲須瀉五七
次今年不曾瀉故如是也常仲明悟其言以
身有濕病故壹歲亦瀉十余行病始已此可
與智者言難與愚者論也

聖惠方

治婦人腰脚疼痛諸方

失腎主於腰脚女人腎藏繫於胞絡若勞傷

腎氣虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交
爭故令腰脚疼痛也

治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏悶食少
無力酸棗人散方

酸棗人叁分防風半兩去牛膝叁分羌活

兩半當歸叁分芎藭叁分桂心叁分木香叁分海

桐皮壹分杜仲叁分去麤附子叁分炮裂壹分草

薛二分續斷叁分甘草壹分炙壹分右件藥

搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前溫溫服

之○婦人太全良方酸棗仁炒川牛膝當

歸各叁分羌活川芎桂心防風木香海桐皮

杜仲附子炮草薛續斷粉草炙○永類鈐

味各半兩右咬咀每服四錢水壹盞半薑三片

煎七分去滓溫服

治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急肢節

不利婦人大全宜服骨碎補散方○永類鈐

方治證同上及腹脇拘急四肢節不持

骨碎補一兩○良方草薺一兩牛膝一兩赤芍

藥分海桐皮一兩當歸一兩芎藭三分附子三分

去皮桂心一兩檳榔一兩桃仁一兩雙入麩炒微

黃枳實半兩麩炒微黃○

右件藥搗篩為散每服四錢水壹中入

生薑一分煎至六分良方鈐方右為粗末

薑參片棗一箇煎至七分去滓食前稍熱服之

治婦人血風攻注腰脚疼痛仙靈脾散方

仙靈脾一兩羌活一分海桐皮一分牛膝三分當

歸參芎藭分骨碎補參分延胡索參分桂心

木香分桃仁壹兩湯浸去皮菴藷子

枳殼分檳榔兩蚶螂半兩麝香一分細

右件藥搗細羅為散每服食前以豆淋酒

調下膏錢文

治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍宜服膏

本散方

蒿本壹兩狗脊壹兩沒藥壹兩天麻壹兩騏驎

竭壹兩蟬殼壹兩微炒骨碎補壹兩桂心兩虎脰

敗龜 穿山甲 已上各二兩各以麝香

初久 右件藥搗細羅為散每服以炒生薑黑豆

淋酒下二錢空心及食前服

治婦人血風攻注腰脚疼痛經絡滯澁四肢

煩疼宜服琥珀散方

琥珀 一兩 牛膝 一兩 常歸 一兩 凌霄花 六兩 赤芍

藥 一兩 沒藥 一兩 地龍 半兩 桃仁 一兩 半湯浸

微炒 水蛭 壹兩 麝香 壹分 細

微黃 令黃 麝香 研入

右件藥搗細羅為散每服食前以温酒調

下二錢

治婦人風毒流注腰脚疼痛行立艱難敗龜

散方

敗龜 二兩 塗酥 白殭蠶 一兩 沒藥 兩 薏苡

人 一兩 當歸 一兩 桂心 三分 乳香 三分 虎脛骨

二兩 塗酥 地竜 三分 杜仲 一兩 去麝皮

右件藥搗細羅為散每於食前以煖薄荷

酒調下二錢

治婦人血風流注腰脚骨節痠疼不可忍附
子丸方

附子三分炮裂 牛膝壹兩 海桐皮半兩 桂

心兩半 延胡索兩半 安息香兩半 天麻三分 羚羊角

屑二分 芎藭三分 當歸三分 白芷兩半 木香兩半 乾蠍

微炒分 酸棗人三分 羌活二分 防風三分 去漏

蘆兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸
如梧桐子大每於食前以煖酒下三十丸

治婦人血風流注腰脚骨節疼痛不可忍虎
骨丸方

虎脛骨一兩塗酥 檳榔一兩 敗龜一兩塗酥

防風兩半 附子兩半 去皮膚 裂 赤芍藥 騏

麟竭兩半 當歸三分 川大黃一分 桂心兩半 沒

藥兩半 牛膝壹兩 木香三分 桃仁三分 湯浸去

炒微 海桐皮三分 地竜兩半 微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於食前以煖酒下二十九

治婦人血風腰脚骨節痠疼筋脉拘急行李艱難兩脇抽痛革薛丸方

革薛壹兩牛膝壹兩杜仲三分去去酸棗

人三分當歸壹兩防風叁分去去丹參三分赤芍藥

分桂心叁分石解壹兩去去附子壹兩炮裂虎

脛骨壹兩醋令黃

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五百杵丸

如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒

下三十九

治婦人腰脚風冷疼痛行立無力宜服海桐

皮丸方

海桐皮壹兩桂心二兩牛膝壹兩杜仲壹兩

皮炙微石斛壹兩去熟乾地黄壹兩

右件藥搗羅鍊蜜和丸如梧桐子大每於

空心及晚食前以溫酒下三十九

治婦人腰脚風冷疼痛久不差牛膝丸方

牛膝二兩虎脛骨二兩酥壹兩沒藥壹兩羌活

當歸壹兩桂心壹兩敗龜二兩酥壹兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每於食前以溫酒下三十丸

治婦人腰脚積年疼痛不差附子散方

附子

二兩炮裂去皮臍

沒藥

壹兩

桂心

二兩

葳靈仙

乾漆

壹兩搗碎

牛膝

壹兩

右件藥搗細羅爲散於食前以溫酒調下

二錢

治婦人腰脚疼痛大腸不利葳靈仙散方

葳靈仙

二兩

牽牛子

二兩

木香

半兩

枳殼

壹兩

微黃去麩

右件藥搗細羅爲散每日空心以茶清調

下二錢以利爲効

朱氏集驗方人以酒煎成其氣味甚佳

虎骨散治婦人腰上實肉處痛不可忍虎骨

散用麝香酒調服遂安

紅花四物湯治婦人臂疼又如癱瘓劉泣之

學云是血證四物湯加紅花煎服見效

婦人大全良方

夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許太
學云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏
故也以感外邪論之則有太陽經先因感風
又感寒濕致令外證發熱惡寒與傷寒相似
頸項強急腰身反張如中風狀瘳瘳口噤其
身體凡凡古人以強直為瘳其脉沉遲弦細
新產血虛多汗出喜中風亦有此證已上並
載婦人中風角弓反張口噤論中言之甚詳
不復贅錄 又有挫枕轉項不得者與三五

七敗

方見大方
科者風門

追風散仍與急風散搽頂上

皆因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背

筋脉拘急可與蠲附散都梁元許太學治

項筋強痛不可轉側者以木瓜煎

追風散治年深日近承類癱正頭疼又治

肝藏久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭

眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞

聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲

行及一切頭風兼療婦人血風攻挂頭目昏

痛新產血虛四字永類鈔方此下有皆治之風丸滋陰日

川烏炮去皮防風去蘆石膏煨川芎非甘草

多荆芥穗炒去絲白殭蠶炒去絲天南星炮羌

活天麻地龍白附子地全蝎去尾

白芷各半草烏炮去皮沒藥研乳香炮雄

黃研各不研木煎

右為細末每服半錢入好茶少許同調食

後及臨卧服常服清頭目利咽高消風化

痰

急風散方

草烏頭三兩壹半燒存性於醋生黑豆壹分

兩味壹內蘸令冷餘壹半生用丹砂壹兩麝香壹分

處為末研令停酒調塗痛處

蝎附散治壹切風邪頭痛夾腦風氣痰涎壅

盛嘔逆惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花

牙關緊急口眼喎斜面目瞶動頭項拘急肩

背引疼耳痒目昏四肢麻木及沐頭浴出暴

感風邪頭目昏痛兩太陽穴疼遠年頭風經

隔歲月乍差乍發服藥無效者並皆治之

附子

炮去皮臍○永川烏

炮去皮尖

麻黃

去節

蠶

炒

南星

防風

各差

雄黃

朱砂

蝎

各錢

白芷

藁木

各半

右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕

婦不可服 京城之醫用此藥兼嚼如聖

餅子治眼生眵糞眈眈不明羞明多淚見

物不明有效○鈴方右細末每半錢葱茶

調嚼如聖餅一方有川芎細辛旋覆花乳

香射香亦妙

都梁員方○永類鈴方治風吹項背頭目昏

疼婦人產前產後傷風頭痛

香白芷

擇大塊白色新索者先以棕刷去塵土用沸湯泡洗四五次為細末

煉蜜圓如彈子大每服壹員多用荆芥點

蠟茶細嚼下食後常服只乾嚼下亦可都

無所忌此藥大治諸風眩暈婦人產前產

後乍傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之

令人目明凡浴沐後服一二粒尤佳暴寒

乍暖神思不清傷寒頭目昏暈並皆服之

木瓜煎方

承類鈴方
治證同上

宜木瓜

三個取
蓋去穢

沒藥二兩乳香壹分

研末

右二味內木瓜中用羔子合了竹簽定之

鈴方蓋飯上蒸三四次爛研成膏子每服

三匙生地黄汁半瓊無灰上醞二瓊和之

用八分瓊熟煖化膏子服有人患此病自

午後發黃昏時定予曰此患必始從足起

經言十二經絡各有筋惟足下少陰之筋

自足至頂大抵筋者肝之合也日中至黃

昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺

也白晝至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法

云晝至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二藏受

此陰氣故發於是時予授此方三服而愈

微風婦人腰痛方

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛

弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有

五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜

仲煎服脾胃氣蔽及寒濕腰痛宜互積散見方

大方科加桃仁如虛損及五種腰痛者青蛾

傷寒門元方見大方科神應元方見和劑局方皆可用也如氣

滯腰痛如神保員黑牽牛茴香橘核必有功

也劉康所發外法即平建此方三服可愈

如神湯治男子婦人腰痛陳總領方

延胡索當歸桂心等分壹方無

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服潭

人滕珂云此方得之於歙川祈門老鑿真

是如神故以名之

獨活寄生湯夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷

濕地當風所得不時速治喜流入脚膝為偏

枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘攣肺重脾宜急

服之主人感當歸草漢人張仲景獨活風

獨活三兩桑寄生續斷杜仲北細辛

川牛膝秦艽茯苓白芍藥桂心

加芎防風人參熟地黃當歸各

兩

右咬咀每服三錢水壹瓊煎至七分去滓
溫服空心氣虛下利除地黃并治新產腹
痛不得轉動及腰脚攣痛痺弱不得屈伸
此藥最能除風消血肘後有附子一枚無
寄生人參當歸粉草近人將治歷節風脚
氣流注亦效

婦人臂痛方

夫婦人臂痛筋脉攣急不得屈伸遇寒則劇
由肝虛爲風寒邪氣流於血脉客於經絡搏

於筋筋不榮則乾急而痛其脉緊細宜服栝
子仁丸舒經湯若臂痛不能舉或左或右時
復轉移一臂由中腕伏痰脾氣滯而不行土
與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下
上攻於臂故痛其脉沉細宜茯苓圓控涎丹

栝子仁圓

王氏指迷方

栝子仁

乾地黄

各二兩

茯苓

枳實

去穢炒

覆盆子

炒

北五味

附子

炮

石斛

去根切酒蒸炒

鹿茸

酥炙

酸棗仁

炒

桂心

沉香

黃耆

各壹

兩蜜水炙
一方等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒
下叁十圓

舒經湯治臂痛又名五脾湯亦治腰下疾

片子薑黃四兩 羌活各一兩 白朮各一兩 海

桐皮當歸 得效方去尾 赤芍藥各二兩

右為粗末每服三錢水壹盞半得效方煎

至七分去滓溫服如腰以下疾空心服腰

以上疾食後服

茯苓圓

茯苓壹兩 半夏二兩 枳殼今兩 風化朴消壹兩

右四味為末薑汁煮糊為圓如梧桐子大

生薑湯下二十圓食後服

控涎丹凡人忽患胷背手足頸項腰胯隱痛

不可忍連筋骨牽隱釣痛坐卧不寧時時走

易不定俗醫不曉謂之走疰使用風藥及針

灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽亂以

藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下變為

此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡
或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多
流睡涎手脚重腿冷痺氣脉不通誤認爲癱
瘓亦非也凡有此疾但以此藥不過數服其
疾如失

甘遂

去心

大戟

去皮

真白芥子

各等分炒

右爲細末糊圓如梧桐子大臨卧淡薑湯
吞下伍七圓如疾猛加至十圓

白芥子散治臂痛外連肌肉牽引背脚時發

時止此由榮衛之氣循行失度留滯經絡與

正氣相搏其痛發則有似癱瘓

真白芥子

木鼈子

各二兩
麩炒

沒藥別研桂心

木香

各半兩

右爲細末入研藥令停每服一錢溫酒調
下

流氣飲子

紫蘇葉

青皮

苦梗

大黃

煨

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃耆

枳

穀去穢炒防風各半甘草 橘皮各三木香

津皮大腹二兩到姜汁炒

右咬咀每服五錢水二瓊薑三片棗壹枚

煎壹錢去滓服

得效方

臂痛

交加散乃五積散敗毒散合和治弱者或兩

臂或膏臂冷痺作痛起手甚艱每服四錢

姜三片棗二枚木瓜二片水壹盞半煎不

不拘時服未效再加川牛膝方見大方仍開

服通氣驅風湯方見大方科諸風門

補保圓治因食酒毒熱物過度痰飲與氣蓄

聚所作臂痛每服二七粒柿蒂湯下得利

或不利皆效方見大方蓋水壹盞半煎

治脚赤腫

荆艾各石膏二地龍炒薄荷

右判散薑三片蜜少許煎服

拔粹方

獨活湯治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活防風獨活肉桂煨大黃

澤瀉各三錢桃仁五錢當歸稍連翹各半兩

炙甘草二錢酒防己酒黃連各壹兩

右攻阻每服半兩酒半盞水壹盞半同煎

去滓熱服淋瀝二寸淋瀝不降同

仙傳濟陰方凡腰痛與流

腰痛

水觸經時經不行因而脚痛致腰疼但用流

經調血藥治療遲時別病生

凡婦人脚疼腰痛皆因氣血凝滯多因經

行之際水濕所觸住而不行流入脚經故

成疾甚不轉側日夜呻吟不止或有發熱

流經散

歸當肉桂各三錢京芍藥四錢威靈仙三錢烏

豆半錢牡丹皮二錢川芎三錢黑牽牛炒烏藥

半錢地黃半錢

咬咀半酒半水煎服

治婦人脚氣諸方
 牛膝散 赤茯苓散 大腹皮散 半夏
 散 紅雪散 犀角散 木香散 紅藍
 花散 牛膝散 紫蘇散 桑白皮散
 薏苡人散 防風散 坐拏散 木香丸
 羚羊角丸

脚氣

論

目錄

聖惠方

治婦人脚氣諸方

- 牛膝散
- 赤茯苓散
- 大腹皮散
- 半夏散
- 紅雪散
- 犀角散
- 木香散
- 紅藍花散
- 牛膝散
- 紫蘇散
- 桑白皮散
- 薏苡人散
- 防風散
- 坐拏散
- 木香丸
- 羚羊角丸

朱氏集驗方

脚氣

三聖散

婦人大全良方

四白散 蒼朮元 七宣圓 神功圓

七聖檳榔圓 三和散

永類鈴方

脚氣

餘藥無名者散見本方

脚氣

巢氏病源

脚氣痛弱候

脚氣之病由人體虛溫濕風毒之氣先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也江東嶺南土地卑下風濕之氣傷於人初得此病多不即覺或先無他疾而忽得之或因衆病後得之此病初甚微飲食嬉戲氣力如故當熟察之其狀從膝至脚有不仁或若痺或淫淫如

蟲行或微腫或酷冷或疼痛或緩縱不隨或
有攣急或有至困能飲食或有不能食者或
右見飲食而嘔吐者惡聞食臭者或有物如
脂發於端膠逆上衝心氣上者或有與體轉
筋者或壯熱頭痛者或心胃衝悸寢處不飲
見明或腹內苦痛而兼下者或言語錯亂喜
忘誤者或眼濁精神昏憤者此皆其證候也
治之緩者便上入腹腹或腫脅滿上氣賁
便死急者不全日緩者二三日也其病既入

臟證皆相似但脉有三品若脉浮大而緩宜
服續命湯兩劑若風盛者宜作越婢湯加朮
四兩若脉轉駛而緊宜服竹瀝湯若脉微宜
服風引湯二三劑其緊駛之脉是三品之最
惡脉也脉浮大者病在外沉細者病在內皆
當急治之治之緩慢則上氣便死也

脚氣腫滿候

溫濕風毒從脚而上故令四肢懈惰緩弱疼
痺甚則上攻名脚氣而津液爲風濕所折則

津液否澀而蓄積成水內則浸漬臟腑外則
流溢皮膚故令腠理脹密水氣積不散故腫
也

婦人大全良方

婦人脚氣方論

凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而脚屈
弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜槲榔
生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人
先從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩

脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不

仁皮頑不知有無也或舉體轉筋或見食嘔

逆惡聞食氣或胃滿氣急或遍體酸痛皆脚

氣候或之壹字
有無是也黃帝所謂緩風濕痺是也頑

弱名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷

小續命湯主之煎成入生薑自然汁最快暑

中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂壹

半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以自

合薄荷煎冷水調服極妙大便秘者脾約員

麻仁員

方見大方科大小便門

三和散

方見大方科諸氣門主之

局方中仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也

聖惠方

治婦人脚氣諸方

夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎藏虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三藏經絡起於足十指若藏腑虛損則風邪

先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也此皆由體虛或當風取涼或久坐卑濕或產後勞損或恚怒悲傷肝心氣滯致月候不通因其虛傷風毒搏於肌骨則令皮膚不仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘攣或即冷疼或即腫滿或兩脚痺弱或舉體轉筋眩目心煩見食嘔吐精神昏憤肢節煩疼小便赤黃大便祕澁並皆其證候也其婦人脚氣療之不與丈夫同者以其氣血不謂胎妊產生崩傷之異

是以楮澄療寡婦及尼與妻妾殊別卽其義也
婦人人全良方此下云凡婦人有脚氣疾者必無生育

治婦人脚氣浮腫心神煩悶月候不通牛膝散方

牛膝去苗一兩 漢防己三分 牡丹三分 桂心三分 羚羊

其角屑兩 當歸三分 赤芍藥三分 桃人五枚 湯

浸去皮尖雙 檳榔兩 川大黃兩 碎微炒 川苦

消兩 甘草三分 改赤判

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一巾

蓋煎至六分婦人大全良方每服三 去滓

食前溫服利下惡物爲效良方彙類鈴方此下云亦要相

其強弱用之

治婦人脚氣腫滿腹內妨悶月水不通四肢

疼痛赤茯苓散方

赤茯苓兩 木通壹兩 紫蘇莖葉兩 牛膝兩

去苗 木香兩 防葵兩 檳榔兩 桂心兩 鼈甲兩

黃去裙襴 赤芍藥兩 川大黃兩 碎微炒

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水壹巾

蓋入生薑半分煎至六分去滓食前溫服以利為効

治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神墮悶大腹

皮散方

大腹皮壹兩紫蘇葉二兩○婦人大全良方袖珍方一兩

木通一兩桑根白皮壹兩羌活壹兩赤芍藥

獨活壹兩青橘皮壹兩湯浸木瓜壹兩

枳殼二兩麩炒乾者微黃去瓢

右件藥搗籠羅為散每服四錢以水壹中

蓋入生薑半分葱白七寸煎至六分婦人大全

良方水壹蓋生薑五片去滓食前溫服永類

葱白七寸煎至七分去滓食前溫服類

良方同○袖珍方右咬咀每服壹兩生薑五片葱七寸水壹蓋半煎至八分去滓溫服不拘時

治婦人脚氣發動心腹脹滿食飲不下嘔逆

不止半頁散方

半夏三分湯洗赤伏苓壹兩陳橘皮三分

去白木通三分剉○婦人大人參三分去瓢焙全良方袖珍方無人參蘆頭

大腹皮三分 檳榔壹兩 紫蘇莖葉壹兩 桂心半兩

三分 〇 袖珍方官桂

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分 永類鈔方三片 煎至六分 良方水壹瓊半

薑叁片 去滓不計時候温服 〇 袖珍方右

吹咀每服壹兩姜三片水二盞煎至壹盞

去滓食前温服

治婦人脚氣藏腑氣壅育膈滿悶脚膝煩疼

宜服紅雪散方

紅雪壹兩 赤芍藥半兩 茜根半兩 桂心壹分 生

乾地黄壹兩 紅藍花叁分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓食前温服

治婦人脚氣忽發衝心悶亂四肢煩疼婦人

良方四肢煩疼有熱者 犀角散方

犀角屑半兩 紫蘇莖葉壹兩 赤茯苓壹兩 木香半兩

赤芍藥二分 〇 良紅藍花叁分 檳榔壹兩 紅雪

壹兩

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以木一中
盞煎至六分良方七分去滓每於食前溫服

治婦人脚氣卒發衝心悶亂木香散方

木香半兩郁李人二兩湯浸去皮微炒○桂

心三分赤芍藥壹兩桑根白皮叁分大腹皮兩壹

剉赤茯苓叁分檳榔叁分紫雪二兩○良

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分良方每服叁錢

煎至七分去滓每於食前溫服

治婦人脚氣心神煩悶紅藍花散方

紅藍花兩壹柴胡兩壹羚羊角屑兩壹赤芍

藥兩壹桑根白皮兩二檳榔兩二紫蘇莖葉兩青

紅雪兩二甘草叁分炙

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此方

紫蘇莖葉兩二吳茱萸半兩湯浸七陳橘皮

參分湯浸 檳榔 兩 松木節 兩 木瓜 壹

去白 剉焙 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至五分 婦人大全良 次入童子小便二

合更煎三兩沸去滓不計時候溫服

治婦人脚氣緩弱無力兼軟風牛膝散方

牛膝 壹兩 炮裂 仙靈脾 兩 草薢

附子 壹兩 去皮 大腹皮 壹兩 桑根

白皮 二兩 郁李人 壹兩 湯浸 剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入黑豆五十粒生薑半分煎至六分去滓

每於食前溫服

治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食

脚重虛腫紫蘇散方

紫蘇 壹兩 木通 壹兩 桑根 白皮 兩 藁香

枳殼 二兩 剉 獨活 兩 荆芥 兩 羌活

木瓜 兩 青橘皮 半兩 湯浸 大腹皮 十枚

甘草 半兩 剉 赤剉 剉 剉 剉 剉 剉 剉 剉 剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大

蓋入生薑半分葱白壹莖并鬚煎至五分

婦人大全良方永類鈔方每服三錢去滓

水壹盞薑三片葱白壹莖煎至七分

不計時候溫服

治婦人脚氣盛袖珍方癸兩脚浮腫小便壅

澁婦人大全良方袖珍方腹脇脹滿氣急坐

卧不得桑白皮散方

桑白皮一兩赤茯苓一兩○良方袖

已半兩木香半兩紫蘇子叁分郁李人一兩湯浸

木通叁分大腹皮半兩檳榔叁分青橘皮叁分

湯浸去白瓢落

右件藥持籠羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分良方鈔方薑三片煎至七分

去滓不計時候溫服○袖珍方有咬咀每

服壹兩生姜三片煎至八分去滓溫服食

前

治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大便

澁薏苡人散方

薏苡人壹兩防風壹兩法猪苓壹兩法芎藭

壹兩 羚羊角屑 兩 壹兩 漢防已 兩 壹兩 桑根白皮 兩 二兩

大麻子 兩 壹兩 檳榔 兩 壹兩 郁李人 兩 壹兩 湯浸 枳實

叁分 麩 甘草 兩 壹兩 微赤 剉 煎 水 一 中

右件藥搗麩羅為散每服四錢以水一中

蓋煎至六分去滓食前溫服○婦人大全

良方每服三錢水壹蓋煎至七分去滓放

溫服 方同 類鈐

治婦人脚氣腫滿疼痲筋脉拘急防風散方

防風 兩 壹兩 蘆頭 兩 去 五加皮 兩 二兩 薏苡人 兩 二兩 活羌 兩 壹兩

附子 壹兩 兩 兩 裂 酸棗人 壹兩 兩 芎藭 兩 一兩 川大

黃 兩 二兩 兩 炒 羚羊角屑 兩 壹兩 常歸 兩 壹兩 兩 剉 枳實

三分 麩 甘草 兩 壹兩 微赤 剉 煎 水 一 中

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蓋

煎至六分去滓食前溫服

治婦人脚氣卒發衝心煩悶氣急大便苦難

小便赤澀心神熱躁宜服此方

紅藍花 兩 三分 生黑豆皮 兩 二兩 川大黃 兩 二兩 剉 微炒

右件藥以水壹大蓋半煎至一蓋去滓食

前分温三服

治婦人脚氣痲冷血氣不調坐拏散方

坐拏壹兩狼毒壹兩旋刮取盡沉香叁分紫蘇

子叁分羌活叁分蘿蔔子叁分杉木節叁分乳香

炒桂心兩

右件藥搗細羅爲散每服用水煎木瓜紫

蘇莖葉湯調下二錢每於食前服之

治婦人脚氣衝心悶亂腹脇脹滿不能下食

木瓜丸方

木瓜二枚蒸熟木香壹兩檳榔二兩草苴壹兩

去青橘皮叁分湯浸桂心叁分當歸半兩剉

桃人壹兩湯浸去皮尖郁李人半兩湯浸

右件藥搗羅爲末爛研木瓜和凡如桔桐

子大不計時候以温酒下三十九

治婦人脚氣上衝喘息稍促兩脚不仁連小

腹頑痺頭面浮腫時復心悶便利常澁羚羊

角丸方

羚羊角屑壹兩漢防已半兩薏苡人壹兩牛膝壹兩

去芎藭壹兩 川大黃壹兩 獨活壹兩 大味人
 兩木香兩 郁李人壹兩 湯浸壹兩 枳實壹兩 炒壹兩 黃
 右件藥搗羅為末 鍊蜜和搗五七百杵 凡
 如梧桐子大 每於食前以溫酒下三十九

朱氏集驗方

脚氣

三聖散治婦人脚氣遇發吐水至壹桶粥藥
 不下醫用三聖散見效

生科五積散 治中湯 嘉禾散

右三藥合而為一 隨意水煎服之 陰證可

用

婦人大全良方 婦人血虛發熱夜多盜汗不

四自散治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不
 進飲食四肢羸瘦骨立拘攣脚痛不能行

黃耆 厚朴 益智仁 藿香 白朮 滋

白扁豆 陳皮 半夏 白茯苓 人

參 白豆蔻 天台烏藥 甘草 各半

京南芍藥 牛 檀香 沉香 各半

右為細末每服叁錢水膏蓋薑參片棗子壹箇煎至七分溫服方同

自後諸證退只有脚攣痛不能行以蒼朮元

治之效此藥大治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛

不能行履兼補下部

蒼朮元方下移人血如神效外多益下不

乳香各二錢沒藥別研川牛膝各半青塩兩研

熟艾肆錢川烏叁錢全蝎一錢

右除研藥為細末入研藥令停以木瓜膏

箇大者切一頭留作蓋去穰入上件藥於

木瓜內將蓋簽定安木瓜於黑豆中蒸令

極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮

末拌令得所員如梧桐子大每服五十員

空心用木瓜湯下或溫塩酒亦得方同

一日三服忌血與蒜 乙巳年羅安人病

發熱自汗心煩身體骨立足痛拘攣不能

屈伸飲食不進雖老醫亦不能療召僕治

之六脉弦弱僕曰雖脉似勞實非勞也似

脚氣而非正脚氣但當調脾生血其熱必退然後攻足則可望安遍尋諸方皆無對證之藥遂處四白散子與服不半劑熱退能食又處蒼朮員繼之筋脉伸足能行而愈

大便祕者可與七宣員神功員七聖檳榔員

方並見大方三和散方見大方服之效

科大小便門永類鈴方

脚氣

大至方取用賓蘇散有冷有熱加減小續命湯大便祕者脾約元麻仁元三和散主之有脚氣冲心煩悶大煩躁者用紫雪若無以自合薄荷煎冷水調服極妙

木煎治婦人小便出血諸方

茜根散 牡蠣散 大黃散 鹿茸散

生乾地黃散 當歸散

治婦人小便數諸方

雞臍脰散 鹿茸散 桑螵蛸散 菝葜

散 牡蠣散 鹿茸丸 龜骨丸

治婦人大便不通諸方

牽牛子散 調氣丸 木香丸 郁李人

散 通神散 芫花丸 牽牛子散 玄

豆丸 散 大麻人丸 血丸

藥治婦人大便下血諸丸

荆芥散 側柏散 桑耳散 阿膠丸

烏賊魚骨丸 烏龍丸 艾葉丸

直指方 人血丸 風人丸 婦人血丸

艾薑湯 大三神湯 小宜圓 麻仁圓

婦人大全方 流式

婦人脬轉不得小便方

蒟葉散 石葦湯 葱白湯

遺尿失禁方

婦人小便出血方

婦人大便不通方

四物湯 大三脘散 七宣圓 麻仁圓

論老人虛人風人大便秘不可用駢

白頭藥骨丸 風雷丸 艾葉丸

治風入腸間或秘或利方

痰藜湯 大五柔員血二仁員 蜜兌法

婦人大便下血方

防風如神散 木香烏剌員 地榆湯

腸風黑散

瑞竹堂方

四七湯

經驗良方

仙傳濟陰方

小便赤澁

葵子散

大便閉結

三黃散 空腸元

壽城神方

餘藥無名者散見本方

大小便

巢氏病源

小便不利候

腎與膀胱為表裏俱主水水行小腸入胞為

小便熱搏其藏熱氣蘊積水行則澀故小便

不利也

大小便不利候

冷熱不調大小腸有遊氣壅在大小腸不得

宣散蓄積結生熱故大小便澀不流利也

大小便不通候
 臟腑不和榮衛不調陰陽不相通大小腸否
 結名曰關格關格故大小便不通自有熱結
 於大腸則大便不通熱結於小腸則小便不
 通今大小便不通者是大小二腸受客熱結
 聚則大小便不通此止客熱暴結非陰陽不
 通流故不痺關格而直云大小便不通

遺尿候

腎與膀胱為表裏而俱主水腎氣通於陰而

小便水液之下行者也腎虛冷冷氣入胞胞
 虛冷不能制小便故遺尿

尿血候

血性得寒則凝得熱則流散若勞傷經絡其
 血虛熱滲入胞故尿血也

大便血候

勞傷經脈則生熱熱乘於血血得熱則流散
 滲入於大腸故大便血也

金匱方

問曰婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚
息者何也帥曰此各轉胞不得溺也以胞系
了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主
之腎氣丸方

乾地黄

兩

薯蕷

兩

山茱萸

兩

澤瀉

茯苓

三牡丹皮

兩

桂枝

兩

附子

炮各兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五

丸加至二十五丸日再服

聖惠方

治婦人脬轉諸方

夫婦人脬轉之病者出飽

巢源婦人大全良方作脬

爲熱

所迫或忍小便俱令水氣還迫於脬屈辟不

得充張外水應入不得入內洩應出不得出

內外壅滯脹滿不通故爲脬轉其狀小腹急

痛不得小便甚者至死不可治也

巢源此下云張仲景

云婦人本肥盛豆舉自滿至羸瘦

治婦人

方婦人大全良方

脬轉小便數日不通滑

石散方

滑石 二兩○良方永 寒水石 二兩 葵子 壹

石件藥搗碎以水三中盞煎至一盞半去

滓食前分溫三服○良方石為末以水一

斗煮取五升時時服壹升即利 鈴方此下

方入味

又方亂髮灰 葵子 車前子 已上各

右件藥擣細羅為散每服以葱湯調下壹

錢 婦人大全良方每 目三四服 永類鈴方

服二錢茶湯調下

血尿 亦治血淋

治婦人忍小便不得時起致令脬轉經四五

日困篤欲死宜服此方

滑石 二兩 亂髮灰 壹

右件藥細研為散取桃白皮壹斤熟擣以

水三大盞絞取汁不討時候溫半盞調下

二錢 婦人大全良方 ○壽域神方治胞轉

用髮灰二錢滑石末壹錢桃白皮煎湯調

下日進二服大效

又方亂髮 壹斤燒 滑石 三兩 鯉魚齒 兩

又右件藥搗細羅為散不計時候以溫水調下二錢一人效

治婦人過忍小便致脬轉方味白文煎

車前草壹斤 ○ 膏地物亦常 車前草切 全貝 貝貝 貝貝 貝貝

右以水七升煮至三升去滓每於食前溫

一中蒸服之

又方浮萍草二兩 乾者壹

右擣細羅為散每於食前以燈心湯調下

青錢亦通小便利流腫經 經經 經經 經經

又方右自取爪甲燒灰細研水調服之

又方右以梁上塵研令極細水調壹錢服之

又方右以滑石末葱湯調二錢服之婦人大

肘後方壽域神方 衛生易簡方同

治婦人小便不通諸方

夫婦人小便不通者由水行於小腸入脬為

小便腎與膀胱俱主於水此二經為藏腑若

內生熱則熱氣入於小腸及脬脬內既熱故

小腸不通令小腹脹滿氣喘急也

治婦人小便不通木通散方

木通三分車前子半兩甘草半兩葵根三分

蘧麥半兩滑石兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治婦人小便不通及大便難葵子散方

葵子車前子川大黃剉微冬瓜人

當歸已上各三分木通半兩滑石兩甘草半兩

剉赤

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治婦人小便不通小腹疼痛榆皮散方

榆白皮剉木通剉赤芍藥剉猪苓去黑皮滑

石已上各三分葵子半兩黃芩半兩

右件藥擣細羅為散食前以木通湯調下

二錢白芷剉煎至五分去滓食前溫服

治婦人小便不通葵根飲子丸

葵根壹兩滑石半兩紫葛半兩蘧麥兩白茅根

分三

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞
入葱白五寸煎至五分去滓每於食前溫
服

治婦人卒小便不通方

陰地草

壹兩

滑石

半兩

葵子

壹兩

右件藥擣細羅為散每於食前以葱湯調

下二錢

又方亂髮

如拳大
燒灰

右細研以溫酒調下二錢立通

又方杏人

二七枚
令黑色

滑石

壹分

右碾為末以熱酒調頓服之立通

治婦人小便不通或急悶欲死方

鹽

右擣碎熬令熟布裏熨臍下按小便漸漸

令出不在手按熨以通快即止

又方濕生蟲壹七枚

爛

右以新汲水調頓服之立通

又方車前子一兩

右件藥搗羅為末食前以井華水調下壹

錢

治婦人小便出血諸方

夫婦人小便出血者由心主於血血之行身

通徧經絡循環藏腑血性得寒則凝濕熱則

流散失其常經溢滲入於脬故小便血也

治婦人小便出血心神煩悶茜根散方

茜根炙微 當歸炒 甘草炙微 貝母煨微 牡

丹人瓜蒂不 羚羊角屑各一兩 栢葉微炙已上

紅藍花二兩 生乾地黄三兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至五分去滓食前溫服

治婦人傷中尿血牡蠣散方

牡蠣粉已上各 車前子半兩 桂心 黃芩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下二

錢日三四服

治婦人卒傷熱尿血大黃散方

川大黃半兩判 川芒消半兩 蒲黃三分

右件藥搗細羅為散食前以冷水調下二

錢

治婦人勞損虛羸尿血鹿茸散方

鹿茸壹兩去毛塗 當歸壹兩判 熟乾地黃

壹葵子兩 蒲黃兩 續斷兩

右件藥搗細羅為散每服以温酒調下二

錢日三四服婦人大全良方同

治婦人尿血不止生乾地黃散方

生乾地黃二兩 栢葉一兩微炙 婦人黃芩

半阿膠壹兩搗碎炒令煙出 良方炒成珠

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至五分良方薑三分去滓

每於食前温服

又方羚羊角屑 龍骨 當歸判微炒 蒲黃已

各半兩婦人大全良方各壹兩 生乾地黃壹兩 良方二兩

右件藥搗細羅為散食前以粥飲調下二

錢

治婦人小便出血或時尿血當歸散方

當歸半兩剉刺薊葉二分○婦人大全赤

芍藥兩半生乾地黃兩一羚羊角屑兩半

右件藥搗篩為散每服三錢以水盞中盪

煎至六分袖珍方右咀每服搗去滓食

前溫服

又方竜骨黃芩當歸剉微生乾地黃

茜根已上各三分

右件藥搗細羅為散每服煎青竹茹湯調

下二錢日三四服

治婦人無故小便出血方

竜骨壹兩

右件藥搗細羅為散食前以溫酒調下壹

錢○肘後方治婦人無故尿血龍骨壹兩

王氏集驗以酒調方寸匕空心日三衛生

方為末

又方鹿角屑微炒大豆黃卷微炒桂心已上各半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

又方甜瓜子

炒

重葉蜀葵花

已上各一兩

右件藥搗細羅為散每服濃煎木通燈心

湯半盞入重子小便壹合調下二錢日三

四服

治婦人小便出血不止方

馬薺零根

刺薊根

已上各一兩

右件藥搗細羅為散每服食前常歸酒調

下二錢

又方婦人大全良方治婦人右以生地黃搗

後取汁每服壹小盞日三服

又方右以蘆薈濃煎作湯每服壹小盞日三

四服

又方右以葎草搗絞取汁每服壹小盞日三

四服

又方婦人大全良方治婦人右以蒲黃末酒

調二錢服之水服亦得

又方棘刺

壹兩剉碎

又右以水二大盞煎至壹大盞分爲二服食
前溫溫服之

又方婦人大全良方治婦人鹿角膠三兩炙
小便出血或時尿血令黃搗

右件以水二大盞煎至壹盞半良方以水
至半去滓分爲三服食前服之

治婦人小便數諸方
夫婦人小便數者由腎與膀胱巢氏病源智
裏與膀胱爲表俱主於水腎氣通於陰此二經俱虛而有

熱乘之則小便澀虛則小便數也

治婦人小便數雞臍散方

雞臍脰十具桑螵蛸半兩厚朴一兩去
汗炙令微炙菝葜壹兩當歸壹兩熟乾地黄
香熟壹兩甘草壹兩微赤到

右件藥搗龜羅爲散每服三錢以水壹中
盞入生薑半分煎至六分去滓食前溫服

治婦人久虛冷小便日夜三五行鹿茸散
方○永類鈴方腎與膀胱二經俱虛而有熱

乘之則小便澀虛則小便數

鹿茸壹兩去毛塗龍骨兩壹桑寄生兩壹當歸

叁分剉附子叁分炮裂白芍藥叁分烏賊魚

微炒骨兩壹桑螵蛸半兩

右件藥搗細羅為散食前以溫酒調下二

錢婦人大全

治婦人虛冷小便數桑螵蛸散方

桑螵蛸叁十枚鹿茸二兩去毛塗黃耆兩叁

剉○婦人大全良牡蠣粉二兩甘草二兩炙

方永類鈐方半兩牡蠣兩甘草兩微赤剉

右件藥搗細羅為散食前以生薑湯調下

膏錢鈐方

治婦人虛冷小便滑數菝葜散方

菝葜剉桑螵蛸微炒附子炮裂去竜骨各壹

韭子半兩桂心兩半

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治婦人藏腑久冷小便滑數牡蠣散方

牡蠣二兩燒龍骨兩壹鷄肫脰十枚附子兩壹

炮裂去壹兩吳茱萸壹分湯浸七鹿角屑壹兩

皮臍壹兩右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下壹錢

治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁鹿茸

丸方

鹿茸壹兩去毛塗椒紅壹兩桂心壹兩附子

壹兩炮裂牡蠣壹兩燒為粉○承類鈐壹兩桑

去皮臍壹兩補骨脂壹兩石斛壹兩沉香壹兩

肉蓯蓉壹兩酒洗去雞肫脰壹兩微炒壹兩

味各二兩

右件藥搗細羅為末酒煮麪糊和丸如梧

桐子大每服食前以溫酒下二十九婦人

良方鈐方空心溫酒下三十元

治婦人小便滑數龍骨丸方

龍骨二兩鹿茸壹兩去毛塗椒紅壹兩附

子壹兩炮裂

右件藥搗細羅為散以酒煮麪糊和丸如

梧桐子大每服食前溫酒下二十九

又方婦人大全良方治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁右以鹿角

屑炒令黃擣細羅為散每服食前溫酒調

下二錢

又方婦人大全良方治證同上右雞肫脰微炙擣細羅為

散每服食前以溫酒調下一錢良方二錢

又方婦人大全良方治婦人遺尿不知出時右以桑螵蛸微炒

酒炒良方擣細羅為散每服食前以生薑湯調

下二錢

治婦人大便不通諸方

夫婦人大便不通者由五藏巢氏病源三焦五藏不調

冷熱之氣結於腸胃則津液竭燥大腸壅澀

故大便不通也張仲景云婦人經水過多者

則去津液亦大便難也

治婦人大便不通牽牛子散方

牽牛子五兩半生半炒熟○婦人桂心壹兩

○袖珍枳殼麩炒微黃去瓢○郁李人兩

湯浸去皮木香兩半木通壹兩青橘皮壹兩湯

焙瓢微炒兩青橘皮壹兩湯

右件藥搗細羅為散空心以熱水調下一

錢良方二錢如茶煎一沸放溫攪起服之

亦佳

治婦人大便不通調氣丸方

檳榔大羌活 桂心 芎藭 木香已上一

兩郁李人湯浸去皮微炒川大黃剉微炒牽牛子生

半炒 青橘皮湯浸去白穰焙各二兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大空心以溫生薑湯下三十九

治婦人氣壅大腸祕澀宣轉木香丸方

木香 川大黃剉微炒 桂心 檳榔 青橘

皮湯浸去白穰焙已上各壹兩 巴豆半兩去皮心用新

火炒令黃研紙裏壓令油盡

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻用麵糊

和丸如粟米大每服以溫水下七丸

治婦人大便不通搜風轉氣郁李人散方

郁李人二兩湯浸去皮微炒 牽牛子壹兩微炒 神麩微炒 桂

心 木香 青橘皮湯浸去白穰焙 檳榔已上各

右件藥搗細羅為散空心以生薑茶調下

二錢

治婦人大便不通通神散方○婦人大全良方婦人大便不通熱而實者方可投此藥其證心腹脹痛手不得近心胃煩悶六脉沉滑而實是其證也永類鈔方同

川大黃炒 川芒消 檳榔 桃花 郁

李人湯浸去皮微炒 木香半兩

右件藥搗細羅為散空心以粥飲調下二

錢袖珍方同 ○袖珍方壹方大黃半兩 芒消 桃花

郁李仁去皮微炒 檳榔三兩 右為末空心米

飲調下二錢食前服

治婦人大便秘澀芫花丸方

芫花半兩醋拌炒令乾 青橘皮半兩湯浸去白穢焙 川大黃

叁分剉微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食前以生薑湯下十丸

治婦人大便不通心腹虛脹牽牛子散方婦人

大全良方袖珍方名牽牛丸良方又云博濟方有大黃檳榔名氣針貞

牽牛子

四兩生用○良方二兩袖珍方二兩半

青橘皮二兩湯浸

去白瓢焙○良方袖珍方壹兩木香壹兩○良方袖珍方五錢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

空心以溫水下二十九○袖珍方右為細

末煉蜜為丸每服六七十丸空心白湯送

下

治婦人夾宿食大便不通玄豆丸方

玄豆

壹分炙令焦去皮子巴豆

五枚去皮心紙裏壓去油香墨二錢

右件藥搗細羅為末入巴豆研令勻以醋

煮麴糊和丸如梧桐子大每服壹丸嚼乾

柿裏以溫水下

治婦人腸胃風結大便常秘大麻人丸方

大麻人

二兩別搗如膏○婦人丸方良方袖珍方壹兩類鈔方去殼川大

黃二兩判碎微炒檳榔壹兩木香一兩枳殼壹兩麩炒

右件藥搗羅為末入大麻人同研令勻以

鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心以溫水

下二十九袖珍方拾九三袖珍方一方大麻仁

去皮另二槓椰壹木香兩火黃炒兩右為
 末與麻仁膏煉蜜為丸如梧桐子大每服
 壹十九空心溫水下大和入同煎令
 治婦人大便下血諸方治婦人
 夫婦人藏腑損傷風邪易入凡熱氣在內令
 人下血風氣在內亦大便血色或如小豆汁
 腹中疼痛若前便後下血者血來遠前下血
 後便者血來近遠近者言病在上臆下臆也
 婦人面無血色時寒時熱脈浮溺按之絕者

為下血也

治婦人風虛大便後時時下血宜服荆芥散

方治婦人大全良方

荆芥 黃耆剉 熟乾地黃 當歸剉 微桑

耳 地榆剉 樗白皮微炙 皂莢刺 乾薑

炮裂 槐豆微炒 牛蒡子微炒 甘草炙 微赤剉 已

右件藥搗細羅為散食前以粥飲調下二

錢

治婦人大便後下血不止側柏散方

側柏二兩 龍骨貳兩 鹿角膠搗碎炒 熟乾地

黃木香 當歸剉微炒已

右件藥搗細羅為散食前以粥飲調下二

錢

治婦人大便下血小腹中切痛不止桑耳散

方

桑耳微炒 牡蠣粉 龍骨 當歸剉微炒 白芍

藥已上各 黃芩半兩 甘草半兩

右件藥搗細羅為散食前以粥飲調下二

錢大 治婦人大便下血不止阿膠丸方

阿膠貳兩 烏賊魚骨二兩 白芍藥二兩

歸剉微炒 劉寄奴剉微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大食前以粥飲下二十丸

治婦人大便下血或似小豆汁烏賊魚骨丸

方

烏賊魚骨兩 芎藭分 熟乾地黃壹兩 茜根

烏賊魚骨兩 芎藭分 熟乾地黃壹兩 茜根

青當歸壹兩到白芍藥叁分阿膠二兩擣碎

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大食前以粥飲下三十丸

治婦人大便後下血不止腹內疼痛烏龍丸

方

烏龍尾煤壹兩伏龍肝一兩香墨一兩當歸壹兩

炒皂莢子人半兩

右件藥擣細羅為末以麩糊和丸如梧桐

子大每服食前以生薑艾葉煎湯下二十

丸

治婦人腹肚脹滿臍下疔痛大便下血不止

艾葉丸方

艾葉壹兩鼈甲壹兩半塗醋炙當歸壹兩

炒卷栢一兩白龍骨二兩附子壹兩炮裂乾

薑壹兩炮裂赤芍藥叁分

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大食前以粥飲下三十丸

治婦人大便卒下血不止方

鼓一

右以水三大盞煮取壹盞去滓分為三服

壹日溫溫服盡

又方巴豆

青枚燒灰亂髮如鷄子太燒灰

右二味細研以酒三合調頓服之

直指方

大便下血芎歸湯加炒槐花

艾薑湯治大便下膿血

艾葉握一黑豆百粒

右新水壹大盞煎陸分入生姜汁叁大匙

稍熱服

又方黃連

二錢南木香壹錢

剉細慢火煎食前服

小便出血則小腸氣秘氣秘則小便難其痛者謂之淋不痛者謂之尿血頭髮燒存性為末新汲水調下妙○婦人大全良方髮灰散治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠近之謂也又治飲食忍小便

類聚

卷九

類聚

卷九

或走馬房勞皆致脬轉臍下急痛不通兼
 治肺疽心衄內崩吐血壹兩口或舌上血
 出如針孔若鼻衄吹內立已亂髮燒灰本
 云能療瘀血通關鬲利水道破癥瘕癰腫
 狐尿刺尸疰雜瘡療脬轉通大小便止欬
 嗽鼻 右壹味用二錢以米醋二合湯少許
 調服并華水調亦可服藥訖即炒黑豆葉
 蹲其上則通

又方車前子但曬乾為末每貳錢以車前子
 葉煎湯調下

又方海金砂為細末新汲水調下五淋散夾
 又五苓散竹園尿門冬草燈心葱頭煎湯調
 下
 婦人大全良方

婦人脬轉不得小便方

菟葉散治婦人脬轉小便不通亦可治男子

裹茶菟葉 燒灰滑石 研細 乙兩半兩

右研停沸湯調二錢服

石韋湯治脬轉小便不通 由指迷方同前

石韋去車前子

右等分爲粗末每服五錢水二瓊煎至壹

錢去滓服○永類鈴方石韋去車前子水

煎

千金翼治婦人不得小便

杏人七粒去

右壹味麩炒黃爲細末水調服立通

又方紫草時後方爲末并華水調取三指撮

立通時後方服三撮便通又云紫苑皆可

用

葱白湯卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣乘并膀胱或從憂驚氣無所伸鬱閉而不流氣衝脢系不止診其脉右手澁小左手急大

橘皮三兩葵子乙兩葱白乙莖

右咬咀水五升煮取二升分三服出指迷方

遺尿失禁方

經云膀胱不利爲癃不約爲遺尿者乃心腎

之氣傳送失度之所爲也故有小便澀而遺者有失禁而不自知者又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又有脬寒臟冷而遺尿不禁治之各有方

治婦人遺尿不知出時出千金翼

白薇 白芍藥等分

右爲末酒服方寸匕日三服空心承類鈔方同

又方白凡 牡蠣等分

右爲細末飲服方寸匕亦能療丈夫遺尿

療婦人小便不禁以雄雞翎燒灰爲末酒服方寸匕

婦人小便出血方

治婦人卒傷於熱尿血陳總領云余頃在章貢時年二十六忽小便後出鮮血數點不勝驚駭全却不疼如是一月若不飲酒則血少終不能止偶有鄉兵告以市醫張康者常療此疾遂呼之來供一器清汁云是草藥添少蜜解以水兩服而愈既厚酬之

遂詢其藥名乃鏡面草一名螺厝草其色青翠所在石階縫中有之一器

婦人大便不通方

局方四物湯加青皮煎服永類鈔方此下云仲景云婦人經水

過多則亡津液亦大便難也

大三腕散又名三和散永類鈔方同方見心腹痛七宣真亦麻

仁真並見和劑局方

論老人虛人風人大便秘不可用駛藥

初虞世云余歷觀古人用通藥率用降氣等

藥蓋肺氣不下降則大腸不能傳送以杏仁

枳殼訶子等藥是也又老人虛人風人津液

少大便秘經云澁者滑之故用胡麻杏仁麻

子仁阿膠之類是也今人學不師古妄意料

酌每至大便秘燥卽以駛藥蕩滌之既走津

液氣血大便隨手愈更祕澁兼生它病予昔

在魯山日有一叢少自稱太監曹鎮有寄居

王世安少府本京師人始病風淫末疾爲此

生以駛藥累累利之後爲肺痿咯膿血卒至

大便不通而又古人服藥尤所謹重不若今人之輕生故舉此以戒後人

治風入腸間或秘或利方

經云春傷於風夏必殮泄蓋木氣刑土也土不能滲泄則木氣勝故泄風氣行津液燥故秘即不可專以秘燥爲風也余家中宗親張公度母氏年七十日下利數十行百方治之不愈又苦腰脚拘攣公度以蒺藜酸棗仁治拘攣而利愈黃魯直母安康郡太苦祕結以

公度藥投之而大便利故知秘與利皆出於風公度潞人名騃世有令德公度承父醫學而克其家清修不妄取真有德君子也今見於此

治風人脚氣人大便秘或利虛人尤宜方

皂莢子

參百枚破作兩片慢火炒燥甚即入酥乙棗大又炒至燥又入酥至

焦黑爲細末

右煉蜜負如梧桐子大每服三十負煎蒺藜酸棗仁湯下空腹服兩時久未利再進

一服漸加至百員不妨以通為度承類鈔方同

痰藜湯方痰藜不以多少炒至赤黑色白內

以木棒舂去揀簸淨每痰藜三兩以酸棗

仁壹兩炒令香同杵為齏末燂尾羅篩每

三錢水清瓊煎至七分法泔溫服下前員

子藥承類鈔方同

大五柔貞主藏氣不調大便難通榮衛利九

竅進飲食方承類鈔方同

公火黃斗米入和去飜白芍藥承類鈔方同

別牛脂去筋膜熬成油菴蓉酒浸軟溫水洗切焙各膏

兩桃仁百合仁四十枚並去皮

右除有油藥並為末煉蜜員入牛嚼桃杏

仁葶塵杵數千下員如梧桐了大米飲下

三員日三服腹稍空時服未知稍增以知

為度承類鈔方同

二仁員

捏作人指狀長三寸許坐廁上內之以手掩定候大便通即放手未快再作已上四方山初虞世○永類鈴方蜜兌法至要宜兼用之方見大方科大小便門婦人大便下血方

防風如神散治婦人風虛大便後時時下血

防風 枳殼等分

右咬咀每服三錢水壹錢煎至七分去滓空心服永類鈴方同

治腸風下血

赤芍藥乙兩瓦上燒存性

右為末溫酒調下二錢

又方枳殼

拾五合每合入巴豆三粒去殼皮安在內以線纏之用好米醋於砂盆內煮候醋乾更加無灰酒以黃耆五兩者令糜爛去巴豆研成膏

入膏內為元如梧桐子大每服二十元空心米飲吞下酒亦可

治痢久不安下血成片頭髮壹團洗燒灰研每服一二錢新汲水調下瘡癩之毒以溫

酒服佳空心

木香烏荊圓治腸風酒痢

已上四方出專治婦人方

木香乙荆芥穗

川烏

炮各乙兩

右為末酒糊員如梧桐子大每服二十員

食前臨卧濃煎栗根白皮酒吞下忌羊血

永壽鈔此同舍處傳之曾服有效

治腸風下血

蒼朮

不以多少以皂角農援汁浸一夕次日煮令水乾焙燥

右壹味為細末麴糊員如梧子大米飲空

心下五十元日三

地榆湯

駱龍吉方

經云結陰者便血壹升再結者

二升三結三升

地榆

四兩

甘草

乙兩

縮砂仁

四粒

右為粗末每服三錢水壹瓊煎至七分去

滓空心溫服

腸風黑散治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑

之內或食生冷或啖炙煖或飲酒過度積熱

腸間致使脾虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹

疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻併並皆治之

敗棕燒木饅頭燒烏梅去核粉草各等分

右為細末每服二錢水壹瓖煎至七分空心溫服僕嘗治一婦人便血不止用煮附員加五靈脂效永類鈔方同方並見調經

瑞竹堂方

四七湯治婦人女子小便不順甚者陰戶疼痛

半夏意雨湯泡七次厚朴姜製赤茯苓各五錢紫蘇葉

二錢甘草二錢香附子五錢

右為咬咀分作四服每服水二盞生薑五片煎至七分去滓加琥珀末壹錢調服

經驗良方

治尿血右用爪甲亂髮各等分二味並燒存性為末酒調日三服

仙傳濟陰方

小便赤澁

臍中有撮小便攻或在產前產後中葵子元
中三五服葱熨臍中立使通

此婦人小便赤澀腹中有熱如小便澀赤
兩津液血出多所以小便不尋常也

葵子散

木通半兩當歸三錢葵子二錢通草壹錢梔子三個

右水煎產後葱熨臍中小便即通也

大便閉結

肺臟虛熱大便結此乃脾虛臟中竭薄苛湯

點三四服自然通利熱須撤

凡婦人大便結肺臟受熱風血虛也

三黃散

防風 只殼各半兩 大黃二兩

右為末薄苛湯下

空腸元

麻仁 厚朴 只殼 大黃 杏仁 川

烏等分

為末煉蜜元米飲下

壽域神方

無故尿血用燕巢中草燒灰為末酒調服半

錢亦治男子

只效 大黃 杏仁 川

赤白痢疾

大黃 杏仁 川

醫方類聚卷之二百十八

大黃 杏仁 川

赤白痢疾