

婦人良方補遺大全卷之十六

臨川陳自明良甫編集

坐月門

鰲峯熊宗立道軒補遺
松軒葉玄昊類校

○坐月序論 妊娠疾病既明須知坐月避忌故

○產寶方周題序第一

頽聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養命之方天年未
終疾病攻奪嗟呼世无良醫著述則急難倉卒尋醫其舛誤多矣醫之
中惟產難為急子母性命懸在片時題勤志方書常思救療每覽名醫
著述皆誌於心且夫男女構精陰陽分氣就中女弱疾狀頗多蓋其稟
柔質以為人有血臟而抱育妊娠之內道理有常至於飲食之間動靜
之際尤多制忌以節情及乎既產鮮保安者蓋是損觸藏府傷動筋骨
將理稍失疾患便生更值育醫取次下藥致其所苦積漸懸危曰復一
婦人良方

日亟至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰生則知在天地之間以
 生育為本又豈因生產而反危人之命乎自惟攝理因循藥餌差謬致
 冥產婦不保安全且婦人生產方二三次血氣未衰飲食易進但此節
 性則无病生縱或偶有微病不難醫治至於四五次迨乎七八次傷敗
 已深血氣衰微子藏虛弱穢敗內帶風邪外攻若有病生宜須審察醫
 若不子細疾便危治此醫殺之理甚明矣且仕俗之家婦人產後復乳
 其子產既損氣已甚乳又傷血至深靈命耗神莫極於此稍失常理便
 合急醫或以家貧不及專賂醫者醫者怠慢須臾因爲吁人之生產非
 小事也而醫者圖財悔而致死此醫殺之理又明矣且夫產前產後血
 氣未寧一疾苟生百疾同作古故所以著方論於產乳者正在此也至
 若鯉魚阿膠能治胎動苦弱當歸善療胎痛抵如胎動胎痛非一理也
 有因母疾而胎動者有因胎不堅固而自動者痛亦如之此畧率大綱
 蓋須知醫者之功也降刃地黃益血生薑助氣芍藥止痛黃耆補虛用

之門門其效如聖用之失理不如不醫乃知醫人不可苟作題以此
 心常思著方以濟危急而奪解不博未能自信所以偏採產術志在廣
 行復見外殷產寶_醫切深入醫門乃大中歲相國白敏中傷茲婦人多
 患產難詢訪名醫思救人命或人奉殷相國迎召問其產乳殷乃撰方
 三卷贄於相國_上重其簡要命曰產寶此方雖存_上者甚少頌志在
 愈疾常恨不家藏一本故輒敢序之蓋欲開其衆聽凡五十二篇三百
 七十一方兼拾_上氏之遺作小論三篇次於序末庶幾妊娠之家自_上
 覽斯為家內明師爾時丁巳歲秋八月序

○將護孕婦論第二

凡婦人妊娠之後以至臨月藏府壅塞關節不利切不可多睡須時_上
 行步不宜食粘硬難化之物不可多飲酒不可亂服湯藥亦不可妄行
 鍼灸須寬神減思慮不可負重或登高涉險若偶然胎不安腰痛者須
 服安胎藥一二服自安即止周頰論曰生產雖然觸穢排比須要在先

八月一日貼產圖并日遊胎系所在并借地法於妊婦房內北壁上仍依位設床帳厚鋪茵褥周密使无孔竅夏月亦鋪厚薦用好油單薄簾紗帳以備之常焚香令潔淨備辦湯藥器物既齊欲產不得喧哄人力雜亂大小惶惶驚動產婦宜預擇年高歷練生婆一人并穩富曾經陪婦人一人扶持不日揮霍恐產婦憂驚又忌閑雜外人并喪孝穢觸之人者視功不日驚動傷早若坐婆揪不能體候胎氣方轉動之際便為欲生多端下手驚動傷早則橫倒之憂從此而致也

產寶方云妊娘欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產也且令扶行執忍如行不得則凭物扶立行得又行或衣襟先下然後作陣腰腹痛取中如火生此是胎離脊經兒逼產門也即服催生藥一二服即扶上草切不可坐草早務要產婦用力存養調停亦令坐婆先說諭之如竟心中煩悶可取白蜜一匙用新汲水調下或菴飢即喫軟飯或粥少許亦須預備勿令飢渴恐產婦无力困乏也若不飢渴亦不須強食大凡生產

自有時候不可強服催生滑胎等藥或因坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐變生他疾又須戒之

○滑胎例第三 凡八方

凡妊娘已滿十月形體成就神識咸備分氣趣產宜服滑胎湯藥

滑胎湯散

瘦胎易生胡陽公主每產累日不下南山道士進此方

商州枳殼 二兩

粉草 一兩

右為細末百沸湯點二錢服空心日三服凡懷孕六七月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日已後內漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣為衆方之冠此方分兩出必用方以此為正○

一方枳殼六兩甘草一兩

故加枳殼減甘草蓋未產人甘草性寒故也未產前一服忌登高廁

一方有糯米半升淘洗控乾同炒為末米飲白湯調下一二錢○溫

隱居加當歸木香各等分

○張氏方治妊娘胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中

諸疾下氣寬葛 枳殼五兩 甘草半兩 香附子三兩炒去毛

為末薑煎湯點亦可如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用煎白三寸同煎服○婦人脾寒血氣成塊作痛熱酒調服○大小便不通白牽牛為末煎湯調服○選奇方 香附子 枳殼略二 甘草半兩

內補丸 治妊婦衝任脉虛補血安胎

熟地黄 二兩 當歸 一兩微炒

右為細末煉蜜丸如梧子大温酒下三四十丸

○許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋抑陽助陰之藥甚多然胎前藥唯惡羣隊若陰陽交錯別生他病唯是南山道士枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不致弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也

○易產滑胎方其藥性滑利小便 車前子

右為末酒調方寸匕服不飽飲若水調○詩云采芣苢能令婦人樂有子矣○陸機註云治婦人產難思詳孔子序詩云樂然而生易於生育後人以為注喜誤矣

治產難 **神效丸** 瘦胎滑利易產臨入月服之極有神効知蘇州施少

卿方蘇州徐太守傳

通明乳香 半兩別研 枳殼 一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大空心温酒吞下二十九日一服懷孕九月已後方可服

崔氏方名 **神效丸** 乳香 一分 酒糊丸

神效散 治妊娘滑胎易生

揄白皮 甘草各二兩 葵子 一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓温服○一方無揄白皮名葵子散

○主孕九个月将产消息

猪肚一全具

依法用葱五味煮熟食之如不盡更食以盡為度不得与别食無功

保胎散

安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜偶然顛仆胎動胎

痛漏胎下血煎服佛手散神寢丸枳殼散見前此三藥入月內

大宜常服

香附子 四兩

山藥 二兩

縮砂仁 兩 木香 四錢 粉草 一兩一分

益智仁 紫蘇葉 各半

右為細末白湯點二錢服

補遺

無憂散

治妊婦身居富貴口厭其肥憂樂不常食物不節既飽

便卧致令胞胎肥厚根蒂堅牢行動艱難因致臨產必是難生入月可

服無憂散則易生矣

當歸

川芎

白芍藥

枳殼

乳香 各三 木香

甘草

血餘 即髮灰以猪心

右為末每二錢水煎日進兩服

○月空方位例第四 出太平聖惠

正月 三月 五月 七月 九月 十一月 在丙壬

二月 四月 六月 八月 十月 十二月 在甲庚

○逐月安產藏衣忌向方位第五

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠方云凡婦初入月便

寫產圖一本以朱書某月某日空貼在某位如正月在丙壬可於壬位

安產婦床帳丙位藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看

節氣用之又云每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池

吳時豐隆白虎大夫天候狂虎凡十三神並從月建易其位所謂月空

者按內經云月廓空無馮王冰注云論月輪中空日也即非十三神之

數今太平聖惠方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言

正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言

之簡耳今人多依聖惠方者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並

向月德月空方位所有十三神殺並從節氣更換若交次月節便作次

月用書產圖者非也假如正月十四日立春若妊婦十三日乳臥豈可
 作去年十二月用也必依月分用之乃是若依節氣所換則天德月德
 所在差矣然月空與壬謂之中天空頗相類議者以為天空者非十三
 神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂天空值此
 神百事不宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖曆云天德正月在丁
 二月在坤三月在壬四月在辛五月在乾六月在甲七月在癸八月在
 艮九月在丙十月在乙十一月在巽十二月在庚

○又堪輿醫有遊年白虎殺神在太歲後一辰如太歲卯則白虎在寅
 餘倣此推之若產及藏衣犯之則子母皆不利

○王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦有自然難
 產兒自逆生者及有產腸胃俱下者產已則復如故此非疾病所劫
 氣血所主天下之理蓋有不可窮詰者亦宜知之

南



西

北

東

安產藏衣十二神吉凶方位

正月	壬	丙	艮	寅	寅	卯	辰	辰	辰	午	申	酉	戌
二月	坤	艮	寅	寅	卯	辰	辰	辰	午	申	酉	戌	亥
三月	丙	壬	坤	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
四月	甲	庚	巽	巳	巳	午	未	未	申	酉	戌	亥	子
五月	丙	壬	艮	寅	寅	卯	辰	辰	辰	午	申	酉	戌
六月	庚	甲	乾	亥	亥	子	丑	丑	寅	卯	辰	巳	午
七月	丙	壬	坤	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
八月	庚	甲	巽	巳	巳	午	未	未	申	酉	戌	亥	子
九月	丙	壬	艮	寅	寅	卯	辰	辰	辰	午	申	酉	戌

十月	庚	甲	乾	亥	亥	子	丑	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
十一月	癸	丙	坤	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
十二月	庚	甲	巽	巳	巳	午	未	未	申	酉	戌	亥	子	丑

推婦人行年法第六

生氣方

產婦宜向之坐卧及產帳向之開門大吉

反支月

遇此月即鋪灰上用牛皮或馬皮記草勿令惡血汚地吉

絕命方

不得於其上產又不得向之大小便避之大吉

懸尸日

遇此月產不得攀婦宜懸馬懸攀之大吉

閉肚方

臨月至滿月並不得向之大小便及棄不之水謹之吉

產帳不得向之

開門忌之大吉

三歲行年在癸卯離二月坤兌
日 巳亥在正北在正北赤色正南正南方赤
偏西至偏東赤衣 首 衣師自產

三歲行年在壬寅坎月坤乾艮
日 卯酉在正北在正北黑色正北正北方青
偏東至偏西赤衣 首 衣師自產

三歲行年在辛丑震月艮乾
日 寅申在正北在正西青色正東正南方青
偏東至偏西赤衣 首 衣師自產

三歲行年在庚子艮月震坎
日 寅申在正北在正南白色正西正南方青
偏南至偏北赤衣 首 衣師自產

三歲行年在己亥乾月坤坎震
日 巳亥在正北在正南白色正西正南方青
偏東至偏西赤衣 首 衣師自產

三歲行年在戊戌兌月巽離
日 午申在正北在正南白色正西正南方青
偏西至偏東赤衣 首 衣師自產

三歲行年在丁酉巽月兌坤
日 巳亥在正北在正東青色正東正南方青
偏南至偏北赤衣 首 衣師自產

三歲行年在丙申坤月艮離巽
日 巳亥在正北在正東青色正東正南方青
偏北至偏南赤衣 首 衣師自產

三歲行年在乙未離月艮坤兌
日 卯酉在正北在正北赤色正南正南方赤
偏西至偏東赤衣 首 衣師自產

三歲行年在甲午坎月艮乾艮
日 寅申在正北在正北黑色正北正北方青
偏東至偏西赤衣 首 衣師自產

四歲行年在癸巳震月艮乾
日 丑未在正東在正西青色正東正南方青
偏北至偏南赤衣 首 衣師自產

四歲行年在壬辰艮月震坎
日 子午在正東在正西黃色正東正南方青
偏南至偏北赤衣 首 衣師自產

四歲行年在辛卯乾月坤坎震
日 巳亥在正南在正南白色正西正南方青
偏東至偏西赤衣 首 衣師自產

四歲行年在庚寅兌月巽離
日 辰戌在正南在正南白色正西正南方青
偏西至偏東赤衣 首 衣師自產

四歲行年在己丑巽月兌坤
日 卯酉在正西在正東青色正東正南方青
偏南至偏北赤衣 首 衣師自產

四歲行年在戊子坤月離巽
日 寅申在正西在正東黃色正東正南方青
偏北至偏南赤衣 首 衣師自產

四歲行年在丁亥離月坤兌
日 丑未在正北在正北赤色正南正南方赤
偏西至偏東赤衣 首 衣師自產

四歲行年在丙戌坎月乾艮
日 子午在正北在正北黑色正北正北方青
偏東至偏西赤衣 首 衣師自產

四歲行年在乙酉震月艮乾
日 巳亥在正東在正西青色正東正南方青
偏北至偏南赤衣 首 衣師自產

四歲行年在甲申艮月震坎
日 辰戌在正東在正西黃色正東正南方青
偏南至偏北赤衣 首 衣師自產

○體玄子借地法第七

東借十步 西借十步 南借十步 北借十步 上借十步 下借十步

壁方之中四十餘步安產借地或有穢汚或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神擁護百邪遠去急上如律令勅前項借地法朱書一本貼於產婦房內北壁上更不須避忌神殺也

○禁草法章第八

鋪草及檀符訖即呪曰

鐵上湯上非公所當是王一言得之銅一言得之鉄母子相生俱獲鐵急上如律令

○禁水法第九

欲產時貯水呪曰

南無三寶水 水在井中為井水 水在河中為河水

水在器中為淨水 水在法中為真水 自知非真莫當言水

以淨持濁 以正治邪 日遊月殺 五士將軍 青龍白虎

朱雀玄武 招搖天狗 軒轅女媧 天吞地吞 懸尸閉胎

六甲禁諱 十二神王 土符伏神 各安所在 不得動靜

不得忌干 若有動靜 若有忌干 施以神呪 當攝汝形

阿佉厄阿毗羅莫多梨婆娑地梨娑訶

○入月預備藥物第十

保氣散 佛手散 枳殼散 神寢丸 揄白皮散 保生丸

催生丹 黑神散 大聖散 花蕊菜右散 黑龍丹 理中丸

催生符 生地黄 羌活 葵子 黃連 竹茹 烏梅

雌雄石燕 甘草 海馬 馬嚼鉄 藜子 陳皮 姜錢

黑豆 白蜜 無灰酒 童小便 好醋 白米 煎藥爐

銚子 煮粥沙瓶 濃藥帛 醋炭盆 小右十顆湯瓶

婦人良方十卷

軟硬炭 乾柴茅 煖水盆 洗兒肥皂頭髮

斷臍線及剪刀 斷臍本不用刀只用帛裹臍下齒交斷 乾厚草 臥交荷 軟厚檀

燈籠 火把 繳巾 油燭 發燭 灯心

○催生靈符第十

書符時宜以水飛朱砂書之貼於房內北壁上過坐養之時劄於針上就盞內以燈燒之庶免飛揚溫水調服

○治產難橫生逆產胞衣不下靈符出聖惠方○前方同

麗 函 麗 麗 麗 麗 麗 麗

麗 麗 麗

不安穩未書貼產房處此壁天

麗 麗 麗

覺不安穩書貼枕上

麗 麗 麗

治橫生靈符未破書此符以順水吞下

此 儼 儼 儼

此四符入月一日墨書鞋底上仍密安產婦帶身下勿令人知

扇 扇 扇 扇 扇

此三符遇產難以黑墨書吞之

麝 麝 坐 鬼 園

治胞衣不出
靈符四道急
則以朱砂書
符吞下

新刊婦人良方補遺大全卷之十六

新刊婦人良方補遺大全卷之十七

產難門

○產難類

坐月既明須知產難故以次之

○產難論第一

夫產難之由有六兩受各異故治
察之方不同今具言之以開世或

凡婦人以血為主惟氣順則血順胎氣安而后生理和今富貴之家往往保惜產母推恐運動故羞出入專坐卧曾不思氣閉而不舒快則血凝而不流暢胎不轉動以致生理失宜臨產必難甚至悶絕一也且如貧者生育日夕勞苦血氣舒暢生理甚易何俟乎藥則孕婦富貴於運動者明矣 次則婦人妊娠已經六七月胎形已具而世人不知禁淫恣情交合嗜慾不節使敗精瘀血聚於胞中致令子大母小臨產必難二也何以知之生下孩子頭上有白膜一片滯臃如膠俗稱名曰戴

臨川陳自明 良甫 編集

熬峯熊宗立 道軒 補遺

松軒葉玄昊 顯章 類校

神效

曰生兒身有青有黑俗強名曰宿疰此皆是八月交合所致也如此則不特母病其子亦生浸淫赤爛瘡瘍俗謂之胎蛆動逾歲月不差可不戒乎 三則臨產太早大小揮霍或信卜筮或說鬼祟多方誤惑致令產母心驚神恐憂懼俱又被閑雜婦人喪孝觸濁之人衝濁若不預為杜絕臨產必難三也何以知之如偷生之女不正之屬况无產厄子母均安其理可知 凡臨產初然腹痛或作或止名曰弄痛坐婆疎率不候時至便令試水試水頗併胞漿水先破凡頭產門產道乳油及其兒轉便令坐草上 太早兒轉亦難致令產難四也直候痛極服中如火此是兒逼產門方可坐草即令易垂如坐草稍久用力太過產母因睡抱腰之人又不穩當致令坐立傾側胎死腹中其為產母五也時盛暑宜居泔幽房室日色遠感開啓窗戶多貯清水以防血運血悶血溢妄行血虛發熱之証如冬未春初天色疑寒宜密閉產室室室鏽條內外生火常令暖氣如春仍下部衣服不可去綿方免胎寒血結母

六也

凡孕婦入月斷不可洗頭方免產難及橫生逆產自明謹論

揚子建十產論第二

凡人生產先知此十產証候則生產之婦永无傷損性命生產之間性命最重幸而孩子易生人不知福方一有少艱難則頃刻之間子母之命懸於絲髮危世人所患者推自生產收生之人少有精良妙手緣此而多有傾性命予因傷痛其事不為无補如有胎前產後方法在後

一曰正產

正產者蓋婦人懷胎十月滿足隊臥氣足忽然腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹疼痛極甚乃至腰門重痛谷道挺送繼之漿破血下兒子遂生此名正產

二曰傷產

傷產者蓋婦人懷胎忽有七月八月而產忽至九月十月而產忽有經一年二年乃至四年五年而后產者令独以十月滿足為正蓋一人

之生陰注陽定各有時日不可改移今有未產一月已前腹疼胎腹疼
痛有如欲產仍却死事是名試月非正產也但一切產母未有前面正
產証候即可可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦胎腹疼
痛兒身未順收生之人却教產母虛亂用力兒身總方轉動却破產母
用力一逼遂使兒子錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母未當用力之
所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下
生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥
餌令兒下生譬如掘田而取之長非独无益而又害之此名傷產

三曰催產

催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛甚痛極其腰重穀道
送已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之忽有姪及數日產
母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之
正氣令兒連得下生此名催產

四曰凍產

凍產者蓋言三冬之月天氣寒甚產母經血得冷則凝結而不散因其
血之不散以至兒子不能生下此之一弊為害最深然世人不知覺若
冬月產婦下部不可脫去綿衣并不坐卧寒冷之處當滿房着火令漏
房常有暖氣常令產母背身向火令濟下腿膝間常有暖氣若背心上心
前少開寒冷須是暖灸綿衣以包之貴其血得熱則流散使兒子易生
此名凍產若春秋之間天地少有陰濕寒冷之氣亦可就房中以微炭
火暖之為妙

五曰熱產

熱產者蓋言盛夏之月欲產之婦當要其溫涼得所不可因熱恣意取
涼又有傷損胎氣又生產之處不可多着人數切恐人多熱氣逼能產
母蓋人之血氣得熱則散熱過則損今當夏暑火熱之盛而產母氣虛
人氣一逼則其血沸溢而血得熱則上蒸能令產母發熱頭痛面赤昏

昏如醉乃至不知人事世有名血暈者緣此而成也此名熱產者值夏月少有清涼之氣陰雨之變產母亦不可任意取涼恐生大病

六曰橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手忽先露其臀此因未當用力而產母用力之過也膈腹疼痛兒身未順則是產母用力一逼遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰卧令看生之人推而入去凡推兒之法先推其兒身令直上漸上通手以中指摩其肩推其上而正之漸引指摩其耳而正之須是產母仰卧然後推兒直上徐心正之候其身正門路皆順煎催生藥一盞令產母喫了方可令產母用力令兒下生此名橫產如若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚必傷人命

七曰倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉順生候只直下先露其足也治之七法當令產母於床上仰卧令看生之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經父不生却令看生之人輕用上門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸上順下直待兒子身轉門路正當然後煎催生藥令產母服一盞後方始用力一送令兒生下此名倒產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

補遺 治倒產脚先出者

烏蛇蛻一條 蟬退杆四 血餘一個 即胎髮

右同燒為灰分作二服酒調溫服仰卧霎時兒即順生或用穀尖刺兒足心刺三五次急以鹽少擦刺處即生

八曰偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正却被產母用力一送致令兒頭偏柱左腿忽偏柱在腿致令兒難近入門而不能生下但云兒已

露頂然不知兒之所露即非頂也忽左額角忽右額角而兒謂兒頭係
挂一畔以此不能生收之之法當令產門於床上仰卧令產生之人輕
輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向人明然後令產母用力一
送即使兒子生下若是小兒頂之後骨偏挂穀道即令兒却只顧額當
令看生之人以一件綿衣灸令溫暖用最手急於穀道外旁輕推兒
頭令正即便令產母用力送兒生也此名偏產凡於穀道外旁推兒頭
正須推其上而正之仍是小用輕力推此上兒而正之也若看生之人
非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

九曰礙產

礙產者蓋言兒身已順明路俱正兒子已露正頂而不能生下蓋因兒
身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生此名礙產收之七法當令
產母於床上仰卧令看生之人輕推兒近上徐引手以中指按兒
肩下其肚帶也仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒子下生此

礙產者看生之人非新良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

十曰坐產

坐產者蓋言兒子之欲生當從高處坐繫一條手巾令產母以手攀之
輕屈只坐身令兒生下非令產母臨生兒時坐着一物此名坐產若
是產母兒將欲生却令坐着一物即抵着兒路不能生也

十一曰盤腸產

趙都運蔡人每臨產則子腸先出然後產子產子之後其腸不收其以
為苦名曰盤腸產盤不能療偶在建昌得一坐婆施之一法而收之其
法遇產後子腸不收之時以醋半盞新以冷水七分碗調停喫產婦面
一縮五喫水及此良法也右等不可不知

治盤腸生方 又名盤腸產

右以半研為末搗鼻中則腸上

又方

以大紙撚以麻油潤了點燈吹滅以煙熏產婦鼻中腸即上矣

方以草麻子十四个去殼研如膏貼產婦頭項中心腸即上即落去

○催生方論第三 凡三十六方

五行論命以年月日時支干所遇五行所屬相生相植以推命之貴賤其間最切要者時也若林開命書以年為父母為己身月為元第僚友日為妻妾上官時為子孫啼產蓋人之生也得其時則終身富貴失其時則終身貧賤信乎人生之時不可忽也然則人生之時其可催乎所不知娘有諸生產之難若臨產起坐既久勞力困乏預妙藥催起以双其危當此之時又何暇其時耶又聖惠方有推娘婦行年法若行年有與本命相值所產歲月者即鏡驢焦皮枌灰草上令娘婦臨產時踐之手攀鞍轡頭則易產今之鑿者便以此持物為產卧所需之物誠誅論也其所以然者謂姓婦行年偶與本命相值於所產歲月慮有諸胎艱難之厄故以此厭禳之取其快速之意耳如或不值則無用矣今錄催生數方皆各醫士夫歷用良驗者以幸有緣產室方論曰夫產難者

內宜用藥外宜用法蓋多門救療以取其安也療產難坐草數日困之小能生此為母先有病終終俱閉所然

催生木飲子

治產難或橫或倒死胎爛服於腹中此方屢用神效

生火枌木板

一大尾長一尺

甘草

大者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新沙瓶內以紙三重緊封之文武火煎至一升半令香覺腹痛便準備候產婦腰痛欲坐草時溫上飲一小盞便竟心下開豁如竟再渴又飲一盞至三四盞竟下重便生更无諸君切不可坐草早及坐婆亂下手如催生藥只消一服此方至驗乃上蔡張不愚方也

催生如神散

療逆產橫生瘦胎煎治產前產後虛損月脉不調崩漏

名(一)催生黑散

一名(二)烏金散

一名(三)神散

百草霜

香白芷

不見火為細末

右二味等分研停每服二大錢於臨產辱時以童子小便并火米醋

打為膏沸湯調下集驗用滋童子小便各半煮同煎絕沸即調停熱服甚者不過再服血烏黑則止此藥大能固血免得乾生其效如此

催生如聖散

黃蜀葵花

不以多少焙乾

右為細末熟湯調下二錢神妙○或有漏血胎臟乾澁難產痛極者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下如無花時只用葵子爛研小半合以酒調灑去滓溫過頃服尤妙○亦治打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下 ○用子哥曰 經驗用子四十九粒

黃金內子三十粒

納研酒調能倚急 命若懸絲在頃吏

即令眷屬不悲泣

○曹秀才方。用葵子味研黑或研朱砂為衣每服四十粒溫酒吞下

催生丹

療產婦生理不順產真艱難並宜服之出 惠方局方同 宜 醫日合

十二月免腦通

去皮服 研如尺

通明乳香

一分

母丁香

末一錢

射香研

右四味拌停以免腦髓和丸如雞頭攘大陰乾用油抵密貼每服

一九溫水下即時產隨男左女右手中搥出是驗

又方

通明乳香 一塊如皂子大

右為末煮腰痛時用新汲水一小盞醋少許同調扶立令產婦兩手提兩石燕坐婆餽藥飲之先令姐婦念醫靈藥聖三遍然後服之仍畧扶行數步須臾坐草便生更無痛楚神良

經驗方如神開骨膏

乳香不以多少五月五日午時令一人在壁

背棒乳鉢在瓮上令一童兒以筆管透壁縫內逐柱從筆管中過入乳鉢內研令極細以童兒面北滴水丸如雞頭大每服一粒無灰酒吞下海上方用乳香朱砂等分為細末麝香酒調下

○治難產或倒橫不順方

蛇蛻一條全者

蚕蛻紙一張一方無

右入新瓦瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯下一錢三服竟痛便生○一方云臨產腰痛用藥三字麝香字溫酒調下名散

崔氏萬金不傳仙丹

單麻子 十四个去殼朱砂

雄黃各一錢半蛇蛻二天燒

右為細末將水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋洗臍下次安藥一丸於臍中用紙數重覆藥上以闊帛繫之須臾生下急取去藥一丸可用二次

口 治難產兼治胸衣不下又治死胎

右用單麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上陽自縮入如聖之妙。一方男用七粒女用十白粒。一方用單麻子百粒雄黃末一錢同研並用如前法

寸金散 治產難

右用敗兔毫筆燒為灰細研為末生藕汁一盞調服立產若產婦虛弱及素有冷病恐藕汁動氣當於銀石器內重湯調溫服

陸氏萬云此難產第一方

金箔三片兔毫筆頭三不燒為灰

右二味和停用蠟為丸如梧子大作一服溫酒下

又方

臍月兔腦髓塗於一張薄紙上更用一張令揭以秤槌搥三五十下每遇難生看大小書天生兩字作符以醋湯調下極妙

又方

大朱砂隨多少焙午日晒至百日不

右用臍月兔腦髓和丸如菉豆大欲產粥飲下一丸良久便生其藥男左女右手中把出

又方

臍月兔頭一林沉為灰

右為細末葱白煎湯調二錢立生

指迷方

臍月兔血蒸餅切作片子蘸之以紙袋盛掛

當風處陰乾為末煎香湯調下二錢

又方

兔皮和毛燒為灰末之以酒調方寸七服之即產衣不下者服之即下

○治橫倒生者或先手足者

明阿膠炒二方用酥滑石末各一乃

葵丁二合

右水一盞未煎至一盞去滓分二服

○治難產五六日不得分娩疲困虛乏者

光明水膠二乃

右用好酒一升半微火溶膠入新雞子一箇鹽一錢七攪溫令產婦坐倚物上伸腰大口作吞服之齋小腹重便生緣坐草早驚動故也

○救產難經日不生

雲母粉半乃溫酒調服入口當產不順者即產萬不失一陸氏方云是何

德揚方云已救三五千人却云雲母粉救過研細取一團如雞子大臨時以无灰酒調下

○治橫逆產理不順子死腹中

伏龍肝細研每服一錢酒調服之以土着兒頭上戴出妙

廣濟療難產三日不下方

吞雞子黃三枚并少苦酒服

集驗療橫產及胎死腹中

以三姓雞卵各一枚三姓鹽各一錢三姓水共一盞相和煮五七沸分溫二服今產母東首服之立出

○療難產日久氣力乏及不能生此是宿疾

赤小豆二升以水九升煮熟取汁入炙子明黃膠一兩同煎以時

一服五合未効再服不过三四服即產

備急方療難產三日不出

吞槐子十四枚即下廣濟方有蒲黃一合千金集驗崔氏同

又方

當歸為末酒調方寸匕服

唐生如意散

臨產腰疼方可服之

人參為末乳香各一亦

辰砂半亦

右三味一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用生薑自然汁調開冷服如橫生倒生即時端順至每平善傳於鄂倅施浚卿

藥見功效

陳氏催生神効七聖散臨產腰疼方可服之

延胡索 沒藥 白礬 白芷 姜黃

當歸

桂心等分

右為細末臨產陣痛時燒錢刀鈇是也令通赤泮酒調藥三錢服一
二杯立產此方鳳州何池縣喬醫家貨每服錢引一

催生神妙乳珠丹

乳香研細以猪心血為丸如梧桐子大以朱砂為衣日乾每服一
如催生冷酒化下良又未下再服一粒如大段難產時以蓮葉心蒂
七箇水二盞煎至一盞放溫化下一粒良又未下亦可再服此藥
驗如神無有不下者○如胞漿先破惡水不多胎乾不得卧時須先
與四物湯及通真丸補養其血氣次更濃煎葱湯放冷如体令坐婆
洗產戶須是欵曲洗令氣上下通暢仍更用酥調滑石末塗產戶里
次服前催生藥則方全矣○如胎死不下者用黑豆三合好醋半升
煮令豆爛取汁一盞放溫化下藥一盞須更便下矣方一未下亦可
再服○如胎下胞衣未下者服此亦使下也○若胎橫逆不順即先
服如神散方見再服此藥後以此藥催之合藥時要五月五日午時

極妙或七月七日或三月三日及月初上辰日合亦得

小品慈逆產方 益塗兒足底又可急搔瓜之并益塗產婦腹上即產

又方 以益和粉塗兒兩足下即順矣

集驗方療逆產 燒錢令赤細酒中飲之

又方 取天陰毛二七蒸燒以猪膏和丸如豆大吞下兒手即握

出神驗○刪繁慈逆產雜方取車軋中膏畫服下及掌心崔氏文仲小

品千金集驗備急同

○療逆產胞衣不出方 取窰屋黑塵研為細末酒調方寸七○一方

用梁上塵

○張文仲療橫生逆產服諸付藥不捷者灸右脚心三壯艾炷

如小麥大

○小品療橫生倒產手足先出方 並出外臺

用粗針刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮息當回順○文仲備

急千金崔氏集驗同

○橫產逆產二條其理雖別療法蓋同可以意量逐善參用也

救張仲文救婦人橫產先手出諸符藥不效者

灸右脚小指尖頭三壯灸炷小麥大下火立產

補遺 龍胎散 催生秘傳

婢退一刀 燒存性 大蛇蛻一條 燒存性 滑石五分 葵子炒一握

為末每一盞順流水微溫煖調下不可使熱湯

○催生應急方 好京墨新汲水濃磨服之墨水裏兒出○又方清油

同密等分湯少許調頓服○油菜子以濃煎一盞服之○又方取路

傍破草鞋一隻用鼻絡小耳繩燒灰酒調服

加味 芍藥湯 治產五七日不下垂死者及矮石六子交骨不開者

川芎 當歸各一斤 自死主殼一个 酥炙 生男女者婦人頭髮一握 存性

性 共為散每服三錢水一盞半煎服効約人行五里生胎死胎並下

無自死龜殼鑽圭齊殼亦可

催生湯治妊娠欲產痛陣尚盛 三兩日生 產母氣乏羨頓產

道乾澁致令難產經竟腹痛但破水後可 此藥即生矣如是死胎

亦下若未經破水者不宜輕服此却用他法治之

蒼朮二兩 米酒浸 枳殼 桔梗 陳皮 楊芍藥

川白芷 川芎 當歸各一斤 肉桂 半夏 粉草

厚朴 南木香 杏仁 茯苓各半斤

右為末每二錢順流水溫煖調下若竟熟悶白蜜湯調或劉散每服

四錢姜三片棗一枚以順流水煎服方用楊芍內桂能開通子宮

餘藥助氣開竅自遠麻黃內通陽氣甚則血行即產矣冬月用之甚

為的當隆暑之時恐經輕服但以五苓散用葵子臈心煎湯調下御

暑清竟滑胎則產易矣

○郭稽中產雜方論第四 凡三方

論曰產難者何胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子
故難產但服勝金散其胎即自生若逆生橫生並皆治之

勝金散方

麝香一子研

鹽豉一升以白青皮果了燒令赤急以乳鉢研細

右為末取秤錘燒紅以酒淬之調下一大盞

○陳無擇評曰產難不只胎側有兒枕破與敗血裹疑傷其胎息因緣
自有難易其如橫逆多因坐早太早努力過多兒轉未速或已破水其
血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫法當以針刺之使
自縮入即服**神應黑散**以固其血必自轉生○養生方云倉皇之間西
命所係不可不廣傳善養黑散之功也或以鹽塗克脚底抓搔之

補遺

橫產倒產等諸方已見前此不復贅神應黑散即前准生如神散

○產難子死腹中方論第五九十八方

夫產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難皆因穢沃
先下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死腹中其候產母必面黃

胎上冷者子已死也故產處坐卧須順四時方面并避五行避忌若有
觸犯多招災禍也

○治妊娘三五箇月胎死在腹內不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮各三斤

當歸一兩炒 滑石末三分

瞿麥 葵子炒 茯苓 粉草 子卷各半兩

右為粗末每服四錢水一盞煎至七八分去滓不拘時溫服

○療死胎腹內不出母已危殆不得已者立效方

水銀半兩 桂末一錢 右只作一服溫酒調下粥飲亦可

又方

以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子便下

○治妊娘胎死

子死腹中候其母面赤舌青者是

錫粉 水銀各一錢

右同研不見水銀為度茶末和丸如豌豆大煎瞿麥湯吞下

十全傳救療胎死腹中

以好辰砂一兩水煮數沸研令極細酒調二錢服

又方 雞子黃枚用姜汁合調雞子黃令均頻服分晚後喫云薑粥良

○趙和叔傳下如胎方 桂心二錢麝香當門子一个

右同研溫酒調服頃更如手推下比之用水銀等藥不損血氣

○何山方 無麝香每用桂末二錢痛陣密時用溫童子小便調下名

○齊胎死腹中不出母欲絕 用水銀二兩麝香之兒立出

○救急治子死腹中 取夫尿二升煮令沸飲之

文仲療或生胎不下或子死腹中或半著者及在草不產血氣上湯

心母面無顏色氣欲絕方 猪脂一升白蜜二升淳酒二升

右三味合煎取二升分溫兩服不能隨所能服之

又振子死腹中不出 以牛屎塗母腹上立出

○催氏療胎死 甘草一尺蒲黃二合筒桂四寸香豉二升雞子一枚

右細切以水六升煮取三升頓服胎胞穢惡盡去大良

○產經數日不出或子死腹中母氣欲絕 瞿麥六月通草 桂心各三刀 牛膝四刀榆白皮一升

右咬咀以水九升煎取三升去滓分溫三服

鬼臼不拘多少黃色者去毛碾為末以手指搥之如粉極細為度

每服二錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神此藥不用

羅只碾令極細

○鄧知縣傳方療死胎不出 朴消為末每用二錢溫童子小便調下知洪州進賢曾通仕定家

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

婦人必用

云昔為豐城尉時有猶孕五子一子已生四子死腹中啼喚欲死試問醫者令用此藥灌之死子即下猶得再生后有一牛亦如此用此法亦活醫云本治人方用以治畜也后因以救人無不驗僕于兒時人用此藥灌之死子即下猶得再生后有一牛亦如此用此法亦活醫云本治人方用以治畜也后因以救人無不驗

治死胎不下其證指甲青舌青眼悶甚者口中作桑臭先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞同煎至一盞却投朴消半兩研細末

三五沸傾出候微溫服盡其胎即化血水而下

繆宅歎息孺人社氏生產數日不下坐婆寃童救瘵皆無效召僕論之僕曰產前脈不可考但當察色而知之遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青見此色者知胎已死母却無憂矣或問曰何以知之予答曰

面赤舌青者子死母活明矣出自合至聖丹二粒服之胎即落矣以此見古人處方神速至聖丹方見和劑

治死胎不下惟**催生湯**是驗方見十四卷孕婦不同

欲產之婦脈離經離經云一呼三至至日陽加於陰一倍一呼一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

○產難生死訣第六

也胃脈常路之度周即言之一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

故一呼脈行三寸一吸脈行三寸一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

三至一吸脈行八寸一呼脈行九寸一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

一呼脈行一尺一吸脈行一尺一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

脈行一丈一吸脈行一丈一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

行得四五百五丈乃為一週一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

周而後始亦不在所起之經一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

見沉細而滑者亦與腎經之脈一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

繫胞胎見此脈者亦與腎經之脈一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

定知生若始胎夜半覺痛應分誕來日日午

也身重體熱寒又頰舌下之脈一呼三至至日陽加於陰一倍一呼

歸冥凡妊身有沉重者胃氣絕也又體熱寒脈上冷子當死腹中須遣子

面赤舌青細尋看母活子死定應維凡妊面赤舌青是氣絕也活之候舌上青色是氣絕也

胎死唇口俱青沫又出子母俱死總高判若胎死唇口俱青沫又出子母俱死總高判

應驗尋之賢哲不虛陳此症婦面舌青皆青色又須生痰未者是產下子母必死也此古醫哲新產之脉緩活吉實大弦急死來親凡應驗之文不虛矣陳其說也血通利是生法安若得沉重小者吉忽若吉之兆也若見大弦急之脉則必死之脉若得沉重小者吉忽若堅牢命不停之脉忽診得沉重小者此是形虛用德故云吉光可傳也寸口溢疾不調死若產後診得寸口脉溢疾大小不調沉細附骨不絕生骨不絕生骨不絕生骨不絕生骨不絕生骨不絕生念此向心經凡于脈者宜詳審也審者此候分明記長須審者此候分明記長須

補遺
有朱又頻出乃腎氣絕散當子母其死歌云赤則母死
子定知真釜血

新刊婦人良方補遺大全卷之十七

新刊婦人良方補遺大全卷十八

產後門

產後將護法第一 周適論行在其中

產難既明須知產後疾病故以次之

論凡婦人生產畢且令飲童子小便一錢不得便卧且宜閉目而坐酒更方可扶上床仰卧不得宜立膝未可高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免被賊風兼時時令人以物從心搗至膈下使惡露不滯加此三日可止仍不可令多卧如卧多着承人宜頻喚醒焉說產婦分梳了三日方可上床若三日上床則必就地睡卧又豈可產婦近如氣平 纒生產畢不得問是男是女且先研醋里坐三分脈之一法云不可服醋墨有傷肺經成欬嗽之戒誦過慮也然醋里坐本破疑結之血熱不可用 太多即不至傷厥然前在皆同更產後三日內令產婦嘗醋里坐大之醋里不可氣身燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之以防血逆血迷血運不省之患夏月宜於房門外燒磚以醋沃之置於房中夏月房中不宜著大分梳之後

後須更且食白粥一味不可令太飽頻少與之為妙逐日漸增之者其時
須是者得如法不用經宿者又不可令過冷不謂恐留滯成疾仍時
與童子小便一錢盞飲之亦須先備小便者過新產後不問腹痛不痛

有病無病以童子小便以酒和半瓊湯服五七服妙一臈七日之後方
可少進醇酒并此二小鹽味 一法饒產不得與酒緣酒引血

逆入四肢兼產母臍臍方唐不禁 平声 酒力熱酒入腹必致昏
悶七日後少進些二酒不可多飲如未出月間欲酒喫或服藥者可

用淨黑豆一升炒令煙出以無灰酒五升澆之仍入丹羌活一兩
洗淨拍破 同浸尤妙當用此酒下藥或時飲少許可以辟風邪養氣血

下惡露行乳脉也如產婦素不善飲酒或夏月之間亦不須強飲
一臈之後恐喫物無味可爛煮羊肉或唯雞汁畧用滋味作粥飲之

或恐喫爛者其清蹄肉忌母猪及白脚猪肉不可過多飲 江浙間產婦多喫熟
三月之後方可食濕麵食麵疾凡喫物過多恐成積滯若未滿

月不宜多語止笑驚恐百安惶哭泣思慮志怒強起離床行動又
坐或作針線用力工巧恣食生冷粘硬菜菜肥膩魚肉之物及不

避風寒脫衣洗浴或冷水洗濯濯當時雖未之見大損兩月之後即
成辱辱勞手脚及腰腿痠重冷痛骨髓間臆臆如冷風吹縫有名

醫亦不能療大都產婦將息頂是滿百日方可平復大慎觸犯此多
致身軀強直如角弓反張名曰瘳風遂致不救又不得夜間獨處

去血心虛恐有驚悸切宜謹之所有血衣洗濯不得於中曬曝免
致邪祟侵傷又不得濯足恐血氣攻不又不得刮舌傷心 刷牙及就

下低頭皆成血逆血運此產家謹護一常法也兩月之後尤忌任
意飲食觸冒風寒恣意喜怒梳頭用力高聲作勞工巧房慾

詳見意後通用方第一 及上高廁便溺之類如此節 養攝至百晷始得血氣
調和臍臍手復自然安怡設不依此即 致產後餘疾矣小可產

羸失於將補便成大患終身悔而不及或有諸疾不論巨細後並有

方乘醫療不得信庸醫而妄投藥餌經云婦人非止臨產須
夏產後大面將理慎不得恃身軀和手取次為之乃縱心必
意無所不為若有觸傷便難整理犯時微若秋夏感病重如
岳知命者可不謹之

產後調理法第二

若產後將息如法四肢安和無諸疾恙若亦須先服黑神散四服亦略備
補益固散之類不可過多又恐因藥致疾不可不戒如四物湯四類理中固內
補益固散因產後中傷
或產婦血盛初經生產竟氣悶不寧者調八七寶湯散在十九卷服
之若帝帖不須服若三月後竟忙忙頭痛背膈氣刺者不可便作傷寒
傷風治之此是乳脈將行宜服玉露散一二服如無此證
不須服若因床帳大暖
或產婦氣盛或素多喜怒竟月眩暈如在舟車精神鬱冒者此是血暈
即須服血暈藥二服止方月第
五論仍須看承之人照管問當也或竟弱食不美
戶困即服四順理中固一二服若不如此
若於兩三月間

齊腹中時上撮痛者此為兒枕作痛必須服治兒枕藥一二服方月第
七論若大便閉小便澀切不可服通利藥以其無律液故也若投通
利之藥則滑泄不禁不可治也切須戒之若秘甚必欲通利方可服和
暖藥即通方見二十三
卷第二論

補遺 加味四君子湯 新產之後雖无疾故宜將息調理脾胃美進飲

食則臟腑易平復氣血自然調和百疾不生也

- 人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮 藿香
- 縮砂仁 黃耆 各等分

右劉散每四錢姜三片棗一枚煎溫服

○產後通用方論第三 九二十三方

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死產後百疾滋長慎之○凡
婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也○凡產後七日內惡血
未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩

三日消息可服澤蘭丸此至滿月九藥盡為佳不爾慮俱不可平復也
至極消瘦不可救者服五石澤蘭丸補之服法必七日之外不得早服
也○凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百疾竟起及至
於死百方療不能差桃仁煎主之出毒后服之婦人縱令无病每至秋
冬須服一二劑以至年內常將服之佳

聖藥散治婦人產后惡露不盡胞衣不下攻衝心胸痞滿或脐腹脹
脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產后瘀血諸疾並皆治之

熟乾地黄

蒲黃

當歸

乾姜

桂心

芍藥

甘草

各四

黑豆

及去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同煎調服

烏金散

治產后十八疾方論

方論與烏方聖神散同有人遺集千歌訣十八首言語引理較不錄

一曰產后因熱病胎死腹中者何但服烏金散○二曰產難者何但服烏金散○三曰產后胞衣不下者何但服烏金散○四曰產后血

軍者何但服烏金散○五曰產後口乾心悶者何但服烏金散○六曰產后乍寒乍熱者何但服烏金散○七曰產后虛腫者何但服烏金散○八曰產后見鬼神者何但服烏金散○九曰產后月內不語者何但服烏金散○十曰產后腹內疼痛熱瀉者何但服烏金散○十一曰產后遍身疼痛者何但服烏金散○十二曰產后血崩者何但服烏金散○十三曰產后血氣不通咳嗽者何但服烏金散○十四曰產后乍寒乍熱心痛月候不來者何但服烏金散○十五曰產后腹脹滿嘔逆不定者何宜服烏金散○十六曰產后口鼻黑氣及鼻朱砂丸三二日少生薑醋湯下七九○十六曰產后口鼻黑氣及鼻衄者何論同此證不可治○十七曰產后喉中氣喘急者何論同十八曰產后中風者何但服烏金散 已上論与郭稽中二十一論問答同故不詳錄

聖藥 療万病婦人產后有病諸氣方

桃仁 一千二百枚去皮尖及雙仁發令黃色

右一味持令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍如作麥粥法以極細為佳納小長項瓷餅中密塞以麵封之納湯中煮一復時不停火亦勿令火猛使餅口常出在湯上勿令沒之熟訖出溫酒服一合日再服

天大補丸 療產后有病理血氣補虛勞

澤蘭 甘草 當歸 川芎各七附子炮 乾薑
白朮 桂心 北細辛 各四分 北防風
人參 牛膝各五 柏子仁 熟地黃 石斛各六分 厚朴
藥本 芫荽各二 麥門冬 去心八分
右二十味為末煉蜜丸如梧桐子大溫酒下二十九
○產後醋墨
松煙墨不拘多少用炭火燒通紅以米醋淬之再煨再淬如此七度

研令極細用絹羅過細產了與醋墨二錢用童子小便調下

四味湯 療產後一切諸疾緩分晚吃一服亦效

當歸心蒲頭 延胡索氣悶喘急加 血竭惡露不 芍藥心腹脹痛加
右為細末每服各抄半錢用童子小便一盞煎至六分通口服

玉露散 治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便滯滯悉能治之涼膈厭熱下乳
人參 白茯苓 甘草 各半兩

苦梗炒 川若 白芷 各一兩 當歸 一分 芍藥 三分
右為細末每服二平錢水一錢煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半

聖惠丸 治產後諸疾

生地黃汁 生薑汁 各一升 藕汁 半升 大麻仁三兩去殼為末
右和停以銀器內慢火熬成膏溫酒調半匙服更以北朮煎膏半匙入之尤佳○產寶方無蘇仁用白蜜治產後虛癯盜汗嘔吐

黑龍丹 治新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦之氣多汗總產直至百晷日常服壯氣補虛和養臟氣蠲除餘疾消穀嗜食

甘草 二兩 一方三兩 白朮 人參 乾姜 各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大溫米飲下三十九空心服總產了以童子小便打開點服七日內日三服○產乳方云此乃大理中丸加甘草兩倍耳然其功比之四味等分大故不同蓋取其味以緩其中而通行經絡之功最勝者也此產婦月內不可闕者出月不須服也○古方中有婦人補益之藥如**天聖散**之類其藥味稍聚而中下之家村落之地卒何以致且藥肆中少有真者不若以**四順丸**易之較其功比**澤蘭丸**之類主治頗多也

黑龍丹 治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 良姜 熟地黃 各一兩

右細剉以沙合盛赤石脂泥縫紙筋鹽泥固濟炭火十斤煨令通赤去火候冷取開者成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜 硫黃 乳香 各一錢半 花藥石 琥珀 各一錢

右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊丸如彈子大每服一九炭火燒令通赤投於生姜自然汁與童子小便入

酒漉出控乾研細只用此酒調下○茂伯熙寧初從事濮上幕府郡之幕醫胡者為予言數政之前有朱汴水部施黑龍丹凡產後諸病危甚垂死者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行尚有一三粒未之施也先人自三峯謫官淮陽家嫂馬氏尋中大病醫者康從變投井立愈訪之乃得於汴也且言每嚙一粒輒受十錢必甚獲厚利不欲求之後起守汝海從變錢別一驛臨行出此方為鬻每以救人無不驗者盧道原侍郎再帥涇

原時姨母妊娠至臨產就產後數日有盜夜入其室驚怖成疾衆醫不能治乃以他第嘗遺此藥服之遂安家人金華君在秦生文度數日苦頭痛米止又心痛也發兩股上下走注疾勢甚惡昏躁煩憤目視燈如金色勺飲不下服藥甚衆無效他第曰黑龍丹可服初以半粒投之即能飲粥而他藥入輒吐出不受覺痛稍緩又投半粒又得安眠自中夜服藥至五鼓下惡物數升頭痛頓減又至食時復下數升渙然醒愈蓋敗血所致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂侑記仲氏嫂金華君在秦產七日而不食始言頭痛也而心痛作既而目睛痛如割如是者更作更止相去纔瞬息間每頭痛甚欲取大石厭食又漸定心痛作則以十指抓壁血流掌痛定目復痛又以兩手自剋取之如是者十日不已國醫二三輩郡官中有善醫者亦數人相顧無以為計且言某藥孔弓可以愈頭痛此美黃可以治心痛率皆悠也

不根之言竟不知病本所起張益困頓醫益術殫予變嘆執危矣非神丹不可愈方治藥而張召予夫婦付以諸子與仲氏別慘怛不復言予瞑目戒張曰弟安心養疾函出召伯氏曰事急矣進此丹可乎仲氏尚疑也以兩旬不食恐不勝任黃昏進半粒疾少間中夜再服藥下瞑自寢如平昔平旦一行三升許如蝗虫子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣遣荆釵輩視之奄然無氣午後躄方涼氣方屬乃微言索飲自此遂平復大抵產者以去敗血為先血滯不快乃至是爾後生夫婦不習此理老媪庸醫不能中病所以疾苦之人十死八九大數雖定豈得無夭不遇良醫終抱遺恨今以施人俾終天年非祈于報者所冀救疾苦養性命爾時崇寧元年五月五日郭惟序

當歸

產後氣血俱虛慎無大補恐增客熱別致他病常令惡露

快利為佳

當歸

芍藥

川芎

黃芩

白朮

半兩

右為細末溫童子小便或酒調下二錢

出指迷方又出傷寒指迷方

○周頴傳授濟急方四道

頃嘗見人傳經効諸方自曾修合實有大功遂編於卷末昔用專授以濟急難治產後血暈血氣及滯血不散便成癥瘕兼瀉面色黃腫嘔吐惡心頭痛目眩口吐清水四肢羸弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸覺羸瘦年久變為勞疾如此所患偏宜服**勝金丸**

澤蘭葉兩芍藥

蕪荑仁

甘草

當歸

芍藥各六

乾姜

桂心各半

石膏

桔梗

細辛

厚朴

吳茱萸

栝子仁

防風

烏頭炮

白薇

扶殼

南椒

石額

蒲黃

石斛

茯苓各三分

白朮

白芷

人參

青木香

藁本

各一分

右棟擇上等州土如法修製為末煉蜜丸如彈子大有所患熱酒研一丸入口便愈大忌腥膩熱麵豉汁生葱冷水菓子等若死胎不下胎衣在腹並以炒鹽酒研服

○治產後諸疾**聖散子**方與局方**大聖澤蘭散**

同但無地黃阿膠

桔梗故不歸

○神效產後一切疾**黑散子**

鯉魚皮

三兩燒灰

芍藥

蒲黃酪二當歸

沒藥

桂心

好墨

卷栢

青木香

麝香兩

各一

丈夫髮灰

錫墨

各半兩

右為細末以新瓷罍盛密封勿令走氣每產後以好酒調下一錢七如血暈衝心下血不盡臍下攪刺疼痛不可忍塊血癥疾甚者日加兩服不拘時候忌冷物菓子

保生丸

方與局方同却無麻仁有川椒故不復錄

味妙丸

治產後虛中有積結成諸疾

黑附子

桂心

白姜酪半

巴豆

一錢醋浸煮去皮研

右為細末入巴豆研俾醋為麵糊丸如麻子大每服三九至五九冷茶下服之取瀉為度

養血散 總產服此湯盡兒枕除百病

當歸 人參 木香 黃耆 川芎 甘草

茯苓 芍藥 桂心 知母 大黃 草豆蔻 白朮

訶子 良薑 青皮 熟地黃 附子 重半兩 一个

右除地黃附子外各等分焙乾生姜一斤研取自然汁於椀中停留食久傾去清汁取下面粉糊攤在藥上入焙籠焙乾擣羅為末總產後用藥三錢水一盞姜三片棗一个煎至七分熱服之後產母自然睡着半日以來睡覺再服全除腹痛每日只三服至九日不可服

地黃汁 治產後百病未產一月先釀產訖可服

地黃汁 好麴 好淨秫米 各二升

右先以地黃汁清麴令發準家法釀之至熟封七日取清者服常令酒氣相接勿令絕忌蒜生冷鮮滑雞猪肉一切毒物婦人皆可服之但夏三個月不可合春和宜合以地黃汁并滓內米中炊合用之若

作一碩十碩準此一升為一先服當歸湯後服此妙

治產後肢痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語心胸脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽喉腫痛心中忪悸夜不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑

生地黃 研取汁 晉澤 生薑 各二斤 研取 蒲黃 當歸 各四兩

右於銀石器內用慢火取地黃汁炒生姜滓以生薑汁炒地黃滓各令乾四味同焙乾為細末醋煮面糊丸如彈子大每服一九食前用當歸酒化下神妙。一方地黃減半當歸一两延胡索琥珀各一两

名 治狀同

琥珀散 治產後一切危困之疾

琥珀 朱砂 麝香 香墨 醋炙 白殭蚕 當歸 各一

鯉魚鱗 桂心 百章霜 白附子 梁上塵

右為細末炒生薑熱酒調下二錢產後一切病服之奇効
○治產後諸疾如產卧畢切須用黃子小便調黑神散數服除百病如
無小使用白陽亦可

○或產勞力過度或下血頗多或微熱惡露來遲
馬尾大當歸洗一兩半

右在末產前修製為末如遇產有疾無疾若產了但用童子小便調
服令產婦月後並無他證果有神効

○許仁則秘方三道

療產後雖甚通利唯竟心腹滿悶脇脹咳嗽不能食大便不通眼澁行
坐心腹時痛

大黃略三 細辛 桂心各二兩 當歸 桑白皮 生姜四兩

右咬咀用水二升煎取一升分為三服如人行七八里久再服此湯
當得利上又下宜過多所利者為不獲已而微利之其不然之合令

利既初產後覺身背虛尚藉藥食補之豈宜耳刑此緣病以既安不
利苟以當塗服湯得通氣息安帖利既未止即便須急取三匙醋飯
喫即止上後但須滴寒溫將息後取差復飯食之節量其所宜如利
不減宜依後方服之產後不難動易便投大黃如不得已
後入更難動強弱而用之亦得穩當

當歸十分 白木八分 甘草七分 細辛四分 桂心 人參 桑白皮六分 生薑各三分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三十九
產後血氣不通當時不甚覺如在產出血少皆成癥結心便疼硬乍寒
乍熱飲食不進不生肌肉心腹有時刺痛口乾粘手足沉重有此狀者
宜此藥

當歸 芍藥 甘草 牛膝 鬼箭羽 人參各五分

牡丹皮 虎杖 白木各六分 大黃八分 乾地黃七分 朴硝十分

烏梅肉炒 白薇 桂心各四分 水蛭炒 蒲黃各三分 蜚蠊十四枚製

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下二十九日兩服外臺有赤石

脂十分

補遺五續散

新產之後以此藥袪除敗血補生新血調和榮衛滋養臟腑使陰陽不相勝負邪氣不能相干則無寒熱之患又治新產氣虛或外感寒邪頭疼身痛發熱惡寒或但後熱者方見局方一並煎熱甚者可加黃芩並用去麻黃

○產科序論 陳無擇

世傳產書甚多千金外臺會三產寶馬氏王氏崔氏皆有產書巢安世有衛生室集子母秘錄等備則備矣但倉卒之間未易歷試惟李師聖序郭稽中產科經驗室慶集十一篇凡十八方用之頗切但其間店論未為至當始為料理簡辨於諸方之下以備識之者非敢好辯也產後要病無不出於郭稽中二十二篇一十八方有益於世多矣予家三世用之未有不効頃陳元澤所評或是否亦不可不詳而究之且如產後咳暈以推用散然其中有大黃芒硝等物新產後氣血大震豈宜輕服又云去血過多而暈者或有之若言痰暈者十無一二又如產後喘胸氣上轉為脹氣不應用小續今湯僕以百問中方加感而用之比諸法也故孟子云及焦書則不如無書此之謂也

○胞衣不出方論第四九二十二方

夫有產兒出胞衣不落者世謂之息胞由產初時用力此產兒出而體已疲憊不能更用力產胞經停之間而外冷氣柴之則血道凝故胞衣不出須急以方藥救治不妨害於兒所柰者胞係連兒臍胞不出即不得以時斲臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊法胞衣不出恐損兒者依法截臍而已產處須順四時方面并避五行禁忌者若有觸犯多令產婦進產雖腹痛者未產也欲腹痛連腰痛甚者即產也所以然者腎候於腰胞係腎故也診其脈轉急如切繩無殊者即產也郭稽中論曰胎衣不下者何答曰母生子訖流血入衣中衣為血所脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中以次上衝心胸疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血七散脹消胎衣自下而無所患更有牛膝湯等用之甚效錄以附之

奪命丹

附子兩 牡丹皮一兩

乾漆一分 穿山甲一分 炒令煙

右為細末以醋醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸如梧桐子大

温酒吞五七丸不拘時

必效方 **牛膝湯** 治胎衣不出臍腹堅脹急痛即殺人服此藥胞即爛下死胎

牛膝

瞿麥

各四兩

當歸

三兩

通草

六兩

滑石

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下腹滿即殺人推其源

皆是胞衣有血奔心是以不出也或坐婆生踈斷帶收兒其衣失於

花柳毒散

治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹

中胎衣不下至死者但心頭暖急以童子小便調一錢取下惡物如猪

肝終身無血風血氣疾膈上有血化為黃水即吐出或小便中出也若

先下胎衣則泛上之藥不能達若先治血悶則尋常之藥無此功無如

此藥有兩全之效也

花藥石

一斤

上色硫黃

四兩

右二味相拌令均先用紙和膠泥固瓦罐子一个內可容藥候泥乾

入藥在內密泥封口了焙籠內焙令透熱便安在四方磚上

字用炭一秤籠疊周匝自己午時從下生火令漸上上徹有墜下火

放夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹

罗至細窰合內盛依法用之

○有一親戚婦人產後胞衣不下血脹迷悶不記人事告之曰死矣

僕曰某收得趙大觀文局中真花藥石散在笥中謾以一貼贈之以

童便調灌藥下即甦衣與惡物旋即隨下乘輿無恙

牛膝散

治妊娠五六月隨胎胞衣不出

牛膝

川芎

朴消

蒲黃

各三

桂心

半兩

當歸

右為粗末每服四錢水一盞姜三片生地黃一分煎至六分去滓温

温頓服

若胞衣不出若腹脹則殺人

右入醋一盞煎三五沸去豆分為三服酒養亦可

黑豆 一合炒令熟

必助方療胞衣不出方 服蒲黃如棗大集驗千金崔氏同

又方 以生地黃汁一升若酒三合暖服之

又方 以水噴產婦面神驗

延年方 以洗兒水令產母飲半盞其衣便下勿令產婦知

又方 牛膝一兩 葵子一合

右搗碎以水一盞半煎至一盞去滓分二服

廣濟療胞衣不出方

右以木竈突中土三指撮以水服之集驗千金備急同

又方 竈下土研碎用好醋調令相合納臍中續煎生甘草湯三

四合服○救急一方見子死腹中類

又方 以醋湯飲之出

又方 雞子一枚苦酒一合和飲之立出

又方 用草麻子名如聖膏見產難門

○延年方療胞衣不出腹脹則殺人

吞雞子黃三個仍解髮刺喉中令嘔即出若困極以水煮蟻姑一

枚二十沸灌入口中汁下即出崔氏同

○救急方 用赤小豆男用七粒 女用十四粒東流順水吞下

○產母療產後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等疾備急同

右大黃一兩為末以好醋半升熬成膏以藥末搜膏為丸如梧桐子

大溫醋湯吞五丸良久取下惡物不可多服

○療胞衣不下 括樓實一個 取子研令細

右酒與童子小便各半琰煎至七分去滓溫服如無實根亦得

又方 紅花一兩 酒煮濃汁服

又方 以鹿角鎊屑三分為末煮葱白湯調下

○凡欲產時必先脫常所着衣以籠竈胞衣自下仍易產

廣濟方云取六单衣蓋井上立出千金集驗救急崔氏同

補遺 催生湯 治胎衣不下方在十七卷准生類補遺

又方 取產母鞋底灰炙熱熨小腹上下二七次

又方 取路傍故草鞋前截連鼻子燒灰童子小便和酒調下

又方 浸序水濃煮溫飲二確立下

又方 皂角棘燒為末每一錢溫酒調下

○治胞衣不下訣

婦人百病莫甚於生產產科之難臨產莫重於催生既產莫甚於胞衣不下惟有花藥石散一件最為緊要如黑神散琥珀散諸方之類雖皆有驗然鄉居或遠於藥局倉卒之間無法可施今採得胡氏寶慶方一妙法云若產訖胞衣不下待稍久非特產母疲倦又且血流入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫墜以物繫墜之時切宜用心先繫然使其子血脈不潮入胞中則後截斷不爾則胞上騰心而死胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰然自

下矣累試有驗不可輕信坐婆妄用手法多有因此而亡深可浩歎所以胡氏重引親見其說為據

○產後血暈方論第五 九十六方

論曰產後血暈者由敗血流入肝經眼黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調集神散最佳庸醫或作暗風中風治之凡暈血熱乘虛逆上凌心故昏迷不省氣閉欲絕是也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治特具當詳審之下血多而暈者但昏悶煩乳而已當以補血清心藥治之下血少而暈者乃惡露不下上搶於心匕下滿急神昏口禁絕不知人當以破血行血藥治之古法有云產婦絕分挽了預燒秤錘或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋氣可除血暈產後一臈不妨時作為妙崔氏云凡暈者皆是虛熱血氣奔送腹中空所致欲分挽者第一須先取醃醋以塗口鼻仍置醋於傍使

開其氣蒸細已飲之此為上法如竟暈即以醋嚼面甦來即飲醋仍火
與鮮之一云仍火一法燒乾漆令煙濃熏產母面即醒如無乾漆以舊
燒熏之亦妙○郭稽中論曰產後血暈者何答曰產後氣血暴虛未得安靜
血隨氣上迷乳心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知入口噤神昏
氣令醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服**清血散**即省

清血散方

澤蘭葉 人參各一兩 荆芥 一兩 川芎 半兩
右為末用溫酒熱湯各半錢調一錢急灌之下咽即開眼氣定即醒

○一方有甘草二錢

若去血過多而暈者當服**當歸芍藥湯**

方見第二卷通用門**當歸芍藥湯**方見十二卷
婦人腹中結塊

○廣濟治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕

芍藥

甘草各一兩 丹參四分 並 生地黃汁一升 生姜汁 白蜜各

右水二升先煎前三味取八合下地黃生姜汁蜜分兩服

荷葉二枚 真蒲黃及 甘草二兩 白蜜一匙 生地黃汁升

○產後血暈心悶
右切細以水三升者取一升去滓入蒲黃蜜地黃汁暖服立愈

蒲黃四分 紫葛

芍藥八分 紅花十二分

○產後血暈心悶恍惚如見鬼
右以酒以水二升煎至七合入生地黃汁二合更煎三五沸每服三

生益母草汁三合 生地黃汁二合 童子小便一合 雞子清三枚

右煎三四沸後入雞子清攪停作一服

○產後血暈狂語不識人在亂

童子小便五合

生地黃汁一合

赤馬通七枚

紅雪八分

右以上二味浸赤馬通絞去滓下紅雪溫為兩服

獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絕衛生方各立應散

五靈脂半生半炒 二兩

右為末溫酒調下二錢口噤者拗開口灌之人喉即愈。一方加荆

亦等分為末童便調下

又方 治產後血暈 右神麩為末熟水調二錢

○療產後血暈狂言煩渴不止 生香附子去毛

右為末每服二錢水一錢姜三片棗一箇煎至七分溫服

○治產後血暈危困用醫以此方獻禁中用之大效厚樗實齊時庚寅

歲也 生地黄汁 一大盞 當歸 赤芍藥 各一分並剉

右水煎三五沸溫服如竟煩熱去當歸入童子小便半盞效

張氏方治產後血暈全不省人事極危殆者

右用菲來切入在一有嘴甕瓶內煎熱醋沃之便密縛瓶口以瓶背
向產婦鼻孔令醋氣透入頂先扶病人起惡血衛心故有此證並能

去心之滯血加以醋氣運達之用無不效

近效方療血暈絕不識人煩悶言語錯亂惡血不盡腹中絞痛胎死腹

中 **紅花** 一兩

右為末分二服每服酒二盞童子小便二盞煮取盞半候冷分為二

服酌產再併煎。一方無童子小便

崔氏療產乳暈絕方 以洗兒水飲三合良。或惡血服少許良

又方 半夏洗不以多火

右為末丸如大豆內鼻中即省亦療五絕指迷文仲同

又方 生赤小豆搗為末取東流水和服方寸匕不瘥再服

奪命散 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志及產後百病

沒藥 血竭等分

右細研為末總產下便用童子小便與細酒各半盞煎一二沸調下
二錢良久再服其西行更不銜上免生百疾專治婦人方

只用白湯調。五羊洪運使上天下錫子去穢人產後語言顛倒謔
語不已如有神靈服諸藥無效召予診之六脉和平僕以此藥兩服愈

補 壯丹散 治產後血暈悶絕若口噤挑開囉之効

牡丹皮 芒硝 大黃 一兩 冬瓜子 桃仁 三七 去皮尖

右剉每五錢水煎溫服

治產後去血多眩暈欲絕 即佛手散方見前

又方 松煙墨二錢燒通紅罈城火氣為末溫酒調半匕京墨亦可

又方 方見前

又方 舊漆器燒微煙逼面熏之却不可太甚恐人怯不禁

○產後顛狂方論第六 凡三方

產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用局方大聖澤蘭散

自合者加好辰砂研令極細每服加一字許煎酸棗仁湯調下一服可安

○何氏方 產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛狂方

用大辰砂一二錢重研令極細用飲兒乳汁三四茶脚許調仍搗

紫項活地龍一條入藥候地龍衣三衣取出地龍不用不令帶藥出

但欲得地龍身上涎耳却入無灰酒與煎乳汁相合七八分錢重湯

溫遇疾作分三二服

○余家荆布方 產一日忽見鬼物言語顛倒遂取自合蘇合香丸

錢重以童子小便調服即醒神思如故

補遺 與後卷產後乍見鬼神方論下通看

○產後狂言謔語如有神靈方論第七 凡一方

夫產後言語顛倒或狂言謔語如見鬼神者其源不一須子細辨証用

藥治療產後驚風言語亂道如見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下

血停積上干於心而狂言獨語者當在十九卷第一論求之○二則產

後膈虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知神思不安者當在十

九卷第二論求之○三則宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或嘔哭

噴笑言語亂道當作風症治療當在十九卷第三論求之○四則產後

心虛中風心神恍惚言語錯亂當在十九卷第四論求之○五則產後

婦人

多因敗血迷心。心狂言語錯亂無常或暈悶者當於本卷血暈類中求之。○六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒發熱如瘧書曰明了暮則謔語如見鬼狀當作熱入血室治之宜。及四物湯只用生乾地黄加此些胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾地黄如黃芩分兩煎服愈雖然已上諸證大抵胎前產後之疾自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐散生新然後子細詳辨疾證不可妄立名色自立新意妄自加減方藥大宜對證依古法施治未有不妥者也。

瑤珀地黃丸

方見十九卷第二論四物湯方見二卷第五通用方

小柴胡湯方見六卷第五論

○治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

男六德續添

乾荷葉 生乾地黄 牡丹皮 等分不以多少

右二味濃煎湯調生蒲黃二錢七服即定

補遺

獨方

治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神用生乾地

黃芩歸二味煎湯調服立効

○產後不語方論第八 凡二方

論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服**七珍散**

人參

石菖蒲 生乾地黄

川芎各一兩 細辛一錢

防風

辰砂別研各半兩

右為細末每服一錢薄薑湯調下不拘時

胡氏秘傳

治產後閉目不語

白礬 研細生用

右每服一錢以熱水調下

補遺

治產後不語方

人參

石蓮子

去殼不去心

右等分坐每少钱求煎温服

新刊婦人良方補遺大全卷之十八畢

