



重修政和經史證類備用本草卷第九

增行西義



成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學士臣曹孝忠奉敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經內字

一十三種名醫別錄

一十二種唐本先附注云唐附

二十二種今附比皆醫家嘗用有注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

十種陳藏器餘

艾葉實續注

惡實牛蒡葉續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水松石髮无松續注

澤蘭

昆布紫菜續注

防己

木防己續注

天麻

阿魏唐附

高良薑

百部根

懷香子亦名苗香唐附

款冬花

紅藍花

牡丹

京三稜

今附雞瓜稜等附

薑黃唐附

葶撥根續注

芍藥

音醬唐附

蘿摩子

青黛附

鬱金唐附

盧會附

馬先蒿

延胡索

附

肉豆蔻

補骨脂附

零陵香

附

縮沙蜜

蓬莪茂旬律切附

積雪草

連錢草附

白前

薺芫

白藥

唐附

荳蔻

香附即蘇合香根是也水香接附

華澄茄

附

胡黃連

船底苔補新

紅豆蔻

附

蒔蘿

艾納香附

甘松香

附

垣衣地衣續注

陟釐音

鳧葵唐附菴菜也

女莞

王孫

土馬駿新定

蜀羊泉

菟葵唐附

薺草唐附

鱧腸蓮子草唐附

爵牀今名香藤

井中苔萍附

茅香花白茅香花續注

馬蘭新補山蘭附

使君子

附今

乾苔

補新

百脉根

附唐

白豆蔻

附今

地笋

補新

海帶

定新

陀得花

附今

翦草

原附

白藥條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草


菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名水臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風陶隱居

灸百病亦止傷血汁又殺蛇蟲苦酒煎葉療癰其良○唐

本注云別錄云艾生寒熱主下血衄血膿血痢木莖及

丸散任用○臣禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血

葉主吐血實主明目療一切老氣初生取作乾菜食之

除鬼氣炒艾作餵飽天三一切老氣初生取作乾菜食之

又心腹惡氣取葉搗汁飲人禱末和乾薑末為丸一服三

下丸飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣○孟

詭云艾實與乾薑為末蜜丸消一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣○孟

當○日華子云止霍亂并治心腹痛鼻洪并帶下及患痢

圖經曰艾葉舊者為佳所出州土但云生田野今處處有之

類蒿而葉背白可用俗間亦生博葉取汁飲止心腹惡氣

孫真人葉生後有血濃煎艾

斗門方治火眼用艾葉水調化洗起以艾葉蓋之候煙上挑成疔

又方治門當中間於年歲下殺道

勝金方治中風口噤以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面

初虞世治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搗上先乾處

錢相公篋中方治誤吞錢取艾蒿一把細剉用

傷寒類要治婦人妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑

又方一頭蝨內下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌口中

子毋秘錄以頭動上迫心痛取葉艾如雞子大

又方治倒產子死腹中艾葉半斤服

又方小兒黃爛瘡燒艾葉灰傳上

荆楚歲時記端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上穰毒

衍義曰艾葉乾搗篩去青滓取白入石礪黃為硫黃艾炙家

實惡州蜀



本草九

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中

風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

藥不復用○唐本草注云魯山在鄆州東北其草葉大如羊

子殼似栗栗狀實細長如菟薺子想土牙疼痛勞瘡脚緩

弱風毒癰疽咳傷肺壅疔瘰癧積血主諸風癩疥冷氣

器一本草云惡實根蒸暴乾不爾今人飲吐浸酒去風又主

惡瘡子名鼠結上有芒能殺鼠味苦主風毒腫諸瘡按可

作如食之葉亦搗傅於瘡不膿碎風○主風毒腫諸瘡按可

性論云牛蒡亦可車用味其無毒能主○主風毒腫諸瘡按可

健通十二經脈洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子

研末投酒中浸三日每日服三二匙任性飲之少除諸風

去丹石毒主明目利腰脚又食前吞二枚熟接下散諸結

節筋骨煩熱毒又根細切如豆麵拌作飲食之消脹壅又

莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行

風洗了慎風少時又能一切腫毒用根葉入少許蓋花搗

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋

有過之則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根

傳信入少蓋花以精腫毒又冬月採根取時蒸棗之入藥割馬

荆刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一升大升和灼然好蜜

四此方得之岳野鄭中承陽頃年至此方備時便服得汗隨

便中暴風外生盧氏為類合無灰酒不可示者摩膏主之取

差神効又篋中之風頭及合無灰酒不可示者摩膏主之取

雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然後焙用酒拌蒸待上有

食療云根作脯食之良熱毒腫瘰癧及丹石熱瘡金瘡取

兩盞隨性多欲散支節筋骨煩熱毒瘰癧及丹石熱瘡金瘡取

耳目利腰膝則取其子末之敷骨煩熱毒瘰癧及丹石熱瘡金瘡取

粒熟投吞之十服後甚良如行皮根如汁小食前取子三七

人其子炒過末之便如行皮根如汁小食前取子三七

茶煎三上通利小便如行皮根如汁小食前取子三七

聖惠方飲食用根搗絞取汁不計時候服一血力不盛効

外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬蘭子八分搗為散每

經驗方治風熱閉塞咽喉通身浮腫以牛蒡子一合

孫真人食忌主天行以生牛蒡根搗取汁五升大合空腹分為

五合去滓煎服覆取汗無葉用故

食醫心鏡治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根

斗門方治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸着痛

紙下點腫上仍熱酒

王氏博濟治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢

服已出更服亦妙

初虞世治皮膚風熱遍身生癢牛蒡子

衍義曰根實是子也今謂之牛蒡未去莖時大謂之鼠黏子

芥穗各一兩甘草炙半

當緩取効子在莖中此

兩同為末食後夜卧湯煎二錢服

如根長一二尺葉

水萍



水萍味辛酸寒無毒亡工暴熱身痒下水腫勝酒長鬚髮注消

渴下氣以沐浴生毛髮及久服輕身一名水花一名水白一名

水鮮生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大洋

有花白色即非今用藥所生者楚王渡江所得有荇菜也

相似而葉圓水大者曰荇菜小者曰萍今按陳藏器本草云

水萍有二種大者曰荇菜小者曰萍今按陳藏器本草云

一名茅菜暴乾與括樓手分以人乳為丸主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦可傳熱者小萍子是溝渠間者未傅面點搗汁服之入水腫利小便又人中毒取萍子暴乾未酒服方寸匕又為清長髮本經云水萍應是小者口臣禹錫等謹按爾雅云萍其大者謂之蘋小者謂之萍始生可參蒸為餅又可苦酒渣以就酒日華子云治熱毒風熱疾熱狂協腫毒湯火瘡風癩

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水皆有一此是水爾雅謂之萍其大者謂之蘋是也周南詩云于以采蘋陸機六海浮萍其大者謂之蘋是也周南詩云于以采蘋陸機可用苦酒渣以按酒三月其暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者萍小者水萍浮萍即溝渠間牛者甚也大者今醫方無用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和浮熱服汁出乃差又治惡疾遍身瘡者取水萍浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇古也

聖惠方治少年而止起細施按浮萍之亦可飲少許汁良也

又方爛背初得毒腫熱赤爛搗和雞子清貼之良

千金方治中水毒手足指冷即是或至

千金翼治小便不利膀胱水氣滯帶以浮

孫真人食忌五月取浮萍陰乾燒烟去蚊

子母秘錄熱毒浮萍搗

高供奉癰瘻與緩風數小不在山不在岸採我之特七月半選甚

也 幘頭 汗

瓜王州均



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘰癧血月閉寒熱酸疼益氣愈

龔療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺合瘡一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾陶隱居云今土瓜

生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用

時刀挫取不入大方正如彈丸小如彈丸滿并瘰癧取根及葉擣

生比之謂也無玄云獲子如旋子生青熟亦但無稜爾根

似為根細而多糝生間者紫相連人如素皮黃肉白苗子

相似根狀不同試療黃疔破血南者大勝也○今按陳藏

器本草云王瓜主毒絞汁服當吐下宜少也

爾雅云瓜正赤未苦也○藥性論云土瓜根使平一名王瓜

子主毒治小便數遺精不禁○日華子云王瓜子潤心肺

治黃病生用肺痿吐血損消痰於血破癰瘰癧瘰癧瘰癧

痰根通血損精大行治痰瘰癧瘰癧瘰癧

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間亦處處有之

如多毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細

而多毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細

肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間

人呼為老鷄瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃菟瓜郭璞注云

似土瓜而上瓜自謂之菟與啖同菟與姑同又名鈎茹蓋

不謂採葯採葯者非此土瓜也大比物有異類同名甚多

土瓜根搗篩漿水勻和入夜先漿水洗面傳藥且復洗之

百日光華射人小兒四歲發黃生搗絞汁三合與飲不過

聖惠方治黑疔多死宜急治用瓜根一斤搗絞汁六

醫方

產言酒服一錢一日三

行義曰王瓜射如括樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下
三五謂之赤霄子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根
又謂之連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風

榆地府寧江



榆地川衡



地榆味苦其酸微寒無毒主婦人乳痃痛七傷帶下病止痛
除惡肉止痛療金瘡止膿血諸瘦惡瘡熟瘡消酒除消渴補
絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及窠句山谷二月八月
採根暴乾似髮良惡麥門冬陶隱居云近道處處有葉
色如豉故名土

一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏者
時用葉作飲亦好○今按刈本注云今人止冷熱及疔瘡
熱極効○臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產
後餘瘀疥癩痛七傷治金瘡止血論云地榆味苦平能治產
其樗皮同療赤白痢○日華子云排膿止血鼻洪月經
不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但
是平原川澤皆有獨
莖花紫七月八月採

圖經曰生地榆初生桐栢及窠句山谷今處處有之宿根三月內

葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十
年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮半頓服不斷水漬
屋塵飲與小五粒之不過重人持新根小兒疳痢亦單煮汁
如鉛糖與服便已又毒地榆人持新根小兒疳痢亦單煮汁
良崔元亮海上方赤白痢絞盡空腹榆一斤水三升煮
取一升半去滓煎如粥服之

唐本注云主帶下赤白痢絞盡空腹榆一斤水三升煮
解七日合陰陽患痛六日小腹寒痛九日子藏赤六日多白
宮冷十日合陰陽患痛六日小腹寒痛九日子藏赤六日多白

甚鮮

聖惠方 治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩

血治吐

千金翼 伐指逆腫單煮地榆

肘後方 療虎犬交人地榆根未服方

葛氏 絞取汁飲兼以清瘡

梅氏方 治痢大咬人瘡地榆飲之兼未傳瘡上服方寸匕

齊民要術 治地榆汁釀酒

三洞要錄 露地榆草到一升稻米一升白玉屑一升三物取白

名曰玉液以藥內杯美

衍義曰 若地榆寒性沉寒入下焦熱血痢則可用

翼州小薊根



大小薊根味甘温主養性 保血大薊主女子赤白沃安胎止

吐血衄鼻令人肥健五日採似陶隱居云大薊似虎薊小薊

多方藥不復用是或似之功力有殊並無毒亦非虎薊也

注云入小薊葉欲相似以功小薊生平原破宿血生新血暴下

消腫也○山谷根按陳藏器本草云小薊破宿血生新血暴下

及血崩也○今按陳藏器本草云小薊破宿血生新血暴下

許服亦可差○用末苦平小薊根下血生毒治熱毒風腎隔煩

只可退熱不似大薊能補養下氣○又云大薊葉涼治腸

服癰瘡藏癩血血暈撲損可生研酒并小便

圖經曰小薊苗高尺餘葉多刺心出州土今處處有之俗名青刺

色北人呼為四月採苗九月採根並陰乾二三寸時并根作茹

汁飲以功止咳有血衄破血之外亦驗大薊根苗與此相似但肥

陳藏器云薊門以薊為名

食療云小薊根主養氣取生根葉搗取自然汁服一盞立佳

搗汁半升服之全瘡血不止按葉封之夏

聖惠方根搗絞取汁每服一匙小薊葉及

又方取乳石每服動壅熱心間吐血以生刺薊搗

外臺秘要治鼻室塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓

薊根汁服立差

符師方小薊葉搗絞取汁溫服

簡要濟衆頓服之如無清汁以刺薊二握絞取汁以酒半盞調和

又方刺薊小兒浸湯瘡疼不可忍發寒熱

衍義曰大小薊皆相似花如唇色但大薊高三四尺葉皺小薊

亦適用雖有微芒

海藻



海藻味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕

堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴瘡留氣熱結

利小便一名落首一名薄生東海池澤七月七日採暴乾其

草似陶隱居云生海島山上黑石如亂髮而少許葉大

本經吸注海藻功狀不本草云此物有淺水者短而細黑

色用之當浸去鹹大葉藻生深海中又新羅葉如水藻而

組下則得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人以繩繫腰沒

亂髮生海中等謹按爾雅云海藻海味藥草也一名海蘿如

鬼魅治風疾急滿瘵山氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽

疾南方人多食之傳於北人博博小兒食之倍生諸病更不宜

美○陳藏器云馬藻人寒博博小兒食之倍生諸病更不宜

石攪絞汁服去暴熱熱上漸軟作交羅文生海底黃汁○又云

主婦人血結月閉石淋石水水松葉如松半葺食之生石

無毒紫色如漆市人飾作珊瑚狀風漸

圖經曰藻周南詩一云于以萍藻○登萊諸州海中凡水中皆有

草生水底有二種一葉如蘇莖如節長四五尺一種

也二藻皆可食由熱授其腥氣米麵蒸為茹甚佳美荆揚

人飢荒以常穀食之今謂海藻者乃海中之所生根著水底

石上黑如常穀食之今謂海藻者乃海中之所生根著水底

藻本經云主瘦瘠是也海人以繩繫腰沒水下則得之旋

繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑組

此主水瘰下用水用之陶隱居云爾雅所謂如短馬尾細黑組

而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹按本經恐即是此也

海藻而爾雅謂藻為石衣又謂藻徒南切名海藻與藻同是

然為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔又注釋以石

異與海藻全別又難而大生海池澤乃是水藻中自青苔古人用

藻音


本草九
三

吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼石
 上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人
 於海邊得之稀石有見其生者木松藥草則紫水出南海交
 趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之
 東海可以繫束一種海帶似海藻而食且長登州人取乾之柔
 朝亦可繫束一種海帶似海藻而食且長登州人取乾之柔
 人亦乾之類又有井中苔生巖井中并井蓋皆主熱毒又
 利人苔之類又有井中苔生巖井中并井蓋皆主熱毒又
 也生有垣衣條云昔邪屋上生者名至游大抵主瘰瘕同陸
 田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟菴是也瓦松生古瓦
 至生故陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松而
 生多下條作葉何草也廣志謂之蘭香段不必爾今醫家或用
 即下條作葉何草也廣志謂之蘭香段不必爾今醫家或用
 上多下條作葉何草也廣志謂之蘭香段不必爾今醫家或用
 作女行經絡藥陟菴古方治虛冷下痢最要范注治腹
 中留飲有海藻九又有瘦酒方用海藻一斤絹袋盛以清
 酒之二升浸春夏暴乾末服方寸七日一服兩劑者差廣濟
 飲之如前浸春夏暴乾末服方寸七日一服兩劑者差廣濟
 療氣宿洗去鹹味以水一斗布腫法高麗昆布三斤開四五
 浸一宿洗去鹹味以水一斗布腫法高麗昆布三斤開四五

分仍取葱白一握二寸切
 益酢或糝調和依攪法
 小依州法極下氣大効魚
 海藥六氣浮腫脚氣黃狷氣
 雷公洗使三件同蒸一伏時
 肘後方治領下瘰癧如梅李
 又方治頭下卒結囊欲成瘦
 藻一斤洗去鹹酒浸飲

擊之更莫令昂布係爛勿下
 得令鹹酸以生薑橘皮椒末
 良水忌藥
 昔天葵和
 日乾用之
 稍稍飲之

徐州澤蘭



梧州澤蘭



澤蘭味苦甘微温無毒主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身

面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名

虎蘭一名龍康一名虎蒲生汝常諸大澤傍三月三日採陰

乾可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名澤蘭多生下濕地葉微香

多不種之而葉小異今山中又有一種甚相似似莖方葉小強

用之○澤本注云澤蘭莖方節氣色葉似蘭草而不香今

京下用之者是本注云澤蘭莖方節氣色葉似蘭草而不香今

浴亦生澤畔人家種之葉白紫莖同殊非澤蘭也陶注

澤草復云名都深香並不味識也○臣禹錫等謹按吳氏

云澤蘭一名水香仲農黃帝岐伯桐君酸無毒季氏温生

下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間○藥

性論云澤蘭使味苦辛上產後腹痛瀉腰痛○日華子澤

瘦羸人治通身而目大腫生婦人血滯腰產痛○日華子澤

通小腸久竅利開脈養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病

人勞瘦丈夫面黃口乾○澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府

月五採作夫經把子○澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府

青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花葉紫白

色萼過紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荆湖嶺南人家

多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生

水傍葉光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕

地葉尖微有毛不光滑潤方莖紫節七月八月初採微辛此

為異耳今婦人方中急用也又有一種馬蘭生水澤傍

頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補筋創斷下血陳藏器

以為楚詞所喻惡草即是也北人呼為紫菊以其花似菊

雷公云青黃能生血調氣與雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根

上斑根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小澤

蘭須細到之用絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用

子毋秘錄治小兒疳瘡

衍義曰澤蘭按補注云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長

分枝梗葉如葱但尖長若取香臭則稍類既謂之澤

蘭又曰生汝南大澤傍則其種殊別如蘭之說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘕瘡生東海

○陶隱居云今惟出高麗細把索之如卷府作黃黑色系
似綸此昆布亦似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆
青苔紫菜輩亦然然乾苔性熱柔苔甚冷也○今按陳藏器
本草云昆布主陰積含之性熱柔苔性冷論云昆布臣有小毒利水道
去面腫治惡瘡用薄○陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩
氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之○蕭炳云
海中菜有小螺子
損人不可多食

圖經藻條下海

唐本注云又有石帆狀如柏治石滑

陳藏器云主類外腫煮汁因之生南海葉如手乾紫赤色大
是馬尾海藻也新注云如瘦
氣取木蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑
並瘦瘤氣結等良

雷公云凡使先獎醜值
向黃去鹹味焙細到用每修事一斤
筒同昆布細到二味合一處下東流

水旋添勿令少
食療云無好氣久服瘦人
無此疾者不可食海島之人愛食為
人比人若熱氣塞明
喉者汁飲之此是海中之物味熱氣多
食脹人若熱氣塞明
喉者汁飲之此是海中之物味熱氣多
所以有損人矣

聖惠方以治瘦氣結核癰腫硬昆布
洗去鹹搏為散每
外臺秘要等治領下卒結囊漸大欲成瘦以昆布海藻
千金翼如治五瘦昆布一兩並切

巴防軍化典



巴防州黔



防已味辛苦平温無毒主風寒温瘧熱氣諸漏除邪利大小

便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止

洩散癰腫惡結諸蝸疥癬瘡通腠理利九竅一名解離文

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾發聲為

雄黃毒惡細辛華薛陶隱居云今出宜都建平大而青

白色虛軟者好黧黑水強者不佳服食亦須之是療風水

氣要藥爾唐本注云防已本出漢中者作車輻解黃實

而香其青白虛軟者名木防已本出漢中者作車輻解黃實

未見漢中者爾臣禹錫等謹按藥性論云漢防已君味

若有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣軟

喘○風毒又云木防已使畏女莞鹵鹹味苦辛能治勝腕

中風毒風不語主散結氣壅腫温瘧風水腫治勝腕○蕭

炳云木防已出華州

圖經曰防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之

其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又

有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用

木防已今不

增減木防已湯

師療隔向支滿

之數十日吐下

二枚雞子大碎

煮取二升分再

不愈者宜去石

陳藏器云如陶所

木生吹氣通頭如通草

雷公云不堪用夫使

煎草根相對同

肘後方乾為雄黃中

初虞世方等分

注即是木防已用體小同接木漢二防已

木條以其木條文黃腥皮皺上指了足子

使防已要心花文黃腥皮皺上指了足子

蒸半日後出

茶法煎服俗解之用防已實焙

略血多痰防已葶藶

邵州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣于小兒風癇驚氣利

腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山勞山諸

山五月採根暴乾葉如芍藥而小當中一莖直上如箭籜

其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆葦

大小不定彼人謹按別注又云生諸毒惡氣故莖滿寒而

附○今處處有之特人多用馬莖似箭籜赤色故莖名亦箭

北○藥性論云赤箭一名天麻又驚失志○陳藏器云

治○氣痛痺云緩不遂語多恍惚多取子作飲去熟○日華

天○麻寒主熱毒節腫搏莖葉傳之亦子如青指子○日華

平澤似馬鞭草節節生紫花中亦有子如青指子○日華

子云味甘暖助陽氣補五勞七傷

是症蠱毒通血脈關竅服無忌

圖經曰淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直

上高三二尺如箭籜狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半

以上貼莖微有尖小葉稍頭生成連開花結子如豆粒大

其子至夏不落却透虛入莖中潛生上內其根形如黃瓜

連生一至二十枚大者重半斤或五六兩其皮黃白色名曰

龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮

去皮沸湯畧煮過暴乾收之高山衡山人或取生者蜜煎

之甚珍食雷公云使勿用神風草皆白有青點使御風草根勿使其

亦同天麻布拭上氣汗用蓋又隔焙之細剉單講然用御風草修事法

別說云此謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之亦為分明不

同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰天麻用根須剉碎相佐使然後見其功深思之則得

赤箭也

廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭臭氣破癥積下惡氣除邪

鬼毒生西蕃及崑崙○唐本注云苗葉根莖酷似白芷搗

禹錫等體性極臭而能止臭亦為奇者為上截根穿暴乾

云臭為奇物今下細蟲極効○段成式可陽雅俎云阿

波斯呼為阿虞載樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形

似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅疑名阿魏拂林

國僧學所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成

阿魏○日華子云阿魏熱治傳死破癥瘕冷氣瘴温冷瘧

温瘴瘵亂心腹痛腎氣切葷菜毒

圖經曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極

次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段

成式西陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九

尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴

今廣州出相近耳海藥云謹按廣志云生在崑崙國是木津液如桃膠狀其色

雷公云器中一宿至明露阿魏處白如銀永無赤色第二驗

將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三
驗將一銖安於抽樹上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中
研如粉了於藥酒器
上衰過任入藥用

千金翼魏治之神氣阿

別說云家謹按種阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人
枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

儋州高良薑



雷州高良薑



高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛○陶隱居云出高

但爵食亦効形氣與杜若扣似面葉如山薑○唐本注云
生嶺南者形大虛軟江右者細緊味亦不甚辛其實一也
今相與呼細者為杜若大者為高良薑此非也○今按陳
臧器本草云高良薑朱辛温下氣益聲好顏色黃作飲服

之止痢及霍亂○又按別本注云二月三月採根暴乾味
辛苦大熱無毒○臣禹錫等

治腹內久冷胃氣逆嘔吐治
弱療下氣冷逆衝心腹痛吐
反胃嘔食解
酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不在所出州十一陶隱居云出高良郡今嶺
南諸州及黔蜀皆有之內一郡雖有而不堪入藥春生

如散子塊含之燕津遠巡即善若臭亦含
燕更加草豆蔻同為未煎湯常飲之佳

聖惠方治霍亂吐利腹瀉等疾高良薑一兩剉以水二
大盞煎取二盞半去滓下

外臺秘要備急霍亂吐利方大炙高良薑令焦香每用五兩
打碎以水三升煮取一升頓服即愈

蘇恭云凡患脚氣每旦任意飲食干後少食日傍不食如飢
打碎以水三升煮取一升頓服即愈

清酒一升煮取一升頓服即愈
之雖不及高良薑亦大効矣

十全方 治心脾痛 高良薑 細細 湯

衡州百部



徐州百部



峽州百部



百部根微温 按蜀本草云微寒 謹主欬嗽上氣 陶隱居云山野

連似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療欬亦

主去蟲瘻作湯洗千大蟲即去博物志云九真有一種草

似百部但長大爾懸火今乾夜取四五寸短切含四汁

勿令人知主暴欬甚良名為軟藥疑此是百部部恐其土肥

潤處是以長大爾懸火今乾夜取四五寸短切含四汁

圖經曰 有之春生苗作藤葉大如 江 湖 淮 峽 齊 魯 州 郡 皆

而光根下作撮如羊子一撮乃十 尖 長 頗 似 竹 葉 面 青 色

月八月採暴乾用古方書治欬 多 用 葛 洪 主 卒 欬 以 百

部根生薑二物各絞汁合煎服 方 張 文 仲 單 用 百 部 根

唐本云 微寒有 如 飴 服 方 可 上 日 三 驗

雷公云 先使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簾

外臺秘要 治誤示 宿 溫 部 根 四 兩 酒 服

續十全方 治暴欬 百 部 根 搗 成 膏 煎 之

抱朴子 救及 救 風

子香懷



子香懷州簡



懷香子味辛平無毒主諸瘕霍亂及蛇傷

高五六尺叢生。今注一名苗香子亦主膀胱腎間冷氣。及奇腸氣調中止痛嘔吐。唐本先附。臣禹錫等謹按藥

性論云懷香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭。氣又辛惡心腹中不安取華葉煮食之即差川中多食之

癩疔氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥妙。○日華子云得酒良治乾濕脚氣并腎勞

圖經曰懷香子亦名苗香本經不載所出今交廣諸蕃及近

三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月

牛花頗如傘蓋黃色結實如麥而小青色此人呼為土苗

種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髒間疼痛急變牽入

小腹不可忍一宿則殺人者用苗香苗葉搗取汁一升服

之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可。用此外國方永

嘉死以來用之。起死神効。食療云國八重之。投熱酒一合服之治卒

痛喘息不得亦。甚理小腸氣。孫真人云治瘰癧。子搗取汁服之

經驗後方內濕紙蓋一宿次以銀石器中火武火炒令黃焦

為末酒九如梧子大每服。十丸至十五丸。茶酒下。

食醫心鏡臭真作。霍亂碎熟除口氣。及生食並得。

衍義曰懷香子。人止。胡荽。治膀胱冷氣及腫痛亦調

香徒有葉之名。但如薑治小腸氣甚良。胡荽葉如蛇床

上時有大青蟲形如蠶。治小腸氣甚良。胡荽葉如蛇床


花冬款州晉



花冬款州洛



花冬款州濟



花冬款州秦



款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣至喘喉痺諸驚癩瘰熱

邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名野藟一名虎鬚一名蒼

奚一名氏冬生常山山谷及上黨水傍四月採花陰乾

為之使待紫苑良惡阜茨硝石玄參畏具毋辛夷麻黃
著黃芩黃連青柏陶隱居云第一出河北其形如宿蓐
未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃以大菊
次亦出蜀北其部宕昌而並不出如其冬月在水下生
正月旦取之○唐本注云今出雍州南山溪水及華州山
谷間葉似葵而大叢生花出根下○臣禹錫等謹按爾
雅云菴菴論云款冬花君主療肺氣心促急熱之勞欬連
不絕除煩補勞治肺痿肺癰吐膿吐血心虛驚悸洗肝
五藏除煩補勞治肺痿肺癰吐膿吐血心虛驚悸洗肝
目及中風等疾十一

圖經曰款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根

一高二尺初出如菊葉似草薺通直而有紅花者葉如荷而斗直大

出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大

者容一升小者容數合呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐

注所謂大如葵而最生者是也十葉又花陰乾或云花
生於水下正月一日採之郭璞注爾雅云紫赤花生水
中於水亭近正小者容數合呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐
于北山于時仲當是生於水凌盈各積雪被崖顛見款冬
婦然始敷華蓋當是生於水凌盈各積雪被崖顛見款冬

方用之為定歌最難在知梯療久嗽熏法每旦取數冬花
如雞子許少蜜拌花皮調內一升鐵罐中又用一瓦枕鑽
一孔筒孔筒安一竹筒管亦得其筒稍長作枕鑽相合
反插筒出則口含筒吸煙氣吸煙使盡止凡如是五日一為
從筒出則口含筒吸煙氣吸煙使盡止凡如是五日一為
指頭於筒口則口含筒吸煙氣吸煙使盡止凡如是五日一為
之待肉健則飽食

雷公云

去兩夜... 雷公云... 藥用... 甘草水浸一宿却取款冬花葉相伴裏

衍義曰

荒如入... 使如入... 花三... 吸草... 荒如入... 使如入... 花三... 吸草... 荒如入... 使如入... 花三... 吸草...

紅藍花



紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛
胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎
傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聾耳
滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云苗藍張騫所得
今倉魏地亦種之附今

圖經曰

紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家
作棟彙多刺花葉出棟上國人承露採之採已復出至盡
而罷棟中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作

燕脂主產後血病為勝其質亦同葉頗似藍故有燕脂名又
名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十三種風兼
腹內血氣刺痛用紅花一大兩分藍子四分以酒一夫升煎
酒一大升二合正元并了暴令乾重搗碎以無灰
藍子五大合微炒又搗碎且日取半大匙以水一升煎取七
合去滓細細燕之妙又搗碎且日取半大匙以水一升煎取七
取紅藍花者濃絞取汁一升服之極驗但度如冬月無濕
亦療婦人產暈絕者

唐本注云治口禁不語血結

外臺秘要再治一切腫方以紅花化熱爛搗取汁服之不過

簡要濟衆酒後血暈心驚氣紅花一兩搗為末分作兩服

產寶療產後中風煩渴紅花 丁五合徐微研

近効方血暈絕不識人煩渴者紅花 三兩新者佳無灰酒

新汲水之亦良

除州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘕瘕痙驚癩邪氣除
癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞
勞氣頭腰痛風癩疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及

漢中二月八月採根陰乾長莖赤子為好 陶隱居云今東間亦

亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤○唐本注云牡丹

赤丹亦名冬不周根似芍藥肉白皮丹丹出漢初南土人謂之
 異於此別有膝氣也○臣禹錫等謹按藥性論牡丹能治
 冷氣散諸痛治女子經閉不通血滯腰疼○蕭炳云今出
 合州者佳白者補赤者利出和州者並良○日華云今出
 邪氣悅色通關膝血脈利通月經消撲損瘵血續筋骨
 除風痺治胎下胞產後一切女人冷熱血氣此便
 是牡丹花根巴蜀渝合州者上海鹽者次服忌蒜
 經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中
 枯燥者白相似二月花梗上生苗葉色此當是山牡丹其莖便
 家所種者相似但花梗上生苗葉色此當是山牡丹其莖便
 子大根黃白色似二月花梗上生苗葉色此當是山牡丹其莖便
 勞去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重團人欲
 其花之說異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變
 故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主
 血乃去瘀滯正元廣利方療因傷損血痰不敬者取牡丹
 皮八分合靈蟲二十一枚炒過同搗篩每旦溫酒和散方
 化為水服血常
 雷公云如大豆許用清酒拌蒸從已至未出日乾用

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根搗為末服一錢七日三服良

肘後方下高生瘡已決洞者服

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也
 今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者為佳家


以葉便瘦多是開不成市人或
 氣子何以之若移技接者不其用為其花葉既多發奪根之
 氣也何以之若移技接者不其用為其花葉既多發奪根之

稜三京府中河稜三京州



稜三京州邢

稜三京府寧江



稜三京州淄



京三稜味苦平無毒主老癬癥瘕結塊俗傳昔人患癥瘕死

遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文選有五色人謂異物

竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄清成水乃知此可療癥

瘕也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍

大有鬚相連蔓延體輕為瘵體並同今附○臣禹錫等謹按

婦人血脈不調心腹痛或胎前惡血補勞通月經治

氣脹消撲損瘀血產後腹痛胎前惡血補勞通月經治

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荆襄間皆有

似蕒草狀體黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦似如

如附子大或有扁者傍生一振又成塊亦出苗其不中

大小不常其色黑去皮即蒲苗高及尺葉上亦有三稜根黃白

色開花白色如紅蓼花五月三月採根亦消積氣下品別有草三

稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一積氣下品別有草三

說三稜生荆楚守當作荆以著其地本秦州尤多舉世皆

都者不復有三稜所用江准南紅蒲根也

用之雖大醫不以為謬蓋流習既久用根者不識其苗採

藥者莫究其用因緣差蒙不復更辨今三稜荆湘江高五

澤尺之莖端開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗

下即魁其傍有根橫貫如鯽魚者則連數魁根上發苗採時

其苗及橫根形扁長如鯽魚者則連數魁根上發苗採時

雞苗小圓如鳥梅者黑而三稜也又根一端鈎屈如氏者為

各物適其用因其形為名如烏頭烏雲再雲華之類本非

形如鯽魚里三稜如烏梅而輕今紅蒲根不至堅重刻削而

成莫知形體又葉扁莖圓而不復有三稜處不知何緣名三

稜也今三稜皆獨傍引二根無魚

直下根其形大體多亦如鯽魚

陳藏器云本經無傳三稜總有蜀人織為器取根似烏梅有鬚

外臺秘要治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草中重釜煎如糖

服之內密器中且服一酒氣相續

又云煎取汁一椀洗三發三箇以水二椀
 子母秘錄治小兒食每氣日取汁三發大與汁小兒亦得作粥與熱
 熱食之治小兒等皆理之下
 妙新不生百日無問癩

黃薑州宜



黃薑州澧



黃味辛苦大寒無毒主

心腹結積疰忤下氣破血除風熱

消癰腫功力烈於鬱金

青白三色其作之方法
 味辛少苦多鬱金同惟花
 謹按陳藏器云薑黃真者
 花根際一如蘘荷根節

本注云葉根都似鬱金花春生
 與苗並出夏花爛無了根有黃
 鬱金同爾西戎人謂之迷藥其
 生具爾唐本先附○臣禹錫等
 是經種三年已上老薑能生花
 緊硬氣味辛辣種薑處有之終

是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來
 者與鬱金迷藥相似如蘇所附即是迷藥而非薑黃蘇不
 能分列二物也又云迷味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結
 積蘇云薑黃是迷又云迷味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結
 通相連名總稱為迷功狀則合不殊今迷味苦色青薑黃
 味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤
 主治馬熱病三物不同所用各別○日華子腫毒止暴風痛
 治癰瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛
 冬氣下食海南生者即為薑黃
 葳蕤送江南生者即為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠
 長一尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅

白色至中秋漸凋春末方生其花或云真者是經種三年以
 根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以
 上老薑生花根際一片如葉荷根節堅硬氣味辛辣
 種薑處有之八月採根際一片如葉荷根節堅硬氣味辛辣
 敗血攻心甚驗蠻人生取細切暴乾蜀人以治氣脹及產後
 黃連藥三物相近蘇秦不細辨所說乃如辟惡謹按鬱金薑
 紛云菜味苦色青薑黃味辛溫劉淵林注吳都賦薑色赤主
 馬熱病三物不同所用全別又溫劉淵林注吳都賦薑色赤主
 一云薑景大如螺氣猛也其味臭南土金樽之以為薑葵一
 名廉薑生沙石中薑類也其味臭南土金樽之以為薑葵一

益汁漬之乃成也始安有之據此康薑亦是其類而自是
一買生取之云治氣為最醫
家治氣藥大古中亦時用之

千金翼瘡癰初生或始痛
瘡以薑黃傳之妙

經驗後方兩治心痛薑黃一兩桂枝三
兩為末醋湯下

揆華州端



華揆味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃

冷陰疝疔瘕癖其根名華揆沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯

國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附○臣

按日華云治霍亂
味辛温無毒主冷氣
人內冷無子治腰腎
波斯國似柴胡黑硬
圖經曰華出波斯國
光而厚三月開花白
色在表七月結子如
小指人長二寸

或取葉生茹之黃牛
實錄云貞觀中上以
訪求其方有衛進士
尚錫亦記其事云洛
海藥云有華揆徐表
痛水瀉虛人參桂心
味得訶子人參桂心
陳藏器云揆温中下
瘕根名華揆沒主五
唐本注調食人

氣心腹痛血氣
區逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦
冷除血氣生
其莖如筋葉青圓開二三寸如桑面
色在表七月結子如小指人長二寸
九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香
氣煎其子治氣刺神良謹按唐太宗
乳煎華揆未痊服心名醫藥不應因詳

味不本出南海上者味辛温又主老冷
味不本出南海上者味辛温又主老冷
味不本出南海上者味辛温又主老冷
味不本出南海上者味辛温又主老冷

陳藏器云揆温中下
瘕根名華揆沒主五
唐本注調食人

瘕根名華揆沒主五
唐本注調食人

雷公云凡使先云極下力用醋浸一宿焙乾以刀測

聖惠方為治未發痰飲惡心用華探兩搗服

經驗後方治偏頭痛左

行義曰華探走腸胃

醬 蒟



蒟醬味辛溫無毒下氣溫中破痰積生巴蜀

流味於番禺者甚皮黑肉白兩戎亦人云蒟醬人家多檳榔食之辛而否也

此當信也○今注渝瀘

圖經曰蒟醬生巴蜀今夔川嶺南皆有之昔漢武使唐蒙曉

制江廣數里出查禹城下武帝感之於是問特柯越也

似長二三寸以實藏而食之辛香溫調五藏今云蔓生葉

食之辛而香也兩說大同小異然則片林所云乃蜀種如

者用此今說吳海南所傳耳今惟貴華探而不尚蒟醬故鮮有

海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者為

逆鮮酒上氣心腹垂痛胃弱為霍亂土

雷公云之使採得後以刀刮上蠶皮便搗用生薑自然汁拌

乾為度

食療溫散結氣治心腹中冷氣亦名工草

齊民要術荷子下

蘿摩子味甘辛温無毒土虛勞葉食之功同於干陸機云一

名芫蘭幽州謂之雀瓢蓋知以雀瓢是女青別名

今按陳藏器本草云蘿摩子以雀瓢是女青別名

呼為白環藤生離落非折有白汁一物相似不能分

附○臣禹錫等女青終非白環一物相似不能分

蘭云芫蘭黃生斷之有白汁可啖如蘭釋曰雀

外臺秘要治白癩風以蘿摩草白汁

梅師方治丹火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭

痛寒熱並水研服之亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒

從波斯國東及太原并廬陵南甯等染澱亦堪傳熱惡腫蛇

虺螫毒染毫上池沫紫碧色者田丁之同青黛功錫等謹按藥

性論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲

圖經實文具籃

梅師方治傷寒發瘧豆瘡未成膿方以

宮氣方治傷寒發瘧豆瘡未成膿方以

煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱瘓腹中時時更下痢青

瀉赤白一服眼淚面黃鼻孔赤穀道開張不乳哺壯熱增

寒下不安腹中病須醫藥紅頭祈禱信神盤此方便是

初虞世治諸毒所傷青黛維黃等分

太平廣記物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患瘡下腹上連二陰

黃丹出黃汁食亦減身熱面微腫醫作惡瘡治用鯁鮒魚松脂

酒食嚼喜魚鱗研細入青黛一兩再研勻塗傳膏藥尋時

熱減痛痒皆去仍服八散日三服如散二日減三分之

緣至五日減三分之二自熱毒氣若不愈既愈而問曰此瘡向

能常須禁酒後果熱患內痔不

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血

金瘡 ○唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無

藥用之破血而補胡人謂之馬鎊等謹按藥性論云鬱金單用

亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚

圖經曰鬱金本經不載今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中

者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根

黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及醫

馬多用之詳按許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百

二十貫葉以黃之為鬱鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金

香云生大泰國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳

亦無在木部非也今人不復用

經驗方以治尿血不愈以三兩搗為木蔥白一握相和

經驗後方治風痰鬱金一分蓋先以少漿水調下餘者水漱

口都服便

以食壓之

孫用和治陽毒入胃下血藥疼痛不可忍鬱金五箇大者一

盞同煎三沸溫服

丹房鏡源云紙柯用

說文曰芳草也十葉為貫百草貫藥以煮之為鬱人所謂芳

草合釀之以降神

周禮鬱人凡祭祀

行義曰鬱金不香今人將染山醉人衣最鮮明然

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心小兒

癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癩解巴豆毒一名訥會

一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似

黑錫今附○臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小

本草不細委之謂是象膽殊非也

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴

云耳盧會治濕疥瘡之不拘時月俗呼為象膽以其味苦而

年曾連齋初在項間後其左耳遂成濕瘡用生油狗

用盧會等兩研草半兩末相和令勻先以濕漿水洗

奇乃治舊乾高子拭乾便以二味合和傳之分末先以蓋

審公云微使勿用和象藥搗此藥先搗成粉待象藥未出

然後入藥中此物是胡人發得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無

子一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名獨石草

云此葉如茼蒿花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之荒蔚苗短小子夏中熟而初生

二種極相似也○臣禹錫等謹按爾雅云蔚牡蒿釋曰蔚即

採莖葉陰乾○臣禹錫等謹按爾雅云蔚牡蒿釋曰蔚即

蒿之雄無子者又曰蔚一名牡蒿詩蓼莪云匪莪伊蔚陸

機云牡蒿也三月始坐七月華華似胡麻華而紫赤八月

馬角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷

聖惠方治大風癩疾骨肉在敗百節疼痛石髮墮落身體習

酒調下

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月

經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血

或酒摩及者炙服生奚國根如半夏色黃今附○臣禹錫等謹

氣暖腰膝破癩癩瘡損

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡

露及兒枕與二稜驚甲大黃為散能散氣通經絡

聖惠方治產後穢污不盡腹滿方

又方

勝金方治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭

拾遺序云延胡索止

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中

惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄

中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒論云肉豆蔻君味苦辛能主

小元吐逆不下乳腹滿治宿食不消痰飲○日華子云調中下氣止瀉痢間胃治食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味

更殊

圖經曰肉豆蔻出胡國人惟嶺南人家種之春生苗花實似

信方治痢泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調製之置於煨令黃焦和麵碾末甲以炒了蠟子末一兩相和又焦炒

陳療米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一

陳藏器云有大舶來即

海藥云謹按廣志云生泰國及崑崙味辛温無毒主心腹虫

飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云待米團子以糯米作粉使熟湯搜裹豆蔻於塘火中炮

犯銅

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪

行義曰肉豆蔻對芋豆蔻言去殼只用肉油色者佳控

和平其氣

梧州補骨脂



補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷

精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國

樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳等謹按藥性論

云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑止小便利腹中冷○日華子云與陽事治冷

勞明耳目南蕃者色赤廉商者色綠入藥微炒用又名胡荽子

固經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有

實如麻子圓扁而黑九月採或云胡桃合服此法出於唐如

相國自叙云子為南海節度年七十有五越地卑濕傷於

內外象疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元

和七年有訶陵國僧土李摩訶知予病狀遂傳此方并藥

子初疑而未服後得訶陵僧額固請遂服之經七八日而覺應

驗自爾常服其功神驗十年二月罷歸京師方傳之破

浸去皮細研如泥以酒入前未更以好蜜和攪令勻如飴糖

盛於瓷器中旦日以燉酒二合調藥一匙服之便以飯壓

如不飲人以燉熱水調亦可服滿久則延年益氣悅心明

目補添筋骨但禁食芸薑羊血餘無忌此物本自外蕃隨

破船而萊非中華所有蕃人呼為補骨脂故并錄之

海藥云

雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用

經驗後方治腰疼神妙用破故紙

又方治男子女五勞七傷下元久冷烏髮一切風病四

油麻一升和炒令麻子大早取溫酒益湯下二寸九

香陵零州家



香陵零州家



零陵香味甘平無毒主惡氣症心腹痛滿下氣冷體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕

草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如薜蘿

可以止癘即零陵香也今附○臣禹錫等謹按陳藏器云薰

頭疾一名薰草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草

即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也○日華子

酒煎服血氣腹脹云治血氣腹脹

圖經曰零陵香生零陵山谷今嶺南諸州皆有之多生下濕

地葉如麻兩兩相對葉方氣如薜蘿常以七月中旬

開花至香古所謂薰草是也云薰草亦此也又云其莖

葉謂之薰其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南牧之皆

作窰竈以火炭焙乾令黃色乃在江准間亦有土生者作

香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用

零陵香今合香家及面膏深豆兩法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注性飲之亦宜和諸香唐本注性飲之亦宜

海藥云謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地

凡是齒痛前令良得升細辛善不宜多服令人氣喘

行義曰零陵香至枯乾入藥絕可用婦人

新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛温無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中
虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃

赤色八月採波今附○臣禹錫等謹按藥性論云縮沙蜜君出

以損消子化水穀温煖脾胃治冷瀉下痢不禁虛羸方曰沙未

為九日二服五十九又方炮附子未乾薑厚朴陳橘皮等

嗽奔豚鬼疰驚癘邪氣似白豆蔻子○嵩陽子曰止痢味

辛香○日華子云治一切氣壅氣轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良

開花而根下五六尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月

微黑十餘粒如黍米大

海藥云訶子按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得

孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹

熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調
下須臾覺腹中胎動處極熱即胎安已神效

端州蓬莪茂



温州蓬莪茂



蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣

吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狝

生西戎及廣南諸州好似乾葛葉似藜荷茂在根下並生

食羊不食者棄之今附○臣禹錫等謹按陳藏器云一名

蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名蓬莪波殺味甘有大毒○藥性論

酒醋摩服效○日華子云治女子醋血氣治一切氣開胃消食
損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生

根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去

令透皮蒸熟乘熱入臼中搗之即碎如粉古方不見用者今醫

家治積聚諸氣為最要之藥與京

雷公云後使於火畔吸盆中醋磨令盡然

十全博救方治小兒氣未用一錢蓬莪酒調下候

孫用和正元散治氣不接續氣短無治滑泄及小便數王采

未更入鵬砂一錢煉過研細都心服

積雪草



積雪草味苦寒無毒主大熱亞心瘡癰疽浸淫赤燥皮膚赤身

熱生荊州川谷唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延

生溪澗側搗傳熱腫丹毒不入藥用荊楚人以葉如錢謂

為地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀○今按陳藏器

服之○今按別本注云今處丹毒有並入藥用生陰濕地入

亦九月採苗葉陰乾○臣禹錫等謹按藥性論云連錢草

苦辛以益按貼消腫毒并風疹疥癬

圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細

草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾○臣禹錫等


濕地亦生臨單行力云連錢草味甘平無毒元生咸陽下

小胡薄荷所在有之單服腹中切痛連脊間如刀錐所刺

忍不可... 疾轉增... 即採取... 為度... 下三... 愈為... 陳藏器云... 衍義曰... 也葉... 直等... 秋後... 收之... 陰乾... 為末... 水調... 傅

陳藏器云... 衍義曰... 也葉... 直等... 秋後... 收之... 陰乾... 為末... 水調... 傅

越州白前



舒州白前



白前味甘微温... 按蜀本云... 無毒主腎脇逆氣咳軟上氣

陶隱居云... 唐本注云... 氣生... 方多... 生洲... 氣不... 也... 臣... 日... 氣... 肺... 氣... 經... 圖... 似... 於... 八... 倚... 幸... 一... 宿... 唐... 本... 注... 雷... 公... 云... 鹿... 出... 使... 去... 頭... 鬚... 子... 焙... 乾... 任... 入... 藥... 中... 用... 候...

圖經曰... 似... 於... 八... 倚... 幸... 一... 宿... 唐... 本... 注... 雷... 公... 云... 鹿... 出... 使... 去... 頭... 鬚... 子... 焙... 乾... 任... 入... 藥... 中... 用... 候...

雷公云... 鹿... 出... 使... 去... 頭... 鬚... 子... 焙... 乾... 任... 入... 藥... 中... 用... 候...

梅師方治久患喉甲家溫酒中作聲不得眠
 行義曰白前保肺氣治寒多用白而長於細辛但麤而
 脆不似細辛之柔以溫藥相佐使則尤佳餘如經

潤州薺花



蜀州薺花



薺花味甘寒主解百藥毒○陶隱居云根莖都似人參而藥

藥共處而毒者皆然歇不正入方家用也○今按別本注

云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾○臣

圖經曰薺花舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗

採根尤多人家收以為果菜或作脯取味甘計良又小品方療

飲服取薺花根搗末以

食療云丹石發動取

千金翼一封丁腫取生薺花根汁

食醫心鏡蒸薺花主利肺氣和中明目止痛

金匱玉函方鈎芎藭與薺葉相似誤食之殺人○薺花

朝野僉載多食此物出

別說云今多以蒸壓偏亂

行義曰古薺花今陝州採為脯別有法甚甘美蒸服可寄遠

洪州白藥



小州赤藥




興元府白藥



施州白藥



臨江軍白藥



白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州○唐本注云三月抽

赤莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾○今按

別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾

末傳之唐本先附○臣禹錫等謹按藥性論云白藥亦可

單用味苦能治喉中熱塞壅痺不通背脊中隘塞咽中常痛

腫脹○日華子云白藥冷消痰止咳軟治渴并吐血喉閉消

腫毒○又云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

圖經曰白藥出原州○夔施江西嶺南亦有之三月生苗似

結子亦名菰葉九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江

西出者葉似烏白子如菘豆至八月其子變成赤色施州

人取根并野猪尾二味洗淨去蘆皮○音乾等分攪酒

調服錢匕療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不斂者取

生根爛搗貼乾則易行取白藥研如麵漿塗之亦大效空

元亮海上方治一切天行取白藥研如麵漿塗之亦大效空

腹疝服之便以仰臥一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車

鳴疝刺痛良以仰臥一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車

水粥於片一中以仰臥一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車

即喫冷粥一以仰臥一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車

經驗後方子治婦人傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞

行義曰肺熱藥今為治馬

草莖



莖草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠如馬

蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕

龍注云莖草郭景純云即龍古也○今按別本注云紅

圖經曰莖草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在

紅龍古其大者莖有之似蓼而葉大赤白色高文餘爾雅云

一名馬蓼木經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五

陳藏器云作湯浸水


唐本注脚氣者濃汁漬之多差

衍義文具水

香附子



香附子



香附子即莎草根味甘微寒無毒主陰冑中熱充皮毛久服

令人益氣長鬚須一名瀉一名侯莎其實名緹生田野二月

八月採陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草

此○唐本注云此草根名香附子一名雀頭香大小氣除

育腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛

許荆襄人謂之大者如素近道者如杏仁

圖經曰莎草根有之或香附子舊不著所出州土但云生田野

許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道者如杏仁

載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜
味辛微寒無毒性溫元生博平即池澤中苗名香稜根名
沙結亦名草附子河南及淮南亦名水巴戟今治都最饒名
謂之地蕝根蜀郡名續思草亦名水巴戟今治都最饒名
三稜草用莖作鞋履所生皆在勝間連脅下時有氣妨皮膚
夫稜心脾中虛風及客熱勝間連脅下時有氣妨皮膚
瘡痒應飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等症
春收苗及花陰乾入冬擇根切貯於風涼處有患前病者
取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於酒
中浸身令汗出五六度浸其肺中客熱皮膚痒即止每
載四時常用則應應風永差其心中客熱肺間連脅下
氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切炒令香以
生絹袋盛貯於三斗無灰清酒中浸之春三月浸一日
即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日
夜三四服桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸搗一
十兩如桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸搗一
千兩如桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸搗一
等下如桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸搗一
雷公云搗勿令犯鐵用之切忌爾
衍義曰亦能走氣今人多用此生於莎草根然根上或有或

無有薄韌皮紫黑色非多毛也刮去皮
則色白苦便以根為之則誤矣其味苦

廣州華澄茄



華澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人

能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子

微大亦名毗陵茄子今附○臣禹錫等謹按日華子云治一

圖經曰華澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可

醫方脾胃藥中多用又治傷寒效意日夜不定者其方以

分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青特就樹採摘造之

痛霍亂吐瀉痰厥冷氣古

雷公云凡使藥得後去柄及皺皮了用酒

廣州胡椒



胡黃連味苦平無毒主久痢成疴傷寒咳嗽温瘧骨熱理腰

腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊

柳心黑外共一名割狐露澤附今

圖經曰胡其大連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆

中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃
連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味
搗羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片
烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便冷温
再服甚效

唐本云厚大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色

熟出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白蘇
皮餅巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良

苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之肉似鸚鵡眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極
酒少許化開更入水五分重湯
煮三二沸放温食後和滓服

別說云謹按胡黃連折之

舩底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯

旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行

病心悶搏絞汁服新補見孟詵陳

陳藏器云主五淋取一鴨卵

聖惠方治乳石發痛大便以水一盞煎至五分去滓溫服

四服

子母秘要即死水中苦擣末傳上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水

解酒毒不宜多服令人舌益不思飲食云是高良薑子其苗

如蘆葉似薑花作穗嫩葉赤心而生微帶紅色生南海諸谷附

○臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

海藥云色深善醒於醉鮮酒毒此外無諸要使也

廣州蔣羅



蔣羅味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋

痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀附○臣禹錫

大建脾胃開胃氣溫腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蔣羅出佛誓國今嶺南及近道皆有之二月四月生苗花實人類蛇床而香辛六月七月採實令人多以

和五味不

湯藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即異色而重蔣羅

損不可與阿魏

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附○臣禹錫等謹按方列國持何來攪攪卷五木香迷迭艾納與都梁是也

陳藏器云主癰

海藥云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟溫疫令瘴窠浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣平心腹痛滿兼用合諸香叢生

葉細廣誌云甘松香出姑臧今附○臣禹錫等謹按日華子

香身

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀川郡及療州亦有之叢生山野葉細如茅草根根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉細出涼州

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生入陳氏云生黑皮點黧風疖齒蠶野雞痔得白芷附子良志諸香

衰衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣

羸一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或墜上三月三日採陰

乾○陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云陶隱居是天蒜爾○唐本草注云此即古墻陰青苔衣也

其生石上者名昔邪一名烏韭江南少密陶故云少見本經載之墜上者名屋遊在下品形並相似為療畧同別錄

云主暴風口噤金瘡酒漬服之效○臣禹錫等謹按日華子云垣衣冷○又云地衣冷微毒治卒心隔中惡以入芳臧為丸服七粒此是陰濕地被日曬起若蘚是也并生油調傳馬反花瘡良

生江南池澤○陶隱居云此即南人用作紙者方家佳合斷

陽方云紙名苔紙青黃色體滋小品方云木中麓苔也范東

聲相之湯華削理紙萬張云張華撰博物志上晉武帝燠繁

命制之湯華削理紙萬張云張華撰博物志上晉武帝燠繁


也為色之類似苔而產道為異且水苔性冷陟釐甘温明其味

名陟釐全異池澤中石上

圖經藻條下海

斤義曰甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家赤等用

鳥葵



鳥葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即蒼菜也

一名接余也○唐本注云南人名嗜葍堪食有名未用條中載

並根極長江南人多食云是諸葍全為誤也猶葍與絲葍

龜葍此與鳥葵殊不相似也南人搗汁服之療寒熱也唐

本先附○臣禹錫等謹按日華子云諸葍鮮盡毒葍葍絲

而尋已見葍條解之○按唐本注云有名未用條中載也

圖經曰鳥葵即苦菜也舊不著所出州土云生水今處處

盛謹按爾雅若謂之接余其葉謂之荷郭璞以爲叢生水
中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂
參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘淨在
水上根在水底大如欵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸
不食醫方亦鮮用

女苑味辛温無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處

驚瀆寒熱百病療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜

食發病一名白苑一名織女苑一名苑生漢中川谷或山陽

正月二月採陰乾畏鹵鹹○陶隱居云此來醫方都無復用
紫苑非此之別名也○唐本注云白苑即女苑更無別者
有名未用中浪出一條無紫苑時亦用之功效相似也○

正禹錫等今據有名未用中無
白苑者蓋唐修本草時剛去爾

衍義曰女苑一名白苑或者謂為二物非也唐剛去白苑之
條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚
明今直

王孫味苦平無毒主五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛瘰

取經

百病益氣吳石白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名

黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下陶

居云今方家皆呼名黃昏又云杜蒙市人亦少識者唐本
注云小品述本草杜蒙一名王孫藥對有杜蒙無王孫此
則一物明矣又主全瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益
氣除胸腫發陰陽也○正禹錫等謹按蜀本注云葉似及
已而大根長尺
餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅劔鼻所在背陰古墻垣上有之

歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣墻之側

此物生垣墻之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不

同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在墻垣則謂

之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井管在水

中

石上則謂之陟釐土馬駿近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥癩加蠶蟲療齒

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

谷注陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本

志無心有按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採

苗葉陰乾之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗

澤花白似梅莖紫色煮汁極滑甚取爾雅釋草一名菟葵

在平澤皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸

本先附汁飲之及塗瘡解毒止痛六月七月採莖葉小暴乾唐

葉狀如藜有毛為

啖之滑疏洵煮也

圖經文具第三十

行義曰菟葵綠葉如黃蜀葵花似柳霜甚雅形如奎小者切

劉夢得還京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

蘇草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蘇榮生水傍

唐本注云葉圓似澤瀉瀉而小花青白亦堪取所在有之

今按別本注云江蘇人用蒸魚食之甚美五月六月採

除州鱧腸



鱧腸



鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之

立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地。○唐本注云苗似旋復

間有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附○臣
禹錫等謹按蕭炳云作膏點鼻中添腦○日華子云排膿

圖經曰今處處有之南方尤多此有二種一但云生下濕地

澤草似馬齒莧高一尺可花細而白其葉若小薄荷房蘇

實亦作房而圓南人謂之蓮翹者三種摘其苗皆有汁出

須吏而黑故多作烏髭髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八

月採陰乾亦謂之金陵草煎方金陵草孫思邈千金月令云益鬚髮

無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪攪搗研新布絞

取汁又以紗絹濾令淨盡內通油器鉢盛之日中煎五日

勿取手令勻調入置日中煎一斤合如稀錫為藥成矣每日
煎及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再
煎令可丸大如梧子依煎法酒服三十丸及時多合製為
甚速其效

爵牀味鹹寒無毒主腰脊痛不得著床俛仰艱難除熱可作

浴湯生漢中川谷及田野○南本注云此草似香葉葉長而

傍甚療血脹下氣又主杖木屑汁塗立差俗名赤

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸

毒○陶隱居云瘡井中多生苔及磚土間生雜草其藍既

鮮毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍其底泥

至冷亦療湯火灼瘡井華水又服鍊法用之○臣禹錫
等謹按蜀本云井中苔及萍味苦○日華子云無毒

圖經藻條不海

丹州茅香



許嵐軍茅香



淄州茅香



茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉

可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其莖葉黑褐

色花白即非白茅香也今附○臣禹錫等謹按陳藏器云茅

云白茅香花寒鼻流涕久不愈灸瘡器
刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劔南道諸州今陝西河東京東州郡亦有

結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花
八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器服之主腹內冷痛生惡氣冷人身心香美煮

海藥云謹按廣志云生廣南山谷諸味甘平無毒主小兒遍身

者

肘後方治熱淋取白茅根四斤到之以水一斗

又方諸竹木刺在肉中不出因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明累而長皆可作浴
湯同蒸亦本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解

酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣

臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊

而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無極不對生花心微黃

赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文具澤
瀾條下

眉州使君子



使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生
交廣等州形如柘子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗
傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號
為使君子也附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州一郡皆有之生山野中
三月生花淡紅葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如干指
長一寸許大類色又乃深紅有五稜其殼有黑八月內結子如柘指
採實

衍義曰使君子難辨果色四稜高辨深今經中謂之稜瓣深似

乾苦味鹹寒温云王痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又

心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹

石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木乳

中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

酒浸若水煮丸以取兼用之出肅州巴西唐本注云葉似首

月八月採根日
乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消積下氣出
伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不

洞花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今

圖經曰者佳苗類出如古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃船

胃氣冷喫食即欲得吐以葡萄生青熟三枚搗篩更研細好

酒一盞微溫調之併飲三兩多佳又有治嘔吐白

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心

腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更柔韌而長今登州人乾之以苴束也物新

龍得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來

胡人採此花以釀酒呼為三勒漿

閩州草



前草凉無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見

圖經曰前草生閩州味苦平無毒主虫瘡疥癬乾用

陳藏器前草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒

治勞瘵方云娶合州淨洗為未入生蜜二斤狀如茜草及細

盛之不得犯鐵器九蒸九暴之日每服四兩或吐或下皆不

坐米飯壓之藥只二服愈尋常或吐或下皆不

可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方鼻之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若一小小血妄行一發而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人不香燒之去鬼魏略云出

大秦國廣志云出西海

海藥云味平不治疾燒之法用氣合着活為丸散夜燒之辟故此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆冷夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟻虱按取汁沐頭盡死人有誤吞虱成

病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山澤濕地莖葉似山

丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云

去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷柏而

大生韎羯國其葉者之不熱無毒

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細

軟似兎肝一名雞肝與鷲葉同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜

葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為折草

六月七月生穗如狄也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮

汁服之生搗傳瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之
問荆味苦平無毒主結氣留痛上氣氣急煮服之生伊洛間
洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

重修政和經史證類本草卷之九

重修政和經史證類備用本草卷之九已酉新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉救校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經圈內

四種名醫別錄

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

附子

烏頭謝附烏

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

葶藶

草蒿

鈞吻

常山

白欵

白及

茵芋

莨菪花

羊躑躅

鷓尾

桔梗

旋覆花

射干

蜀漆

青箱子

大戟

楮者魁

牙子

大黃

葇荑

藜蘆

蛇合

甘遂

萹蓄

澤漆

貫衆

反已

三種海藥餘

瓶花

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘

藕車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

狔耳草

燈花末

千金鏗草

斷鏗草

狼把草

百草灰

產死婦人家上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

蠶母草

故叢衣結

故炊簞

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺廐草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梓州附子



梓州附子花



附子味辛甘温大热有大毒主风寒效逆邪气温中金瘡破

癥堅積聚血疲寒濕痿痺拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰

脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨强陰又墮

胎為百藥長生健為山谷及廣漢冬月採為附子春採為

烏頭地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏非

皆熱灰微炮令碎以子以八月上旬採八角者良凡用三牛

藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去其汁主喉痺

圖經子條下

陳藏器云附子無八角陶強名之古方名用

雷公云子烏頭先須認勿誤用有烏頭烏家天雄側子木鼈

有大豆許者即破用天雄身全後無尖周匝四而附

孕十陰制用並得側子只是天雄身宜傍有小有後去皮大底用不

是宜生用治風瘰子不入藥中用若服令諸人喪目若附子底

平有九角如鐵炮筒重者去兩之用氣全堪用夫修事

底尖微細剪破於至下夫欲炮者灰坑勿用深一尺安於中

一宿至明取出焙乾用去尖皮者灰坑勿用深一尺安於中

豆浸五日若陰制使即生去尖皮令乾用凡使須陰制去

頭尖了每十兩用生烏

聖惠方治丁瘡腫甚者用附子末醋和

外臺秘要療偏風半身不遂升右以咀內於酒中經一附子一兩生用無灰酒

小合

千金翼治大風冷痰痺脹滿諸痺等病用大附子一枚重半

再合以差為度日

又方治口禁卒不問搗附子末

百一方治卒卒停尸不能言口噤不開生

經驗方兩逆細刺煮研如麵糊米一箇生薑一

經驗後方治大人久患口瘡附子為末醋

又方治熱病吐下及下利身冷脈微發燥不止附子一枚

斗門方治通碎入胃用附子一箇最又依前火逼乾復濟之約生

薑汁可盡半枕許搗羅為末用

又方治兩藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以水

冷下元肥腸

簡要濟眾治脚氣連腫滿久不差方黑附子一箇去皮

塗傳腫上藥乾再調

孫用和治大瀉霍亂不止附子一錢煎重七錢炮去皮臍為

張仲文療暴赤腫痛不得開又淡出不止割

崔氏方療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一枚酢漬

耳中

孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是

水調下為一服而愈此乃散寒

又方治頭痛附子炮石膏下等錢為
 脩真秘旨治頭痛風至內者以附子一箇生去皮臍用豉豆一合
 筒附子可煮五
 服後為未服之

晉州烏頭



成州烏頭



邵州烏頭



梓州烏頭



江寧府烏頭



龍州烏頭



烏頭味辛甘温天熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕
 痺欬逆上氣破積聚寒熱消腎上痰冷食不下心腹冷疾臍
 間痛有胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之
 名射罔殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一
 名即子一名烏喙○臣禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔温大毒

烏喙音味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷
 節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎主明陵山谷正月
 二月採陰乾長三寸已上為天雄莽草為之使反半夏括樓

陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根毒特莖初生有
 烏喙形似烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧其莖狀如牛角名
 烏喙人以傳箭射禽獸中亦以八月採搗莖取汁煎為射
 罔

鳥喙即鳥頭異名也此物同苗或有三岐者然兩岐者少
縱天堆附子者有兩岐者復云柯石之○臣禹錫等謹按吳
氏云堆烏頭一名黃帝一名千秋一名毒公一名生葉厚莖方中空
子神農雷公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空
葉四面相當與蒿相似○又云鳥喙神農雷公桐君黃帝
有毒十月採形如鳥頭有兩岐相合如鳥喙名曰鳥喙
也所謂惡使盡與鳥頭同爾雅云葦葦草注即鳥頭也江
東呼為鳥頭○崔寔四月令云三月可採鳥頭○藥
性論云鳥頭使遠志為之使忌鼓汁味苦辛大熱有大毒
能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛疥癩疥氣塊
益陽事上氣治洗惡寒積聚寒熱主骨中痰滿冷氣不下食
治效逆上氣治洗惡寒積聚寒熱主骨中痰滿冷氣不下食
岐汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主瘰癧風濕濕
邪瘰癧瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇交朱取藥塗肉四畔漸
漸近瘡習背逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿
水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳
箭鏃射之十步倒也○日華子云土附子未煆辛熱有毒
生去皮搗瀝汁澄清旋添曬乾取膏名為射罔獵人將作
毒箭使用或中者以甘草藍青小
豆葉浮萍冷水薺荖皆可禦也

子文其下

聖惠方

治風腰脚冷痺疼痛川烏頭三分去皮臍

又方

治疥癬方用川烏頭七枚生用搗碎

外臺秘要

治頭風脫髮油三升浸溫服

千金方

治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾生烏頭

又方

治少風毒以

經驗方

治一切冷氣去風痰定通身疼痛益元氣強精力固

盛以

通軟揀去子爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四斤却用

新出

焙乾其藥紫白搗羅為末酒煮麩糊丸葦豆太每服

上九

空如冷氣稍盛加數服之

經驗後方

治出刺獨聖九川烏頭一箇研好者柴灰火燒烟欲盡

每服三九赤荆用黃連甘草煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每按空心

服之忌熱物

梅師方治蛇蝎螫人以射

又方治婦人血風虛冷月候不勻或即脚手心煩熱或頭面

冷裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處鑄內熬

白中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下二

又方醋浸三元藏進飲食壯筋骨二虎九烏頭附子合四兩

用七好醋三宿取切作片子穿一小時以灰火炕令通赤

又方下十丸如梧桐子大空心亦宜

又方龍腦麝香研令細勻納水一丸如彈子大空心服九先

薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心服食前服治一生

人只三十丸服得五以自梳頭

勝金方治蠟螫烏頭末

靈苑方治馬汗入瘡腫

初虞世治陷甲割甲成

脩真秘訣治瀉痢三神

白空心服瀉湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣治陰毒逆等症

轉色放冷再搗為細末每服一錢

古今錄驗以苦酒三升若六日瘰肉突出者烏頭五枚

楊氏產乳等分為末綿裹塞耳中日用

唐李寶臣為飲之即昏二日死

唐武后

氏置堇于食賀

衍義曰

小鳥頭鳥喙天雄附子側子凡五等皆一物也止依大

其端亦取而圓大者以半兩以上者其力全不肯就下故取數散
也此用烏頭附子之大畧如此餘三等則
量其材而用之其炮製之法經方以著

天雄



天雄味辛甘温大温有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩

急破積聚邪氣令寒瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來疼痛

心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

勇力作不倦又墮胎一名白

恭生少室山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢○陶隱居云今採用八月中旬天雄

似附細而長使是長也乃王三四寸許此與烏頭附子三

種本並出建平故謂之三建今宜都銀山最好謂為西建

錢塘間者謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝

東白也其用灰殺之時有以綿州龍州出者不佳○唐本云

天雄附子烏頭等並以蜀椒用米者全不堪用蜀以三物俱

造得者力為郁不相似江上川真薑干內注云烏頭也爾雅

出建平故名之非也按國地真薑干物本出蜀漢其本名薑

今此為建遂以建平釋之以此生建平耶按字書又無薑字
復為水薑亦作建平此薑以薑故故名水薑今
魏立言本草音義云論之曰以生建平則了並用八月採
造其鳥頭四月月上句今薑上氣益注云取天雄三枚內雄
雞腸中搗生食之天雄雞上氣益注云取天雄三枚內雄
有大毒乾薑制州之六八薑上氣益注云取天雄三枚內雄
促急熱食毒制州之六八薑上氣益注云取天雄三枚內雄
水藏補腰膝益精明目力疲利皮膚調血氣助陽道暖
破痰癖瘰結毒瘰癧上病瘰癧水發汗止陰汗物洽喉痺
筋背脊僕軀痛瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

凡元散炮去皮用飲藥即和皮生使甚佳句以便驗又
云天雄大長少角刺而虛鳥象似天雄而附子大短有角
平穩而實鳥頭次附子類力氣乃有殊等即宿根與嫩
者耳已天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩
並忌豉汁

圖經子條下側

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼
色即是天雄宜炮炙後去皮尖底用之不然陰制

得用並

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種鳥頭而不
生諸附子則子之類經年獨生長大者是也蜀人種

養之忌生此以爲不利如
養蚕而爲白殭之類也



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠

瘦又墮胎用北陶隱居云即附子邊前之大者脫取之昔時不

同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄

屬豫州汝南郡今在北國○唐本注云側子只是鳥頭下

共附子天雄同生小者側子與附子皆非止生謂從鳥頭下

傍出也以其小者爲側子大者爲附子今稱附子角爲側子

復有角如大豆許藥州已上劍南所出者附子之角曾微

黍粟持此爲用誠亦充北來京下皆用細附子有角未

嘗取角若然方須入角附子應言八角側子言取角用不

近人情也○臣禹錫等詳按蜀本注云昔多不用今以療

脚氣甚效○按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云

只據是鳥頭下其附子同生小者爲側子大者爲附子今

子邊果有角如大角小者核皮數角已來者形狀亦自是

仍不小有角如大角小者核皮數角已來者形狀亦自是

頭兩岐者爲鳥頭細長者乃至三四寸者爲天雄根底如

散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名如

二尺許葉似石龍芮及茨其花紫赤其實紫黑今以龍

綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令氣出以白
灰褒之數場使乾又法以生熟湯浸半日勿令氣出以白
吳氏云側子一名其神辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰
子角之大者畏惡與附子同○藥性論云側子使能治冷
筋濕痺大風

圖經曰烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子
所產其種出於龍州及廣漢今並出蜀上然四品都是一種
成其黃高三四尺以然後布種逐月耘至次年八月後方
實小子黑如桑椹木只種附子一葉如艾花紫碧色非四
物收時仍一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小
醋候熟淋去糟其醋不用大酸則水解之便將所收附
子等去根須於新潔盆內審浸七日每日攪一週日足勝
出以乾為度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三二寸者
為天雄割附子傍小者為側子餘大小者皆為附子以八
者為上如方藥要用者須令其裂去皮臍使與本經所說不
多種之惟赤水一類

同蓋今時所種如此其內地
按本經冬採為附子春採為
一歲為側子與側子二歲為
頭五歲為天雄今一年種之
法用力倍至故爾繁盛也然
氏治寒疝心腹脅引痛諸藥
烏頭五枚大者去芒角及皮
取出焙乾搗篩又以熟蜜丸
除又法用煎烏頭蜜汁以挂
知加五合其知者如醉以為
煩躁迷悶不知悟人急者用
作四片生薑大一塊立劈作
米以水一升煎取六合去滓
汗出或不出一升煎取六合
不得與冷用有如水將淨煎
莫今人多用有如水將淨煎

陳藏器云側子冷酒調服
雷公云側子只是附子傍有小
者號曰水驚子不入藥
用若服之令人喪目

只是諸藥者宜主用
只側子如棗核者是宜主用
只側子如棗核者是宜主用
只側子如棗核者是宜主用

齊州半夏

半夏味辛平生微寒熱溫有毒

主傷寒寒熱心下堅下氣喉

咽腫痛頭眩胃脹欬逆腸鳴止

汗消心腹胃膈痰熱滿結欬

嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔

逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤

面目生令人吐熱令人下用之

湯洗令滑盡一名守田一名

地文一名水玉一名示姑生槐

里川谷五月八月採根暴乾

射干為之皮惡阜莖畏雄黃

生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

白者為佳居云裡屬扶風今

生薑洗以制其毒故也○不唐

戰人因為佳方中屢陳久用之

生薑洗以制其毒故也○不唐

本注云半夏所在皆有

人特重之頃來互用功殊異

勝然江南者大乃徑寸

注云虎掌極似半夏注由

問南人說苗乃是說由

說云虎掌極似半夏注由

說感尾於此注中似說由

說云虎掌極似半夏注由

錫等謹按蜀本云熟可以

下痰又圖經云苗一莖端三葉

有當以灰裏二日湯洗其

乾之○藥性論云半夏使忌羊

血海藻飴糖柴胡為之使

有大毒湯淋十遍去涎方盡其

毒以生薑等分制而用之

能消痰涎開胃健脾止嘔吐去

胃中痰滿下肺氣主效

新生者摩塗癰腫不消能除食

瘦氣虛而有痰氣加而用

○日華子云味酸辛治吐食

反胃霍亂轉筋腸腹冷

○時醫雜錄云脾惡濕半夏


圖經曰半夏生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者

似為藥葉根下相重生上大一皮黃肉白五月八月採

者實大然以圓白陳久者為佳其平澤生者甚小八月採

多生林下或絕類半虎掌之小者是以和亂半夏主胃冷嘔

歲方藥之最要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三升



人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百二十遍
煮取三升半溫服一升以水一斗再亦治腸間支飲又主嘔噦
不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三
兩切以水七升煎取一升半分溫服之又主心下悸半夏
麻黃丸二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三九日三其
餘主寒厥赤風四逆吐附子粳米湯及傷寒方用半夏
一升洗去滑焙乾末小麥麵一升合和以水搜令熟九
如彈丸以水煮令熟則藥成初吞四五枚日三稍增
至十五枚旋旋服覺病減欲
更重合亦佳禁食錫與羊肉

雷公云凡使勿誤用白傍糞子真似半夏只是咬著微酸不
入藥用若修事半夏四兩用搗了白芥子末二兩頭
醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之
半夏上有膠涎若洗不淨令人氣逆即氣怒滿
聖惠方治時氣區逆不下食用半夏兩湯浸洗七遍去滑
生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二
服不計時
候溫服之

又方治鼠瘦五乳皆相通半夏
一分為末以水調傳之
經驗後方入治嘔吐半夏二兩天南星二兩右以水五升
入場子內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重張令

細每服水二盞藥末二錢薑三
片同煎至八分溫服至五服效

斗門方治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末
以生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令
香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入盞半錢煎取一盞
溫服能去胃膈壅滯大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗
簡要濟衆治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩
洗過為末每服三錢白麵一兩以水和搜切作基
子水煮麵熟為度用
生薑醋調和服之

古今錄驗治喉痺半夏末方寸匕雞子一枚頭開竅了去內
黃白盛厚苦酒令小滿內半夏末著中攪和雞子
內以鑲子坐之於炭上煎
藥成置在中稍按燕之

錢相公篋中方治嗽螿人取半夏
以水研塗之立止

深師方治傷寒病嘔不止半夏熱洗
乾末之生薑湯服一錢匕

子母秘錄治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大
每服二丸生薑湯吞下不差加之日再服又若以

火炮之為末
貼臍亦佳

又方治五絕凡五日皆以半夏一兩搗篩為末九如大豆內

鼻中愈心溫

產書如治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸

御藥院治膈壅風疾半夏一兩搗為末酸漿浸一宿溫湯洗五

雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一錢研勻以漿水濃煎下

紫靈元君南嶽大人內傳治卒死半

行義曰濕濕則需而困用痰不言益脾蓋能分水故也脾惡

子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各

掌虎州冀



掌虎州江



虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋

漆拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八

月採陰乾夏但皆大四邊有子如虎掌今用多破之或三四

片爾方藥亦不正用也唐本草注云此藥是由跋宿者其

者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙者如虎掌故有此名由

跋是新根猶大於半夏二三四倍但四畔無子牙亦陶云虎

掌似半夏即由跋為半夏也臣禹錫等謹按蜀本圖經

云其莖端有八九葉花生莖間根周圍有芋然若獸掌也

九月採之○藥性論云虎掌使木毒岐伯桐君詳有毒立秋

能治風眩目轉主痲瘋腸痛主傷寒特疾強陰

圖經曰根如豆大漸長山谷及冤句今河北州郡亦有之初生

大者如雞卵外周匝生圓牙二三枚成五六枚而圓一葉生七

八莖時出一莖上作穗直上如鼠尾中有一葉如麻子大熟

房傍開一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟

即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器
中漬三五日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或
再火炮今蕪州人菜園中種之亦呼為天三三江州有一
種草葉大如掌而青背紫四畔有芽如虎掌生三四葉為
一本冬青治心痛寒熱積氣不
結花實與此名同故謂見之

由跋主毒腫結熱○陶隱居云本出始興今都下亦種之狀
如鳥翼而小注云由跋根准陶所注乃是

不識半夏亦不知由跋與六馬尾也○今按陳藏器本草云
夏也○由跋黃高一尺生澤中孰地根如小指正圓所謂羊眼半
夏也○臣禹錫等謹按蜀六圖經云春抽一莖莖端直入
九葉根圓
而肉白

圖經夏條下

右由跋一種古本所去月政和監本脫
漏不載今照依嘉祐監本補之於此

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水

下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採○陶

云方家云日尺射十苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物
方亦有用作馬頭者即應是其根療體相似而本草不顯之
○唐本注云此草葉似射干而潤短不抽長莖花紫碧色
根似高良薑皮黃肉白有小毒爵之殺人因疾與射干全
別人家亦無所在有之射干花紅抽莖長根黃有白今陶
云由跋正說為尾根莖○臣禹錫等謹按蜀本云此草苗
名鳶尾根似高良薑頭亦謂之鳶根又圖經云葉似射干布地
生黑根似高良薑而節大數箇相連今所在皆有九月十
日月採根

圖經干條下

陳藏器云鳶尾主飛尸將蠱著喉中氣欲絕者以
根削去皮內疾中摩病處令血出為佳

右鳶尾一種古本所有政和監本脫
漏不載今照依嘉祐監本補之於此

黃大州蜀



大黃將味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚

留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五

臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小

腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月

採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療女子血閉黃芩為之使

所長西陶隱居云今採益州北波山及西山者雖非

乾者勝此藥至勁利麤者乾亦有中服最者皮小焦所種道耐性

去痰非養性所須也將乾之取其驗快矣○唐本注

云大黃性濕潤而易壞火乾二月八月不烈恐

不時燥即不堪矣葉字並似羊蹄但長而厚其根細

者亦以宿羊蹄大者乃如枕長二天作時燒石使熱橫寸

北漸細氣力不如一日微燥乃絕穿眼之至乾為佳幽并有

其味酸堪生啖亦以鮮熟多食不利人陶稱蜀地者不

力若取瀉和厚深沈以陳藏器本草云大黃用之當分別其

有熟不得一藥用之○臣禹錫等謹按蜀本云葉似薏麻

根如大芋傍生細根如牛蒡小者亦似羊蹄又云圖經云

高六七尺莖脆○藥性論云蜀大黃使去寒熱忌冷味苦

甘消食鍊五藏通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚

宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱特疾煩熱結聚

氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傳一切瘡癤

壽康州馬蹄峽中者次○時醫雜錄云破癥瘕積聚消留

飲宿食蕩滌腸胃推陳致新走

而守體弱大便滑者不宜用

圖經曰有大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆

黃正月內生青葉似菟麻大者如扇根如芋大者如槐長
一尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有
青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑
皮火乾江准出者曰土大黃二月開花結細實又昂州出
二種羊蹄大黃療疥癩甚效初生苗葉如羊蹄累年長大
即葉似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖相合
花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼為金
蕎麥三月採苗五月收實並陰乾九月採根破之亦有絲
紋日乾之亦呼為土大黃凡收大黃之法蘇公云作時
石使熟橫寸截著石上焙之一日微燥乃繩穿眼之至乾
今七蕃大黃往往作橫片曾經火焙蜀大黃乃作緊片
牛舌形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推
致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用
處尤多又有三物備急丸司空裴秀為散用療心腹諸疾
卒暴百病其方用大黃乾薑巴豆各一兩須精新好者搗
篩蜜和更搗一千杵丸如小豆服三九老小斟酌量之為散
不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛急
口噤停尸卒死者以煖水苦酒服之若不下捧頭起急
下喉亦須更差未知更與三九腹當鳴轉即吐下便愈
已瘵亦須折齒灌之藥入喉即差若知弟瘵小兒無瘵因
瘵瘵瘵或頭乾黃聲或下痢下差者狀多者皆大黃煎主
之大黃九兩錦紋新實者若微打即不中用削去蒼皮乃

秤搗篩為散以上好米醋三升和之置銅碗於火鐺中
浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木篋攪藥候任
傳於小器中貯兒年三歲一服七九如梧子可再服常
以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍加丸下膿
若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒
以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳
者乳母亦同忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣以大黃
二兩切如棊子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃
焦則無力搗篩為末每日空腹以水三大合入生薑兩片
如錢煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置梳子中以薑湯
調之空腹頓服如有餘薑湯徐徐押之令盡當下冷膿及
惡物等病即差止古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處
置非一切而用也姚僧坦初任梁武帝因疾熱欲服大黃
僧坦曰大帝常有此腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宜通
委頓元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宜通
垣曰昧洪而實此有宿妨并用法黃無差理帝從而愈
以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶中病便謂此方
之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者眾矣可下或或
唐本草云葉似蓂莢而細如大羊蒡生細根如牛
雷公云凡使細切內紋如水旋旋緊重割蒸從已至未熟乾

水再蒸一伏時其大黃臂如鳥

膏樣按日中煎用之為妙

聖惠方以治時氣黃疸用川大黃半兩微炒

又方熱病在語及此煎黃用川大黃五分兩制妙微赤搗為散用

外臺秘要

搽癰方大黃十兩竹篩醋三升和勻白蜜兩匙

千金方治產後惡血一衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋

千金翼篩以酒二升煮十沸頓服

經驗後方解風熱積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大

梅師方治卒外腎偏腫即易之

斗門方治腰痛用八黃半兩更入生薑半兩同煎如小豆大

簡要濟衆治吐血川大黃

廣利方煎取四合去滓

寒類要煎絞汁一升半

和衆宿治小兒胎熱常閉目

別說云更無生者用之不

衍義曰大黃損益前書已

補心湯更瀉心湯何也

苦補其心蓋因不足


者用之無不効量虛實

凡證

薺州薺



薺州丹



薺州德成



薺味辛苦寒大寒無毒

逐邪通利水道下膀胱水

腫身暴中風熱癰瘡利

薺音高一各六室一名大高

實陰乾得酒良城榆皮為之使

苦用之當熬○今按此薺

三入花黃角生子黃細

土瘕瘕積聚結乳飲食寒熱破堅

以留熱氣皮間邪水上出面目浮

腹久服令人虛一名丁歷一名

生薺城平澤及田野立夏後採

惡薑蠶石龍肉○陶隱居云出

近道亦有勞則公薺子細黃

亦療肺癆上氣欬嗽定喘促

五月熱採氣上暴乾○藥性論云

小氣上暴乾○藥性論云

微黃結角子扁小如黍粒微長黃

令孟夏之月聚草死許慎鄭康成

卮薺也至夏瀉則枯死故此時採

九更煎取一大棗瀉則枯死故此

上氣欬嗽長引氣不得臥或過體

亞主之薺子三升微火炒搗篩

共氣力取微利一初服為度如患急

以綿細絞即服其薺近根下作奇生

角端出角角麓且短又去

爾雅云薺薺注實葉

齊○山華子云利小腸

圖經曰薺生薺城平澤

白枝莖俱青三月開花

色立夏後採實暴乾月

注皆云薺薺薺薺薺

張仲景治肺癰喘不得

黃色搗末為丸大如彈

之取二升然後內一彈

息亦主之崔知悌方療

本草十

十一

七

七

雷公云凡使勿用赤鬚子其相以葶藶子只是味微甘苦葶藶子入預苦凡使以糯米相合於煨上微焙待米

熟去米

聖惠方治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒令紫

服抄一匙用粥飲

又方治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔

紙炒令紫色搗如膏每服九如彈子大以水一中盞入

外臺秘要治食飲不得息葶藶子三兩炒令黃搗為末以水

分去滓非時服

千金方治腹脹積聚痰液葶藶子一升

炒以酒五升浸七日服三合

千金翼湯治頭風搗葶藶子以

湯淋取汁洗頭止

經險方河東裴氏傳經効治水腫及暴重葶藶三兩并六干

下令如溼即如漢防已末四兩取葶藶頭鴨就藥白中

梅師方治遍身腫浮小便澀葶藶子二兩大棗二十枚以水

子飲下

又方肺壅氣喘急不得卧葶藶子三兩炒大棗三十

枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟眾治小兒水氣腹腫下痢膿血小便澀葶藶子半

五丸棗湯下空心晚後

續十全方治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子

一兩炒研以水一斗浸湯服取下惡血

崔氏治水氣葶藶子三兩以水一斗浸湯服取下惡血

利即佳不可多服令人不堪美附馬患水腫惟服此得氣

傷寒類要治腎痺厚乾

子母秘錄治小兒白痢

姚和衆用治孩兒三合煎服

衍義曰味辛產用子子合煎服

走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義

梗桔州解



梗桔州成



梗桔州和



桔梗味辛苦微溫有小毒主胃脘痛如刀刺腹滿腸鳴

驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消殺痰

咽痛下壘毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名

齊荒生嵩高山谷及寬句二八月採根暴乾

及龍眼龍膽○陶隱居云齊荒能解藥毒○所謂亂人

怒得硝石石膏療傷寒畏白齊荒能解藥毒○所謂亂人

者便是非此桔梗而葉甚相似五加異葉生又不如人參相

按藥性論云桔梗相亂惟以根聚痰涎主肺氣促嗽逆除

養氣除邪辟溫補虛又破痰開養血排膿補內瀉及痰

藥中不可用恐不能下沉

圖經曰桔梗生嵩高山谷及寬句今在處有之根如小指大

對而結子八月亦可食之

心者乃菁老也而菁老亦能

下先澤德毛為異開中枯梗如

黃頗似蜀葵根莖細青

色

葉小青色似菊
下血如雞肝者
破得死者取枯
物以口開灌之
時時出清神良
一梗草二兩炙
雷公云凡使勿
細到用百合水
修事四兩用生
聖惠方以水三
又方中惡心腹
外臺秘要治卒
千金方水治三
又方寸鼻七日
百一方若被打
經驗後方治如
簡要濟衆治痰
子母秘錄治小
杜士治上焦有
細呷之亦治肺
梅師方治卒
衍義曰枯梗治
非此枯梗也○
○陶隱居所苗
之乃本注誤矣

用之古今錄驗
四藏皆損惟心
方寸七日三不
自定服七日止
滿而振寒肺數
梗米粥是肺癰
交之只是腥澁
并兩畔附枝子
緩火熬令乾用
膏棗二兩去蘆
津不計時分溫
一兩細剉水一
去滓非時溫服
者燒枯梗二
如大豆許佳

聖惠方以水三
又方中惡心腹
外臺秘要治卒
千金方水治三
又方寸鼻七日
百一方若被打
經驗後方治如
簡要濟衆治痰
子母秘錄治小
杜士治上焦有
細呷之亦治肺
梅師方治卒
衍義曰枯梗治
非此枯梗也○
○陶隱居所苗
之乃本注誤矣

百一方若被打
經驗後方治如
簡要濟衆治痰
子母秘錄治小
杜士治上焦有
細呷之亦治肺
梅師方治卒
衍義曰枯梗治
非此枯梗也○
○陶隱居所苗
之乃本注誤矣

梅師方治卒
衍義曰枯梗治
非此枯梗也○
○陶隱居所苗
之乃本注誤矣

衍義曰枯梗治
非此枯梗也○
○陶隱居所苗
之乃本注誤矣

之乃本注誤矣

秦州菘菜



良音菘音蕒子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健

行見鬼療癩狂風癩顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走

及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及

雍州五月採子極小惟入瘵今處處有子形頗似五味核而

刺尔又服自無癩通神健行足為大益而仙經不見用

方家多作狼藉○今按陳變白性温不寒取子洗暴乾隔

定志聰明耳目除邪逐風子破破即令人發狂亦用小使

浸之今浸水下一指捻勿令前服之○臣禹錫等謹按蜀本

圖經云葉似王不留行藍等莖葉有細毛錫等謹按蜀本

嬰子形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六七月採子

日乾○藥性論去菘莖石亦可單用味苦辛微熱有大毒生

能瀉人見鬼拾針狂○熱炒止冷痢主齒痛蚰牙孔子突

之蟲出石灰清煮○一八時擲出去茅暴乾以附子乾薑陳

橘皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積年氣痢甚温煖熟發

用菜汁解之焦炒碾細末治下部脫肛○日華子云温有

毒其草升麻犀角並能解之燒熏神牙及洗陰

圖經曰菘菜子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二

花紫色至苗莖似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開

搗房子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾

謹按本經云菘菜性寒後人多云大熱而史記淳于意傳

云淄川王美人懷子而乳意飲以浪藥一撮以酒飲旋

乳且不知乳豈熱藥所治又古方主卒癩狂亦多單用菘菜

升漬數日出搗之內汁和絞去滓湯上煎令可乾如小

豆三九日三當覺口面急頭中有蟲行額及手是赤色

慶如此並足差候未知再服取盡神良又菘菜中升方主腸風

菘菜煎取菘菜實一升治之暴乾搗篩生薑半升取汁二

物相合銀鋼中更以無灰酒二升投之上火煎令大如稠餲

即旋投酒度用酒可及五升以來即止煎令大如稠餲

子每旦酒飲通下三九增至五九止若九時粘手則克
絲粉觀隔煎熟切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿
恠疾甚者服過三日當下
利疾去利亦止絕有效

雷公云用凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無効時人多
是盡醋為度却用黃牛乳色微赤若脩事十兩以頭醋一盞
是黃芩子大毒煎乾別搗重篩用一宿至明看牛乳心大煩悶
畏生
暹火

別說云謹按黃芩若之二日而芽方見如所說而其毒有

蒿草



蒿草



草蒿味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蟲留熱在骨節間明

日一名青蒿一名方漬生華陰川澤即今青蒿人亦取雜香

菜食之○唐本注云此蒿生
痛良○今按陳藏器本草首
腹內滿及冷熱久痢秋冬用
暴乾為末小便調服覺冷用
取汁和石灰去息肉鷹子○
葉似茵陳蒿而背不白高四
東人呼為和蒿為其息似和
取釋曰蒿一名散詩小雅似和
豫之問汝陰背云散孫炎云
人呼青蒿香中炙啖者為茹
益氣輕身補勞駐顏色長髮
熱黃生搗汁服并傳之瀉痢
煎治惡毒瘡并莖亦用又云
用治勞壯健人小便浸用治
又云臭蒿子涼無毒治勞下
胃止盜汗及邪氣鬼毒又云
氣開

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉

後開細淡黃花入藥用乾者煎作飲香在佳青蒿亦名方
乾根莖子葉並入藥用乾者煎作飲香在佳青蒿亦名方

本草綱目卷之四十五 蒿草

漬凡使子勿使葉使根勿使莖
子小便浸之良治骨蒸熱勞為
金刀初傷取生青蒿搗傳上以
海上方療骨蒸氣取童子小便
煎取三大斗去滓淨洗金令乾
可二大斗登過青蒿即取諸膠
火待冷以新瓷器盛每欲服時
以前膏和搗一千杵為丸空腹
飲下二十九漸增至三十九止
取甘草相和煎一大斗半除

雷公云凡使唯中為妙到膝即仰
少用七歲兒童七箇溺浸
七日七夜後漉出曬乾
然成痼疾採得葉不論多

食療云青蒿寒益氣長髮能輕身
醋淹為茹益人治骨蒸以小便
去熟藥又鬼氣取子為末酒服
灰煎治惡瘡癩廔
主色用之白者是自然香

一方治蜂螫人嚼青蒿傳瘡上即差

斗門方治丈夫婦人勞
空心中臨臥以溫酒吞下二十九
瘦青蒿細剉水三升童子小便五升
去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大

行義曰草蒿今青蒿也
赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也
取其青色者陝西人謂之香蒿莖葉與常蒿不同但常蒿色
淡青此蒿色深青以氣芬芳古人所

用以深青者為勝下不然諸蒿何嘗不青

隨州旋復花



旋復花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除
水去五臟間寒熱補中下氣消胃上痰結唾如膠漆心脅痰

水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵翳利大腸通血脉
益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平

澤川谷五月採花日乾二十日成○陶隱居云出近道下濕

苗根出河南來北國亦有形似芍藥惟合旋膏用之餘

無所入非此旋復花根也○唐本注云旋復根在中品陶

云苗似薑根似高良薑而細此是山薑正不是旋復根今

復道從北國來似芍藥與高良姜全無髣髴爾○臣禹錫

等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇黃花如菊今所在

皆有六月至九月採花○藥性論云旋復花使味甘無毒

主助脅氣下寒熱水腫主盜疾注旋復似菊疏獲一名盜

嘔逆不下食○爾雅云獲盜疾注旋復似菊疏獲一名盜

庚也○蕭炳云旋復用花葛旋徐願取用根○日

華子云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血

圖經曰旋復花生平澤川谷今所在有二尺已來後生苗多

細六月開花如菊小銅錢大深黃色上黨田野人呼為

金錢花七八月採花暴乾一十成今近者人家園圃所

蔣金錢花葉並如說極易繁盛恐印此旋復也張仲

景治傷寒汗下後心下痞堅意氣不除有七物旋復代

湯雅治婦人有三物旋復湯切治有除痰

雷公云子採得後去暴花葉乾用

外臺秘要救急續斷筋法取旋

又方破所筋斷者以旋復根

經驗後方治中風及壅滯以

梅師方治余瘡止血搗旋

衍義曰旋復花葉如大菊又

行痰水去頭目風其味甘非

花四五月有花別一種非此

蘆菘州鮮



蘆菘州鮮



藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘡

惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛

瘡不入湯一名葱苒一名葱葵一名山葱生太山山谷三月

採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃陶隱居

根微炙之○臣禹錫等謹按蜀本草圖經云葉似藜蘆秦九

有八月採根陰乾○吳氏云藜蘆一名葱葵今所在山谷皆

名蕙蔡神農本草公辛有毒岐伯鹹有毒季氏大寒扁鵲苦

藥性論云藜蘆使有大毒能主上氣去積年膿血泄瀉治

惡風瘡疥癬頭禿殺蟲

圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三

色高五六寸上有黑皮裏莖似二月三月採根陰乾此有二種

餘莖不中入藥今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是根鬚百

十莖生高山者為往均州俗亦呼為鹿葱此藥大吐

通頂令人覺而古經本草今莖草亦謂之鹿葱其類

雷公云先採得去頭用糯米煮從已至未出照乾

聖惠方治黑痣生於身上用器中盛以重

處點之良不過三遍神驗

千金翼治牙疼內蒸蘆末於

經驗後方治中風不語痰中

入嚼細用生麵為丸如赤

百一方治黃疸取蘆灰

斗門方治疥癬以生油塗

簡要濟衆治中風不省人事

乾碎切炒微褐色搗為末每

服羊錢温水調下以吐出血涎
為効如人行三里未吐再服

行義曰調治馬疥癬

鈎吻味辛温大有毒主金瘡疥癩中惡風欬逆上氣水腫殺

鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺疔四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸

一名野葛折之青烟出者名田田活甚熱不入湯生傳高山谷

及會稽東野鈎吻是野葛言其入口則鈎人後物或言物作

挽字牽挽人所生處亦有絕之數言子而不言乃事兩物野葛是根狀

無如牡丹所生處亦有一草葉似其六精而莖紫當心抽花黃色初

生既極類黃精故以為殺此工之對也或云鈎吻是毛茛菪此

本及後說參錯下同未詳一云何又有物名陰命赤色著木

懸其子生山海中最大老何入口能殺人○唐本注云野

葛生桂州以南南村樓間巷間皆食其葉者皆致死而羊食

名鈎吻根名野葛蔓生人以此以誤食其葉者皆致死而羊食

不待集之妄矣其野葛如此以新巴豆鼠食則肥也陶云飛鳥

骨嫩根如漢防己皮節斷者良正與白花藤根相類

別者懶亦惑之其新取者折之無塵氣經年已後則有

起根骨似拘杞有細孔者入折之則塵氣活為良此亦不

拘杞根亦然經言折之青煙起者名潤活為良此亦不

之蔓生葉如黃精且生如龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎

類毛茛菪是有毛石龍芮何千鈎吻○臣禹錫等謹按蜀本

秦鈎吻主喉痺四中塞聲變欬逆氣温中一名徐長卿赤箭

石山二八月採按鈎吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭

鬼箭等並一名野葛者亦如徐長卿赤箭

附傳

要胡

陳藏器云食俗呼五胡蔓草誤食之殺人嶺表錄異云野

葛毒草也俗呼五胡蔓草誤食之殺人嶺表錄異云野

日根潤亦有形似高良薑大小

赤黃色淡硬五六七八月採

圖經曰多射干生南陽山谷田野今在處有之人家庭亦

如翅羽狀故一名鳥翼謂其葉中抽莖以莖草而

月開花黃紅色黃赤三月三日採陰乾陶隱居云

方多作夜干今射干亦作夜音又云別有射干

莖長似射干之執事者故阮公詩云射干似射干

不入藥用蘇恭射干此說阮公詩云射干似射干

色不抽高莖根似高良薑而內台根即莖頭也

云西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之

而何木誤也今觀射干之形其莖梗疎長正如

由此平而陶以夜音為疑正古字音呼同多相

僕射干亦射干而射干之名木而蘇謂陶說為

其莖葉亦射干而射干之名木而蘇謂陶說為

地而生亦射干而射干之名木而蘇謂陶說為

也本經云生九真山今在處有大類莖薑也五月採

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用

外臺秘要治喉痺射干一

肘後方治小兒疝瘕時腫痛如刺用

行義曰引射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者

木金土而言之故儒者以射干為木殊不知五行止

皆土也灰火皆火也水皆水也由是言之即非佛經

宅前之獸及阮公所云臨層城者佳日華子曰大小似高

良薑故知草無疑今治肺氣喉為佳日華子曰大小似高

興州蛇含



蛇合

合是含字

味苦微寒

無毒

主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔

鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒

一名蛇

衛生益州山谷八月採

陰乾陶隱居云即是蛇

處處有之亦生黃土

字乃是含字陶見

○今按陳藏器本草

本圖經云生石上

苗佳○藥性論云蛇

赤止血協風瘰癧腫

用細葉黃色花者為

甚即為熟乃成亦瘰

毒瘡腫瘡方通用之

陶隱居蘇恭皆以為

雀歌即蘿摩之別名也

用亦稀識別故

雷公云

凡使勿用有藥尖葉者號竟命草其味別空只酸澁

後去根莖只取葉細切

肘後方

治金瘡亦

又方

治蜈蚣螫人蛇

斗門方

治產後癰疔用小龍牙根一

抱朴子

云蛇街膏連

晉異苑

云有田父見一蛇被傷又見蛇街一草菁其瘡上經

草街

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱執疾温瘧鬼毒胃中

痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益

州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉扎陶隱居云出宜都

山用最勝○唐本注云常山葉似茗俠長莖圓兩葉相當

者不過三四尺○臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四

尺根似荆根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採

葉名蜀漆也○藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘡

吐痰涎去寒熱用山麥竹葉三味合煮小兒甚良生瘡酒

酒寒熱不可進多令人人大吐治項下瘤瘰○

蕭炳云得甘草吐瘡○日華子云忌菘菜


雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用時使酒浸一宿至明漉出

外臺秘要治瘡常山二兩以漿水三升浸紆

肘後方治瘡病常山二兩研末以雞子

衍義曰常山蜀漆根也一治

漆蜀州明



漆蜀州海



漆蜀州海



蜀漆味辛平微温有毒主瘡及欬逆寒熱腹中瘕堅痞結積

聚邪氣蠱毒鬼疰江療胃中邪結氣吐出生江林山川谷及

蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾括樓為之使惡貫眾所出

又異者江林山即益州江陽山名故是同處採人採仍

暴使燥色清白堪用若陰乾便黑爛齧壞矣陶云五月採日乾

餅非蜀漆也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾

之○藥性論云蜀漆使畏寒熱不可多進令人吐逆主堅

瘕下肥氣積聚○蕭炳云枯梗為使○日華子云蜀漆治

圖經曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州同慶耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩房相當莖圓有節三四月生紅花青莖五月結實圓三子為葉八月高者不過三四尺根似刺黃色而海州小五月採葉似樹漆雲母龍骨等分杵末患瘡者至發前以漿水和半錢服之温瘡加蜀漆半分臨漢時服一錢匕今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用為飲香甘味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

雷公云

四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩又蒸了任食用勿食竹笋

行義曰

此蜀漆常山苗也治瘡多吐人其他亦未見所長

江寧府甘遂



甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹痛面目浮腫留飲

宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱

氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名主田

生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂為之使惡遠志反甘草

本出太山江東北來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贗偽之草也○唐本注

云所謂草甘遂者乃蚤體也瘰癧體全別真甘遂苗似漆草甘遂苗一莖六七葉如菟絲鬼白葉生食一升亦能利

大瘰癧疽蛇毒且真甘遂苗以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白者乃是蚤體俗名重臺也○臣禹錫

等謹按藥性論云京其逐味苦能瀉心
腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫○日華子云京西者止
皮其草節節切之

圖經曰者最佳汴滄吳者為
根皮赤肉白作連珠又似
乾以實重者為勝又有一
莖麻鬼白葉用之殊惡生
逐即蚤體也蚤體自有條
小腹滿大小便不利氣急
下方泰山赤皮其逐二兩
粒多覺心下煩得微下者
得下日再服漸加可至半
苓散見猪

雷公云凡採得後去莖於
水淘六七次令水清為度
出於瓦器中煮令乾用之
肘後方治卒腫滿身面皆洪
為七疔入其遂於中

當覺腹協
鳴小便利

楊氏產乳治腹滿大小便
行義曰藥專於行水攻決
者然經中不言此

白斂味苦甘平微寒無毒
主癰腫疔瘡散結氣止痛除熱日

核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採

根暴乾代補為之使反烏頭○陶隱居云近道處處有之作

根暴乾代補為之使反烏頭○陶隱居云近道處處有之作

根暴乾代補為之使反烏頭○陶隱居云近道處處有之作

斂白州滁



其水細到用生甘草湯小薺花
入其逐一分粉之猪腎一枚分
以火炙之令熱日一食至四五

不利氣急甘遂二分為散分
者然經中不言此

腫亦効○唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷○臣禹錫等謹按蜀本圖經云曼生枝端有五葉今所在有之○藥性論云白斂使殺火毒味苦平有毒反烏頭能生風墜腫用赤小豆茵草為末雞子白調塗一切腫毒治面上癩瘡子治溫瘡主寒熱結壅熱腫○口華子云止驚邪疾背癩瘡腸風痔瘡刀箭瘡撲損溫熱瘡疾仙

痢湯火瘡○肌止痛

圖經曰州皆生之○二月三月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑

五月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用

之濠州有一種赤斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調

肘後方治瘡背白斂

外臺秘要用白斂治湯火灼爛

衍義曰多見於斂瘡方中一物多損而行

除州青箱子



青箱子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風癢身痒殺三虫

一名蔓蒿生平公道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

一名蔓蒿生平公道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

隱居云處處有以麥柵花其子甚細後又有草蒿別本亦

作草蒿今即主瘰癧相類形名又相以極多是為疑而實

作角子黑而扁光似其實而大生下濕地四月五月荆襄

人名為崑崙草搗汁單服大療溫癘今所在下濕地有○藥

性論云青箱子一名草蒿味苦平無毒能治肝藏熱毒衝

今主理眼有青菴子丸又有一種花黃名陶珠術苗相似
○日華子云治五藏邪氣益腦髓明目鎮肝堅筋骨法
風寒濕痺苗
止金瘡血

圖經曰青菴子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之四月
月七月內生青苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色大
根而白直下獨莖生根六月八月採子只有一種花黃名
陶珠術苗亦相似
似忍不堪用之

雷公云凡用勿使思莫子才鼠細子其二件真似青菴子只
并單搗用之
是味不同真思莫子才鼠粗煎之有涎凡用先燒鐵白

廣利方治鼻衄出血不止以青
菴子汁三合灌鼻中
三國志云魏略初平中有青菴子
行義曰青菴子經中並不言治
云益眼明目與經意相當
多用治眼珠不與經意相當

蕈菌味鹹甘平微温有小毒主心痛温中去長蟲白癩瘡疥

蛇螫毒癩瘡諸蟲疽蝸去蚊蟲寸白惡瘡一名蕈蘆生東海

池澤及渤海童武八月採陰乾得酒良異雞子○陶隱居云

云蕈果所化生一名蕈菌單末之猪肉膳和食可以遺蛇
與菌亦非是蕈果所化生也其菌色白輕虛表裏相
今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者

食療云菌子莢五藏風壅經絡動痔病昏多睡背膊四肢無
人又多
發冷氣

外臺秘要治蛇蟲咬心刺以清汗蕈蘆一
兩許末以羊肉糲和之但頓服佳

金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食大
耳青色及仰生者不可食之

及白州興



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中

邪氣賊風鬼擊非緩不收除白癬疥蟲一名其根一名連及

草生北山川谷又寬甸及越山紫石莢為之使惡理石畏李

處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以

作糊○唐本注云此物山野人患手足皸折為以塗之有

效○臣禹錫等謹按蜀本云反鳥頭又圖經云葉似初生

黃黑根用○吳氏云神農本草黃帝辛季氏大寒雷公辛

無毒莖葉似生薑藜蘆十月華直治結熱不消主陰下度

治面上點皴令人肌滑○日華子云味辛辛止驚邪血邪

癩疾赤眼癢結痰背癢癰腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘡

生肌止痛風痺瘡

圖經曰諸州皆有北山石川又寬甸及越山今江淮河陝漢黔

熟蘆莖端生一莖葉兩片人青色夏開花紫七月結實至

月七月採根今醫治金瘡

不差及癰疽方中多用之

經驗方治鼻衄不止甚者白及為

行義白及文貝下

戰大州徐



戰大府中河



信州大戟



并州大戟



大戟味苦甘寒大寒有小毒

王蠱毒十二水腹滿急痛積聚

中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰

腫頭痛發汗利大小腸一名印

鉅生常山十二月採根陰乾

反其草○陶隱居云近道處處

按蜀本云思昌蒲蘆草鼠

皆○蜀木圖經云苗似芋遂高

二月八月採根用○爾雅

苦參皮黃黑肉黃白五月採苗

也○藥性論云大戟使反

云用蒿中鉅注云今本草大戟

辛有大毒破久新陳下惡血

疥塊腹內雷鳴通月水善治疥

圖經曰長作叢高尺已來

山今近道多有之春生紅芽漸

開黃紫花團圓似杏花又

似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉

黃白色秋冬採根陰乾

向出者莖圓高三四尺花黃葉

至心亦如百合苗江南生

者葉似芍藥醫家用治惡疹風

及風毒脚腫並黃水熱淋

之日再三便愈李降兵部手集

方療水病無問年月淺深

雖腹脉惡亦主之入戟當歸橘

皮各一大兩切以水二大

升煎取七合頓服利水二三升

勿恠至重不過內服使差

出張尚客

雷公云凡使勿用附生者若

服冷洩氣不禁即煎薺老芋湯

已乾申去芋

上細剉與細剉海芋葉伴蒸得

北異州澤漆



太上八帝玄變經大戟

必隅

澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫

丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生

太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆為之使惡

云此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能齒人肉

消痰退熱此即大戟生川澤中有莖梗小葉花黃葉似

月採之四五

圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近

張仲景治肺癆一斗氣肺沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東

前各五兩并草黃芩人參桂心各三兩入物以咀之

內澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服焉

本餘水有小毒逐氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水

惡方治十種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水

內教每以愈

平茵州絳



茵芋味苦温微温右口毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀

誤作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一名莞

草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾好者出彭城

今近道亦有莖葉亦狀如莽草而細軟取用之皆連細莖方

用其稀惟以合法涼風酒散○臣禹錫等謹按蜀本圖經云

莖葉高三四尺葉小如石櫛短厚莖赤今出華州雍州四月採

熱似瘡諸關節中風痺拘急掌痛治男子女子能治五藏寒

治濕痺發作有時○日華子云治一切冷風筋骨怯弱羸

竈入藥多生出葉厚五六七月形似

圖經曰茵芋出太山四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉

四月開細花白五月結實三月四月七月採葉連細莖酒

乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒

主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艸女萎防風已

石商細辛桂心各一兩凡十一味切以絹袋盛清酒一

漬之冬七日夏三日春秋五日藥成

初服一合日三漸增之以微痺為度

赭魁味甘平無毒主心腹積聚除心三蟲生山谷二月採

云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有○唐本注云赭魁大

者如斗小者如升葉以杜蒿草生草木上有小毒陶所說

也○乃臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓延生葉似薤摩根

若茂莖皮紫黑肉黃赤大者輪菌者如升小者若拳今所

在○有之據本經云無毒而蘇云為小毒又云陶說者梁漢

人蒸食之則無毒明矣乃陶說為是也○陳藏器云

按土外蔓生如芋人以灰汁煮食之不聞有功也

淄州貫衆



貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破

癥瘕除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷

一名扁府一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及

宛旬少室山二月八月採根陰乾近道亦有葉如大藏其根

形色毛芒全似老鴟頭故呼為草鴟頭○臣禹錫等謹按

爾雅云貫衆注葉圓銜莖毛黑布地冬不死一名貫渠

狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用

貫之今所在山谷陰處有之○藥性論云

圖經曰及貫衆生玄山谷及宛旬少室山今陝西河東州郡

莖葉三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如

大瓜下有黑鬚毛又似老鴉爾雅云樂舒若切貫衆郭璞

注云葉員銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三

月採根晒乾荆南人取根為末水調服錢七止鼻血有効

堯花味苦辛寒微寒有毒主傷寒温瘧下十二水破積聚大

堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬

嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾○陶隱居云中

河上來形似堯花而極細白色○北來隔絕殆不可得○唐

本注云此藥苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與

堯花全不相似也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二

尺許生崗原上今所在有之○凡用雍州者好○藥性論云

堯花使治欬逆上氣喉中腫滿等症氣壅毒瘕癖氣塊下水腫

衍義曰堯花今京洛間甚多張仲景傷寒論以堯花治利者

以其行水也水去則利止其意如此然今人用時當

江寧府牙子



以意斟酌不可使過與不及也仍須有是證者方可用之

牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一

名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及宛旬

八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人○陶隱居云近

道處處有之其根牙亦似獸之牙齒也○臣禹錫等謹按

蜀本圖經云苗似蛇莓而厚大深綠色根萌牙若獸之牙

今所在有之二月三月採牙日乾○藥性論云狼牙使未

腹臍一切蟲止赤白痢煎服

圖經曰

牙子即狼牙子生淮南川谷及宛句今江東京東州

牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒法取

獨莖狼牙搗臘月猪脂和以傳上立差又揚炎南行方云

聖惠方

治陰瘡洗方用狼牙五兩細

外臺秘要

范注治寸白蟲方狼牙五兩搗末蜜丸如麻

又方

治金瘡狼牙草莖葉

又方

治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩以水四升煮去

千金方

治小兒陰瘡濃煮狼牙草洗之又治射口即

及巴味苦平有毒主諸惡瘡疥癩痿蝕及牛馬諸瘡

人多用以合藥膏其驗○唐本草注云此草一莖莖頭四

葉葉際著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒

錫等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之○藥性論云及

巴亦可單用能治癩疥○華子云主頭

海州羊躑躅



潤州羊躑躅



羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒

諸瘡邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三

月採花陰乾○陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊

本注云玉支躑躅一名陶於植子注云是躑躅子名玉支

樹生高三尺葉似桃葉花似山石榴○今注其苗

云採花日乾今所在有之○藥性論

圖經曰

羊躑躅生太行山山谷及淮南山今所在有之春生

石榴旋苗以鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄

名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色

如錦綉然或六此種不入藥古大方多用躑躅花散甚勝

特行赤散及治五軟四清丸之類及治風諸酒方皆雜用

脚湯中多治自病風濕等魯正酒中亦用躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳痲器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天

行特氣是惡邪精等並宜燒之又於木之裏善洗水腫浮氣與

上薑芥子等煎浴湯風瘧甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似

細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠禹州者佳草莖功力

相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莖長二尺許內有薄

片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一牛佩之臂

上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非

也宜南草者即當草是

二十五種陳藏器餘

藕車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛇虫生彭城高數尺白

花爾雅曰藕車芫與郭注云香草也廣志云黃葉白花也海

藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂

辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛇者煎此香冷

朝生暮落花主惡瘡疽蠱疥癰蟻癩等並日乾末和油塗之

生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺莖又名鬼

筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地
經秋兩生菌重臺名仙人帽大主血

衝絳根味苦平無毒主熱毒蛇火蟲癰瘡等毒功用同陳家

白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥謹按廣州記云

苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及
蛇傷並取其根煎服之應是着諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着毋卧席下勿令毋知

蛇耳草主溪毒射工絞取汁服津傳瘡止血○百一方能耳

未知何是松葉白葉者亦名蛇耳類氏家訓馬莧
一名蛇耳馬莧是也又草前葉圓者亦名蛇耳

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花化落有喜事不尔

錢之兆也

千金鑷草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傳瘡正生飢止痛生

南高二三尺也


斷罐草主丁療合白牙莖耻六反羊菜青苔半

窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸

下根出也

夏地骨皮蜂藥末服一匕

狼把草



狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖經曰

根俗間頻服有功效患血痢不療婦人若患諸病年痲痲即其
內白麵半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過
三服若無生者但收取苗陰乾搗為散患痢者取散一方

寸匕和蜜水半盞服之。臣禹錫等謹按狼把草出近道古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒灰作以井花水為團重燒令白以醞醋和為餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傳瘡上產死婦人塚上草主小兒疳瘡取之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傳面黥

蚩毋草葉卷如實中有血蟲羽化為蚩便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂杵為末傳人馬山行無復蚩來

故囊衣結燒為灰和油傳蠮螋溺瘡佳

故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥亦燒成灰和苦酒合為泥傳之

天羅勒主溪毒按碎傳之瘡上天羅勒主江南平地毛蓼主癰腫疽瘰癧杵碎肉瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬依不死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖

圓似芋亦傳蛇毒○百一方東關有草狀如芋莖方節赤按

草總能主蛇毒如藟藟出山知何者是又有鼠芮草如昌蒲出山取根藥鼠立死

萬一藤主蛇咬杵篩以水和泥傳壅上藤蔓如小豆生嶺

南亦名萬吉

螺麤草主癰腫風癩脚氣腫搗傳之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺麤微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳必以月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒


成灰和臘成口脂所止一與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口旁癢瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傳亦煮服斷血

疥及卒下血生江南落野田間下濕地高一二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁根生池畔葉有柎方莖子作釵脚着人衣如針北人呼為鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十



五十一

