

朱

禡

日

本草綱目草部第十五卷

草之四
墮草類上五十三種

菊

本經

野菊

拾遺

菴藺

本經對盧附

蓍

本經

艾

別錄夏臺附

千年艾

綱目

茵陳蒿

本經

青蒿

本經

黃花蒿

綱目

白蒿

本經

角蒿

唐本

蘆蒿

拾遺

馬先蒿

本經

陰地厥

圖經

牡蒿

別錄

九牛草

圖經

茺蔚

本經卽益母草

蕪菁

拾遺

薇銜

本經

夏枯草

本經

劉寄奴草

唐本

曲節草

圖經卽麗春草

旋覆花

本經

青葙子

本經○陶朱術鴈來紅天靈草思蓂子附

雞冠花

嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花

綱目

燕脂

大薊

小薊別錄續斷

本經

苦芨

別錄

漏盧

本經

飛廉

本經

苦芨

別錄

苘麻

唐本卽白麻

大青

別錄

小青

圖經

胡蘆巴

嘉祐

蠡實

本經

惡實

別錄卽牛蒡

枲耳

本經

天名精

本經

卽地菘

蘆別錄

甘蕉別錄

襄荷別錄

麻黃

本經雲花

草附

木賊

嘉祐問荆附

石龍芻

本經卽龍鬚草


龍常草

別錄櫻心草

燈心草

開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六



本草綱目草部第十五卷

草之四

陸草類上五十三種

菊

本經上品

釋名

節華

本經

女節

別錄

女華

別錄

女莖

別錄

日精

別錄

更生

別錄

陰成

別錄

周盈

別錄

九月菊

別錄

傅延年

別錄

治蘚

爾雅

金蕊

綱目

陰成

別錄

周盈

別錄

珍

曰按

九月菊

陸佃埤雅

云菊

本作鞠

從鞠

窮也

月令

九月菊

有黃華

事至此而窮盡故謂之鞠

鞠節華之名亦

取其應候也

崔寔月令

女節

女華

菊華之名亦

也

治蘚

日精

也治蘚

日精

菊根之名也

抱朴子云仙方所謂曰

仙方所謂曰

也

治蘚

日精

菊根之名也

抱朴子云仙方所謂曰

仙方所謂曰

也

治蘚

日精

菊根之名也

抱朴子云仙方所謂曰

仙方所謂曰

也

唐天寶單方圖載

白菊

云原生南陽山谷及田野

及田野

中穎川人呼爲回峰

菊汝南名茶苦蒿

上黨及田野

建安郡順政郡並名羊歡

草河內名地薇蒿

上黨及田野

中穎川人呼爲回峰

菊汝南名茶苦蒿

上黨及田野

中穎川人呼爲回峰

菊汝南名茶苦蒿

上黨及田野

中穎川人呼爲回峰

菊汝南名茶苦蒿

中穎川人呼爲回峰

菊汝南名茶苦蒿

上黨及田野

集解

別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實

皆陰乾

宏景曰菊有兩種

一種莖紫氣香而味甘

葉可作羹食者爲眞菊

一種青莖而大作蒿艾氣

味苦不堪食者名苦薏

非眞菊也葉正相似惟以

甘苦別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種

便得又有白菊莖葉都相似惟菊白五月取之仙

經以菊爲妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊

潭者爲佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種

生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊

類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微

大味甚甘者爲眞其莖青而大葉細氣烈似蒿艾

花小味苦者名苦薏非眞也南陽菊亦有兩種白

菊葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

蒿花蕊都黃今服餌家多用白者又有二種開

宗瘦曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白

花

小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳

宗瘦曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白

花

菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香者爲甘菊花小而黃者爲黃菊花小而氣惡者爲野菊時珍曰菊之品九百種宿根自生莖葉花色品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜

亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無心有子無子黃白紅紫閒色深淺大小之別其味有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟以單葉味甘者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高蓋如蜂窠中有細子亦可捺種嫩葉及花皆可蝶食白菊花稍大味不甚甘亦秋月采之菊之無子者謂之牡菊燒灰撒地中能死蠶龜說出周禮

花實並同

氣味苦平無毒

別錄曰甘損之曰甘者

入藥苦者不入藥

冥曰

苦甘寒可升可降陰中微陽也

時珍曰本經言菊花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者爲菊苦者

爲苦蕙惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕙者爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄人正如黃精益壽鈞吻殺人之意之才曰朮及枸杞根桑根白皮青葙葉爲之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風溼痹久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來

陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢

別錄
陶縱

緩貌治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游

風令消散利血脈並無所忌

甄

作枕明日葉亦明

目生熟並可食

大

養目血去翳膜

元

素主肝氣不足

古好

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白

弘

染鬚髮令黑和巨勝茯

苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色

藏器

發明

震亨曰

黃菊花

屬土

與金

有水

與火

能補陰

受四氣飽

經露霜葉枯

不落花槁

不零味兼甘苦

性稟平和

昔人謂其能除

風熱益肝補陰

蓋不知

其得金水之精英尤多能益

益金水二臟也

補水所

以制火益

金所以平木

木平則風息火降則熱除

用始京也準是言仙餐賢囊之入用治之熟雜冒天豈胡傳其比之存金諸記霜極羣廣言落之可乎其陽風頭言吐也芳久病風子長神農可苗者行其穎黃伍風子朱房言列之上品自本至末罔花皆可入水陰分皆可入藥神而白采菊象黃羸飲菊子皆以飲菊花可以辟根實者莖質雜鍾會菊潭水有五多壽菊花成仙年也早美壽菊花之貴重荆如州記神人高如州記此記前藥明葉也益土色也中秋中體也早美壽菊花之貴重荆如州記神人高如州記此記前藥明

附方

舊

十六

新

服食甘菊

玉函

方云

王子喬

變

年方用

甘菊

三月

上寅日

容成

九月

日增

采苗

名曰

玉英

六月

上寅日

采花

名曰

金精

十二月

上寅日

采葉

名曰

容成

九月

日采

根莖

名曰

日杵丸齒正長爲一落月莖采三斤丹眩久服或苓九月再日末生葉三每酒味並服百日一陰錢輕潤十歲老翁變髮白丸分以蜜或取等份梧子成童黑服之孟之酒合引二九云年七千日續貯得服陰并昏悶也生頭日二九

爲佳

頌圖經

蘇

風熱頭痛

菊花

石膏

川芎

各三錢

爲末

每服一錢半茶調下

簡便

方

膝風疼痛

菊花

陳艾葉

作護膝

久則

吳旻扶壽方

同煮

俟汁盡食

豆皮等分爲末

每用

一生

醫障用白

菊花穀精

草綠

豆皮等分

爲末每用

一錢以乾柿餅一枚粟米泔

一盞同煮

俟汁盡食

大半日

者半月

食三枚

散者

每用

柿

日食

三枚

淺者

五七日遠

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

蟬等分爲

末

者

半月見效

仁齋直指方

方

遠病後生醫

白菊花

蟬等分爲

仁齋直指方

方

病後生醫

白菊花

花上水主治益色壯陽治一切風明

野菊

拾

釋名苦薏

時珍曰薏乃蓮子之心此物味苦似之故與之同名

集解

藏器曰苦薏生澤畔莖如馬蘭花

苦薏生澤畔莖如馬蘭花

苦薏生澤畔莖如馬蘭花

苦薏生澤畔莖如馬蘭花

苦薏生澤畔莖如馬蘭花

苦薏生澤畔莖如馬蘭花

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

多與菊無異但葉薄小而多尖

多與菊無異但葉薄小而多尖

多與菊無異但葉薄小而多尖

多與菊無異但葉薄小而多尖

多與菊無異但葉薄小而多尖

主治調中止洩破血婦人腹內宿血宜之

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

腫疔毒瘻癰眼癰

時珍

附方

新癰疽疔腫

一切無名腫毒

孫氏集效方用

野菊花連莖搗爛酒煎熱服取

孫氏集效方用

孫氏集效方用

汗以渣傅之卽愈

衛生易簡方用野菊花莖葉

蒼耳草各一握共搗入酒一盃絞汁服

以渣傅之或六月六日采蒼耳葉九月

取汗卽愈或六月六日采野菊花爲末每酒服三錢亦可

天泡溼瘡

野菊花根棗木煎湯

野菊花根擣爛煎酒服以渣傅之自

洗之瑞竹堂經驗方

不消亦自破也

瘰癧未破酒服以渣傅之自

菴蘭

本音淹閣○

釋名覆閣

時珍曰菴草屋也閣里門也此草乃蒿

屬老莖可以蓋覆菴閣故以名之貞元

廣利方謂之菴蘭蒿云又史注云

菴廬軍行宿室也則閣似當作廬

集解

別錄曰菴蘭子生雍州川谷亦生上黨及道

邊十月采實陰乾宏景曰狀如蒿艾之類近

菴廬軍行宿室也則閣似當作廬

利方謂之菴蘭蒿云又史注云

菴解

江淮有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也

高二三尺七

頭

道處處有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七

頭

月開花八月結實九月采實時珍曰菴蘭葉不似艾似菊葉而薄多細子面背皆青高者四五尺其莖白色如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊

子氣味苦微寒無毒

別錄曰

微溫

普曰

神農雷公

溫無毒

季當

之溫權曰

辛苦時

血分之才

日荆實

慧苡爲之使

足厥陰經

桐君岐伯苦小溫

溫無毒

雷公當

降也陰中微陽入

足厥陰經

血分之才

日荆實

慧苡爲之使

足厥陰經

腰痛及婦人產後血氣痛

時珍

發明

頌曰本經言久服食者惟入諸雜治藥中如胡洽治驚邪少有服

丸之類

大方法並單用菴蘭煮汁服亦可末服今人

主跪折瘀血並單用菴蘭煮汁服亦可末服今人

謂普本草及名醫別錄並言驅驢乃獸名似驃而小前足

附方

舊二瘀血不散變成癰腫生菴蘭蒿擣

汁一升服之

去皮尖研勻入瓶內以

不通

婦人宿有風冷積聚月水不通菴蘭子

酒二斗浸封五日後每飲

升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以

水一升童子一兩

產後血痛

菴蘭子一兩

三合二斗浸封五日後每飲

升童子一兩

小便二日三服

頻湖集簡方飲

附錄對盧

別錄有名未用曰味苦寒無毒主疥瘡久不瘳生死服除大熱煮汁洗之似荅

蘭八月采

蓍

音尸上品○本

釋名

時珍曰按班固白虎通載孔子云蓍之爲言

埠雅云蓍也老人歷年多更事久事能盡知也

陸佃云蓍千歲而三百莖其本已老故知吉凶

集解

別錄恭曰此草所在有之其莖可爲筮陶氏誤乾

以楮實爲之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡

蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一莖二十莖至多者五十莖生便條直所以異於

州本一眾如艾實史記龜策傳云枝端紅紫色形如菊花結於

上著百莖其一根所生之處龜千歲乃遊於蓮葉之

本草圖書卷五著

徐廣註云劉向言龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖也褚先生云蓍滿百莖其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今取蓍者八十莖已上長八尺者卽已難得但得六十莖以上長六尺者卽可用矣今蔡州所生皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰蓍乃蒿屬神草也故易五尺士三尺張華博物志言以末大於本者爲主夫次蒿次荆皆以月望浴之然則無蓍揲卦亦可以荆蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒

主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老

輕身

本經

葉主治瘡疾

時珍

附方

新

腹中瘡塊

蓍葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量瘡大小貼之兩

炷香爲度其瘡化爲膿血從大便出

劉松石保壽堂方

艾

中別錄品

釋名

冰臺

爾雅醫草別錄

黃草

埤雅艾蒿

時珍曰

王安石字說云艾可久

疾久而彌善故字從火

陸佃

云博物志言削

冰令圓舉而向日以艾承其影則得火則艾名冰

臺其以此乎

醫家用灸百病故曰灸

草一灼謂之一壯以壯人爲法也

集解

別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾

頌曰處處有之以複道及四明者爲佳云此種灸

百病尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短

者爲良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可

用

者爲良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可

用

百病尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短

者爲良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可

用

百病尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短

用時珍曰艾葉本草不著土產但云生田野宋時謂之北艾四明者爲佳四明者圖形近代惟湯陰者以湯陰複道者爲佳四明者圖形近代惟湯陰者處州者爲勝用充方物天下重之謂之蘄艾相傳他草多生山原二月宿根生苗成叢其莖直生白有茸而柔厚七八月葉間出穗如蒿分爲五尖挺上復有色高四五尺其葉四布狀如蒿子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池如車前穗細花結實纍纍盈枝中有細子葉間出穗皆以端午治病灸疾功非小補又宗慎荆楚歲時記子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以收云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之灸瘡至愈不疼亦可代蓍策及作燭心氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤

葉脩治末少許謂之硫黃擣去青滓取白入石硫黃艾灸家用之得米粉少

許可擣爲末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人肌脈故孟子云七年之病求三年之艾揀取淨葉揚去塵屑入石臼內木杵搗熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿爲度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗爲末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同研卽時可作細末亦一異也

氣味苦微溫無毒恭曰生寒熟熱元素曰苦溫陰熱可升可降陽也少陰之經苦酒香附爲之使

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部癰瘍婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令

見風

別錄

搗汁服止傷血殺蛇蟲

宏景

主衄血下血膿

血痢水煮及丸散任用

蘇恭

止崩血腸痔血搗金瘡

止腹痛安胎苦酒作煎治癬甚良搗汁飲治心腹

一切冷氣鬼氣

甄權

治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱

大治帶脈爲病腹脹滿腰溶溶如坐水中

好古溫中

逐冷除溼

珍時

發明

詵子

春月采嫩艾作菜食或和麪作餛飩如

彈子吞

三五枚以飯壓之治

一切鬼惡氣長

服止冷痢

又以嫩艾作乾餅子用生薑煎服止瀉

痢及產後瀉血

甚妙

頌曰近世有單服艾者或用

蒸木瓜和丸

或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒

發則熱氣衝上

狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者

發

彈子

冷痢又以嫩艾作乾餅子用生薑煎服止瀉

及產後瀉血甚妙

頌曰近世有單服艾者或用

蒸木瓜和丸

或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒

發則熱氣衝上

狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者

誠不可妄服也

震亨曰

婦人無子多由血少不能

本

艾草

性至熱入火灸則氣下行入藥服則氣上行本

草止

言其溫不言其熱世人喜溫率多服之久久

毒發

何嘗歸咎于艾哉予考蘇頌圖經而因默有

感焉

時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦

元生溫熟熱純陽也

可以取太陽真火可以回垂絕

人爲融和

陽服之則走三陰而逐一切寒溼轉肅殺之氣

謂有毒

一則見其能止諸經而治百種病邪起沉疴之氣

其性寒

有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則

病散

熱因久服致火上衝之故爾夫藥以治病中

諸咎

艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣

艾不輟助以辛熱藥性久偏致使火躁是誰之

功尤艾附丸治心腹少腹諸痛調女人下血

尤著奇效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒溼腳氣亦宜以此夾內襪

附方

舊二

新二

十七

四傷寒時氣

溫疫

頭痛壯熱

脈盛以

汗一升

頓服

取

妊娠

傷寒

壯熱

赤斑變爲黑斑

溺血

煮二升

半分

爲二

妊娠

風寒

卒中

不省人事

狀如

醋炒

極熱

以絹包

熨臍下

良久卽甦

婦人

良方

耳內

四面

以麵密

封不透

風一頭

以艾灸

中風口

之七壯

患右灸

左灸右

勝金方

中風口

熟艾灸

承漿一穴

頰車

中風

掣痛

不仁

不隨

二穴各五壯

千金方

中風掣痛

不仁

不隨

揉圓

瓦甌中

並下塞

諸孔獨留

一目以痛處

肘後方

舌

縮口噤

以生艾搗傅之乾艾浸溼亦可

聖濟錄

咽喉腫痛

醫方同嫩艾搗

汁細

嚥之○

經驗方

用青艾和莖葉一握同醋搗

爛傅

於喉上冬月取乾艾亦得

中閒隨年歲灸之

斗門方

當鬼擊中惡

癲癇諸風

熟艾於陰囊下穀道正門當

李臣所傳方也

卒然著人如刀刺狀胸膈腹內病刺切痛不可按

或卽吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子大三枚水五升煎

二升頓服肘後方

撮口艾葉燒灰填

上白或喜睡其不舌

或隔蒜灸之候口中有艾氣立愈簡便方

小兒臍風臍中以帛縛定效

病人齒無色舌

上白或喜睡其不舌

知痛癢處或下痢宜急治

下部不曉此者但攻其

管中熏下部令烟入或少加雄黃

于其不舌

更妙罌中燒烟亦可

肘後方

頭風久痛

蘄艾揉爲

丸時時嗅之以黃水出爲度

青囊雜纂頭風面瘡

瘡出黃水艾二升砂鍋煎取

兩

汁每薄紙上貼之一日

二三上

御藥院方

心腹惡氣

艾葉搗汁飲之

藥性論脾

胃冷痛

白艾末沸湯服

二升

水白熟艾一升

升水三升

乾薑一片乃飲一升

當下蟲出艾搗汁五口

吐清水

乾薑艾煎湯啜

止以艾一把水三升

頓服臺秘要外

老小白痢

艾薑丸用陳北艾四兩乾薑炮三兩爲末醋煮倉米糊丸

梧子大每服七十丸

空心米永類方

諸痢久下等分煎湯

飲下甚有奇效

水酒煮爛飯和丸

每暴泄不止陳艾一把

鹽湯下三十丸

聖濟總錄

生薑煎濃汁一千金方野雞

熱服

一塊水煎

艾葉生薑煎濃汁七壯取效郎中

痔病

先以槐柳湯洗過以艾灸上

及乘驃入西川數日病痔大作如胡瓜貫

於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵者云須

灸卽瘥乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸

中因大轉瀉血穢併出瀉後遂

妊娠下血

張仲景曰婦人

失胡瓜所在矣

經驗良方

妊娠下血者

有漏下者有半產後下血不絕者有妊娠

並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芎藭甘草

各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒一升日三

服五升煮取三升乃納膠令消盡每溫酒一升日三

或腰痛或搶心或下血不止或或

匱要略妊娠胎動倒產子死腹中心艾葉一雞子大以

酒四升煮二升分

二服肘後方胎動迫心作痛艾葉雞子大以

頭醋四升煎二升分

溫服二服

母秘錄子婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠

盞先煮艾薑至二盞半傾出入膠烊化

炒爲末半兩乾薑一錢水五

分三服一日服盡初虞世古今錄驗

產後瀉血

濃煎湯一服立妙孟詵食療本草

產後腹痛欲死

不止乾艾葉半兩灸熟老生薑半兩

產後瀉血

因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗熨之待口中艾氣出則痛自止矣

楊誠

經驗

忽然吐血

一二口或心衄或內崩熟艾三團水五升煮二升服一方燒灰水服

二錢

鼻血不止

艾灰吹之亦可以艾盜葉煎服

聖惠方

盜汗不止

熟艾二錢白茯神三錢烏梅三箇水一鍾煎八分臨臥溫服

以艾燒烟起用盜覆之候烟盡盜上溫水調化洗眼卽瘥更入黃連尤佳

通妙真人方

上肝黯

艾灰桑灰各三升

以水淋汁再淋至三遍布納于中同煎令可丸時每以少

許傳之自爛脫甚

妙外臺秘要

婦人面瘡

名粉花瘡以定粉五錢菜子油調泥盜內

用艾一二團燒烟熏之候

盡覆地上一夜取身

談楚翁試驗方

身

面疣目除

艾火灸三壯卽

聖惠方

鷺掌風病兩水四五五盜煮

五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心放瓶上熏之如冷再熱如神一陸氏積德堂方

瘡疥熏法

大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手
熏之如冷再熱如神陸氏積德堂方

取備急合方 股小兒爛瘡

盛之用麻布二層縛之將手再熱如神一陸氏積德堂方兩木鱉子三錢雄黃二錢硫末揉入艾中分作四條每以被裏烘小兒瘡瘍水一升煮艾葉一兩方摘要傳之良子母秘錄臘瘡口冷飲不

之熟艾燒驗方白癩風瘡

之用麻布二層縛之將手
熱如神一陸氏積德堂方
木鱉子三錢雄黃二錢硫
採入艾中分作四條每以
葉裏烘小兒疳瘡水一升煮
葉燒灰傳之臙瘡口冷不
葉子母秘錄臙瘡口冷不
乾艾隨多少以浸麴釀酒
如常法日飲之覺癒卽瘥

後方 肘
疔瘡腫毒

瓶內盛之用麻布二層縛之將手如冷再熱如神一陸氏積德堂方錢爲末採入艾中分作四條每以中置被裏烘醫方摘要小兒疳瘡艾葉一兩水一升煮
癩風瘡艾葉燒灰傳之臘瘡艾子母秘錄口冷不乾艾隨多少以浸麴釀酒飲
艾蒿一擔燒灰于竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以鍼刺刺以

瘡至痛乃點藥
人神驗貞觀初

瓶內盛之用麻布二層縛之將手如冷再熱如神一陸氏積德堂方
艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫
錢爲末採入艾中分作四條每以
中置被裏烘醫方摘要小兒疳瘡
艾葉燒灰傳之臙瘡水一升煮
爛瘡良子母秘錄艾葉一兩
癩風瘡乾艾隨多少以浸麴釀酒飲
艾蒿一擔燒灰于竹筒中淋取汁
以一二合和石灰如糊先以鍼刺
三遍其根自拔玉山韓光以此治
衢州徐使君訪得此方予用治

孫真人千金方

瓶內盛之用麻布二層縛之將手如冷再熱如神一陸氏積德堂方錢爲末採入艾中分作四條每以中置被裏烘醫方摘要小兒疳瘡水一升煮艾葉一兩艾葉燒灰傳之子母秘錄臘瘡口冷艾隨多少以浸麴釀酒飲艾蒿一擔燒灰于竹筒中淋取汁三遍其根自拔玉山韓光以此治衢州徐使君訪得此方予用治三發背初起未成及諸熱腫以溼紙先乾處是頭著艾

灸之不論壯數止其毒卽散不

瓶內盛之用麻布二層縛之將手如冷再熱如神一陸氏積德堂方錢爲末採入艾中分作四條每以中置被裏烘醫方摘要小兒疳瘡水一升煮艾葉一兩艾葉燒灰傳之子母秘錄臘瘡口冷不乾艾隨多少以浸麴釀酒飲艾蒿一擔燒灰于竹筒中淋取汁三遍其根自拔玉山韓光以此治衢州徐使君訪得此方予用治三發背初起未成及諸熱腫以溼紙散亦免內攻神方也李絳兵部

手癰疽不合

瘡口冷滯以北艾煎湯洗後白膠熏之

直指方

咽喉骨哽

艾蒿

用生艾蒿數升水酒共一斗煮四

外臺秘要

一把

艾灸數壯甚風

升細細飲之當下水五升煎一升頓服便

諸蟲蛇傷

良

集簡方

燒烟

蟲牙痛化蠟少許攤紙上鋪艾以筋卷成筒

左右熏鼻及烟令滿口呵氣即疼止腫

良

集簡方

風

消斬季謙病此月餘一試即愈

普濟方

實氣味苦辛熱無毒

主治明目療一切鬼氣

大

飄壯

陽助水臟腰膝及暖子宮

明

發明

說曰艾子和乾薑等分爲末蜜丸梧子大空心每服三丸以飯三五匙壓之日再服治百

惡氣其鬼神速走出田

野之人與此甚相宜也

附錄夏臺

別錄有名未用曰味甘主百疾濟絕氣也時珍曰艾名冰臺此藥神奇乃爾不復識用可恨

氣此主百病濟絕氣恐是一物重出也故附于艾後

千年艾

目綱

集解

時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖極面青背

白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之卽碎不似艾葉成茸也羽流以充方物

葉氣味辛微苦溫無毒**主治**男子虛寒婦人血氣諸痛水煎服之

時珍

茵陳蒿

本經上品

釋名

藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字耳時珍曰按張揖廣雅

及吳普本草並作因塵不知何義

集解

別錄曰茵陳生太山及丘陵坡岸上五月及立秋采陰乾宏景曰今處處有之似蓬蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰

葉似青蒿而背白

大明曰茵陳出和州及南山嶺

上一名石茵陳

頌曰近道皆有之不及太山者佳

春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五

月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江甯府一種

茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種白

方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳

汴京亦似青蒿而背白本土皆以爲茵陳入藥今南

艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳

而荷吳中所用乃石香菜也葉至細色黃味辛甚香烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之但有茵陳蒿無山茵陳註云葉似蓬蒿而緊細汴京北地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳治療腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦然少效江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝比見諸議論謂家茵陳亦能解肌下隔去胸中煩方家少醫家用但以功較之則江南者爲勝以經言之則非本草但以物主療自異不得爲山茵陳也此說亦未可據是一研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿少醫用葉有八角者陰乾去根細剉勿令犯火時珍曰凡使須茵陳昔人多時爲蔬故入藥用山茵陳所以別家曰陳之絲也是也洪舜俞老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醯苗青家曰陳陳也二月二日猶采野茵陳

和粉麪作茵陳餅食之後人各據方士所傳遂致
消亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色
青蒿而背白葉歧緊細而扁整九月開細花黃色
結實大如艾子花實並與菴蘭花實相似亦有無
花實者

莖葉氣味苦平微寒無毒

普曰神農岐伯雷公苦無毒黃帝辛無毒權曰

苦辛有小毒天明曰石茵陳苦涼無毒伏硝砂張元素曰苦甘陰中微陽入足太陽經

主治風溼寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐

老面白悅長年白兔食之仙

本經

治通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕

別錄

通關節去滯熱傷寒用之

藏器

石茵陳治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘡

瘧女人癥瘕并閃損乏絕

大明

發明

宏景曰仙經曰白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤耳

宗奭曰張仲景治傷寒熱

汗不徹有留熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食

甚發黃

身面悉黃者用之極效一僧因傷寒後發

治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之

一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳

山梔子各三分

秦艽升麻各四錢爲散每用三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知爲度此藥以

山茵陳爲本故書之

王好古曰張仲景茵陳卮子則溼黃苗旱則燥黃溼則瀉之燥則潤之可也

二藥治陽黃也

韓祗和李思訓治陰黃用茵陳附

子湯大抵以茵陳爲君主而佐

以大黃

附子各隨其寒熱也

附方

舊二茵陳羹除大熱黃疸傷寒頭痛風熱獐利小便以茵陳細切煮羹食

之生食亦宜

食醫心鏡

遍身風癢

生瘡疥用

茵陳糞濃汁

癰

瘍風病

茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以

阜莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日一

洗不然恐痛也

崔行功纂要

洗不然恐痛也

風疾攀急

茵陳蒿一斤糙米一石

翹三斤和勻如常法釀

酒服之

聖濟總錄

癰黃如金

好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等

分水二鍾煎服日二服

三

十六黃方遍身黃疸

茵陳蒿一把同生薑一塊搗

於胸前四肢日日擦之

男子

酒疸

用茵陳蒿四根厄子七箇大田螺一箇連殼

擣爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之秘方也

也

眼熱赤腫

山茵陳車前子等分煎湯細茶調散服數服

直指方

青蒿

本經下品

釋名草蒿

本經方潰本

敵音牽去聲

狄蒿本

香蒿衍義保

昇曰草

蒿江東人呼爲狹蒿爲其氣臭似狹也北人呼爲
青蒿爾雅云蒿藾也孫炎注云荆楚之間謂蒿爲
藾郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者爲藾是也
時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨藾
得單稱爲蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶

集解

別錄曰青蒿生華陰川澤宏景曰處處有之

醋淹爲菹自然香葉似茵陳蒿而背不白高四尺
許四月五月采日乾入藥詩云呦呦鹿鳴食野之
蒿卽此蒿也頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏
高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米
大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作
飲香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人剔以爲蔬根
種赤葉香沈括夢溪筆談云青蒿一類自有二種一
西銀綬之一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝
人謂之香蒿莖葉與常蒿同一兩窠迥然青色者土
人謂之香蒿叢中時有一同但常蒿色淡青此

蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白硬七八月閒開細黃花頗香結實大如麻子中有細子

修治

數日凡使惟中爲妙到膝卽仰到腰卽俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成

病疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出曬乾

葉莖根子氣味苦寒無毒

時珍曰伏硫黃

主治

疥癬癩瘻惡瘡殺蟲治留熱在骨節閒明目

本經鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢

秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾爲末小便

入酒和服藏器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮

器

令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生擣汁服

并貼之

大治瘧疾寒熱時

珍

生擣傅金瘡止血止疼

良

蘇恭

燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡癩肉癰癧

孟詵

發明

頌曰

青蒿治骨蒸熱勞爲最古方單用之

時

證

皆

少陽厥陰血分之病也

按月令通纂言

伏內

庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾爲末冬

至元旦各服二錢亦良觀此則青

蒿之治鬼疰伏尸蓋亦有所伏也

附方

舊十四

男婦勞瘦

青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去

虛勞寒熱

二十丸 斗門方

虛勞寒熱

及入器中煎成膏丸如梧子大每空心
肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去
枝梗以童子小便浸三日曬乾爲末每服二錢烏

梅一箇煎湯

靈苑方

骨蒸鬼氣

童子小便五大斗澄清青

最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去

滓漑

金令淨再以微火煎可二大斗入豬膽十枚

同煎一大斗半去火待冷以甕器盛之每欲服時

取甘草二三兩炙熟爲末以煎和搗千杵爲丸空

腹粥飲下二十丸漸加至三

崔元亮海上方

骨蒸煩熱

青蒿一握

十丸止

崔元亮海上方

骨蒸煩熱

青蒿一握

一枚杏仁四十箇去皮尖炒

以童子小便良方

虛勞盜汗

冬末各一兩熬至可丸

丸如梧子大每食後米飲

服二十丸名青蒿

瘧疾寒熱

肘後方用青蒿一握

丸服

聖濟總錄

二升擣汁服之○

存仁方用五月五日天未明時采青蒿陰乾四兩桂心一兩爲末未發前酒服二錢○經驗方用端

午日采青蒿葉陰乾桂心等分爲末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物

溫瘧痰甚

但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半兩爲末每服二錢白湯調下

存仁赤白痢下

五月五日采青蒿艾葉等分同豆豉搗作餅日乾名蒿豉丹每用一

餅以水一盞半煎

鼻中衄血

青蒿搗汁服之并塞鼻中極驗

簡服聖濟總錄

酒痔便血

青蒿用葉不用莖用莖不用葉爲末

方金瘡撲損

肘後方用青蒿搗封之血止則愈

日擣和曬乾臨時爲末搽之

牙齒腫痛

青蒿一握煎水漱之

人卽安肘後方

耳出濃汁

青蒿末綿裹納耳中

聖惠方鼻中瘻

肉

青蒿灰石
熬膏點之
灰等分淋汁

聖濟總錄

子氣味甘冷無毒主治

明目開閼炒用治勞瘦壯

健人小便浸用之治惡瘡疥癬風癬煎水洗之

大明

治鬼氣爲末酒服方寸匕

孟詭

功同葉

時珍

附方

新積熱眼澀

三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾爲末每井華水空

心服二錢久服明目可夜看

書名青金散

十便良方

看

節閒蟲

見蟲

黃花蒿

綱目

釋名臭蒿

集解

大明

曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶

淡黃氣辛臭不可食人家
采以罨醬黃酒麴者是也

葉氣味辛苦涼無毒主治小兒風寒驚熱時珍

子氣味辛涼無毒主治治勞下氣開胃止盜汗及

邪氣鬼毒大明

白蒿本品

釋名繁

爾雅

由胡

爾雅

蕎蒿

食商

薦蕎

時珍

白蒿

有

艾蒿

通謂

艾蒿

謂其春

之繁以其易繁衍也

曰

繁衍也

曰

繁衍

曰

繁衍

曰

繁衍

曰

繁衍

曰

繁衍

曰

繁衍

謂其春

繁衍

謂其春

辛薰不美

曰

薰不美

謂其春

日繁之醜

秋爲

蒿則通

指水陸二種而言

謂其春

時各有種

至秋老則皆呼爲蒿矣

曰賴

曰蕭

曰蕭

謂其春

象秋氣蕭賴之通名

皆老蒿之通名

秋氣蕭賴之通名

皆老蒿之通名

秋氣蕭賴之通名

皆老蒿之通名

秋氣蕭賴之通名

秋氣蕭賴之通名

皆老蒿之通名

集解

別錄曰

白蒿生中山川澤二月采

宏景曰

蒿

生中山川澤二月采

宏景曰

蒿

生中山川澤二月采

宏景曰

用皆無復識之

恭曰爾雅燔蒿卽白蒿也所在有

之葉頗似細艾

上有白毛錯澀粗

于青蒿從初生

以豆薦繁菹也

陸機詩疏云

凡艾白色爲燔今白

至秋白于眾蒿禹錫曰蓬蒿可以爲茹故詩箋云

以豆薦繁菹也

陸機詩疏云

凡艾白色爲燔今白

蒿先諸草發生香美可食生蒸皆宜

頌曰此草古

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

蕷蒿先諸草發生香美可食生蒸皆宜

頌曰此草古

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

人以爲菹今人但食蕷蒿不復食此或疑白蒿卽

蕷蒿而孟說食療又別著蕷蒿條所說不同明是

二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿爲

茵陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也時珍

曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水

陸二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美爾詩云呦

鹿鳴食野之草草卽陸生燔蒿俗呼艾蒿是矣

于沼于沚左傳云蘋蘩蘊藻之菜可以薦于鬼神

于王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之爲

差于于沼于沚左傳云蘋蘩蘊藻之菜可以薦于鬼神

于王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之爲

差于于沼于沚左傳云蘋蘩蘊藻之菜可以薦于鬼神

于王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之爲

差于于沼于沚左傳云蘋蘩蘊藻之菜可以薦于鬼神

于王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之爲

差于于沼于沚左傳云蘋蘩蘊藻之菜可以薦于鬼神

于王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之爲

差于于沼于沚左傳云蘋蘩蘊藻之菜可以薦于鬼神

萋蒿

無疑矣

鄭樵通志謂萃爲萋蒿

非矣鹿乃山

獸乃水蒿

陸機詩疏謂萃爲牛尾蒿

亦非矣牛

澤中二月發苗葉似嫩艾而歧細面青

背白其莖

或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食

蓋嘉蔬也景差大招云吳酸蒿蔓不沾薄謂吳人

善調酸淪

萋蒿爲齏不沾不

薄而甘美此正指水生者也

苗根

氣味

甘平無毒

思邈曰辛平時珍曰發瘡疥

主

治

五臟邪氣風寒溼痹補中益氣長毛髮令黑

療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老

本經生

授醋淹爲菹食甚益人擣汁服去熱黃及心痛曝爲末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁

煎治淋瀝疾孟詵利膈開胃殺河豚魚毒時珍

發明

宏景曰服食家七禽散云白免食白蒿仙與
菴蘭同法耳時珍曰本經列白蒿於上品有

功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與

附方

舊一惡瘡癩疾但是惡疾遍體面目有瘡者皆可服之用白艾蒿十束如升大

煮取汁以麴及米一如釀酒

法候熟稍服之

深師方

子氣味

缺

主治鬼氣爲末酒服之良孟詵

角蒿

唐本

集解

恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月采保昇曰葉

似蛇牀青蒿子角似蔓菁實黑而細秋熟所在皆有之宗奭曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三

四分花罷結角長二寸許微彎數日凡使勿用紅
蒿并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采
得于槐砧上細剉用之

氣味辛苦有小毒主治乾溼癰諸惡瘡有蟲者本
治口齒瘡絕勝

唐宗奭

附方

舊二
新一

齒齦宣露

多是疳也角蒿燒灰夜塗上切忌油膩沙糖乾棗外臺

秘要

口瘡不瘥

入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿效千金

方

月蝕耳瘡

良用蒿灰摻之

蘆蒿

拾遺

釋名

莪蒿

爾蘿蒿同

抱娘蒿

時珍曰

陸農師云

蘆蒿

雅言之爲言高也

莪亦峩

之爲言高也

也
之
集解

芥科高也可
蘿抱根叢生故曰抱娘

謂

時珍曰
爾雅云
云
詩小雅云
云
陸機
注云卽
蒿也
生澤國漸洳處葉似
邪蒿而細
科
三月生莖
葉可食又可蒸香美頗似
蕷蒿但味帶
麻不似
蕷
蒿香甘

氣味辛溫無毒主治破血下氣煮食之

藏器

馬先蒿

本經中品

釋名馬新蒿

唐本草

馬矢蒿

本經練石草

別錄

爛石草

上同虎

麻

時珍曰
蒿氣如馬矢故名

乃馬矢字訛也

宏景曰練石草一名爛石

草卽馬矢蒿今

不復用之

方藥卽馬矢蒿今

草

卽藥不復用

之

附方

舊

大瘋癩疾

骨肉疽敗眉鬚墮落身體癢痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛石草炒搗末每服方寸匕食前溫酒

石草炒搗末每服方寸匕食前溫酒

下一日三服

一年都瘥

肘後方

陰地厥

宋經圖

集解

頌曰

生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根

用時珍曰江浙亦有之

外家采制丹砂硫黃

根苗

氣味甘苦微寒無毒

主治腫毒風熱

頌蘇

附方

新

男婦吐血

後胸膈虛熱陰地厥紫河車貫眾甘草各半兩每服三錢水煎

牡蒿

下別品

濟總錄聖

釋名齊頭蒿

時珍曰爾雅蔚牡藾蒿之無子者則牡之名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉則

獨多而秃故有齊頭之名

集解

別錄曰牡蒿生田野五月八月采藥不復用

宏景曰方澤恭曰齊頭蒿也所在有之葉似防

風細薄而無光葉扁而本狹末多有禿歧嫩可茹鹿食九草此其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見故人以爲無子也

苗氣味

苦微甘溫無毒主治充肌膚益氣令人暴

肥不可久服血脈滿盛

別錄擂汁服治陰腫

附方

新瘡疾寒熱

齊頭蒿根滴滴金根各一把擂生酒一鍾未發前服以滓傅寸口

止男左女右二日海上名方

九牛草

宋圖

集解

頌曰生筠州山岡上二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月采苗用時珍曰陳嘉謨本草蒙筌以此爲蘄艾謬矣

苗氣味微苦有小毒

主治解風勞治身體痛與甘草同煎服不入眾藥用

蘇頌

茺蔚

本經上品

釋名

益母

本經

益明

本經

貞蔚

別錄

蕘

爾雅音推

野天麻

會編

豬

麻

綱目

火欵

本經

鬱臭草

圖經

苦低草

圖經

夏枯草

外臺

土質

汗

綱目

時珍曰

此草及子皆茺盛密蔚故名茺蔚

其功宜于婦人及明目益精故有益母之稱其

莖方類麻故謂之野天麻俗呼爲豬麻喜食之
質汗林億云質汗出西番乃熱血合諸藥煎成治
金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名爲土質汗
也禹錫曰爾雅荊蕎注云今茺蔚也又名益母劉
歆云荊蕎臭穢也臭穢卽茺蔚也陸機云荊蕎益母也

故曾子見

之感思

集解

別錄曰茺蔚生海濱池澤五月采

宏景曰今

處處有之葉如荏方莖子形細長有三稜

頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云

葉似荏方莖白華生節間節生花實似雞冠

云莖作四方棱五月采又云九月采實醫方

稀有黑色莖作四方棱五月采又云九月采實醫方

宗奭曰茺蔚初春生時亦可浸洗淘

水去苦用者宗奭曰茺蔚初春生時亦可浸洗淘

凌冬不凋悴也時珍曰茺蔚近莖

方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有莖

莖近莖

尖歧寸許一節節生穗叢簇抱莖四五

月開穗

用葉似荏方莖子形細長有三稜

頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云

葉似荏方莖白華生節間節生花實似雞冠

云莖作四方棱五月采又云九月采實醫方

稀有黑色莖作四方棱五月采又云九月采實醫方

宗奭曰茺蔚初春生時亦可浸洗淘

水去苦用者宗奭曰茺蔚初春生時亦可浸洗淘

凌冬不凋悴也時珍曰茺蔚近莖

方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有莖

莖近莖

尖歧寸許一節節生穗叢簇抱莖四五

月開穗

牛而母是物尾金鞭云丹閣者也九白巨四內
蘚銳葉矣二花方草茺註事能此月色勝粒開
據有似又種此云節蔚云宜入草采蘇子粒小
此穗桂按凡皆天節生紫云氣有實頌貨大花
則穗白郭物似麻牛田花自分白寇圖之如紅
是閒華璞花以草紫野者花紅花夷謂草蒿子亦
有華爾皆茺莖花閒爲能花衍其生時有三棱褐色者每萼內有
蘚花生雅有蔚如花人益爲能花衍義葉似桂其子黑色似雞冠子根
名紫節註赤天火中呼母益入二義謂其凌冬不凋者皆誤傳
本縹閒云白麻麻有爲白母紫花者不爲用之可也接
相色又蘚如爲冬子如草青天麻生陳藏器本返菟
同可云蘚推丹芍蓋夏苦子孫平澤器本返菟
但以音卽茺藥菊花不知其花思邈似馬草菟
以爲音推茺蔚方莖葉又名益類一鼠千馬草菟
色分東呼爲

其爲一物無疑矣宋人重脩本草以天麻草誤註
天麻尤爲謬矣陳藏器本草又有鑿菜云生江南
即蕪蔚之白花者故其功主血病亦相同

子

脩治

時

珍曰

凡用微炒香亦或蒸熟

氣味

辛甘微溫無毒

別錄曰

甘微寒

時珍

主治

明目益精除水氣久服輕身

本

療血逆大熱

頭痛心煩

別錄曰

甘辛溫灰制硫黃

血脈填精髓止渴潤肺

大春

仁生食補中益氣通

肝益心安冤定鬼調女人經脈崩中帶下產後胎

前諸病久服令人有子

時

珍曰

發明

卷之三

茺蔚子活血行氣有補陰之功

胎之功故名
前無羣

發明農亨曰茺蔚子活血行氣有補陰之功故名產後無虛以其行中有補也時珍曰茺蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入血氣分紫花者入血分治婦女經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人諸病溫東垣李氏言瞳子散大者禁用茺蔚子爲其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能捷瞳子散大血不足也故禁之非助火也血滯病故目則明宜之

三

葉大根明

同日
功苗

氣味

古漢

味曰寒時

甘珍
根曰

味莖
甘葉

音
樂

微毒

黃鏡

卷之二

砒石硫

主治

卷之三

彫可作浴

湯本

擣汁

卷之三

王浮

腫下水消惡毒疔腫乳癰丹遊等毒併傅之又服
汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾

耳擣傅蛇虺毒

蘇恭

入面藥令人光澤治粉刺

藏器

活

血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血

風血痛崩中漏下尿血瀉血疳瘡痔疾打撲內損

瘀血大便小便不通

時珍

發明

時珍曰同用

若

治手足厥陰血分

風熱明目益精調

人經脈則單用

茺蔚子爲良

若治腫毒瘡瘍消

婦人胎產諸病則宜並用爲良

蓋其根莖

行中有補故也

本草綱目草部

卷五 蔊蔚

附
方

新舊
七十

濟陰返兎丹

晉殷產寶曰此方乃吉安文江高師禹備禮求

鹽橫破一安或七藥其器正處四又前于湯生血丸下作十不恨碾開皆面名產下不痛能血聲丸限燒爲時有四負諸疾所得。順養安不者又丸存細連白五擔諸疾危者其效神產死脈魂止米可數性末根花者不但是于節開花紅紫色如蓼花南北隨後胎息定當飲搗病愈爲度或丸散不相上下的藥也。胎前產後膏服之梧子大每服五錢。胎前臍刺痛胎動動下不痛口渴煩悶並用炒米下能化及鬼

竹刀切長五寸勿用鐵刀置于大鍋中以水浸過

二三寸煎煮候草爛水減

三之二濾去草取汁約

五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入

釜中慢火煎取一斗如稀鴟狀瓷瓶封收每取梨

大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行卽更

煉至可丸收之服至七日則疼漸平復也產婦惡

忌露不盡及血運一二服便瘥其藥無

乾者一大握水七合煎減半頓服立止無新者以

草搗汁七合大合煎減半頓服立止無新者以

韋宙獨行方

欲絕益母草研汁服

一盞絕益母草研汁服

聖惠方帶下赤白

此蘇澄方也

小便尿血益母草搗汁服

外臺秘要赤白雜痢困

溫服

益母草搗汁服

益母草搗汁服

二錢食前溫湯下

腹中益母草搗熟以暖水少許和絞

韋宙獨行方

取汁頓服之

韋宙獨行方

益母草研汁服

益母草研汁服

益母草研汁服

一小盞入酒一合

產後血閉不下者益母草汁

一小盞入酒一合

產後血運心

氣

溫服

益母草花開時采搗爲末每服

集驗方

者益母草日乾陳鹽燒存性等分爲末每服三錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯下名二靈散

方家寶小兒疳痢垂死者益母草嫩葉同米羹粥食之取足以瘥爲度甚佳飲汁亦可食

生靈散

濟方廣痔疾下血益母草葉搗汁飲

一切癰瘡

婦人

乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用天麻草切五升以水一斗半煮一斗分數次洗

之

以殺瘻急慢疔瘡聖惠方用益母草搗封之仍絞

之

母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃

之

開疔根令血出次遶根開破捻出血拭乾以稻

之

心蘸藥擦入瘡口令到底良久當有紫血出捻

之

血淨再擦藥入見紅血乃止一日夜擦藥三五

度令草割

重者二日根爛出輕者一日出有瘡根脹起卽

是度

根出以鍼挑之出後仍傅藥生肌易愈忌風寒房

切室酒肉一癰毒已破妙

益母草搗傅甚勒乳成癰

母益

本草綱目草部

卷十五

茺蔚

方家寶

方

一切癰瘡

婦人

爲末水調塗乳

上一宿自

喉閉腫痛

益母草搣爛

新汲水一盃

瘥生擣亦得

聖惠方

耳出汁

茺蔚莖葉汁

滴

粉刺黑斑

閨閣事

宜五月五日收

帶根

野天麻紫

藥甚能潤肌

蘇頌曰唐天后鍊益母草澤面法

半年方用入面加

五

月五日采根苗

具者勿令著土暴乾

仍作一爐四旁開竅上

大火留小

和成團如雞子

大再暴乾

搗羅以麪水

下置火安藥中央

火養之勿令火絕

經一伏時出之

之器中研治篩

再研三日收用

如潔豆法日用

一馬咬成瘡

苦低

草切

細和醋炒塗之

孫真人方

益母草五兩

煎水浴之

要濟眾

集解

藏器曰
甄菜生江南陰地似益母方莖對節

時珍曰此卽益母之白花者乃爾雅所謂蕡是也

謂蕡是也其紫花者爾雅所謂蕡是也蕡蕡皆同

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

謂

無風獨搖則吳風亦當作無風乃通藏器
曰一名無心草非草之無心者方藥少用

集解

別錄曰薇銜生漢中川澤及冤句邯鄲七月采莖葉陰乾恭曰此草叢生似茺蔚及白頭翁其葉有毛赤莖又有大小二種楚人謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草保昇曰葉似茺蔚叢生有毛其花黃

色其根赤黑色

莖葉氣味苦平無毒

別錄曰微寒之才曰得秦皮良

主治風溼痹

歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫本經暴癥逐

水療瘻久服輕身明目

別錄

婦人服之絕產無子

藏器煎水洗漂疽甲疽惡瘡

時珍出外科精義

發明

時珍曰麋銜乃素問所用治風病自汗藥而後世不知用之誠缺略也素問黃帝曰有病

身熱解憇汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名酒風治之以澤瀉朮各三五分麋銜五分合以三指撮爲後飯者先服藥也

附方

新年深惡瘡

無心草根釣苓根狼毒白丁香各五錢麝香一字爲末摻之。

又一方

無心草根乾薑各二錢釣苓根三錢爲末摻之

並外科精義

小兒破傷風病

拘急

口噤沒心草半兩

白附子炮二錢半爲末

每服一字薄荷酒灌下

聖濟錄

附錄無心草

宋圖經頌曰生秦州及商州鳳翔各縣皆出之

三月開花五月結實六七月

主積血逐氣塊益筋

一名麋銜

月采根苗陰乾用性溫無毒

主積血逐氣塊益筋

主積血逐氣塊益筋

一名麋銜

一名麋銜

節補虛損潤顏色療澼洩腹痛時珍曰麋銜

一名麋銜

一名麋銜

一名麋銜

同不

夏枯草

本經下品

釋名夕句

本經

乃東

本經

燕面

別錄

鐵色草

震亨曰

此草

夏至後卽枯

蓋稟純陽之氣得陰氣則枯故有是名

集解

別錄

曰夏枯草

生蜀郡川谷四月采

叢曰處

澤冬至後生葉似旋覆

三月四

五月五

月

便枯四月采

穂

花作穗

紫白色似丹參花

結子亦作穗

五月

六月

許其莖微方葉對節生

似旋覆葉而長大有細齒

一二尺

穗長一寸穗中開淡紫小花

一穗有多紋莖端作穗

葉對節生似旋覆葉而長大有細齒

高一二尺

穗長一寸穗中開淡紫小花

大有細齒

一二尺

穗中開淡紫小花

大有細齒

正誤

宗奭曰

今謂之臭鬱

自秋便生

經冬不悴春

夏結子

震亨曰

臭鬱草有臭味卽茺蔚

味明是兩物俱生於

蔚是也夏枯草無臭味

先枯而無子

夏枯草無臭味

震亨曰

臭鬱草有臭味卽茺蔚

後枯而結子

於

莖葉氣味苦辛寒無毒

之才曰土瓜爲

主治寒熱

瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癰結氣腳腫溼痹輕身

發明

震亨曰本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有

虛者可使若實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取效時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疼用善沙糖水浸一夜用取其能解內熱緩肝火也娶全寒藥點之反甚者亦神效蓋目珠連目本肝系也屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒亦神陰故也夏枯稟純陽之氣補厥陰血脈故治此如頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效灸厥神以陽治陰也一男子至夜目珠疼連眉稜骨及附二兩甘草四錢爲末又作月餘以夏枯草二兩香調服下咽則疼減半至四五服一錢半清茶良愈矣

附方

舊一
新六

明目補肝

肝虛目睛痛冷淚不止血脈
痛羞明怕日夏枯草半兩香

附子一兩爲末

每服一錢

茶湯調下

簡要濟眾

赤白帶下

夏枯草花開時采陰乾爲末

附子末每服二錢米飲下

徐氏家傳方

血崩不止

夏枯草爲末

方寸七米飲調下

聖惠方

產後血運心氣欲絕者

夏枯草一盞大妙

徐氏家傳方

撲傷

金瘡

夏枯草口嚼爛置上卽愈衛生易簡

汗斑白點

夏枯草煎濃汁日日洗之

坤生瘍癰馬刀

不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫

乾

服虛甚者則煎汁熬膏服并塗患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治瘍癰

之聖藥甚多

薛己外科經驗方

劉寄奴草

唐本草

釋名金寄奴

大烏藤菜

綱目

史云時珍曰按李延壽南

宋高祖劉裕小字寄南

時

劉裕

中搗藥

於榛林

日往聞杵

白寄南

而細根淡紫色似萬

通

本草圖目草部

卷十五 劉寄奴草

大蛇射

之明

遇一

大蛇

射

於榛林

中搗藥

問其

神皆

其

童子

皆

青衣

於榛林

中搗藥

問其</p

用時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蒼朮尖長糙澀
面深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十朵小
花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦蕡花
之絮其子細長亦如苦蕡子所云實如黍稗者似
與此不同其葉亦非蒿類

子苗同脩治

數日凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從巳至申暴乾用時

珍曰莖葉花子皆可用

氣味苦溫無毒主治破血下脹多服令人下痢

蘇恭

下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效

別錄心腹痛

下氣水腫血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉大

明

小兒尿血新者研末服

時珍

附方

舊一

大小便血

劉寄奴爲末茶調空心折傷服二錢卽止

集簡方

兩水

瘀血

在腹內者

劉寄奴骨碎補延胡索各

集簡方

頓溫

服之

千金方

血氣脹滿

劉寄奴穗實爲末每服三錢酒

煎服不可過多令人吐利此破

血之仙藥也

劉寄奴草煎汁

湯火傷灼

燒

衛生易簡方

劉寄奴搗末先以糯米漿雞

翎掃上後乃摻末並

不痛亦無痕大驗之方凡

湯火傷先以鹽末摻之

並護肉不壞後乃摻

風入瘡口腫痛劉寄奴爲末摻

本事方

聖濟總錄

霍亂成痢

劉寄奴草煎汁

聖濟總錄

湯火傷灼

燒

藥爲妙

劉寄奴搗末

先以糯米漿雞

翎掃上後乃摻末並

不痛亦無痕大驗之方凡

湯火傷先以鹽末摻之

並護肉不壞後乃摻

風入瘡口腫痛劉寄奴爲末摻

小兒夜啼

劉寄奴半兩地龍炒

一分甘草

聖濟總錄

赤白下

痢

陰陽交帶

一寸水煎灌少許

劉寄奴烏梅白薑等分

艾元英如宜方

宋圖經

曲節草

宋圖經

釋名

六月凌

六月霜

綱目綠豆青

蛇藍

時珍

草性寒故有凌
霜綠豆之名

集解

頌曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有葉似劉寄奴而青軟七八月著花似薄荷

結子無用五月六月采莖葉陰乾

莖葉氣味甘平無毒主治發背瘡消癰腫拔毒同

甘草作末米汁調服

蘇頌

麗春草

宋圖經

釋名

仙女蒿

圖經

定參草

頌曰

麗春草

生檀嶠山

在高密界河南川

淮陽郡穎川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河

北近山鄴郡汲郡並名叢蘭艾上黨紫團山亦有

名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療瘻黃人
莫能知時珍曰此草有殊功而不著其形狀今墨
粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪

花及根氣味甘微溫無毒主治瘻黃黃疸

蘇頌

發明

頌曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用

黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭
氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸
等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每
平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服日一
服隔五日再進以知爲度其根療黃疸搗汁一盞
空腹頓服須臾卽利三兩行其疾立已一劑不能
全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪豬魚蒜粉酪等

旋覆花

本品

釋名金沸草

本經

金錢花

本目

滴滴金

綱目

盜庚

爾雅

夏菊

綱戴椹

別錄宗奭曰

花緣繁茂圓而覆下故曰旋

日

覆時珍曰

諸名皆因花狀而命也

爾雅云

蕩盜庚也

蓋庚者金也謂其夏開黃花盜竊金氣

也

酉陽雜俎云金錢花

一名昆尸沙自梁武帝時

始進入中國

集解

別錄曰

旋覆生平澤川谷

五月采花日乾二

十日成弘景曰

出近道下溼地似菊花而大

別有旋

蓄根出河南

北國亦有形似

芎藭惟合旋

蓄膏用之餘無所用

非此旋覆花根也保昇曰葉

似水蘇黃花如菊

六月至九月采花頌曰今所在

皆有二月

以後生苗多近水

旁大似紅藍而無刺

銅錢大深黃色

上黨田野人呼爲

金錢花七八月

易繁盛恐卽旋

覆也宗奭曰

旋覆葉如大菊又如

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

大菊並同極

艾蒿
別有旋花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰
狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花
大蕊簇蓋壞瘠使然其根細白俗傳露水滴下卽
生故易繁蓋亦不然

花脩治

數子曰采得花去蕊并殼皮及

氣味鹹溫有小毒

別錄曰甘微温冷利權曰甘無
毒大明日無毒宗奭曰苦甘辛

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟閒寒熱補中

下氣

本經消胸上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留

飲風氣溼痹皮閒死肉目中眵曠利大腸通血脈

益色澤

別錄主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食
甄權

行痰水去頭目風

宗消堅軟痞治噫氣

古

發明

頌曰張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物

旋覆

湯胡治居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花

丸用

之尤多成無己曰鞭則氣堅旋覆之鹹以軟

走堅也

震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦

之時珍曰

旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所

治諸病其功只在行水下氣通血脈爾

李衛公言

嗅其花能損目唐慎微本草誤以

旋花根方收附此下今改正之

附方

舊一新三丸

中風壅滯

旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧

七丸十丸

經驗方半產漏下虛寒相搏其脈弦芤旋覆花

子大夜臥以茶湯下五丸至

新絳少許

金匱要略水三升煮

旋覆花三兩葱十四莖

旋覆花燒研羊

升頓服

集羊脂和塗之

研羊集

月蝕耳瘡

旋覆花燒研羊脂和塗之

方 分爲末洗淨以油調塗之

總微論

葉主治傅金瘡止血大治疔瘡腫毒時

根主治風溼別錄急續斷筋

取根洗淨擣傅創上日一二易瘥止外臺方

青葙

本經下品

釋名

草蒿

本經

蕓蒿

本經

崑崙草

唐本草

野雞冠

綱目

雞冠覓

綱目

子名草決明

本經

時珍曰

青葙名義未詳

胡麻葉亦名青蕓此草又多生于胡麻地中與之同名豈以其相似而然耶

青蒿亦名草

其功相似而名亦相同何哉其子明目與決明子同功故有草決明之名其花葉似雞冠嫩苗似

草冠覓鄭樵通志言俗名牛尾蒿者誤

大草圖目錄部 卷二十一 青葙 附陶朱術

集解

別錄曰青葙生平谷道旁五月采莖葉陰乾

其子甚細別有草蒿或作草藁主療殊相類又相似可疑而實兩種也

恭曰此草苗高尺餘形似麥柵花乾

細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而尖

今江淮州郡近道亦有之二月生青苗長至四

葉潤似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生

直下紅下白子黑光而扁似莧根亦似蒿根而長至四

野雞冠花一樣無別但雞冠花穗或有大爾扁或圓

朱術與陳藏器所說不同又有天靈草亦此類也陶一紅圃與田白花

並於下附

明大

子氣味苦微寒無毒

權曰苦平

主治唇口青

本經

治五臟

邪氣益腦髓鎮肝明耳目堅筋骨去風寒溼痹

明權

治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡

甄權

發明

炳曰不言理眼有青葙子丸

宗奭曰青葙子經目

今人多用治眼殊與經意不相當

時珍曰

青葙子經雖不言治眼而云

治眼與決明子莧實同功本經雖不言

治眼而云

一名草決明主唇口青則其明目之功可知矣目

者肝之竅唇口青者足厥陰經之證古方除熱亦

多用之青葙子之爲厥陰藥又可知矣况用之治

目往往有驗尤可徵據魏略云初平中有青牛先

百餘歲常服青葙子丸年

六十者

附方

舊一

鼻衄不止

眩冒欲死青葙子汁三合灌入鼻中

貞元廣利方

雞冠

宋嘉祐

釋名

時珍曰以花狀命名

集解

時珍曰雞冠處處有之三月生苗入夏高者五六尺

者纔數寸其葉青柔頗似白莧菜而窄梢有赤脈其莖赤色或圓或扁有筋起六七

月梢閒開花有紅白黃三色其穗圓長而尖者儼如青葙之穗扁卷而平者儼如雄雞之冠花大有

圍一二尺者層層卷出可愛子在穗中黑細光滑與莧實一樣其穗如秕麥

狀花最耐久霜後始焦

苗

氣味甘涼無毒主治瘡痔及血病

時珍

子

氣味甘涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢

藏器崩

中帶下入藥炒用

大明

花氣味

同上

主治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶

下分赤白用

珍時

附方

新十

吐血不止

白雞冠

花醋

浸煮七次爲末

二錢熱酒

下經驗方

結

陰便血

雞冠花椿根白皮等分爲末

煉蜜丸梧子大每服三十丸黃芪湯

下日二服

聖濟

總錄糞後下血

白雞冠花并子

炒煎服聖惠方

五痔肛腫久不愈變

成瘻瘍用

聖濟

雞冠花鳳眼草各一

兩水

下血脫肛

白雞冠花

防風等分

爲末糊丸梧子

大空心米飲

每服七十丸

一方白

鷄冠花炒櫻榔灰羌活一

兩爲末

每服二錢米飲

一兩爲末

每服二錢米飲

一味曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

紅雞冠花

一味酒調下

忌魚腥豬肉

一

味

曬乾爲末

每服二

孫

二

類方

永經水不止

氏集效方

產後血痛

白雞冠花酒煎服

婦人白帶

白雞冠花

曬乾爲末

每旦空心酒服三錢

赤帶用紅者

孫氏集效方

白帶沙淋

白雞冠花苦壺

蘆等分燒

存性火酒服之

摘玄空

赤白下痢

雞冠花酒服赤用

紅藍花

宋開寶

釋名

紅花

開寶

頗似藍故有藍名

集解

志曰紅藍花卽紅花也生梁漢及西域博物

今處處有之人家場圃所種冬月布子于熟地至

春生苗夏乃有花花下作棣彙多刺花出棣上圃

人乘露采之采已復出至盡而罷棣中結實白顆

如小豆大其花暴乾以染真紅又作胭脂時珍曰

紅花二月八月十二月皆可以下種雨後布子如

種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五

白雞冠花酒煎服

婦人白帶

白雞冠花苦壺

月開花如大薊花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿曬乾或捏成薄餅陰乾收之入藥搓碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可爲車脂及燭

花氣味辛溫無毒

元素曰入心養血謂其苦溫陰中之陽故入心佐當歸生新血

好古曰辛而甘苦溫肝經血分藥也入酒良

主治產後血運口噤腹內

惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒

開寶

多用破留血少用養血

震亨

活血潤燥止痛散腫通

經時

發明

時珍曰血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水

多病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶於窗格之下昇婦寢其上熏之湯冷再加有頃指動半日乃蘇按此亦得唐許允宗以黃芪湯熏柳太后風病之法也

附方

舊五新三

六十二種風

張仲景治六十二種風兼腹內血氣痛用紅花一大升煎鍾半

兩分

爲四分以酒一大升煎鍾半

經本草

一切腫疾

紅花酒熟搗

頓服之不

止再服外臺秘要

喉痹壅塞

不通者紅藍花搗絞

取汁一小升

服之以

便瘥爲度

如冬月無生花以乾者

浸溼絞

廣利方

熱病胎死

紅花酒煮汁飲

浸溼絞

汁煎服極驗

如

冬

月無生花

以乾者

熊二三盞

爲末分作二服酒二盞煎

同上

胎衣不下

楊氏產乳

心悶氣絕紅花

如

一兩爲末分作二服酒二盞煎

口噤幹開灌之或入小便尤妙

子母錄

如

耳

如

出水

紅藍花三錢半枯礬五錢爲末以綿杖繳淨

吹之無花則用枝葉一方去礬

聖惠方

端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭

噎膈拒食

瓜子樣者等分爲末無灰酒一盞隔湯

頓熱徐嚥初服二分次日四

分三日五分

楊起簡便方

子主治天行瘡痘水吞數顆

開寶

功與花同

蘇頌

附方

舊二新一

血氣刺痛

紅藍子

一升搗碎以無灰酒

一大升拌子暴乾重搗篩蜜

各

半錢

丸梧子

大空心酒下

瘡疽不出

紅花子

紫草茸各

半兩蟬蛻

二錢半

四十丸

張仲景方

瘡疽不出

紅花子

紫草茸各

半兩蟬蛻

二錢半

水酒鍾半

煎減半量大小

女子中風

血熱煩渴以

紅藍子

五合

加減服

龐安常傷寒論

女子中風

血熱煩渴以

紅藍子

五合

熬搗旦日取半大匙以水一升煎取

七合去渣細細嚥之

貞元廣利方

苗主治

生搗塗遊腫

開寶

番紅花

目綱

釋名泊夫藍

目綱

撒法卽

集解

時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國卽彼地紅藍花也元時以入食饌用按張華

博物志言張騫得紅藍花種于西域

則此卽一種或方域地氣稍有異耳

氣味

甘平無毒主治心憂鬱積氣悶不散活血久

服令人心喜又治驚悸

時珍

附方

新

傷寒發狂

驚怖恍惚用撒法卽二分水一盞浸一宿服之天方國人所傳

林王璽醫集要

燕脂

目綱

本草綱目

草部

卷十五

番紅花 燕脂

四

氣味甘平無毒主治小兒聾耳浸汁滴之

開竇活血

解痘毒

時珍

附方

新五

乳頭裂破

燕脂

蛤粉爲末

傅得方

嬰孩鵝口

白

厚

如紙用坏子

燕脂以乳汁

調塗之

一宿效

男用女乳

女用男乳

集簡方

漏瘡腫痛

膽

七箇綿燕脂十箇洗水和

勻搽七次即可

救急方

防痘入目

臘脂嚼汁點

之

集簡方

研末用

痘瘡倒陷

乾燕脂

三錢胡桃燒

存性

一箇研末

用

酒服一錢再服取效

救急方

大薊小薊

別錄

中品

釋名

虎薊

宏景

馬薊

范汪

貓薊

宏景

刺薊

日華

山牛蒡

日華

雞

項草

圖經

千鍼草

圖經

野紅花

綱目

大薊

小薊

是貓薊葉並多

刺相似花如髻也牛蒡因其根似牛蒡根也雞項因其莖似雞之項也千鰐紅花皆其花狀也鄭樵通志謂爾雅之繫曰狗毒者卽此未知是否藏器曰薊門以多薊得名當以北方者爲勝也

集解

別錄曰大薊五月采

恭曰大小薊葉雖相山谷根療癰腫小薊生

平澤不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾宗奭曰大薊高三尺葉皺小薊皆相似花如髻但大薊高一尺許葉雖有微芒不害人爲異作菜雖有微芒不害人爲

大薊根同氣味甘溫無毒

宏景曰有毒權涼曰苦平大明日葉涼

主治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健

別錄

擣根絞汁服半升主崩中血下立瘥

甄權

葉治腸癰

腹臟瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡

疥癬同鹽研置之

大明

小薊根

苗

氣味甘溫無毒

大明

涼

主治養精保血

別錄

破宿血生新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及

蜘蛛蛇蠍毒服之亦佳

藏器

治熱毒風并胸膈煩悶

開胃下食退熱補虛損○苗去煩熱生研汁服

並

明作菜食除風熱夏月熱煩不止擣汁半升服立

瘡

孟說

發明

大明日小薊力微只可退熱不似大薊能健養下氣也恭曰大小薊皆能破血但大薊兼

療癰腫而小薊專

主血不能消腫也

附方

舊五新九心熱吐血口乾用刺薊葉及根搗絞取汁每頓服二小盞聖惠方

舌硬出血

不^止刺薊搗汁和酒服乾者爲末冷水服曾濟方乾

上簡要

卒瀉鮮血小薊葉搗汁溫服梅師方

崩中下血

同大

濟眾要

升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生

薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生

搗汁溫服○又方小薊莖葉洗切研汁一盞入生

地黃汁一盞白朮半兩

煎減半溫服千金方墮胎下血小薊根葉益母草五兩水二大

益煮汁一

益再煎至一盞分服盡

聖濟總錄

金瘡出血

不止小薊苗擣爛塗

之食療

孟詭

小便熱淋

馬薊根搗汁

聖惠方

鼻塞不通

一把小薊

水二升

煮取一升分

外臺秘要

方

小兒浸淫

瘡痛不可忍發寒

熱者刺

薊葉搗汁

調傅

瘡上乾卽易癬

瘡作癩

刺

薊葉搗汁

服

千金方

婦人

之簡要

濟眾方

瘡作癩

之刺

千金方

虎薊根貓

薊根酸

杜衡各

陰癢

小薊煮湯日洗

廣濟方

諸癰不合

虎薊根

棗根枳根

杜衡各

千金方

一把斑蝥

三分炒爲末

蜜丸

棗大

日

疗瘡惡腫

千

鍼

草四兩

乳香一兩明礬五錢爲末

普濟方

酒服二錢

出汗爲度

普濟方

續斷

本品

釋名屬折

本接骨

別錄龍豆

別錄南草

時珍曰續斷屬

接骨

皆以功

命名

集解

別錄曰續斷生常山山谷七月八月采陰乾

七
月
八
月

續
斷
生
蔓
延
葉
細
莖
如
在
大
根
本
黃
白
有
汁

雞
餘
許
腳
者

葉似
蒴
蘽
皮
主
金
瘡
廣
州
又
有
接
骨
樹
高
丈

諸
藤
斷
葉

似
莖
以
器
承
取
汁
飲
療
虛
損
絕
傷
用
藤

長
髮
折
其

枝
但
插
地
卽
生
恐
皆
非
真
李
當
之
云
是
虎
薊
頭
名

俗
用
者

大
乖
枝
葉
似
芝
而
莖
亦
生
恐
皆
非
真
李
當
之
云
是
虎
薊
頭
名

按
四
月
也

頌
曰
今
後
生
陝
西
河
中
興
方
根
如
大
薊
黃
白
色
谷
皆
有
說
有
虎
薊
頭
名

花
於
紫
小
范
汪
爾
方
花

紅
白
色
自
旁
翁
菜
而
相
類
似
益
母
花
根
如
馬
薊
根
與
小
薊
葉
兩
邊
有
葉
大
薊
黃
赤
對
色
而
有
說
有
虎
薊
頭
名

數種少能辨其粗良醫人但以節節斷皮黃皴者爲真數曰凡使勿用草茅根緣眞相似若誤服令人筋軟時珍曰續斷之說不一桐君言是蔓生葉似荏李當之范汪並言是虎薊日華子言是大薊而一名山牛蒡蘇恭蘇頌皆言葉似芻麻根似大薊來皆以大薊爲續斷相承久矣究其實則二蘇所以云似與桐君相符當以爲正今人所用以川中來色赤而瘦折之有烟塵起者爲良焉鄭樵通志謂范汪所說者乃南續斷不知何據蓋以別川續斷耳

根脩治

數曰凡采得根橫切剉之又去向裏硬筋以酒浸一伏時焙乾入藥用

氣味苦微溫無毒

別錄曰辛普曰神農雷公黃帝李當之苦無毒扁鵲辛無毒之才曰地黃爲之使惡雷丸主治傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續

筋骨婦人乳難久服益氣力

本經

婦人崩中漏血金

瘡血內漏止痛生肌肉及跪傷惡血腰痛關節緩

急

別錄

去諸溫毒通宣血脉

甄權

助氣補五勞七傷破

癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前

後一切病胎漏子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精

尿血

大明

發明

時珍曰

宋張叔潛秘書知劔州時其閣下病

血痢一

醫用平胃散

一兩入川續斷末二錢

半

每服二錢水煎服卽愈紹興王子會稽時行病

疾叔潛之子以方傳人往往有驗

小兒痢服之效

根也

斷搗絞汁服卽馬薊

初虞氏古今錄驗

附方

舊二新二

小便淋瀝

生續斷

搗絞汁服卽馬薊

初虞氏古今錄驗

妊

娠胎動

兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杜仲薑

汁炒去絲各二兩爲末棗肉煮爛杵和丸

十丸米飲下

三

血運心悶煩熱厭氣

欲絕心頭硬乍寒乍熱

梧子大每服

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所忌此藥救產後垂死

子母秘錄打

十丸

米飲下

三

產後諸疾

血運心悶煩熱厭氣

欲絕心頭硬乍寒乍熱

梧子大每服

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所忌此藥救產後垂死

子母秘錄打

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所忌此藥救產後垂死

子母秘錄打

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所忌此藥救產後垂死

子母秘錄打

續不斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所忌此藥救產後垂死

子母秘錄打

撲傷損

金之立效

用接骨草葉搗爛

衛生易簡方

續不斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所忌此藥救產後垂死

子母秘錄打

苦芙

音襖

○別

釋名鉤芙蓉

爾苦板

時珍曰凡物穉曰芙蓉此

雅物嫩時可食故以名之

集解

宏景曰苦

芙處處有之

儉人取莖生食之保

身

昇曰所在下溼地有之

莖圓無刺可生噉子

保

若貓

五月采苗暴乾

恭曰今人以爲漏蘆

非也時珍曰爾雅鉤芙蓉卽此苦

芙也芙蓉大如拇指

中空莖頭有薹似薊初生可食許慎說文言江南

人食之

氣今浙東人清明節采其嫩苗食之云

人食之下氣今浙東人清明節采其嫩苗食之云

本草綱目草部

卷十五 苦芙

一年不生瘡癧亦搗汁和米爲食其色清久留不敗造化指南云苦芙蓉大者名苦藉葉如地黃味苦初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實其無花實者名地膽草汁苦如膽也處處溼地有之入爐火家用

苗氣味苦微寒無毒主治面目通身漆瘡燒灰傅之亦可生食別錄燒灰療金瘡極驗宏景治丹毒明大煎湯洗痔甚驗汪穎時珍下氣解熱

漏盧

本經上品

釋名野蘭本經莢蒿蘇恭鬼油麻日華時珍曰屋之西黑色謂之盧此草秋後卽黑異於眾草故有漏盧之稱唐韻作萹其莢如麻故俗呼爲鬼油麻云

集解

本草圖說卷五
近道景別錄
郡似子曰下殺用鹿江言今見後生以近
所白頌花溼蘆苗驪東漏人用皆焚療瘡市
圖蒿曰苗處山北蘇人以根黑長似疥人曰
上花今並最人土云取莖其異似疥人曰
惟黃汴可多以用木其大薊鹿似驪眾麻曰
單白東用六洗滌蘆用筋苦芙蓉謂之俗
州莖郡并月乃勝高四者如之類也
者差若氣及秦味保昇如也根五爲之類也
相筋葉似大海似莖曰茱萸自別上黨者俗
類沂房乾日葉似角高二尺藏器曰佳陶
州類皆牛蒡頭於眾草大有三尺南人云小
者油麻葉而舊說莖大明州有陶人云本也
葉頗似牡諸葉花出宏

丹州者秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一榦海
老翁葉花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州
從當依舊說以單州出者爲勝又本草飛廉一名
漏盧云與苦芙相類其根生則肉白皮黑乾則黑
飛圖如漏盧參七八月采花陰乾用所說與秦州海州所
人吐不不止時珍曰接沈存中筆談云今方家所用
漏盧乃飛廉也飛廉一名漏盧苗似苦芙根如牛
蒡綿頭者是也飛廉秋深枯黑如漆采時用苗乃真漏
油麻高六七尺秋深枯黑如漆采時用苗乃真漏
盧也餘見

根苗脩治

〔教曰〕凡采得漏盧細剉以生甘草相對拌蒸之從巳至申揀出曬乾用

氣味鹹寒無毒

別錄曰大寒藏器曰有毒果曰無毒足陽明本經藥也之才曰連翹

爲之使

主治皮膚熱毒惡瘡疽痔溼痹下乳汁久服輕身

益氣耳目聰明不老延年

本經

止遺溺熱氣瘡癩如

麻豆可作浴湯

別錄

通小腸泄精尿血腸風風赤眼

小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿

補血長肉通經脈

大明

發明

弘景曰此藥久服甚益人而服食方罕見用之近道出者惟療瘻疥耳市人皆取苗用時

珍曰漏盧下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺蟲故東垣以爲手足陽明藥而古方治癰疽發背以漏

盧湯爲首稱也。龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏盧葉云無則以山厄子代之亦取其能入陽明之故也。

附方

舊二新六

腹中蛻蟲

漏盧爲末

以餅臘和方寸匕服之

外臺秘要

小兒

無辜

疳病肚脹或時泄痢

冷熱不調以漏盧一杵爲末每服一錢以豬肝一兩入鹽少許同

艾葉炒四兩

米醋三升入藥末

鹽少許同

煮熟

空心頓食

漏盧一兩

艾葉炒四兩

米醋三升入藥末

鹽少許同

鹽少許同

鹽少許同

冷勞泄痢

漏盧爲末

米醋三升入藥末

鹽少許同

鹽少許同

鹽少許同

鹽少許同

鹽少許同

一半

同熬成膏

入後末和丸梧子大每溫水下三十丸

聖濟總錄

產後帶下

上方同上

上方同上

上方同上

乳汁不下

乃氣脈壅塞

也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之自然內消漏盧二兩

聖濟總錄

產後帶下

上方同上

上方同上

上方同上

半蛇退

錢溫酒調下

良久以熱羹湯投之以通爲度

每服二和

半兩爲末生薑二兩取

半兩和

半兩和

方劑

歷節風痛

筋脈拘攣古聖散用漏盧鼓炒半兩

炒半兩爲末生薑二兩取

半兩爲末生薑二兩取

半兩爲末生薑二兩取

半兩爲末生薑二兩取

汁入蜜三兩同煎三五沸入好酒五合盛
之每以二盃調水一錢溫服

聖濟總錄

一切癰

疽

發背

初發二日但有熱證便宜服漏盧湯退毒

聖濟總錄

退毒用漏盧湯

有白茸者

大黃微炒

連翹生黃芪沉香各一兩生粉草半兩

聖濟總錄

半兩生粉草半兩

迅癰疽

集驗方

一兩爲細末每服二錢薑棗湯調下李

聖濟總錄

白禿頭瘡

五月收漏盧草燒灰豬膏和塗之

聖濟總錄

飛廉

本經上品

釋名漏盧別錄

木禾別錄

飛雉

同飛輕

同伏兔

同伏豬

同天薺

同時文雀頭蛇尾

珍曰飛廉神禽之名也其狀鹿身豹

皮如箭羽復療風邪故

此草附莖有角能致風氣

有飛廉飛雉飛輕諸名

別錄曰飛廉生河內川澤正月采根七月八

月采花陰乾弘景曰處處有之極似苦葵惟

集解

別錄曰飛廉飛雉飛輕諸名

此草附莖有角能致風氣

惟

其岡有枕俗葉近黑碧葉血脂在也者乾其岡有枕俗葉之識然色色寒以蔓平保俱則根上兩方方多漏時彼如如菊此與澤昇有黑直者種今殆刻盧珍但蔓單紫可飛皆曰驗如下葉一旣無缺是日謂青葉色表廉有葉今玄更頗種別用葉飛飛而蓮五識形五似俗參有而下廉廉漏細花七之頌相六芙蓉馬莖枝而無中則是此漏盧家服輕沈亦盧又花枝日月莖葉生則刻陶氏所說者一爾恭又存蒿今類夢同日似月采似苦吳者爲漏殺蟲中類葱下一今只采軟羽白且多毛其莖亦蘇也蘇木及榦秦州脂蔓教曰凡色子盧蟲與黑赤一種入神談亦頌有陶旁所圖漏盧酒則使勿色並非平脈無生言圖用飛經疑廉說飛裏盧花似便用白如州不廉之花似赤所是澤日羽山此牛所能相根紫單如赤所

勞而綿頭古方漏盧散下云用有白茸者則是有
白茸者乃飛廉無疑矣今考二物氣味功用俱不
相遠似可通用豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎

根及花脩治

敷曰凡用根先刮去粗皮杵細以苦酒拌一夜濾出日乾細杵用

氣味苦平無毒

權曰苦鹹有毒之才曰得烏頭良惡麻黃

主治骨節熱脛重酸疼久服令人身輕

本經頭眩項

重皮閒邪風如蜂螯針刺魚子細起熱瘡癰疽痔
溼痹止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可

煮可乾用

別錄

主留血療疳蝕殺蟲

蘇恭

小兒疳痢爲

散水漿服大效

蕭炳

治頭風旋運

時珍

發明

時珍曰葛洪抱廉朴子可書遠言飛廉單服可倍於身

於牙

可輕身數倍於

言飛廉單服

廉朴
煎子
可書

言易
服洪
飛抱

時珍曰
延年又
古詩

發明

常本

時珍曰葛洪抱朴子延年又言服飛廉前經別錄所列亦是真

書言飛廉單服可輕身
可遠涉疾行力數倍於

附
方

時珍曰葛洪延年又言服經別錄所列後人不知用

抱朴子書言飛廉單服可輕身
可遠涉疾行力數倍於良

無不數痛

時珍曰葛洪延年又言服經別錄所列後人不知用

抱朴子書言飛廉單服可輕身
亦是良藥可遠涉疾行力數倍於
及下部用飛廉蒿燒灰搗篩以
兩錢匕著痛處其痛則忍之若
蟲如馬尾大相纏出平復千金翼方

芸
麻
下別

品錄

釋名

時珍曰茲麻作紩可以績紩故謂之紩凡麻絲之細者爲紩粗者爲紩陶宏景云茲卽今

三
巴
象
績
派

屋麻下是也。从广，掩声。音掩。

集解

頌曰 芝麻舊不著所出州土今閩蜀江浙多有之剗其皮可以績布苗高七八尺葉如楮

其葉而

黃白而輕虛二月八月采按陸機草木疏云

荆芋一科數十莖宿根在土中至春自生不須栽種
江浙閩中尙復如此宗奭曰芋如蕎麥花如白楊
而長成穗每一朵凡數十穗青白色時珍曰芋家
青其背皆白可刮洗煮食救荒味甘美其子
茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生

根氣味甘寒無毒

權曰甘平大明

曰甘滑冷無毒

主治安胎貼熱丹毒

別錄

治心膈熱漏胎下血產前

後心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱置

毒箭蛇蟲咬

大漚

別錄

止消渴

別錄

發明

震亨曰芋根大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也藏器曰芋性破血將芋麻

與產婦枕之止血運產後腹痛以茲安腹上卽止也又蠶咬人毒入肉取茲汁飲之今人以茲近蠶種則生是矣

附方

舊七

痰哮欬嗽

茲根煅存性爲末

生豆腐薰

爲末全可以肥

麻根蛤粉

每服二錢

煎

豬肉

二新

醫學正傳

小便不通

聖惠方用

半兩爲末

每服二錢

研末水下○摘玄方用

空心妙

三片

上貼少腹○連陰際須臾卽通

茲根洗

半兩爲末

每服二錢

研末水下○摘玄方用

茲根洗

半盃半盃頓

打碎

煎治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

研治諸

搘頻絹新

服大妙亦

五種淋疾

茲根水一盞

麻根兩莖打碎

水一盞半盞頓

忽下黃汁如膠或如小豆

去

熏洗之聖惠方癰疽發背

初起未成者夜數易腫消則瘻

根熟搗傅上圖經本草日

五色丹毒

芸根煮浴之

濃汁日三外臺秘要

驗方用野翁試

雞魚骨哽

醫方大成用野芸湯下

葉氣味

根同

主治金瘡傷折血出瘀血

珍時

發明

時珍曰灰搗作團曬乾收時遇有金瘡折損者研末

取和石傅之卽時血止且易癒也按李仲南永類方云凡

諸傷瘀血不散者五六月收野芸葉蘇葉擂爛傅

金瘡上如瘀血在腹內順流水絞汁服卽通血皆

化水以生豬血試之可驗也秋冬用乾葉亦可

研末每服五

附方

驟然水瀉

月五日采麻葉陰乾爲末每服五

二錢冷水調下勿喫熱物令人悶倒只

冷痢白凍

半錢用五

方同

蛇虺咬傷

青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞

中卽不發

看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇

以鍼挑破傷處成竅傅藥摘玄方

蕷麻

唐本草

釋名白麻

時珍曰蕷一作蕡又作蕪種必連頃故謂之蕡也

集解

恭曰蕷卽蕡麻也今人取皮作布及索者實似大麻子九月十月采陰乾頃曰處處有之

北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實殼如蜀葵其中子黑色時珍曰蕷麻今之白麻也多生卑溼處人亦種之葉大似桐葉圓而有尖六七月開黃花結實如半磨形似有齒嫩青老黑中子扁黑狀如黃葵子其莖輕虛潔白北人取皮作麻以莖蘸硫黃作焮燈引火甚速其嫩子小兒亦食之

實氣味苦平無毒主治赤白冷熱痢炒研爲末每

蜜湯服一錢癰腫無頭者吞一枚

蘇恭

生眼翳瘀肉

起倒睫拳毛

時珍

根主治亦治痢古方用之

蘇頌

附方

新

一切眼疾

荷麻子一升爲末以猪肝批

片蘸末炙熟再蘸再炙未盡乃

爲末

每服

一字

陳米飲

聖濟總錄

目生翳膜

久不愈者用

穢

以柳木作

砧

爲末

下日三服

一字

陳米飲

聖濟總錄

磨去殼馬尾篩取黃肉去

焦殼每十兩可得四兩

非此法不能去殼也用

豬肝薄切滾藥慢炙熟爲

實末醋和丸梧子大每服三十丸白湯

水下一方以

穢

以柳木作

砧

蒸熟暴爲末蜜丸溫水

下一方以

穢

以柳木作

砧

蒸熟暴爲末蜜丸溫水

下一方以

穢

大青

中別錄

釋名

時珍曰其莖葉皆深青故名

集解

別錄曰大青三四月采莖陰乾

宏景曰今出

東境及邊道紫莖長尺許莖葉皆用

頌曰今

江東州郡及荆南眉蜀濛諸州皆有之

春生青紫葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃

莖似石竹苗葉花陰乾用時珍曰處處有之

高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月

開小花紅色成簇結青

實大如椒顆九月色赤

莖葉氣味苦大寒無毒

權曰甘時珍曰

甘微鹹不苦

主治時氣頭痛大熱口瘡

別錄除時行熱毒甚良景

宏

治溫疫寒熱

甄權治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒

身熱疾風癰及金石藥毒塗署腫毒

大明主熱毒痢

黃疸喉痺丹毒

時珍曰

發明

頌曰古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯內亦用大青

大抵時疾多用之時珍曰大青氣寒味微苦鹹能解心胃熱毒不特治傷寒也朱肱活人書治傷寒

先指掌賦云陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可同發赤斑煩痛有犀角大青湯大青四物湯故李象

篤困

附方

新喉風喉痺

大青葉搗汁灌之取效止

衛生易簡方

小兒口瘡

大青十八銖黃連十二銖

水三升煮一升服一日二服以瘥爲度

千金方

熱病下痢

困篤者大青四兩

甘草赤石脂三兩膠

二兩分三服不過二劑瘥

後方肘熱病發斑赤色煩痛大青四物湯用大青一

阿膠甘草各二錢半煎二合分

三服每用水一盞半煎一盞入膠烊化服。又犀角大青湯用大青七錢半犀角二錢半梔子十枚煎八分溫服。南陽活人書

肚皮青黑

小兒肚皮

青黑

乃血氣失養風寒乘之

口中以酒送下

保幼大方

煎二撮分二服

每服水一盞半

人書

肚皮

然肚皮卒

小青

宋圖經

集解

頌曰小青生福州三月生花彼土人當月采葉用之

葉氣味

溫無毒

主治生搗傅癰腫瘡癩甚效

蘇頌治血痢

腹痛研汁服解蛇毒

時珍

附方

新二蛇虺蟹傷

衛生易筋方用小青一握細研入香白芷半兩酒調服手按患

處候黃水出爲效。

○摘玄方用小青大牛膝葉同搗汁和酒服以渣傅之

中暑發昏

小青葉井水浸去泥控乾入
沙糖擂汁急灌之 壽域方

胡蘆巴

宋嘉祐

釋名苦豆

集解

禹錫曰

胡蘆巴出廣州并黔州春生苗夏結

是番

蘿蔔子未審的否

頽曰今出廣州或云種出

海南諸番

蓋其國蘆菔子也

船客將種蒔於嶺外

亦生然不及番中來者

真好今醫家治元臟虛冷

要藥而唐已前方不見用本草

不著蓋是近出

脩治時珍曰

凡入藥淘淨以酒浸

一病曬乾蒸熟或炒過用

果曰

主治元臟虛冷氣得附子

硫黃

治腎虛冷腹脹滿

面色青黑得懷香子桃

仁治膀胱氣甚效

嘉祐

治冷氣疝瘕寒溼腳氣益右

腎暖丹田

時珍

發明

宗奭曰

膀胱氣用此合桃仁麩炒等分爲末半爲散半以酒糊和丸梧子大每服五七十

丸空心鹽酒下其散以熱米飲下與丸子相閒空

心服日各一二服

時珍曰胡蘆巴右腎命門藥也

元陽不足冷氣潛伏不能歸元者宜之

宋惠民和局方有胡蘆巴丸治大人小兒小腸奔豚偏墜

劑及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡蘆巴

八錢茴香六錢巴戟去心

川烏頭炮去皮各二錢

棟實去核四錢吳茱萸五錢並炒爲末酒糊丸梧

子大每服十五丸

小兒五丸鹽酒下太醫薛已云

人病寒疝陰囊腫痛服五苓諸藥不效與此而

苦豆即胡蘆巴

頻頻不缺不周歲而目中微痛如

行入皆漸明而愈按此亦因其益命門之功所

蟲苦豆又張子和儒門事親云有人病目不覩思食

平也

入皆漸明而愈按此亦因其益命門之功所

謂益火之原以消陰翳是也

附方新小腸氣痛

胡蘆巴炒研末每服二錢

直指方

腎臟虛

冷腹脇脹滿胡蘆巴炒二兩熟附子硫黃各七分爲末酒煮麴糊丸梧桐子大每鹽湯下三錢四十丸

酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下三錢

至兩月大便出白膿則除根

方廣心法附餘

心鹽湯或鹽酒下三錢

陰癩腫痛

偏墜或小腸疝

沉香內消丸主之沉香木香各半兩胡

巴酒浸炒各二兩爲末酒

冷久不愈者

方鹽湯或鹽酒下三錢

糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

腳氣

故紙炒香各四兩爲末

兩爲末以木瓜切頂去瓢安

寒溼

荳三曰頗蒲三如葉
開花多而月麻似
草種小開大蘿
結葉生於根花而而
實中荒階可五赤長
抽野庭爲月色厚
中但刷采有三月
就呼高實稜根開
地叢爲旱云陰細
生蒲河乾長通碧
一不北用許慎說
本平澤人取以作
二卽馬率說文取
三蘿生之云江荔似
十莖也時珍東高
苗珍似刷子

正說

陝本宗

草夷
諸日

家藏

所貴
注陶

不隱
相見

相居
應言

若方

藥果

走不
馬用

蘭俗

則無
日識

成華者

不但水明乃馬又子
計據漢又茲蘭無木

之陶夫按字更味草

藥說苦周之俟馬不
多疑味憲訛博牛當

矣之油王也識皆更

今欠鹽救張時不言
正考調荒捐珍食可

其矣食本廣曰豈爲
如煦則有誰則堪禁

誤陶則草雅別堪疏
氏馬言云錄人菜

蘭其荔蠶食蓋

馬蕭亦嫩又實今

可由古亦不獨
作味馬名敢葉

以出上
其寢也

工實則說熟寂矣

氏換已蠶爲硬

實脩治

時珍曰凡入藥炒過用治疝則以醋拌炒之

氣味甘平無毒

保昇曰寒頌曰山人服之云大溫甚有奇效

主治皮膚寒熱胃中熱氣風寒溼痹堅筋骨令人

嗜食久服輕身

本經

止心煩滿利大小便長肌膚肥

大

別錄

療金瘡血內流癰腫有效

蘇恭

婦人血氣煩悶

產後血運并經脈不止崩中帶下消一切瘡癧止

鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺蕈毒傅蛇蟲

咬

大明

治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病

時珍

附方

舊二新六

諸冷極病

醫所不治者

馬蘭子

九升洗淨空腹服一合酒下日三服

寒疝諸疾

寒疝不能食及腹內一切諸疾

食肥肌馬蘭子一升

每日取升

把馬蘭子一升

用一

以金

方

千
寒疝諸疾

食肥肌

馬蘭子一升

每日取升

把馬蘭子一升

愈

方

姚僧坦集驗方

水拌煮吞之

服盡

喉痺腫痛

衛生易簡方

用水一

升

煎三合入少蜜攬勻細呷

大驗

○聖惠

升麻五分

把升麻五分

錢又

方馬

馬蘭子二升升入少蜜一兩爲末蜜丸

水服

大驗

○仲文

急方用馬骨灰米飲服

用方

蘭子

爲末心溫水服

牛蒡子六

寸七

水痢百病

張仲文

急方用馬骨灰米飲服

蘭子

爲末

以六月六日麵糰各等分爲末

空心溫水服

方寸七

水痢百病

張仲文

急方用馬骨灰米飲服

錢又

方馬

馬蘭子八錢牛蒡子六

寸七

水痢百病

張仲文

急方用馬骨灰米飲服

蘭子

爲末

以六月六日麵糰各等分爲末

空心溫水服

方寸七

水痢百病

張仲文

急方用馬骨灰米飲服

普濟丸

水

冷忌

豬肉

水

冷

熱

皆治常用神效不得

打

花實及根葉主治去白蟲本經療喉痺多服令人溏

洩別主癰疽惡瘡

時珍

發明

頌曰 蟬草花實皆入藥列仙傳云寇先生宋人好種荔食其葩實是矣時珍曰按葉水東

日記云北方田野人患胸腹飽脹者取馬棟花搗涼水服卽泄數行而愈按此則多服令人泄之說

有驗而蠡實之爲馬蘭更無疑矣

附方

舊三新六

睡死不寤

蠡實根一握杵爛以水绞汁稍稍灌之外臺秘要

痺口噤

馬蘭花二兩蔓荆子一錢

喉痺腫痛

死者外半煮一盞細飲

臺秘要用馬蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲之立瘥○聖惠方用根搗汁三合蜜一合慢火熬成徐徐點之日五七度一方單汁飲沙石熱淋

馬蘭者灌下無生者以刷煎汁灌之口

花七枚燒故筆頭二七枚燒粟米一合炒爲末每服二錢酒下日二服名通神散

小便不

通

馬蘭花炒茴香炒葶藶炒爲末每酒服一錢十便良方

一切癰疽

瘡用鐵掃帚地

掃

帚同松毛牛膝以水煎服

乾坤生意

數次自消

壽域神方

面上癩疊

馬蘭子花杵傅

拾遺藏器

日辛溫無毒主冷氣胸閉

附錄必似勒

不消心腹脹滿生崑崙狀似馬蘭子

落葉并子煎湯頻

惡實

別錄中品

釋名

鼠黏

別錄牛勞

別錄大力子

綱目

勞翁菜

綱目

便牽牛

綱目

蝙蝠刺

時珍曰其實狀惡而多刺鉤故名其根葉皆可食人呼爲牛菜術人隱之呼爲

大力也俚人謂之便牽牛河南人呼爲夜叉頭頸

曰實殼多刺蟲過之則綴惹不可脫故謂之鼠黏

子來亦如比羊

集解

別錄曰惡實生魯山平澤恭曰魯山在鄧州東北此草葉大如芋子殼似粟狀實細長如指頭

芋莧葉而長實似蒲萄核而褐色外殼似栗核而小如指頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥時珍曰牛蒡古人種子以肥壤栽之剪苗汋淘爲蔬取根煮曝爲脯云甚益人今人亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色十數十顆其根大者如臂長者近尺其色灰黑

七月采根子

子脩治

穀曰：凡用揀淨以酒拌蒸待有白霜重出以布拭去焙乾擣粉用

氣味辛平無毒

藏器曰苦元素曰辛溫陽中陰升也果曰辛平陽也降也

之

主治明目補中除風傷別錄風毒腫諸瘻減器研末浸

酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰膝又食

前熟按三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒甄權吞一

枚出癰疽頭蘇恭炒研煎飲通利小便孟詭潤肺散氣

利咽膈去皮膚風通十二經元素消斑癬毒時珍

發明

果曰鼠黏子其用有四治風溼癰疹咽喉風熱散諸腫瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也

附方

舊五新十一

風水身腫

欲裂鼠黏子二兩炒研爲末每溫水服二錢日三服

惠方

風熱浮腫

咽喉閉塞牛蒡子一合半生半熟爲末熱酒服一寸匕

經驗方

瘻厥頭痛

牛蒡子炒旋覆花等分爲末臘茶清服一錢日二服

聖惠方頭痛連

睛

茶清調服

膏等分爲末

醫方摘要

疏風壅滯唾

膏等分爲末

牛蒡子微炒

荆

芥穗一兩炙

甘草半兩爲末

食後湯

牛蒡子微炒

疏風壅滯唾

服

二錢當緩緩取效

寇氏本草衍義

懸癰喉痛

牛蒡子微炒

疏風壅滯唾

水煎

含嚥名啟關散

普濟方

生等分

喉痺腫痛

牛蒡子六

分馬蘭子六分

爲散每空心溫水服

方寸匕日再

服仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熱包熨喉外

濟方廣

疏風壅滯唾

咽喉痘疹

牛蒡子二錢桔梗一錢半粉

甘草七分水煎服

初虞世古今錄驗

痘疹要訣

疏風壅滯唾

熱癰疹

牛蒡子炒浮萍等分

以薄荷湯服

疏風壅滯唾

疏風壅滯唾

疏風壅滯唾

小兒痘瘡

牛蒡子炒水含

初虞世古今錄驗

痘疹要訣

疏風壅滯唾

疏風壅滯唾

小兒痘瘡

牛蒡子炒水含

初虞世古今錄驗

痘疹要訣

疏風壅滯唾

疏風壅滯唾

痛

鼠黏子炒水含

初虞世古今錄驗

痘疹要訣

疏風壅滯唾

疏風壅滯唾

秘

鼠黏子炒水含

初虞世古今錄驗

痘疹要訣

疏風壅滯唾

疏風壅滯唾

炒

荆芥穗一錢

甘草節四分水

大便利者勿服

牛蒡子一錢

疏風壅滯唾

煎

荆芥穗二分

甘草節四分水

大便不利者勿服

牛蒡子一錢

疏風壅滯唾

服

名必勝散

和劑局方

婦人吹乳

鼠黏子少許

溫酒

細吞下便癰腫痛

鼠黏子二錢炒研末入蜜

一匙空心溫酒服

袖珍方

蛇蝎蟲毒

大力子

煮汁服

衛生易簡方

水蟲腹大

惡實

微炒袖珍

麴糊丸梧子大每米飲

下十丸張文仲方

炒羌活各一兩爲末每服二錢白湯下

風熱攻手指赤腫麻木甚則攻

肩背兩膝遇暑熱則大便秘牛蒡子三兩新豆豉

本事方

炒羌活各一兩爲末每服二錢白湯下

本事方

根莖氣味苦寒無毒

權曰甘平藏器曰根須蒸

熟暴乾用不爾令人欲吐

本事方

本事方

本事方

本事方

主治傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久

服輕身耐老

別錄

根主牙齒痛勞瘧諸風腳緩弱風

毒癰疽欬嗽傷肺肺壅痘瘻冷氣積血

蘇恭

根浸酒

服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡永不畏風

藏器

主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡

氣可常作菜食令人身輕

甄權

切根

豆大

拌麵作飯食

消脹壅莖葉煮汁作浴湯去皮閒習習如蟲行又

入鹽花生搗搗一切腫毒

孟詵

發明

頌曰

根作脯

食甚良

莖葉宜

煮汁釀酒

服冬

用緊細牛蒡

根取時

避風以竹刀

或荆刀刮去土

生布拭了搗絞取汁

一大升和好蜜

四大合溫分

兩服得汗出便瘥此方得之岳鄂

鄭中丞

鄭因食

熱內一頓便中暴風外

甥盧氏爲

潁陽令有此方

便瘥當時

附方

舊五新

十六時氣餘熱

不能飲食

用牛蒡根搗汁

不能退煩躁發渴四肢無力

服

聖惠方

一小盞效

天行時疾

生牛蒡根搗汁五合空腹分爲二服服訖取桑葉一

把

炙黃以水

一升煮取五合頓服

汗無葉用枝

孫真人食忌

以牛蒡根搗汁一升食後分

勞

根搗汁

一升食後分

醫心鏡

傷寒搗搗

汗後覆蓋不密致腰背手足搗

搗者

牛蒡根散

主之牛蒡根十條

星各六錢剉於盆內研細好酒

一升同研以新布

綃取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁

入坑內再燒令黑色

取出於乳鉢內細研每服一

錢溫酒下日三服

朱肱活人書

一切風疾十年二十年者牛蒡根一年二十

○子牛膝各三升

用袋盛藥浸無灰酒

升生地黃枸杞

根外臺秘要方

老人中風目口

三升內每任意飲之

外臺秘要方

老人中風目口

子牛膝各三升

用袋盛藥浸無灰酒

升生地黃枸杞

根外臺秘要方

老人中風目口

白米四合淘淨和作餽飪

豉汁中煮加葱椒五味

心食之恆服極

壯腎潤皮毛益氣力

此

效

空心食之恆服極

壯腎潤皮毛益氣力

此

親養老人風溼久痹筋攣骨痛服此

牛蒡根一升切生地黃一升切大豆二升炒以絹袋盛浸一斗酒中五六日任性空心溫服二三盞

日二服頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫集驗方

頭面忽腫

觸着痛者牛蒡子根一名蝙蝠

以刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍頭風掣痛

無灰酒一二匙腫消痛減斗門方頭風掣痛

不可禁者磨膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升

處風毒自散摩時須極力令頭癩火煎稠成膏以摩痛

熱乃效冬月用根篋中方頭風白屑牛蒡葉搗

洗去聖惠方喉中熱腫鼠黏根一升水五升煎

喉中熱腫

延年方

聖惠方

細熱毒牙痛熱毒風攻頭

小兒咽腫牛蒡根搗汁細熱毒牙痛熱毒風攻頭

小兒咽腫

普濟方細熱毒牙痛熱毒風攻頭

普濟方

細熱毒牙痛熱毒風攻頭

不可忍牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀器中熬

不可忍

牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀器中熬

成膏每用塗齒齦上重者不過三度瘥

成膏

每用塗齒齦上重者不過三度瘥

項下癰疾鼠黏子根一升水三升煮取一升半分

項下癰疾

鼠黏子根一升水三升煮取一升半分

或爲末蜜丸常服之

或爲末蜜丸常服之

或爲末蜜丸常服之

耳卒腫痛牛勞根切絞汁二升銀鍋小便不通腹臍

內熬膏塗之聖濟總錄

小便不通

腹臍

急痛

牛勞葉汁生地黃汁二合

和勻入蜜二合每

服一合

入水半盞煎三五沸

調滑石末一錢服

聖濟總錄

癩子腫毒鼠黏子葉貼之

千金方石瘦出膿堅實寒熱

爲未和

雞子白封外臺秘要

諸瘡腫毒牛勞根三莖洗煮爛

曹鎔甚良方

積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者牛勞根

搗汁入米煮粥食一千金

方月水不通

結成癥塊腹肋脹大欲死牛勞根

搗汁入米煮粥食一千金

斗浸五日每食前溫

普濟方

枲耳

中品

釋名

胡枲本

常思宏

景

蒼耳爾

卷耳詩

爵耳詩

疏豬耳

目綱

耳璫

詩

地葵

本

施

音

羊負來

宏

道人頭

圖

進賢

菜

記事

喝起草

目綱

野茄

目綱

縑絲草

頌

曰詩人謂之

卷耳爾雅謂之

蒼耳

廣雅謂之

菜耳皆以實得名也

陸機詩疏云

耳璫今或謂之

耳璫草鄭康成謂

謂之

陸機詩疏云

耳璫草鄭康成謂

謂之

謂之

是白

胡枲幽州人呼爲爵耳博

物志云洛中有人

驅羊入蜀胡枲子多刺黏綴羊毛遂至中國故名

羊負來俗呼爲道人頭

宏景曰倉人皆食之謂之

常思菜以葉覆麥作黃衣者方用甚稀時珍曰其

葉形如枲麻又如茄故有枲耳及野茄諸名其味

滑如葵故名地葵與地膚同名詩人思夫賦卷耳

之章故名常思菜張

之章故名常思菜張

揖

廣雅作常枲亦通

集解

別錄曰枲耳生安

陸川谷及六安田

野實熟

時采頌曰今處處有之

陸氏詩疏云其葉青

蔓生可煮爲茹滑而少味四

月中生子正如婦人耳璫郭璞云形如鼠耳叢生

似胡荽白華細莖

耳璫郭璞云形如鼠耳叢生

如盤今之所以有皆類此但不作蔓生時珍曰按周憲王救荒本草云蒼耳葉青白類黏糊菜葉秋閒結實比桑椹短小而多刺嫩苗燂熟水浸淘拌食可救飢其子炒去皮研爲麵可作燒餅食亦可熬油點燈

實脩治

大明日入藥炒熟搗去
刺用或酒拌蒸過用

氣味甘溫有小毒

別錄曰苦權曰甘無毒恭忌豬肉馬肉米泔害人

主治風頭寒痛風溼周痹四肢拘攣痛惡肉死肌

膝痛久服益氣器治肝熱明目

甄治一切風氣填

髓暖腰腳治療癰瘍及癩瘻

大明炒香浸酒服去

風補益

時珍

附方

舊三
新四

久瘧不瘥

蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十丸日二服

亦可

朱氏集驗方

大腹水腫小便不利蒼耳子灰蓼子灰蓼末等

分每服

二錢水下

半煎取七合去滓

食醫心鏡

牙齒痛腫

蒼耳子五升炒爲末以水一升

卽吐去

吐後復食不過一劑

瘡

亦可或入鹽少許

孫真人千金翼

鼻淵流涕

蒼耳子五升煮取五升熱含之冷

子卽繭絲草子炒

研爲末每白

眼目昏暗

枲耳實一升爲

湯點服一二錢

證治要訣

白

日未白米半升作粥

嗜酒不已

毡中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之卽不

器本草

陳藏

莖葉脩治

穀曰凡采得去心取黃精以竹刀細切拌之蒸從巳至亥時出去黃精陰乾用

氣味苦辛微寒有小毒

恭曰忌豬肉馬
內米泔伏硇砂

主治

溪毒

別錄

中風傷寒頭痛

孟詵

大風癲癇頭風溼

痹毒在骨髓腰膝風毒

夏月采曝爲末水服一二

匕冬月酒服或爲丸每服二三十丸日三服滿百

日病出如癰疥或汁出或斑駁駁甲錯皮起皮落

則肌如凝脂令人省睡除諸毒蟄殺蟲疳溼蠶久

服益耳目聰明輕身強志

蘇恭

接葉安舌下出涎去

目黃好睡燒灰和臘豬脂封疔腫出根煮酒服主

狂犬咬毒

藏器

發明

時珍曰蒼耳藥久服去風熱有效最忌豬肉及風邪犯之則遍身發出赤丹也按蘇沈良

方云枲耳根苗葉實皆洗濯陰乾燒灰湯淋取濃汁泥連兩竈煉之灰汁耗卽旋取傍釜中熱灰湯益之一日夜不絕火乃旋得霜乾甕瓶收之每日早晚酒服二錢補煖去風駐顏尤治皮膚風令人膚革清淨每澡沐入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力也斗門方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人者用喝起草嫩心陰乾爲末以酒服一大錢其功甚效此物善通頸門連腦蓋卽蒼耳也

附方

舊十二

萬應膏

治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔瘻一切風癩瞓瘡杖

瘡牙疼喉痹新十六日采蒼耳根葉數擔洗淨曬萎細剉以大鍋五月五口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再瀝復入淨鍋武火煎滾文火煎稠攬成膏以新罐貯封每以敷貼卽愈牙疼卽敷牙上喉痹敷

舌上或能進酒服一匙極有效。集簡方。一切風毒。并殺蟲腸痔。用舌上或能進酒服一匙極有效。集簡方。一切風氣。並治瘧疾。用舌上或能進酒服一匙極有效。集簡方。一切風氣。並治瘧疾。

一切風毒

并殺三時

一切風氣

於蒿艾中置
暖入麴三升
驗封此酒可
服一錢酒調
蜜丸梧子大
發毒攻手足

卒中水毒覺初

腫痛欲斷蒼耳搗汁潰之

并以淳健

傳

頭目微痛惡寒骨節強急日醒暮劇手足逆冷

日則蟲蝕下部六七日膿潰至五臟殺人也

搗

常思草絞汁服

導其下部

一二升并以

肘後方

毒蛇溪毒沙蟲射

等所傷口工

勝

綿染眼黑

手足強直

毒攻腹內成塊逡巡不救

蒼耳

遂巡不救

蒼耳

勝

方金疫病不染

收之臨時爲末

冷水服二錢或水煎

陰乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

舉家皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

豆淋酒調下

聖惠方

面上黑斑

蒼耳葉焙爲末

每服二錢

後米飲

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

赤白汗斑

蒼耳葉尖和青鹽

擂爛五六錢

一月愈

摘玄方

大風

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

方皆服能辟

邪惡方千金方

辟風瘡癰疹

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

乾

身癢不止用蒼耳嫩葉

莖葉

寸七

千金翼效

赤白下痢

蒼耳草不拘多少洗淨用
水煮爛去滓入蜜用武火熬成

膏

每服一二匙

醫方摘玄

聖惠

湯下

醫方摘玄

溫服

湯下

醫方摘玄

產後諸病

蒼耳葉搗絞汁

半中蓋日

三四服

方

醫方摘玄

誤吞銅錢

蒼耳頭一把以水

一升

浸水

花蜘蛛

蛛毒

咬人與毒蛇無異

搗汁一盞服仍以渣傅之

野縫絲卽道人頭

摘玄方

花主治白癩頑癧

時珍

天名精

本經上品

校正

時珍曰據蘇沈二說併入唐

本鶴蠚開寶地菘別錄有名

墨松

未用

釋名天蔓菁

別錄

天門精

別錄

地菘

唐本草

墨松

別錄

玉

門精

別錄

麥句薑

本經

蟾蜍蘭

別錄

墨藍

本經

珂蛻草

綱目

豕首

本經

彘顱

別錄

活鹿草

異

劉懨草

懨音胡
革反

皺面草

音胡
皺面草

目綱

母豬芥

綱目

實名鶴蠚根名杜牛膝

恭曰

天名精即活鹿草也

別錄一

相類故有此名

天蔓菁南人名爲地菘葉與蔓菁菘菜也

蘭故又名藍而蔓菁之氣似蘭

其氣如名蟾蜍

恭曰

天名精即活鹿草也

慕好居其下故名蠚墓

時珍曰天名精乃天蔓菁之訛也

昔人謂之活鹿草俗人因其氣如天蔓菁

氣躁訛爲狐狸躁者是也爾雅云荔

荔豕首也郭公注鈞樟

藏器曰

郭公注鈞樟人呼爲劉

故有豕首

彘顱之名昔人謂之活鹿草俗人因

氣躁訛爲狐狸躁者是也爾雅云荔

荔豕首也郭公注鈞樟人呼爲劉

藏器曰

郭公注鈞樟人呼爲劉

璞注爾雅

江東呼爲豨首可以燭蠚蛹食

蠚蛹食藏器曰

郭公注鈞樟人呼爲劉

藏器曰

郭公注鈞樟人呼爲劉

條云有

一草似狼牙氣辛臭名爲地菘人呼爲劉

菘者非也陶公注鈞樟人呼爲劉

藏器曰

郭公注鈞樟人呼爲劉

藏器曰

郭公注鈞樟人呼爲劉

倒如此三度

懨因密錄此草種之主折傷愈多人

倒如此三度

懨因密錄此草種之主折傷愈多人

倒如此三度

倒如此三度

相合陶蘇俱說是地菘定非二物

倒如此三度

倒如此三度

倒如此三度

倒如此三度

倒如此三度

正誤

有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高
尺許七月生花似菊八月結實子極尖細乾
嫩花實相類而別是一物不可雜用時珍曰天名精
皆云辛而香亦巴人食負蠶南人食山柰之意爾亦可
其根白如短牛膝此物最賤而唐本草言鶴虱
出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋當時人不知
用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦
首蓿云出西戎域而不知中國飼馬者卽是也詳見
下豨薺

葉

同

氣味

甘寒無毒

別錄曰

莖葉辛無毒

時珍曰

莖葉辛無毒

時珍曰

莖葉辛無毒

時珍曰

莖葉辛無毒

時珍曰

莖葉辛無毒

時珍曰

莖葉辛無毒

才曰

垣衣地

黃爲之使

主治瘀血血痕欲死下血止血利小

便久服輕身耐老

本經除小蟲去癥除胸中結熱止

煩渴逐水大吐下

別錄破血生肌止鼻衄殺三蟲除

諸毒腫疔瘡瘻痔金瘡內射身癢癰癬不止者揩

之立已

唐本

地菘主金瘡止血解惡蟲蛇蟄毒接以

傅之

開寶

吐痰止癰治牙痛口緊喉痹

時珍

墨松主眩

癆

別錄有

發明

時珍言

曰天名精併根苗而言也地菘墨松皆

吐痰止血殺蟲解毒

故擂汁服之能止痰瘧

漱之

效方云凡男婦乳蛾喉嚨腫痛及小兒急慢驚風

牙關緊急不省人事者以鶴蠶草

一名皺面草一名鶴蠶草一名皺面草

名母豬芥一名杜牛膝取根洗淨搗爛入好酒絞
汁灌之良久卽甦仍以渣傅項下或醋調搽亦妙
朱端章集驗方云余被檄任淮西幕府時牙疼大
作一刀鑷人以草藥一捻湯泡少時以手蘸湯挹
草痛處卽定因求其方用之治人多效乃皺面地菘
名鶴蠅正此物也錢季誠方用鶴蠅一枚擢置齒
中高監方以鶴蠅煎米醋漱口或用防風鶴蠅煎
水噙漱仍研草塞痛處皆有效也

附方

舊二
新九

男女吐血

皺面草卽地菘曬乾爲末每

服一二錢以茅花泡湯調服

咽喉腫塞

傷寒蘿

要治痰涎壅滯喉腫

水不可下者地菘一名鶴蠅

搗汁掃入去痰最妙○聖濟總錄

灌鼻得

喉風腫

蚘蝮草卽皺面草細研以生蜜和丸彈子大每噙一二丸卽愈乾者爲末蜜丸亦可

名

救生丸

經效濟世方

彈丸綿裹含嚥其骨

白梅肉一箇白礬一錢搗

地菘馬鞭草各一握去根

一錢搗傅去

根

名

救生丸

自軟而下也

普濟方

赤腫地菘搗傅

乾卽易之

聖

諸骨哽咽

地菘馬鞭草各一握去根

白梅肉一箇白礬一錢搗

地菘搗傅

赤腫地菘搗傅

乾卽易之

聖

作彈丸綿裹含嚥

其骨

普濟方

赤腫地菘搗傅

乾卽易之

聖

惠

疗瘡腫毒

鶴虱草葉浮酒糟同搗傳

孫氏集效方

日服

發背初起

發背初起

地菘杵汁一升日再服

傷寒類要

孫氏集效方

日服

惡瘡腫毒

地菘搗汁日服

外臺

秘

惡蛇咬傷

地菘搗傅

傳之

易簡方

鶴蠭

草唐本氣味苦辛有小毒

涼無毒主治

蛇蠭蟲

主治蛇蠭蟲

主治蛇蠭蟲

主治蛇蠭蟲

爲散以肥肉臙汁服方寸匕亦入丸散用

本蟲心痛以淡醋和半匕服立瘥

開殺五臟蟲止瘧傳惡

寶殺五臟蟲止瘧傳惡

瘡明大

發明

頌曰鶴蠭殺蟲方中爲最要藥初虞世古今錄驗方療蛇咬心痛取鶴蠭十兩搗篩蜜丸

梧子大以蜜湯空腹吞四五十丸忌酒肉韋雲患

心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳兵部

手集方治小兒蛇蠭噉心腹痛亦單用鶴蠭研末

以肥豬肉汁下之五歲一服二分蟲出卽止也

附方

新大腸蟲出不斷斷之復生自行坐不得鶴蠭

末水調半兩服自愈怪疾奇方

豨莶

音喜欵○

校正

併入唐本

黏糊菜

救荒時珍曰韻書楚人呼豬爲豨呼草之氣味辛毒爲莶此草氣臭如豬而味莶蟹

故謂之豨莶

猪膏虎膏狗膏皆因其氣以及治虎傷也火欵當作虎莶俗音訛爾近人復訛豨莶

釋名希仙

綱火欵草唐本豬膏母唐本虎膏唐本狗膏唐本

爲希仙矣救荒本草言其嫩苗爛熟浸去苦味油鹽調食故俗謂之黏糊菜

集解

恭曰

豨莶

田

野

皆識之一名

火欵

葉似酸漿

葉暴乾又

火欵

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉暴乾處處有之

一名虎膏

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

火欵

母生平澤

下溼地所在皆有一名虎膏一

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

葉似酸漿

將何適從耶時珍常聚諸草諦視則豬膏草素莖有直棱兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十人九月開小花深黃色中有長子如同蒿子外蔓有細刺黏人地菘則青莖圓而無棱無斑無毛葉皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所說相合今河南陳州采豨莶充方物其狀亦是豬膏草則沈氏謂豨莶卽豬膏母者其說無疑矣蘇恭所謂似酸漿者乃龍葵非豨莶蓋誤認爾但沈氏言世間單服火欒乃是地菘不當用豬膏母似與成張之說相反今按豨莶豬膏母條並無治風之說惟本經地菘條有去癥除熱久服輕身耐老之語則治風似當用地菘然成張進御之方必無虛謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服豬膏母之豨莶者復往往有效其地菘不見有服之者則豨莶之爲豬膏尤不必疑矣

豨莶氣味苦寒有小毒又曰豬膏母辛苦平無毒

藏器曰有小毒蘇恭

曰

豬膏

無毒誤矣

蘇恭

主

治稀薺治熱驢煩滿不能食生擣汁三合服多

則令人吐又曰豬膏母主金瘡止痛斷血生肉除

諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傅並良蘇恭主久瘡

痰癰搗汁服取吐搗傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬蠻

蝮溺瘡藏器治肝腎風氣四肢麻痹骨痛膝弱風溼

諸瘡

時珍

發明

頌曰蜀人單服稀薺法五月五日六月六日九月九日采葉去根莖花實淨洗暴乾入瓶

中層層灑酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極香美矣搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝腎風

氣四肢麻痹骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣
諸州所說皆云性寒有小毒與唐本同惟文州及
高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼
主風溼瘡肌肉頑痹婦人久冷尤宜用須去粗莖
留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉則寒而有
毒并枝花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而
然歟時珍曰生搗汁服則令人吐故云有小毒九
蒸九暴則補人去痹故云無毒生則性寒熟則性
溫云熱者非也慎微曰按江陵府節度使成納進
豨薦丸方表略云臣有弟訴年二十一中風伏枕
五年百醫不瘥有道人鍾鉗因覩此患曰可餌豨
薦丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當
夏五月以來收之每去地五分翦刈以溫水洗去
泥土摘葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但以取
蒸爲度仍熬搗爲末煉蜜丸如梧子大空心溫酒
或米飲下二三十丸服至二千丸所患愈加不得
憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復至五千丸
當復健壯臣依法脩合令訴服之果如其言服後

須喫飯三五匙壓之五月五日采者佳奉勑宣付
醫院詳錄又知益州張詠進豨莶丸表略云切以
餐石飲水可作充腸之饌餌松含柏亦成救病之
功是以療飢者不在於羞珍愈病者何煩於異術
倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不恥管窺輒干天
聽臣因換龍興觀掘得一碑內說脩養氣術并藥
線素莖紫荄對節而生蜀號火欵莖葉頗同蒼耳
不費登高厯險每常求少獲多急采非難廣收甚
易倘勤久服旋見神功誰知至賤之中乃有殊常
之效臣自服至百服眼目清明卽至千服鬚鬚烏
黑筋力輕健效驗多端臣本州有都押衙羅守一
曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立瘥又
和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎斜時時吐涎
臣與十服亦便得痊今合一百劑差職貢史元奏進

附方

新風寒泄瀉

火欵草治風氣行於腸胃泄瀉爲末醋糊丸梧子大每

服三十丸

白湯聖濟總錄

癰疽腫毒

一切惡瘡

豨莶草

端午

下礬燒半兩爲末

每服二錢熱酒調

下毒

采者一兩乳香

一兩白

香

重者連進三服

得汗妙

乾坤秘韞

豨莶草

端午

豨莶燒

半兩爲末

每服二錢熱酒調

下毒

采者一兩乳香

釋名 篦

與箬同

遼葉

時珍曰

箬若竹而弱故名

其生疎遼故又謂之遼

集解

時珍曰

箬生南方平澤其根與莖皆似小竹

而韌新舊相代四時常青南人取葉作

笠及裹茶鹽包米櫻女人以襯輶底

葉作

葉氣味甘寒無毒

主治男女吐血衄血嘔血咯血

下血並燒存性溫湯服一錢匕又通小便利肺氣

喉痹消癰腫

時珍

附方

新十二一切眼疾

籠箒燒灰淋汁洗之

久之自效

經驗方

咽喉閉

痛

遠葉燈心草燒灰等分吹之甚妙

集簡方

耳忽作痛

或紅腫內脹

將經霜青箬

耳中其疼卽止

楊起簡便方

燒灰

露在外將朽者燒存性爲未傳入肺壅鼻衄

箬葉燒灰

時珍曰

箬生南方平澤其根與莖皆似小竹

而韌新舊相代四時常青南人取葉作

笠及裹茶鹽包米櫻女人以襯輶底

葉作

其生疎遼故又謂之遼

白麪三錢研勻井華水經血不止等分爲末每服

二錢米飲下

聖濟總錄

茶簍內箬葉燒存性每服

箬葉灰蠶紙灰

每服

麝香少許

聖濟總錄

腸風便血

茶簍內箬葉燒存性每服

箬葉灰蠶紙灰

每服

麝香少許

王選方

男婦血淋亦治五淋

頭箬葉五年至十年

多年煮酒瓶

或入

者尤佳

每用七箇燒存性

入麝香少許陳米飲下

日三服有入患此二服愈

福建煮過夏月酒多有

有

之百選

尿白如注小腹氣痛

茶籠內箬葉燒存性

入麝香少許米飲下

經驗方

便澀滯

不_爲通乾箬葉一兩燒

灰滑石半兩

普濟方

男婦轉

脬方同

吹嫋乳癰五月五日

櫻箬燒灰酒服二

痘

累效濟急仙方

男婦轉

瘻倒臙

箬葉灰一錢麝香少許酒

卽散

累效濟急仙方

瘻

便覽方

蘆別錄

校正

中采出

拾遺江

蘆

釋名葦

音偉

葭加花名蓬蘽

唐本

筍名蘿

音拳

時珍曰按毛茛詩疏

云葦之初生曰葭未秀曰蘆長成曰葦葦

者偉大也蘆者色盧黑也葭者嘉美也

集解

恭曰

蘆根生下溼地莖葉似竹花若荻花名

蓬蘽

二月八月采根日乾用頌曰今在處有

之生下溼陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝

花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎其根取水

底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用

按郭璞注爾雅云葭卽蘆也葦卽蘆之成者焚𦐹似葦

而小中實江東呼爲烏蘆音丘或謂之邁

至秋堅成卽謂之萑音桓兼似萑而細長高數尺

江東謂之蒹其花皆名芽音調其萌皆名蘿堪食

如竹笋若然則蘆葦通爲一物也所謂蒹乃今作

別蒹葦是也所謂葦者今以當薪者是也而人罕能

植下溼所生者皆名蘆其幹差大深碧色者亦難得然則蘆

其細不及指大人家池圃所

葦皆可通用矣時珍曰蘆有數種其長丈許中空皮薄色白者葭也蘆也葦也短小於葦而中空皮厚色青蒼者茭也蘆也葦也最短小而中實者蒹也蘆也皆以初生已成得名其身皆如竹其葉皆長如箬葉其根入藥性味皆同其未解葉者古謂之紫蘆〔教曰〕蘆根須要逆水生并黃泡肥厚者去鬚節並赤黃皮用

根氣味甘寒無毒主治消渴客熱止小便利別療反胃嘔逆不下食周中熱傷寒內熱彌良〔蘇恭〕解大熱開胃治噎噦不止〔甄權〕寒熱時疾煩悶瀉痢大渴

孕婦心熱

大明

筍氣味小苦冷無毒〔甯原曰〕主治膈閒客熱止渴

忌巴豆

主治療瘧

利小便解河豚及諸魚蟹毒

原解諸肉毒

時珍

發明

時珍曰按雷公炮炙論序云益食加觴須煎蘆朴注云用逆水蘆根并厚朴二味等分煎

湯服

蓋蘆根甘能益胃寒能降火故也

附方

舊六

骨蒸肺痿

不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮生薑各

十兩

橘皮茯苓各五兩

水二斗煮八升

外臺秘要

厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升

去滓分五服取汗乃瘥

欲死並以蘆根煮

外臺秘要

厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升

濃汁飲

肘後方

嘔噦不止

厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升

必效若以童子小便煮服

不過三升愈

肘後方

心膈氣滯煩悶不下食蘆根各二錢水煎服

根五兩剉以水三

大蓋煮取二升

反胃上氣

蘆根茅根各二錢水煎服

兩水四升

溫服

金匱玉函方

霍亂煩悶

蘆根三錢麥門冬一升

分服

干金方

霍亂煩悶

蘆根三錢麥門冬一千金方

霍亂脹痛

蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分服

太平聖惠方

食狗

肉毒

心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語蘆根煮汁服

梅師方

中馬肉毒

方同上

聖惠

鯀鯉魚毒 方同上

千金

食蟹中毒

方同上

中藥箭毒

方同上

千金

千金

食蟹中毒

方同上

中藥箭毒

法器

藏

發明

時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水不強火不盛也蘆中空虛故能入心肺治

莖葉氣味甘寒無毒

主治霍亂嘔逆肺癰煩熱癰疽燒灰淋汁煎膏餌惡肉去黑子時珍擗治金瘡生肉滅瘢徐之○江中采出蘆令夫婦和同用之有

虛上焦

附方

新六

霍亂煩渴

腹脹蘆葉一握水煎服○又方
蘆葉五錢糯米二錢半竹茹一錢水煎入薑汁蜜各半合煎

錢水

煎入薑

汁蜜各半合煎

兩沸時時呷之

聖惠方

吐血不止 蘆荻外皮燒灰勿令

白爲末

入蚌粉少許研勻

麥門冬湯

微熱心胸甲錯革莖湯用革莖切二升水二斗煮

汁五升

入桃仁五十枚薏苡仁瓜瓣各半升煮取

服一二錢

三服可救一人

聖惠方

肺癰欬嗽 滿

二升服當吐出膿血而愈

張仲景金匱玉函方

發背潰爛 陳蘆葉爲末

以葱椒湯洗

淨傳之神效

乾坤秘韞

癰疽惡肉 白炭灰白荻灰等分煎膏

塗之蝕盡惡肉以生肉膏

貼之亦去黑

子此藥只可留

葛洪肘後方 十

小兒禿瘡 洗淨蒲

日久則不效

葛洪肘後方

聖濟總錄之

蓬蘽氣味甘寒無毒主治霍亂水煮濃汁服大驗

恭蘇

煮汁服解中魚蟹毒

頌蘇

燒灰吹鼻止衄血亦入

崩中藥

時珍

附方

新二

乾霍亂病

心腹脹痛

蘆蓬茸

一把水煮

諸

般血病

水二

蘆花紅花

槐花白

雞冠花

茅花等分

鍾煎一鍾服

萬表積善堂方

甘蕉

別錄下品

釋名芭蕉

衍義

天苴

史記注

芭苴

時珍曰

按陸佃埤雅

云蕉不落葉

一葉舒

則一葉轉也

稽聖賦云

竹布實而根苦

蕉舒花而株槁

芭苴乃

蕉之音轉也

蜀人謂之天苴

曹叔雅異物志云芭

蕉結實其皮赤如火

其肉甜如蜜

四五枚可飽人

而滋味常在牙齒間故名甘蕉

集解

宏景曰

甘蕉本出廣州今江東並有根葉無

味

甘北閒者但有花無實

頌曰甘蕉出嶺南者子大皆有而閩廣者實極甘美可啖他處雖多而作花

者亦少

近時中州種之甚盛皆芭蕉也其類亦多

有子者名甘蕉卷心中抽幹作花初生大萼似倒

垂菌苔有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極

繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水

蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之

別品類亦多最美曝乾可寄遠北土得之以爲

珍果其莖解散如絲閩人以灰湯練治紡績爲布

謂之蕉葛

宗奭曰芭蕉三年已上卽有花自心中

抽出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但色微黃

綠中心無蕊悉是花葉也花頭常下垂每一朵自

中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落

也時珍曰按萬震南州異物志云甘蕉卽芭蕉乃

草類也望之如樹株大者一圍餘葉長丈許廣尺
餘至二尺其莖虛軟如芋皆重皮相裹根如芋魁
青色大者如車轂花著莖末大如酒盃形色如蓮
花子各爲房實隨花長每花一閻各有六子先後
相次子不俱生花不俱落也蕉子凡三種未熟時
皆苦澀熟時皆甜而脆味如蒲萄可以療飢一種
子大如拇指長六七寸銳似羊角兩相抱者名
羊角蕉剝其皮黃白色味最甘美一種子大如雞
子卵有類牛乳者名牛乳蕉味微減一種子大如蓮
子長四五寸形正方者味最弱也並可蜜藏爲果
又顧珍海槎錄云海南芭蕉常年開花結實有二
種板蕉大而味淡佛手蕉小而味甜通呼爲蕉子
不似江南者花而不實又范成大虞衡志云南中
芭蕉有數種極大者凌冬不凋中抽一條長數尺
節有花褪葉根有實去皮取肉軟爛如綠柿
味極甘冷四季恒實土人以飼小兒云去客熱謂
之蕉子又名牛蕉乾一種雞蕉子以梅汁漬曝壓扁
微霜名芭蕉小於牛蕉亦四季實有

一種牙蕉子小於雞蕉尤香嫩甘美惟秋初結子兩葉其中有一點鮮綠可愛春開至秋盡猶芳俗名美人蕉一種膽瓶蕉根出土時肥飽狀如膽瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

氣味甘大寒無毒

恭曰性冷不益人多食動冷氣

主治生食止渴

潤肺蒸熟曬裂春取仁食通血脈填骨髓

孟子

生食

破血合金瘡解酒毒乾者解肌熱煩渴

吳瑞

除小兒

客熱壓丹石毒

時珍

根氣味甘大寒無毒

恭曰寒頌曰甘芭蕉性相同也

主治癰腫

結熱

別錄

擣爛傅腫去熱毒擣汁服治產後血脹悶

恭蘇

主黃疸

孟詵

治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金

石發動躁熱口乾並絞汁服之又治頭風遊風

大明

附方

舊四新六

發背欲死

芭蕉根搗爛塗

肘後方

一切腫毒

芭蕉根搗汁

塗之

同

上赤遊風癰

方同

風熱頭痛

芭蕉根搗汁

飲之

同

風蟲牙痛

芭蕉根搗汁

自然

汁

一盃煎熱含

普濟方

天行熱狂

芭蕉根搗汁

飲之

同

各等分水煎服

日華子本草

血淋澀痛

芭蕉根搗汁

早蓮草

飲水

骨節煩熱用

生芭蕉根搗

時飲一二合

聖惠方

產後血脹

芭蕉根搗汁

溫服二三合

甘冷無毒主治

頭風熱

合

芭蕉根取汁抹

直指方

蕉油

以竹筒插入皮

中取出瓶盛之

氣味甘冷無毒主治

頭風熱

止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑

明大

暗風癆病涎作暈悶欲倒者飲之取吐有奇效

蘇頌

附方

新

小兒截驚

以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭項留額門塗四肢留手足心勿塗

甚效

鄧興

葉主治腫毒初發研末和生薑汁塗之

時珍聖惠方

附方

新

岐毒初起

芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日三上或消或破

皆無痕也

仁齋直指方

花主治心癆痛燒存性研鹽湯點服二錢

日華

襄荷

別錄中品

校正

自菜部移入此併入有名未用襄草爲一

釋名 覆葙

別錄

博

音

蓄苴

說

嘉草

宏景曰
本草白

蘘荷

而今人呼

赤者爲勝

入藥以白者爲良

葉同一種爾

時珍曰

覆苴許氏說文作蓄

苴司馬相如上

林賦作搏且

王且

與芭蕉音相近離騷大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

大招云醯豚若狗膾苴蓆

集解

別錄

日蘘草生淮南山谷

頌曰蘘草荆襄江

似薑芽而肥其葉冬枯根堪爲菹其性好陰在木

下生者尤美潘岳閑居賦云蘘草依陰時藿向陽

是也宗懷荆楚歲時記云仲冬以鹽藏蘘草用備

冬儲又以防蠹史游急就篇云蘘草冬日藏其來

遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪噉及作梅

果多用之宗奭曰蘘草八九月閒醃貯以備冬月

作蔬果治病止用白者時珍曰蘇頌圖經言荆襄

江湖多種今訪之無復識者惟楊慎丹鉛錄云急

就章註
蘘荷卽今甘露考之本草形性相同甘露
子花根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑
宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蘘荷宜
樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳
八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生
根爲菹亦可醬藏十月中以糠
覆其根下則過冬不凍死也

脩治

穀

曰凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥

入砂盆中研如膏取自然汁鍊作

瀝

凡使白蘘荷以銅刀刮去粗皮一重細切

根氣味辛溫有小毒

思邈

曰辛微溫濁無毒

主治中蠱及瘧

擣汁服

別錄

溪毒沙蠶蛇毒宏景諸惡瘡根心主稻麥

芒入目中不出以汁注目卽出

恭

蘇赤眼澀痛擣汁

點之

珍時

蘘草氣味苦甘寒無毒

主治大明平溫瘧寒熱酸嘶

邪氣辟不祥

錄別

發明

宏景曰中蠱者服蘘荷汁并臥其葉卽呼蠱主姓名多食損藥力又不利腳人家種之亦

云辟蛇

頌曰按千寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以蘘荷置於席下忽大笑

曰蠱我者張小小也乃收小小亡走自此解

蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒

宗懷謂嘉草卽蘘荷是也

陳藏器云蘘荷茜根爲主蠱之最謂此時珍曰別錄茱部蘘荷謂根也草亦頗相近今併爲一云

附方

舊八卒中蠱毒

下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以蘘荷葉密置

病人席下勿令知之必自喉中似物吞吐不出腹

呼嚥主姓名也梅師方

喉中似物

吞吐不出腹

脹羸瘦取白

薑荷根搗汁服薑

根半日含

立出也梅師方

其汁療乃止外

臺秘要方

同上

吐血痔血向東薑荷根一把搗汁

肘後方

婦人腰痛

月信澀滯空心入酒和服

經驗方

風冷失

方同上

聲咽喉不利薑荷根二兩搗絞汁入酒

經驗方

風冷失

溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生薑

白

荷根葉合搗絞汁服三四升

白

荷根取心搗絞取汁滴入目中

白

麻黃入目中立出

白

釋名龍沙本經

本品

卑相錄別錄時珍曰諸名殊不

可解或云其味麻其色

麻黃

本品

釋名龍沙本經

卑相錄

卑鹽

別錄

時珍曰

諸名殊不

可解或云其味麻其色

黃未審然否張揖廣雅云龍沙麻黃也
狗骨麻黃根也不知何以分別如此

集解

別錄曰麻黃生晉地及河東立秋采莖陰乾令青

宏景曰今出青州彭城滎陽中

沙苑亦多其青

徐者亦不復用禹錫曰段成式酉陽雜俎云鹿臺及

莖頭開花花小而黃叢生子如覆盆子可食頌曰

勝春生苗至

夏五月則長及一尺以來梢上有黃花結實如百

合瓣而小又似阜筴子味甜微有麻黃氣外皮紅

月四月內開花六月結子雄者無花不結子於三

秋後收莖陰乾時珍曰其根皮色黃赤長者近

尺立

仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三

紅

葛洪肘後方治馬疥有

近

立

時珍曰按葛洪肘後方治馬疥有

近

立

葛洪肘後方治馬疥有

近

<p

氣味苦溫無毒

別錄曰微溫普曰神農雷公苦無
毒扁鵲酸李當之平權曰甘平元

素曰性溫味苦而甘辛氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明時珍曰麻黃微苦而辛性熱而輕揚僧繼洪云中牟有麻黃之地冬不積雪爲泄內陽也故過用則洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法卽止凡服麻黃藥須避風一日不爾病復作也凡用須佐以黃芩則無赤眼之患之才曰厚朴白薇爲之使惡辛夷石韋主治中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚本五臟邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛別錄治身上毒風癰

痹皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣飄通九竅調

血脉開毛孔皮膚大明去營中寒邪洩衛中風熱元

散赤目腫痛水腫風腫產後血滯時

發明

宏景曰麻黃療傷寒解肌第一藥頌曰張仲

皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃

湯皆大方也杲曰輕可去實麻黃葛根之屬是也

六淫有餘之邪客於陽分皮毛之閒腠理閉拒營

衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之

麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之

經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去

皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或

飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元

氣不可不禁好古曰麻黃治衛實之藥桂枝治衛

虛之藥二物雖爲太陽證藥其實營衛藥也心主

營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃桂

枝卽湯液之源也

時珍曰

麻黃乃肺經專藥故治

肺病多用之

張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用

桂枝歷代明醫解釋皆隨文傳會未有究其精微

者時珍常繹思之似有一得與昔人所解不同云

津液爲汗汗卽血也

在營則爲血在衛則爲汗夫

寒傷營血內滯不能外通於衛

衛氣閉固津液

不行故無汗發熱而憎寒夫風傷衛氣外泄不

能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而

惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合

也肺主衛氣包羅一身天之象也是證雖屬乎太

陽而肺實受邪氣其證時兼面赤佛鬱欬嗽有痰

喘而肺滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱

分之邪達之肌膚故用麻黃甘草同桂枝引出營

大熱而喘者加火石膏朱肱活人書夏至後加石

膏知母而喘者加杏仁泄肺而利氣汗後無

者是則麻黃湯雖太陽發

膏知母而喘者加火石膏朱肱活人書夏至後加石

膏是則麻黃湯雖太陽發

汗重劑實爲發散肺經火鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾藥泄木而固脾泄東所以補西也使以薑棗行脾之津液而和營衛也汗後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沉遲者加人參以益肺氣也朱肱加黃芩爲陽旦湯以瀉肺熱也皆是肺脾之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實爲理脾救肺之藥也此千古未發之秘旨愚因表而出之又少陰病發熱脈沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽爲表裏乃趙嗣真所謂熟附配麻黃補中發也一錦衣夏月飲酒達旦病水泄數日不止水穀直出服分利消導升提諸藥則反劇時珍診之脈浮而緩大腸下弩復發痔血此因內食生冷茶水過雜抑遏陽氣在下木盛土衰素問所謂久風成飧泄也法當升之揚之遂以小續命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後脈沉遲手足厥逆咽喉不利唾膿血泄利不止者用

麻黃湯平其肝肺兼升發之卽
斯理也神而明之此類是也

附方

舊五新七

天行熱病

初起一二日者

麻黃一大兩

去節以水四升煮去沫取二

升去滓著米一匙及豉爲稀粥先以湯浴

後乃食粥厚覆取汗卽愈孟詭必效方

傷寒雪

煎

麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十

二兩先以雪水五石四斗漬麻黃於東向竈釜

中三宿後納大黃攬勻桑薪煮至三石去滓納杏

仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三

斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子大有病者

以沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服一

丸封藥勿令洩

千金方

燒寒黃疸表熱者麻黃醋酒湯主

之麻黃一把去節綿裹

美酒五升煮取半升頓服

氣封藥勿令洩

千金方

燒寒黃疸

表熱者麻黃醋酒湯主

之麻黃一把去節綿裹

美酒五升煮取半升頓服

燒寒黃疸

表熱者麻黃醋酒湯主

之麻黃一把去節綿裹

美酒五升煮取半升頓服

燒寒黃疸

小汗

春月用水煮

千金方

裏水黃腫

一身面目

黃腫其脈沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四

兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一

升

升

升

升

升重覆汗出不汗再服慎風寒又千金云有患急久不瘥變成水病從腰以上腫者宜以此發汗氣

水腫脈沉

屬少陰其脈浮者爲氣虛脹者爲氣皆非水也麻黃附子湯汗之麻黃三兩水皆汗氣

七升

煮去沫入甘草二兩附子炮一枚煮取二升

半每服八分日三服取汗

風痹冷痛

麻黃去根五兩桂心二兩爲末酒調下至二升

出爲度避風

小兒慢脾

風因吐泄後而成麻黃五寸十箇去節白朮指面長汗

大二塊全蠍二箇生薄荷葉包

下一字三歲以上半錢薄荷湯下爲末二歲以

聖惠方

聖惠方

咽痛癆

語聲不出麻黃以青布裹燒烟筒中熏之

聖惠方

聖惠方

燒烟筒中熏之

聖惠方

聖惠方

產後腹痛

及血

聖惠方

聖惠方

盡麻黃去節爲末酒服方寸匕一日

二三服血下盡卽止

子母秘錄

心下悸病

夏半不

盡麻黃丸用半夏麻黃等分

末之煉蜜丸小豆大每飲服三丸日三服

金匱要略

痘瘡倒

升重覆汗出不汗再服慎風寒又千金云有患急久不瘥變成水病從腰以上腫者宜以此發汗氣

麻黃丸用半夏麻黃等分

末之煉蜜丸小豆大每飲服三丸日三服

金匱要略

痘瘡倒

壓

寇宗奭曰鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎數沸去沫再煎去三分之一

去滓乘熱服之避風其瘡復出也

煎

其效更速仙源縣筆工李用之子病斑瘍風寒倒壓已困用此

中風諸病

日乙卯日取東流水三

一服便出如神

麻黃一秤去根以王相

石三斗以淨錙盛五七斗先煮五沸掠去沫逐旋

添水盡至三五斗瀝去麻黃澄定瀝去滓取清

熬至一斗再澄再瀝取汁再熬至升半爲度密封下取汗熬

收之一二年不妨每服一二匙熱湯化

時要勤攬勿令着底恐焦了仍忌雞犬

陰人見之此劉守眞秘方也

宣明方

根節氣味甘平無毒主治止汗夏月雜粉撲之

景宏

發明

權曰麻黃根節止汗以故竹扇杵末同撲之

又牡蠣粉粟粉并麻黃根等分爲末生絹袋

之時珍曰麻黃發汗之氣

駛不能禦而根節止汗效如影響物理之妙不可

盜汗出卽撲手摩之時珍曰麻黃發汗之氣

物之妙不可

測度如此自汗有風溼傷風溫氣虛血虛而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其性能行周身肌表故能引諸藥外至衛分而固腠理也本草但知撲之之法而不知服餌之功尤良也

附方

新盜汗陰汗

麻黃根牡蠣粉爲末撲之

盜汗不止

麻黃根椒目等

分爲末

每服一錢無灰酒下外以麻

奇效良方

小兒盜汗

古今錄驗

三分日三服

麻黃根各一

黃根故蒲扇爲末

撲之一分爲末以乳服

三分撲之

枯瘦黃芪

古今錄驗

五錢

麻黃根各一

諸虛自汗

夜臥卽甚久則枯瘦黃芪

三分日三服

麻黃根各一

水二盞

小麥百粒米泔浸洗殼過爲散每服五錢

煎服

和濟局方

虛汗無度

麻黃根黃芪等分

末飛麪糊作丸梧子大

止爲度

大每用浮麥湯下百丸以

談塙翁試驗方

產後虛汗

黃芪當歸各一

兩麻黃根各一

止爲度

一兩每服一兩煎湯下

陰囊溼瘡

腎有勞熱麻黃根石硫黃各一兩米粉一合爲末傅

之千金方

內外障翳

麻黃根一兩當歸身一錢同炒黑

南京相孩兒方也

寺東黑普濟

木賊

祐宋嘉

釋名

時珍曰此草有節而糙澀治木骨者

集解

禹錫曰木賊出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一榦無花葉寸寸有節色青

凌冬不凋四月采之

頌曰所在近水地有之采無時今用甚多時珍曰叢直上長者二三尺狀似

鳧茈苗及棕心草而中空有節

又似麻黃莖而稍粗無枝葉

莖氣味甘微苦無毒

時珍曰溫

主治目疾退翳膜消積

塊益肝膽療腸風止痢及婦人月水不斷崩中赤

白祐解肌止淚止血去風溼疝痛大腸脫肛

時珍

發明

禹錫曰木賊得牛角鰐麝香治久痢得禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白得槐蠍桑耳

治腸風下血得槐子根實治痔疾出血震亨曰木賊去節烘過發汗至易本草不曾言及時珍曰木賊氣溫味微甘苦中空而輕陽中之陰升也浮也與麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散火鬱風溼治眼目諸血疾也

附方

舊三

目昏多淚

木賊去節蒼朮泔浸各一兩爲末每服二錢茶調下或蜜

丸亦急喉痺塞

木賊以牛糞火燒存性每冷水舌

服一錢血出卽安也

聖惠方

硬出血

木賊煎水漱之

血痢不止

木賊五錢水煎

一日一服

惠方 聖瀉血不止

方 同上

日二 腸痔下血

多年不止

廣利方 用木賊枳

殼各二兩乾薑一兩大黃二錢半並於銚內炒黑

存性爲末每粟米飲服二錢甚效也

蘇頌圖經

草本 大腸脫肛

木賊燒存性爲末摻之按入婦人血

草本 大腸脫肛

卽止一加龍骨三因方

崩血氣痛不可忍遠年近日不瘥者雷氏木賊散

主之木賊一兩香附子一兩朴消半兩爲末每

服三錢色黑者酒一盞煎紅赤者水一盞煎和滓

服日二服臍下痛者加乳香沒藥當歸各一錢同

煎忌生冷硬物豬魚油

膩酒麵醫壘元戎

服日一服胎動不安

木賊去節川芎等分爲末每

煎服聖惠方

小腸疝氣

木賊細剉微炒爲末沸湯點

濟總錄

誤吞銅錢

木賊爲末雞子白調

本草衍義

酒下○寇氏

誤吞銅錢

木賊爲末雞子白調

附錄問荆

藏器曰味苦平無毒主結氣瘤痛上氣急煮汁服之生伊沒洲渚閒苗如木

賊節

節相接草

一名

按續草

石龍芻

本品

釋名

龍鬚

本經

龍脩

山海經

龍華

別錄

龍珠

本經

懸莞

別錄

續斷

本經

縉雲草

綱目

方賓

別錄

西王母簪

時珍曰

刈草

包束曰芻此

草生水石之處可以刈

東養馬故謂之

龍芻

述異

可以刈東養馬故謂之

龍芻

化爲龍駒亦孟子芻參之義

是矣

故古語云一

東龍芻化爲龍駒

王母簪

因形也

縉雲

縣名屬今處州仙都山

今處州仙都山

屬今處州仙都山

屬今處州仙都山

屬今處州仙都山

產此草因以名之崔豹古

今注云世言黃帝乘龍

上天羣臣攀龍鬚墜地生草名曰龍鬚者謬也江龍

東以草織席名西王母席亦

豈西王母騎虎而墮其鬚乎

亦

江龍

屬今處州仙都山

屬今處州仙都山

屬今處州仙都山

本草圖用草部

卷五 石龍芻

石龍芻

石龍芻

石龍芻

石龍芻

石龍芻

石龍芻

石龍芻

集解

別錄曰石龍芻生梁州山谷溼地五月采莖暴乾以九節多珠者良宏景曰莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者

但多節爾藏器因今出汾州沁州石州亦處處有

之保昇曰叢生莖如綻所在有之俗名龍鬚草可爲席八月九月采根暴乾時珍曰龍鬚叢生狀如棕心草及鳧茈苗直上夏月莖端開小穗花結細

實並無枝葉今吳人多栽蒔織席他處自生者不

多也本經明言龍芻一名龍鬚而陶宏景言龍芻似龍鬚但多節似以爲二物者非矣

莖氣味苦微寒無毒

別錄曰微溫

主治心腹邪氣小便不利淋閉風溼鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年

本經補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除

莖中熱痛療蛇蟲腫不消食

別錄

敗席主治淋及小便卒不通彌敗有垢者方尺煮

汁服之

藏器

龍常草

別錄有
名未用

釋名粽心草

時珍曰俚俗五月采繫角黍之心呼爲粽心草是也

集解

別錄曰按爾雅云蘆鼠莞也鄭樵解爲龍芻

生夏冬時
纖細似龍鬚可爲席蜀中出者好恐卽此龍常

也蓋是龍鬚之小者爾故其功用亦相近云

莖氣味鹹溫無毒

主治輕身益陰氣療癥寒溼錄別

燈心草

宋開寶

釋名虎鬚草

綱目碧玉草

綱目

集解志曰燈心草生江南澤地叢生莖圓細而長直人將爲席宗奭曰陝西亦有之蒸熟待乾

拆取中心白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者但生乾剝取爲生草入藥宜用生草時珍曰此卽龍鬚之類但龍鬚緊小而瓢實此草稍粗而瓢虛白吳人栽蒔之取瓢爲燈炷以草織席及蓑他處野生者不多外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云硇遇赤鬚承留金鼎注云赤鬚亦呼虎鬚草煮硇能住火不知卽此虎鬚否也

莖及根脩治

時珍曰燈心難研以粳米粉漿染過曬乾研末入水澄之浮者是燈心也

曬乾

用

氣味甘寒無毒

元素曰辛甘陽
吳綏曰淡平

主治五淋生煮服

之敗席煮服更良

開寶

瀉肺治陰竅濇不利行水除

粉漿染曬乾研末入水澄去粉取浮者曬乾二兩
五錢赤白茯苓去皮共五兩滑石水飛五兩豬苓
二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏和藥丸如龍
眼大硃砂爲衣每用一丸任病換引大段小兒生
理向上本天一生水之妙諸病以韓氏醫通
水道通利爲捷徑也 溼熱黃疸 燈草根四
兩酒水各半入瓶內煮半日露一夜溫服 集玄方

燈花燼

見火部

本草綱目草部第十五卷終