IA 3716

東北帝國大學農科大學教授　理學博士　松村松年著

續日本千蟲圖解

卷之一

東京　警醒社書店

74-266

續日本千蟲圖解卷之一

凡例

一、本書ニハ日本産蛾類ノ内天蛾科六十三種、天社蛾科三十六種、毒蛾科二十二種、枯葉蛾科九種、天蠶蛾科十一種、水蛾蛾科二種、家蠶蛾科四種、鈎蛾科十三種、錦紋蛾科三種、夜蛾科七十四種、尖蛾科八種、帶蛾科二種、燈蛾科一種、合計二百四十八種ヲ記載セリ、

一、本書ニハ可成大形ノ種類ヲ撰ビタレバ普通種ト雖ドモ微小ナルモノハ茲ニ記セズ、

一、本書ニハ大形ナル臺灣産ノ種類ヲモ記入セリ、臺灣總督府技師農學士染木得一氏ノ健筆ニ成ルモノナレバ茲ニ謝意ヲ表ス、

一、本書ノ第一及ビ第二圖ハ臺灣總督府技師農學士染木得一氏ノ健筆ニ成ルモノナレバ茲ニ謝意ヲ表ス、

一、編纂ニ就テハ東北帝國大學農科大學昆蟲學敎室助手荒川重理氏ノ補助ヲ得タルコト少ナカラザレバ茲ニ謝意ヲ公表ス

明治四十二年二月二十八日

於東北帝國大學農科大學昆蟲學敎室

松村松年識

續日本千蟲圖解卷之一

東北帝國大學農科大學敎授 理學博士 農學士 **松村松年著**



(1) めんがたすゞめ

第一圖(1)(♀)

學名 Acherontia styx West.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科 (Sphingidae)

前翅黑色若クハ黑褐、白色及ビ黃色ノ鱗毛ヲ散在ス、翅ノ中央ニ黃色ノ一紋アリ、濃色ノ橫線アレドモ餘リ判然セズ、後翅ハ濃黃色、黑色ノ二橫線ヲ裝フ、胸背ニ髑髏ニ似タル大紋アルヲ以テ一名がいこつすゞめト云フ、體長一寸六分、開張三寸二分乃至三寸五分、幼蟲ハ胡麻、馬鈴薯、茄子等ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、支那、印度、

(2) えぞすゞめ

第一圖(2)(♂)

學名 Phyllosphingia (Smerinthus) dissimilis Brem. et Grey.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

前翅灰色、光線ノ工合ニテ少シク紫色ヲ現ハス、前緣ノ中央ニ暗黑色ノ大ナル三角紋アリテ、其內

ニ更ニ楕圓形ノ黑輪ヲ裝フ、翅底ハ暗黑色、前橫線ハ濃色ニシテ〈字形ニ屈折ス、中橫線ハ甚ダシク傾斜シテ判然ス、外線ハ暗黑色、其中央ニ淡色ノ一紋アリ、後翅ハ暗黑ニシテ前線ニ濃色ノ一大紋ヲ具ヘ、中央ニ波狀ヲナセル二橫帶ヲ裝フ、前後翅ノ外線ハ少シク波狀ヲナス、後翅ノ裏面ニハ褐色ノ長楕圓紋アリテ其周圍ハ桃色ヲ帶ビタル白色、體ハ暗黑色、前胸背及ビ腹背上ノ一縱線ハ濃色、體長(♂)(♀)一寸三分、開張二寸八分乃至三寸二分、餘リ多カラズ、

分布—北海道(札幌、箱館)

第一圖(3)(♀)

(3)おほしもふりすゞめ

學名 Langia zenzeroides Moor. var. Nawae Roth.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

前翅ハ灰白、前線ハ廣ク灰色ニシテ少シク藍色ヲ帶ブ、中室ノ部分ハ少シク暗黑ニシテ、其外側ニ一黑紋ヲ裝フ、黑色ノ四斜條アリテ一ハ翅ノ中央ヲ斜走シ、次線ハ淡色、外線ニアル二條ハ下方ニテ判然ス、此等ハ前線角ニ相合シテ一線トナル、後線ノ中央ニ灰色ノ大紋ヲ具ヘ、尙ホ全面ニ黑色ノ鱗毛ヲ散在ス、外線ハ外線角ニ近ヅクニ從ヒ深キ弦月形ノ四所ヲ具ヘ、其部分黑色ナリ、後翅ハ灰黑色、外線ハ白色、之レニ沿ヒ弦月形ノ黑紋五個アリ、內線角ニ近ク黑橫紋ヲ具ヘ、其下方ニ二條ノ白橫線ヲ裝フ、頭及ビ胸背ハ灰藍色、後者ノ兩側ニハ各一條ノ太キ黑線ヲ縱走シ、其周圍ハ灰白、中央ニ黃白ノ四縱條ヲ具ヘ、中央ニ暗黑ノ太キ一條ヲ縱走ス、胸背ト腹背ト相接スル所ニ杓子狀ノ長キ鱗毛ヲ密生シ其一部ハ美麗ナル藍色ヲ呈ス、腹背ハ灰色ニシテ第四及ビ第五節ノ中央並ビ

ニ第五及ビ第六節ノ兩側ニ藍色ノ鱗毛ヲ裝フ、尾節ハ灰藍色ヲ呈シ、三條ノ白線ヲ縱走ス、後翅ノ裏面ハ灰白、中央ニ黑色ノ弦月紋アリテ此ハ一列ニ排置セラル、尙ホ黑色ノ鱗毛ヲ散在ス、體長(♂)(♀)一寸五分、開張五寸乃至五寸五分、之レハ餘リ多カラズ、幼蟲ハうめ、あんずノ葉ヲ食ス、

分布—本州、九州、臺灣、

第一圖(4)(♂)

(4)したべにすゞめ

學名 Theretra (Chaerocampa) alecto L.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

前翅ハ綠褐、翅底ハ少シク灰色ヲ帶ブ、約七個ノ濃色斜條アリテ第一及ビ第五ノ兩線ハ太クシテ判然セリ、中室ノ一點ハ黑褐、後翅ハ紅色、翅底及ビ外線ハ黑色、內線角ノ大部ハ灰白色、裏面ハ黃褐、迹標ノ點紋ヲ散在ス、外線ハ灰色、少シク桃色ヲ帶ブ、體ハ綠褐、頭及ビ胸背ノ兩側ハ少シク桃色ヲ帶ビタル白色、腹部ハ胸部ヨリモ淡色、第二節ノ兩側ニ各一個ノ黑紋アリ、體下ハ少シク桃色ヲ帶ビタル黃白色、胸側ニハ赤褐ノ毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)一寸七分、開張二寸七分乃至三寸、

分布—臺灣臺北、臺南)

第一圖(4)(♀)

(5)はがたすゞめ

學名 Polyptychus (Smerinthus) trilineatus Moor.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅灰褐色、前翅ニ三個ノ黒斜條アリ、中央ニアルモノ最モ太ク、外緣ニアルモノハ中央ニテ彎曲ス、尙ホ各緣ノ外側ハ何レモ暗黒色、外緣ハ弦月形ニ刻ラレ、前緣ニ近ク黒褐ノ大紋アリテ稍々三角形ヲナス、後翅ハ暗黒、中央ニ淡色ノ一横帶アリテ、其内緣ハ白色、外緣ハ少シク刻ラレ、其中央ハ白色ナリ、裏面ハ表面ト略同色、前翅ニハ二條ノ斜線アリテ外緣ニ近キモノハ黒色、外緣ハ廣ク黒褐、後翅ノ中央ニ黒褐ノ一帶ヲ具ヘ、外緣ハ前翅同樣ニ黒褐ナリ、觸角ハ黄色、體ニ斑紋ヲ缺ク、體長(♂)(♀)一寸四分、開張(♂)三寸五分(♀)三寸八分、

分布―臺灣(臺中、新竹)、支那、其他南洋諸島、

第一圖(6)(♂)

(6)こびいろすゞめ

學名 Clanis bilineatus Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅黄褐色、個種ニヨリ少シク青味ヲ帶ビタルモノアリ、前翅ニ濃色ノ六波狀線ヲ斜走シ、翅底ニアルモノハ稍々半圓形ヲナス、其外側ニ相近接セル二波狀線アリテ之レハ前緣ニテ判然セズ、中央ヨリ外緣ニ接シテ斜走セル三條ハ稍々同距離ニ排置セラレ、内方ノ二線間ハ地色ヨリ濃色ナリ、前緣角ニ褐色ノ三角紋ヲ具ヘ、外緣室ノ脈ハ濃色ニシテ判然ス、尙ホ翅底ノ三分ノ一ノ處ヨリ外緣角ニ向ヒ太キ濃色ノ一帶ヲ逆ル、此ハ前緣ニテ濃色ナレドモ外緣ニ至ルニ從ヒ淡色トナリ同時ニ其幅ヲ增ス、後翅ハ濃褐、翅底ノ中央ハ黒褐、内緣ハ黄褐、前後兩翅ノ裏面ニハ褐色ノ三斜條アリテ、前翅ニ於ケルモノハ餘リ判然セズ、前翅ニハ前緣ヲ二等分セル黒褐斜條ヲ具ヘ、中央ニ黒褐ノ太キ

一線ヲ縱走ス、複眼及ビ胸背ノ中央ヲ縱走セル一線ハ黒褐、觸角ハ黄色、前肢ノ脛節及ビ跗節ハ黒褐、中後兩肢ノ外側ハ銀白色、體長(♂)(♀)一寸五分、開張四寸乃至四寸三分、幼蟲ハ大豆ノ葉ヲ食ス、

分布―本州、九州、臺灣、

第一圖(7)(♂)

(7)のこぎりすゞめ

學名 Marumba (Smerinthus) Jankowskii Oberth.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅灰色ニシテ少シク青味ヲ帶ブ、前翅ニハ濃色ノ五波狀線アリテ稍々同距離ニ排置セラル、但シ雄ニアリテハ中央濃色ナレバ中橫線判然セズ、縱脈及ビ橫脈ハ黄白、外緣ノ上方ニ濃色ノ一大紋ヲ裝ヒ、其内方ニ灰白帶アリテ之レハ外緣角ニテ增幅シ大紋トナル、外緣ハ不整ニ刻ラル、後翅ニハ二條ノ太キ波狀線アリテ、其外側ハ何レモ灰白、外緣ノ上方ニ前翅同樣ノ大紋アリ、脈ハ黄白ニシテ第六及ビ第七脈ノ部分ハ著シク外方ニ突出ス、胸背ノ中央ハ灰白、觸角ハ黄色、前翅ノ裏面ニハ二條、後翅ニハ三條ノ波狀線アリ、體長(♂)(♀)一寸一分乃至一寸四分、開張二寸八分乃至三寸六分、

分布―北海道、滿洲、

第一圖(8)(♀)

(8)いぶきすゞめ

學名 Celerio (Deilephila) Galii L.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅暗綠、胸背ノ兩側ハ白色、腹部ノ兩側ニ灰白紋ヲ列ヰ、前翅ノ中央ニ太キ灰黃ノ一縱條アリテ之レハ末端ニテ尖ル、其下方ニ黑褐ノ斜條アリテ之レハ後緣ニテ廣ク外緣ニ至リテ尖小ス、後翅灰白、翅底及ビ外緣ノ橫條ハ黑色、中央ニ紅色部アリ、體長(♂)(♀)一寸二分、開張二寸五分乃至二寸八分、幼蟲ハかはらまつばヲ食フ、

分布—北海道、本州、滿洲、歐洲、

(9)くろすゞめ

學名 Hyloicus Pinastri L. var. caligineus Butl.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

翅ハ灰色、前翅底ノ下方ニ黑褐ノ毛塊アリテ彎曲セル縱紋ヲナス、尙ホ其直上ニ一縱線ヲ有スレドモ餘リ判然セズ、前緣ノ中央ニ近ク一黑紋ヲ具ヘ、橫脈上ニ白色ノ一紋アリ、又其直下即チ第一室及ビ第二室ニ各一條ノ黑縱線アリテ之レハ稍々相平行ス、稍々外緣ニ近ク〈字形ヲナセル暗色ノ橫帶ヲ裝ヒ其內側ニ當リ前緣ニ同色ノ一紋ヲ有ス、前緣角ニ劍狀ノ一黑線アリテ前緣角ヲ二分シ、其前側ニ白色ノ一線ヲ橫走ス、裏面ハ灰色ニシテ橫線ノ痕跡アレドモ判然セズ、頭ハ淡褐、觸角ハ白色、羽狀ノ小枝ハ褐色、胸背ハ天鵞絨樣ノ黑褐ニシテ中央ハ稍々淡色ナリ、腹背ニ三黑條ヲ縱走シ兩側ニアルモノハ太クシテ點紋ヲナス、腹面ハ白色、體長(♂)(♀)九分乃至一寸二分、開張一寸九分乃至二寸二分、幼蟲ハ松、とゞまつ等ノ葉ヲ食ス、

第一圖(9)(♂)

分布—北海道、本州、滿洲、歐洲、

(10)ゐびがらすゞめ

學名 Herse (Proctoparce) Convolvuli. L.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

前翅灰褐、黑色若クハ灰色ノ紋條アリ、灰色ノ腎狀紋ヲ具ヘ、其中央ハ暗色、尙ホ少シク外緣ニ近キ處ニ犬牙狀ノ黑色波狀紋アリテ其內側ハ灰色、後翅ハ暗灰色、黑色ノ四橫線アリ、腹部ニ黑色、白色及ビ赤色ノ三橫紋列アリテ恰モ蝦ノ腹部ニ類シタルモノアルヲ以テ此名アリ、體長(♂)(♀)一寸五分乃至一寸八分、開張三寸乃至三寸三分、幼蟲ハ甘藷、朝顏、旋花等ヲ食ス、

第二圖(1)(♀)

分布—世界共通、

(11)ほそばすゞめ

學名 Oxyambulyx ochracea Butl.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅淡黃褐乃至黃褐、前翅ハ細ク、外緣ニアル弧狀ノ一紋、翅端ニ近キ前緣ノ三角紋、中室外ニアル三波狀線、橫脈上ノ一紋、其內側ニアル波狀線、翅底ノ一小紋、內線角ニ近キ圓紋、其直上ノ三角紋並ニ其外側ニアル一波狀線ハ褐色、後翅ハ黃色、外緣、第六室ノ一紋、二橫帶及ビ散在セル點紋ヲ散在ス、複眼間、翅底鱗並ニ後胸背ノ毛塊ハ暗褐ノ一紋ヲ裝フ、前肢ノ外側ハ黃白、腿節ニ黃褐

第二圖(2)(♀)

ノ長毛ヲ密生ス、體長一寸三分、開張三寸乃至三寸四分、之レハ餘リ多カラズ、

分布―本州、

第二圖(3)(♀)

(12)きいろすゞめ

學名 Theiretra ncssus Drury.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅黃褐、胸側ハ灰白、前翅底ノ前方ハ暗綠、後方ニ黑色及ビ白色部アリ、中室ニ一黑點ヲ具ヘ、外緣ニハ五條ノ斜帶ヲ裝ヒ、最モ外方ニアルモノハ波狀ヲナス、前緣角ハ尖リ、灰黃、後翅黑色、內緣角ニ廣キ黃色部アリ、體長(♂)(♀)一寸五分、開張三寸五分、幼蟲ハやまのいもの葉ヲ食ス、

分布―本州、四國、九州、琉球、臺灣、支那、印度、

第二圖(4)(♂)

(13)くろほしすゞめ

學名 Theretra (Chaerocampa) clotho Drury.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

前翅ハ灰黃褐、外緣ハ少シク桃色ヲ帶ブ、翅端ヨリ後緣ニ向ヒ、濃色ノ判然セザル六斜條ヲ斜走シ、其內中央及ビ內側ニアルモノハ最モ判然ス、中室ノ一點ハ黑色、尙ホ全面ニ小黑點ヲ散在ス、後翅ハ暗黑、後緣ノ中央ニ當リ灰黃褐ノ部分アリ、前翅裏面ノ中室ニ暗色ノ大紋ヲ具ヘ、後翅ノ中央ニハ黑點ヲ橫列ス、體ハ黃褐、少シク綠色ヲ帶ブ、胸背ノ兩側ハ白色、腹背ニ判然セザル暗色ノ三條

ヲ縱走ス、腹面淡色ニシテ小黑點ヲ散在ス、體長(♂)(♀)二寸四分、開張二寸二分乃至二寸五分、之レハ臺灣ニ普通ナリ、

分布―臺灣(臺北、臺南)

第二圖(5)(♂)

(14)ぎんぼしすゞめ

學名 Parum colligata Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

翅ハ綠褐、前翅底ニ三角形ノ灰白紋アリテ廣底ヲ前緣ニ有ス、稍々三分ノ一ノ處ニ灰白ノ一橫帶アリテ其中央ニ判然セザル淡褐ノ一線ヲ並走ス、又其外緣ニハ判然セル一橫帶アリテ灰白帶ノ分界ヲ顯著ナラシム、中脈上ニ褐色ノ縱條アリテ其中央(橫脈上)ニ銀色ノ一紋ヲ裝フ、外緣ニ稍々半月形ノ灰白紋アリテ其內緣ハ白色、第六室及ビ第七室ニアルモノハ弦月形ヲナシ其內側ハ白色、尙前緣ノ三分ノ二ノ處ニ褐色ノ一紋アリ、後翅ノ內緣角ニ近ク黑褐ノ太キ橫紋アリテ其前後ノ兩側ハ白色、翅ノ裏面ハ表面ト稍々同樣ノ斑紋ヲ有スレドモ後翅ノ中央ニ近ク黑褐ノ一縱線アリ、體ハ灰色、胸背ノ兩側ニアル毛塊ハ褐色、但シ雌ハ雄ヨリモ青味ヲ帶ブ、體長(♂)(♀)一寸、開張一寸三分乃至一寸七分、之レハ餘リ多カラズ、幼蟲ハかちのき及ビかうぞヲ食ス、

分布―北海道、本州、九州、臺灣、

第二圖(6)(♂)

(15)ほしほうじゃく

學名 Macroglossum pyrrhosticta Butl.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

前翅ハ暗褐ニシテ少シク綠色ヲ帶ブ、翅底ノ三分ノ一ハ黑褐、其黑褐部ノ中ニ濃色ノ二橫線アレドモ餘リ判然セズ、其外側ハ少シク桃色ヲ帶ビタル灰白色、中橫線ハ太クシテ前緣ニ近ク屈折スレドモ個種ニヨリ判然セズ、其屈折シタル部分ヨリ黑褐ノ縱線ヲ翅端ニ出ス、翅端ニハく字形ノ濃色紋ヲ認メ得ベシ、尙外緣ニ接シテ二條ノ判然セザル橫線ヲ裝フ、後翅ハ黑褐、中央ノ黃帶ハ中央ニテ少シク緊縮ス、裏面ハ赤褐、前翅ニ二條、後翅ニ三條ノ褐色帶アリ、體ハ綠褐、頭及ビ胸背上ニ黑褐ノ縱條ヲ具ヘ、各腹節上ニハ四個ノ黑紋アリテ其內第三節ニアルモノハ判然セリ、第二腹節ノ兩側ニ黃紋ヲ裝フ、尾端ニハ黑色ノ掃狀毛ヲ簇生ス、體下ハ赤褐、體長(♂)一寸二分、開張一寸八分、之レハ稀ナリ、

分布—北海道、本州(青森)、臺灣、支那、印度、

(16) ひさごすゞめ

學名　Dilina (Minas) Christophi Stgr.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

前翅茶褐色、光線ノ工合ニヨリ紫色ヲ現ハス、外緣ニ三個ノ判ラレタル部分アリテ其內第二ハ小ナリ、中央ニ稍々瓢形ニ近キ黑褐紋ヲ裝フ、但シ個種ニヨリ其外側ニ圓紋ヲ附セルモノアリ、外緣ハ濃色、翅端ニ鉤狀ノ灰白紋アリテ之レハ同色ノ第七脈ト相連續ス、尙中室ノ外側ニ當リ、太キ橫線並ニ翅底ニ近ク細キ橫線ヲ有スレドモ餘リ判然セズ、後翅ハ暗灰色、後緣ハ暗褐ナリ、裏面ハ黃褐、

第二圖(7)(♂)

外緣ハ暗褐、翅端ニ表面同樣ノ灰白線ヲ裝フ、後翅ニハ濃色ノ二橫線アリテ其中間ハ淡色ナリ、體ハ茶褐色、胸背ハ濃色、觸角ハ灰黃色、體長(♂)(♀)九分、開張二寸、之レハ稀ナリ、

分布—北海道、本州、滿洲、

(17) はねながぶどうすゞめ

學名　Acosmeryx naga Moor.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅ハ灰褐色、斑紋ハ黑褐、前翅底ニ二半橫線ヲ具ヘ、其外側ニ著ダシク傾斜セル橫線アリテ之レハ中室ニテ屈折ス、前緣ノ中央ヨリ外緣ノ中央ニ向ヒ太キ一斜條ヲ出ダシ、其外側ハ廣ク灰白、之レニ直角ヲナシテ同樣ノ一線ヲ後緣ノ中央ニ送ル、又其外側ニ波狀ヲナセル二橫線アレドモ餘リ判然セズ、外緣ニ近ク太キ一橫線アリテ第六室ニテ濃色トナル、其外側ニ灰白ノ太キ一橫線ヲ裝ヒ、外緣角ニ三角形ノ濃色紋アリ、後翅ハ中央ニ近ク褐色ノ一橫帶ヲ具ヘ、外緣ハ濃色、裏面ノ中央ハ赤褐、外緣ハ灰褐ニテ限界ハ犬牙狀ヲナス、後翅ニ四條ノ濃色帶アリテ內緣ハ灰黃白、前胸背及ビ中胸背ニ濃色ノ橫條ヲ裝フ、體長(♂)(♀)一寸三分乃至一寸五分、開張三寸一分乃至四寸四分、幼蟲ハぶどうノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、九州、琉球、支那、馬來、印度、

(18) をきなはくろほうしゃく

學名　Macroglossum fringilla Boisd.

第二圖(9)(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅黑褐、前翅ニ四五條ノ濃色帶アレドモ徐リ判然セズ、外緣ニ近クニ從ヒ少シク淡色トナル、後翅ノ黃帶ハ廣クシテ前緣ニテ增幅シ殆ンド其全長ヲ占ム、前翅ノ裏面ハ褐色ニシテ殆ンド斑紋ヲ有セズ、後翅ハ黃褐、外緣ハ暗色、中央ニ判然セザル二橫線アリ、腹部ニハ藍色ノ鱗毛ヲ有スル部分アリ、第一、第二及ビ第三腹節ノ兩側ニ黃紋ヲ裝フ、尾端ノ掃狀毛ハ黑色、腹面ハ金光アル黃褐色、顏及ビ胸片ハ白色、黑鱗ヲ混ズ、體長(♂)(♀)一寸二分乃至一寸八分、開張一寸八分乃至二寸二分、

分布—沖繩、大島(池端)

(19) びろうどすゞめ

學名　Rhagastis (Metopsillus) mongoliana Butl

第二圖(10)
(♂)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅黑褐、前翅ノ基部ニ近クく字形ニ屈折セル黑色ノ二橫帶アレドモ之レハ徐リ判然セズ、中室ノ一點ハ黑色、其外方ノ一個ハ少シク黃褐ヲ帶ブ、中央ヨリ少シク外緣ニ接シタル處ニ點線ノ三橫條アレドモ之レモ亦徐リ判然セズ、翅端ニハ黑褐ノ三角紋アリテ其內側ニ灰黃色ノ大紋ヲ裝フ、尙內緣角ニ近ク白色ノ一縱線アリ、後翅ハ其中央ニ濃色ノ二橫線ヲ具有スレドモ徐リ判然セズ、內緣角ニ灰黃色ノ大紋ヲ有スルモノ多シ、裏面ハ灰褐、前翅ノ中央、後翅基部ノ大半ハ黃褐ニシテ褐點ヲ散在ス、頭及ビ胸側ハ白色、後胸ニ黃毛ヲ有スル部分アリ、腹面ハ少シク桃色ヲ帶ブ、體長(♂)(♀)八分乃至一寸一分、開張一寸七分乃至二寸二分、幼蟲ハ葡萄ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、

(20) こゝのびがらすゞめ

學名　Hyloicus (Sphinx) Ligustri L.

第二圖(11)
(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

前翅ハ淡灰黃色、前緣ニ判然セザル二條ノ黑斜條アリテ外緣ノ中央ニ向ツテ斜傾ス、中央ニ約五個ノ黑線ヲ縱走シ、中央ニアルモノハ長クシテ中室ノ中央ニ達ス、橫脈モ黑色ニシテ其中央ニ黑色ノ一線ヲ內方ニ透ル、翅ノ中央ハ黑褐、二條ノ弧線ヲ裝ヒ、其前緣ノ淡色ノ部分ニアリテハ其線モ亦淡色ナリ、外緣ニ近ク黑色ノ波狀線アリテ之レハ翅端ノ三角紋ニ連續ス、其外側並ビニ翅端紋ノ上線モ灰白ナリ、後翅ハ帶紅黃白、三條ノ三線ヲ橫走シ、翅底ニアルモノハ小ナリ、裏面ハ灰色、後翅ヨリ前翅ニ向ヒ黑色ノ太キ橫線ヲ出シ、前翅ニテハ叉狀ニ分支ス、頭ハ暗褐、頭頂、胸側並ビニ胸背ノ中央ハ帶紅黃白、胸背ハ黑褐、後胸背ニ黑毛ヲ密生シ、之レニ白毛ヲ混ズ、腹部ハ淡紅ト黑色トノ斑ニシテ、背線ハ太キ淡灰黃色、更ニ其中央ニ黑色ノ一線ヲ縱走ス、觸角ハ白色、內側ハ赤褐、體長(♂)(♀)一寸三分乃至一寸五分、開張三寸一分乃至三寸五分、

分布—北海道、滿洲、歐洲、

(21) ささなみすゞめ

學名　Dolbina (Pseudosphinx) Tancrei Stgr.

第二圖(12)
(♂)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰色、少シク綠色ヲ帶ビタル部分アリ、前翅底ノ三分ノ一ノ處ニ黑色ノ四波狀線アレドモ內側ニアルモノハ判然セズ、中室ニアル白紋ノ周圍ハ黑褐、其外側ニ犬牙狀ヲナセル黑色ノ四橫線アリテ其外側ニアルモノハ淡色ナレドモ其外側更ラニ灰白ナルヲ以テ判然セリ、外線ノ脈上ニ各褐色ノ一紋ヲ具ヘ、其中間ノ綠毛ハ白色、後翅ハ黑褐、內綠角ハ少シク淡色ナリ、裏面ハ暗黑、前翅ニ一條、後翅ニ二條ノ判然セザル濃色綠ヲ裝ヒ、胸背ニ四條ノ暗色綠ヲ縱走ス、腹背ニ三條ノ縱線アリテ、兩側ニアルモノハ點綠ヲナス、體長(♂)一寸、開張二寸三分、幼蟲ハいぼた、とねりこヲ食ス、

分布—北海道、本州、

第二圖(13)(♂)

(22)くるますゞめ

學名　Ampelophaga rubiginosa Brem. et Grey.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅褐色、前翅ニ濃色ノ四橫條ヲ具ヘ、其內中央ニアルモノハ太シ、前綠角ニ近ク大ナル濃色ノ三角紋ヲ裝ヒ其直下ニ長楕圓ノ一紋アリ、後翅ハ暗黑、中央ヨリ少シク下方ニ當リ紫褐ヲ呈スル部分アリ、裏面ハ黃褐、濃色ノ判然セザル二橫線ヲ裝フ、外綠ハ暗黑、胸背ノ中央並ニ兩側ハ灰白、腹背ノ中央ニモ亦同色ノ一線ヲ縱走ス、體下ハ黃褐、體長(♂)(♀)一寸乃至一寸四分、開張二寸三分乃至三寸、幼蟲ハ葡萄ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、滿洲、支那、印度、

(23)すぢぐろすきばほうじやく

學名　Haemorrhagia (Hemaris) alternata Butl.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

翅ハ黑褐、翅底ニ黃毛ヲ裝ヒ、中央ハ廣ク透明ニシテ光線ノ工合ニテ少シク藍色ヲ帶ブ、脈ハ黑褐、前翅外綠ハ黑褐ニシテ透明部ニ向ヒ內方ニ尖レル黑褐線ヲ出ス、體ハ黃色、頭下及ビ前胸下ハ白色、觸角ノ基部ニ白毛ヲ裝フ、腹部ノ中央及ビ尾端ノ掃狀毛ハ黑色、但シ後者ノ中央ニ黃毛ヲ混ズ、體長(♂)(♀)八分、開張一寸五分乃至一寸八分、

分布—北海道、本州、

第二圖(14)(♀)

(24)くろすきばほうじやく

學名　Haemorrhagia (Hemaris) affinis Brem.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

翅ハ透明少シク黃色ヲ帶ビ、周圍及ビ脈ハ黑色、外綠ノ黑色部ヨリ內方ノ透明部ニ向ツテ黑色ノ放線ヲ出ス事ナシ、體ハ黑色、頭及ビ胸背ノ兩側ニ黃白ノ長毛ヲ裝フ、頭下及ビ前胸下ハ白色、腹背並ニ第六、第七兩節ノ兩側ニ黃白ノ毛塊アリ、尾端ノ掃狀毛ハ黑色、中央ニ少シク黃白毛ヲ混ズ、體長(♂)(♀)七分乃至八分、開張一寸四分乃至一寸六分、

分布—北海道、本州、滿洲、

第二圖(15)(♂)

（附　言）ろすちやいるど氏ハ之レヲ H. fusiónnis L. ノ變種トナセドモ元來ひゆーしふぁーみす種ハ翅透明ニシテ黃色ヲ帶ブル事ナク、胸腹ニ黃色ノ長毛ヲ裝ヒ、腹部ノ中央ハ黑色ナルヲ以テ一見らちあんすノ觀ヲ有セリ、

(25) したべにせすちすぐめ

學名　Hippotion (Chaerocampa) celerio L.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅黃褐、前翅內線ノ稍々中央ヨリ前緣角ニ向ヒ白色ノ弧線ヲ出ダシ、其直上ハ黑褐、其直下ニ暗色ノ一線アリテ之レト相平行ス、更ラニ其下方ハ灰白ナリ、外線ニ近ク濃淡アル三條ノ弧狀線ヲ具ヘ之レハ翅端ニ相合ス、尙外緣角ニ近ク黑褐ノ一紋ヲ裝フ、後翅ハ灰黃色、內線ハ淡紅色、中央ニ太キ黑帶ヲ具ヘ、其直下ノ脈ハ黑色、之レハ外緣ヨリ橫走セル黑線ト合スルガタメ恰モ六個ノ灰黃紋ヲ有スルガ如シ、前翅裏面ハ灰色、中央ニ近ク灰黃ノ太キ橫線アリテ之レハ翅端ニ至ルニ從ヒ細マル、後翅ハ灰黃、外線ハ暗色、中央ニ近ク暗色ノ三橫線アリテ、外側ニアルモノハ點線ヲナス、胸背ノ兩側並ニ腹背ノ縱線ハ白色ナリ、體長(♂)一寸一分、開張二寸一分、之レハ餘リ多カラズ、

分布—臺灣（臺南）

第二圖(16)
(♂)

(26) べにすずめ

學名　Pergesa (Chaerocampa) elpenor L.

第三圖
(1)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅黃綠、前翅前緣ノ外半、外緣、中央ノ二帶ハ暗紅色、後翅モ亦暗紅色、翅底ニ太キ黑色帶ヲ裝フ、緣毛ハ白色、裏面ハ暗紅色、前翅ノ基部ハ灰色、其外方ニアル大ナル三角紋ハ淡黃綠、後翅ノ前緣並ニ之レヨリ出ヅル二橫紋ハ淡黃綠、頭ノ兩側、觸角末端ノ白色部ヲ除キ及ビ胸背ノ六縱條ハ暗紅色、胸背ノ兩側ニ白毛塊アリ、腹節ノ基部並ニ三縱條ハ暗紅色、第二腹節ノ兩側ハ黑色、體下ハ暗紅色、脚ハ灰白、體長(♂)(♀)一寸一分乃至一寸二分、開張二寸二分乃至二寸三分、幼蟲ハかはらまつば、みそはぎ等ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、臺灣、支那、歐洲、印度、

第三圖(2)
(♀)

(27) くろほうじやく

學名　Macroglossum saga Butl.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅暗褐、前翅底ニ近ク細キ黑色ノ斜線ヲ具ヘ、幅シ且ツ少シク曲ル、中帶ハ太クシテ其兩緣一層濃色ヲ呈シ之レハ前緣ノ處ニテ少シク屈折ス、此屈折シタル處ノ外側ハ翅端ニ至ル迄灰色、外緣ニ近ク細キ黑線アリテ之レハ前緣ニテ淡色トナリ、弦月樣ノ二紋ヲ現ハス、翅端並ニ第六室ノ紋ハ濃色ニシテ判然セリ、後翅ハ黑色、黃色帶ハ美麗ナリ、裏面ハ赤褐、三條ノ橫線ヲ裝ヒ、外緣ハ灰褐、後翅ニハ黑色ノ小點ヲ散在ス、頭及ビ胸背上ニ濃色ノ一縱條ヲ具ヘ、後胸背ニハ少シク黃毛ヲ混ズ、腹背ニハ一雙ノ黑紋列ヲ縱走シ、第二、第三

及ビ第四節ノ兩側ニ黃紋ヲ裝フ、但シ第五節ノ基部ニ黑紋アリ、尾端ノ中央ニ大黑紋ヲ具ヘ、腮狀毛ハ黑褐ニシテ大ナリ、頭下ハ白色、體下ハ灰褐色、腹面ノ兩側ニ白毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)八分乃至一寸一分、開張二寸一分、幼蟲ハゆすりはノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、臺灣、支那、馬來、印度、

第三圖(3)(♀)

(28) うんもんすゞめ

學名 Calambulyx (Smerinthus) Tartarinovii Brem. et Grey.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰色、頭、胸背ノ三角紋、後胸背ノ圓紋並ニ腹背線ハ暗綠、前翅ノ中央ニ大ナル暗綠ノ雲紋ヲ裝ヒ、其中央ハ淡色、翅底ニ近ク濃色ノ一橫線、翅端ニハ同色ノ三角紋アリ、尙其直下ニ一紋、其內側ニ一橫線アレドモ、往々判然セザルコトアリ、後翅ハ黑藍色、其直上ニ暗綠ノ一縱紋アリ、後翅ハ紅色、外緣ハ灰白、內緣角ハ暗色ニシテ之レヨリ灰白ノ橫紋ヲ出ス、裏面ニハ判然セル斑紋ヲ缺キ、前翅基部ノ大半ハ淡紅色、體長(♂)(♀)一寸、開張二寸二分乃至二寸九分、幼蟲ハけやきノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、支那、滿洲、

第三圖(4)(♀)

(29) こすゞめ

學名 Theretra (Chaerocampa) japonica Boisd.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰褐ニシテ少シク綠色ヲ帶ブ、前翅ノ中室ニ黑點ヲ具ヘ、中央ニ太キ暗黑ノ一斜條アリテ之レハ翅底ニ近キ內緣ヨリ起リ翅端ニ達ス、其下方ハ灰黃ニシテ其內ニ暗色ノ一線ヲ認メ得ベシ、尙外側ニ三條ノ暗色線アリテ之レハ翅端ニテ相合ス、後翅ハ黑色、內緣ハ灰黃色、之レヨリ同色ノ一橫紋ヲ出ス、之レハ後緣ニ平行シテ約第四脈ノ處ニ至ル、尙其紋ノ內ニ細キ一暗色線ヲ認メ得ベシ、緣毛ハ灰白、裏面ハ黃褐、前翅ノ中央ハ黑色、外緣ハ暗灰色、三條ノ橫線アリテ外方ニアルモノハ點線ヲナス、頭及ビ胸背ノ兩側ハ灰白、胸背ノ中央ニ二條ノ黃赤線ヲ縱走ス、腹背線ハ判然セザレドモ暗色ノ三線ヲ認メ得ベシ、兩側ニ金光ヲ放テル太キ黃褐條アリ、氣門ハ黑色、脚ハ灰白、體長(♂)(♀)一寸二三分、開張二寸二三分、幼蟲ハ葡萄ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、臺灣、

第三圖(5)(♀)

(30) ほうじやく

學名 Macroglossum stellatarum L.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅暗灰色、前翅ニ二條ノ黑橫帶アリテ外方ニアルモノハ前緣ニテ判然スレドモ後方ニテハ不明ナリ、中室ニ一黑點ヲ具フ、外緣ハ少シク濃色、後翅ハ美麗ノ黃褐色、外緣並ビニ翅底ハ少シク濃色、裏面ハ黃褐、後翅ニ判然セル一橫帶アリ、第四腹節ノ兩側ニ灰黃紋、第五節ニ黑紋及ビ灰黃紋ヲ裝フ、掃狀毛ハ黑色、第五節ノ兩側ニアルモノハ其末端白色ナリ、頭下及ビ胸下ハ灰白、體長(♂)(♀)九

分、開張一寸六分乃至一寸八分、幼蟲ハかはらまつばノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、沖繩、支那、印度、歐洲、

(31) うらすゞめ

學名 Sphinx (Smerinthus) planus Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第三圖(6)(♀)

前翅暗灰色、少シク綠色ヲ帶ブルモノトアリ、翅底及ビ前綠ハ灰色、內綠ニ濃色ノ二大紋ヲ具ヘ、翅ノ中央ハ濃色、之レニ弦月形ノ灰色紋ヲ裝フ、其外側ニ濃色ノ二橫線ヲ走ラシ、外綠ニ濃色ナル不正形ノ雲狀紋アリ、後翅ノ中央ハ桃赤色、黑輪ヲ有セル大形ノ眼狀紋アリテ藍色ヲ呈シ、其中央ハ暗黑、裏面ハ黃褐、前翅底ノ大半ハ淡紅色、三分ノ二ノ處ニ灰白ノ二橫條アリ、後翅ノ中央ニ太キ暗褐ノ一帶ヲ具ヘ、其外側ニ灰白ノ二條アリ、胸背ノ中央ニ大ナル綠褐紋ヲ裝フ、體長(♂)(♀)一寸二分乃至一寸五分、開張三寸七分乃至三寸三分、幼蟲ハ櫻、苹樹、柳等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、支那、滿洲、

(32) いつぼんせすぢすゞめ

學名 Theretra (Chaerocampa) silhetensis Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第三圖(7)(♀)

體翅ハ灰褐、前翅ノ中央ニ黑褐ノ太キ縱條ヲ具ヘ、之レハ兩端ニテ細マル、其外綠ニ灰白ノ一線ヲ具ヘ、中室ニ黑褐ノ一點アレドモ雄ニテハ其到然セザルモノアリ、外綠ニ近ク三條ノ到然セザル濃色線ヲ出ダシ、之レハ翅端ニテ相合ス、後翅ハ灰黑、前綠及ビ中央ノ太キ橫帶ハ淡色、裏面ハ黃褐、外綠ハ灰色、暗色ノ三橫帶ヲ具ヘ、外側ノモノハ點線ヲナス、後翅ノ中室ニハ黑褐ノ一點アリ、頭及ビ胸背ノ兩側ハ灰白、中胸ノ背上ニ二黃條ヲ縱走ス、腹背綠ハ白色ニシテ一本ナレバせすぢすゞめト容易ニ區別スルコトヲ得ベシ、體長(♂)(♀)一寸乃至一寸二分、開張一寸七分乃至二寸一分、幼蟲ハさといもノ葉ヲ食ス、

分布—九州(福岡、鹿兒島)、臺灣、

(33) おほすかしば

學名 Cephonodes hylas L.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第三圖(8)(♀)

體綠黃、腹部ノ中央ニ黑色ノ太キ橫帶ヲ具ヘ、更ラニ其中央ニ赤褐ノ一橫帶アリ、尾端ノ掃狀毛ハ黑色、基部ハ綠黃、翅ハ透明、前綠及ビ外綠ハ細ク黑色、翅底ニ綠黃毛ヲ密生ス、體長(♂)(♀)一寸、開張一寸八分、幼蟲ハくちなしノ葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、沖繩、臺灣、支那、馬來、印度、

(34) ひめくちばすゞめ

學名 Marumba (Smerinthus) Maackii Brem.

第三圖(9)(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體ハ灰色、胸背ノ縱條ハ赤褐、之レハ後方ニテ擴ガル、腹部ニ斑紋ナシ、前翅灰色、三分ノ一ノ處ニ黃褐ノ太キ一帶アリテ其內ニ三條ノ濃色線ヲ縱走ス、翅端ノ小半ハ黃褐、灰色部トノ限界ニ濃色ノ一斜線アリ、其外側ニ同色ノ斜條アリテ之レハ第三室ニテ彎曲ス、尙其外側ニ灰白ノ一橫線アリ、前緣角ニ近ク褐色ノ一紋アリテ之レハ中央ニテ少シク緊縮ス、外緣ハ波狀ヲナシ、凹處ニ白緣毛ヲ裝フ、後翅ハ淡黃褐、脈ハ黃色、內緣角ニハ二個ノ褐色紋アリ、裏面ハ淡黃褐、外緣ハ濃色、後翅ニ三條ノ橫線アリテ外側ニアルモノハ灰白ナリ、下唇鬚及ビ胸下ハ美麗ノ黃褐、體長(♂)(♀)一寸乃至一寸二分、開張二寸八分乃至三寸二分、

分布—北海道(札幌)、滿洲、

(35) せすぢすゞめ

學名　Theretra (Chaerocampa) Oldenlandiae F.

第三圖(10)
(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

前翅灰褐、少シク綠色ヲ帶ブ、後緣ノ中央ヨリ斜ニ前緣角ニ達スル灰白條ヲ裝ヒ、其內側ニ接シテ太キ黑褐條アリ、此線ノ中央ニ更ラニ濃色ノ細線ヲ有シ、外側ニ黑色ノ稍々細キ線アリテ、其外側ニモ亦同色ノ稍々細キ一線ヲ具ヘ、更ニ其外側ニ灰白ノ一線アリ、翅ノ中央ニ黑色ノ一圓紋ヲ具ヘ、腹背ノ中央ニ二條ノ銀白條ヲ縱走シ、腹側ニ金色毛アリ、體長(♂)(♀)一寸三分、開張二寸五分內外、幼蟲ハ靑苧、半夏(カラスビシャク)等ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、支那、馬來、印度、

(36) ひめくろほうじやく

學名　Macroglossum bombylans Boisd.

第三圖(11)
(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

前翅ハ暗褐、三分ノ一ノ處ニ太キL字形ノ黑褐橫條ヲ具ヘ、翅底ニハ半橫線アレドモ餘リ判然セズ、中央ニハ黑褐ノ二條アリテ外側ノモノハ太シ、緣ス、後翅ハ黑色、翅底ノ大部ハ黃橙色、裏面ハ赤褐、前翅ニ二條、後翅ニ三條ノ褐色線ヲ橫走シ、外線ハ灰褐ナリ、體ハ鬱色、第一、第二及ビ第三腹節ノ兩側ハ黃色、第四腹節ノ兩側ハ黑色、第五腹節以下ハ黑色、體下ハ白色、腹面ハ黑色、中央及ビ兩側ニ白毛塊アリ、體長(♂)(♀)八分乃至一寸、開張一寸三分乃至一寸六分、幼蟲ハあけび、あかね等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、

(37) しもふりすゞめ

學名　Psilogramma (Diludia) menephron Cram.

第三圖(12)
(♂)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰色、白毛ヲ混ジ、胸背ノ兩側ニ黑條ヲ縱走ス、前翅ノ中央ニ黑色ノ二線ヲ縱走シ、其外側ニ判然セザル黑色ノ波狀線アリ、前緣角ニ大ナル稍々半圓形ニ近キ黑紋ヲ裝フ、後翅ハ暗黑、腹背ニ

黑褐ノ三條ヲ縱走シ、兩側ニアルモノハ基部ニテ判然セズ、裏面ハ灰色、前翅ニ一條、後翅ニ二條ノ暗色線ヲ橫走ス、體下ハ灰白、體長(♂)(♀)一寸三分乃至一寸七分、開張三寸二分乃至四寸、幼蟲ハきり、いぼた等ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、支那、印度、

(38)ひめすゞめ

學名　Cinogon (Hyloicus) askoldensis Obth.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

第三圖(13)(♀)

體翅黃褐、胸背ノ兩側ハ白色、前翅ノ翅底、其外側ニアル細キ一斜條、中室外ノ一紋、其外側ノ太キ斜帶、更ニ其外側ニアル細キ一斜條並ニ外緣ハ綠褐、前緣角ノ下方ハ少シク灰色ヲ帶ブ、後翅暗色、中央ニ太キ黃褐ノ一帶アリ、各腹節ノ後緣ハ灰白、體長(♂)(♀)九分、開張一寸八分、幼蟲ハ葡萄ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、滿洲、西比利亞、

(39)ほしひめはうじやく

學名　Gurelca masuriensis Butl. var. sangaica Butl.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

第三圖(14)(♂)

體翅暗褐、前翅底ニ黑褐ノ三橫帶ヲ具ヘ、中室ノ末端ニ灰色短線アリ、其外側ニ∧字形ヲナセル黑

褐條ヲ具ヘ、其一邊ハ外緣ノ下方ニ至ル、外緣ニ濃色ノ紋條ヲ裝ヒ、後翅底ノ二分ノ一ハ黃橙色、腹背ノ中央ニ二個ノ灰白紋アリ、體長(♂)(♀)八分、開張一寸三分內外、幼蟲ハへくそかつらノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、支那、

(40)ひめうちすゞめ

學名　Sphinx (Smerinthus) caecus Mén.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

第三圖(15)(♂)

體翅灰白、少シク紅色ヲ帶ブ、前翅ニ判然セザル太キ四條ノ暗褐帶ヲ裝ヒ、中央ニ暗褐ノ一紋アリテ、中央ノ二橫帶ヲ連續ス、中室ニ腎狀紋ヲ裝ヒ、外緣ノ一帶ハ多少波狀ヲナシ、其外側ヨリ一斜線ヲ出ス、之レハ外緣ノ弧狀紋ト上端ニ合シ、翅端ニハ暗褐ノ三角紋ヲ裝フ、後翅ハ淡紅色、內緣角ノ眼狀紋ハ黑色、中央ハ淡キ藍色、裏面ハ灰色、前翅底ノ大半ハ淡紅ヲ帶ブ、二條ノ太キ黃褐帶アリテ、外側ニアルモノハ波狀ヲナス、後翅ニハ褐色ノ三帶アリテ、內側ノモノ最モ太ク、中央ニ灰白ノ一帶ヲ裝フ、頭及ビ胸背ノ前緣及ビ兩側ハ帶紅灰白、中央ニ暗褐ノ四角紋アリ、腹部ハ暗褐、體長(♂)九分乃至一寸一分、開張二寸乃至二寸三分、此ハ札幌地方ニ產スレドモ稀ナリ、

分布—北海道、滿洲、

(41)くろてんけんもんすゞめ

學名　Kentochrysalis Streckeri Stgr K. consimilis Roth.

第四圖(1)(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰色、前翅ノ中室ニ白紋ヲ具ヘ、其內側ニ太キ暗褐ノ橫帶アレドモ新シキ標本ニアラザレバ判然セズ、又中室紋ノ外側ニハ三條ノ太キ波狀線アリテ、第二室ヨリ內方ニ劍狀ノ一線ヲ出シ、第六室ニモ亦同樣紋ヲ裝フ、後翅ハ暗黑、中央ニ近ク淡色ノ一橫線ヲ裝ヘドモ餘リ判然セズ、裏面ハ暗色、後翅ニ二條ノ濃色紋ヲ橫走ス、頭ハ灰黃、胸背ニ四條ノ褐色線ヲ裝ヒ、腹背ニハ三條ノ暗褐線ヲ縱走シ、之レハ點線ヲナス、體長(♂)(♀)一寸二分、開張二寸三分乃至二寸五分、幼蟲ハいぼたノ葉ヲ食ス、

分布—本州、

(42)もんほそばすゞめ

學名　Oxyambulyx (Ambulyx) Schauffelbergeri Brem. et Grey.

第四圖(2)(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰黃色、前翅底及ビ前線ノ斑紋ハ茶褐色、中室ノ橫脈上ニ褐色ノ一紋ヲ裝フ、其外側ニ褐色ノ三橫線アリテ、第三室ハ一圓ニ淡褐ナルタメ橫紋ハ判然セズ、外線ニ弦月形ノ大褐紋ヲ具ヘ、翅端ニ近ク淡褐紋ヲ散在ス、後翅ハ黃色、外緣ハ褐色、褐色ノ二橫線ヲ裝ヒ、褐色ノ小紋ヲ散在ス、尙第五室ニモ一褐紋アリ、裏面ハ黃色、外緣ハ灰褐、褐紋ヲ散在シ、後翅ニハ二橫條アリ、觸角間ノ一橫紋、翅底鱗並ビニ後胸ハ茶褐色、體下ハ黃色、體長(♂)(♀)一寸四五分、開張三寸五分、

分布—本州、支那、滿洲、

(43)すきばほうじゃく

學名　Haemorrhagia (Hemaris) radians Wk.

第四圖(3)(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體ハ濃黃色、前頭ハ黑色、下唇鬚ハ黃白、眼ノ後緣ニ白毛アリ、腹背ノ中央ハ黑色、第二及ビ第三ノ兩側モ亦黑色ニシテ、之レニ少シク藍色ヲ帶ビタル白毛ヲ裝フ、尾端ノ掃狀毛ハ黑色、其中央ノ基部ニ黃毛ヲ混ズ、體下ハ淡黃色、腹面ハ初メノ第四節ニ於テ黑色、翅ノ中央ハ透明、前緣及ビ基部ニ黃鱗ヲ裝フ、脈及ビ外緣ハ黑褐、前翅ノ外緣ヨリ內方ノ透明部ニ向ヒ放線狀ノ黑褐紋ヲ出ス、後翅ノ基部並ニ內緣ハ黃色ニシテ裏面ト同色、體長(♂)(♀)八分內外、開張一寸五分乃至一寸七分、幼蟲ハあかね、すひかつら等ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、支那、滿洲、

(44)くろめんがたすゞめ

學名　Acherontia Sojeijmae Mats.

第四圖(4)(♀)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

此ハ(1)めんがたすゞめニ酷似スレドモ其異ナル處ハ左ノ如シ、

一、頭及ビ胸背ハ暗褐、胸背ニ於ケル闊帶樣ノ斑紋ヲ具ヘ、第三節以下ノ各背上ニハ少シク藍色ヲ帶ビ、

二、腹部ハ黑色、第二乃至第五節ノ兩側ニ黃紋ヲ具ヘ、第三節以下ノ各背上ニハ少シク藍色ヲ帶

ビタル灰白ノ横紋ヲ裝フ、

三、前翅ハ茶褐色ニシテ少シク細長ク、翅底ニ近キ黄色ノ波狀線ハ遙ニ深ク屈折シ、中室ニアル白紋ハ微小ナリ、翅端ハ赤褐、各室ノ中央ニ黄色ノ細キ縱條ヲ裝フ、

四、後翅ハ小ニシテ黒色、前緣中央ノ二横條並ニ後緣ノ紋列ハ黄色、內緣角ニ近ク藍色ヲ帶ビタル白鱗ヲ裝フ、

五、前翅裏面ノ中室紋、後翅ノ中室ニアル眼狀紋並ビニ其外側ニアル四條ノ横線ハ黒色、但シ中央ノ二線ハ細ク、殊ニ內側ニアルモノハ犬牙狀ヲナス、

六、腹面ニハ黒紋ヲ散在ス、體長(♀)一寸八分、開張三寸五分、

分布—九州(佐賀)、

(附言) 此ハ農學士副島昌氏ノ初メテ發見セルモノナレバ紀念ノタメ命名シタリ、

第四圖(5)(♀)

(45)ももすゞめ

學名 Marumba (Smerinthus) Gaschkewitschii Brem. et Grey.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅暗褐若クハ赤褐、黒褐ノ斑紋及ビ横線アリ、前翅底ニ接シテ判然セザル短カキ横紋ヲ具ヘ、其外側ニく字形ニ屈折シタル一横線アリ、其次ギニ三條ノ横線アリテ、各後緣ニテ相合ス、中室ニ弦月形ノ一紋ヲ具ヘ、其外側ニ二横線アリテ、之レハ稍々相平行ス、尙外緣ニ近ク黒褐ノ細キ二横線アリテ、之レハ第二脈ノ處ニテ鋭山ス、後緣ハ灰黒、外緣及ビ內緣ハ暗褐、內緣角ニ二個ノ黒褐紋

ヲ裝ヒ、胸背ノ中線並ニ後胸背ハ暗褐、體長(♂)(♀)一寸乃至一寸三分、開張一寸五分乃至三寸、幼蟲ハ桃、櫻、海棠等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、支那、滿洲、

第四圖(6)(♀)

(46)ひめほうじやく

學名 Gurelca hyas Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

此ハ(39)ほしひめほうじやくニ酷似スレドモ左ノ如ク區別シ得ベシ、

一、體ノ遙ニ小ナル事、體長六分五厘乃至七分、開張一寸一分餘、

二、腹背ノ中央ニ灰白紋ヲ有セザル事、

三、後翅外緣ノ黒褐部ハ同幅ナル事、

四、體色ノ灰褐ナル事、但シ(39)ニアリテハ普通暗褐ニシテ一層濃色ナリ、

此ハ臺灣ニ普通ナル種類ニシテ未ダ本邦ニ捕獲セシ事ナシ、

分布—臺灣、支那、馬來、印度、

第四圖(7)(♂)

(47)くろをびほうじやく

學名 Macroglossum sitiene Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅灰褐色、斑紋ハ暗褐、前翅底ノ一橫線ハ判然セズ、三分ノ一ノ處ニアル橫線ハ殊ニ內緣ニテ太ク、直角ヲナシテ內方ニ屈折ス、中央ニハ二條ノ橫線アリテ、之レハ第六脈ノ處ニテ彎曲ス、外緣ニ近ク灰白ノ一橫線アリテ、其內側ハ少シク濃色、第六室ニ稍長方形ノ大ナル一紋アリテ、其直下ニ判然セザル灰白ノ一線ヲ裝ヒ、外緣角ノ三角紋ハ判然ス、後翅ハ黑褐、黃帶ハ太クシテ美麗ナリ、裏面ハ暗褐、外緣ハ灰褐、前翅ニ一條、後翅ニ二條ノ褐色帶ヲ裝フ、第二及ビ第三腹節ノ兩側ニ黃色紋ヲ具ヘ、掃狀毛ハ黑褐、體長(♂)(♀)九分內外、開張一寸七分乃至一寸九分、

分布—琉球、臺灣、支那、馬來、印度、

(48) ふたうすゞめ（くろくもすゞめ）

第四圖(8)(♀)

學名 Acosmeryx castanea Roth.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅褐色、斑紋ハ濃褐、前翅底ニ近ク三四個ノ濃色橫帶アリ、外側ニアルモノハ太クシテ判然シ、弧線狀ヲナス、中室ノ一點ハ黃褐、前翅ノ中央ヨリ外緣ノ中央ニ向ヒ太キ一斜條ヲ出シ、此ハ第五脈ノ處ニテ屈折シ、後緣角ニ達ス、其內方ニ細キ三橫線アリテ、多少波狀ヲナス、外緣ニ太キ一橫線アリテ、此ハ前緣ニテ判然シ、其外側ニ灰色帶アリ、此ハ(17)はねながふたうすゞめニ酷似スレドモ翅細長ナルヲ以テ容易ニ區別シ得ベク、同時ニ着色ハ全ク其趣ヲ異ニセリ、體長(♂)(♀)一寸二分乃至一寸四分、開張二寸五分乃至三寸、幼蟲ハぶだうノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、

（附言）之レニハ從來 Acosmeryx anicea Cram ノ學名ヲ附シ來タリシガろすちやいるど氏ハ新種トシテ之レニ A. castanea ノ學名ヲ附シタリ或ハ變種ナルベシ、

(49) ねぐろはうじゃく

第四圖(9)(♂)

學名 Macroglossum passalus Drury.
(*M. rectifascia Feld.*)

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體ハ灰黑、頭及ビ胸背ノ中央ニアル一線ハ濃色、頭下ハ白色、前翅ハ紫褐色、翅底ノ三分ノ一ハ光澤アル黑色、殊ニ外側ノ限界ハ一層濃色ナリ、前緣ノ中央ニ判然セザル黑褐ノ一紋ヲ裝ヒ、其下方ニ一二ノ細橫線アレドモ判然セズ、尙外緣ニ斑紋アレドモ之レモ亦明カナラズ、後翅ハ黑褐、黃帶ハ美ニシテ、中央少シク緊縮ス、裏面ハ赤褐、後翅ニ判然セザル三條ノ濃色帶ヲ裝ヒ、第一、第二、及ビ第三腹節ノ兩側ニ黃色紋ヲ具ヘ、腹背上ニハ二條ノ黑紋列アリ、掃狀毛ハ黑褐、體下ハ淡黃褐、體長(♂)(♀)一寸一分、開張一寸八分乃至二寸、

分布—琉球、臺灣、

(50) をびはうじゃく

第四圖(10)(♂)

學名 Macroglossum insipida Butl. var. poecilus Roth.

昆蟲學上ノ地位　天蛾科

體翅灰褐、斑紋ハ黑褐、前翅ハ翅底ニ細キ二半橫線ヲ具ヘ、其外側ニ太キ一斜橫帶アリテ、此ハ內

縁ニテ增幅ス、又前縁ノ中央ヨリ少シク外縁ニ近キ處ヨリ二横帶ヲ出シ、之レハ第六脈ノ處ニテ弓狀ニ彎曲ス、尙其外側ニ二横帶アリテ、此ハ前縁ニテ判然セズ、第六及ビ第七室ニアル斑紋ハ大ニシテ判然シ、第六室ノ斑紋ヲ貫キテ前縁ヨリ後縁角ニ向ヒ一横線ヲ出ス、後翅ハ黑褐、黃帶ハ中央ニテ少シク縊ル、裏面ハ赤褐、外縁ハ灰褐、前翅ニ一條、後翅ニ三條ノ暗褐條ヲ横走ス、頭及ビ胸背上ニ黑褐ノ一條ヲ縱走シ、翅底鱗及ビ後胸ノ鱗毛ハ赤褐、第一、第二及ビ第三腹節ノ兩側ニ黃紋ヲ具ヘ、第三、第四及ビ第五腹節ノ兩側ニ赤褐毛ヲ裝ヒ、腹背ニハ黑紋ノ二列ヲ縱走ス、搔狀毛ハ黑色、顏ハ白色、胸下ハ灰黃、腹面ハ赤褐、體長(♂)(♀)一寸內外、開張一寸五分乃至一寸八分、

分布—本州、四國、九州、琉球、臺灣、小笠原島、支那、馬來、印度、

第四圖(11)
(♂)

(51) ぎんもんすゞめもどき

學名 Tarsolepis rumicauda Butl.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科 (Notodontidae)

前翅ハ暗褐色、中央ニ近ク三角形ノ銀色紋アリテ、其尖端ハ上向シ、其內方ニアル同樣紋ノ尖端ハ下向ス、何レモ其周圍赤褐ナリ、外縁ハ灰褐色、之レニ波狀ノ一縱線ヲ裝フ、後翅ハ暗色、頭、胸背及ビ腹部ハ暗褐色、胸背ニ三個ノ暗色線ヲ横走ス、腹部ハ長ク、各節ノ兩側ニ暗色紋ヲ具ヘ、後肢ノ腿節ニ紅色毛ヲ裝フ、體長(♂)一寸三分、開張二寸七分、之レハ本邦ニ稀ナリ、

分布—本州、九州、馬來、印度、

第四圖(12)
(♂)

(52) あかをびすゞめ

學名 Celerio (Deilephila) lineata F. var. livornica Esp.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

此ハ(8)いぶきすゞめニ酷似スレドモ左ノ諸點ニテ區別シ得ベシ、

一、體ハ少シク小形ナル事、體長(♂)(♀)一寸一分內外、開張一寸四分乃至一寸五分、

二、前翅中央ノ脈ハ白色、黃白ノ中央紋ハ細クシテ(8)ノ約二分ノ一ニ過ギズ、

三、後翅外縁ノ黑帶ハ遙ニ太キタメ淡紅色ノ部分小ナリ、

四、腹背ノ中央ニ三双ノ白紋列アレドモ(8)ニテハ唯一列ナリ、

幼蟲ハあかね、かはらまつばノ葉ヲ食ス、

分布—本州、九州、臺灣、支那、印度、歐洲、

第四圖(13)
(♂)

(53) あかしたばうしやく

學名 Macroglossum belis L.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅赤褐、前翅ノ翅底ニ近キ横帶ハ暗褐ニシテ廣ク、其中央ハ淡色、中央ニく字形ノ二横帶アリテ、此ハ第五脈ノ處ニテ屈折ス、外縁ニ近ク二横帶アレドモ餘リ判然セズ、翅端紋ハ暗褐、後翅ハ暗褐、横帶ハ中央ニテ少シク縊ル、裏面ハ赤褐、第二及ビ第三腹節ノ兩側ニ黃紋ヲ具ヘ、第四及ビ第五節

ニ黒褐紋ヲ裝フ、掃狀毛ハ暗褐、體長九分乃至一寸一分、開張一寸五分乃至一寸八分、

分布—琉球、臺灣、支那、馬來、印度、

(54) たかさごすゞめ

學名 Cechenena minor Butl.
(*C. lineosa Wlk.*)

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第五圖(1)(♂)

前翅ハ暗黃色、前緣ハ黃綠、中室ニ紫褐ノ小點ヲ具ヘ、外緣ニハ同色ノ小紋ヲ散在ス、六條ノ太キ紫褐線ヲ裝ヒ、一ハ前緣ニ近ク、一ハ外緣ニ位シ、殘餘ノ四條ハ後緣ヨリ出テ、皆前緣角ニ相合ス、後翅ハ黑色、中央ニ近キ橫紋ハ橙黃色、外緣ハ黃褐ニシテ、濃色ノ小斑ヲ散在シ、中央ニ暗黑ノ三條ヲ斜走ス、後翅ハ灰黃白、體ハ黃綠、頭及ビ胸背ノ兩側ハ少シク紅色ヲ帶ビタル灰白、腹背ニハ同色ノ四條ヲ縱走ス、第三節以下ノ背上ニハ暗褐ノ一背線ヲ裝ヒ、其兩側ニ紫褐ノ小斑列ヲ並列ス、體長一寸五分、開張三寸二三分、

分布—九州、臺灣、支那、馬來、印度、

(55) をばなわすゞめ

學名 Hippotion (Chaerocampa) Obanawae Mats.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第五圖(2)(♂)

前翅ノ前半ハ少シク綠色ヲ帶ビタル黑褐、前緣ニ小褐點ヲ散在ス、中室ノ一點ハ黑色、後半ハ灰白

色、外緣ハ暗灰色、後緣角ニ近ク黑褐紋ヲ裝フ、後翅ハ暗灰色、後緣ニ近ク黑褐ノ橫帶アリテ、其上方ハ黃白、前翅ノ裏面ハ暗灰色、外緣ニ近ク淡黃色ノ太キ斜帶アリテ、之レニ暗灰色ノ小點ヲ散在ス、後翅ハ淡黃色、後緣ハ暗灰色、全面ニ同色ノ小點ヲ散在ス、頭及ビ胸背ハ暗綠褐、其兩側ハ黃白、腹部ハ灰黃、黑褐點ヲ散在ス、體長(♂)一寸、開張一寸八分、

分布—臺灣(臺南)、

(56) みどりすゞめ

學名 Rhyncholaba (Chaerocampa) acteus Cram.

第五圖(3)(♀)

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅ハ美麗ノ綠色、前翅ノ前緣ハ綠褐、中室ノ一點ハ黑色、翅端ハ黃白、外緣ハ黑褐、其內ニ濃色ノ波狀線ヲ裝フ、中央ニ濃色ノ縱線四條アリテ、其內兩端ニアルモノハ判然シ、中央ノ二條ハ不明、翅底ニ暗紅色ノ細毛ヲ密生ス、後翅ハ黑褐、綠毛及ビ後緣ニ近キ一橫帶ハ橙黃色、裏面ハ美麗ノ橙黃色、前翅底ノ大半ハ帶綠暗褐、灰褐ノ三條ヲ斜走シ、外側ニアルモノハ太クシテ判然ス、後翅ノ後緣並ビニ中央ノ二橫線ハ紫褐、赤褐ノ小點ヲ散在ス、頭、胸背及ビ胸腹ノ中央ヲ縱走セル一條ハ帶紅灰白、腹部及ビ兩側體下ハ橙黃色、體長(♂)(♀)一寸二分乃至一寸四分、開張二寸三分乃至二寸五分、

分布—臺灣(新竹、北埔)、支那、馬來、印度、

(57) たいわんべにすゞめ

學名 Theretra (Chaerocampa) suffusa Wk.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第五圖(4)(♂)

前翅ハ灰色、前緣ハ暗褐、中室ニ一黑點ヲ具ヘ、暗褐ノ六縱條アリテ、前緣角ヲ等分セルモノハ太ク、之レハ二線ヨリ成レドモ、中間ノ限界判然セザルヲ以テ一線ナルガ如シ、又中央ニアル二條ハ細クシテ且判然セズ、後緣ハ白色、後翅ハ紅色、翅底ノ一大紋並ニ後緣ハ暗褐、裏面ハ赤黃、外緣ハ灰色、褐色ノ小點ヲ散在ス、體ハ暗褐、胸腹ノ背緣ハ太クシテ灰白、體下ハ赤黃、體長(♂)一寸四分、開張二寸七分、

分布—臺灣新竹、支那、

(58) こほうじやく

學名 Rhopalopsyche nycteris Koll.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第五圖(5)

前翅ハ灰褐、斑紋ハ暗褐、翅底ノ半橫線ハ判然セズ、前橫線ハ太クシテ、後緣ニテ少シク內方ニ彎曲ス、中央ニ三波狀線アリテ中央ノモノ判然ス、翅端ニ近ク四角形ノ褐色紋ヲ裝フ、後翅ハ黑褐、黃帶ハ廣シ、頭、胸及ビ腹部ハ灰褐、初メノ第三腹節ニハ黃紋ヲ具ヘ、第六節ニハ白毛ノ二紋アリ、掃狀毛ハ暗褐、裏面ハ赤褐、前翅ニハ一條、後翅ニハ三條ノ暗褐帶ヲ裝ヒ、翅底ハ黃色ナリ、體長

(♂)一寸、開張一寸四分、

分布—臺灣、支那、印度、

(59) こもえすゞめ

學名 Deilephila (Daphnis) hypothous Cram.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第五圖(6)(♂)

前翅ハ紫褐ニシテ少シク綠色ヲ帶ブ、前翅ノ三分ノ一ノ處ニ帶紅灰白ノ太キ斜帶アリテ、之レハ三分ノ二ノ處ニアル同色斜條ト相連リテ稍巴狀ノ斑紋ヲナス、翅端ニ白色ノ一紋ヲ具ヘ、其下方ニ三角形ノ褐紋ヲ裝フ、翅底ハ帶紅灰白、後翅ハ黑褐、內緣角ノ直上ニ黃白ノ橫帶アリテ、其終止スル處ノ一圓ハ赤褐、裏面ハ桃色、前翅底ノ大半ハ暗褐、翅端ニ白紋ヲ具ヘ、之レヨリ灰白ノ斜條ヲ後緣ニ送ル、後翅ニモ亦同樣ノ一帶アリ、頭、胸及ビ腹ハ紫褐色、翅底鱗ノ前方ハ黑褐、各腹節ノ後緣ニ灰白毛ヲ裝ヒ、第一節ニアルモノハ白色ナリ、體下ハ桃色ニシテ美麗ナリ、體長(♂)一寸八分、開張三寸二分乃至四寸、此ハ臺灣ニ產スレドモ稀ナリ、

分布—臺灣新竹、馬來、印度、

(60) きすゞめ

學名 Leucophlebia lineata West.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

第五圖(7)(♀)

前翅ハ淡桃色、中央ニ黃色ノ太キ一縱條アリテ、之レハ翅底ニテ細マリ、其直下ハ暗色、第三及ビ第四脈ハ黃白、外緣ハ紅色、後緣ハ灰白、後翅及ビ裏面ハ暗黃色、前翅ノ外半ハ帶紅白色、中央ニ黃色ノ縱條ヲ有ス、體ハ灰白、腹背ハ暗黃色、體下ハ淡紅色、頭、胸下及ビ脚ハ暗紅色、體長(♂)(♀)一寸、開張二寸三分乃至二寸六分、幼蟲ハ甘蔗其他禾本科植物ノ葉ヲ食ス、

分布—臺灣(新竹、臺北)、支那、馬來、印度、

(61) はいいろすゞめ

學名 Hippotion (Charocampa) velox F. (*C. Swinhoei Butl.*)

第五圖(8) (♂)

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅灰褐、前翅中室ノ一點ハ黑褐、其外方ニ判然セザル稍ヤ濃色ノ縱紋ヲ具ヘ、外緣ハ灰色、其上方ニ黑褐ノ二斜條アリテ、其外側ニアルモノハ細シ、又外緣角ニ近ク黑色ノ一紋ヲ裝ヒ、外緣ハ灰黃下黑褐ノ斑ヲナス、後翅ハ黑褐、後緣ハ灰黃、緣毛ハ灰白、裏面ハ黃褐、前翅々底ノ大半並ニ外緣ハ暗黑、小褐點ヲ散在ス、頭及ビ胸背ノ兩側ハ灰黃、體下ハ淡色、體長(♂)一寸一分、開張二寸二分、此ハ臺灣ニ產スレドモ稀ナリ、

分布—臺灣(臺南)、支那、馬來、印度、

(62) りうきうおほすかしば

學名 Cephonodes xanthus Roth.

第五圖(9) (♂)

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

此ハ(33)おほすかしばニ酷似スレドモ左ノ數點ニヨリテ容易ニ區別シ得ベシ、

一、淺色ニシテ少シク黃味勝チナリ、

二、前翅ノ脈ハ黃色ニシテ、翅端ノ黑色部ハ廣シ、

三、腹背ハ黑色ニシテ、第四及ビ第五節ニ紫褐帶ヲ有セズ、

四、體下ハ美麗ノ橙黃色、

五、脚ハ橙黃色、

分布—琉球、

(附言) 此ハ沖繩地方ニ稀ナル種類ニシテ、余ハ唯ダ黑岩恒氏ノ採集ニ係ル標本一匹ヲ有スルニ過ギズ、

第五圖(10) (♂)

(63) ふたつめびろうどすゞめ

學名 Rhagastis binoculata Mats.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅暗褐、前翅ノ中央ニ大ナル灰色ノ二大紋ヲ裝ヒ、外緣ハ灰色、翅端ニ三角紋ヲ具ヘ、其內側ハ黃褐、後翅ハ黑褐、中央ハ黃褐、緣毛ハ白色、裏面ハ赤黃、外緣及ビ前翅底ハ灰色、小褐點ヲ散在ス、頭及ビ胸背ノ兩側ハ灰白、後胸ニ赤褐ノ二毛塊アリ、腹部ハ灰褐、第四節以下ノ各節ニ各二個ノ黑褐點ヲ裝ヒ、體下ハ赤黃、腹面ハ淡色、體長

(♂)一寸、開張二寸一分、

分布—臺灣(北埔)、

第五圖(11)(♂)

(64)ひめしたべにすゞめ

學名 Hippotion (Chaerocampa) boerhaviae F.

昆蟲學上ノ地位 天蛾科

體翅黃褐、前翅ノ中室點ハ黑褐、其外側ノ一圓ハ暗黃褐、中央ニ暗褐ノ太キ一斜條アリテ、此ハ翅端ニテ判然セズ、其外側ニ約五條ノ細キ斜線アリテ、外側ニアルモノハ判然セリ、外緣ハ灰褐、緣毛ハ灰黃、裏面ハ橙黃色、中央ハ桃色、外內ニ褐色ノ一橫帶ヲ裝フ、後翅ハ紅色、外緣ハ黑褐、緣毛ハ灰黃、裏面ハ橙黃色、中央ハ桃色、外緣ハ黑褐色、小褐點ヲ散在ス、頭及ビ胸背ノ兩側ハ帶紅灰白、腹部ノ兩側ニ金光ヲ放テル黃色ノ縱條アリ、體下ハ灰黃色、體長(♂)(♀)一寸、開張一寸七分乃至二寸、

分布—九州、沖繩、臺灣、支那、馬來、印度、

(附言) 此ハ從來 Chaerocampa thyelia L. ノ學名ヲ以テ知ラレタル種類ナルガ、最近ノ研究ニヨレバ本學名ヲ有スルモノハ南亞米利加ニ產シ未ダ東洋地方ニ發見セラレタルコトナシ、蓋シ其誤謬ハ昔テくらーめる氏ガ同名ヲ以テ C. boerhaviae F. ヲ發表セシニ基因スルモノナリ、

第六圖(1)(♂)

(65)しんじゆさん

學名 Attacus cynthia Drury.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科 (Saturnidae)

體翅綠褐、前胸ニ白環ヲ具ヘ、腹部ニ白毛塊ヲ散在ス、前翅底ニ近クく字形ノ白帶アリテ、其外側ハ暗黑、中央ニ弦月形ノ白紋アリテ、其後緣ハ黑色、後緣ハ黃色、其外方ニ少シク桃色ヲ帶ビタル白色ノ廣帶アリ、前緣角ニ近ク一黑紋アリテ、其內側ニ白紋ヲ裝フ、後翅ノ斑紋ハ前翅ト略ボ同樣ナレドモ中央ノ弦月紋ハ短クシテ、稍へ字形ヲナス、頭頂、前胸ノ輪紋、腹部ノ縱條及ビ斑紋ハ白色、體長(♂)(♀)九分乃至一寸二分、開張四寸乃至四寸五分、幼蟲ハしんじゆの葉ヲ食ス、

分布—本州、四國、九州、支那、

第六圖(2)(♂)

(66)うすたびが (一名やまびしやく)

學名 Rhodinia (Rhodia) fugax Butl.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

體翅橙黃色、前後兩翅ノ中央ニ各一個透明ノ圓紋ヲ裝ヒ、前翅ニアルモノハ大ナリ、前翅ニ二條ノ暗色帶ヲ具ヘ、外緣ニ近ク半圓形ノ透明紋アリテ、其前方ハ暗褐、後翅ノ斑紋ハ前翅ノ夫レト同樣ナレドモ、外緣ニアル橫帶ハ太シ、體ハ長毛ヲ裝ヒ、斑紋ヲ缺ク、體長(♂)(♀)九分乃至一寸、開張三寸二分乃至三寸五分、幼蟲ハ楡、櫟、樺等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、

第六圖(3)(♀)

(67)ひめやまい

學名 Saturnia (Caligula) Boisduvalii Ev.

昆蟲學上ノ地位　天蠶蛾科

體翅黃褐乃至赤褐、前翅ノ中央ニ一個ノ眼狀紋アリテ、中央及ビ周緣ハ黑褐、其內方ニ赤色及ビ白色ノ部分アリ、褐色ノ二斜條アリテ、一ハ前緣ノ三分ノ一ノ處ヨリ發シ、眼狀紋ノ下ヲ過ギテ內緣角ニ近ク出デ、他ハ翅底ニ近ク稍弧狀緣ヲナス、前緣ハ灰色、外方ニアル斜條ノ下方ハ綠褐ニシテ、其外側ハ波狀ヲナス、前緣角ニ黑紋及ビ白紋アリテ、少シク紅色ヲ帶ブ、後翅ハ前翅ト略ボ同樣ナレドモ、綠褐部ノ外側ハ白色ナリ、體長(♂)(♀)七分、開張三寸、

分布—北海道、本州、西比利亞、

(68) いぼたが (蜀江蛾)

學名 Brahmaea japonica Butl.

昆蟲學上ノ地位　水蠟蛾科 (Brahmaeidae)

體ハ黑色、灰黃ノ橫帶及ビ縱條アリ、前翅三分ノ一ノ處ニ約七條ノ黑橫帶ヲ具ヘ、此等ハ多少波狀ヲナス、其外側ノ下方ニ圓形ノ大紋アリテ、暗褐ヲ呈シ、其周緣ハ黑色、其中央ニ黑褐ノ二三紋ヲ具ヘ、尙一二ノ白紋ヲ裝フ、其直上ニ暗綠ノ大紋アリテ、暗相平行ス、其上方ニ三個ノ矢筈樣ノ白紋ハ白色、其外側ノ下方ニ暗色ノ波狀線約八條アリテ、稍相平行ス、其上方ニ三個ノ矢筈樣ノ白紋ヲ具ヘ、翅端ニ一黑紋ヲ裝フ、後翅底ノ二分ノ一ハ暗黑、殘部ニ約十個暗色ノ波狀線ヲ橫走シ、原ハ黑ト白ノ斑ヲナス、體長(♂)(♀)一寸一分乃至一寸三分、開張三寸乃至四寸、幼蟲ハ水蠟樹ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道　本州、

第六圖 (4) (♀)

(69) おほみづあを (ゆうがほぐうたん)

學名 Actias artemis Brem.

昆蟲學上ノ地位　天蠶蛾科

翅ハ綠白乃至淡綠、外綠ハ黃色、前翅ノ前綠ハ紫褐乃至暗紅色、中室紋ハ黃色、其中央ハ透明、內側ハ黑色、後翅ノ中室紋ハ大ナリ、裏面ハ表面ト略ボ同色、但シ雄ニテハ外綠ニ近ク暗黃ノ橫線ヲ裝フ、尾樣狀ノ後翅ハ前翅ヨリ少シク長シ、體ハ白色ノ綿樣毛ヲ裝ヒ、前胸及ビ中胸背ノ前綠ハ紫褐乃至暗紅色、脚ハ暗紅色、體長(♂)(♀)一寸乃至一寸三分、開張三寸乃至四寸二分、幼蟲ハ莘樹、櫻、梨、赤楊等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、西比利亞、

第六圖 (6) (♀)

(70) さくさん (柞蠶)

學名 Anthaerea Pernyi Guér.

昆蟲學上ノ地位　天蠶蛾科

體翅黃褐、前胸背及ビ前翅前綠ノ大半ハ暗褐、灰白鱗ヲ混ズ、前翅ノ中央ニ透明ノ一圓紋ヲ具ヘ、其內側ニ白條ヲ裝ヒ、外側ニ黑輪アリ、翅底ニ近ク暗紅色ノ弧狀線ヲ橫走シ、中室ニ同色ノ短カキ橫線ヲ裝フ、何レモ其內側ハ白色、外綠ニ近ク暗褐ノ太キ一帶アリテ、其外側ハ白色、後翅ノ斑紋ハ前翅ト同樣ナレドモ眼狀紋ハ大、黑輪ハ太ク、內側ニハ更ニ一條ノ弧狀線ヲ有ス、裏面ノ外綠ニ

第七圖 (1) (♀)

近接シテ暗褐ノ二紋列ヲ具ヘ、翅底及ビ中央ニ判然セザル濃色帶ヲ裝フ、體長(♂)(♀)一寸二分乃至一寸四分、開張四寸乃至四寸五分、幼蟲ハ楝、樫等ノ葉ヲ食ス、

分布―日本全國、支那、

(71) もくめが

學名 Dicraneura vinula L. var. felina Butl.

第七圖(2)(♀)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅灰白、胸腹背ニ黑紋ヲ裝フ、前翅ニ黑色ナル木目樣ノ斑紋ヲ裝ヒ、殊ニ外緣室ニアルモノハ判然ス、翅脈上ニ黑紋ヲ具ヘ、外緣ニ沿ヒ七八個ノ黑紋ヲ並列ス、體長(♂)(♀)七分乃至一寸、開張一寸八分乃至二寸五分、幼蟲ハ柳ノ葉ヲ食ス、

分布―北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

(72) やまもい (天蠶)

學名 Anthaerea Pernyi Guér. var. Yamamai Guér.

第七圖(3)(♂)

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

此ハ(70)柞蠶ニ酷似スレドモ甚差ハ左ノ如シ、

一、色ハ(♀)ニテハ橙黃色ヲ呈シ、(♂)ハ赤褐ニシテ前緣及ビ翅底ノ一部ハ黃色ナリ、

二、雄ニテハ前翅ノ中央ヲ斜走スル一線判然シ、多少波狀ヲナス、

三、雌ニテハ外緣ニアル斑紋列判然セズ、

(附言) 色ハ個種ニヨリ甚ダシク變化スルモノナレバ茲ニ詳細ヲ記セズ、

分布―全國、

(73) せだかしやちほこ

學名 Nadata (Trabala) cristata Butl.

第七圖(4)(♀)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

雌ハ體翅黃褐、胸背ニ鷄冠樣ノ一毛塊ヲ裝ヒ、甚上緣ハ濃色、前翅ニ二條ノ橫帶ヲ具ヘ、中室ニハ黃色ノ二紋ヲ裝ヒ、甚外側ニ判然セザル濃色ノ一橫帶アリ、外緣ハ鋸狀ニ刻ラレ、甚部分ノ緣毛ハ白色、雄ハ體翅綠黃、中室ニ二白點ヲ具ヘ、甚外側ノ一紋及ビ後綠ハ黃色、前緣及ビ翅端ハ灰白、後翅ハ暗黑、周綠ハ黃色、裏面ハ雌ニテハ淡黃褐、雄ニテハ灰色、何レモ前後ノ兩翅ニ濃色ノ一斜條ヲ裝フ、體長(♂)(♀)九分乃至一寸二分、開張二寸乃至二寸八分、

分布―北海道、本州、

(74) たいわんいぼたが

學名 Brahmaea certhia F. (*B. Wallichii Gray.*)

第七圖(5)(♀)

昆蟲學上ノ地位 水蠟蛾科

此ハ(68)いぼたがニ酷似スレドモ左ノ數點ニ於テ容易ニ區別スルコトヲ得ベシ、

一、體翅大ナル事、(♀)體長一寸四分、開張五寸、
二、體ハ黒色ニシテ、各腹部ノ接合部及ビ背線ハ黄色、頭及ビ胸下ハ眞黒色、腹面ハ黄色ニシテ、黒色ノ五縦條ヲ裝フ、
三、前翅ニ白色部ヲ缺キ、翅底ノ波狀線ハ相集合シテ漸ク後緣ノ三分ノ一ヲ占ムルニ過ギズ、外緣ニ近キ波狀線ハ九條ヨリ成リ、翅端ニアル矢筈樣ノ白紋ハ(68)ノ如ク相集合セズ、
四、後翅ノ波狀線ハ十一條ヨリ成リ、外緣ハ暗緣ナリ、
五、裏面ノ翅底ハ眞黒色ナリ、此ハ臺灣ニ產スレドモ稀ナリ、
分布—臺灣埔里社、阿里山、朝鮮、支那、滿洲、印度、

(75) かしはまいまい

學名 Lymantria mathura Moor.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科 (Lymantriidae)

雌ノ前翅ハ灰白、翅底ノ二横線、前緣ノ四紋、中央ニアル一二ノ波狀線、外緣ニアル一横線並ビニ外緣ノ紋列ハ暗褐、後翅ハ淡紅、外緣ニ近ク暗黒ノ一帶ヲ具ヘ、中室ニ不明ナル一點ヲ裝フ、胸背ハ灰白、黒點ヲ裝フ、腹部、脚、觸角ノ基部及ビ下唇鬚ハ淡紅色、雄ノ前翅ハ暗灰色ニシテ、暗黒ノ紋條多シ、後翅ハ暗黄、中室ニ暗色紋ト外緣ニ近ク暗色帶ヲ裝フ、胸部ハ灰色、腹部ハ濃黄色、腹背上ニ一條ノ黒紋列アリ、脚ハ黄色、觸角ハ暗色、體長(♂)(♀)六分乃至一寸一分、開張九分乃至二寸、幼蟲ハ櫸、楪、楢等ノ葉ヲ食ス、

第七圖 (6) (♀)

分布—北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、滿洲、

(76) よなくにさん

學名 Attacus atlas L.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

體翅赤褐、前翅ノ前緣及ビ翅底ハ暗褐、翅底ニ近クく字形ノ白横帶アリテ、其内側ハ赤色、其外側ハ黒色、中室ノ中央ニ半透明ノ一大紋ヲ具ヘ、其周圍ハ黒色、尙其外側ニ小形ノ同樣紋アリ、翅端ハ黄色、鉤狀ニ曲リ、外緣ハ暗緣、其中央ニ黒色ノ一波狀線ヲ横走ス、其内側ハ廣ク赤褐、黄色及ビ黒色ノ鱗毛ヲ散在ス、後翅ハ前翅ト略ボ同樣ノ斑紋ヲ裝フ、體長一寸四分乃至一寸九分、開張七寸乃至八寸、幼蟲ハ樟科及ビ大戟科ノ植物ヲ食ス、

第八圖 (1) (♂)

分布—琉球、臺灣、支那、馬來、印度、

(77) きあしどくが

學名 Leucoma auripes Butl.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅ハ淡キ灰白、前翅ノ翅端ハ灰白、天鵞絨樣ノ光澤ヲ有ス、後翅外緣ノ一部モ亦少シク灰色ヲ帶ブ、裏面ハ表面ニ酷似ス、觸角ハ白色、小枝ハ暗黒、脚ハ橙黄色、體長(♂)(♀)五分、開張一寸二分乃至一寸六分、此ハ餘リ多カラズ、

第八圖 (2) (♀)

分布―北海道、本州、

(78)をながみづあを

學名 Actias selene Hb.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

此ハ(69)おほみづあをニ酷似スレドモ左ノ數點ニヨリテ區別スルコトヲ得ベシ、

一、體翅大形ナル事、體長(♂)(♀)一寸一分乃至一寸四分、開張四寸乃至五寸、

二、前翅前緣ノ前半ハ白色、中室紋ト外緣ノ中間ニ明瞭ナル灰黃ノ一橫帶ヲ具ヘ、後翅ニアルモノハ少シク淡色ナリ、

三、尾樣狀ノ後翅ハ著シク延長シ、長サ二寸五分乃至三寸五分アリ、

四、前翅ノ裏面ニハ二條ノ橫帶ヲ具ヘ、前緣ハ白色ナリ、

分布―本州、四國、九州、琉球、臺灣、支那、馬來、印度、

第八圖(4)(♂)

(79)すかしさん

學名 Prismostricta hyalinata Butl.

昆蟲學上ノ地位 家蠶蛾科 (Bombycidae)

體翅暗褐、前翅ノ翅端ニ近ク二個ノ透明紋アリテ、外側ニアルモノハ小ナリ、中央ハ黃色、中室點ハ黑褐、之レヲ貫キテノ一橫線並ニ其外側ニアル一線ハ黑褐、後翅ハ外緣ヲ除キ前緣ノ大半ハ黃色、

內線角モ亦廣ク黃色ニシテ、之レニ黑褐ノ二橫線ヲ裝フ、橫脈ハ暗褐、裏面ハ黃色、前翅透明紋ノ下方ハ廣ク暗褐、後翅ニ暗褐ノ二橫條ヲ裝フ、頭前胸背並ニ脚ハ黃色、體長(♂)四分、開張九分、此ハ本邦稀ナル種類ナリ、

分布―本州、九州、

(80)えぞよつめ

學名 Aglia tau L. var. japonica Leech.

第八圖(5)(♂)

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

體翅黃褐、前翅ノ中室ニ黑紋アリテ、其中央ニ白色ノ弦月紋ヲ裝フ、其內側ニ濃色ノ一斜條アリテ、更ラニ其內側ハ灰白、中室紋ノ外側ニ濃色ノ一斜條アレドモ、雌ニテハ之レヲ缺ク、外緣ニ近ク一橫線アリテ、其外側ハ灰白、之レハ殊ニ前緣ニ接シテ判然セリ、翅端ニ三角形ニ近キ灰白紋ヲ具ヘ、外緣ノ一圓ハ小褐點ヲ散在ス、後翅ノ眼狀紋ハ大、其中央ニT字形ノ白紋アリ、其外側ニアル弧狀帶ハ黑色ニシテ、其外側ハ灰白、翅端モ亦灰白ニシテ、之レニ小褐紋ヲ散在ス、裏面ハ前翅ニ於テ少シク淡色、後翅ハ雄ニテハ暗褐、翅底ハ灰白、小褐紋ヲ散在ス、中室紋ハ單ニ白色ノT字形ヲ呈シ、其上方ニ濃色ノ一橫帶アリテ、外緣ニ近ク灰白ノ弧狀線ヲ裝フ、脚ハ灰白、腿節ニハ濃褐毛ヲ密生ス、體長(♂)(♀)八分乃至一寸、開張二寸六分乃至三寸八分、

分布―北海道、本州、

(81) おほくはこもどき

學名 Oberthüria falcigera Butl.

昆蟲學上ノ地位 家蠶蛾科

前翅ハ暗褐、光線ノ工合ニテ少シク紫色ヲ帶ブ、中室紋ハ暗色ナレドモ餘リ判然セズ、其外側ノ橫帶ハ太クシテ、暗黑、其外方ニ更ラニ一條ノ細線アリテ、其外側ハ灰白、外線ノ中央ニ弦月樣ノ褐紋ヲ裝フ、中室紋ノ內側ニ暗色ノ橫帶アリテ、其內側ハ灰色、此ハ中脈ノ處ニテ屈折ス、後翅ニハ前翅同樣ノ二橫線ヲ裝ヒ、中室紋ハ小ナリ、裏面ハ暗黃、前翅ヨリ後翅ニ連リテ二條ノ暗褐帶ヲ併走ス、體ハ暗黃、腹部ハ暗褐ナリ、體長(♂)(♀)五分乃至七分、開張一寸五分乃至一寸九分、

分布—北海道、本州、

第八圖 (6) (♀)

(82) くすさん (樟蠶)

學名 Caligula japonica Moor.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

體翅ノ色ニ二樣アリテ、一ハ暗黃綠、一ハ赤褐、前翅ニ濃色ノ二橫線アリテ、一ハ翅底ニ近ク、他ハ中央ヲ斜走ス、此二線ノ間ハ灰色、其中央ニ半月形ノ一紋アリテ、更ニ其中央ハ透明、周圍ハ少シク赤味ヲ帶ブ、外緣角ニ桃色ノ部分アリテ、之レニ白色ヲ混ズ、後翅ハ前翅ヨリ少シク濃色、中央ニ黑紫色ノ眼狀紋ヲ有シ、其中ニ弦月形ノ透明部アリ、雌ハ黃褐、紋條ハ少シク淡色、雄ノ如ク

第九圖 (1) (♀)

桃色ヲ帶ビタル部分ナシ、體長九分乃至一寸、開張三寸八分乃至四寸五分、幼蟲ハ櫟、栗、苹樹、白楊、胡桃、楝等ノ葉ヲ食ス、

分布—全道、臺灣、西比利亞、

第九圖 (2) (♂)

(83) むらさきしやちほこ

學名 Uropyia meticulodina Obth.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

前翅ハ黑褐、前緣及ビ後緣ハ淡黃綠、前翅ニ三個、後翅ニ四個灰白ノ橫線ヲ裝ヒ、其內側ハ何レモ濃色ナリ、外緣ハ濃紫褐ニシテ光澤ヲ有シ、中室紋ハ暗褐、後翅ハ灰黃、頭及ビ前胸背ハ淡黃褐、胸背ハ濃紫褐、後胸及ビ腹部ハ灰黃、體下ハ腹背ヨリ少シク濃色、體長(♂)七分、開張一寸七分、

分布—北海道、本州、西比利亞、

第九圖 (3) (♂)

(84) おほなかじろもくめ

學名 Cerura bifida Hb.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

前翅ハ灰白、翅底ニ一個、其外側ニ四個ノ黑點アリテ橫列ス、其外側ニ太キ一帶ヲ裝ヒ、其限界ハ黑色ニシテ、少シク黃色ヲ混ジ、內部ニハ小黑點ヲ群散ス、前緣ニ四個ノ黑紋ヲ裝ヒ、中室ノ外方ニ太キ暗灰色ノ一帶アリテ、之レハ下方ニテ二條ノ波狀線トナル、橫脈及ビ其下方ニアル一橫紋並

ニ外線ノ紋列ハ黑色、後翅ハ灰白、橫脈、其外方ニアル一橫帶並ニ外線ノ紋列ハ灰黑色、體ハ灰白、中胸背ニ灰色及ビ黃色ノ交互帶ヲ裝フ、體長(♂)(♀)四分乃至五分、開張一寸三分乃至一寸五分、幼蟲ハ柳ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、歐洲、

(85) つまきしやちほこ

學名 Phalera assimilis Brem et Grey.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅灰白、前翅ノ前緣角ハ淡黃白、其內側ハ少シク下方ニ突出ス、半橫線、前橫線ハ判然シ、其外方ニアル細線ハ判然セズ、但シ黃白紋下ニアルモノハ多少判然ス、緣毛ハ黃褐、裏面ハ黃白、前翅前緣ノ基部並ニ外緣ハ暗灰色、後翅ハ灰色、濃色ノ二線ヲ橫走ス、頭ハ黃褐、後頭及ビ前胸背ハ黃色、胸背ハ灰色、腹部ハ黃褐、尾端ハ灰白、體長(♂)(♀)六分乃至七分、開張一寸四分乃至一寸八分、幼蟲ハ櫟ノ葉ヲ食ス、

第九圖(4) (♂)

(86) くはこもどき

學名 Pygaera (Gonoclostera) trimonides Brem.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ハ灰褐、中央ニ大ナル三角形ノ黑褐紋アリテ、其外側ハ灰白、其內方ニ暗褐ノ二橫線アリテ、其內側ハ何レモ灰色、外緣ハ地色ヨリモ濃色ニシテ、紫色ヲ帶ビ、之レニ判然セザル灰白ノ波狀線ヲ斜走ス、後翅ハ暗灰色、判然セザル淡色ノ一線ヲ橫走ス、頭及ビ胸背ハ黑褐、腹部ハ黃褐、雄ハ尾端ニ叉狀ノ毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)四分、開張一寸一分乃至一寸三分內外、

第九圖(5) (♂)

分布—北海道、本州、支那、滿洲、

(87) つまあかしやちほこ

學名 Pygaera anachoreta F.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅灰色、前翅ニ灰白ノ四條ヲ斜走シ、何レモ其外側ハ濃色、第三者ハ短小ニシテ甚ダシク傾斜シ、第四者ハ翅底ニ向ッテ傾斜ス、翅端ハ灰褐ニシテ大ナル三角紋ヲナシ、其中央ハ赤黃、其下方ニ暗褐ノ一紋アリ、後翅ハ灰色、中央ニ判然セザル濃色ノ一帶ヲ裝フ、裏面ニハ前後翅ヲ通ジテ一橫帶ヲ具ヘ、後翅ハ灰白、之レニ褐色ノ小點ヲ散在ス、頭並ニ胸背ノ縱條ハ黑褐、體長(♂)(♀)五分內外、開張一寸二分內外、幼蟲ハ柳ノ葉ヲ食ス、

第九圖(6) (♂)

分布—北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、印度、

(88) もんくろしやちほこ

學名 Phalera flavescens Brem. et Grey.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

第九圖(7) (♂)

體翅ハ黃白、翅底ニ近ク稍々圓形ノ暗黑紋アリテ、之レハ少シク藍色ヲ帶ブ、暗黃ノ橫線四條アレドモ餘リ判然セズ、外緣ニ沿フテ暗黑ノ大紋ヲ裝ヒ、之レモ亦少シク藍色ヲ帶ビ、後翅ノ後緣ニ近ク灰色ノ太キ一帶アリ、裏面ニハ斑紋ヲ缺キ、唯ダ前翅ノ外緣ニ褐色ノ紋列アリ、腹部ハ暗黃、體長(♂)(♀)七分五厘、開張一寸六分乃至一寸八分、幼蟲ハ苹樹、櫻、其他薔薇科植物ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、

(89) ぶらいやしやちほこ

第九圖(8)(♀)

學名 Cnethodonta (Somera) Pryeri Leech.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅灰白、斑紋ハ黑色、前緣ニ六七紋ヲ具ヘ、前橫線及ビ中橫線ハ餘リ判然セズ、但シ中橫線ノ屈折セル處ヨリ上方ハ濃色、橫脈ハ黑色ニシテ判然ス、波狀線ハ三條アリテ、中央ノ一條ノミ判然セリ、各外緣室ニM字形ノ一紋アリテ、外緣ト相平行ス、後翅ハ暗褐、裏面ハ暗黃、外緣ハ少シク濃色、頭及ビ胸部ハ灰白、腹部ハ暗黃、尾端ハ灰白、體下ハ暗黃、體長(♂)(♀)八分乃至九分、開張一寸八分乃至二寸一分、之レハ本邦稀ナル種類ナリ、

分布—本州、

(90) やすぢしやちほこ

第九圖(9)(♂)

學名 Pheosia octofasciata Mats.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ハ灰色、前翅ニ八九個ノ灰黑條アリテ、三分ノ一ノ處ニアル二個ハ太クシテ相平行ス、中室紋ヨリ二條ヲ下方ニ送ルヲ以テ叉狀線ヲ有スルガ如シ、中室ノ外方ニ三條アリテ、何レモ後緣角ノ方向ニ斜走ス、外緣ニハ二線アリテ、之レハ外緣ニ平行ス、外緣ハ黑色、後翅ハ灰白、中央ニ淡色ノ一橫線アレドモ判然セズ、頭及ビ胸背ハ暗褐、腹部ハ少シク淡色、裏面ハ灰白、前翅ニ三個、後翅ニ二個ノ暗色條アレドモ餘リ判然セズ、體長(♂)六分、開張一寸二分、

分布—北海道(函館)、

第九圖(10)(♂)

(91) たいわんをびが

學名 Eupterote formosana Mats.

昆蟲學上ノ地位 帶蛾科 (Eupteroidae)

體翅暗黃褐、前翅ノ中央ニ近ク褐色ノ二斜條ヲ具ヘ、其間室ハ濃色、第二斜條ノ內側ハ黃色、其外側ニ八個濃色ノ半圓紋アリテ、其第一室ニアルモノハ稍々楕圓形ヲナス、脈ハ少シク濃色、後翅ハ前翅ヨリ少シク淡色、三條ノ橫帶アリテ、外側ニアルモノハ波狀ヲナス、裏面ノ斑紋トハ稍々同樣ナレドモ少シク淡色ナリ、觸角ハ黑褐、體長(♂)一寸一分、開張三寸七分、此ハ臺灣ニ產スレドモ稀ナリ、

分布—臺灣(阿里山)、

(附言) 帶蛾科ニ屬スル昆蟲ハ從來本邦ニ一種ヨリ知ラレアラザリシタメ便利上枯葉蛾科ニ編入シ來リタルガ、近來たいわんをびがナルモノ發見セラレ其他尙續々發見セラルベキ見込ナルヲ以

テ更ラニ一科ヲ獨立セシムルヲ以テ適當ナリト信ズルガ故ニ今左ニ枯葉蛾科ト異ナル重點ヲ擧グベシ、

一、前翅ノ五脈ハ中室ノ上方ヨリ出ヅ(第四脈ヨリモ第六脈ニ近シ)、

二、後翅ニ抱刺ヲ有ス、

三、前翅ノ第一脈(1b)ハ基部ニテ分叉シ、普通第十脈ヲ缺ク、

(92)なかすぢしやちほこ　第九圖(11)(♂)

學名　Nerice bipartita Butl.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

前翅ノ前半ハ暗褐、前緣ハ灰白、之レニ二褐紋ヲ具ヘ、其內方ニアルモノハ往々判然セザル事アリ、後半ハ白色ニシテ前半ト相界スル處ニ黑褐ノ一條ヲ縱走ス、其下方ニ廣底四角形ノ褐紋ヲ裝ヒ、後緣ハ少シク灰色ヲ帶ブ、後翅ハ灰色、裏面ニ暗色ノ一帶ヲ橫走ス、頭及ビ胸背ハ黑褐、後者ノ兩側ハ白色、腹部ハ灰褐、體長(♂)(♀)五分、開張一寸三分內外、

分布—北海道、本州、支那、

(93)いしだしやちほこ　第十圖(1)(♀)

學名　Notodonta Ishidae Mats.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

體翅灰色、前翅底ニ紫夢(ボケ)樣ノ二黃紋アリテ、兩者何レモ其內ニ更ラニ同樣ノ濃色紋ヲ裝ヒ、下方ニアルモノヨリハ黑褐ノ縱線ヲ外方ニ出シ、中脈ト相平行ス、其外側ニ褐色ノ屈折セル一線アリテ、其內側ハ淡色、橫脈ノ部分ニ白紋ヲ具ヘ、其直上ノ前緣ニハ暗色ノ一大紋アリテ、其內ニ電光樣ノ赤紋ヲ有シ、之レヨリ下方ニ灰白ノ一波線ヲ送ル、此ハ後緣角ノ前ニ開口ス、其內側(第一室ノ部分)ハ黑褐ニシテ少シク黃色ヲ混ジ、其外側ニハ三個ノ黑紋ヲ縱走ス、外緣ニ近ク灰白ノ一橫線アリテ、其內側ニ赤褐紋ヲ列ヌ、外緣ハ細ク黑褐、脈ノ終止スル處ハ灰色、後緣ノ突起ハ黑褐ニシテ、中央ニ黃色ト黑色ノ二線ヲ縱走ス、後翅ノ中央ニ暗色ノ判然セザル一線ヲ裝フ、胸背ハ灰白、中胸背ノ兩側ニ黑條ヲ具ヘ、中央ハ黃色、後胸背ニハ黑褐ノ二毛塊アリ、腹部ハ暗黃、裏面ハ光澤アル灰白、體長(♀)八分、開張二寸四分、

分布—北海道札幌、

(附言)　此ハ石田昌人氏ノ初メテ採集セルモノナレバ紀念ノタメ命名セリ、

(94)もんしろごくが　第十圖(2)(♀)

學名　Porthesia similis Fues.

昆蟲學上ノ地位　毒蛾科

體翅共ニ白色、前翅ト後翅ト相接スル處ニ相隔離シテ二個ノ暗色紋ヲ有スルコトアリ、前緣ノ裏面モ亦暗色ナリ、尾端ニ黃色ノ毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)五分乃至七分、開張一寸一分乃至一寸六分、幼

蟲ハきんけむしト稱シ櫻、梨、李等ノ葉ヲ食ス、
分布―北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、滿洲、西比利亞、歐洲、

第十圖(3)(♀)

(95)のんねまいまい

學名 Lymantria monacha L.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

前翅白色、黑色ノ紋條アリ、犬牙狀ヲナセル凹凸ノ四橫帶アリテ、第二橫帶ハ最モ太シ、後翅ハ灰色、外緣ハ暗色、前後兩翅ノ緣毛ハ白色ト黑色ノ斑ヲナス、體ハ白色、黑紋ヲ裝フ、唯ノ腹部ニ赤色ノ紋條アリ、(體長♂♀六分乃至七分、鬥張一寸二分乃至一寸八分、幼蟲ハ松ノ葉ヲ食ス、
分布―北海道、本州、西比利亞、歐洲、

第十圖(4)(♀)

(96)ごくが

學名 Euproctis subflava Brem.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅濃黃色、雄ハ前翅ノ中央ニ弓狀ノ白色帶ヲ裝ヒ、其內側ニ褐色ノ小點ヨリ成レル太キ一帶アリ、後翅ハ前翅ヨリ少シク淡色、雌ハ白色帶ヲ缺キ、外緣ニ近ク二個ノ褐色紋ヲ裝フ、體長♂(♀)四分乃至五分、開張一寸二分乃至一寸五分、幼蟲ハ李樹、梨、薔薇等ノ葉ヲ食ス、
分布―本州、四國、朝鮮、西比利亞、

(97)にとべしやちほこ

學名 Notodonta Nitobei Mats.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅暗灰色、前翅底ノ半部ハ黃褐、前緣ハ灰白、之レニ翅底ニテ分叉セル褐色ノ縱條アリ、外緣ニハ褐色ノ一弧狀線アリテ黃褐部ヲ界ス、又其下方ニ暗褐ノ二大紋アリテ、下方ニアルモノハ稍々楔狀ヲナシ、其尖端ニ接シテ黃褐ノ部分アリ、後緣ノ中央突起ハ暗褐、翅端ニ近キ前緣ニハ黃褐ノ二縱紋アリテ、之レヨリ暗色ノ一波狀線ヲ後緣ニ逕ル、後緣角ノ內外ニ黃褐部アリ、外緣ニ近ク灰白ノ一波狀線アレドモ餘リ判然セズ、外緣ハ黑褐、緣毛ハ暗灰色、後翅ハ灰白、二三條ノ判然セザル暗色帶アリ、外緣ハ前翅ノ外緣ト同樣、裏面ハ灰黃、前後翅何レモ判然セザル暗色ノ一條ヲ橫走ス、頭及ビ前胸ハ暗灰色、中胸背ハ黃褐、少シク灰白毛ヲ混ジ、後胸背ニ暗褐毛ヲ裝フ、腹部ハ暗灰色、體長(♀)六分、開張一寸五分、
分布―本州、

第十圖(5)(♀)

(附言) 此ハ新渡戶稻雄氏ノ初メテ青森ニ發見セルモノナレバ紀念ノ爲メ命名セリ、

(98)やなぎごくが

學名 Stilpnotia Salicis L. var. candida Stgr.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

第十圖(6)(♀)

體翅白色、絹樣ノ光澤ヲ有シ、腹部ハ多少黑味ヲ帶ブ、脛節及ビ跗節ニ黑環アリ、雄ノ觸角ハ黑褐、雌ニテハ灰褐、體長五分五厘乃至七分、開張一寸四分乃至一寸七分、幼蟲ハ柳葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、西比利亞、歐洲、

(99) はらあかまいまい

學名 Lymantria fumida Butl.

第十圖(7)(♀)

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅灰色、前翅ニ約三條ノ波狀線アリテ、一ハ三分ノ一ノ處ヲ斜走シ、其外側ハ灰白、中央ニアルモノハ橫脈ノ處ニテ判然シ、其外方ノ一圍ハ灰白、外緣ニ接スル斜條ハ判然シ、甚ダシク凹凸アリ、外緣ニハ七個ノ黑紋ヲ列ス、後翅ハ暗黃色、外緣ニ近ク暗色ノ太キ一橫帶ヲ具ヘ、裏面ハ暗黃色、外緣ニ灰色ノ一帶アリテ、後翅ノ中室ニ黑點ヲ裝フ、胸背ハ灰色、暗色紋ヲ具ヘ、腹部ハ暗黃色、尾端ノ二節ハ淡紅色、體長(♀)九分、開張二寸二分、

分布—本州、

(100) ふたほしごくが

學名 Euproctis Staudingeri Leech.

第十圖(8)(♀)

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅黃色、前翅ノ中央ニ近ク暗色ノ大紋ヲ裝ヒ、其內ニ黑紋ヲ散在ス、又外緣ニ近ク二個若クハ三

個ノ黑鱗ヨリ成レル斑紋ヲ裝フ、後翅ハ淡黃色、翅底ノ大半ハ暗灰色、裏面モ亦淡黃色、前翅ノ中央ニ少シク暗色ヲ呈セル部分アリ、腹部ハ暗黃、尾毛ハ黃色、體長(♂)(♀)四分、開張一寸乃至一寸三分、

分布—北海道、本州、

(101) おほえぐりしやちほこ

學名 Pterostoma sinica Moor.

第十圖(9)(♀)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅灰褐、前翅後緣ノ三分ノ一ハ淡黃褐、之レニ濃色ノ二三縱線ヲ有スレ𪜈判然セズ、脈ノ一部ハ黑褐、前緣ニ暗褐ノ三縱紋ヲ裝フ、外緣ニ近ク灰白ノ一斜條アリテ、其外側ニ黃褐ノ波狀線ヲ裝ヒ、之レニ平行シテ其外側ニ灰白線ヲ有ス、外緣ノ三分ノ一ハ稍々濃色、後翅ハ暗色乃至暗黃、中室ニアル黑紋ノ判然セザルモノアリ、體下ハ暗黃、體長(♂)(♀)八分乃至九分、開張一寸八分乃至二寸二分、

分布—北海道、本州、九州、朝鮮、支那、

(102) まめごくが

學名 Cifuna locuples Wk. var. confusa Brem.

第十圖(10)(♀)

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅黃色、前翅底、外緣ニ近キ一橫帶並ニ中室ノ判然セザル腎狀紋ハ黃褐、後翅ニ斑紋ナシ、體長

五分乃至六分、開張一寸三分乃至一寸七分、幼蟲ハ大豆、藤、うつぎ等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、朝鮮、印度、

(103) をびかれは

學名 Malacosoma (Clisiocampa) neustria L.

第十圖 (15)(11) (♂)(♀)

昆蟲學上ノ地位 枯葉蛾科

雌ハ體翅赤褐、前翅ノ中央ニ濃色ノ太キ一帶ヲ斜走シ、其兩側ハ黃色、雄ハ體翅黃色、赤褐ノ二斜條アリテ、綠毛ハ赤褐、體長(♂)(♀)五分乃至八分、開張一寸一分乃至一寸四分、幼蟲ハ梅、苹樹、梨、櫻、桃、柳等ノ葉ヲ食ス、

(104) るりもんしやちほこ

學名 Notodonta monetaria Obth.

第十圖 (12) (♀)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅暗灰色、前翅前緣ノ中央ハ白色、翅底ノ環狀紋、其下方ニアル楔狀紋、中央ノ波狀線並ニ前緣ノ斑紋ハ黑褐、橫脈上ニ少シク藍色ヲ帶ビタル灰白紋ヲ裝フ、外緣ニ橫線アレドモ判然セズ、後翅ハ灰白、大小二條ノ暗色帶ヲ具ヘ、內緣ニ暗黃ノ軟毛ヲ密生ス、但シ雌ニテハ外緣暗色ナリ、裏面ハ灰黃、判然セザル暗色ノ二帶ヲ具ヘ、腹部ハ暗黃、後者ノ基部ニ暗灰毛ヲ簇生ス、體長(♂)(♀)八分、開張一寸七分內外、

分布—北海道(札幌)、

(105) しろしやちほこ

學名 Cnethodonta grisescens Stgr.

第十圖 (13) (♀)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅灰白、前翅ニ小黑點ヲ散在ス、中室ノ橫脈上ニ二黑紋ヲ具ヘ、第四、五、六、七ノ四室ニ各一黑紋ヲ裝ヒ、尙外緣ニハ六個ノ黑紋アリ、後翅ハ暗灰色、裏面ハ表面ヨリ少シク暗色、後翅ニ孤狀ノ一橫線ヲ裝フ、體長(♂)(♀)五分五厘乃至八分、開張一寸四分乃至一寸七分、此ハ本邦ニ稀ナル種類ナリ、

分布—北海道、本州、

(106) えるもんごくが

學名 Arctornis (Laria) L-nigrum Müll.

第十圖 (14) (♀)

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅ハ少シク黃色ヲ帶ビタル白色、天鵞絨樣ノ光澤アリ、前翅ノ橫脈ハ黑色く字形ヲナス、觸角ハ淡キ暗黃色、脚ニ黑輪ト白輪トノ交互斑アリ、體長(♂)(♀)六分乃至七分、開張一寸八分乃至二寸一分、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、歐洲、

(107) くろもんどくが

學名 Euproctis (Choerotriche) niphonis Butl.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅淡黃色、雄ノ前翅後緣ニ廣キ半月形ノ大紋アリテ、暗黑色ヲ呈シ、其內ニ淡黃ノ小橫紋ヲ散在ス、雌ニアリテハ黑褐ノ鱗毛ヲ散在シ、中室ニ黑褐ノ一紋ヲ具フ、後翅ハ雄ニテハ灰白、前緣ニ黑褐ノ大紋ヲ具ヘ、內緣ニ前翅ト同色ノ三角紋ヲ裝フ、中室紋ハ黑褐、外緣ハ廣ク黃色、裏面ハ淡色、表面同樣ノ斑紋アリテ判然ス、但シ後翅ノ前緣ニ於ケル紋ヲ缺キ、外緣ニ黑褐紋ヲ裝フ、雌ニテハ斑紋ナシ、體長(♂)(♀)三分乃至四分、開張七分乃至一寸三分、

分布—本州、朝鮮、支那、

第十圖(16)(♀)

(108) なかさしやちはこ

學名 Notodonta gigantea Butl.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

翅ハ暗褐、前翅ノ翅底ニ近ク黃色ノ一條アリテ、之レハく字形ニ屈折ス、前緣ノ中央ハ灰白、其下方ニ略三角形ノ黃紋ヲ具ヘ、其外方ニ黃色ノ斜條アリ、前緣ノ部分ハ灰白、外緣ニ近ク黃色ノ一斜條アリテ、之レハ第二脈ノ處ニテ屈折シ、中斜條ニ連續ス、後翅ニ三條ノ灰白條ヲ具ヘ、二條ハ中央ニアリテ相接近シ、一條ハ外緣ニ位シ、短カクシテ內緣ニ達セズ、裏面ハ灰白、後翅ニ判然セザ

第十圖(17)(♀)

ニ灰色ノ二帶ヲ裝フ、體ハ暗褐、翅底鱗ノ內側ハ黑色、後胸背ニ黑色ノ環狀紋アリ、體長(♀)七分、開張二寸一分、

分布—本州、

第十圖(25)(18)(♀)(♂)

(109) りんごどくが

學名 Dasychira pudibunda L.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

雌ハ前翅灰白、黑色ノ二橫條ヲ裝ヒ、外緣ニハ小黑紋ヲ列ヌ、全面ニ小黑點ヲ密布ス、後翅白色、時ニ暗色ヲ呈スルモノアリ、雄ハ前翅灰白、其中央ニ太キ暗色帶ヲ具ヘ、其前緣ニ近キ部分ニ更ニ弦月形ノ一紋アリ、又翅底ニハ一橫線ヲ裝フ、體長(♂)(♀)六分乃至七分、開張一寸五分乃至二寸、幼蟲ハ果樹ノ害蟲ナリ、札幌地方ニハ稀ナラズ、

分布—北海道、本州、支那、西比利亞、歐洲、

第十圖(19)(♀)

(110) じようざんしやちはこ

學名 Zangra ziozankeana Mats.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ハ暗黑色、外緣及ビ前緣ニ少シク藍色ヲ帶ビタル白鱗ヲ裝フ、翅底ノ一紋、第七室ノ一紋並ニ後緣角ノ一紋ハ黃色、前緣ノ中央ニ近ク白色ノ一紋ヲ具ヘ、外緣ハ黑色、縱脈ノ終止スル處ニ黃毛

アリ、尙後緣ニモ黃毛ヲ混ズ、後翅ハ灰白、周緣ハ暗黑、中央ニ近ク暗黑帶アリテ、之レヘ內緣ニテ濃色、前翅裏面ノ第七室ニ黃紋ヲ裝フ、體ハ暗黑、白毛及ビ黃毛ヲ混ズ、後胸背ニ黃色ノ毛塊ヲ密生シ、腹背ハ暗黃、裏面ハ暗黑、白毛ヲ混生ス、觸角ハ黑褐、下面ハ黃褐、末端ハ白色、體長(♂)(♀)七分乃至八分五厘、開張二寸二分乃至二寸四分、此ハ札幌地方ニ捕獲シ得ベシト雖モ稀ナリ、

分布—北海道、

第十圖
(20)
(♂)

(111) あかもんごくが

學名 Orgyia gonostigma F.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

雌ハ暗黑、翅ハ退化シ、腹部大ナリ、雄ノ前翅ハ赤褐、前緣角ニ黃色及ビ白色紋ヲ裝ヒ、後緣角ニ黃色ノ部分アリテ、之レニ二個ノ白紋ヲ裝フ、後翅ハ黑褐、體長(♂)(♀)四分乃至七分、開張一寸二分、幼蟲ハ俗ニつのけむしト稱シ、苹樹、梨、櫻、梅、李其他種々ノ果木ヲ害ス、札幌地方ニ普通ナリ、

分布—北海道、本州、朝鮮、西比利亞、歐洲、

第十圖
(21)
(♂)

(112) ひめしろもんごくが

學名 Orgyia thyellina Butl.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

雌ノ體翅ハ灰黃、前翅ノ前緣ニ近ク長楕圓形ヲナセル黑褐ノ一紋ヲ具ヘ、翅底及ビ後緣角ニ少シク藍色ヲ混ゼル小褐紋ヲ散在ス、翅ノ退化シタルモノニアリテハ腹部甚ダシク膨大シ、胸背ニ暗黑毛多シ、雄ハ暗褐、前翅ノ後緣及ビ翅底ハ黃褐、前緣角ニ近ク黑褐紋ヲ具ヘ、後緣角ニ眼狀紋ヲ裝ヒ、其中央ハ黑褐、周圍ハ白色、外緣ニ黑褐ノ波狀線アリ、其內側及ビ緣毛ハ黃褐、體長(♂)(♀)三分五厘乃至四分、開張一寸三分乃至一寸五分、幼蟲ハ前種ニ酷似シ苹樹、梨其他ノ果木ヲ害ス、札幌地方ニ普通ナリ、

分布—北海道、本州、

第十圖
(22)
(♂)

(113) ひめしろごくが

學名 Arctornis alba Brem.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅雪白色、前翅ノ中室ニ黑褐紋アレドモ種類ニヨリ判然セザルモノアリ、觸角ハ灰黃、前肢腿節ノ末端並ビニ脛節ノ中程ニ黑褐紋ヲ裝フ、體長(♂)五分、開張一寸一分、

分布—北海道、本州、

第十圖
(23)
(♂)

(114) あかひげごくが

學名 Dasychira lunulata Butl.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅灰白色、前翅ノ前緣ニ約四個ノ黑點ヲ具フ、中室ノ基部ニ長楕圓ノ黑輪アリテ、其直下ニ小黑

點ヲ裝ヒ、之レヨリ判然セザル一斜條ヲ下方ニ延ル、橫脈ハ褐色ナレドモ僅リ判然セズ、中室ノ外方ニ暗色ノ一波狀線アリテ、之レハ前緣ニ近キ處ニテ廣ガリ彎曲ス、外緣ニモ一波狀線アリテ、之レハ下方ニテ點線トナル、後翅ハ暗灰色、中室紋、中央ニ近キ一橫條並ビニ外緣ハ暗黑、裏面ハ淡灰白、前翅ノ中室ハ判然シ、外緣ニ暗色紋ヲ列ヌ、前翅基部ノ前方ニ暗色部アリ、觸角ハ赤褐、脚ニ黑輪ヲ裝フ、體長(♂)六分、開張一寸六分、

分布—北海道、本州、滿洲、

(115) ひめきあしぐくが

學名 Caviria ochripes Moor.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅光澤アル雪白色、前翅ノ外緣、並ニ之レニ近キ前緣ハ少シク暗色ヲ帶ブ、裏面モ亦前翅ト同樣ナレドモ暗色ノ部分一層判然セリ、前肢ハ黃金色、中後ノ兩肢ハ跗節ニ於テ少シク黃色ヲ帶ブ、體長(♂)四分、開張一寸一分、

分布—北海道、印度、

第十圖(24)(♂)

(116) すげおほぐくが

學名 Laelia gigantea Butl

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

第十圖(26)(♂)

體翅灰白、前翅ノ翅端ハ暗色、斑紋ナシ、前翅裏面ノ外半ハ少シク暗褐ヲ帶ブ、觸角ハ暗色ニシテ羽狀ヲ呈シ大ナリ、體及ビ脚ニ斑紋ナシ、體長(♂)五分、開張一寸一分、

分布—北海道、本州、

第十圖(27)(♂)

(117) かばいろぐくが

學名 Aroa socrus Gey.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅黃褐、前翅ノ前緣、中央及ビ外緣ハ濃色、後翅ハ淡黃、斑紋ナシ、前翅裏面ノ外緣ハ暗黃褐、之レハ翅端ニテ少シク廣マル、後翅ノ緣毛モ少シク濃色ナリ、觸角ハ白色、羽狀ノ小枝ハ暗色、腹部ハ淡黃褐、脚ハ黃白、但シ前肢ハ少シク濃色ナリ、體長(♂)(♀)四分、開張一寸乃至一寸一分、

分布—臺灣、支那、馬來、印度、

第十一圖(1)(♀)

(118) ほそばしやちほこ

學名 Fentonia ocypete Brem.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ハ灰褐、少シク紫色ヲ帶ビタル部分アリ、中脈ノ下方ニ當リ翅底ヨリ第二脈ノ中央ニ黑色ノ一縱線ヲ出ス、中室及ビ第四室ノ內半ハ黃褐、外緣ニ近ク暗褐ノ一弧狀線アリテ、之レハ第四、五兩室ノ處ニテ廣ク彎曲ス、弧狀線ノ外側ハ灰白、外緣モ亦廣ク灰白ニシテ、緣毛ト界スル處ニ暗色線

アリ、後翅ハ灰黃色、中央ニ近ク淡色ノ一橫線アレドモ判然セズ、內緣角ニ暗色線ヲ裝フ、裏面ハ灰色、後翅ハ淡色、頭及ビ胸背ハ灰白、腹部ハ灰黃、第一節ノ二紋及ビ尾節ノ一縱線ハ暗褐ナリ、體長(♂)(♀)七分、開張一寸五分乃至一寸七分、

分布—北海道、本州、滿洲、印度、

(119) はがたしやちほこ

學名 Anticyra combusta Wk.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ハ橙黃色、前緣ニアル脈ハ大部暗色、中室ニ暗色ノ四縱條ヲ裝ヒ、第二及ビ第三室ハ暗褐、外緣ハ前緣角ヲ除キ暗黑ニシテ、少シク紫色ヲ帶ブ、外緣ハ鋸齒狀ヲ呈シ、各室ニ弦月形ノ二黑紋ヲ具ヘ、緣毛ハ大部黃色、後翅ハ暗黃色、內緣ノ大半ハ淡色、外緣ハ前翅同樣ニ鋸齒狀ヲ呈スレドモ淡色ナリ、裏面ハ暗黑、外緣ニ表面同樣ノ斑紋アレドモ淡色ナリ、頭及ビ前胸背ハ黃色、翅底鱗ハ少シク紫色ヲ帶ビタル暗黃色、其前緣ハ黑褐、胸背ハ黑褐ナレドモ少シク黃褐毛ヲ混ズ、腹部ハ濃色ノ橙黃色、基部及ビ尾節ハ淡色、腹面ハ淡黃色、體長(♀)七分五厘、開張二寸、

分布—臺灣北埔、印度、

第十一圖(2)(♀)

第十一圖(3)(♂)

(120) かばいろもくめ

學名 Hupodonta pulcherrima Moor. var. corticalis Butl.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

頭及ビ前胸背ハ赤褐、胸背及ビ腹部ハ暗黃、前翅ハ淡褐、赤褐若クハ暗褐ヲ呈スル部分アリ、翅底ハ暗黃、中央ニ暗色ノ大紋アリテ、之レハ前緣ヨリ第二脈ノ處ニ達ス、外方ニ波狀ノ三橫線アレドモ僅リ判然セズ、外緣ニ近ク暗褐ノ太キ一帶ヲ具ヘ、其外側ニ黑色ノ橫線ヲ有ス、但シ唯ニテハ此黑線ハ僅リ判然セズ、外緣ハ廣ク灰色、其中央ニ暗黑線ヲ具ヘ、暗色ナル緣毛ノ基部モ亦暗黑ナリ、前緣角ニ近ク數個ノ黑褐紋ヲ裝ヒ、脈ハ灰白ニシテ其間ニ褐色ノ縱條アルヲ以テ木目ニ似タル處アリ、後翅ハ暗色、判然セザル濃色ノ二帶ヲ具ヘ、內緣ハ灰黃、體長(♂)(♀)六分乃至七分、開張一寸八分乃至二寸一分、

分布—北海道、本州、印度、

第十一圖(4)(♀)

(121) あやとがりば

學名 Habrosyne (Gonophora) derasa L. var. scripta Goss.

昆蟲學上ノ地位 尖蛾科

前翅ハ灰色、翅底ニ近キ三分ノ一ノ處ニ白色ノ斜條ヲ具ヘ、之レニ直角ヲナシテ中室ノ內側ニ白色ノ一線ヲ逆ル、環狀紋及ビ腎狀紋ハ判然シ、其周圍ハ黃褐、但シ環狀紋ハ半圓形ヲナス、前緣ノ大部ハ白色、第一、第二、第三及ビ第四室ニ木目樣ノ褐色紋アリテ、三重ノ半楕圓紋ヲナス、外緣ニ二條ノ白橫帶アリテ、外側ニアルモノハ細シ、各室端ニ弦月樣ノ白紋ヲ裝ヒ、末端ニ近ク三黑紋ヲ具ヘ、其下方ニ少シク黃色ヲ帶ビタル部分アリ、後翅ハ灰色、中央ノ一帶及ビ外緣ハ灰白、裏面ハ

淡灰色、外緣ハ淡色、後翅ノ中央ニ淡色帶アリ、體ハ淡灰色、前胸背ト中胸背ト相界スル處ニ褐色ノ一輪アリ、體長(♂)(♀)五分五厘乃至七分、開張一寸三分乃至一寸四分、幼蟲ハ蕗ヲ食ス、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、歐洲、印度、

(122) しろすぢしやちほこ

學名 Nerice Davidis Obth.

第十一圖(5)(♀)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

此ハ(92)なかすぢしやちほこニ酷似スレドモ其差異左ノ如シ

一、前翅ノ中央ヲ縱走セル黑褐條ハ第二脈ノ處ニテ三角形ヲナシテ下方ニ突出シ、黑褐條ノ下方ニアル銀白ノ部分ハ遙ニ少ナシ、

二、中室ノ基部ノ下方ニ當リ黑褐ノ一紋ヲ裝フ、

三、前翅表面ノ前緣ニハ黑褐ノ一紋ヲ具ヘ、後翅ノ中央ニハ同色ノ一紋ヲ裝フ、體長(♂)(♀)六分、開張一寸三分內外、

分布—北海道、本州、支那、滿洲、

(123) しろてんしやちほこ

學名 Drymonia discoidalis Mats.

第十一圖(6)(♂)

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅暗灰色、前緣ノ二分ノ一ハ暗色、翅底ニ判然セザル褐色若クハ黑褐ノ一紋アレドモ判然セズ、中室ニ鼠色ノ一紋アリテ、其上下ハ暗褐、之レヨリ黑褐ノ波狀線ヲ後緣ニ遊ル、橫脈ノ外側ハ白色翅端ニ近キ前緣ニ四白紋ヲ具ヘ、外側ノ白紋ヨリ後緣角ニ白色ノ波狀線ヲ遊ル、之レハ第七脈ノ處ニテ犬牙狀ヲナス、外緣ノ一圍ハ少シク淡色、外緣ハ細ク黑褐、緣毛ハ灰白ニシテ、少シク黑褐毛ヲ混ズ、後翅ハ淡灰色、裏面ハ淡灰黃色、前翅ノ外緣ニ近ク淡色ノ一帶ヲ具ヘ、翅端ニ近キ前緣ニハ五個ノ黑紋ヲ裝フ、後翅ハ黃白、觸角ハ黃褐、基節ニ刷毛樣ノ毛塊ヲ具ヘ、頭ハ黑褐、頭頂ニ白毛ヲ戴キ、胸背ハ暗灰色、腹背ハ黃褐、腔節及ビ跗節ハ白色ト黑色ノ斑ヲナス、體長(♂)六分、開張一寸二分、

分布—北海道(札幌)、

(124) ほそこがりば

學名 Cymatophora angustata Stgr.

第十一圖(7)(♀)

昆蟲學上ノ地位 尺蛾科

體翅灰白、前翅ノ半橫線、前橫線及ビ中橫線ハ黑色、前橫線ト中橫線ノ間室ハ暗色、前緣ニ黑色ノ一橫帶アリテ、之レヨリ判然セザル一線トナリテ後緣ニ達ス、環狀紋及ビ腎狀紋ハ判然ス、後橫線ハ二條ニシテ、少シク波狀ヲナシ、第五脈ノ處ニテ彎曲ス、波狀線ハ餘リ判然セズ、外緣角ヲ二分スル黑條アリテ、之レハ判然セザル波狀線トナリテ後緣角ニ達ス、其內側ハ灰白、後翅ハ暗灰白、中央ニ近ク淡色ノ一帶ヲ裝フ、前胸背ノ前緣ニアル一帶及ビ翅底鱗ノ前緣ハ黑色、觸角ハ黃色、體

長(♂)(♀)六分、開張一寸內外、
分布—北海道、本州、九州、

(125) もんこがりば

學名 Thyatira batis L.

昆蟲學上ノ地位 尖蛾科

前翅ハ暗褐、桃色ノ五大紋ヲ裝ヒ、其翅底ニアルモノハ大ニシテ淡色ナリ、後緣ニアルモノハ小ニシテ白色、此ハ半圓形ニシテ其中央ハ灰色、外緣角ニアルモノハ圓形、其中央ハ暗灰色、尙前緣ノ翅端ニ近キ處ニ三紋アリテ、外側ニアルモノハ大ナリ、此外黑褐ノ細キ波狀線約七條アリテ、外緣ニアルモノハ稍M字形ヲナス、後翅ハ灰色、中央ニ淡色帶アレドモ判然セズ、裏面ハ淡灰黃色、外緣ハ淡色、緣毛ニ六個ノ暗色紋ヲ列ス、體ハ桃色ヲ帶ビタル淡褐、腹部ハ淡色、體長(♂)(♀)五分、開張一寸三分內外、幼蟲ハ苺ノ葉ヲ食ス、
分布—北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、歐洲、

第十一圖(8)
(♂)

(126) ぎんしやちほこ

學名 Hoplitis Milhauseri F. var. umbrosa Stgr.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ハ銀白色、中室外ノ一圓ハ金光アル灰黃色、外緣脈ハ黑色、緣毛ハ白色ト黑色ノ斑ヲナス、後

第十一圖(9)
(♀)

緣ハ黑色、其中央ノ大半ハ光澤アル灰黃色、其外側ニ判然セザル白斜條アリ、後翅ハ暗色、內緣角ハ黑色、其前後ニ白色ノ一紋アリ、緣毛ハ白色、其基部ハ黑褐、裏面ハ暗色、前翅ノ前緣ニ白紋ヲ裝ヒ、外緣ハ白色ト黑褐ノ斑ヲナス、後翅ハ白色、周緣ハ黑褐、頭及ビ胸背ハ暗褐、胸背ノ兩側ハ灰白、腹部ハ灰黃、其兩側ハ淡色、體下ハ淡黃褐、體長(♂)(♀)六分乃至七分、開張一寸五分乃至一寸八分、
分布—北海道、本州、支那、滿洲、

第十一圖(10)
(♂)

(127) しやちほこが

學名 Stauropus Fagi L.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

雄ニテハ前翅底ノ二分ノ一ハ灰黃白ニシテ、少シク褐色ヲ帶ビ、其中央及ビ其外緣ニアル波狀ノ橫帶ハ赤褐、環狀紋ハ赤褐ニシテ判然ス、外緣ノ二分ノ一ハ暗褐、其中央ニ黑褐ナル波狀ノ點線アリテ、各內側ハ白色ナリ、外緣ニ黑褐ノ弦月紋ヲ列ス、其內側ハ白色、後翅ハ灰黃白、前緣ニ黑褐ノ大紋アリテ、之レヨリ判然セザル橫帶ヲ內緣角ニ迄リ、外緣ニハ弦月形ノ暗褐紋ヲ列ス、體ハ灰色、後胸及ビ第一腹節ニ赤褐ノ毛塊ヲ裝フ、裏面ハ暗色、前翅中室ノ處ニ軟毛ヲ密生ス、後翅ハ淡色、雌ニテハ體翅灰色、斑紋ハ雄ト異ナラズ、緣毛ハ白色、尾節ニ長白毛ヲ簇生ス、體長(♂)六分五厘(♀)八分乃至九分、開張一寸八分乃至二寸、幼蟲ハ柳葉ヲ食ス、
分布—北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

(128) なかぐろとがりば

學名 Cymatophora medialis Mats.

昆蟲學上ノ地位 尖蛾科

前翅灰白、翅底ノ三分ノ一ハ暗色ノ小點ヲ密布シ、中央ノ三分ノ一ハ暗色ニシテ、其外側ハ波狀ヲナシ、外緣ノ三分ノ一ハ翅底ト同樣ニ暗色ノ小點ヲ密布ス、外緣ハ細ク暗色、緣毛ハ暗褐、後翅ハ暗色、橫脈上ニ暗黑紋ヲ具ヘ、其外側ニアル一帶ハ少シク濃色ナリ、裏面ハ淡キ暗色、後翅ノ橫脈ニ判然セル暗色紋アリ、體ハ灰色、白毛ヲ混ズ、腹部ハ鼠色、但シ第二節ハ胸部ト同色、體長(♂)三分五厘、開張一寸三分五厘、

分布—本州(盛岡)、

第十一圖(11) (♀)

(129) ひろとがりば

學名 Cymatophora latipennis Mats.

昆蟲學上ノ地位 尖蛾科

體翅灰白、三分ノ一ノ處ニ判然セル黑色ノ三波狀線アリテ、其間室ハ暗色、腎狀紋ハ判然シ、其外側ニく字形ノ暗色線アリテ、之レハ第三脈ノ處ニテ更ラニ外方ニ屈折ス、尙其外側ニ同色線アレドモ之レハ前緣ニ於テノミ判然ス、第三、第四及ビ第五脈ハ白色ト暗色ノ斑ヲナス、外緣ニ近ク白色ノ波狀線ヲ具ヘ、外緣ニハ暗色ノ弦月紋ヲ列ス、前緣角ニ暗色條アリテ角ヲ二分ス、緣毛ハ灰白、

第十一圖(12) (♀)

其中央ニ暗色ノ一橫帶アリ、後翅ハ灰白、中央ニ近ク淡色ノ一帶ヲ具ヘ、緣毛ノ基部ハ暗色、裏面ハ灰色、二條ノ橫線アレドモ後翅ノモノハ判然セズ、觸角及ビ口吻ハ黃色、翅底鱗ノ中央ニ暗色ノ橫紋アリ、體長(♂)(♀)五分乃至五分五厘、開張一寸三分乃至一寸五分、

分布—本州、

(130) くびわしやちほこ

學名 Microphalera atrovittatus Brem.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅ハ暗灰色、前翅ノ第一室ニ太キ黑色ノ一縱條ヲ具ヘ、第二乃至第六室ニ大小アル黑縱紋ヲ裝フ、尙前緣ニモ三個ノ黑紋アリ、後翅ノ橫脈上ニ暗色紋ヲ具ヘ、裏面ハ暗黃色、暗色ノ一帶ヲ橫走シ、橫脈上ニハ暗色紋ヲ裝フ、前胸背ノ末端並ビニ翅底鱗ノ中央ハ黑色、體長(♂)(♀)七分乃至八分、開張一寸七分乃至一寸九分、

分布—北海道、本州、滿洲、

第十一圖(13) (♀)

(131) せぐろえぐりしやちほこ

學名 Pterostoma palpina L.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅灰黃色、前翅ノ中室ニ暗色ノ二縱條ヲ具ヘ、中室ノ外側ニ暗色ノ太キ一斜條ヲ裝ヒ、四分ノ一

第十一圖(14) (♂)

ノ處ニ波狀ノ暗褐線アリテ、其脈上ニ小黑紋ヲ裝フ、尙脈上ニ黑紋ヲ有スル處少カラズ、後緣ハ三角形ヲナシテ突出シ、其外側ハ刻ラレ、緣毛ハ暗褐、其內側ニ褐色ノ一斜條アリ、外緣ハ暗色ニシテ波狀ニ刻ラレ、黑點ヲ列ヌ、緣毛ハ灰黃、其基部ハ細ク暗褐、後翅ハ灰黃、外緣ハ廣ク暗褐、裏面ハ灰黃白、暗色ノ二橫帶アリ、前翅ノ前緣ニハ四五個ノ暗色紋ヲ具ヘ、後翅ノ中室ニハ大ナル暗色紋ヲ裝フ、尙外緣ニハ暗色ノ點紋ヲ列ヌ、緣毛ノ基部モ亦暗色ナリ、下脣鬚ハ甚ダシク延長シテ羽狀ヲナス、雄ノ尾節ノ毛塊ハ長クシテ左右ニ分開ス、體長(♂)(♀)七分乃至八分、開張一寸二分乃至一寸四分、

分布—本州、滿洲、歐洲、

(132) ゆみがたうはば

學名 Abrostola (Jugurida) abrostolina Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ暗褐、翅底ハ廣ク灰黃褐、半橫線ハ波狀ヲナシ、其外側ニ同樣ノ淡褐線アリ、前橫線ハ黑色、其內方ニ黃褐ノ同樣線アリテ彼レト相並行ス、中央ニハ黑色ノ高マリタル黑鱗ヲ裝ヒ、後橫線ハ弓狀ヲ呈シ、之レハ第四脈ヨリ後緣ニ達ス、其外側ハ黃褐、更ニ其外側ニ當リ暗黃ノ二線アリテ、之レハ第三脈ヨリ後緣ニ達ス、前緣角ニ近ク三個ノ黑縱紋ヲ具ヘ、外緣ハ細ク黑色、緣毛ハ長ク暗灰色、後翅ハ黑褐、翅底ノ大半ハ灰黃、緣毛ハ灰黃ニシテ光澤アリ、裏面ハ暗色、前翅ノ前緣角ニ近ク四黃紋ヲ具ヘ、中室ノ外方ニ濃色ノ一橫線ヲ裝フ、後翅々底ノ大半ハ灰黃、橫脈上ニ暗色紋ヲ具ヘ、中央ヨリ外緣ニ至ル迄ハ暗色、但シ其分界線ハ一層濃色ナリ、體ハ鼠色、前頭ニ黑色ノ二橫紋ヲ具ヘ、前胸背ハ灰黃白ニシテ、其周圍ハ褐色、尙中央ニ褐色ノ部分アリ、體長(♂)(♀)五分乃至六分、開張一寸乃至一寸二分、

分布—北海道、本州、

(133) うすべにあやこがりば

學名 Habrosyne roseola Mats.

昆蟲學上ノ地位 尖蛾科

前翅ハ暗褐、翅底ニ白色ノ一短線ヲ斜走シ、其上方ニ稍々三角形ニ近キ桃色ノ一紋ヲ裝ヘ、其外側及ビ下方ハ黑褐、之レヨリ桃色ノ一細線ヲ後緣ニ送ル、尙其外側ニ黑色ノ一波狀線ヲ後緣ニ出ス、腎狀紋及ビ環狀紋ハ濃色ニシテ判然シ、其外方ニ黑褐ノ二波狀線アリテ、其外側ハ桃色ヲ帶ビタル灰白、但シ第二及ビ第三室ニテハ更ラニ其外側ニ暗色ノ弧狀紋アルヲ以テ木目ニ似タル處アリ、外緣ハ廣ク桃色、之レニ暗褐ノ一橫帶ヲ具ヘ、外緣ニ沿ヒ黑褐ノ判然セル波狀線アリ、前緣ハ桃色、中央ニ二黑紋ヲ具ヘ、外緣ニ近キ暗色部ニ弦月形ノ桃色紋ヲ裝フ、緣毛ハ長クシテ暗黃褐、後翅ハ暗灰色、中央ニ判然セザル一淡色帶アリ、緣毛ハ暗黃、裏面ハ暗黃、二條ノ暗色帶ヲ具ヘ、前緣ニ灰黃白ノ一紋ヲ裝フ、體ハ淡灰黃色、中胸ハ桃色毛ヲ密生シ、其末端ハ褐色、體長(♂)(♀)四分、開張一寸四分內外、

分布—北海道、

(134) きしゃちほこ

學名 Pydna straminea Moor.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

前翅ハ淡黃色、前緣角ヲ二分スル暗色條ハ中室下ノ暗色紋ニ連續ス、半橫線、前橫線及ビ後橫線ハ黃褐ニシテ波狀ヲナシ、後橫線ノ外方及ビ外緣ニ沿ヒ暗褐ノ點紋ヲ橫列シ、此中間ニ暗色ノ判然セザル一斜條ヲ有スレドモ之レハ前緣ニ達セズ、後翅並ビニ裏面ハ淡黃白、頭及ビ胸背ハ暗黃、翅底鱗ハ淡黃、腹部ハ淡キ暗黃色、體長(♂♀)六分五厘乃至七分、開張一寸五分乃至一寸六分、

分布—北海道、本州、朝鮮、

第十一圖(17)
(♀)

(135) ぎんすぢしゃちほこ

學名 Spatalia argentifera Wk.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

頭、胸背及ビ腹部ハ暗褐、前翅ハ淡褐、翅底ニ近キ中脈ノ下方ニ赤褐ヲ呈スル部分アリ、中室ノ下方ニ銀白ノ一縱紋ヲ具ヘ、其外側ニ一白紋アリテ、之レハ第二及ビ第三脈ニ沿ヒ外方ニ尖紋ヲ出ス、中室ノ外方ハ淡色、尙外緣ニ沿ヒ判然セザル暗褐ノ翅端及ビ外緣ノ中央ニ黑褐ヲ呈スル部分アリ、後翅ハ暗色、體長(♂♀)七分、開張一寸三分乃至一寸四分、

分布—本州、印度、

第十一圖(18)
(♂)

(136) ふじとがりば

學名 Cymatophora fujisana Mats.

昆蟲學上ノ地位　尖蛾科

體翅灰白、前翅ノ翅底ハ廣ク褐色、但シ雌ニテハ三條ノ橫線トナル、橫脈上ニ黑色ノ弦月紋ヲ裝ヒ、外線ニ近ク黑紋ヲ橫列シ、其外側ニ褐色ノ一橫紋ヲ具ヘ、之レヨリ外方、殊ニ翅端ニ於テハ紫褐ナリ、全面ニ紫褐ノ點紋ヲ散在ス、後翅ハ灰白ニシテ斑紋ナシ、裏面ハ灰白、外緣ニ暗色ノ一橫帶アリ、線毛ハ桃色ヲ帶ブ、頭及ビ前胸背ハ淡黃褐、少シク黃褐ヲ帶ビタル部分アリ、體長(♂♀)開張一寸三分內外、

分布—本州富士山、

第十一圖(19)
(♀)

(137) まへしろとがりば

學名 Cymatophora albicostata Brém.

昆蟲學上ノ地位　尖蛾科

體翅暗色、前翅ノ前緣ハ廣クシテ白色、翅底ハ少シク桃色ヲ帶ブ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ灰白ニシテ判然シ、其外方ニ二條ノ波狀線ヲ有スレドモ此ハ中央ニ於テノミ判然セリ、後橫線ハ濃色、外線ニ近キ灰白ノ短カキ波狀線ヲ具ヘ、其外側ハ濃色、後翅ハ中央ニ於テ判然セザル淡色ノ一帶ヲ裝フ、裏面ハ表翅ヨリ少シク淡色、二條ノ暗色帶アレドモ判然セズ、下唇鬚ノ下方ハ白色、體長(♀)六分、開張

第十一圖(20)
(♀)

一寸六分、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、

(138) くろしたしやちほこ

學名 Phalera sigmata Butl.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

前翅ニ白色、黑色、褐色及ビ黃色ノ部分アリ、中室ニハ白鱗ヲ具ヘ、其外側ニY字形ノ褐色紋アリテ、之レハ延長シテ後方ニ至ル、後橫線ノ處ニ白紋列アリテ、之レヨリ不明ノ灰色帶ヲ後方ニ近ル、外緣ニ近ク M字形ノ褐斑紋ヲ列ス、前緣ニハ數多ノ褐色紋ヲ裝フ、後翅ハ暗褐、外方ハ濃色、內緣ハ暗黃、胸部ハ白色、黃斑アリ、腹部ハ黃褐、尾節ハ白色、側角ハ赤褐、羽狀ノ小枝ハ黃褐、體長(♂)一寸、開張二寸、

分布—北海道、本州、

第十一圖 (21) (♂)

(139) ぎんもんしやちほこ

學名 Spatalia Okamotonis Mats.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅紫褐色、中室基部ノ下方ニ四個ノ銀色紋アリテ、第二者ハ最モ大ニシテ、稍四角形ヲナス、尙翅底ニ小ナル銀紋二個アリ、中室ノ外方ニ濃色ノ大紋アリテ、第四脈ヨリ前緣ニ達ス、後緣ニアル

第十一圖 (22) (♂)

緣毛ハ黑褐ニシテ長ク、其外側ハ弓狀ニ刻ヲルヽ、後翅ハ淡灰色、後翅ノ裏面ニ判然セザル暗色ノ一波狀線アリ、後胸背ノ中央ニ白毛塊ヲ具ヘ、腹部ハ灰黃、尾端ハ紫褐、尾節下ニ黃毛ヲ裝フ、體長(♂)六分、開張一寸二分、

分布—北海道、

(附言) 此ハ農學士岡本半次郎氏ノ初メテ捕獲セルモノナレバ紀念ノ爲メ命名セリ、

第十一圖 (23) (♀)

(140) せぐろしやちほこ

學名 Pygaera (Clostera) anastomosis L.

昆蟲學上ノ地位 天社蛾科

體翅暗黃褐、前翅ニ灰白ノ三橫帶アリ、內方ニアルモノハ短クシテ、中脈ヨリ後緣ニ達シ、第二者ハ其外側ニ弓狀ヲナシ、前緣ニテハ僅リ判然セズ、第三者ハ中室ノ外方ニアリテ、稍端直ナリ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ暗褐ニシテ判然シ、其下方ニ稍三角形ニ近キ暗褐紋アリ、外緣ノ中央ニ赤褐ノ部分アリテ、其內方ニ暗色ノ四紋ヲ具ヘ、各紋ノ中央ニ灰色部アルヲ以テ二紋列ヲ有スルニ似タリ、尙其內側ニ灰白ノ環狀線アレドモ判然セズ、後翅ハ中央ニ淡色帶ヲ裝フ、裏面ハ灰黃色、淡色ノ一帶アレドモ判然セズ、頭、前胸背並ニ中胸背ノ前緣ハ暗褐、體長(♂)(♀)六分、開張一寸三分內外、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、歐洲、

第十一圖 (24) (♂)

(141) えぐりしやちほこ

學名 Lophopteryx camelina L.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

體翅ハ黃褐乃至暗褐、前翅ノ半横線、中横線並ニ後横線ハ黑褐ニシテ、甚ダシク波狀ヲナス、半横線ノ如キハ中央ニテM字形ヲナシ、甚ダシク外方ニ突出ス、第一室並ニ外緣ニ近キ一帶ハ暗色ニシテ、少シク紫色ヲ負ヒ、外帶ノ脈上ハ黑色ヲ帶ブ、外緣ハ弦月形ニ刻ラレ、後緣ノ中央ハ甚ダシク突出シ、其緣毛ハ褐色、後翅ハ灰黃乃至灰色、內緣角ハ褐色、中央ハ少シ藍色ヲ帶ビ、其前緣ニ更ラニ同色ノ一短線ヲ裝ヒ、之レハ不明ノ線トナリテ前緣ニ至ル、裏面ニ斑紋ナシ、體長(♂)(♀)五分乃至七分、開張一寸二分乃至一寸五分、

分布—北海道、本州、支那、朝鮮、歐洲、

(142) にっこうしゃちほこ

學名　Drymonia circumscripta Butl.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

前翅ハ紫灰色、翅底ハ白色、中脈下ニ楕圓形ノ一黑紋ヲ具ヘ、其外側ニ紫灰色ノ一條ヲ斜走シ、更ニ其外側ニ黑條アリテ、稍平行ス、中室ノ外方ニ大ナル黑紋アリテ、其外側ニ同色ノ一帶ヲ具ヘ、更ニ其外方ニ濃色ノ一帶アレドモ餘リ判然セズ、後翅ハ中央ニ淡色ノ一帶ヲ有スレドモ、コレモ亦判然セズ、裏面ハ暗灰色、後翅ノ中央ニ濃色ノ一帶アリ、雄ノ觸角ハ甚ダシク羽狀ヲナシ、前胸背ノ後緣ニハ黑毛ヲ密生ス、中後ノ兩胸背ハ灰白、腹部ハ灰黃、暗色ノ軟毛ヲ裝ヒ、尾節ニハ灰白ノ長毛ヲ簇生ス、體長(♂)(♀)四分乃至五分、開張一寸一分乃至一寸三分、

第十一圖(25)　(♂)

分布—北海道、本州、

(143) うすきしゃちほこ

學名　Pydna pallida Butl.

昆蟲學上ノ地位　天社蛾科

體翅ハ淡キ暗黃、前翅ノ中室ヲ貫キテ濃色ノ一縱帶アリテ、之レハ前緣角ヨリ出ヅル暗色線ニ連續シ、後緣ニ達スレドモ判然セズ、外緣ニハ暗色點ヲ列ヌ、後緣ノ中央ハ廣ク暗黃、其中央ニ暗色ノ橫帶ヲ上方ニ延レドモ、之レハ餘リ判然セズ、後翅ハ暗色、周緣及ビ緣毛ハ淡黃白、裏面ハ暗色、後翅ニテハ灰黃、觸角ハ黃色、前胸背ハ暗色、腹部ハ暗黃、雄ノ尾端ハ淡色ニシテ、之レニ掃狀毛ヲ簇生ス、體長(♂)(♀)五分乃至七分、開張一寸二分乃至一寸五分、

第十二圖(1)　(♀)

(144) きいろかれは

學名　Crinocraspeda guttata Mats.

昆蟲學上ノ地位　枯葉蛾科

體翅黃色、前翅ノ橫脈上ニ暗褐ノ一紋ヲ具ヘ、其下方ニ同色ノ大紋アリテ、第一室ノ大半ヲ占ム、前橫線及ビ後橫線ハ濃色、紋上ニテハ暗色ヲ呈ス、外緣ニ近キ各室ニ暗褐ノ一紋ヲ列ヌ、後翅ノ中央ニ近ク暗色ノ一帶ヲ具ヘ、外緣ニ近キ各室ニハ暗褐ノ一紋ヲ並列ス、裏面ハ表面ト同樣ナレドモ

前翅底ニ暗色紋ヲ缺キ、後翅ノ前緣ニ黑褐毛ヲ簇生ス、觸角ハ暗黃、尾端ニ筆毛樣ノ擔狀毛アリ、

體長(♀)一寸、開張二寸六分、

分布—臺灣(北埔)、

(145) りんごかれは

學名 Odonestis Pruni L.

昆蟲學上ノ地位 枯葉蛾科

體翅赤褐、前翅ノ橫脈上ニ一銀白紋ヲ具ヘ、其內方ニアル橫線ハ褐色ニシテ、少シク波狀ヲナス、又外方ニアル斜條ハ黑褐ニシテ判然ス、尙外緣ニ近キ波狀線ハ褐色ニシテ、其外側ハ濃黃色、外緣ハ波狀ニ刻ラル、後翅ハ淡褐、斑紋ナシ、裏面ハ黃色、前翅ノ一橫帶、翅端及ビ外緣ハ黑褐、後翅ハ暗黃褐、二條ノ黑褐帶アリテ、外方ニアルモノハ波狀ヲナス、體下ハ褐色、體長(♂)(♀)六分乃至一寸、開張一寸五分乃至二寸八分、

第十二圖(2)(♂)

分布—北海道、本州、滿洲、歐洲、

(146) まつおほかれは

學名 Dendrolimus undans Wk. var. excellens Butl.

昆蟲學上ノ地位 枯葉蛾科

雌雄ハ大ニ翅ノ彩色ヲ異ニシ、雄ノ前翅ハ橙黃色、外緣ハ廣ク黑褐、此部分ハ第四室ニテ深ク刻ラ

第十二圖(3)(♀)

ル、翅底ニ近ク卵形ノ環狀紋アリテ、其外側ニ一白點ヲ裝ヒ、其外方ニ太キ赤褐ノ一帶アリテ、其限界ハ黑褐、更ラニ其外方ニ二三條ノ暗色帶アレドモ除リ判然セズ、後翅ハ暗褐、中央ニ濃色ノ一帶アリ、雌ニテハ暗黃色、斑紋モ亦淡色ナリ、約五條ノ黃褐帶アリテ、第四條ト第五條ノ間ハ黃色、其外側ニモ黃紋ヲ橫列ス、外緣ハ黃褐、後翅ハ淡黃褐、裏面モ亦淡黃褐、三條ノ濃色帶ヲ具ヘ、前後ノ兩線及ビ外緣ハ黃褐、體長(♂)(♀)一寸一分乃至一寸三分、開張二寸二分乃至三寸五分、幼蟲ハ松ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、印度、

(147) ほしかれは

學名 Epicnaptera populifolia Esp.

昆蟲學上ノ地位 枯葉蛾科

體翅黃褐、前翅ニ約六條ノ波狀線アリテ、何レモ暗色ヲ呈シ、相斷續セルヲ以テ暗色ノ紋列ヲ有スルガ如シ、外線ハ少シク弓狀ニ刻ラル、後翅ハ稍卵形ニシテ、中央ニ三條ノ暗色帶ヲ具ヘ、之レハ前緣ヨリ中央ニ亘リテ判然ス、何レモ點紋トナリ斷續ス、外緣ハ弓狀ニ刻ラル、裏面ハ個種ニヨリ前翅ノ中央、翅端並ビニ後翅前緣ノ暗黑ナルモノアリ、胸背ニ黑褐ノ一背線ヲ具ヘ、腹背ニ暗色毛ヲ有スル處アリ、體長(♂)(♀)七分乃至一寸二分、開張二寸乃至二寸八分、

第十二圖(4)(♀)

分布—北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

(附言) 著者ハ日本昆蟲總目錄ニ *E. ilicifolia* L. ノ學名ヲ用ヒタレドモ誤ナレバ茲ニ訂正ス、

(148) ひめかれは

學名 Epicnaptera ilicifolia L. var. japonica Leech.

昆蟲學上ノ地位 枯葉蛾科

體翅赤褐、灰白ヲ帶ビタル部分アリ、前翅ニ三條ノ暗色帶アリテ、其內二條ハ波狀ヲナシテ中室及ビ中室外ニ位シ、一條ハ外緣室ノ中央ヲ斜走ス、何レモ間室ノ中央ハ白色ナリ、外緣室ハ淺ク弓狀ニ刳ラレ、第一室ノ外緣ハ深ク刳ラル、後翅ハ前翅ヨリモ濃色、中央ニ白色部アリ、其兩緣ハ濃緣ニヨリテ界セラル、裏面ハ淡色、前翅ニ二條、後翅ニ一條ノ濃色帶アリ、後翅底ノ大半ハ黑褐、緣毛ノ一部ハ白色、雄ハ雌ヨリモ一層濃色、翅底鱗ノ後緣ハ暗色、腹面ハ暗褐、體長(♂)(♀)六分乃至七分、開張一寸五分乃至一寸八分、幼蟲ハ薔薇科植物ノ葉ヲ食ス、

第十二圖 (5) (♀)

分布—北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

(附言) 著者ハ日本昆蟲總目錄ニ E. tremulifolia Hb. ノ學名ヲ用ヒタレドモ誤ナレバ訂正ス、

(149) たけかれは

學名 Cosmotriche (Odonestis) potatoria L.

昆蟲學上ノ地位 枯葉蛾科

體翅ハ普通黃色ニシテ、前翅ノ中央ニ近ク銀色ノ二紋ヲ裝ヒ(銀色紋ヲ缺クモノアリ)、前緣角ヨリ後緣ノ中央ニ褐色若クハ暗色ノ一條ヲ斜走シ、尙翅底ニ近ク同色ノ一帶ヲ裝フ、外緣ニ近ク褐色ノ波狀線アレドモ雌ニテハ判然セズ、後翅ノ外半ハ暗色、裏面ハ淡色ニシテ斑紋ヲ缺ク、體長(♂)(♀)七分乃至一寸一分、開張一寸八分乃至二寸三分、幼蟲ハ竹ノ葉ヲ食ス、

第十二圖 (6) (8) 變種 (♀)(♀)

分布—北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

(附言) (8)ハ變種 Var. albomaculata Brem. ト稱スルモノニシテ、斑紋ハ原種ト略同樣ナレドモ常ニ赤褐ニシテ、中央ニアル斜條ノ外側ハ白色ナリ、

(150) まいまいが

學名 Lymantria dispar L.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

雌ハ灰黃白、前翅ニ各一個ノ字形ノ黑褐紋ヲ裝ヒ、其內方ニ同色ノ小圓紋アリ、尙暗色ノ一波狀線アレドモ其外側ニアルモノハ判然セズ、外緣ニ八個ノ黑褐紋ヲ列ス、後翅ニ同樣ノ九紋ヲ裝フ、雄ハ暗灰色、斑紋ハ同樣ナレドモ一層濃色ニシテ判然ス、體長八分乃至一寸二分、開張一寸八分乃至二寸七分、幼蟲ハぶらんこけむし若クハはんのけむしト稱シ、殆ンド總テノ果木ヲ食害ス、雄ハ旋轉シテ飛翔スルヲ以テまいまいがノ名アリ、

第十二圖 (9) (♀)

分布—世界共通、

(151) をびが

學名 Apha tychoona Butl.

昆蟲學上ノ地位　帶蛾科

體翅黃褐、體下及ビ翅ノ裏面ハ美麗ノ橙黃色、前翅ノ前緣ニ暗綠紋ヲ散在シ、中室ニ同色ノ一點アリ、其外側ニ波狀綠アレドモ判然セズ、前綠角ヨリ後綠ノ中央ニ向ヒ黃色ノ一斜條ヲ逕リ、其外側ハ廣ク暗綠、後翅ハ前翅ト同樣ナレドモ外綠ノ暗綠部ハ少シク淡色、之レニ赤褐ノ齒形紋ヲ具ヘ、一橫帶ヲ裝フ、體長五分乃至六分、開張一寸五分乃至一寸九分、幼蟲ハうつぎノ葉ヲ食ス、本邦普通ノ種類ナリ、

分布―北海道、本州、四國、九州、

(152)まつかれは

學名　Dendrolimus (Eutriche) Pini L.

第十二圖
(11)(10)
(♂)(♀)

昆蟲學上ノ地位　枯葉蛾科

體翅ノ色ニ種々アリテ、赤褐、黑褐又黃褐ナルモノアリ、何レモ前翅ノ中央ヨリ少シク翅底ニ近ク一白紋ヲ裝フ、黑褐ノ個種ニアリテハ灰色ノ二橫條ヲ具ヘ、一ツハ白紋ニ近接シ、他ハ波狀ヲナシテ中央ヲ橫走ス、赤褐ノ個種ニアリテハ黑色ノ三波狀線アリ、裏面ハ淡色ニシテ二條ノ濃色帶ヲ具ヘ、前翅ノ外方ニアルモノハ點線ヲナス、體長(♂)八分乃至一寸三分、(♀)八分乃至一寸三分、開張一寸八分乃至三寸二分、幼蟲ハ松ノ葉ヲ食ス、

分布―北海道、本州、四國、九州、支那、滿洲、歐洲、

(153)かれはが

學名　Gastropacha quercifolia L. var. cerridifolia Feld.

第十二圖
(12)
(♀)

昆蟲學上ノ地位　枯葉蛾科

體翅赤褐、翅ノ外綠ニ著シキ犬牙狀ノ切目ヲ有ズ、前翅ニ二條ノ黑キ波狀線アリテ、一ハ外綠ニ近ク位シテ太ク、他ハ中央ニアリテ細シ、外綠角ニ近ク一個ノ大黑紋ヲ裝フ、後翅ノ中央ニ黑色ノ一橫條ヲ具ヘ、翅ヲ疊ムトキハ後翅ノ前綠ヲ出シ、恰モ枯葉ノ觀ヲ呈ス、裏面ハ少シク淡色、二條ノ橫帶アリテ、外側ニアルモノハ點紋ヲナス、後翅ノ帶ハ太クシテ判然シ、翅底ハ黃褐、腹部ハ淡色、體下ハ暗褐、體長(♂)一寸乃至一寸二分、(♀)一寸二分、開張二寸四分、幼蟲ハ苹樹ノ葉ヲ食ス、

分布―北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

(154)しろけんもん

學名　Acronicta leporina L. var. leporella Stgr.

第十四圖
(1)
(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

翅ハ白色、脈ハ暗褐、前翅ノ基部ハ少シク黑色ヲ帶ビ、翅底ニ細キ劍狀紋ヲ裝フ、環狀紋、其外方ニアル弦月紋、其下方ニアル短橫線及ビ外綠ニ近キ波狀線ハ黑色、外綠ニハ約六個ノ小黑紋ヲ橫列ス、後翅ハ稍ヤ半透明、外綠ニ約七個ノ小黑色ヲ列スレドモ種類ニヨリ全ク之ヲ缺クモノアリ、裏面ハ表面ト同色、斑紋モ亦表翅ニ異ナラズ、但ダ後翅ノ中室ニ黑色ノ小紋ヲ裝フ、體ハ黑色、白色

ノ長毛アリ、觸角ハ白色、其半面ハ黒褐、脚ハ白色、體長(♂)(♀)七分、開張一寸五分、

分布—北海道、本州、滿洲、

(155) なしけんもん

學名 Acronicta rumicis L.

第十四圖(2)(♀)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ黒色ト灰白ト相交ハリ、半横線、前横線、中横線及ビ後横線ハ黒色ニシテ判然シ、何レモ鋸齒狀ヲナス、環狀紋ハ判然スレドモ腎狀紋ノ判然セザルコトアリ、腎狀紋ノ下方ニ(1b室)一白紋ヲ負ヒ、其外側ニ黒色ノ細キ劍狀紋ヲ裝フ、前横線ト後横線ノ間ハ淡色ナルヲ常トス、後翅ハ暗褐、翅底及ビ中央ハ暗黄、前翅ノ裏面ハ暗褐、前縁ノ基部及ビ縁毛ノ斑點ハ暗黄色、後翅ハ暗黄、外縁ハ暗褐、其內方ニ暗褐ノ一紋ト弧狀線アリ、縁毛ハ暗黄、各節節ハ黒色ト白色ノ交互斑ヲナス、腹部ハ暗黄、體長(♂)(♀)五分、開張一寸三分、幼蟲ハ梨、李等ノ葉ヲ食害ス、

分布—北海道、本州、支那、歐洲、

(156) うすきしたもや

學名 Agrotis (Triphaenopsis) cinerascens Butl.

第十四圖(3)(♂)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ暗褐、半横線、前横線、後横線ハ黒色、環狀紋ハ判然スレドモ腎狀紋ノ判然セザルコトアリ、

後横線ハ中室ノ外方ニ於テ著シク外方ニ彎曲シ、之レト腎狀紋トノ間ハ淡キ暗黄ニシテ、此一圓ハ稍ヤ圓形ヲナス、其外方ハ灰白、波狀線ハ暗黄ナレドモ判然セズ、外縁ニ黒色ノ波狀紋ヲ裝ヒ、縁毛ハ黒褐、後翅ハ暗黄、外縁ヨリ翅底ニ亘リテ廣キ暗褐帶ヲ裝フ、縁毛ハ暗黄色、裏面ハ淡色、前翅中央ノ一縦紋、後横線及ビ其外方ノ太キ一帶ハ濃色、後翅中央ノ一紋、外縁ニ於ケル細太ノ二横條ハ暗褐、體ハ灰褐、後胸背ノ中央及ビ第一、第二、第三並ニ第四腹節ノ背上ニ黒褐ノ毛塊ヲ具ヘ、尾端ニハ鬃狀毛ヲ裝フ、體長(♂)(♀)七分、開張一寸五分內外、

分布—北海道、朝鮮、

(157) はいいろきしたもや

學名 Agrotis (Epilecta) semiherbida Wk.

第十四圖(4)(♀)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰褐、半横線、前横線、後横線ハ何レモ暗色ニシテ判然セズ、環狀紋、腎狀紋ハ黒色ノ不完周線ヲ有ス、後翅ハ橙黄色、前縁ノ基部及ビ內縁ニハ淡色毛ヲ裝ヒ、外縁ノ太キ横帶及ビ中央ノ一紋ハ黒色、裏面ハ表面ト略同色、前翅ノ外縁ハ暗黄、其內方ニアル黒褐帶ハ稍ヤ楔狀ヲナス、體ハ灰褐、鬃狀毛ハ黄色、體長(♂)(♀)六分、開張一寸六分、

分布—北海道、本州、印度、

(158) どろけんもん

學名 Acronicta Psi L.

第十四圖(5)(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰色、半横線、前横線、後横線ハ暗黒、翅底及ビ第一室(1b)ニ劍狀紋ヲ具ヘ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ黒色ノ短縦線ニヨリテ連絡ス、波狀線ハ黒色ニシテ判然シ、其外方ハ稍ヤ濃色、外緣ニ約六個ノ小黒點ヲ横列ス、後翅ハ灰色乃至灰白色、外緣ニ濃色ノ一帶ヲ有スルモノト有セザルモノトアリ、裏面ハ白色、前翅ノ斑紋ハ暗色、後翅ノ中央ニ一双ノ黒紋ヲ裝フ、體ハ灰色、黒毛ヲ交ヘ斑ヲナス、體長(♂)(♀)六分内外、開張一寸三分、幼蟲ハ白楊ノ葉ヲ食害ス、

分布―北海道、本州、朝鮮、滿洲、歐洲、

(159)しまけんもん

學名　Acronicta (Hyboma) fasciata Moor.

第十四圖(6)(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰白、翅底ニ黒褐ノ劍狀紋ヲ裝フ、環狀紋ハ白色、腎狀紋ハ黒色及ビ灰白ノ周緣ヲ有シ、其中央ハ灰褐、兩紋ノ中間ハ少シク濃色ヲ帶ブ、後横線及ビ波狀線ハ黒色、後緣ニ近キ波狀線上ニ黒褐ノ劍狀紋ヲ裝ヒ、其附近ハ暗褐、後翅ハ淡黄白、外緣ニ暗色ノ一線及ビ一廣帶アリ、裏面ハ灰黄色、前翅ノ外緣及ビ之レニ沿ヘル二横線、後翅ノ黒紋及ビ一横帶ハ暗黒、體長(♂)五分、開張一寸、

分布―本州、支那、印度、

(160)ひめこまけんもん

學名　Diphtera (Lamprosticta) venusta Leech.

第十四圖(7)(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅ハ青味ヲ帶ビタル白色、環狀紋ノ附近ハ黒色、其内部ニ黒點アリテ、之レハ少シク下方に偏在ス、腎狀紋ハ不正形ヲナシ、其外方ニ三角形ノ黒紋ヲ横置シ、之レニ平行シテく字形ノ一線アリ、翅底ノ劍狀紋、其外方ノ二縦紋、外緣ニ平行セル犬牙狀ノ二紋列、後緣ノ中央ニ列レル四横紋ハ黒色、後翅ハ灰褐、其外緣ハ少シク濃色、緣毛ハ灰ビ、基部ニ灰色ノ細毛ヲ裝フ、外緣ニハ灰色ノ太キ一帶ヲ具ヘ、其外方ニ表面同樣ノ黒紋ヲ横列ス、後翅ハ表面ヨリモ淡色、中央ニ一暗色紋、外緣ニ近ク暗褐ノ一横線ヲ裝フ、頭及ビ胸背ハ灰白、前胸背ノ中央ニ三稜形ノ毛塊ヲ有シ、其周圍ハ黒色、腹部ハ灰褐、背上ニ三個ノ黒毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)五分五厘、開張一寸三分、

分布―北海道、

(161)たんぼやが

學名　Agrotis ditrapezium Bkh.

第十四圖(8)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰褐、少シク紫色ヲ帶ブ、半横線、前横線、後横線ハ灰色、環狀紋及ビ腎狀紋ノ周輪モ亦灰色、翅底、兩紋間並ビニ後横線ノ外方ハ黒褐、波狀線ハ判然セズ、緣毛ハ黒褐、後翅ハ灰黄色、裏面ハ灰黄ニシテ斑紋ナク、後翅中室ノ一紋ト其外方ノ一横帶ハ暗褐、體は暗灰色、背上毛ハ少シク濃色ナリ、體長(♂)(♀)六分五厘、開張一寸六分、幼蟲ハ蒲公英(タンポ)、ひなぎく等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、滿洲、印度、歐洲、

(162) りんごけんもん

學名 Acronicta tridens Schiff.

第十四圖(9) (♂)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰白、少シク赤味ヲ帶ブ、斑紋ハ黑色、翅底ニ太キ劍狀紋ヲ具ヘ、之レニ三齒アリ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ一線ニヨリテ相接續ス、外緣ニ波狀線アリテ、之レニ二個ノ劍狀紋ヲ裝フ、後翅ハ白色、少シク暗褐ヲ帶ブルモノアリ、外緣ハ暗褐、前翅裏面ノ前緣ハ暗褐、後緣ハ灰白、金光アル細毛ヲ粗生ス、胸背ニハ灰白ノ長毛ヲ裝フ、體長(♂)(♀)七分、開張一寸五分、幼蟲ハきんけむしニ酷似スレドモ長毛ヲ有ス、苹樹、梨、櫻、梅、李、柳等ノ葉ヲ食害ス、

分布—北海道、本州、臺灣、朝鮮、滿洲、歐洲、

(163) くろふけんもん

學名 Acronicta Jankowskii Obth.

第十四圖(10) (♀)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ黑褐ト灰白ト相半バシ、斑紋ハ凡テ黑褐色、翅底ニ天鵞絨樣ノ楔狀紋ヲ具ヘ、半橫線、前橫線、後橫線ハ各二條ニシテ相平行ス、後橫線ハ犬牙狀ニ凹凸シ、外緣ニハ約七個ノ黑紋ヲ橫列ス、後翅ハ灰色、外緣ハ暗灰色、裏面ハ少シク黃味ヲ帶ビタル白色、前、後兩翅ノ中室ニ各一個ノ黑紋

ヲ裝ヒ、種類ニヨリ其外方ニ一橫帶ヲ走ラスモノアリ、胸背ハ灰白、黑褐毛ヲ混ズ、體長(♂)(♀)五分五厘、開張一寸二分、

分布—北海道、

(164) ごまけんもん

學名 Diphtera alpium Osb. var. murrhina Graes.

第十四圖(15)(11) (♀)(♂)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅淡青色、少シク白斑ヲ交ユ、斑紋ハ凡テ黑色、半橫線、前橫線ハ判然スレドモ中橫線、後橫線ハ唯黑點ノ斷續セルニ過ギズ、環狀紋ハ判然スレドモ腎狀紋ハ半周ヲ有スルノミ、波狀線ノ外方ニ凹凸アル赤褐ノ橫帶ヲ裝ヒ、外緣ニ近ク第一(1b)室、第四及ビ第五室ニ三角形ノ黑紋アリ、外緣ニハ黑、白相半バセル約七個ノ小紋ヲ橫列ス、後翅ハ暗褐、黑白ノ緣毛ヲ裝ヒ、後緣角ニ波狀ヲナセル白紋ヲ裝フ、裏面ハ淡キ暗褐、後翅ニ黑紋及ビ波狀線ヲ有ス、胸背ハ淡青色、其前緣及ビ中央ニ黑色ノ橫帶ヲ具ヘ、前者ノ後方ニ白橫線及ビ一黑點ヲ有ス、體長(♂)四分(♀)五分五厘、開張(♂)一寸一分(♀)一寸二分、幼蟲ハかしわ、ぶな等ノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、本州、支那、西比利亞、

(165) にっこうあをもん

學名 Diphtera pulchripicta Wk.

第十四圖(12) (♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅青綠色、翅底ヨリ中央ニ亘リテ黑褐ノ太キ眼狀紋ヲ有シ、其內線及ビ外線ニ銀白ノ周緣ヲ繞ラス、此圈周ハ翅底ニ近キ後緣ニ於テ開口ス、前緣角及ビ後緣角ハ白色、緣毛ハ中央ニテ黑褐、後翅ハ白色、外緣ハ少シク暗褐ヲ帶ブ、體ハ暗褐、胸背及ビ腹背ノ中央ニ黑褐ノ毛塊ヲ具ヘ、腹背ニアルモノハ濃色ニシテ、恰モ泥塊ヲ附着セルガ如シ、體長(♂)五分、開張一寸、

分布—本州(日光)、印度、

(166)まへじろやが

學名　Agrotis plecta L.

第十四圖(13)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗赤褐、前緣ハ腎狀紋迄灰白、翅底ニ黑色ノ縱線アリ、前橫線及ビ後橫線ハ暗色、波狀線ハ黃色、何レモ餘リ判然セズ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ灰色ニシテ少シク黃色ヲ帶ブ、此兩者ヲ貫キテ黑色ノ太キ一線ヲ縱走シ、之レハ內方ニ向ッテ尖ル、後翅白色、何レモ餘リ判然セズ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ灰色、裏面ハ黃白、頭部ニ黃褐毛ヲ裝フ、體長(♂)(♀)五分、開張一寸一分、幼蟲ハ甘菜、蔕菖、防風等ノ植物ヲ害ス、

分布—北海道、本州、朝鮮、滿洲、印度、歐洲、亞米利加、

(167)しろしたけんもん

學名　Acronicta hercules Feld.

第十四圖(14)(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰白、半橫線、前橫線、後橫線ハ何レモ暗色ニシテ、斷續セル波狀ヲナシ、餘リ判然セズ、環狀紋ノ內圈ハ白色、腎狀紋ノ內部ハ暗褐色、黑色ノ太キ縱線アリテ、兩紋ヲ連絡ス、波狀線ハ黑色ニシテ判然シ、其中央及ビ後緣ニ近ク各一個ノ劍狀紋ヲ裝フ、翅底ニ一個ノ劍狀紋アレドモ之レハ種類ニヨリ餘リ判然セズ、波狀線ノ外方ニ暗褐ノ部分アリ、外緣ニ平行シテ暗褐ノ縱紋ヲ橫列ス、之レハ後緣ニ至ルニ從ヒ不明トナル、後翅ハ灰色、翅裏面ノ中央ハ黑色、黑帶ヲ橫走ス、後翅ノ裏面ニ一黑紋及ビ一橫帶アリ、體ハ灰白、腹面ニ少シク淡紅ヲ帶ブルモノアリ、體長(♂)八分(♀)九分、開張二寸、

分布—北海道、本州、滿洲、

第十四圖(16)(♂)

(168)はこべやが

學名　Agrotis triangulum Hufn.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅赤褐、前橫線、後橫線及ビ波狀線ハ黑褐、翅底ニ漆黑ノ一小紋アリ、中室ハ全部黑褐ニシテ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ淡色、後翅ハ淡黃白、外緣ニ近ク暗褐ノ太キ橫帶ヲ裝フ、前翅裏面ノ大半ハ暗黑、後翅ノ裏面ハ表面同樣ナレドモ橫線ヲ有セズ、胸背ハ赤褐、腹背ハ黃褐、橙黃色ノ帶狀毛ヲ裝フ、體長(♂)六分五厘、開張一寸四分、幼蟲ハはこべ、だいこんさうノ葉ヲ食ス、

分布—本州、歐洲、

(169) しろもんやが

學名 Agrotis C-nigrum L.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰黒、少シク赤紫色ヲ帶ブ、前線ノ中央ニ三角形ノ灰白紋ヲ具ヘ、其附近ハ黒色、腎狀紋ハ灰白、其外側ヨリ淡色ノ横線ヲ後線ニ近ク一個ノ黒紋アリテ、之レヨリ淡色ノ波狀線ヲ出シ、外線ト相平行ス、兩者ノ中間ハ暗黒色、後翅ハ灰白ニシテ、少シク黄色ヲ帶ブ、前胸ノ前線ニ灰白ノ輪環アリ、體長(♂)(♀)六分、開張一寸三四分、幼蟲ハ各節ニ八字形ノ黒紋ヲ裝フテ以テ俗ニはちのじねきりト稱シ、亞麻、甘藍、豌豆、玉葱等ヲ食害ス、

分布—北海道、本州、朝鮮、印度、歐洲、

第十四圖(17)(♂)

(170) せんもんやが

學名 Agrotis informis Leech.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰褐、半横線、前横線ハ次白、前横線ノ中方ニ近キ處ヨリ黒色ノ栓狀紋ヲ外方ニ向ツテ縦走ス、前横線ヨリ内方ハ赤褐、環狀紋、腎狀紋ハ黒色、後横線ト外線トノ間ハ暗褐色、波狀線ハ灰色ナレドモ、種類ニヨリテ判然セザルモノアリ、後翅ハ白色、外線ノ少シク暗色ナルモノアリ、前胸背ノ前線ニ黒色ノ一横帶ヲ裝フ、體長(♂)(♀)六分、開張一寸三分、

第十四圖(18)(♀)

分布—北海道、本州、

(附言) 此種ノ變種 var. confluense Leech ハ前翅ノ環狀紋著シク變形シテ栓狀ヲナシ、腎狀紋ト相接スルヲ以テ區別シ得ベシ、

(171) おほほそばけんもん

學名 Acronicta cuspis Hb.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗灰色ニシテ、少シク淡紫色ヲ帶ビ、翅底及ビ後線角ニ近キ外線ニ各一個黒色ノ劍狀紋ヲ裝フ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ淡灰色、後横線ヨリ外線ニ至ル一圓ハ濃色、第四及ビ第五ノ兩室ニ黒縦線ヲ有スレドモ餘リ判然セズ、後翅ハ灰白、外線ハ少シク暗色ヲ帶ブ、翅ノ裏面ハ灰色、一横線並ニ後翅ノ一小紋ハ暗褐、體長(♂)六分五厘、開張一寸六分、幼蟲ハはんのきノ葉ヲ食ス、

分布—北海道、朝鮮、支那、滿洲、歐洲、

第十四圖(19)(♂)

(172) きばらけんもん

學名 Trichosea champa Moor.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅淡黄白、少シク淡紅色ヲ帶ブ、各横線ハ黒色ニシテ波狀ヲナシ、環狀紋ハ小ニシテ白色、外方ハ黒色、更ラニ其外方ニ當リ腎狀紋ニ沿フテ白色ノ部分アリ、腎狀紋ハ黒色ノ周線ヲ有スレドモ餘

第十四圖(20)(♀)

リ判然セズ、翅底及ビ外横線ノ下方ニ濃黒ノ栓状紋アリ、後翅ハ白色、脈ハ褐色、翅底及ビ内線ニ黄色ヲ密生ス、裏面ハ白色、前翅ノ中室及ビ其附近ハ橙黄色、脈、前線ノ中央、其外方ニアル横紋及ビ外線角ニ於ケル三角紋ハ黒色、後翅ノ翅底及ビ内線ニ表面同様ノ黄色ヲ装フ、前線ノ約三分ノ一ノ處ニアル一紋、其外方ニアル横線及ビ外線ハ黒色、體ハ白色ノ長毛ヲ以テ被ハレ、前胸背ノ前線ニハ黒帯アリ、胸背及ビ腹背ノ斑紋ハ黒色、各腹節ノ兩側ハ黄色、腹面ニ黒斑ヲ縦列ス、體長(♀)五分五厘、開張一寸五分、

分布—北海道、九州、印度、

第十四圖(21)(♀)

(173)おほけんもん

學名 Acronicta major Brem.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅暗灰色、環狀紋及ビ腎狀紋ハ判然ス、前線ニハ數個ノ短カキ黒條ヲ有スレドモ判然セズ、翅底ニ近ク大ナル黒色ノ劍狀紋ヲ具ヘ、波狀線ハ黒色、之レニ二個ノ劍狀紋ヲ有スレドモ、其上方ニアルモノハ小ナリ、後翅ハ灰褐色、裏面ハ灰色ニシテ、少シク黄色ヲ帶ブ、前翅ノ中室ニ淡黄ノ長毛ヲ裝ヒ、半横線、波狀線ハ黒色、後翅ノ黒紋及ビ黒横線ハ判然セリ、體長九分、開張二寸一分、

分布—北海道、本州、滿洲、印度、

第十四圖(22)(♀)

(174)まへきやが

學名 Agrotis stupenda Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰黒、少シク紫色ヲ帶ブ、前線ノ基部約三分ノ二ハ少シク赤色ヲ帶ビタル灰黄色、環狀紋及ビ腎狀紋ハ灰黄、其附近ハ漆黒、後横線及ビ波狀線ノ間ハ淡色、後翅ハ灰黄、外線ニ至ルニ從ヒ暗色ヲ帶ブ、前翅ノ裏面ハ暗黒、後翅ノ中央ハ灰黄、前胸背ノ前線ニ灰褐毛ヲ裝フ、體長(♀)六分、開張一寸四分、

分布—本州、朝鮮、支那、西比利亞、

第十四圖(23)(♂)

(175)きはだけんもん

學名 Acronicta leucocuspis Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰白、斑紋ハ暗色、翅底及ビ波狀線上ニ黒色ノ劒狀紋ヲ裝フ、前横線ハ一双ニシテ犬牙狀ヲナシ、中横線及ビ後横線ハ前線ニテ判然ス、後翅ハ白色、翅脈ハ灰色、外線ハ濃色ナリ、其内方ニ暗色ノ細帶アリ、胸背及ビ腹基部ハ暗灰色、體長(♂)六分、開張一寸四分、幼蟲ハ梅、桃等ノ葉ヲ食害ス、

分布—本州、

第十四圖(24)(♀)

(176)きのかはが

學名 Stictoptera (Dandaca) senex Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ノ大部ハ白色若クハ灰色、處々ニ青綠色ノ斑紋ヲ散在シ、一見樹皮ニ似タリ、半橫線、前橫線、後橫線及ビ波狀線ハ黑色、前橫線ノ外方ニ黑褐ノ一橫線アリ、翅底及ビ後綠角ニ各一個ノ黑紋ヲ有スレドモ、個種ニヨリ劍狀ヲナスモノアリ、後翅ハ黃褐、外綠ニ暗黑ノ太キ一橫帶ヲ裝フ、裏面ハ淡黃白、前後兩翅ニ各二條ノ暗色帶ヲ橫走シ、其外綠ニ近キモノハ幅廣シ、頭及ビ胸背ハ前翅ト同色ナレドモ腹部ハ黃褐ナリ、體長(♀)(♂)六分、開張一寸二分、幼蟲ハ柿ノ葉ヲ食ス、

分布—本州、

(177) おほふたをびきよとう

學名 Leucania (Mythimna) biundulata Motsch.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

第十四圖(25)(♀)

體翅灰色、黑色ノ小斑ヲ散在ス、翅底及ビ外綠ニ近ク黑色ノ橫線ヲ裝フ、綠毛ハ褐色、後翅ニ斑紋及ビ橫條ヲ有セズ、裏面ハ少シク赤味ヲ帶ビ、前翅ノ翅底ニ近ク赤色ノ長毛ヲ裝フ、體長(♂)(♀)九分、開張一寸七分、

分布—本州、朝鮮、

(178) こふたをびきよとう

學名 Leucania divergens Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

第十四圖(26)(♀)

前翅黃褐、小黑點ヲ散在ス、前種同樣ニ二條ノ黑橫線ヲ具ヘ、其中間ニハ淡色ノ腎狀紋ヲ裝フ、其外方ニ濃褐ノ斑紋ヲ有スレドモ、餘リ判然セズ、外綠ニ黑色ノ小黑點ヲ橫列ス、綠毛ハ少シク濃色、後翅ノ翅底ハ白色、外綠ニ近ク暗褐ノ部分アリ、裏面ハ赤褐、前後ノ兩翅ニ各一條ノ黑橫線ヲ裝ヒ、翅底ニ赤色ノ長毛ヲ簇生ス、體長(♂)(♀)八分、開張一寸六分內外、

分布—北海道、本州、朝鮮、

(179) あをけんもん

學名 Diphtera japyx Stgr.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

第十四圖(27)(♂)

前翅ノ大半ハ白色、暗褐ノ二橫條ヲ以テ翅ヲ三分シ、不正形ノ黑紋ヲ裝フ、中央ニ黑色ノ栓狀紋、判然セザル環狀紋及ビ腎狀紋ヲ具ヘ、後者兩紋ノ中間ハ前綠マデ黑色ヲ呈ス、綠毛ハ白色ト黑色ノ交互斑ヲナス、後翅ハ暗褐、綠毛ハ白色、裏面ハ暗褐、前翅ノ前綠ニ白點ヲ並列シ、前胸及ビ腹背ニ三角形ノ毛塊ヲ裝フ、體長四分五厘、開張一寸、

分布—北海道、本州、朝鮮、

(180) もくめやが

學名 Agrotis putris L.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

第十四圖(28)(♂)

前翅灰褐、黑褐ノ小點ヲ散在ス、前線ハ黑褐、腎狀紋及ビ環狀紋ノ周線ハ赤褐、內部ハ黑褐ナリ、前橫線ハ著シク波狀ヲナシ、後橫線ハ點線ヲナス、外線ニハ黑點ヲ橫列シ、前線角ノ下方ニ黑褐ノ縱條ヲ內方ニ逆ル、後翅ハ白色、外線ハ少シク黑褐ヲ帶ブ、裏面ハ灰色、頭及ビ頸毛ハ黃褐、體長(♀)(♂)四分、開張一寸一分、

分布—北海道、本州、朝鮮、歐洲、

(181) ちやをびよとう

學名 Miana segregata Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

體翅暗褐、前翅ノ中央ニ濃色ノ廣帶ヲ裝ヒ、後線ニ至ルニ從ヒ增幅ス、前線角ニ近キ前線ニ濃色ノ〈字紋アリテ、其兩側ハ灰白、外線ニハ灰白ノ細條ヲ橫走ス、後翅ハ暗黃褐、裏面ハ表面ヨリモ稍々淡色、斑紋ヲ有セズ、體長(♂)(♀)五分、開張九分、

分布—本州、朝鮮、支那、西比利亞、

第十四圖 (29) (♂)

(30) (♀)

(182) しろをびきよとう

學名 Calymnia camptostigma Mén.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅暗灰色若クハ暗褐色、半橫線及ビ他ノ二橫線ハ黑線ヲ有スル白色、中央部ハ赤褐乃至暗褐ニシテ、太キ〈字形ノ褐色帶アリ、前線ニ白線ヲ有スル半圓紋ヲ裝フ、外線ハ暗色、其內方ニ白條ヲ有ス、後翅ハ暗褐ニシテ、外線ニ至ルニ從ヒ濃色ヲ呈シ、線毛ハ黃色ナリ、體長六分、開張一寸二分、

分布—本州、支那、滿洲、

第十五圖 (1) (♀)

(183) かぶらやが

學名 Agrotis segetum Schiff.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

(170) せんもんやがニ酷似スレドモ其異ナル處ハ次ノ如シ、

一、前翅ノ色ハ種々ニシテ灰褐、灰黑若クハ灰色ナルモノアリ、

二、腎狀紋及ビ環狀紋ノ周圍ハ黑褐ナレドモ、內部ハ淡色ナルヲ常トス、

三、後橫線ハ概ネ判然セズ、判然セル種類ニアリテモ後橫線ト外線トノ中間ハせんもんやがノ如ク濃色ヲ呈セズ、

四、灰色ナル種類ニアリテハ、前線角ニ近キ前線ニ黑色ノ小紋ヲ裝ヒ、外線ニ約七個ノ黑紋ヲ列ス、

五、頸毛ノ前緣ニ波狀ノ黑橫線ヲ裝フ、

六、體長(♂)(♀)六分、開張一寸二分、

幼蟲ハ甘藍、蘿蔔、豌豆等ヲ食害ス、

分布—北海道、本州、九州、朝鮮、支那、滿洲、歐洲、

(184) おほあをはやが

學名 Agrotis virens Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅黃綠、半橫線、前橫線及ビ後橫線ハ黑色、環狀紋及ビ腎狀紋ハ白色ノ周線ヲ有シ、內部ハ赤褐、兩紋ノ間ハ黑褐、波狀線ハ斷續シ、之レヨリ內方ニ黑色ノ縱線ヲ送ル、後線ニハ赤褐ノ長毛アリ、後翅ハ暗灰色、外緣ハ濃色、胸背ハ黃綠、前緣ニ波狀ノ黑帶ヲ裝フ、體長(♂)一寸六分、(♀)二寸一分、開張(♂)一寸六分、(♀)二寸一分、

分布—北海道、本州、滿洲、印度、

第十五圖(2) (♂)

(185) かくもんきしたば

學名 Pseudophia (Chrysolithrum) amata Brem.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅暗褐若クハ灰褐、少シク紫色ヲ帶ブ、翅底ニ近ク〻字形ノ廣キ黑帶アリテ、其兩側ハ灰白色、其外方ニ更ニ廣キ暗黑帶アリテ、此ハ前緣ニ近ク叉狀ニ分支シ、其外側ニアル一枝ノ末端ハ特ニ灰白ノ細線ヲ以テ倒梯形ニ限ラレ、此部分ハ天鵞絨樣ノ黑色ヲ呈ス、兩帶間ノ上方ニハ小黑紋ヲ裝フ、波狀線ハ黑色、後翅ハ暗色、中央ニ橙黃色ノ一帶ヲ具ヘ、前緣及ビ後緣ノ兩角ニモ亦黃紋ヲ裝ヒ、內緣ニハ灰黃ノ長毛アリ、裏面ハ暗褐、前翅底ノ長毛及ビ中央ノ橫帶ハ黃色、後翅ノ一紋及ビ外緣

第十五圖(3) (♂)

ニ近キ一帶ハ暗色、體長(♂)九分、(♀)開張二寸一分、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、

(186) たまなやが

學名 Agrotis ypsilon Rott.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰褐、少シク赤味ヲ帶ブ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ暗色、周線ハ黑色、前者ハ稍不正形ヲナシ、後者ノ外側ニ接シテ黑色ノ楔狀紋ヲ具ヘ、更ラニ其外側ニ二個ノ劍狀紋アリ、前橫線、後橫線及ビ波狀線ハ何レモ淡色、波狀線ト外緣トノ間ハ暗黑、後翅ハ白色、體ハ灰褐、頸毛ノ前緣ハ暗黑、黑色ノ波狀帶ヲ裝フ、體長(♂)(♀)八分、開張一寸五分、幼蟲ハ俗ニ根切蟲ト稱シ、甘藍、蘿蔔、豌豆、其他ノ植物根ヲ食害ス、

分布—北海道、本州、四國、九州、朝鮮、印度、馬來、濠洲、歐洲、

第十五圖(4) (♂)

(187) おほしらほしよとう

學名 Mamestra nebulosa Hufn. var. askolda Obth.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅暗褐、前橫線及ビ後橫線ハ灰白ニシテ黑線ヲ有シ、前者ノ中央ヨリ黑線アル灰色ノ楔狀紋ヲ外方ニ送ル、環狀紋ハ白色、稍菱形ヲ呈シ、腎狀紋ハ大ニシテ外側ハ深ク彎曲ス、波狀線ハ餘リ判然

第十五圖(5) (♀)

セズ、後翅ハ灰褐、內線ニ灰白ノ長毛ヲ裝フ、裏面ハ灰色、後翅ハ灰色ニシテ橫脈上ノ一紋及ビ一帶ハ稍濃色ナリ、體ハ灰色、體長(♀)七分五厘、開張二寸、

分布—北海道、西比利亞、

(188) せぶとももくめ

學名 Rhizogramma (Lithophane) saga Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰褐、褐紋ヲ交ユ、前線角ニ近キ外線ヨリ後線ニ向ヒ黑褐ノ一條ヲ斜走ス、其下方ニモ亦一斜條アリテ後線ニ於テ之レト相會ス、後線ノ基部ハ暗黑、外緣ニハ小黑點ヲ橫列シ、之レヨリ內方ニ向ヒ黑褐ノ短線ヲ縱走ス、緣毛ハ赤褐、犬牙狀ニ凹凸ス、後翅底ハ灰白、脈ハ暗色、外緣ハ暗灰色、脈ハ濃色、緣毛ハ白色、裏面ハ暗色、後翅ノ翅底ハ白色、頸毛ハ灰色、之レニ黑緣ヲ有スル灰白帶ヲ橫走ス、胸部ハ灰色、黑條アリ、體長(♂)八分、開張一寸九分、

分布—本州、朝鮮、滿洲、

第十五圖(6)(♂)

(189) しようぶよとう

學名 Hydraecia nictitans Bkh.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅赤褐、腎狀紋及ビ環狀紋ハ黃褐ニシテ判然シ、半橫線及ビ前橫線ハ各一双アリ、中橫線、後橫線ハ稍太ク、後橫線ノ內外ニ各一條ノ波狀線アリテ、其內側ニアルモノハ犬牙狀ヲナス、後翅ハ暗黃、緣毛ハ黃色、裏面ハ淡黃、前翅ノ中央ハ少シク暗色ヲ帶ブ、頭及ビ胸部ハ赤褐、頸毛ニ一橫線アリ、體長(♂)(♀)五分乃至五分五厘、開張一寸一分、幼蟲ハ菖蒲ノ髓部ニ蠶入シ大害ヲ加フ、

分布—北海道、本州、朝鮮、滿洲、歐洲、亞米利加、

第十五圖(7)(♀)

(190) かぶらおほやが

學名 Agrotis tokionis Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰白、少シク赤紫色ヲ帶ブ、前緣ノ三分ノ二ハ中室マデ黑色、前橫線及ビ後橫線ハ各一双アリテ、前者ノ中央ヨリ黑色ノ栓狀紋ヲ外方ニ逕ル、環狀紋及ビ腎狀紋ノ周緣ハ黑色、後者ハ劃合ニ大ナリ、波狀線ハ淡色、之レト外緣トノ間ハ黑色、但シ翅端及ビ外緣角ハ淡色、緣毛ハ黃褐、後翅ハ灰黑、外緣ハ暗色、光澤アリ、前翅ノ裏面ハ暗黑、後翅ハ灰黃、橫脈上ノ一點及ビ外緣ハ暗色、體長(♂)(♀)七分、開張一寸六分、

分布—北海道、本州、九州、滿洲、

第十五圖(8)(♀)

(191) よとうが

學名 Mamestra Brassicae L.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

第十五圖(9)(♀)

前翅灰褐、光澤ヲ有シ少シク赤味ヲ帶ブ、橫線、環狀紋及ビ栓狀紋ハ黑色、波狀線及ビ腎狀紋ハ白色、外緣ハ波狀ノ凹凸ヲナス、後翅ハ灰黑、翅底ハ淡色、前翅ノ裏面ハ灰黑、後翅ニテハ灰白、前緣及ビ外緣ハ少シク暗色ヲ帶ブ、頭及ビ胸部ハ灰褐、體長(♂)(♀)七分乃至八分、開張一寸三四分、幼蟲ハ俗ニ夜盜蟲ト稱シ、豌豆、甘藍、亞麻、大麻、蕎麥、蔓菁等ヲ食害ス、

分布—世界共通、

(192) ほそばもくめ

學名 Cucullia fraterna Butl.

第十五圖(10)(♂)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅灰褐、前緣及ビ後緣ハ黑色、腎狀紋及ビ環狀紋ハ淡色、外緣ニ近キ後緣ニ一個ノ楕圓紋ヲ具ヘ、其內外ニ黑色ノ一線ヲ縱走ス、外緣ノ一橫線ハ黃色、緣毛ハ灰黑、後翅ハ灰白、脈ハ暗褐、外緣ハ暗褐、前翅ノ裏面ハ暗灰、後翅ニテハ大部白色、內緣ニ長白毛ヲ裝フ、胸部ハ鼠色、頸毛ニハ黑橫線アリ、腹基部ノ背上ニハ黑色ノ毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)七分、開張一寸五分、

分布—本州、

(193) しろすぢあをよとう

學名 Trachea (Hadena) atriplicis L.

第十五圖(11)(♀)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅暗褐若クハ黑褐、半橫線、前橫線及ビ後橫線ハ黑色、環狀紋及ビ腎狀紋ハ白色、稍長方形ノ白紋ヲ裝フ、波狀線ハ灰色、其下方及ビ翅底ハ黃色、外緣ニハ黑色ノ齒狀線アリ、後翅ハ暗灰色、外緣ハ濃色、緣毛ハ灰色、後翅裏面ノ中室點及ビ一橫帶ハ暗色、胸背ハ黑褐、之レニ黃毛ヲ交ユ、體長(♀)(♂)八分、開張一寸七分、幼蟲ハ裴、ぎしぎし等ヲ食トス、

分布—北海道、本州、朝鮮、滿洲、

(194) はそあをばやが

學名 Agrotis praecox L. var. flavomaculata Grass.

第十五圖(12)(♂)

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅淡黃白、少シク綠色ヲ帶ブ、翅底ニ判然セザル黃白紋ヲ裝ヒ、半橫線、中橫線及ビ一双ノ後橫線ハ黑色、環狀紋及ビ腎狀紋ハ淡黃、黑緣ヲ有ス、後橫線ト外緣トノ間ハ赤褐、其內ニ白色ノ波狀線ト黑色ノ三縱線ヲ裝ヒ、翅端及ビ其內側ノ一紋ハ純白、後翅ハ暗褐、外緣ハ少シク濃色、緣毛ハ灰黃、裏面ハ暗色、半橫線及ビ中室點ハ黑色、前翅ノ外緣及ビ後翅ノ前緣ハ白色、體長七分、開張一寸六分、幼蟲ハはまはこべ、のうるし及ビにがよもぎ等ヲ食トス、

分布—北海道、本州、朝鮮、滿洲、

(195) しろてんあをよとう

學名 Trachea (Hadena) melanospila Koll.

第十五圖(13)(♂).

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅黑褐若クハ暗褐、前橫線及ビ後橫線ハ黑色ニシテ灰色線ヲ有シ、中橫線ハ黑色、翅底、前線、環狀紋、腎狀紋及ビ波狀線ハ黃線若クハ橙黃色、兩紋ノ下方ニ菱形ノ一白紋ヲ裝フ、前線ニハ四個ノ灰黃紋ヲ具ヘ、外線ニハ黑色ノ齒狀線アリ、線毛ハ灰黑、犬牙狀ニ凹凸ス、後翅ハ灰白、外線ハ灰黑乃至灰褐、裏面ハ灰褐、後翅ノ基部ハ灰白、中室紋及ビ一橫帶ハ暗色、頭及ビ頸毛ニハ黃綠色ヲ混ジ、腹節ノ背上ニ約三個ノ毛塊ヲ有ス、體長(♂)(♀)七分、開張一寸六分、

分布—北海道、朝鮮、支那、滿洲、印度、

(196) もくめがらす

學名　Amphipyra (Perinaenia) lignosa Butl.

第十五圖 (14) (♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅赤褐、木目樣ノ灰褐紋ヲ具ヘ、中央ニ黑色ノ一縱條ヲ裝ヒ、此ハ外橫線ニ至リテ終ル、其縱線上ニハ白色ノ環狀紋及ビ腎狀紋アリ、外橫線ハ黑色、其外方ニ四五個ノ黑色短線ヲ橫列シ、外線ニハ黑色ノ點線アリ、線毛ハ灰色、其基部ニ暗色ノ一線ヲ裝フ、後翅外線ノ廣帶ハ暗黑、線毛ハ淡白、裏面ハ淡褐、前翅ノ中央ハ淡灰色、暗黑ノ外線及ビ一廣帶ヲ具ヘ、後翅外線ノ一橫帶及ビ中室點ハ黑色ナリ、腹部ハ淡灰色、體長(♂)六分、開張一寸四分、

分布—本州、

(197) おほしろてんあをよとう

學名　Trachea (Hadena) lucia Butl.

第十五圖 (15) (♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗褐、(195)しろてんよとうニ酷似スレドモ黃綠ノ部分遙カニ多ク、中央ニ於ケル白紋ハ楕圓形、大ニシテ環狀紋ト腎狀紋ノ間ニアリ、後翅ハ暗灰、外線ハ濃色、線毛ハ淡黃綠、裏面ハ暗灰色、外線ハ暗褐、前後ノ兩翅ニ各二個ノ暗褐紋ヲ裝ヒ、後翅ノ內線ニハ灰白毛ヲ密生ス、體長(♀)(♂)六分、開張一寸五分、

分布—北海道、本州、

(198) あかまへりが

學名　Agrotis obscura Brahm.

第十五圖 (16) (♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗褐、前線ハ灰色若クハ赤色ヲ帶ブ、半橫線、前橫線、後橫線及ビ波狀線ハ黑線ヲ有スル灰色、環狀紋ハ灰色、周線ハ黑色、腎狀紋ハ灰黑ナレドモ餘リ判然セズ、中橫線ハ淡キ暗色、外線ニハ黑色ノ小點ヲ列ヌ、後翅ハ灰白、外線ニ沿フテ暗黑ノ細線アリ、裏面ハ灰白、後翅ノ前線ハ暗色、之レニ黑色ノ一短線ヲ橫走ス、胸背ハ暗褐ナリ、體幼蟲ハさくらさう其他ノ矮生植物ヲ食ヒス、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、西比利亞、歐洲、亞米利加、

(199) うすづまがらす

學名 Dinumma deponens Wk.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅紫褐色、中央ノ約三分ノ一ハ黑色、其境界ハ犬牙狀ニ出入ス、翅底ハ黑色、外方ニアル二條ノ波狀線ハ白色、外線ニ近ク、黑白ノ點線ヲ橫列シ、翅端ニ近ク黑色ノ小紋ヲ裝フ、後翅ハ暗褐、裏面ハ暗褐、後翅ノ外緣ニ近ク灰白ノ一橫帶アリ、體長(♀)(♂)六分、開張一寸二分、

分布—北海道、本州、九州、朝鮮、支那、印度、

第十五圖(17) (♂)

(200) あやもくめ

學名 Calocampa exoleta L. var. fumosa Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅赤褐、木目樣ノ斑紋アレドモ餘リ判然セズ、環狀紋及ビ腎狀紋ハ暗色、黑色ノ周緣ヲ具ヘ、腎狀紋ノ外方ニ黑色ノ部分アリテ、更ニ其外方ニ數個ノ劍狀紋ヲ裝ヒ、其內二個ハ長シ、後翅ハ暗灰色、翅底ハ淡褐、緣毛ハ淡灰色、頭及ビ頸毛ハ灰褐ニシテ、漆黑ノ廣緣ヲ有ス、胸部ハ暗黑、肩部ハ灰白、腹部ハ灰褐、之レニ暗色ノ橫線ヲ裝フ、體長(♀)八分、開張二寸一分、

分布—本州、

第十五圖(18) (♀)

(附言) 爰ニ揭キタルモノハ變種ニシテ原種ヨリハ多少條紋ヲ異ニセリ、

(201) あをばはがたよとう

學名 Hadena viridimacula Graes.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅暗褐、前緣ノ大部、翅底ニ近キ大紋、環狀紋及ビ腎狀紋ハ黃色、前橫線ハ判然セザル白色、之レハ後緣ニ近ク切斷セラル、其外側及ビ腎狀紋ノ一面ハ黑褐、翅端ヨリ後緣ニ亘リ黃色ノ一橫帶ヲ斜走シ、其外側緣ハ犬牙狀ニ凹凸ス、後翅ハ暗灰色、緣毛ハ黃色、裏面ハ灰褐、兩翅共各一條ノ橫線ヲ裝フ、頸及ビ頭毛ハ黃褐、腹部ハ稍黃色ヲ呈ス、體長(♀)(♂)六分、開張一寸四分、

分布—本州、九州、西比利亞、

第十五圖(19) (♂)

(202) かばすちやが

學名 Agrotis exusta Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅黃褐、前橫線、後橫線、波狀線及ビ平行セル一雙ノ半橫線ハ灰黃、環狀紋及ビ腎狀紋ハ濃黃褐、灰黃ノ周緣ヲ有ス、中橫線ハ餘リ判然セズ、前橫線ノ內方及ビ波狀線ノ外方ハ濃色、外緣ニ沿ヒ黑色ノ點列ヲ橫走ス、後翅ハ淡灰色、緣毛ハ少シク紅紫色ヲ帶ブ、頭及ビ頸部ハ少シク紅色ヲ帶ビ、腹基部ハ白毛ヲ以テ被ハル、體長(♀)(♂)六分、開張一寸五分、

第十五圖(20) (♀)

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、西比利亞、

(203) あかばきりが

學名 Taeniocampa carnipennis Butl.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ赤褐ニシテ、少シク紫紅色ヲ帶ブ、前橫線、後橫線及ビ波狀線ハ濃赤褐、環狀紋及ビ腎狀紋ハ淡色、濃赤褐ノ周線ヲ具ヘ、半橫線ノ基部、翅底ノ三角紋並ニ中室ノ下方ニアルH字形ノ一橫紋ハ漆黑色、後翅ハ白色、裏面ハ灰白ナレドモ少シク紅色ヲ帶ビ、前翅ノ中室ニハ灰白ノ長毛ヲ密生ス、胸部及ビ脚ハ淡紫紅色、腹背ハ蒼白色、體長(♂)六分、開張一寸六分、

分布—本州、

第十五圖(21) (♂)

(204) のこめせだか

學名 Orthogonia sera Feld.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅黃褐若クハ黑褐、翅底及ビ中央ノ廣帶ハ藍黑色、腎狀紋及ビ環狀紋ハ灰黃ノ周線ヲ有スレドモ餘リ判然セズ、環狀紋ノ下方、腎狀紋ノ外方並ニ內線角ノ附近ハ天鵞絨樣ノ黑色、後線ハ黃綠色、外線ニ近ク黃綠ノ波狀帶アリテ、之レト外線トノ間ハ暗褐色、外線ハ赤褐、緣毛ハ暗褐ニシテ犬牙狀ニ凹凸ス、後翅ハ暗黑色、緣毛ハ灰白、裏面ハ暗褐、前翅ノ前緣ハ赤褐、尾端ノ箒狀毛ニハ黃色

第十五圖(22) (♂)

ヲ混ズ、體長(♀)(♂)九分、開張二寸、

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、

(205) しらほしよとう

學名 Mamestra persicariae L. var. unicolor Stgr.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅黑褐、前橫線、後橫線並ニ波狀線ハ黑色ナレドモ多クハ判然セズ、環狀紋ハ不明ニシテ、中央ニ黑點ヲ裝ヒ、腎狀紋ハ白色ニシテ鮮明ナリ、後翅ハ灰白、外緣ニ暗色帶ヲ裝フ、頭及ビ胸背ハ黑褐、頸毛ノ基部ハ黃色、體長(♂)(♀)六分、開張一寸六分、幼蟲ハさなへたで、ぼんとくたで等ヲ食トス、

第十五圖(23) (♀)

分布—北海道、本州、朝鮮、支那、

(206) ふたをびこやが

學名 Naranga diffusa Wk.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ雄ニテハ濃黃色、中央ニ赤褐ノ二斜條ヲ具ヘ、後緣ニ至ルニ從ヒ增大ス、後翅ハ灰黑、頭及ビ胸背ハ灰黃、雌ニテハ前翅ハ黃色、中央ニ暗色ノ二紋ヲ裝ヒ、之レハ少シク紫色ヲ帶ブ、前緣角ニモ亦同色紋アリ、體長(♂)(♀)二分五厘乃至三分、開張五分五厘乃至八分、幼蟲ハいねのこあをむし

第十五圖(24) (♂)

ト稱シ、稻葉ヲ食ヒ大害ヲ加フルコトアリ、

分布—北海道、本州、九州、臺灣、瓜哇、馬來、印度、

第十六圖(1)(♂)

(207) つまじろがらす

學名 Amphipyra Schrenkii Mén.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅黑褐、少シク紫色ヲ帶ブ、半橫線、前橫線及ビ後橫線ハ黑色、環狀紋ハ小ニシテ白色、腎狀紋ハ判然セズ、外緣ハ翅底ヨリモ濃色、翅端ニ白色ノ一紋ヲ裝フ、後翅ハ暗褐、裏面ハ暗褐、前翅ノ中央ニ一黑條ヲ橫走シ、後翅ノ中室ニ一黑點ヲ裝フ、胸背ハ黑褐、口吻ハ赤褐、體長(♀)(♂)七分乃至九分、開張一寸四分乃至二寸、

分布—北海道、本州、九州、滿洲、

第十六圖(2)(♀)

(208) おほこもる

學名 Nyctipao crepuscularis L.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅黑褐、中央ニ大ナル巴狀ノ一紋ヲ裝ヒ、其周緣ハ黑色、但シ其下方ハ藍白色、內部ハ褐色、黑色ノ半輪ヲ繞ラス、又其外方ニ之レト平行シテ白色ノ半輪紋ヲ裝ヒ、之レハ其下方ノ白斜條ト相合ス、更ラニ其外方ニ白色ノ一橫帶ヲ具ヘ、之レト白色ノ波狀線トノ間ハ稍濃色、翅端ニ近キ前緣ニ

三角形ノ一白紋アリ、後翅ハ黑褐、翅底ハ灰白、其外方ニ細キ灰白線アリ、中央ノ白橫帶及ビ波狀線ハ前翅ト同樣、外緣ハ兩翅共波狀ヲナス、裏面ハ淡褐、中央ノ白帶及ビ波狀線ハ表面ト異ナラズ、頸部前緣ノ橫帶ハ黃白、口吻ハ赤褐、體長(♀)(♂)一寸二分、開張三寸內外、

分布—北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、滿洲、支那、印度、スマトラ、マダガスカル、亞米利加、

第十六圖(3)(♀)

(209) いねきんうはば

學名 Plusia festucae L.

昆蟲學上ノ地位 夜蛾科

前翅ハ金色ヲ帶ビタル褐色若クハ黃褐、中央ニ二個ノ銀色紋アリテ、少シク金色ヲ混ジ、其內方ニアルモノハ大ナリ、前緣角ニ近キ內方ニ稍菱形ノ銀色紋アリ、前緣ノ基部、後緣ノ大部及ビ翅端ハ金色、後翅淡黃褐、緣毛ハ少シク赤味ヲ帶ブ、裏面ハ淡黃褐、不明ナル一橫條ヲ裝フ、頭及ビ前胸背ハ黃色、後者ノ前緣ニ少シク銀色毛ヲ混ズルモノアリ、胸部褐色、腹部灰黃、體長(♀)(♂)六分、開張一寸、幼蟲ハ稻葉ヲ喰ヒ農家ニ有害ナリ、

分布—北海道、本州、滿洲、歐洲、

第十六圖(4)(♀)

(210) しまがらす

學名 Amphipyra pyramidea L. var. monolitha Gn.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗褐、環狀紋ハ灰白、中央ハ多少黑色ヲ帶ビ、半橫線、前橫線及ビ後橫線ハ黑色、何レモ灰白線ヲ有ス、後翅ハ赤褐、前緣ハ暗褐、後翅ノ裏面ハ暗褐、後半ハ淡赤褐、外緣ノ後半ハ赤褐、體長(♀)(♂)八分乃至九分、開張一寸七分乃至二寸、幼蟲ハ俗ニしんきりあをむしと稱シ櫻、苹樹、梨等ノ稚果ヲ喰ヒ大害ヲ加フルコトアリ、

分布―北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、

(211)
かきば

學名　Spirama vespertilio F.

第十六圖(5)(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

翅ハ灰褐、中央ニ黑褐ノ二條ヲ橫走シ、其外方ノモノハ幅廣ク、後緣ニ至リテ稍鮮明ヲ缺ク、外緣ニハ灰綠ノ廣帶ヲ裝ヒ、其內ニ黑色ノ波狀線ヲ有ス、前翅底ニ近キ一線ハ黑褐、中室ニハ四五個ノ黑紋ヲ散在シ、前綠角ニハ綠褐ノ一斜線アリ、後翅ノ內緣ハ黃色、裏面ハ鮮黃色、三條ノ黑色帶ヲ橫走シ、翅底ニハ黑紋ヲ裝フ、頭及ビ頸毛ハ黑褐、胸背ハ灰白、尾端ハ黃色、兩側ニ各一個ノ褐紋ヲ有ス、腹面ハ稍赤色ヲ帶ビ、脚ハ灰黑、體長(♂)(♀)一寸、開張二寸九分、

分布―本州、九州、支那、瓜哇、ビルマ、

第十六圖(6)(♂)

(212)
あをばせびか

學名　Mormo muscivirens Butl.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅濃黑、環狀紋及ビ腎狀紋ハ暗黃ノ周緣ヲ有シ、不正形ナリ、半橫線、前橫線、後橫線及ビ波狀線ハ暗黃、翅底及ビ後橫線ト波狀線ノ間ハ淡色、之レニ沿フテ約八個ノ黑點ヲ橫列シ、緣毛ハ波狀ヲナス、後翅ハ黑褐、緣毛ハ暗黃、裏面ハ暗黑、中央ニ黑色ノ一條ヲ橫走シ、後翅ノ中央ニ一黑紋ヲ裝フ、體長(♂)(♀)八分乃至一寸、開張一寸八分乃至二寸、

分布―本州、朝鮮、支那、

(213)
しろすぢがらす

學名　Amphipyra tripartita Butl.

第十六圖(7)(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅黑褐、白色ノ二橫條アリテ、一ハ翅底ニ近ク、他ハ外緣ニ近位ス、後者ノ外方ハ稍赤褐ヲ呈シ、之レニ沿フテ白色ノ波狀線アリ、後翅ハ暗褐、前翅裏面ノ外緣ハ少シク赤褐ヲ帶ビ、後翅底ハ淡色ナリ、體長(♀)七分、開張一寸六分、

分布―本州、九州、支那、

(214)
こもるが

學名　Spirama retorta Clerk.

第十六圖(8)(♂)
第十九圖(3)(♂)變種

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

體翅暗褐、前翅ノ中央ニ巴様ノ黒紋ヲ具ヘ、其内縁ハ銀白色、此紋ノ内方ニ一條、外方ニ二條ノ黒横條ヲ裝ヒ、外線ニ近ク相平行セル二双ノ波狀線アリ、後翅ノ斑紋ハ前翅ノモノト略同様ナレドモ太クシテ且ツ判然セリ、裏面及ビ體下ハ美麗ナル赤黄色、翅ニハ五條ノ黒横條ヲ裝ヒ、其内外線ニ近キモノハ波狀ヲナシ、其内側ニアル二條ハ太クシテ互ニ相近接ス、各腹節ノ末端ハ尾節ヲ除キ黒色、體長(♀)(♂)八分乃至一寸、開張二寸乃至二寸五分、之レニハ變種多シ、

分布―本州、四國、九州、朝鮮、支那、印度、爪哇、

(215) こしまがらす

學名　Amphypyra perflua F.

第十六圖(9)(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅黒褐、環狀紋ハ暗褐ナレドモ徐リ判然セズ、半横線及ビ前横線ハ濃色ニシテ各一双アリ、其中間ハ淡色、後横線ハ黒色、其外側ハ灰白、波狀線ハ白色、其内側ノ前線ハ暗褐、裏面ハ灰色、二條ノ横線ヲ裝ヒ、各一個ノ黒紋ヲ有スレドモ、前翅ニ於ケルモノハ徐リ判然セズ、體長(♂)(♀)七分、開張一寸五分、幼蟲ハ白楊、楡、櫸等ヲ食トス、

分布―北海道、本州、朝鮮、支那、滿洲、歐洲、

(216) あかいろこもる

學名　Spirama martha Butl.

第十六圖(10)(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

體翅褐色、前翅ノ中央ニ巴様ノ大紋アレドモ徐リ判然セズ、其内外ニ各一條ノ黒褐帶ヲ裝ヒ、更ラニ其外方ニ斷續セル黒線アレドモ亦其判然セザルモノアリ、外線ニ沿ヒ少シク綠色ヲ帶ビタル廣帶ヲ裝ヒ、其内側ニ暗色ノ一横線アリ、後翅ノ紋條ハ前翅ノモノト相連絡ス、裏面ハ美麗ナル赤黄色、暗色ノ三横線ヲ裝フ、頭及ビ頸毛ハ暗赤褐、腹面ハ赤黄、脚ハ灰黒、體長(♀)(♂)九分、開張二寸二分、

分布―本州、九州、支那、

(217) ひさごもんうはべ

學名　Plusia chrysitis L.

第十六圖(11)(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

體翅暗褐、前翅ニ大ナル瓢形ノ金色紋ヲ裝ヒ、外線ハ淡色、後翅ハ淡色、綠毛ハ灰黄、裏面ハ淡黄、前翅ノ中央ニ暗黒ノ楔狀紋アリテ翅ノ大部ヲ占メ、翅底ニ黄毛ヲ裝フ、後翅ニハ二條ノ横線ト中室紋ヲ有シ、何レモ暗色ヲ呈ス、頭及ビ頸毛ハ黄褐、腹背上ニ二三ノ毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)四分乃至五分、開張一寸一分乃至一寸二分、幼蟲ハ蕈麻、紫蘇等ヲ食トス、

分布―北海道、本州、朝鮮、滿洲、歐洲、

(附言) 歐洲産ノ種類ニアリテハ金色紋ハ多ク瓢形ヲナサズ、卽チ相離レテ二横帶ヲナセドモ本邦産ノモノハ多ク瓢形ニ相接續ス、故ニ此ノ名アリ、

(218) からすよとう

學名 Amphipyra livida F.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅ハ紫色ノ光澤アル黒色、條紋ヲ有セズ、後翅ハ赤褐、前縁及ビ外縁ノ半ハ暗黒、裏面ハ表面ヨリモ淡色、體ハ黒色、頭頂ハ稍黒褐ヲ帶ブ、口吻ハ赤褐、體長(♀)(♂)七分、開張二寸六分、幼蟲ハ蒲公英ノ如キ雜草ヲ食トス、

分布―北海道、本州、九州、朝鮮、支那、印度、歐洲、

第十六圖(12)
(♀)

(219) きくぎんうはゞ

學名 Plusia gutta Gn.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅灰黒、中室ノ下部ハ茶褐色、其内ニ山形ノ銀色紋ヲ裝ヒ、翅端ヨリ銀色紋ノ一端マデ暗色ノ一線ヲ斜走ス、外線及ビ縁毛ハ白色、後翅ハ灰褐、外線ハ少シク暗色ヲ帶ブ、裏面ハ暗灰色、前翅ハ稍濃色、體長(♀)(♂)六分、開張一寸二分、幼蟲ハのこぎりさうヲ食ス、

分布―北海道、本州、朝鮮、滿洲、西比利亞、歐洲、

第十六圖(13)
(♂)

(220) ふくらすゞめ (からむしが)

學名 Arcte coerulea Gn.

第十六圖(14)
(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅黒褐、半横線、前横線及ビ波狀線ハ黒色、環狀紋ハ小ニシテ黒色、腎狀紋ハ大ニシテ更ニ其内ニ二三個ノ黒紋ヲ裝フ、半横線ノ外側及ビ下方ハ黒大半ハ紫黒色、波狀線ノ外側ニ弓狀ノ紫黒線アリ、後翅ハ黒色、之レニ藍色ノ鱗毛アリ、後縁ニ接スル翅ノ分乃至一寸二分、開張二寸三分乃至二寸九分、幼蟲ハ苧麻、蕁麻、楮等ノ葉ヲ食トス、

分布―北海道、本州、九州、滿洲、印度、

第十六圖(15)
(♂)

(221) まだらむらさきうはゞ

學名 Telesilla (Placodes) amethystina Hb.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅茶褐色、半横線、前横線及ビ後横線ハ黒色、淡キ紫紅色ノ片線ヲ有ス、兩線ノ中間ニ➢狀ノ一紋アリテ、其周圍ハ淡キ紫紅色、内部ハ茶褐色、其上方ニ大小ノ二黒紋ヲ裝ヒ、一ハ三角形ヲナシ、他ハ梯形ヲナス、下方ニモ亦黒色ノ一紋ヲ裝フ、後横線ノ附近ハ凡テ淡キ紫紅色、外縁ニ近ク淡色ノ波狀線アリ、後翅及ビ裏面ハ淡色、體長(♀)(♂)五分、開張一寸、幼蟲ハ繖形科ノ植物ヲ食トス、

分布―北海道、本州、朝鮮、歐洲、

第十六圖(16)
(♀)

(222) ちやいろきりが

學名 Taeniocampa (Agrotis) odiosa Butl.

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗紫褐色、環狀紋及ビ腎狀紋ハ餘リ判然セズ、半橫線、前橫線及ビ波狀線ハ各一双アレドモ此モ亦明ナラズ、波狀線ノ外方ハ淡色、稍紫色ヲ帶ブ、緣毛ハ暗紅色、後翅ハ暗灰色、前翅ノ裏面ハ暗色、後翅ニテハ灰白、前緣ハ少シク紅色ヲ帶ビ、波狀ノ一黑條ヲ有スレドモ、中室點ハ不明ナリ、頭及ビ前胸ハ灰黃、胸背ハ茶褐色、腹背ハ赤紫色ヲ帶ブ、體長(♂)(♀)五分、開張一寸二分、

分布―本州、九州、

(223) まへもんこやが

學名　Erastria costimacula Obth.

第十六圖(17)　(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅暗黃、翅端ヨリ後緣ノ三分ノ二ノ處マデ灰白條ヲ斜走シ、其內部ハ濃色、外部ハ淡色、中央ニ菱形ノ白色紋ヲ橫裝シ、前緣ノ中央ニ三角形ノ黑紋アリテ、其外側ハ白色、外緣ニ白色ノ一橫條アレドモ判然セズ、後翅ハ灰白、裏面ハ淡黃、前翅ノ中央ハ暗黑、其內ニ淡黃ノ一點ヲ裝フ、體長(♀)(♂)三分五厘、開張九分、

分布―北海道、本州、支那、滿洲、

(224) きくきんうはば

學名　Plusia aurifera Hb.

第十六圖(18)　(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅茶褐色、外緣ヨリ中央ニ亘リ鉤狀ノ金色紋ヲ裝ヒ、其內ニ暗褐ノ波狀線ヲ橫走ス、後翅底ハ淡褐、外緣ハ暗黑、裏面ハ暗黃褐、前翅ノ中央、後翅ノ中室點、橫線及ビ其外側ハ暗色、頭及ビ胸背ハ赤褐、腹節ノ背上ニ毛塊ヲ裝フ、體長(♂)(♀)七分、開張一寸四分、

分布―北海道、滿洲、

(225) うすむらさきうはば

學名　Telesilla (Diastima) virgo Treit.

第十六圖(19)　(♀)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅淡紫色、銀白ノ光澤ヲ有ス、環狀紋及ビ腎狀紋ハ黑線ヲ有シ、其內外ハ白色、兩紋ノ間及ビ環狀紋ノ內方ハ前線マデ茶褐色、前橫線及ビ後橫線ハ白色、兩者後線ニ於テ相會ス、其內側ニ淡茶褐ノ一線アリ、翅端ノ一紋及ビ外線ハ茶褐色、後翅及ビ裏面ハ灰白、少シク紫色ヲ帶ブ、體長(♂)(♀)五分、開張一寸、

分布―北海道、本州、朝鮮、歐洲、

(226) さまだらこやが

學名　Emmelia (Agrophila) trabealis Scop.

第十六圖(20)　(♂)

昆蟲學上ノ地位　夜蛾科

前翅黒色、中央ニハ黄色ノ二紋ヲ装ヒ、其上方ニアルモノハ稍楔形ヲ呈シ、其内ニ黒紋ヲ散在ス、下方ニアルモノハ細長ニシテ、其内ニ二個ノ黒横線ヲ装フ、兩紋ノ外方ハ紫色ヲ放チ、外縁ニハ黒紋アル黄色ノ横帯ヲ装フ、後翅ハ暗色、頭胸及ビ腹部ハ黒色、胸側及ビ其前縁ノ一紋並ニ尾節ハ黄色、體長(♂)(♀)三分、開張八分、幼蟲ハ旋花科ノ植物ヲ食ス、

分布—北海道、本州、歐洲、

(227) むなべにかぎば

學名 Hypsomadius insignis Butl.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科 (Drepanidae)

第十三圖 (1) (♀)

體翅灰色、少シク赤味ヲ帯ブ、前翅ノ前縁角ハ少シク鈎狀ニ屈曲シ、之レヨリ後縁ノ中央ニ向ヒ朱色ノ一條ヲ斜走ス、後翅ニハ淡キ朱色ノ二横條ヲ装ヒ、外側ニアルモノハ波狀ヲナス、外縁ニ近ク黒褐ノ小點アリテ、之レハ二列ニ排在ス、裏面ハ淡黄赤色、體下及ビ脚ノ一部ハ紅色、體長(♀)(♂)五分乃至六分、開張一寸三分乃至一寸八分、

分布—本州

(228) まへきかぎば

學名 Drepana scabiosa Butl.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

第十三圖 (2) (♂)

體翅灰色、真珠様ノ色澤ヲ帯ビ、前翅端ハ少シク鈎狀ヲナス、前縁ハ橙黄色、外縁ニ近ク暗灰色ノ一横線ヲ装ヒ、中央ニハ屈折セル褐色ノ點列ヲ横走ス、其周圍ハ灰白、後翅ノ中室ニハ淡色ノ一小點ヲ具ヘ、外縁ニハ判然セザル二三ノ灰色線ヲ横走ス、線毛ハ灰色、頸毛ハ黄金色、體長(♀)(♂)五分、開張一寸一分、

分布—本州、九州、朝鮮、滿洲、支那、

(229) ふたつめかぎば

學名 Oreta calida Butl.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

第十三圖 (3) (♂)

體翅暗褐、翅ニハ多數ノ黒點ヲ散在シ、前翅ノ前縁角ハ著シク鈎狀ヲナス、中央ニハ暗色ノ横條ヲ具ヘ、其線上ニ褐色ノ圓紋ヲ装フ、翅端ノ内方ニく字形ノ黒條ヲ斜走シ、其外方ニ平行セル一斜條アリ、後翅ニモ亦二黒條ヲ横走ス、線毛ハ黒褐、前翅ノ裏面、體下並ニ脚ハ黄赤色、前翅ノ裏面ニハ表面同様ノ横條ヲ装フ、體長(♂)五分、開張一寸四分、

分布—北海道、本州、

(230) きをびかぎば

學名 Oreta calceolaria Butl.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

第十三圖 (4) (♀)

體翅黃褐、少シク紅色ヲ帶ブ、前翅底ハ淡色、翅端ハ鈎狀ヲナシ、之レヨリ後線ニ向ヒ鮮黃色ノ一廣帶ヲ斜走シ、此ハ後線ニ至ルニ從ヒ增幅ス、後翅ノ外半ハ鮮黃色、其內ニ黑色ノ小點ヲ散在ス、體下及ビ脚ハ黃色、頭及ビ口吻ハ少シク赤色ヲ帶ブ、體長(♂)(♀)三分乃至五分、開張一寸乃至一寸三分、

分布—本州、

(231) すかしかぎば

學名 Macrauzata fenestraria Moor.

第十三圖(5)(♀)

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

體翅淡黃、前翅ノ前緣角ハ稍鈎狀ヲナス、中央ニ白色半透明ノ大紋アリテ、其周圍ハ褐色、外緣ニ近キ波狀線ハ白色、後翅ニモ前翅同樣ノ透明紋アレドモ、之レハ褐色條ニヨリテ四五室ニ分離ス、裏面ハ白色、透明紋ハ判然ス、體長五分、開張一寸五分、

分布—本州、九州、印度、

(232) あしべにかぎば

學名 Oreta pulchripes Butl.

第十三圖(6)(♀)

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

體翅褐色、翅ニハ小黑點ヲ散在ス、前翅ノ中室ハ緋色、其內ニく字形ノ白紋アレドモ、之レハ個種

ニヨリ餘リ判然セザルコトアリ、翅端ハ淡黃、之レヨリ黃色ノ一線ヲ後線ニ送ル、線毛ハ黃色、兩翅ノ外緣ハ少シク濃色、裏面ハ赤黃色、頭、口吻及ビ脚ハ鮮黃色、尾端及ビ胸下ハ黃色、腹面ハ少シク紅色ヲ帶ブ、體長(♀)(♂)四分乃至四分五厘、開張一寸二分乃至一寸三分、

分布—本州、臺灣、支那、

(233) うすいろかぎば

學名 Drepana palleolus Motsch.

第十三圖(7)(♀)

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

體翅淡黃、前翅ノ前緣角ハ少シク屈折シ、其附近ハ淡褐、之レヨリ後緣ニ向ヒ一雙ノ淡褐線ヲ斜走シ、其內外側ニアルモノハ太シ、翅底ニ近ク波狀ノ褐色線アレドモ餘リ判然セズ、裏面ハ淡黃、條紋ヲ有セズ、體長(♂)(♀)四分、開張一寸一分、

分布—北海道、本州、

(234) おほかぎば

學名 Euchera (Gandarites) maculata Swinh.

第十三圖(8)(♀)

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

翅ハ白色、前翅底、中央ニ於ケルく字形ノ廣帶、其外方ノ一橫帶及ビ外緣ハ淡黑色、中央ノ廣帶內ニハ三角形ノ白紋アリ、外緣ニ近キ齒狀ノ橫線ハ黑色、後翅底、其外方ノ二橫帶及ビ外緣ハ暗色、

齒狀線アリテ之レハ黒色ヲ呈ス、頭ハ黒色、胸部ハ白色、腹背ハ淡灰色、腹面ニ白色ノ短毛ヲ密生ス、脚ハ暗色、體長(♂)(♀)七分乃至八分、開張二寸一分乃至二寸三分、

分布—北海道、本州、

(附言) 此ハ拙著日本昆蟲目錄第一卷百二十八頁おほなみしやくト同種ニシテ鈎蛾科ニ屬スルモノナレバ爰ニ訂正ス、

(235) ほしべっかう

學名 Deroca phasma Butl.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

翅ハ白色、半透明、前翅ノ中室ニ二個、前縁、翅端及ビ外縁ニ數個ノ暗色紋ヲ裝フ、後翅ノ外縁ニモ亦四五個ノ暗色紋アレドモ餘リ判然セズ、頭及ビ體ノ背面ハ暗色、體下及ビ脚ハ灰白、體長(♀)(♂)二分八厘乃至三分、開張九分乃至一寸一分、此ハ極メテ屏弱美麗ナルヲ以テ容易ニ他ト區別スルコトヲ得ベシ、

分布—本州、

第十三圖 (9) (♂)

(236) ちゃのかぎば

學名 Oreta Theae Mats.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

第十三圖 (10) (♂)

體翅褐色、前翅ノ前縁角ハ稍鈎狀ヲナシ、之レヨリ後縁ニ向ヒ黒褐ノ一條ヲ斜走ス、其外側ハ濃色、中央ニ一黒點ヲ裝ヒ、其內外ニ各一條ノ濃色線ヲ橫走シ、之レハ稍弓狀ヲナス、翅端ニ近キ前縁ニ「字形ノ一紋アリ、後翅ノ內縁ニハ灰白毛ヲ交ヘ、前縁ハ淡黄、中央ニ小黒點ヲ具ヘ、其外方ニ二個ノ黒褐條ヲ橫走ス、裏面及ビ體下ハ黄褐、體長(♂)六分、開張一寸五分、幼蟲ハ茶ノ大害蟲ナリ、

分布—臺灣、

第十三圖 (11) (♂)

(237) あとじろごくが

學名 Pantana ampla Wk.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科 (Lymantridae)

體翅屏弱、前翅ノ前半ハ淡褐、翅端ニ囘ハ稍暗色ヲ帶ブ、後半及ビ後翅ハ白色半透明、紋條ヲ有セズ、前翅裏面ノ前半ハ橙黄色、翅端ニ近ク暗色ノ一斜條ヲ裝ヒ、其外側ハ淡褐、後半ハ白色、體ハ暗褐、脚ハ淡褐、體長(♂)四分、開張一寸二分、

分布—本州、支那、

第十三圖 (12) (♂)

(238) ひめはいいろかぎば

學名 Drepana griseola Mats.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

體翅暗灰色、前翅ニ暗色ノ三條ヲ橫裝シ、內方ノ二條ハく字形ニ屈折ス、翅端ハ稍鈎狀ヲ呈シ、之

レニ藍黒色ノ眼狀紋アリテ、其周縁ハ黄色ナリ、前
兩翅ニ各一條ノ暗色帶ヲ具ヘ、後翅ノ中室脈ハ少シク暗色ヲ帶ブ、體下及ビ脚ハ淡褐、體長(♂)二分
五厘、開張八分、
分布—九州(熊本)、

(239) たいわんおほかぎば

學名 Euchera substigmaria Hb.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

體翅白色、前翅底ニ一双、中央ニ二條、外縁ニ近ク灰色ノ一波狀線アリヲ、中央ノ二線間ハ淡灰色、
其内ニ灰色ノ圓紋アリ、翅端ノ内方ハ暗灰色、之レヨリ不明ノ灰色線ヲ後縁ニ斜走ス、後翅ノ中央
ニ暗色ノ圓紋ヲ具ヘ、其内外ニ各一條ノ灰色線ヲ横走ス、外縁ノ波狀線、小點列及ビ其内側ノ廣帶
ハ灰色、裏面ノ斑紋ハ表面ト略同樣ナレドモ前翅中央ノ圓紋ハ黑色、頭及ビ脚ハ暗色、體長(♂)七分、
開張一寸四分、
分布—臺灣、印度、

第十三圖
(13)
(♀)

(240) たいわんいかりが

學名 Cleosiris catamita Gey.

昆蟲學上ノ地位 錨紋蛾科 (Callidulidae)

第十三圖
(14)
(♂)

翅ハ茶褐色、前翅ノ外縁ハ直徹セラレ、其内方ニ橙黄色ノ一斜紋ヲ裝フ、縁毛ハ黄褐、後翅ノ外縁
角ハ稍尖レリ、裏面ハ黄褐、褐紋及ビ黑點ヲ散在シ、前翅ニ三個、後翅ニ二個ノ黑紋ヲ裝フ、體ハ
暗色、體下ハ黄色、體長(♀)(♂)四分乃至五分、開張一寸二分乃至一寸五分、
分布—臺灣、支那、印度、

(241) をびかぎば

學名 Drepana curvatula Bkh.

昆蟲學上ノ地位 鈎蛾科

體翅暗黄、前翅ノ中室ニ三個ノ黑褐紋アリテ、外側ニアルモノハ大ナリ、其外側ニ一條、内側ニ二
條ノ暗色線アリテ波狀ヲナス、翅端ハ鈎狀ヲナシ、之レヨリ黑褐ノ一條ヲ後縁ニ斜走ス、其外側ニ
暗色ノ一横條アリテ、前者ト上方ニ相合ス、後翅ニ五條ノ波狀線アリテ、其内第四線ハ最モ太シ、
裏面及ビ體下ハ黄色、兩翅ノ表面ニ黑點ヲ裝フ、雄ニテハ斑紋ノ判然セザルモノアリ、體長三分乃
至四分、開張一寸乃至一寸四分、幼蟲ハ赤楊ヲ食トス、
分布—北海道、本州、支那、滿洲、歐洲、

第十三圖
(15)
(♀)

(242) べにもんいかりが

學名 Callidula erycinoides Wk.

昆蟲學上ノ地位 錨紋蛾科

第十三圖
(16)
(♀)

(245) いかりもんがニ酷似スレドモ、前翅ノ翅端ハ截斷狀ヲナサズ、其斑紋ハ紅色ニシテ、帶狀ヲナシ、第二脈ノ處ニ至リテ終ル、裏面ハいかりもんがヨリモ赤色ノ部分多ク、前翅白紋ノ附近ハ黑色ヲ呈セズ、後翅ノ白紋ハ不正形ヲナス、體長(♀)(♂)四分乃至五分、開張一寸乃至一寸四分、

分布—臺灣、支那、印度、

第十三圖(17)(♀)

(243) きんもんが

學名 Psychostrophia melanargia Butl.

昆蟲學上ノ地位 燈蛾科 (Arctiidae)

體翅黑色、紫色ノ光澤ヲ有ス、前翅底ノ縱紋、其外側ノ斜紋、更ラニ其外方ニ於ケル三個ノ圓紋及ビ後緣ノ中央ニアル一小點ハ黃色、後翅前緣ノ大部ハ黃色、翅端及ビ內緣角ニ近ク黃色ノ凹凸紋ヲ裝フ、緣毛ハ黑色、兩翅ノ外緣角ニ近ク白色ノ斑紋アリ、胸背ノ一點、尾端、體下及ビ脚ハ淡黃色、體長(♀)(♂)四分乃至五分、此ハ本州ノ高山ニ稀ナラズ

分布—本州、

第十三圖(18)(♂)

(244) くはこ

學名 Bombyx mandarina Moor.

昆蟲學上ノ地位 家蠶蛾科 (Bombycidae)

(247) かさんニ酷似スレドモ色ハ暗色、中央ノ橫帶、外緣角ノ大紋ハ暗黑、此大紋ノ內側ハ灰白、更ラ

ニ其內側ニ細キ弓狀ノ暗色線ヲ橫走ス、後翅ノ外緣ハ少シク濃色、內緣ノ中央ニ暗黑ノ半圓紋アリテ、其周緣ハ白色、體長(♀)五分、(♂)四分、開張(♀)一寸五分、(♂)一寸二分、幼蟲ハ桑葉ヲ食害ス、

分布—北海道、本州、九州、朝鮮、

第十三圖(19)(♀)

(245) いかりもん

學名 Pterodecta Felderi Brem.

昆蟲學上ノ地位 錨紋蛾科

體翅黑褐、前翅ノ外緣ニ近ク錨樣ノ大ナル黃赤紋ヲ裝フ、翅端ハ斜ニ截斷セラレ、其中央ニ一突起ヲ出ス、兩翅ノ緣毛ハ黃赤、前翅裏面ノ錨紋ハ表面ト同樣、其內側ハ黑色、其內ニ白紋ヲ裝フ、翅底ニ近ク二個ノ小白紋アリテ、其周緣ハ黑色、翅端ニ半圓形ノ白紋ヲ裝フ、後翅中室ノ圓紋ハ白色、體下及ビ脚ハ綠黃色、體長四分乃至五分、開張一寸二分乃至一寸四分、蛾ハ晝間飛翔シ、其靜止スルトキハ翅ヲ垂直ニナスヲ以テ恰モ蝶ニ似タリ、高山ニ稀ナラズ、

分布—北海道、四國、九州、滿洲、支那、

第十三圖(20)(♂)

(246) にはこごくが

學名 Aroa Jonasi Butl.

昆蟲學上ノ地位 毒蛾科

體翅淡黃、前翅中央ノ圓紋及ビ前緣ノ翅端ニ近キ筈樣ノ斑紋ハ褐色、前翅裏面ノ前緣ハ淡褐、頭、

體下及ビ脚ハ少シク褐色ヲ帶ブ、體長(♂)五分、開張一寸二分、幼蟲ハニハとこノ葉ヲ食フ、
分布—本州、九州、朝鮮、

第十三圖 (21) (♂)

(247) かさん (かいこ)
學名 Bombyx Mori L.

昆蟲學上ノ地位 家蠶蛾科

體翅白色、前翅ノ前緣角ハ鈎狀ヲナシテ少シク曲リ、外緣ノ上部ハ弓狀ニ刳ヲル、後翅內緣ノ中央ニ灰色ノ半圓紋アリ、雄ハ少シク暗色ヲ帶ビ、前翅ニ判然セザル灰色ノ三線ヲ橫走シ、中室ノ外側ニ弦月形ノ灰色紋ヲ裝フ、後翅ニ二條ノ灰色帶アリテ、內線ハ細ク白色、其中央ニ暗色ノ半圓紋アリ、體長(♀)(♂)五分乃至六分、開張一寸二分乃至一寸四分、幼蟲ハ俗ニかいこト稱シ、絹絲ヲ吐出スルヲ以テ有名ナリ、
分布—世界共通、

第六圖 (5) (♀)

(248) はぐるまやまばい
學名 Loepa katinka West.

昆蟲學上ノ地位 天蠶蛾科

體翅橙黃色、前翅ノ前緣ハ灰褐色、翅底ニ近ク褐色ノ波狀線ヲ具ヘ、中央ニ黑褐ノ楕圓環紋アリ、翅ノ中央ニ眼狀紋ハ黃褐、周緣ハ黑色、內方ニ白色ノ弓狀線ヲ具ヘ、

深ク凹凸セル黑褐ノ橫線アリテ、其外側ニ更ニ一双ノ齒車狀ヲナセル橫線ヲ裝フ、外緣ニ近ク白色ノ波狀線ヲ具ヘ、第六室ノ末端ニ楕圓ノ黑紋、第七室ニ灰黃ノ楕圓紋アリテ、其外方ニ白色ノ波狀線アリ、後翅ノ斑紋ハ前翅ト同樣ナレドモ、翅底ニ近キ橫帶ハ甚ダシク波狀ヲナシ、內緣ニ接スル處ニ少シク紅色ヲ混ズ、又眼狀紋ハ小ニシテ、中央ニ黑褐ノ新月紋アリ、裏面ハ表面同樣ノ斑紋ヲ有スレドモ、何レモ淡色ニシテ、眼狀紋ノ中央ハ白色ナリ、前胸ノ前緣ハ灰褐、各腹面節ニ灰色ノ二紋ヲ裝フ、脚ハ紫褐色、體長(♀)九分乃至一寸一分、開張三寸二分乃至三寸七分、此ハ臺灣ニ產スレドモ稀ナリ、
分布—臺灣(琿里社、函仔嶺)、印度、爪哇、

續日本千蟲圖解卷之一 終

第

一



第一圖 (PLATE I.)

1.	Acherontia styx West. ♂	めんがたすゝめ	1
2.	Phyllosphingia dissimilis Brem et Grey. ♂	えぞすゝめ	2
3.	Langia zenzeroides Moor. ♀	おほしもふりすゝめ	2
4.	Chaerocampa alecto L. ♂	したべにすゝめ	3
5.	Polyptychus trilineatus Moor. ♂	はがたすゝめ	3
6.	Clanis bilineata Wk. ♂	とびいろすゝめ	4
7.	Marumba Jankowskii Obth. ♂	のこぎりすゝめ	5
8.	Celerio Galii L. ♀	いぶきすゝめ	6
9.	Hyloicus Pinastri L. ♂	くろすゝめ	7

第二圖



第二圖 (PLATE II.)

1.	Herse Convolvuli L. ♀	えびがらすゞめ	7
2.	Oxyambulyx ochracea Roth. ♀	ほそばすゞめ	7
3.	Theretra nessus Drury. ♀	きいろすゞめ	8
4.	Theretra clotho Drury. ♂	くろほしすゞめ	8
5.	Parum colligata Wk. ♂	ぎんぼしすゞめ	9
6.	Macroglossum pyrrhosticta Butl. ♂	ほしほうじやく	9
7.	Dilina Christophi Stgr. ♂	ひさごすゞめ	10
8.	Acosmeryx naga Moor. ♂	はねながぶどうすゞめ	11
9.	Macroglossum fringilla Boisd. ♀	おきなはくろほうじやく	11
10.	Metopsilus mongolianus Butl. ♂	びろどすゞめ	12
11.	Hyloicus Ligustri L. ♀	こえびがらすゞめ	13
12.	Dolbina Tancrei Stgr. ♂	ささなみすゞめ	13
13.	Ampelophaga rubiginosa Brem. et Grey. ♂	くるますゞめ	14
14.	Haemorrhogia alternata Butl. ♀	すぢぐろすきばほうじやく	15
15.	Haemorrhogia affinis Brem. ♂	くろすきばほうじやく	15
16.	Hippotion celerio L. ♂	したべにせすぢすゞめ	16

第三圖



第三圖 (PLATE III.)

1.	Pergesa elpenor L. ♀	べにすゝめ	16
2.	Macroglossum saga Butl. ♀	くろほうじやく	17
3.	Calambulyx Tartarinovii Brem. et Grey. ♀	うんもんすゝめ	18
4.	Theretra japonica Orza. ♀	こすゝめ	18
5.	Macroglossum stellatarum L. ♀	ほうじやく	19
6.	Sphinx planus Wk. ♀	うちすゝめ	20
7.	Theretra silhetensis Wk. ♀	いッぽんせすぢすゝめ	20
8.	Cephonodes hylas L. ♀	おほすかしば	21
9.	Marumba Maackii Brem. ♀	ひめくちばすゝめ	21
10.	Theretra Oldenlandiae F. ♀	せすぢすゝめ	22
11.	Macroglossum bombylans Boisd. ♂	ひめくろほうじやく	23
12.	Psilogramma menophron Cram. ♂	しもふりすゝめ	23
13.	Cinogon askoldensis Obth. ♂	ひめすゝめ	24
14.	Gurelca masuriensis Butl. ♂	ほしひめほうじやく	24
15.	Sphinx caecus Mén. ♂	ひめうちすゝめ	25

第四圖



第四圖 (PLATE IV.)

1.	Kentochrysalis consimilis Roth. ♀	くろてんけんもんすゞめ	25
2.	Oxyambulyx Schauffelbergeri Brem. et Grey. ♀	もんほそばすゞめ	26
3.	Haemorrhogia radians Wk. ♀	すきばほうじやく	27
4.	Acherontia Sojejimae Mats. ♀	くろめんがたすゞめ	27
5.	Marumba Gaschkewitschii Brem. et Grey. ♀	ももすゞめ	28
6.	Gulerca hyas Wk. ♀	ひめほうじやく	29
7.	Macroglossum sitiene Wk. ♀	くろをびほうじやく	29
8.	Acosmeryx castanea Roth. ♀	ぶどうすゞめ	30
9.	Macroglossum rectifascia Feld. ♂	ねぐろほうじやく	31
10.	Macroglossum insipida Butl. ♂	をびほうじやく	31
11.	Tarsolepis rumicauda Butl. ♂	ぎんもんすゞめもどき	32
12.	Celerio lineata F. ♂	あかをびすゞめ	33
13.	Macroglossum bellis L. ♂	あかしたほうじやく	33

第五圖



第五圖 (PLATE V.)

1.	Cechenena minor Butl. ♀	たかさごすゝめ	34
2.	Hippotion Obanawae Mats. ♀	をばなわすゝめ	34
3.	Rhyncholaba acteus Cram. ♀	みどりすゝめ	35
4.	Theretra suffusa Wk. ♀	たいわんべにすゝめ	36
5.	Rhopalopsyche nycteris Koll. ♀	こほうじやく	36
6.	Deilephila hypothous Cram. ♀	ともえすゝめ	37
7.	Leucophlebia lineata West. ♀	きすぢすゝめ	37
8.	Hippotion velox F. ♀	はいいろすゝめ	38
9.	Cephonodes xanthus Roth. ♀	りうきうおほすかしば	38
10.	Rhagastis binoculata Mats. ♀	ふたつめびろどすゝめ	39
11.	Hippotion boerhaviae F. ♀	ひめしたべにすゝめ	40

第六回



第 六 圖　(PLATE VI.)

1.	Attacus cynthia Drury. ♂	しんじゆさん	40
2.	Rhodinia fugax Butl. ♂	うすたびが	41
3.	Saturnia Boisduvalii Ev. ♀	ひめやまゝい	41
4.	Brahmaea japonica Butl. ♀	いぼたが	42
5.	Loepa katinka West. ♀	はぐるまやまゝい	130
6.	Actias artemis Brem. ♀	おほみづあを	43

第七回



第七圖 (PLATE VII.)

1.	Antheraea Pernyi Guér. ♀	さくさん	43
2.	Dicranura vinula L. ♀	もくめが	44
3.	Antheraea Pernyi Guér. var. Yamamai Guér. ♂	やままい	44
4.	Nadata cristata Butl. ♀	せだかしやちほこ	45
5.	Brahmaea certhia F. ♀	たいわんいぼたが	45
6.	Lymantria mathura Moor. ♀	かしはまいまい	46

第八圖



第八圖 (PLATE VIII.)

1.	Attacus atlas L. ♂	よなくにさん	47
2.	Leucoma auripes Butl. ♀	きあしどくが	47
3.	Actias selene Hb. ♂	おながみづあを	48
4.	Primostricta hyalinata Butl. ♂	すかしさん	48
5.	Aglia tau L. ♂	えぞよつめ	40
6.	Oberthüria falcigera Butl. ♀	おほくはともどき	50

第九圖



第九圖 (PLATE IX.)

1.	Caligura japonica Moor. ♀	くすさん	50
2.	Uropyia meticulodina Obth. ♂	むらさきしやちほこ	51
3.	Cerura bifida Hb. ♀	おほなかじろもくめ	51
4.	Phalera assimilis Brem. et Grey. ♂	つまきしやちほこ	52
5.	Pygaera trimonides Brem. ♂	くはごもどき	52
6.	Pygaera anachoreta F. ♂	つまあかしやちほこ	53
7.	Phalera flavescens Brem. et Grey. ♂	もんくろしやちほこ	53
8.	Somera Pryeri Leech. ♀	ぶらいやしやちほこ	54
9.	Pheosia octofasciata Mats. ♂	やすぢしやちほこ	54
10.	Eupterote formosana Mats. ♀	たいわんをびが	55
11.	Nerice bipartita Butl. ♂	なかすぢしやちほこ	56

第十回



第拾圖 (PLATE X.)

1.	Notodonta Ishidae Mats. ♀	いしだしやちほこ	56
2.	Porthesia similis Fues. ♀	もんしろどくが	57
3.	Lymantria monacha L. ♀	のんねまいまい	58
4.	Euproctis subflava Brem. ♀	どくが	58
5.	Notodonta Nitobei Mats. ♀	にとべしやちほこ	59
6.	Stilpnotia Salicis L. ♀	やなぎどくが	15
7.	Lymantria fumida Butl. ♀	はらあかまいまい	60
8.	Euproctis Staudingeri Leech. ♀	ふたほしどくが	60
9.	Pterostoma sinica Moor. ♀	おほえぐりしやちほこ	61
10.	Cifuna locuples Wk. ♀	まめどくが	61
11.	Malacosoma neustria L. ♀	をびかれは	62
12.	Notodonta monetaria Obth. ♀	るりもんしやちほこ	62
13.	Cnethodonta grisescens Stgr. ♀	しろしやちほこ	63
14.	Arctornis L-nigrum Müll. ♀	えるもんどくが	63
15.	Malacosoma neustria L. ♂	をびかれは	62
16.	Euproctis niphonis Butl. ♀	くろもんどくが	64
17.	Notodonta gigantea Butl. ♀	なかきしやちほこ	64
18.	Dasychira pudibunda L. ♂	りんごどくが	65
19.	Zangra ziozankeana Mats. ♂	じょうざんしやちほこ	65
20.	Orgyia gonostigma F. ♂	あかもんどくが	66
21.	Orgyia thyellina Butl. ♂	ひめしろもんどくが	66
22.	Arctornis alba Brem. ♂	ひめしろどくが	67
23.	Dasychira lunulata Butl. ♂	あかひげどくが	67
24.	Caviria ochripes Moor. ♂	ひめきあしどくが	68
25.	Dasychira pudibunda L. ♀	りんごどくが	65
26.	Laelia gigantea Butl. ♂	すげおほどくが	68
27.	Aroa socrus Gey. ♂	かばいろどくが	69

第十一圖



第拾一圖 (PLATE XI.)

1.	Fentonia ocypete Brem. ♀	ほそばしやちほこ	69
2.	Anticyra combusta Wk. ♀	はがたしやちほこ	70
3.	Hupodonta pulcherrima Moor. ♂	かばいろもくめ	70
4.	Habrosyne derasa L. ♀	あやとがりば	71
5.	Nerice Davidis Obth. ♂	しろすぢしやちほこ	72
6.	Drymonia discoidalis Mats. ♂	しろてんしやちほこ	72
7.	Cymatophora angustata Stgr. ♀	ほそとがりば	73
8.	Thyatira batis L. ♀	もんとがりば	74
9.	Hoplitis Milhauseri F. ♀	ぎんしやちほこ	74
10.	Stauropus Fagi L. ♀	しやちほこが	75
11.	Cymatophora medialis Mats. ♀	なかぐろとがりば	76
12.	Cymatophora latipennis Mats. ♀	おほばとがりば	76
13.	Microphalera atrovittatus Brem. ♀	くびわしやちほこ	77
14.	Pterostoma palpina L. ♂	せぐろえぐりば	77
15.	Abrostola abrostolina Butl. ♀	ゆみもんうはば	78
16.	Habrosyne roseola Mats. ♀	うすべにあやとがりば	79
17.	Pydna straminea Moor. ♀	きしやちほこ	80
18.	Spatalia argentifera Wk. ♂	ぎんすぢしやちほこ	80
19.	Cymatophora fujisana Mats. ♀	ふじとがりば	81
20.	Cymatophora albicostata Brem. ♀	まへじろとがりば	81
21.	Phalera sigmata Butl. ♀	くろしたしやちほこ	82
22.	Spatalia Okamotonis Mats. ♂	ぎんもんしやちほこ	82
23.	Pygaera anastomosis L. ♀	せぐろしやちほこ	83
24.	Lophopteryx camelina L. ♀	えぐりしやちほこ	83
25.	Drymonia circumscripta Butl. ♂	につこうしやちほこ	84
26.	Pydna pallida Butl. ♀	うすきしやちほこ	85

第十二圖



第拾二圖 (PLATN XII.)

1.	Crinocraspeda guttata Mats. ♀	きいろかれは	85
2.	Odonestis Pruni L. ♂	りんごかれは	86
3.	Dendrolimus undans Wk. ♀	まつおほかれは	86
4.	Epicnaptera populifolia Esp. ♀	ほしかれは	87
5.	Epicnaptera ilicifolia L. ♀	ひめかれは	87
6.	Cosmotriche potatoria L. ♀	たけかれは	88
7.	Lymantria dispar L. ♀	まいまいが	89
8.	Cosmotriche potatoria L. var. albomaculata Brem. ♀	たけかれはノ變種	88
9.	Apha tylicoona Butl. ♀	をびが	89
10.	Dendrolimus Pini L. ♀	まつかれはノ雌	90
11.	Dendrolimus Pini L. ♂	まつかれはノ雄	90
12.	Gastropacha quercifolia L. ♀	かれはが	91

第十二圖



第拾三圖 (PTATE XIII.)

1.	Hypsomadius insignis Butl. ♀	むなべにかぎば	130
2.	Drepana scabiosa Butl. ♀	まつきかぎば	130
3.	Oreta calida Butl. ♂	ふたつめかぎば	131
4.	Oreta calceolaria Butl. ♀	きをびかぎば	131
5.	Macrauzata fenestraria Moor. ♀	すかしかぎば	132
6.	Oreta pulchripes Butl. ♀	あしべにかぎば	132
7.	Drepana palleolus Motsch. ♀	うすいろかぎば	133
8.	Euchera (Gandaries) maculata Swinh. ♀	おほかぎば	133
9.	Deroca phasma Butl. ♂	ほしべつかう	134
10.	Oreta Theae Mats. ♂	ちやのかぎば	134
11.	Pantana ampla Wk. ♂	あさじろざくが	135
12.	Drepana griseola Mats. ♂	ひめはいいろかぎば	135
13.	Euchera substigmaria Hüb. ♀	しろおほかぎば	136
14.	Cleosiris catamita Gey. ♂	たいわんいかりが	136
15.	Drepana curvatula Bkh. ♀	をびかぎば	137
16.	Callidula erycinoides Wk. ♀	べにもんいかりが	137
17.	Psychostrophia melanargia Butl. ♀	きんもんが	138
18.	Bombyx mandarina Moor. ♂	くはご	138
19.	Pterodecta Felderi Brem. ♀	いかりもん	139
20.	Aroa Jonasi Butl. ♂	にはさこざくが	139
21.	Bombyx Mori L. ♂	かさん(かいこ)	140

第十四圖