

大德重校聖濟總錄卷第八十

水病門

水腫欬逆上氣 水氣徧身腫滿



水腫胸滿氣急 水蠱

膜外氣



水腫欬逆上氣

論曰內經謂腎為水腫肺為喘呼氣逆不得卧蓋腎主水肺主氣腎虛不能制水水氣脹滿上乘於肺肺得水而浮故上氣而欬嗽古方有曰腫從脚起上氣而欬名

曰白水其病在肺

治水欬逆上氣通身腫滿短氣晝夜倚壁不得卧喉中水雞鳴大小便不通飲食不下而不甚渴白前湯方

白前參 紫苑去苗土 正半夏湯洗

生澤漆根參 桂去麋皮 人參壹兩

白朮伍兩 乾薑貳兩 赤茯苓去黑皮

吳茱萸湯洗焙杏仁參兩去雙葶藶炒貳
桔樓實參兩

右一十三味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半棗
三枚擘破同煎至八分去滓溫服小便微利氣下腫
減

治水腫上氣褚澄防已煮散方

防已

治風濕痺痛澤漆日乾石葶去

木通兩澤瀉兩白木水陳橘皮湯浸去桑根白皮剉

赤茯苓去木通剉陳橘皮湯浸去桑根白皮剉

木通剉郁李人研

右一十一味搗羅為散每服五錢匕水一盞半入生
薑半分切煎至八分去滓頓服日三服以小便利為

治水氣欬逆上氣四肢浮腫坐卧不安防已湯方

防已剉桑根白皮剉木通剉

赤茯苓去郁李人湯浸去澤漆剉

甜葶藶炒陳橘皮湯浸去

百合剉

右九味搗篩每服五錢匕以水一盞半棗四枚擘

破同煎至七分去滓食前溫服

治水腫腹大喘欬胸脇滿不得臥鯉魚湯方

鯉魚壹枚重參斤淨去鱗腸肚正以水五升桂去皮去薑四味

紫苑去苗土防已各參兩黃芩去黑心

消石研如粉人參各

右七味除魚外麤搗篩用水一斗煮魚如食法取汁

五升去魚每服藥末五錢匕汁一盞半煎至一盞去

治津濕服日三食四煎煎坐相不安切日量式

治水腫盛滿氣急喘欬小便澀赤如血者澤漆湯方

澤漆葉伍兩八桑根白皮參兩白木壹

白木壹郁李人湯水一煎半入主

重發杏仁湯浸去皮尖雙兩陳橘皮湯浸去白兩

治右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半生薑一棗

大拍破煎至八分去滓溫服以利黃水三升及小便

利為度內藥末出雞子煮赤小豆壹合大棗擘林擘

治水氣身面腫滿氣急喘欬小便赤澀郁李人湯方

郁李人湯浸去皮壹兩木壹兩桑根白皮各兩

澤漆葉伍兩芫薺炒合紫兩

治右七味赤茯苓壹兩半大拍

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二棗大拍

治右七味赤茯苓壹兩半大拍

破同煎至八分去滓溫服小便利佳可服三二料

治胸中喘欬逆水氣身腫利小便白雌雞湯方

白雌雞壹隻去腸藏

澤瀉切碎

半夏湯洗去滑參兩白朮兩

甘草壹兩半

右五味除雞外麤搗篩先用東流水五升煮雞令爛

熟去雞內藥末伍錢七煮赤小豆壹合大棗參枚擘

生薑參片俟豆熟去滓溫服日三夜六三升又小則

治偏體浮腫腹脹上氣不得臥大小便澀先服大棗散

後服海蛤丸取差差後三年不得食肉入房不爾病必

重發大棗散方

芫花微炒

甘遂多

大戟煨去皮

右三味搗羅為散每服一錢七以大棗十枚水一盞

半煮棗二十沸去棗調藥空心頓服當利勿止如此

三服後可服海蛤丸

海蛤丸方

海蛤別

赤茯苓去黑皮狼毒煨

桑根白皮炙

玄參微炙大膩粉研

薏苡人

陳橘皮湯浸防已

葶藶炒

杏仁湯浸去皮尖

右一十一味除海蛤外搗羅為末同海蛤再研勻鍊

蜜和丸如小豆大每服空心橘皮湯下二十九日三服五日後覺齒痒即住藥齒腫口瘡即是差候

治水欬逆上氣通身洪腫短氣脹滿晝夜不得卧喉中鳴大小便不通不下食而不甚渴大白前湯方

白前壹兩

紫苑貳兩

半夏湯洗米編去漬參兩

生澤漆根微炒貳兩

右四味廩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓又內後藥

桂去麩皮壹兩半

赤茯苓去土壹兩

吳茱萸水浸壹宿焙乾各貳兩

白朮十斤木一盞

杏人湯浸去皮尖雙人炒壹兩半

芎藭炒紫

栝樓根各貳兩

右八味廩搗篩每服三錢匕入生薑一塊拍碎大棗三枚擘破同入前藥汁再煎至八分去滓溫服當得大小便微利即氣通腫減

治水欬逆上氣通身浮腫短氣腸滿晝夜倚壁不得臥喉中水雞鳴白前湯方

白前去土壹兩

紫苑去土壹兩

半夏湯洗米編去漬參兩

生澤漆根微炒參兩半

人參各壹兩

芎藭炒紫

栝樓根各壹兩

白前去土壹兩

紫苑去土壹兩

半夏湯洗米編去漬參兩

生澤漆根微炒參兩半

人參各壹兩

栝樓根各壹兩

白朮壹兩

吳茱萸

水浸壹宿焙乾炒貳兩

右一十味麤搗篩每服用五錢匕水三盞入棗二枚生薑一塊拍破煎至一盞半去滓分二服當小便利或微溲腫即減

治水氣面體浮腫欬嗽氣促黃者湯方

黃耆剉參

桑根白皮剉

茈胡去苗

赤芍藥剉微炒

赤茯苓

去黑皮各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙

麥門冬去心焙

惡實微炒

甘草

炙各一分

右九味麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治水腫上氣不得臥頭面身骨悉腫大葶藶丸方

葶藶

葶藶兩壹分熟研如泥

澤漆

熱

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮湯浸去白

甘遂

牽牛子各一分

郁李人

研半兩

右七味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸以赤小豆飲及大麻子飲下日再服稍加至七丸以大小便微利為度若渴即飲以小豆麻子等汁

治水氣腫滿欬嗽喘痞痞痰涎不利眠睡不安杏仁半夏

九方

杏仁湯浸去皮尖雙人麩炒

半夏

湯洗去粉各壹兩

椒目半兩

貝母去心

防已各壹兩

苦苧藤紙微炒

右六味搗羅為末鍊蜜和凡如梧桐子大每服二十丸食後臨臥煎桑根白皮湯下

治內虛外實久有積聚榮衛不通甚者變為赤水此為病從心起入於皮膚腫滿皮厚體重上氣卧煩而躁尋

蘇凡

葶藶炒令紫

防已

椒目

大黃剉碎醋拌炒

蓖麻子去皮

郁李人湯浸去皮

葶藶此式

右六味搗羅為末鍊蜜同棗肉和丸如小豆大每服十丸空心溫酒下如不動加至十五二十丸

治水腫上氣大便澀牽牛子丸方

牽牛子炒壹兩半

葶藶炒熟

杏人去皮尖雙人

別研

大棗煮去皮核

芒消半兩

牛酥半合

右六味先搗前二味為末入杏人等研勻次入牛酥更搗萬杵丸如菉豆大每服八丸至十丸空心粥飲

下

治水在肺令人欬喘上氣腹大脚腫目下如卧蠶微渴

不得臥有頃乃復小便難少而數胸滿隱痛此水氣迫肺也宜利小便澤漆根湯方

澤漆根生肆兩

麥門冬去心焙

甘草炙

人參

赤茯苓去黑皮各壹兩 鯉魚壹斤者

右六味將五味麤擣先用水三升煮魚取汁一升去魚每服三錢匕汁一盞煎至七分去滓溫服日三以小便利為度不利增服如大便利小便未利者增至四合初服一日氣即下得安臥有寒可加生薑二兩切焙

水氣徧身腫滿

論曰腎主水脾胃俱主土土剋水胃為水穀之海其氣虛不能傳化水氣使水氣浸漬府藏又脾得水濕之氣土衰不能制之水氣獨歸於腎腎虛三焦不寫經絡閉塞故水氣溢於皮膚傳流四肢所以通身腫也其候上氣體重小便黃澀腫處按之隨手而起是也治通身腫喘欬氣丸方

丁香

木香

沉香破棗豆大

白檀香

桂去粗皮

肉豆蔻去殼

檳榔剉

萆澄茄

大戟炒

甘遂炒各壹分

木通剉壹兩

續隨子去皮

惠衆八十一

海蛤

郁李人皮去

瞿麥

甜葶藶炒

桑根白皮剉

牽牛子各壹分

膩粉壹錢

巴豆慢火炮過出油令盡壹分

右二十味搗為細末研白粳米飯為丸如菽豆大每服三九至五九煎橘皮湯下

治偏身水腫木通湯方

木通剉

苦葫蘆子各壹兩半澤瀉

防己各壹兩

豬苓皮去黑皮

海蛤細研各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕米七分酒七分入葱白五寸切煎至八分去滓食前溫服當下小便數升腫

消二和... 治水氣偏身腫滿皮肉欲裂心腹內氣脹小便不利飲

食不消甘遂丸方... 治水氣偏身腫滿皮肉欲裂心腹內氣脹小便不利飲

甘遂兩

葶藶兩半

赤茯苓去黑皮壹兩

陳橘皮湯浸去白焙

葶藶兩半

郁李人皮各壹兩

右五味搗羅四味為細末別搗葶藶如脂內散中蜜... 治水病通身微腫腹大食飲不消小消化丸方

之以利為度

治水病通身微腫腹大食飲不消小消化丸方

堯花微炒

甘遂微炒

大黃剉碎炒乾

葶藶炒令紫色

巴豆去心皮麩炒研

石五味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服飲下三

丸不知稍增至五丸以知為度

治水病通身腫滿喘急大小便澀大豆散方平陸煎吹

大豆黃醋拌炒乾和大黃微煨去皮散方內對中蜜

右二味搗羅為散每服二錢匕臨臥時煎蒸橘皮湯

調下平明以利大腸為度赤芍等

治水通身腫滿喘急小便澀一字湯方

水甘遂長細切大戟去皮各兩內煎取小量不澀

右二味剉用慢火炒令黃色麤搗篩每服一字匕以

水半盞煎三五沸便須傾出不得煎過去滓溫服之

不過十服大効藥白史書

治通身腫滿喘急小便澀大戟散方

大戟去皮細切乾薑炮裂三錢內煎取小量

右三味搗羅為散每服三錢匕用生薑湯調下良久

糯米飲投之以大小便利為度半兩

治水氣通身黃腫葶藶丸方

葶藶微炒防已

陳橘皮湯去

命木郁李人共紫蘇子

赤茯苓去黑皮

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大麝香酒下

二十九日三服以小便利為度

治水病通身洪腫鯉魚湯方

鯉魚淨去鱗腸肚壹頭壹斤

赤茯苓去黑皮壹兩

澤漆微炒壹兩

澤瀉貳兩

人參壹兩

杏仁

湯浸去皮尖雙

右七味將六味麤搗篩先以水三升煮魚取一升半

每服以魚汁一盞入諸藥末三錢匕煎取七分去滓

溫服日二三小便利乃止

治水腫通身皆腫桑白皮湯方

桑根白皮黃色

剉伍兩

吳茱萸

水浸壹宿

甘草

貳兩

白木

甘草

貳兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕用水二盞生薑一

棗大切飴糖半匙煎至一盞去滓溫服日再

治水病通身洪腫四肢無力喘息不安腹中虛脹澤漆

湯方三和漆二和

澤漆

微炒壹兩

赤小豆

貳兩

甘草

貳兩

鯉魚

淨去腸肚并鱗壹頭重壹斤者

赤小豆

壹斤

麥門冬

去心焙

參分

赤茯苓

去黑皮

人參

參分

杏仁

湯浸去皮尖雙

澤瀉

貳兩

澤漆

右七味將五味麤搗篩先用水五升將鯉魚與小豆

同煮至二升去滓內藥末五錢匕入生薑一分拍破

煎一升去滓分二服弱人作三服日再以小便利腫氣減或小溲下為度若小便大利還從一合始大便利則止若水甚加澤漆至半斤渴加栝樓根一兩

治水腫徧身小便澀腹滿赤小豆湯方

赤小豆壹升 桑根白皮貳兩 澤漆葉切炒

右三味將二味綿裹用水九升與小豆三味煮令熟

去綿裹者藥只留小豆飢則食小豆渴即飲汁以利

為度四兩 煎至一盞去滓飲服日再

治水氣通身腫麻黃湯方

麻黃去根節 白朮剉碎微炒 甘草炙

石膏碎 赤茯苓去黑皮

水右五味麤搗篩每服五錢匕水二盞半棗二枚擘破

生薑一棗入拍碎同煎至一盞去滓溫服日三每服

後蓋覆令汗出差

治水通身腫其脉沉遲芍藥湯方

芍藥剉 桂去粗皮 黃耆剉

右三味麤搗篩每服五錢匕用米醋一合水一盞半

煎至一盞去滓溫服心當煩勿怪六七日即差勿食

鹽

治通身洪腫木香丸方

不得臥有頃乃復小便難少而數胸滿隱痛此水氣迫肺也宜利小便澤漆根湯方

澤漆根

生肆兩

麥門冬

去心焙

甘草

人參

赤茯苓

去黑皮壹兩壹斤者各壹兩壹斤者

右六味將五味廔搗篩先用水三升煮魚取汁一升去魚每服三錢匕汁一盞煎至七分去滓溫服日三以小便利爲度不利增服如大便利小便未利者增至四合初服一日氣卽下得安臥有寒可加生薑二兩切焙

水氣徧身腫滿

論曰腎主水脾胃俱主土土剋水胃爲水穀之海其氣虛不能傳化水氣使水氣浸漬府藏又脾得水濕之氣土衰不能制之水氣獨歸於腎腎虛三焦不寫經絡閉塞故水氣溢於皮膚傳流四肢所以通身腫也其候上氣體重小便黃澀腫處按之隨手而起是也治通身腫喘欬氣丸方

丁香

木香

沉香

白檀香

桂

肉豆蔻

檳榔

草澄茄

大戟

甘遂

炒各壹分

木通

剉壹兩

續隨子

去皮

海蛤

郁李人皮去

麩麥

甜葶藶炒

桑根白皮剉炙

牽牛子各壹分

膩粉壹錢

巴豆慢火炮過出油令盡壹分

右二十味搗爲細末研白粳米飯爲丸如藜豆大每服三九至五九煎橘皮湯下

治偏身水腫木通湯方

木通剉

苦葫蘆子各壹兩半澤瀉

防己各壹錢

豬苓去黑皮

海蛤細研各壹兩

右六味麩搗篩每服五錢匕衆七分酒七分入慈白五寸切煎至八分去滓食前溫服當下小便數升腫

消

治水氣偏身腫滿皮肉欲裂心腹內氣脹小便不利飲

食不消甘遂丸方

甘遂鹽

葶藶炒貳兩半

赤茯苓去黑皮壹兩

陳橘皮湯浸去白焙

郁李人各參

右五味搗羅四味爲細末別搗葶藶如脂內散中蜜爲丸如梧桐子大空心飲下七九日一服如不利稍加以利爲度

治水病通身微腫腹大食飲不消小消化丸方

芫花炒

甘遂炒

大黃剉碎炒乾

葶藶

炒令紫色
各壹兩

巴豆

去皮麩炒研
出油盡擗拾枚

石五味搗羅爲末鍊蜜爲丸如小豆大每服飲下三
丸不知稍增至五丸以知爲度

治水病通身腫滿喘急大小便澀大豆散方

大豆黃

醋拌
炒乾

大黃

微煨去皮
各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕臨臥時煎薤橘皮湯
調下平明以利大腸爲度

治水通身腫滿喘急小便澀一字湯方

甘遂

大戟

去皮各
壹兩

右二味剉用慢火炒令黃色纍搗篩每服一字匕以

水半盞煎三五沸便須傾出不得煎過去滓溫服之

不過十服大効

治通身腫滿喘急小便澀大戟散方

大戟

去皮細切
微炒貳兩
乾薑半兩

右二味搗羅爲散每服三錢匕用生薑湯調下良久
糯米飲投之以大小便利爲度

治水氣通身黃腫葶藶丸方

葶藶

炒

防己

陳橘皮

湯去
白焙

郁李人

紫蘇子

赤茯苓

去黑皮
各半兩

右六味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大麝香酒下

二十九日三服以小便利爲度

治水病通身洪腫鯉魚湯方

鯉魚淨去鱗腸肚
壹頭壹斤

赤茯苓去黑皮
壹兩

澤漆微炒壹兩

甘草炙壹兩

澤瀉貳兩

人參壹兩

杏仁湯浸去皮尖雙
人總炒半兩

右七味將六味麤搗篩先以水三升煮魚取一升半

每服以魚汁一盞入諸藥末三錢匕煎取七分去滓

溫服日二三小便利乃止

治水腫通身皆腫桑白皮湯方

桑根白皮紫黃色
剉伍兩

吳茱萸水浸壹宿
炒乾貳兩

甘草炙壹兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕用水二盞生薑一

棗大切飴糖半匙煎至一盞去滓溫服日再

治水病通身洪腫四肢無力喘息不安腹中虛脹澤漆

湯方

澤漆微炒

赤小豆微炒

甘草炙參

鯉魚淨去腸肚并鱗
壹頭重壹斤者

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮
人參參

右七味將五味麤搗篩先用水五升將鯉魚與小豆

同煮至二升去滓內藥末五錢匕入生薑一分拍破

煎一升去滓分二服 弱人作三服 日再以小便利腫
氣減或小溲下爲度 若小便大利 還從一合始大便
利 則止 若水甚加澤漆至半斤 湯加栝樓根一兩

治水腫偏身小便澀腹滿赤小豆湯方

赤小豆微炒 壹升 桑根白皮炙剉 澤漆葉切炒 參分

右三味將二味綿裹用水九升與小豆三味煮令熟
去綿裹者藥只留小豆 飢則食小豆 渴即飲汁 以利
爲度

治水氣通身腫麻黃湯方

麻黃去根節 貳兩半 白木剉碎微炒 貳兩 甘草炙 壹

石膏碎分 赤茯苓去黑皮 壹兩

右五味麤搗篩 每服五錢匕 水二盞半 棗二枚擘破
生薑一棗入拍碎 同煎至一盞 去滓 溫服 日三 每服
後蓋覆令汗出差

治水通身腫其脉沉遲芍藥湯方

芍藥剉炒 貳兩 桂去粗皮 半兩 黃耆剉分

右三味麤搗篩 每服五錢匕 用米醋一合 水一盞半
煎至一盞 去滓 溫服 心當煩 勿怪 六七日即差 勿食

鹽

治通身洪腫木香丸方

木香

肉豆蔻皮

青橘皮去白

檳榔剉各

右四味搗羅爲細末用棗肉丸如菉豆大每服空心
溫酒下二十九漸加至三十九

治水氣通身黃腫蒴藿酒方

右用蒴藿根搗汁一盞酒一盞和之置暖處一宿旦
起空心服之差

治榮衛不通偏身腫滿欬嗽足腫小便不利通治十水

水銀丸方

水銀木煮

芒消

椒目微炒出汗

右三味搗羅爲細末鍊蜜丸如菉豆大每服十九空

心米飲下日二服小便利差

治水氣腫滿氣息喘急小便不利并男子女人虛積及
偏身黃腫白丸子方

膩粉手

粉霜

滑石末各肆

硝砂

寒水石火煨過

白丁香直者末各

右六味先將膩粉滑石二味研勻紅紙裏更和白麩
作餅子再裹合復用酒濕紅紙裹二十四重後用桑

柴爇火燒以麩熟爲度取出與前藥四味一處研勻

用水浸蒸餅心搗乾和爲丸如豌豆大每煎生薑水

下食前喫第一日三九日三第二日四九日三第三日五九日三第四日六九日三服後以小便無數取下水爲度服四日病未下更加一日如服藥第二日覺口氣時便用後漱口藥漱之漱口齒貫衆湯方

貫衆

黃連去須各半兩

右二味麤搗篩每用一錢匕水一盞煎三兩沸入龍腦少許溫溫湫之白粥養百日

治水腫腹滿四肢羸瘦喘促小便澀少妨悶海蛤充方

海蛤研貳兩

木香

訶梨勒皮

防己

厚朴去麤皮生薑汁炙旋復花各壹兩

白檳榔銚

鼈甲去襖燻

郁李人去皮研

桂去麤皮

右一十味搗羅爲末鍊蜜丸如梧椰子大每服二十丸煎大腹皮湯下

治水氣第一日空心先服檳榔丸一服日中後服枳實湯一服次日亦然第三日空心臨卧服萬靈丸各一服第四日早晚服水銀丸各一服其病當於大小便俱利則喫煮赤小豆如渴不可飲水當服白朮湯然後常服鹿茸丸則永安傾榔丸方

檳榔煨

牽牛子半生

葶藶隔紙炒

惡實

木香

青橘皮湯洗去白

郁李人去皮尖炒研

枳殼不去瓢

白茯苓去黑皮

防己各半兩

大黃濕紙裹煨火中燻令香熟

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

四十九空心煎桑根白皮湯下

治水氣枳實湯方

枳實去瓢炒

升麻

甘草炙

桑根白皮炒

知母焙

紫苑去苗土

白朮

黃耆細切

赤茯苓去黑皮

秦朮去苗土

黃芩去心

麥門冬去心焙乾

右一十二味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞葱白

兩莖同煎至七分去滓溫服

治水氣腫滿萬靈丸方

苦葫蘆子

焙乾伍兩苦葫蘆瓤兩半

牽牛子

參同壹半生炒熟

右三味爲細末醇糊和丸如梧桐子大每服三十丸

空心臨臥各一服煎桑根白皮湯下

治水氣腹滿小便不利水銀丸方

水銀

壹兩酒煮壹日研如泥

楳目壹兩

苦葶藶

貳兩隔紙炒令香

馬牙消壹兩

右四味同研勻鍊蜜和入白內搗千百杵丸如梧桐子大每服二十九空心臨卧各一服米飲下其病當從大小便俱利出可食少亦小豆

治水氣渴腹脇脹滿白朮湯方

白朮

赤茯苓去黑皮

人參

甘草炙

右四味等分麤搗篩每服五錢匕水二盞煎一盞半去滓溫服

治水氣平愈體瘦如舊可服平補鹿茸丸方

鹿茸酥炙

肉苁蓉酒浸去

乾地黄

相子人切

菟絲子酒浸一宿

桂去粗皮

黃耆細切

白茯苓去黑皮

桂去粗皮

防風去粗皮

遠志去心

桂去粗皮

不五味子各半兩

右一十二味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服二十九空心米飲下加至四十九封堅藥水

治水氣輕粉丸方

水銀粉錢

滑石貳錢

凝水石參

海金沙錢

右四味細研勻用白麩裹上用泥裹以牛糞火燒覺

火稍炎便去之取出藥恐粉走也刮去泥及乾麩就
有濕者燒麩投爲丸如菜豆大每服第一日三丸第
二日六丸二服第三日十二丸三服煎漿水燈心生
薑冷湯下若病勢未行第四日更服十二丸然所服
不可過多若能不服第四服得行乃佳恐藥力太過
須慎此一服若服第一服牙齒便動水行則不可治
不須與藥若得第二日第三日小便利行乃妙服藥腹
中作聲背胛疼時牙欲動也旣動則用封潔牙方

青黛

棗肉等分

右二味和研如泥封牙斷更以荆芥湯漂三五度若

逐動小腸中水往往小便淋漓一日夜身便瘦而愈
若水行患渴者則調生凝水石末一錢新汲水下渴
自減小便定疊服後補藥一月方得平復

服前藥後補藥單檢湯方

葦撥

葦澄茄

紅豆蔻去皮

蓮花

甘草等分

右五味麩搗篩每服三錢匕水一盞生薑一小塊切
棗一枚擘煎至七分和滓溫服

治水氣腫滿方

楮木灰壹大斗淋汁壹小斗

糯米壹小斗

赤小豆

壹大升

桃人

去皮尖雙商陸兩壹

麥門冬

去心壹大合

天門冬

壹合

右七味諸藥以灰汁煮令爛空心服以飽爲度飢即喫飯無妨日內當利以白粥止之

治水腫方

商陸

不以多少去毒皮切陰乾爲末

右用黃頰魚三頭大蒜三枚菟豆一合水二大椀同煮以豆爛爲度先將豆任意喫却以汁調下藥末二錢匕其水卽消

治水氣頭面身體俱腫晉瓠丸方

苦瓠

壹長

右一味揀無膿痕者取白瓢實揀丸之如大豆粒每粒用麩裹煮沸空腹吞七粒相次出水一升三日水自出盡以至大瘦是効三年當忌發病食物

水腫胸滿氣急

論曰內經論水病謂其本在腎其末在肺又曰肺爲喘呼腎爲水腫今腫氣否滿塞於胸中故有胸中滿急之證蓋由腎虛旣成聚水之病上攻於肺肺布葉舉在於胸背背者胸中之府也

治水氣腫滿肺氣喘急欬嗽脹悶坐臥不得喉中作聲

心胸痞滯防已丸方

防已

白前

五味子

紫苑

去苗土各半兩

桑根白皮

馬兜零

麻黃

去根

桔梗

羌胡

大腹皮

剉各

赤茯苓

陳橘皮

甘草

炙

杏仁

伍拾粒湯浸去皮尖雙入炒

右一十四味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服十五丸至二十九丸溫生薑湯下不拘時

治水氣腿股腫滿喘促欬嗽坐臥不得澤瀉丸方

澤瀉

芫花

郁李人

牽牛子

防已

苦苧塵

滑石

天戟

海蛤

甘遂

瞿麥穗

檳榔

右一十二味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前煎陳橘皮湯下

治水病喘急上氣消腫滿十聖丸方

天戟

桑根白皮

甘遂

甜苧塵

巴豆

續隨子

烏頭

檳榔

杏仁

牽牛子炒貳兩取
末參分

右一十味為細末鍊蜜丸如雞頭大每服一九生薑

湯化下更量病勢加減

治水腫胸滿氣急甘遂湯方

甘遂炒壹兩半

赤茯苓去黑皮

郁李人湯浸去皮尖研

黃芩去黑心

杏人去皮尖雙兩研各貳兩

澤瀉葉

澤漆微炙

陳橘皮湯浸去白炒乾各壹

右八味麻搗篩每五錢匕水三盞煎至一盞半去滓

分溫二服

治水氣消腫定喘黃耆丸方

黃耆剉

甘遂炒

青橘皮湯浸去白焙

麥蘖

大戟炒

陳橘皮湯浸去白焙

陳麩炒各半兩

右七味為細末鍊蜜丸如梧椰子太煎木通桑根白

皮湯下

治水氣腫滿氣急喘嗽小便赤澀桑根白皮湯方

桑根白皮剉碎

葶藶紙上炒

澤漆莖葉

郁李人湯浸去皮尖各貳兩

杏人湯浸去皮尖雙兩

赤茯苓去黑皮

赤茯苓去黑皮

參兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大
切煎至八分去滓溫服以小便利爲度

治水氣喘滿小便赤澁腰腿浮腫不得眠睡苦苧蘆丸

方

苦苧蘆 紙上炒壹兩參分

杏仁 湯浸去皮尖雙入炒研參

陳橘皮 湯浸去白焙肆錢

防已 兩壹

赤茯苓 去黑皮壹兩

紫蘇葉

郁李人 湯浸去皮尖炒研各半兩

右七味搗羅五味爲末與二味研者和勻鍊蜜丸如
梧桐子大每服二十九食後煎橘皮湯下日再

治水腫胸滿氣急郁李人湯方

郁李人 湯浸去皮尖炒 桑根白皮 炒 赤小豆 炒各兩

陳橘皮 湯浸去白炒貳兩 紫蘇 壹兩

茅根 切肆兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水三盞煎至一盞去滓

溫服

治十種水氣喘急坐卧不得小便淋瀝苧蘆散方

苦苧蘆 紙上炒壹兩參分 牽牛子 炒壹兩 豬苓 去黑皮

澤瀉 各壹兩 椒目 炒參分

右五味搗羅爲細散每用葱白三莖切漿水一盞煎

至半盞去滓調藥二錢匕空心臨臥服以大小便利為度

治水腫胸中氣滿喘急茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 杏仁去皮尖雙仁炒各肆兩

陳橘皮湯浸去白

右三味麤搗篩每服五錢匕水三盞煎至一盞去滓

溫服日再病隨小便下飲盡更作

水蠱

論曰水蠱之狀腹膜腫脹皮膚麤黑搖動有聲此由脾腎氣虛溫氣滯溢久不差則害人如蠱之毒故謂之水

蠱也

治水蠱通身腫滿無比丸方

京三稜煨 牽牛子

價榔剉 芫花昔浸炒各壹兩 膩粉分

續隨子皮 硝砂研 木香各半

鐵粉研 大棗參拾枚湯內畧煮過剉去皮核取肉爛研

右一十一味除膽礬硝砂棗肉外同搗羅為末用醲

醋二大升先下硝砂膽礬棗肉於銀石器內煎五七

沸次下諸藥末一處攪勻慢火熬候可茹丸如豌豆

大每服十丸丈夫溫酒下婦人醋湯下

冷水蠱腹脹消腫滿痞氣中膈丸方

芫花醋浸
炒黃

甘遂炒黃
為末

大戟煨各
兩

澤瀉

青橘皮湯浸
去白 木香各半

稻砂研

乳香研各
錢

巴豆去皮膜
出油
研或拾壹枚

右九外搗研為末鍊蜜和丸如菉豆大每服三九至

五九溫酒下

治水蠱水腫甘遂散方

甘遂炒

蓬莪茂炮

青橘皮湯浸
去白

大戟煨

桂去鹽皮
各參分

石菖蒲炒乾

木香各半
兩

右七味搗羅為散每服用葱湯調一錢七空腹漸加

至二錢匕微吐瀉為度亦治脚氣

治水蠱身體洪腫喘滿葶藶湯方

葶藶紙上炒
令燥
色揅末
各兩

右一味以水二盞入葶藶五錢匕大棗十枚擘破同

煎至一盞去滓分為二服以利為度後服葶藶丸

葶藶丸方

葶藶子紙上炒
令燥
紫色
各兩

牽牛子微炒
壹兩半

海藻洗去
鹹沙

昆布洗去
鹹沙 豬苓去
皮

澤漆各壹
兩

小豆大
擘 糯米炒
下

石六味壽羅爲未鍊蜜和凡如小豆大每服米飲下
十五九日再稍加至二十九以知爲度

治水蠱腹腫利小便分氣散方

甘遂炒

商陸炒

白牽牛炒

各兩

檳榔炮

木香分

白丁香炒

各兩

膩粉研

玉錢分

大蘇分

各兩

右七味搗研爲散每服半錢匕溫酒調下實者加至

一錢匕

治水蠱大小便不通急腹率寒大黃湯方

大黃剉

麥門冬去心

各兩

各兩

甘遂炒

茅根剉

黃連去須

各兩

貝母炮

參分

右六味盛擣篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治水蠱腹脹滿急小便不通縱有少而黃赤瞿麥湯方

瞿麥穗

車前子

滑石

各兩

茅根剉

甘遂炒

苦參

二十分

右六味等分盛擣篩每服二錢匕以水二盞煎至七

分去滓溫服日三以利爲度

治水蠱腹脹喘嗽分水氣海蛤丸方

海蛤燒灰

滑石

凝水石研各

白丁香研杖

膩粉

粉霜各壹

右六味一處研勻麩糊和作餅子以濕紙裹燒熟搗羅爲末薄剋糊和丸如菉豆大溫酒下二十九

治水蠱內腫卽冷外腫卽熱氣急無力結水湯方

黃連去須

大黃劉碎醋拌炒

黃連去須

甘遂微炒

葶蘆炒令紫

右四味麩搗篩每服二錢七水一盞半煎至七分去

滓溫服日二

治水蠱偏身洪腫椒目丸方

椒目微炒

牡蠣煨

葶蘆紙上

甘遂炒

右四味等分搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆大每服米飲下十九取利後服白米粥養之

治水蠱水腫大戟湯方

大戟去皮

甘遂炒

右二味等分麩搗篩每服一錢匕水一盞半入大棗

三枚擘破煎至七分去滓溫服

治水蠱鼠尾草丸方

鼠尾草

馬鞭草各伍斤

石二味用水五斗煮取二斗去滓再煎成膏爲丸如小豆大以輕粉爲衣每服米飲下三九至六九

治水蠱身體洪腫惡實丸方

惡實微炒
壹兩

石一味爲末麵糊和丸如梧桐子大每服寸九米飲

下勿嚙破

治水蠱徧體洪腫瓢瓢煎方

瓢瓢豆
枚

右一味以水二升煮一炊頃去滓煎堪丸卽丸如小

豆大每服米飲下寸九取小便利利後作小豆羹食

之勿飲水

治蠱病水腫楮枝煎方

楮枝剉半
升

右一味以水五升煎至二升半去滓取汁入黑豆末

半升煎成煎每用一匙空腹服之

膜外氣

論曰諸家方書論水病甚詳未嘗有言膜外氣者唐天寶間有徒都子者始著膜外氣方書本末完具自成一家今併編之然究其義本於肺受寒邪傳之於腎腎氣虛弱脾土又衰不能制水使水濕散溢於肌膚之間氣

攻於腹膜之外故謂之膜外氣其病令人虛脹四肢腫滿按之沒指是也

徒都子論病本

膜外氣者或謂之水病起於佗疾不可常定或因患瘧或因積勞或因腎藏中風或因肺府傷冷或因膈上氣或因衝熱遠行或因酒肉中所得始於肺終於腎或因欬嗽或多涕唾或因蓄聚冷氣壅塞不散遂使肺藏熱氣攻心五藏冷氣下化爲水流入膀胱在大腸膜外所以切脉不能知鍼灸不能及蓋人腎爲命本不可虛也本固則葉茂本虛即易枯况四時衰王皆乘腎藏之氣

腎損即五藏皆衰是致胃閉而脾不磨氣結而小便澀輕重之候在大小便耳若小便不通則氣壅攻擊腹內衝出膜外化而爲水使人手足頭面浮腫若大小便微澀則微腫極澀則極腫大小便俱不通三日即徧身洪腫至重則陰亦腫夫陰腫有二有腫而小便自由者有腫而小便出澀者又有莖頸連少腹臍皆腫者此並爲死候宜速治之若患此疾腫亦不常定或先手足面目浮腫或先腰肋微腫或先手足小腫其候或消或甚三五日稍愈或三五日再發亦以小便通澀爲候積漸變成洪腫婦人得之與此略同凡患此疾令人腹脹煩悶

胸間氣急此由肺脹甚卽喘如牛吼坐臥行立不得或
中夜後氣攻胸心重者一年二年方死有一月兩月死
者若將息失度誤食毒物十日五日卽甚也愚醫多以
鍼灸出水爲功又以鯉魚赤小豆爲藥又令病人飲黃
牛尿服商陸根反有所損少有差者大抵此病尤忌鍼
灸華佗云患水病未遇良醫第一不得鍼灸言氣在膜
外已化爲水水出卽引出腹中氣水盡則死扁鵲云水
病在膜外常鍼不可及常藥不可療惟神鍼良藥可也
有此疾者宜向陽行坐遇陰雨則愈覺壅滯房中常須
存火服藥後夜卧覺胸間熱甚宜含紅雪與好茶之類
慎勿飲酒及冷茶冷水若渴宜喫五靈湯方錄在卷後
尤忌鹽生冷醋滑
治膜外氣水病不限年月深淺洪腫大喘須臾不可過
朝服暮差防已湯方

防已

大戟

木香

赤茯苓

去黑皮

海蛤

犀角

屑

胡椒

白朮

葶藶

防風

去

木通

桑根白皮

紫蘇

陳橘皮

炙

牽牛子

訶梨勒

核

郁李人

白檳榔

各壹兩

大黃貳

麝香

少許湯成不用研

右二十味等分唯大黃一味倍用並須新藥剉了秤爲二劑以水三升宿浸明日五更用鎔文火煎減去一升絞取飲可三盞平旦空腹且服一盞如人行五里更服一盞又如人行五里更服一盞至第二第三服如藥冷用重湯煖之不可冷服若久病腹中虛服至第三盞卽微利三兩行若腹中實者至日午卽轉瀉宜用盆盛驗之必有惡濁黃水或青黑惡物出三五升並氣化爲之瀉若不甚困慎勿止之必自住若覺力乏卽服漿水粥補之後隔三五日更服一劑還

依此法服之按徒都先生云服第一劑則病減半至第二劑則去根本前後歷試絕重者朝服一劑而暮已差根本深者服藥當日腫消能起但覺小腹內有塊結則須後劑去之其藥滓慎勿拋棄布囊盛懸於風中俟日或覺微有發動則更煎藥滓可更治兩人徒都先生云人家有此藥滓懸於戶上一家終不患瘦氣此飲不獨治水氣凡是氣病皆治之若患肺氣不限年月深淺於此藥二十味中減去大黃及訶梨勒加貝母人參以童子小便煎每日空心服之當去病根有患肺氣困重者因逢患水氣人服此藥偶得

一盞服之便當永差有人一生患腳氣時時衝心服
此飲亦除根本以此推之但是氣皆治不獨治水氣
而已產婦有娠人服之亦無妨小兒及老人隨意加
減差後宜服順氣丸

治水氣順氣丸方

防已壹兩

大黃貳兩

犀角鎊

訶梨勒皮

牽牛子

赤茯苓去黑

葶藶炒

海蛤

芫薺

乾地黃焙

木通剉

大戟

桑根白皮剉

陳橘皮白法

防風去

郁李人去皮

木香各壹

右一十七味搗羅爲末鍊蜜丸梧桐子大每服十九
空腹米飲下覺壅不快則加至十五丸覺通則減至
三五丸大小便不通卽加至三十九丸此藥不獨治水
氣其功與前飲相類若患水氣人服前飲後腫旣消
便服此順氣丸氣順血滑體氣輕健卽止患脚氣人
長合此藥將行備急服前飲差百日內卽宜服五靈
湯

治水氣五靈湯方

訶梨勒皮

木通剉

赤茯苓去黑

防已

陳橘皮

湯浸去白 焙各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓渴卽飲之覺熱卽喫好茶

治水氣牽牛五靈煮散方

牽牛子

檳榔

木香

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白 焙各壹兩

右五味搗羅爲散如茶法煎三兩沸渴卽飲之此藥兼治一切肺氣脚氣每覺心胸煩悶時服一盞卽愈奔豚氣上築心胸不可忍者併三兩葶立效

治水氣紫蘇煮散方

紫蘇葉

防風

去土

桑根白皮

白朮

剉碎 等分

右四味搗羅爲散如茶法煎三兩沸覺熱卽去白朮加甘草功效如前方所說又有蛇蠱狀與水病相似四肢如故小便不甚澀但腹急腫而蠱脹不下食凡醫多誤作水氣治之宜細詳審當服太上五蠱丸治百病及諸色蠱常合將行備急五蠱丸

雄黃

椒目

巴豆

莽草

眞珠末

芫花

鬼臼

礬石

藜蘆

獺肝各壹分

蜈蚣壹寸

附子炮裂去皮

斑猫去翅足拾枚

右一十三味搗研爲末鍊蜜丸如小豆大瓷合密收
每食後服一九如未效日增一九以利爲度當有蟲
出形狀不可具載蟲下後七日內切宜將攝凡服此
藥一劑蠱不能侵百病盡除勿食五辛又蛇毒甚者
合五蠱丸未及且以大豆漬酒絞汁服半升卽差又
酒服桔梗犀角末方寸七日三服中毒甚不能自服
幹口開與之藥下心頭當煩悶須臾卽穌如此服七
日後宜食豬脾藏補養今所錄蛇蠱方在卷末者緣

蛇蠱狀似水病恐人不辨誤作水病治之且謂水藥
不驗楊譽所傳地仙徒都先生神方一十五首皆治
惡病而膜外水氣方具于首蛇蠱次之餘方世人無
有傳者楊譽云曾有親識患水病洪腫滿牀頃刻必
死且服此藥至暮獲安不忍弃其津常以絹囊盛之
凡煎防已湯須用舊鑊於火中合之幾令通赤揩磨
取淨免有油膩又於藥名二十味中各取一字合成
四句歌之庶使年久不忘胡牽犀麀海漢菰戟通象
青黃訶麝獮白郁紫防蠱

治膜外水氣神効牛李子丸方

牛李子微炒 牽牛子微炒 吳茱萸水浸壹宿炒乾

青橘皮去白各半兩 杏仁湯浸去皮尖雙 人人生用拾伍枚

葶藶紙上炒

右六味搗羅為末用水浸蒸餅九如小豆大每煉三

十九夜後煎橘皮湯下以轉下氣為度

治膜外水腫澤漆丸方

澤漆微炒壹兩 水銀鍊 葶藶紙上炒

大戟微炒 郁李人湯浸去皮炒 枳殼去瓢麩炒

甘遂微炒各壹兩 椒目微炒各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十九空腹

米飲下未利加至十五丸

治膜外水氣身腫十水丸方

藥本去苗土 澤漆微炒 大戟微炒

連翹 葶藶紙上炒 甘遂微炒

芫花醋浸炒焦 桑根白皮剉 赤小豆微炒各

巴豆去皮心膜麩炒

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服五丸空

心米飲下不利加至十九

治膜外氣白牽牛散方

白牽牛子炒 青橘皮去白糖炒 木通剉各壹兩

右三味搗羅爲散每服一錢七煎商陸湯調下大便
下黃水爲度忌鹽一百日

治膜外水氣甘遂餅方

甘遂

大麥麩各半

右二味搗羅爲末以水和作餅子燒熟熱服之如不
利以熱飲投之如利以冷水洗手面卽止

大德重校聖濟總錄卷第八十

大德重校聖濟總錄卷第八十一

脚氣門

風毒脚氣

脚氣緩弱

脚氣痺弱

脚氣痺攣

脚氣疼痛不仁

脚氣統論

論曰風毒中人隨處悉能爲病偏著於脚何耶蓋五臟經絡心肺起於手十指肝腎脾起於足十指地之蒸濕毒氣足先受之久而不差漸及四肢腹背頭項古人所謂微時不覺痼滯乃知所以謂之脚氣也其證不一或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或大小便秘澀不通或胸中衝悸不欲見明或精神昏憤或善忘語錯或壯熱頭疼或身體冷痛或時覺轉筋或小腹不仁或胫腿頑痺或緩縱不隨或腫或不腫或百節掣急凡是之類皆脚氣候也巢元方止論痿弱上氣等八證今詳攷方

籍有陰陽乾濕之異證江東嶺南之異地以至痰壅語澁變成水氣與夫膏藥漬浴等方法匪一故兼明而具載之治法固多矣唯孫思邈云不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯劑此當爲治法之最學者宜加意焉

風毒腳氣

論曰內經謂暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂寒暑風濕之氣皆本乎地人或履之所以毒易中於足也因病從脚起故謂之脚氣又况五藏流注脾與腎肝之經絡皆起足指故有風毒脚氣之病其證

或見食嘔吐或腹痛下痢或便澁不通或胸中驚悸不欲見明或語言錯忘或頭痛壯熱或身體冷疼轉筋脛腫瘡痂緩縱其狀不一治療不可緩也凡小覺病候有異卽須大怖畏決意急治之傷緩氣上入腹或腫或不可腫胸逆滿上氣肩息者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死故不可緩也

治脚氣痺攣風毒攻注腰脚疼痛風引湯方

獨活壹兩

防風壹兩

當歸壹兩

赤茯苓兩

大豆貳合

人參壹兩

乾薑分

炮裂

附子

壹兩炮裂 去皮臍 石斛

壹兩去根

有九味搗篩為散每服四錢匕以水酒各半煮煎至

六分去滓不計時候溫服

治風濕脚氣上攻胸腹壅悶痰逆木瓜丸方

木瓜

壹兩乾者

陳皮

壹兩西湯浸人參壹兩去

桂心

兩

丁香

兩

檳榔

兩

右六味揀淨搗篩為細末鍊蜜搜和成劑更搗五百
杵丸如梧桐子大每服十五丸煎陳橘皮湯下空心
午後日可二三服漸加至三十丸

治風毒脚氣疼痛少力筋脉拘急行步艱難木瓜虎骨

丸方

木瓜

宣州者壹枚去皮煨

麒麟竭

兩

沒藥

研各兩

乳香

半兩研

以上參味同研令勻入在木臼中却以元蓋子蓋
定用黑豆壹斗水淘過安木瓜在內都用豆蓋令
蒸爛取出沙盆內研成膏

虎脛骨

壹兩塗酒炙

木香

自然銅

兩

楓香脂

敗龜

醋炙去

骨碎

補去

甜瓜子

程

去毒

雷歸

切各

地龍

去土

安息香

壹兩重湯內酒熱去滓

右一十五味除前四味外都搗羅為末并安息香同

入木瓜膏內按和更入白搗一二百下如藥稍乾入
少好酒九如梧桐子大每服三十九空心木瓜湯下

日二

治脚氣痺攣不隨風毒攻四肢壯熱如火頭項攣急氣
衝胸中太續命湯方

當歸貳兩

芎藭壹兩

杏仁貳兩

麻黃貳兩

赤芍藥壹兩

石膏貳兩

人參壹兩

防風貳兩

黃芩壹兩

甘草壹兩

杏仁壹兩

右一十一味搗篩爲散每服四錢匕水一盞生薑半

分煎至六分去滓溫服不拘時

治風毒脚氣痺攣行步不遂越婢湯方

麻黃壹兩

石膏貳兩

白朮貳兩

附子壹兩

甘草壹兩

右五味搗篩爲散每服四錢匕水一盞生薑半分煎

至六分去滓溫服不拘時

治脚氣緩弱皮肉頑痺肢節疼痛木香散方

木香壹兩

草薢壹兩

車前子壹兩

牛膝壹兩

羚羊角壹兩

陳橘皮壹兩

杏仁壹兩

獨活壹兩

丹參壹兩

桂皮去塵

杜仲去塵皮細剉炒

秦艽去苗土各壹兩

右一十二味麤鴻篩每服三錢匕以水一盞入生薑
半分拍破同煎至七分去滓空心溫服日午近晚各

治風毒脚氣上衝臑府散入四肢虛腫無力沉香丸方

雄黑豆壹升小圓者淘

附子貳兩炮裂去皮臍

吳茱萸湯浸焙

青橘皮湯浸去白焙各捌兩

生薑肆兩切碎已上伍味用葛

布作袋盛內大鍋中以水壹斗煮令水盡泣乾取
袋中豆礪燥乾為末其餘肆味並不用更入

藥後

沉香剉

陶菴蓉去塵皮切焙

白附子炮

巴戟天去心各貳兩

牛膝剉酒浸焙

海桐皮剉

獨活去塵頭

芎藭

澤瀉剉

山芋

生乾地黃切焙

羌活去塵頭各壹兩

右一十七味除不用四味外搗羅為末拌令勻鍊蜜
為丸如梧桐子大每服二十九空心以溫酒下近晚

再服

治風毒脚氣上衝散入四肢虛腫無力犀角丸方

犀角鎊貳兩

檳榔剉

白朮

芎藭

羌活去塵頭

人參

赤茯苓去塵皮

朮香

防風去

石斛去淨皮及根剉焙 中膝剉酒浸焙乾各壹兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空心溫酒下日晚再服

治風毒上攻下注脚氣等馬蘭花煎丸方

馬蘭花

附子炮裂去皮臍切同馬蘭花以水壹升半煮水乾焙

芫花醋炒各壹兩

巴豆春夏貳拾貳粒秋冬參拾捌粒柏破和殼同芫花用醋壹升半煮

升半煮醋乾焙

白附子炮

陳橘皮湯浸去白焙

羌活去蘆頭

破故紙各壹兩

牽牛子

檳榔剉各半兩

右一十味搗羅爲末醋煮麩糊爲丸如梧桐子大每

食前或臥時空心加減自五九加服丈夫艾鹽湯下

婦人橘皮湯下

治風毒脚氣攻手脚緩弱沉重木香丸方

木香

沒藥研

附子去皮臍生用

烏藥剉

蒺藜子炒

天南星湯浸壹日入

白附子炮各壹兩

礞砂研壹兩

木瓜壹枚去頭蒂乾作麩子

石九味先將礞砂研細入木瓜內濕紙五七重裏煨

熟爛研成膏次將餘八味搗羅爲末以木瓜骨和爲

丸如桐子大每服十九空心冷酒下

治腎虛冷腎風或頭風兼風毒脚氣等五柔丸方

大黃

壹斤蒸

前胡去蘆頭

半夏

湯洗去

肉苳蓉

土蟲皮切焙

芍藥

赤茯苓

土蟲皮剉

細辛

去苗葉剉炒各

葶藶子

鏡子內隔紙炒微紫

當歸

剉炒各

右九味搗羅爲末鍊蜜搜和再入白搗三千杵丸如

梧桐子大每服五九空腹以米飲下加至七九以大

便通利爲度日三

治風毒脚氣無力瘡痺四肢不仁失音不語毒風衝心

檳榔湯方

檳榔

剉半

防風

去

桂皮

去

當歸

剉

赤茯苓

去

犀角

屑分

麻黃

右七味除麻黃外並麤搗篩每服先取麻黃末二錢

匕水一盞半煎至十餘沸掠去沫入藥末五錢匕用

大棗三枚拍碎同煎至七分去滓空心溫服近晚再

服

治風毒脚氣昏煩壯熱頭痛嘔吐口乾蘆根湯方

生蘆根

剉壹

赤茯苓

去

葛根

剉

知母

剉

麥門冬

去

淡竹葉

剉

甘草

炙半

右七味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓食後溫服近晚再服

治風毒脚氣上衝散在四肢虛腫無力丁香湯方

丁香

陳麴炒令

沉香剉

木香各貳

紫蘇子炒參兩

乾木瓜焙乾伍兩

吳茱萸浸洗焙乾炒黃壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓空心溫服近晚再服

治脚氣并諸風毒黑豆煎方

黑豆伍升雄者

桑根白皮伍兩剉以上用水貳斗煮令豆爛取淨汁更入

藥後

羌活去蘆頭為末

蒺藜子炒為末

海桐皮為末

吳茱萸湯洗焙乾為末各半兩

右八味除前二味取汁外入後四味末一處和勻銀

石銚內文武火熬成煎每日空心溫酒半盞調一匙

飲之

治一切風毒脚氣輭脚等黑豆飲方

黑豆升參

檳榔煨米

桑根白皮炙貳兩

生薑

郁李人湯浸去皮尖炒各壹兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取一

盞去滓溫服不拘時

治風毒脚氣心胸妨悶多痰咳嗽背膊痛大腸溫芍藥丸方

芍藥

木香

枳殼去麩炒
各參分

檳榔細切

大黃剉炒
半兩

右五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大食後溫水
下二十五丸加至三十丸

治脚氣上攻及風毒走注疼痛越痛丸方

白芥子

甘遂

大戟已上參味並
生為末各壹

右三味用白麩一兩半滴水同和作餅子焙令焦黃
半兩

勿令黑色細碾為末用醋煮麪糊為丸如梧桐子大
每服一十九粒酒下不得嚼破量虛實加減服

治脚氣喫食不下及一切風毒橘皮丸方

陳橘皮

壹斤以童子小便浸壹日去白用炭火半
秤燒地令赤以酒壹升灑於熱地上將橘

皮鋪在地上着
盆壹壹復時

朴消壹斤漿水漬白茯苓去黑皮
肆兩

右三味搗羅為末再研細鍊蜜為丸如梧桐子大每
服三十九粒空心米飲下以微利為度如利多即減服

治風毒脚氣吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗參度
炒乾炒

桂去麩
各半兩

右二味麩搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

破同煎至六分去滓食前溫服日晚再服

治風毒脚弱痹滿上氣豉酒方

豉豉斗參
蒸參暴

右一味以清酒二斗內瓮中浸經三宿隨意多少飲之若急待飲卽以酒煮豉飲之

治風毒脚氣手足拘攣白楊皮酒方

白楊皮

東南西去地參尺者取壹斤半勿令見風去皮細剉熱令黃赤

右一味以清酒一斗內不津器中漬之密封頭勿令泄氣冬月二七日春夏一七日開取飲量人酒性多少服之日五六服常令酒力相續取差爲度白楊皮

須白色者佳不要近塚墓者

治風毒脚氣不仁摩傅神明膏方

附子

拾肆枚小者參拾枚炮裂去皮臍

吳茱萸壹兩
生用

蜀椒去目及合口者
炒汗出壹兩半

白芷剉

前胡去蘆

芎藭剉

白朮

桂去蘆

當歸切焙各
參兩

細辛去葉
貳兩

防已兩

右一十一味搗碎以新綿裹內淨器中以酢五升浸一宿用臘月豬膏一斗內鍋中鍊去筋膜入前酢中與所浸藥以文火煎三上三下候變色稀稠得所濾

去滓攪勻成膏瓷器中盛密封頭每有患風痺不仁
旋取以手揩摩令入皮肉若多腫卽去細辛以牛酥
代豬膏亦佳

治風痺不仁風毒摩前紫膏內有巴豆若用多恐損皮
肉莽草膏方

莽草用

當歸

白芷

防已

蜀椒出汗去目及合口者各參兩

吳茱萸

湯洗焙乾

丹參

芎藭

商陸根

切焙各肆兩

沉香

木香

零陵香

雞舌香

犀角

屑貳兩

附子

去皮臍生使捌兩

右一十五味剉碎以新綿裏內淨器中以苦酒三升
浸經一宿取出用真酥三斤同入鍋中以文火煎三
上三下候變色稀稠得所濾去滓裏攪勻傾入瓷器
中密封頭每有患旋取以手塗摩傳之措令入皮肉
治風毒脚氣骸膝癢痺腫行履不得皮膚如小蟲行宜
淋瀝方

羊桃

蒟藿

蒺藜子

蒼耳

海桐皮

柳木蠹末

此胡

茯苓皮

水荳各壹兩

右九味劉細以水五斗煎取三斗去滓淋漑慎避風

冷

治脚氣妨悶不下食瘦弱腹痛二香丸方

小香

檳榔劉各

雞舌香

吳茱萸

湯洗焙乾炒

當歸劉

陳橘皮湯去白焙

訶梨勒皮

煨

生薑

切焙各壹兩半

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧子大食前煎

橘皮湯下三十九

治脚氣初覺風毒攻作脚膝虛腫筋骨疼痛或癩痺不知痛痒或氣喘煩悶宜速服大腹飲方

大腹

并子劉拾枚

否人

湯浸去皮尖雙入者

木瓜

切焙

生薑

片切

桑根白皮

劉各貳兩

吳茱萸

湯洗再焙乾炒貳分

黑豆

升伍

右七味先將豆并生薑以水五盞煎令浮去豆即將餘藥麤搗篩入湯內同煎至三盞去滓分溫二服空心服良久再服取利為度

治風毒脚氣酸膝癢痺腫行步不得皮膚如蟲行宜淋

漑方

露蜂房

水菰

茵芋

附子

生各貳兩

蒴藿

肆

蜀椒

去目并閉壹兩

右六味剉碎以水五斗煎去滓取三斗淋瀝慎避風
治風毒流注脚膝腫滿不消順氣丸方

木香

青橘皮湯去白 檳榔剉各

黑牽牛炒體

郁李人分壹

麻人研入 參分別

右六味搗羅五味爲細末入麻人鍊蜜和丸如梧桐
子大每服二十九麻人湯下

脚氣緩弱

論曰脚氣緩弱者由腎臟虛風入其經故筋弛縱而痿
弱內經謂緩風濕痺是也古方載蘇氏論亦云不腫而
緩弱行卒屈倒漸至不仁蓋風濕毒氣之感人多不卽

覺或因它疾乃始發動初若不足畏馴察其狀自膝至
脚已有不仁或痺痛或如蟲緣或足指及脛痠痛或屈
弱不能行皆緩弱之證也

治脚氣手足緩弱膝疼痺上熱下冷或時心悶或卽嘔
逆牛膝湯方

牛膝

去苗酒

萆薢

麥門冬

去心

赤茯苓

皮去黑

黃耆剉

芎藭

防風

去

丹參

各壹

陳橘皮

湯去

人參

附子

炮裂去

獨活

去蘆

桂枝

剉

甘草

剉

當歸

切焙各

木香貳兩

杏人湯退去皮尖雙

右一十七味判如麻豆每服五錢匕以水一盞半生

薑一分拍碎煎至一盞去滓溫服不拘時日三服

治脚氣緩弱及痺腫滿心下急大便澀此胡豬苓湯方

此胡苗

豬苓去黑皮

紫蘇莖葉細剉各壹兩

陳橘皮湯去白焙

防己

天麻人研

郁李人湯去皮尖炒

桑根白皮剉碎炒

半兩

右八味除麻人郁李人研外麻搗篩入研藥和勻每

服三錢匕以水一盞煎至七分去滓空腹服日午晡

時再服

治脚氣緩弱上氣瘡痺服滿不能食枳實散方

枳實

去穢麩炒

桂

去粗皮

白朮

赤茯苓

去黑皮

右四味搗羅為細散每服三錢匕空心以溫酒調服

近晚再服

治脚氣緩弱腫疼杜仲湯方

杜仲

去麩皮微炙搗

生地黄

汁

右二味先將杜仲末以水二盞煎至一盞去滓入地

黃汁三合酒二合再煎三五沸溫服空腹近晚各一

服

治脚氣久虛脉來沉細潛補曹公鍾乳丸方去率入

鍊成鍾乳粉參石斛去根節 吳茱萸湯浸參偏

菟絲子酒浸參宿搗如泥炒貳兩

右四味除鍾乳粉外搗羅為細末鍊蜜和丸如梧子

大每服三十九食前以人參棗湯下覺氣壅即服踈

氣藥勿令太過

治脚氣久虛緩弱乳煎硫黃散方

黃牛乳升參 硫黃研如粉壹兩

右二味先將牛乳煎令減半每服以乳五合入硫黃

末二錢調和服之服畢宜厚以衣被覆卧取汗勿令

見風午時日晡各再一服得汗不用再服若病未痊

三五日可更服

治脚氣久虛脉沉細緩弱獨活酒方

獨活去蘆 附子炮裂去皮臍各貳兩半

右二味剉如麻豆大盛以絹袋內瓷瓶中以醇酒五

升浸密封三日後旋取從一合飲之加至半盞長令

體中酒氣相接未効再服以差為度

治脚氣風多皮肉癢痹筋骨疼痛足跌不仁手脚緩弱

履地不穩附子湯方

附子壹枚重半兩者炮裂去皮臍

麻黃去根節壹兩半

杏仁湯浸去皮尖雙炒黃肆拾枚

細辛去苗葉參分

芍藥壹分

干膝去苗酒浸焙乾

丹參去根參分

防風又

獨活去蘆頭

五加皮炙令黃各壹兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕用水一器半入生

薑半分拍碎同煎至一盞去滓空心日午晡時衣覆

微令汗出

治腳氣緩弱疼痛腫滿柳白皮湯方

柳白皮參升細剉如碁子大

右一味以水一石煎取六斗取一小甕子可受一石

者內湯甕中以兩木橫甕底脚踏其上湯不得過三
里穴如此三度卽消如浸時使湯常熱佳

治腳氣緩弱疼痛腫滿豉湯方

豉參升

蜀椒壹升生用

生薑和皮剉貳斤

右三味以水一斗五升煮一沸貯在小甕子中著一

小木橫甕下脚踏木上湯不得過三里穴以故衣塞

甕口勿令通氣微著糠火燒甕使湯常熱如甕中大

熱歇令片時浸脚了急將綿衣蓋兩脚令暖勿令觸

冷見風臨臥浸之佳

治脚弱及中風緩弱无活湯方

羌活去毒頭

葛根剉

桂去毒

半夏

湯洗凍福去滑
盡去乾各肆兩

乾薑剉

防風去毒

甘草炙

右七味廩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服空心至日午三服

治脚氣筋攣不能行及乾痛不腫日漸枯痺或腫滿緩

弱蒟藿熏灸方

右取蒟藿三斤和根葉剉長二三寸穿地作一坑面

潤一尺以柴截置於坑中燒令微赤出灰火淨以蒟

藿布坑四傍側布一行正布一行次以故氈蓋坑口

候蒟藿萎更著新者一二斤坑邊鋪薦席坐以杉木

板置於坑地以脚踏板上熏之以綿衣覆脚遣周徧

勿令氣出如射人熱甚開歇片時還內脚於坑中其

四邊或有熱處卽隨熱處著蒟藿布之如病人困卽

止安穩暖卧以綿衣蓋勿令露風飽食以補之三五

日一熏重者不過三五熏卽差

治風毒脚氣緩弱腰脊急痛臂膊痠疼心胸痰壅氣逆

脇滿白茯苓丸方

白茯苓去黑皮

石斛去毒

肉蓯蓉酒浸切焙

酸棗人炒

五味子炒

天雄炮裂去皮

續斷

澤瀉剉

當歸切焙各壹兩半

人參

白茯苓炒

羚羊角鎊

枳殼去瓢炒

五加皮剉

黃耆炙

防風去叉

細辛去苗

獨活去蘆

杜仲去麤皮

甘草剉炙各壹兩

熟乾地黄焙

白槿榔生用

鹿角膠炙令燥

雲母粉別研各貳兩

菟絲子酒浸輒別研參兩

右二十五味先將二十三味搗羅為末入細研雲母粉菟絲子揉拌令勻再羅鍊蜜為丸如梧桐子大每日早晚食前各煎棗湯下二十九

治脚氣皮肉瘡痺筋骨疼痛手脚緩弱行履艱難麻黃獨活湯方

麻黃去根

獨活去蘆

杏仁湯浸去皮尖

兩

丹參

附子炮裂去皮臍

五加皮

細辛去苗

牛膝酒浸切焙

芎藭

桑根白皮

白殭蠶炒各壹兩

右一十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前日再

脚氣痲弱

論曰脚氣痲弱者榮衛俱虛也內經謂榮氣虛則不仁

衛氣虛則不用榮衛俱虛故不仁不用其狀令人痺不知痛弱不能舉本由腎虛而得故蘇氏云脚氣之為病本因腎虛千金曰腎受陰濕即寒痹

治惡風毒脚氣痺弱麻黃湯方

麻黃去根節湯煮掠去沫壹兩

防風去

當歸切

赤茯苓去黑皮各參兩升麻

芍藥

白朮

芍藥

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

桂去皮

甘草炙剉各貳兩

杏仁湯浸去皮尖雙炒黃參拾枚

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞入煎至六分去滓溫服日三夜一

大棗一枚擘破煎至一盞去滓溫服日三夜一

治脚氣痺弱獨活湯方

獨活去蘆頭肆兩

附子炮裂去皮臍壹兩

大豆炒

當歸切

赤茯苓去黑皮各參兩黃耆

乾薑切

人參

甘草炙大益人坐

桂去皮

防風去又各貳兩

芍藥參

右一十二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞酒半盞煎至六分去滓溫服日三夜一

治脚氣痺弱防風湯方

防風去

甘草炙

獨活去蘆頭

茵芋 炙

葛根

厚朴 各貳兩

細辛 去苗葉

蜀椒 去閉口及目炒出汗 防已

桂皮 去麩

芍藥

赤茯苓 去黑皮

麻黃 去根節湯煮掠去沫 石膏 研各壹兩

烏頭 壹枚炮裂去皮臍

黃芩 去黑心參兩

右一十六味判如麻豆每服三錢匕水一大盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服日三夜一

治脚氣痺弱防風麻黃湯方

防風 去

麻黃 去根節湯煮掠去沫 獨活 去蘆頭

秦艽 去苗土各參兩

當歸 切去滓 防已

甘草 炙

人參

黃芩 去黑心

升麻

芍藥 各貳兩

遠志 去蘆白二莖

石膏 碎各壹兩

麝香 研半兩

半夏 湯洗去滑生薑汁製貳兩

右一十五味麝香每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓連三服衣覆取微汗

治脚氣痺弱防已湯方

防已

秦艽 去苗土

葛根 各貳兩

桂 去麩皮壹兩半

陳橘皮 湯浸去白皴

麻黃 去根節湯煮掠去沫各參兩

兩

甘草 炙到壹兩半

杏仁 湯浸去皮尖雙入炒捌拾

枚

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至七分去滓溫服日三次覆出汗

治身體微腫心胸痞滿壯熱小腹重兩脚痺弱小龍甲湯方

湯方

龍甲醋炙去

升麻

黃芩去土

麻黃去根節湯煮

羚羊角銼

前胡去土

桂去粗皮烏梅去核碎

杏仁湯浸去皮尖

半夏黃十兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入薤白三莖

同煎至七分去滓溫服日三夜一實

治腳氣風虛痺弱人參湯方

人參

防風去土

芍藥切

甘草炙

當歸切焙各

赤茯苓去黑皮

肉苁蓉去破皮酒浸

黃耆剉各

陳橘皮湯浸去白

龍骨各壹兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入犬棗

一枚擘破生薑二片同煎至一盞去滓服日三夜一

治風痺脚弱久服湯虛弱而氣未除手足拘攣痺弱小

腹緊急不能食五勞七傷腎氣不足內補石斛散方

石斛

附子炮裂去

獨活去土

天門冬

去心焙

桂 去麩皮各半兩

秦艸 去苗土

烏頭 炮裂去皮臍

人參

天雄 炮裂去皮臍

乾薑 炮

防風 去叉

細辛 去苗葉

杜仲 去羅皮剉炒

莽草 炙各兩

當歸 剉焙

右一十五味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下日三

夜一

治風毒心腹虛服脚氣痺弱不能行步枳實湯方

枳實 去麩炒

草豆蔻

杉木節 剉

大腹 剉

青橘皮 湯浸去白膜各壹兩

右六味麩篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片

煎至一盞去滓食前溫服日三

治脚氣風濕痺不仁不能行倒子酒方

倒子 炮裂去皮臍 金牙 兩

牛膝

丹參

山茱萸

蒟蒻

杜仲 去麩皮

石斛 各參兩

防風 去叉

乾薑 剉

椒 去目及閉口者炒出汗

細辛 去苗

獨活 去蘆頭

秦艸 去土

桂 去粗皮

芎藭

當歸

白朮

茵芋

五加皮

薏苡人 各貳兩

右二十一味剉如麻豆絹袋盛以酒三斗浸七宿初

服一盞漸加盞數不拘時候

治脚氣風痺緩弱無力食粟方

生粟

右一味每旦取三二十顆食之次食豬腎粥佳

治脚氣痺弱頭目眩冒筋急黑豆酒方

黑豆炒

右一味以酒一斗浸密覆瓶口經三宿隨性飲常令

酒力相續

治風痺脚弱或兩脛小行步艱難豉酒方

豉蒸曝乾

右一味內淨甕瓶中以無灰酒五升浸三宿隨性飲之

治脚氣痺弱不能行步牛膝丸方

牛膝酒浸切焙

獨活去蘆

桂去粗皮

丹參

石斛去根

牡丹去心

防風去叉各

萆薢

薏苡人炒

附子炮裂去皮

檳榔細

白蔘去心

麻黃去根節

右一十三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空腹溫酒下三十九日午再服

脚氣痺攣

論曰脚氣痺攣者寒氣多也寒搏於筋脉細而為病則筋急不能轉側行步艱難甚則不可屈伸也

治風濕脚氣客搏筋脉痺攣不仁菴蓉丸方

肉菴蓉

酒浸切焙

牛膝

酒浸切焙

天麻

何首烏

米泔浸皂宿竹刀刮去皮

黃耆

剉

木瓜

去皮作片陸味各拾兩好酒伍升浸候藥泣酒乾取出與後參味同焙

狗脊

去毛剉

續斷

剉

葶藶

剉各貳兩

右九味搗羅為末用木瓜三枚去皮剉作甕子入青鹽一兩在內閉口飯上蒸令爛熟搗成膏入土伴藥

末和為丸如木瓜膏少即入酒糊充如梧桐子大每服三十九鹽湯或酒任下不拘時

治風毒流入脚膝行履艱難向夜筋脉痺攣疼痛海桐皮散方

海桐皮

獨活

去蘆頭

五加皮

防風

去蘆

郁李人

妙去皮別研如膏各壹兩

杜仲

去蘆皮炙

枳殼

去穢炒

薏苡人

炒

牛膝

酒浸切焙

虎脛骨

炙

惡實

炒

熟乾地黄

焙乾各壹兩半

朴消

別研貳兩

右一十三味先將十一味搗羅為散次入郁李人膏

并朴消同研勻每服二錢匕溫酒調下早晚食後夜
卧各一服

治風寒濕氣中脚搏於筋脉痺攣不可屈伸者意苳酒

方

薏苳人炒

白欬

芍藥

酸棗人

乾薑

甘草炙各伍兩

附子炮裂去皮
臍壹兩

右七味並剉如麻豆大以酒五升漬一宿微火煎沸
去滓堯器貯之每服一小盞甚者常使人扶行少飲
酒者可隨性飲之常令有酒氣佳

治脚氣腫滿不仁屈伸痺攣或上攻心腹脹滿可思飲
食續斷丸方

續斷

黃耆剉

杜仲去蘊皮
炙

牛膝酒浸
切焙

續香子炒

羌活去蘊
頭

白附子炮

木瓜乾

白蒺藜炒
去土

棟實去核炒
各貳兩

右一十味搗羅爲末酒煮麩糊爲丸如梧桐子大每
服二十丸煎牛膝酒下空心食前服

治脚氣不能行步痺攣秦苳湯方

秦苳去苗
土

枳殼去穢
炒

白朮剉

丹參

羌活去蘆頭

人參

羌胡去苗

陳橘皮去白

紫蘇葉俱用

薏苡人炒

桑根白皮剉各壹兩半

防風去

石斛去根

大麻人干大相

甘草剉各貳兩

右一十五味 蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓溫服日午晚後服各一

治脚氣榮衛不順筋脉痺攣羌活湯方

羌活去蘆頭

芎藭

人參

赤茯苓去黑皮

藥本去土

惡實剉

甘草剉

牽牛子炒

枳殼剉炒各兩

右九味 麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治脚膝痺去風濕活血脉益元氣石南丸方

石南

白朮

牛膝參味酒同浸壹宿焙乾

防風去

天麻

枸杞各貳兩

黃耆兩貳

桂去蘆皮

鹿茸各壹兩半

右九味 搗羅為末用木瓜一枚去皮剉吹令爛熟搗作膏和藥末更用麩糊少許同為丸如梧桐子大每服三十九至五十九空心溫酒下鹽湯亦得

治脚氣流注歷節疼痛脚膝熱疼皮膚麻痺兩脚痺攣

何首烏散方

何首烏

不計多少切作半寸厚以黑豆不計多少水拌令勻濕就甑內用豆青重何首烏壹

重蒸令豆爛爲度去豆暴乾秤壹斤

仙靈脾

牛膝到各壹斤貳味共酒浸壹宿炮

烏頭去皮臍半斤切入鹽貳兩

半炒黃去鹽

右四味搗羅爲散每服二錢匕温酒調下日三服粥

飲調亦得

治脚氣攣痺或四肢攣腫不可屈伸防已湯方

防已

桂去蟲皮

麻黃去根節湯煮掠去沫焙各

兩參

白茯苓去黑皮肆兩

桑根白皮炒

芍藥各貳兩

甘草炙創壹兩半

右七味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入大棗二枚擊破同煎至七分去滓空心日午晚後各一服服訖

汗出粉之勿見風冷

治脚氣痺攣寒搏筋脉不能轉側大腹湯方

大腹連皮創肆枚

防已

青橘皮湯浸去白焙

紫蘇莖葉

木通創

羌活去蘆頭

草薢

芎藭

地骨皮

五加皮酒浸炙黃各壹兩

木香兩

訶梨勒皮糖伍兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半
分拍破同煎至六分去滓食前溫服日晚再服

脚氣疼痛不仁

論曰脚氣疼痛皮膚不仁者蓋人之氣血得濕則流通
遇寒濕則凝泣今脚氣之疾緣風寒濕毒客於氣血榮
衛虛弱不能宣通故有脚氣疼痛麻痺之候也

治風濕毒氣留滯經絡壅遏榮衛致脚膝腫痛不仁牛

膝丸方

牛膝去苗酒浸壹宿切焙肉苳蓉酒浸壹宿切焙防風去

海桐皮剉

自然銅煨研碎

威靈仙二炒

狗脊去毛

烏頭炮裂去皮

沒藥研壹兩半

乳香研各半兩

骨碎補去毛

地龍去土炒

木鼈子去殼炒

右一廿三味除沒藥乳香外搗羅爲細末再入研者
藥和勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服三十九溫酒

下空心食前服

治脚氣兩脚疼痛麻痺不仁麻黃湯方

麻黃去根節

吳茱萸湯浸焙獨活去蘆頭

秦艸去土

細辛去苗葉

杏仁去皮尖雙入

白朮參

白茯苓去黑皮桂去

人參

乾薑炮防風去

防己

芍藥 甘草炙各

右一十五味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓空心日午近晚溫服

治風毒脚氣屈伸無力癢癩不仁麻黃湯方

麻黃去根

防風去桂去

當歸切

白檳榔切黃芩去

升麻

犀角鎊赤茯苓去黑皮各

右九味廔搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破

煎至一盞去滓空腹溫服

治下經氣弱風濕毒氣與氣血相搏皮膚不仁足痛不

能履地上攻眼目迎風淚出牛膝丸方

牛膝酒浸

山茱萸各防風去

羌活去

烏頭炮裂去皮芎

地龍去土

檳榔剉各

右八味搗羅爲細末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服

二十九鹽湯下空心食前服

治脚氣腫痛行履無力及打撲傷折痛不可忍整痛膏

方

草烏頭去尖皮 乾薑生用

五靈脂生用各

浮麥炒焦

右四味搗羅為細末每用醋一盞入藥三錢七熬成膏紙上攤藥傳疼處又取麥麩醋拌和得所銚子內炒熱帛裏熨疼處如患脚氣先燒熟將藥在脚心貼定熨之引脚中氣消腫止痛

毒衝心防風湯方

防風去叉

大棗梁枚

桂去皮

麻黃去根

當歸切焙各

檳榔為末

犀角鎊

赤茯苓去黑皮

白朮去

右八味除檳榔外剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入檳榔末一錢匕再煎一三沸溫服不拘時候

治脚氣及筋骨疼痛敗龜散方

敗龜醋

芸薹子研

白芥子研

木鼈子去殼

自然銅根 硫黃研

地龍炒各

右七味搗研為散看患處大小每用藥末并白麵各一匙醋調作餅子貼之

治濕毒風脚氣瘴氣四肢痛癢疥癩痛不仁桑根白皮湯
方

桑根白皮剉參防風去土

升麻各半

犀角鎔壹

芍藥半斤橫痃剉

淡竹瀝不拘

白朮半斤

右七味除竹瀝外搗篩每服五錢匕水一盞半煎
至七分入竹瀝半合再煎沸去滓溫服空腹日二服

治風濕脚氣筋骨疼痛皮屑不仁天麻丸方

天麻生用麻黃去根節草烏頭皮去

麝香葉白麵各

右六味搗羅爲細末滴水丸如雞頭大丹砂爲衣每

服一丸茶酒嚼下日三服不拘時

治脚氣痛腫行履不得淋瀝羊桃湯方

羊桃 蒟藿 桑葉

右三味剉碎以水九升煮取四升去滓用淋瀝脚不

拘時以腫消爲度

貼脚氣止疼痛獨勝散方

菜豆粉

右一味銀石器中慢火炒令黑色再研爲細散用井
水調成膏攤絹帛上隨痛處貼之仍服後趁痛丸

治三十年脚氣發軟疼痛不仁步履艱難越痛丸方

鮫鯉甲

壹兩用蛤粉壹兩同炒黃色去粉

地龍去土炒

惡實

貳兩

小薊根葉

剉壹兩

五靈脂壹兩

乳香

研半兩

沒藥

研半兩

甜瓜子生

皂莢刺

剉

竹艸末

各壹兩

右二十味搗研為末爛研蒜肉為丸如彈子大每服

一丸用熱酒二合磨下食前服

治脚氣入冬即苦脚痺弱或筋骨疼不能屈伸皮膚瘡

痺不仁手脚指節腫滿悶或四肢腫腰脛直浸牛膝丹

參酒方

牛膝

各半斤

丹參

各半斤

薏苡仁

炒去日漸

生乾地黃

各半斤

五加皮

各半斤

白朮

各伍兩

側子

炮裂去皮臍

葶藶

各半斤

赤茯苓

各半斤

防風

各肆兩

獨活

各肆兩

石斛

去根各肆兩

茵芋

用葉

桂

各肆兩

天雄

炮去

人參

各肆兩

芎藭

各肆兩

石南華

各肆兩

細辛

去苗葉

升麻

各貳兩

礞石

煨酒洗

生薑

伍兩

右二十二味剉如小豆大絹袋盛以無灰酒五斗浸

一七日密封勿令通氣日滿空心取半盞一盞溫飲

之日五服不飲酒者頻頻少服以知爲度

治脚氣皮膚不仁發歇不定補藥五加皮丸方

五加皮剉 人參 吳茱萸湯洗

惡實炒 桂皮剉 檳榔剉

赤茯苓 芎藭 相子人

厚朴薑汁 郁李人湯去皮 枳殼去穢

牛膝酒浸切焙 杜仲去皮 羌活各

右一十五味鴉羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每日

空心溫酒下三十九不飲酒者橘皮湯下

治脚氣疼痛不仁浸漉昏盲乍發乍歇食少無力目漸

羸瘦沉香散方

沉香剉 乳香炒 安息香

丁香 沒藥研 青橘皮去白

牛膝去苗酒 當歸切 威靈仙去土

羌活去頭 萊菔子微炒別研如

右一十一味先將十味搗羅爲散次入萊菔子膏拌

再羅令勻每日空心午時夜卧各用溫酒調下一錢

匕至一錢半生薑湯調亦得若要通氣卽用大蒜一

枚生薑半兩菘豆二合以水四升一處煮豆爛取汁

一升每用二合調下一錢匕其菘豆亦須食盡

治風寒濕毒脚氣疼痛皮膚不仁緩弱瘡痹足脛腫滿
心下急大便澀柴胡湯方

柴胡去苗

豬苓去黑皮

紫蘇莖葉各壹兩半

陳橘皮湯浸去白炒令黃

防已

郁李人湯浸去皮尖炒令黃

大麻人各壹兩

桑根白皮炙對貳兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半同煎至八
分空腹去滓服之近晚再服

大德重校聖濟總錄卷第八十一

大德重校聖濟總錄卷第八十二

脚氣門

脚氣上氣

脚氣腫滿

脚氣心腹脹滿

脚氣衝心煩滿

神農本草經

神農本草經

神農本草經

神農本草經

神農本草經

神農本草經

脚氣上氣

論曰風濕毒氣之中人多從下起足先受之故名脚氣
毒氣循經上入於肺則氣道奔迫升降不順故令上氣
喘滿

治脚氣衝上入腹腹急氣上胸膈真氣欲絕手足湯方

半夏貳兩湯洗去滑炒黃桂去麩皮 乾薑炮壹兩

蜀漆壹兩 甘草炙 人參

附子炮裂去皮臍各半兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
溫服空腹日午晚間各一初服消停藥力恐氣上

不得下宜減之

治脚氣上喘心下妨悶不能食茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 桑根白皮炙 白朮各半

陳橘皮湯浸去白 防己各壹兩半 旋覆花分

檳榔剉 大黃炒 杏仁湯浸去皮尖

拾枚

右九味麤搗篩每服三錢匕先別用麻黃一分水一

盞半煎五七沸掠去沫下藥并生薑一分拍破同煎

至六分去滓空腹服日晚再服

治脚氣上喘心下妨悶桂苓湯方

桂去麤皮 澤瀉剉 赤茯苓去黑皮

乾薑炮各

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空腹日午日晚各一

治風濕脚氣樂令黃耆湯方

黃耆炙 桂去麤皮 芍藥各參

細辛去苗 麥門冬去心 赤茯苓去黑皮

當歸切 陳橘皮去白 人參

前胡去蘆 甘草炙 半夏肆兩湯洗

烏頭拾伍枚炮 蜀椒去目及合口者

右一十四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑

三片大棗三枚擘同煎至一盞去滓溫服日三夜一

治脚氣面目腫上氣眠臥不得氣欲絕桑白皮湯方

桑根白皮參兩黃陳橘皮湯浸去白

葶藶子紙上炒令紫
色別搗貳兩

右三味除葶藶別搗外廔搗篩入葶藶末再搗勻每

服三錢匕先用漿五枚擘破水一盞半煎至一盞去

滓入藥末再煎至七分去滓溫服如人行五里以來

再服服後當利一二行腫氣下卽差三五日服一劑

治脚氣脹滿妨悶喘促大麻子湯方

大麻子

檳榔末鹽

生薑汁鹽

右三味先以童子小便一盞研麻子取汁與檳榔末

生薑汁銀器盛重湯上微煎三兩沸空心溫服

治脚氣脹滿大腹湯方

大腹

連皮細剉杏仁湯浸退皮尖燒
碎枚搗末人研碎金柴故

右三味同拌再搗研勻以童子小便一盞藥三錢匕

煎至七分去滓空腹日午各一服

治脚氣肺氣不問冷熱一切氣紫蘇湯方

紫蘇葉

壹兩

白茯苓去黑皮
壹兩

陳橘皮湯浸去白
焙半兩

右三味廔搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

破同煎至七分去滓空腹溫服日晚再服若患人四
體熱者加麥門冬一兩去心焙冷者加厚朴一兩去
麩皮生薑汁炙小便澀少者加桑白皮一兩炙大便
秘者加檳榔人一兩剉霍亂腹脹加甘草一兩炙剉
瘡加黃連人參皆隨病狀以意加減

治脚氣兼上氣痹滿不能食牛膝散方

牛膝細切酒浸焙乾

硝砂研如粉

細辛去苗葉

丹參去蘆

白朮

芎藭人湯浸退皮尖別研各

兩參

右六味除研者外搗羅爲散再入研藥并勻每服兩

錢匕食前以溫酒調服春秋冬三月宜服夏熱不可
服之春秋服消腫利小便兼補益除風虛冷脹少食
治脚氣上氣枳實散方

枳實去粗殼炒貳兩

桂去蘆皮肆兩

赤茯苓去黑皮

白朮各壹兩

右四味搗羅爲散每服一錢匕食前溫酒調服漸增
至二錢匕日午晚臥各一服

治脚氣上衝頭目面浮腫欬喘乏氣促心胸脹兩脇
鞭腰重小便澀腠冷酸膝疼痛無力海蛤丸方

海蛤研如粉

訶梨勒皮焙

茈胡去苗

赤茯苓去黑皮

杏仁湯浸去皮尖

赤芍藥

牽牛子炒令熟各壹兩半

陳橘皮湯浸去白焙

桑根白皮炙 貝母去心

白檳榔剉

大黃炒

郁李人湯浸去皮別

枳殼去瓢麩炒各壹兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空腹煎棗湯下二十九日午再服

治脚氣咳嗽貝母丸方

貝母去心

蛤蚧壹對洗淨 紫苑去苗土

防已剉

桑根白皮炒 人參

赤茯苓去黑皮

款冬花

天門冬去心

葶藶子隔紙炒

大黃炒

白檳榔剉

百部

紫蘇子炒各壹兩

木香

杏仁湯浸去皮尖雙

右一十六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

一十九空腹米飲下日午再服

治脚氣面目浮腫上氣眠臥不得若臥氣即欲絕桑白

皮湯方

桑根白皮炙

陳橘皮湯浸去白 葶藶子隔紙炒

大棗取拾枚

右四味先將前二味剉碎用水六升煮取二升去滓
次下棗又煮取一升去棗內葶藶膏如大棗許再煮
三分減一頓服當利三二行水氣下日一服

治脚氣上氣悶絕者開胃口令人能食薑汁飲方

生薑兩

右一味和皮搗取自然汁早晨取半合以溫湯半合
和服之每如人行十里一服日三

治脚氣上氣擡肩喘衝心痛烏豆湯溲脚方

烏豆二斗

右一味以水五斗煮取二斗五升分在兩故甕中盛

每甕中浸一脚遣人從膝向下淋洗百徧以來久病
者不過再浸即差

燂脚後服加減木香丸方

木香

白芍藥

椒殼去毒炒

檳榔肆枚

桂去毒皮

天黃剉炒

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹酒下十
五丸日午再服漸加至三十九以大便秘利為度

治脚氣上氣喘滿及毒氣衝心煩悶甚胡湯方

此胡去

赤芍藥各壹

旋覆花兩

紫蘇莖葉各壹

桑白皮剉

大腹剉

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分擘
碎同煎至七分去滓下朴消一字更煎一兩沸溫服
治脚氣上氣喘滿嘔逆欬減食草薺湯方

草薺

當歸切

木香

牛膝

酒浸如焙

桂皮

黃連

去須者壹兩

延胡索

芎藭

天雄

炮裂去

檳榔

代赭

桑耳

去毛

石韋

去毛

威靈仙

去土

射干

各壹兩半

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑
五片煎取八分去滓溫服不拘時

治脚氣乘肺上氣喘促杏仁煎方

杏仁

湯浸去皮尖雙入壹兩炒

百合

細擘洗令淨壹分入水貳

研分

甘草

麻黃

不洗白三兩

射干

右五味除百合外細列入在百合汁中煎取一升去
滓貯在淨器中每日不限早晚取一合服之此藥不
得久停惟宜旋合

治脚氣循經上乘于肺令人上氣喘滿旋復花湯方

旋復花

羌活

芎藭

入薑煎至

桑根白皮

青橘皮

附子

炮裂去

桂枝去麩

赤小豆各壹兩

萊菔子炒壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕以水一大盞煎至七分去滓空心溫服

治脚氣腫滿上氣橘皮防已湯方

陳橘皮

湯浸去白

防已

桑根白皮

剉各二兩

吳茱萸

湯洗去

檳榔

剉各壹兩

大腹

并子剉

生薑

剉

甘草

炙剉

右八味麩搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白三莖

切同煎至八分去滓溫服空心食前

治脚氣衝心煩悶上氣喘悶木香檳榔湯方

木香

參

檳榔

半兩

右二味麩搗羅每服三錢匕水一盞入葱白二寸擘

碎煎至七分去滓下紅雪二錢生薑汁半合童子小

便一合再煎一兩沸溫服

治脚氣擡肩喘豌豆湯淋瀝方

豌豆

貳升

右一味用水五斗葱白十莖擘碎椒三分煮取湯二

斗傾入兩瓷甕以脚各安在一甕中浸遣人從膝上

淋洗百遍如無瓷甕瓦甕亦得患極者不過兩次効

脚氣腫滿

論曰脚氣風濕毒氣客搏腎經腎者胃之關也關閉不利則聚水而生病水性就下故令腎氣不化小便不利濕寒之氣下注足脛腫脹不消故謂之脚氣腫滿
治脚氣腫滿茯苓散方

赤茯苓

去黑皮參兩

葶藶

紙上炒半兩

人參

防風

去義

澤瀉

甘草

炙

桂皮

去麩

白朮

狼毒

剉磨炒

蜀椒

去目并開口者炒出汗

乾薑

炮合童子小

赤小豆

壹兩

大戟

兩

肉苁蓉

酒浸切焙

豬苓

去黑皮

安萎

參

右一十六味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日二夜一小便利為度

治久患脚氣心腹煩滿木瓜丸方

木瓜

切陸

人參

兩

桂

去麩皮壹兩半

木香

沉香

各壹兩

厚朴

去麩皮生薑汁炙

陳橘皮

湯浸去白

此胡

去苗各壹兩半

高良薑

吳茱萸

湯浸焙炒各壹兩

赤芍藥

兩

檳榔

剉參兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘時

治脚氣上攻身體腫滿小便赤澀茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 防己

陳橘皮湯浸去白焙 旋復花兩

杏仁湯浸去皮尖雙入炒 麻黃去根節 白朮

紫蘇莖葉各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕先以水煮黑豆取汁一盞半入生薑半分拍碎同煎至八分去滓溫服不拘

時

治脚氣腫滿行步艱難羌活丸方

羌活去塵頭 天麻各壹兩 防風去義

白僵蠶炒 白附子炮 牛黃研各半兩

犀角鎊 羚羊角鎊 丹砂研各參分

雄黃研壹分 天南星水煮半日切作片子焙參分

右一十一味搗研為末鍊蜜丸如皂子大每服兩丸

不計時候薄荷湯嚼下

治脚氣腫滿或上攻心腹脹滿可思飲食續斷丸方

續斷剉 黃耆剉 杜仲去塵皮剉

牛膝酒浸切焙 懷香子炒 羌活去塵頭

白附子炮 木瓜切 蒺藜子炒去角

棟實剉陳粟米炒去未各貳兩

右一十味搗羅爲末用醋煮麩糊丸如梧桐子大每
服二十九煎牛膝酒下日三夜一

治脚氣腫上衝心腹旋復花湯方

旋復花

犀角鎔

陳橘皮湯浸去
白焙

赤茯苓

去黑皮

紫蘇莖葉各
兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片棗

二枚擘破同煎至一盞去滓溫服更與後犀角丸相

間服

犀角丸方

犀角鎔

蒺藜子炒去
角

五味子

牛膝酒浸
切焙

杏仁湯浸去皮
尖雙入炒枳殼去
穢炒

甘草炙

人參

木通剉

車前子

桑根白皮各
兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九溫酒下

治脚氣虛腫氣滿不食橫痃湯方

檳榔

防風去
叉

防己

桂去
粗皮

麻黃去
根節

陳橘皮湯浸去
白

杏仁去皮尖
雙入炒

秦艸去
苗附子炮裂去
皮

葛根剉
兩

甘草炙
兩半

白朮一
兩半生薑

右一十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓不拘時溫服

治脚氣腫滿胸膈否塞吐逆不下食芍藥湯方

赤芍藥

防已

枳殼去氣炒
桂去塵

獨活去塵

防風去塵

桂去塵

葛根剉各壹兩半

半夏湯洗去滑薑汁製壹兩

右八味廔搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片同煎

至六分去滓空心日午近晚溫服

治脚氣腫滿上衝心胸煩悶氣急旋復花湯方

旋復花

犀角鎊各壹兩

前胡去塵

桑根白皮

紫蘇莖葉

杏仁去皮尖

赤茯苓去黑皮各壹兩半

右七味廔搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至六分去滓不拘時候服

治濕毒脚氣腫滿小便少檳榔湯方

檳榔剉取

桑根白皮參

黑豆升

右三味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服日三夜一

治脚氣腰脊膝浮腫茯苓湯方

赤茯苓去塵

乾薑炮

澤瀉各兩

桂去龜皮

右四味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
空心日午近晚溫服

治濕毒脚氣腫滿小便少桑根白皮湯方煎取一盞去

桑根白皮兩壹

檳榔伍枚

黑豆半

生薑洗切焙

水一盞

右四味搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓不拘時溫服

治脚氣附腫桑白皮湯方

桑根白皮貳兩

杏人去皮尖雙 檳榔生參

右三味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓空心日午近晚溫服

治脚氣足脛附腫上氣偏身疼痛風引大豆湯方

大豆壹合半

附子炮裂去皮 枳殼去

澤瀉一

陳橘皮去白各 甘草炙

赤茯苓去黑

防風去叉

右八味除豆外剉如麻豆每以水兩盞先煎豆一合

半至一盞去豆入藥三錢匕再煎至七分去滓食前

溫服日三若腫疼止即去大豆澤瀉更服三兩劑差

治脚氣酸膝腫急腰髀痛痺心煩氣喘茱萸飲方

吳茱萸

醋炒兩

人參

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉

陳橘皮

湯浸去白

大腹

連皮

天黃

剉

細辛

去苗

檳榔

剉

羌活

去蘆

杏仁

湯浸去皮尖

蜀椒

兩

蜀椒

去目并開口者

右一十二味廬搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

五片同煎八分去滓溫服空心食前日再微利為度

治脚氣脾胃俱虛皮膚腫滿黑豆丸方

黑豆

壹合炒

桑根白皮

剉

陳橘皮

去白

剉

大腹

皮剉

木通

剉

陳橘皮

去白

剉

紫蘇莖

細剉

右六味廬搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑一

分擊破煎至七分去滓空心溫服日午近晚各一服

治腎熱四肢腫滿拘急桑白皮湯方

桑根白皮

剉

桑根白皮

剉

桑黃根

剉

剉

右二味以酒二升煮取一升分溫空心二服

腳氣心腹脹滿

論曰風毒之中人也必先中腳久而不差徧及四肢其

氣深入則腹脇脹滿小便不利氣喘息高者其病為重

也

治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆訶梨勒湯

方

訶梨勒炮去核

大腹煨熟和皮用

木香

防已

紫蘇莖葉

乾木瓜子

羌活去蘆

芍藥

沉香燒

杉木節各半

右一十味燒搗篩每服半兩水三盞煎至一盞去滓

通口服不計時日再

治脚氣心腹脹急不思飲食茯苓方

赤茯苓去黑皮

木瓜煨切

桂去盡皮

木香

訶梨勒皮

吳茱萸湯洗焙

陳橘皮湯洗去白

乾薑炮

高良薑各半

人參

枳殼去瓤炒

右一十二味除木瓜外搗羅爲末先將木瓜飯上蒸

熟研如膏次入諸藥末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每

服空心煎人參茯苓湯下三十九兼藥乾濕霍亂泄

瀉轉筋

治久患脚氣心腹脹滿脚膝浮腫木瓜丸方

乾木瓜

檳榔煨剉各

人參壹兩

高良薑

厚朴去麩皮塗桂去麩皮

陳橘皮湯洗去白

沉香鑿

木香

芍藥

茈胡去苗各壹兩半

吳茱萸湯洗焙乾炒黃半兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心酒下二十九日午再服

治久患脚氣腹脹膝腫肉豆蔻丸方

肉豆蔻人

人參

陳橘皮湯洗去白

木香

檳榔剝

赤芍藥

茈胡去苗

枳殼去瓤麩炒厚朴去腐中坐生薑汁炙令煙

盡

桂去膠

高良薑各參分

吳茱萸湯洗焙乾炒黃半兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空心溫酒下二十九日晚再服

治脚氣食即腹脹喘息不利腰連左膝時掣痛小便日

有餘瀝背膊拘闕手心多汗牛膝丸方

牛膝剝酒浸壹宿燉 木香

訶梨勒皮

菟絲子酒浸搗碎各貳兩半

赤茯苓去黑皮

人參

檳榔剝

枳殼去瓤炒各壹兩半

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹

溫酒下一十五丸日午再服漸加至三十丸

治脚氣心腹妨悶兩肋虛脹不思食漸覺心滿氣隔不通
羚羊角九方

羚羊角

鎊

茯神

去木

木香

防風

又生

升麻

各貳兩

赤茯苓

去黑皮

大麻人

別搗如膏各參兩

獨活

去蘆頭貳兩半

大腹

棗枚連

旋復花

壹兩

右一十味除大麻人外搗羅為末合和勻鍊蜜為丸

如梧桐子大每日空腹酒下四十九日一服如腹內

先冷加附子炮裂去皮大腸秘澀加大黃剉炒兼

氣加檳榔人剉貳兩心胸間熱加麥門冬法心筋急掣

痛加牛膝切焙貳兩半皮膚風痒心下妨悶加枳殼去黃

壹兩藏氣羸弱加黃耆剉炒

治脚氣攻心腹脹滿嘔吐不下食前胡飲方

前胡

去蘆頭

生薑

切

羚羊角

鎊

半夏

湯洗

大黃

剉

赤茯苓

去黑皮各半兩

枳殼

去瓤炒參分

右七味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓下朴消一錢匕攪勻空腹溫服

治脚氣風毒與藏氣相擊心腹急脹紫葛飲方

紫葛

炒

大戟

炒

黑牽牛

尾上炒半生半熟

大黃剉炒各壹兩

木香壹兩

乳香少許別研

檳榔煨各兩

右七味除乳香外麤搗篩拌勻每服三錢匕童子小
便消各半盞葱白三寸蜀椒二十粒煎至六分去滓
臨卧溫服量虛實用至來日早取下亦汁効第一服
病減五分次日第二服必安

治脚氣攻注心腹脹鞭小便赤澀大戟丸方

大戟炒

芫花醋炒黑色

苦葶藶炒各半兩

巴豆

去皮心膜出油別研續隨子炒各壹分

右五味搗研爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服卅丸燈

心湯下

治脚氣入腹心腹脹急煩躁腫痛松節湯方

松節剉碎炒黃

桑根白皮剉

紫蘇葉各壹兩

甘草炙剉半兩

檳榔煨剉參分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入燈心二十莖
生薑三片童子小便三分同煎至七分去滓食前溫

服日二

治脚氣上氣入腹不能食兼主冷氣牛膝散方

牛膝

去苗焙乾別搗細辛去苗葉

礞石研碎以水燉

去石重煎令水盡取礞石霜用各壹兩

右三味搗研爲散拌和令勻每服三錢匕食前以溫酒調下日一服

脚氣衝心

論曰脚氣衝心之狀令人胸膈滿悶上氣喘急甚者嘔吐是也蓋風濕毒氣初從足起縱而不治至於入腹小腹瘡痺不仁毒氣上衝是謂腎水剋心火故名脚氣衝心孫思邈曰凡小覺病候有異卽須大怖畏決意急治之不可樂以腫爲候亦有不腫者正謂此也

治脚氣衝心煩悶氣急坐卧不安半夏湯方
半夏湯洗米編佳去盡皮切焙貳兩 檳榔劉參

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎同煎至七分去滓溫服以微利爲度

治脚氣衝心煩悶腹脹氣急欲死者吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙木瓜切作片暴乾兩 檳榔劉參

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞入竹葉一握

同煎至八分去滓溫服以快利爲度

治脚氣攻心煩悶至甚者旋復花湯方

旋復花十星 赤茯苓去黑皮 犀角屑吹末

藥蘇莖葉劉各在去盡皮 陳橘皮湯浸去白

前胡去蘆頭 白前去

右八味廬掃篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分
拍碎煎二枚擘破香豉半合同煎至八分去滓溫服
如人行二十里再服卽氣下如小便澀者加桑根白
皮二兩胸膈氣滿者加半夏三兩以小便利腹中氣
和脚腫消爲度皮膚猶如隔帛者宜服後犀角麻黃
湯

治脚氣衝心犀角麻黃湯方

犀角屑

參雨

麻黃

去根節別爲末

甘草

炙

赤茯苓

去皮

防己

各二兩

黃芩

去心

石膏

參雨

附子

炮裂去皮

白朮

去

芎藭

防風

去叉各

當歸

切焙

桂

去

細辛

去苗葉

右一十四味除麻黃外剉如麻豆每服以水一盞半
先煎麻黃末一錢匕至一盞掠去沫入生薑一分擘
破并藥三錢匕同煎至七分去滓溫服如人行十里
服蓋復取汗服藥至三四日後得皮膚知痛痒卽止
如不差卽更服脚中未有力者宜服後獨活湯入坐
治脚氣衝心獨活湯方

獨活

犀角屑

石斛

去根各

丹參

參雨

側子

炮裂去

芎藭

去

當歸切焙各
貳兩

芍藥兩

赤茯苓去皮
肆兩

桂去麝皮
兩半

甘草炙

防己去粗皮
兩

防風去文各
貳兩

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓空腹溫服日三服凡喫一兩劑後隔五日一服若覺腹內氣散兩腳有力行動無妨常宜服後香豉酒

治脚氣衝心香豉酒方

豉鹽

右一味以酒三升浸三日隨性多少飲之覺利多即

少服

治脚氣毒氣攻心欲死者吳茱萸檳榔湯方

吳茱萸湯洗焙乾
炒肆分

檳榔剉柴
枚

橘皮湯洗去白
焙壹兩厚朴去粗皮黃
汁炙貳兩木瓜切作片暴
乾壹兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉一握同煎至七分去滓溫服

治脚氣風濕毒氣攻心煩悶手足脉絕木瓜湯方

木瓜禮夜切作
暴乾吳茱萸湯洗焙乾
炒參兩

右二味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服如人行五七里再服

治脚氣若風熱輕但毒氣入胃唯心悶煩熱索水瀉胸
面乾嘔好叫喚氣欲斷絕者犀角湯方

犀角屑

木香

羚羊角屑

人參

竹筴

沉香剉

射干各貳兩

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮各參兩

麝香研旋

雞舌香兩

石膏兩

右一十二味除麝香外麝香半錢匕更煎一沸溫服如
半煎至八分去滓入麝香半錢匕更煎一沸溫服如
人行六七里再服覺眼明心悟是効若嘔逆不下飲
食者加半夏湯洗去滑兩生薑切片橘皮湯浸去白焙兩

治脚氣衝心煩悶茹胡湯方

芫胡去苗壹兩半

旋復花壹兩

赤芍藥壹兩

桑根白皮炙剉貳兩

大腹皮貳枚連皮子

紫蘇莖葉剉壹兩

右六味麝搗篩每服五錢匕水一盞令入生薑半分
切圓煎至八分去滓更入朴消末一錢匕重煎一兩
沸溫服

治脚氣衝心煩悶氣促脚膝痠疼沉香湯方

沉香剉壹兩

赤芍藥貳兩

紫蘇莖葉兩

木通剉半兩

檳榔剉柒兩

吳茱萸湯洗焙乾炒壹分

右六味麝搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切同煎至八分去滓更入紅雪一錢匕重煎一兩沸
溫服

治脚氣衝心煩悶膝痛赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮石膏兩壹 犀角屑兩壹

升麻 麥門冬去心 木香各壹

右六味㕮咀如麻豆每服四錢匕水一盞入竹瀝半

小盞同煎至八分去滓溫服

治脚氣攻心悶絕欲死木香湯方

木香 檳榔剉各壹兩 赤茯苓去黑皮

郁李人研炒 牛膝酒浸切焙 吳茱萸湯洗焙

大黃剉炒 桂去麩皮

右八味礮搗篩七味入郁李人拌勻每服三錢匕先

以水二盞煮桑白皮木通各少許至一盞濾過入藥

煎三五沸去滓溫服重者再服

治脚氣衝心悶極者靈飛散方

乾蠖全者炒 硃砂生用 巴戟天去心

陽起石研細 眞珠搗 木香

附子炮裂去皮 芫花醋炒 青橘皮湯浸去

硫黃研各半兩 阿魏研壹 磁石煨赤淬染

右一十二味搗研爲散每服一錢匕空心熱酒調服

良久以飯壓之至午食前再服其脚氣發時或腫或
欬頭不痛不嗽逆心間妨悶上氣急促有此狀者尤
宜服之不計時候

治脚氣衝心藏府虛憊煩悶木瓜飲方

乾木瓜

紫蘇莖葉

甘草炙

木香

羌活去薑頭
各壹分

大腹壹
枚

右六味細剉分作三服每服用水一盞半煎至八分
去滓溫服

治脚氣上攻心胸痞悶定喘行氣四聖散方

檳榔雞心者半生
半炒共壹兩

木香半
兩

青橘皮

湯洗去白
焙壹兩

桑椹白皮剉炒
分

右四味搗羅爲散每服二錢匕熱酒調下氣實者三
錢匕不計時候

治風毒攻心悶亂狂躁咽燥口乾氣欲絕或秘澀木香
湯方

青木香貳
兩

大黃剉炒
壹兩

生黑豆皮貳
兩

紅雪別研
壹兩

右四味除紅雪外並麤搗篩每用五錢匕水一盞半
煎至八分入紅雪三錢匕去滓不限早晚分溫二服
如人行八九里當下燥糞

治脚氣衝心煩悶氣急坐臥不安午夏湯方

半夏

湯洗去滑切帶壹升 檳榔人枚

石二味咬咀如麻豆大以水七升煮取二升去滓分溫三服每如人行四五里一服

治風毒脚氣攻心忪悶倒仆失音不語困甚者烏豆湯

方

烏豆

壹升淘以水肆升煎取貳升去豆用汁

甜竹葉

壹握

桑根白皮

剉參兩 大腹皮

剉參

右四味先煎豆汁浸藥一宿明旦同藥煎至七合去滓分溫二服如人行四五里再服已死者幹開口灌

之亦愈及灸脚心下七壯男左女右

治脚氣衝心上氣大小便澀小腹急痛麻人湯方

大麻人

強炒

赤小豆

各壹升

右二味以水七升煎取二升半去滓分溫三服隔兩日更一劑

治脚氣攻心煩滿及脚膝浮腫檳榔湯方

白檳榔

壹枚生搗取

生薑汁

少許

右二味以童子小便二合相和煎一沸微溫頓服治脚氣攻心煩滿及脚膝浮腫大腹湯方

大腹皮

剉肆枚

杏仁

湯浸去皮尖雙人拍碎貳拾壹枚

石一味以童子小便一盞半同煮八分去滓分溫二服空心食前

治脚氣攻心悶亂朴消湯方

朴消研

芫胡去苗

芍藥

旋復花各半

桑根白皮剉生薑兩

大腹

檳榔各貳枚紫蘇莖葉兩

右九味除朴消外並細剉分作三貼每貼以水一盞煎至一盞去滓下朴消二錢匕分溫二服空心食前

治脚氣攻心悶絕脚冷頭痛木瓜茱萸湯方

木瓜切片暴乾

吳茱萸湯洗焙乾

乾薑兩

木香兩

桂去粗皮

白檳榔剉拍

右六味廬掃篩每服三錢匕水一盞入生薑二片煮兩枚擘同煎至七分去滓溫服

治脚氣衝心常服補瀉預防發動木香丸方

木香兩

檳榔

大黃剉碎

桂去粗皮

麻子人

薑屑分

訶梨勒煨去核

枳殼去麩

山茱萸

牛膝酒浸

附子炮裂去

萹蒨炒

芎藭

獨活去

羚羊角研

前胡去蘆

牽牛子炒搗碎

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心酒下十五丸至二十九取利爲度

治脚氣衝心浸脚礬石湯方

白礬壹

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

治脚氣衝心胸膈煩滿喘急嘔吐九味木香丸方

木香

訶梨勒皮

桂皮去麩

枳殼

去麩炒

芍藥

芩胡去苗

檳榔

厚朴去蘆皮生薑汁

天黃

剉炒

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九食前酒下

治風毒脚氣上衝臍腹滿悶坐卧不得但不吐者可治

防已丸方

防已

附子去皮

半夏湯洗去滑

斑猫去翅足

防風去

天南星各

麻黃去根節

防風去

天南星各

右七味並生搗羅爲末粟米飯丸如梧桐子大初用生薑湯入童子小便下十九蓋覆取汗服十日後每

日酒下良久以豬腎一隻切二片先用水煮菜豆一
合令爛入腎更畧煮了喫用壓下前丸藥

治脚氣衝心服通利藥後宜服四物湯方

甘草

炙

陳橘皮

湯浸去白
焙各貳兩

蘇白

剉貳
柴莖

赤小豆

揀參
合

右四味剉如麻豆以水五盞煎至二盞半去滓分溫
三服空心早晚食前服盡

大德重校聖濟總錄卷第八十二