



花溪老人虞

搏天民輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳夔則子奇訂

積聚痞塊癥瘕痞腸脾石瘕 二十七

血之所積名曰積取鬱積久而發之義也積有五皆五臟所生陰氣也陰脉沉而伏其症始發有常處其痛不離其部上下有終始左右有定處皆痰飲食積死血所為也

卷五 積聚

剛集

氣之所聚名曰聚取聚散不常之義也聚有六皆六腑所成陽氣也陽脉浮而動其始終無根本痛發無定位上下無留止積與聚屬脾俱係氣病

痞者否也猶易所謂天地不交之否濁氣在上凝結而成也然痞塊有癥瘕痞之不同癥者徵也因物而成質有塊可徵即積聚成塊不能移動者也瘕者假也假物而成形或上下或左或右移易能動者瘕瘕屬肝部俱係血病

痰癰者懸掛偏僻之意也。但痞與痰癰乃胸膈間之候。積與聚爲肚腹之候。俱在上中二焦主病。故多見於男子。癥與瘕獨見臍下。是爲下焦之疾。故常得於婦人。外有腸臍石瘕二証。亦自婦人得之。腸者大腸也。臍者延也。大腸以傳道爲事。乃肺之府。肺主衛氣。氣溫則泄。氣寒則凝。今寒氣客於大腸。故衛氣不榮而結瘕在內。其始發也大如鷄卵。至其成如懷子狀。久久按之則堅。推之則移。氣病而血未病也。故月事未斷。猶以時下是其候也。

卷五 積聚

利集

石瘕生於胞中。寒氣客於子門。夫膀胱爲津液之府。氣化則能出矣。今寒氣客於子門。則氣塞不通。惡血當瀉不瀉。日以益大。狀如懷子。結硬如石。故名石瘕。此氣先病而血亦後病。故月事不來也。

丹溪曰。痞塊者在中。爲痰飲。在右爲食積。在左爲死血。又曰。凡積塊不可常用下藥。徒損真氣。病亦不去。當消導使之銓化。塊去須大補。大抵脾胃乃聚痞塊。

之根宜以大補脾胃爲主。脾胃之氣一旺則邪氣自消。故素古有養子積自除之說。辟之滿座皆君子。其中有小入自無容地而去。斯言信也。治法痰宜二陳加瓦礫子食積保和丸。死血用破血行血順氣藥。通用大七氣湯。貼藥用三聖膏。琥珀膏。難經所載五積見証及東垣五積丸宜參究。

五積見症

肝之積名曰肥氣。在左脇下如覆盂。有頭足。久不愈。

卷五 積聚

三

利集

令人發欬逆。痰瘧連歲不已。

心之積名曰伏梁。起臍上大如臂。上至心下。久不愈。

令人煩心。

脾之積名曰痞氣。在胃脘右側。覆大如盤。久不愈。令

人四肢不收。發黃疸。飲食不爲肌膚。

肺之積名曰息奔。在右脇下大如覆杯。久不愈。令人

洒淅寒熱喘咳。發肺癰。

腎之積名曰奔豚。在小腹上至心下。若豚狀。或上或

下無時久不愈令人喘逆骨瘦少氣

凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼一

陳湯先須斷厚味爲要

凡婦人腹中有塊多屬死血

凡水香檳榔去氣積神麩麥芽去酒積蚘虫水蛭去

血積蒙石巴豆去食積牽牛甘遂去水積雄黃膩粉

去涎積硃砂水銀去肉積各從其類也

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在胸中微

卷五 積聚

四

利集

出寸口積在喉中在關上積在臍傍出關上積在心

下微在關積在小腸尺微積在氣衝脉出在右積在

右脉出在左積在左脉兩出積在中央各以其部處

之也 脉來小沉而實若脾胃中有積聚不下食食

則吐 肺積脉浮而平按之辟易 心積脉沉而芤

上下無常處 肝積脉弦而細 腎積脉沉而急

脉沉重而中散者因寒食成積 脉左轉而沉重者

氣癥積在胸中 脉右轉出不至寸口者肉有肉癥也

積聚方

肥氣丸

治肝積

黃連

七錢

厚朴

五錢

柴胡

一兩

川椒

四錢

廣朮

三錢

人參

昆布

三錢五分

炙甘草

三錢

皂角

茯苓

錢半

巴霜

乾姜

五分

右除茯苓皂角巴霜另研末外諸藥共研成細

末入前藥和勻蜜丸梧子大初服二九日加一

九二日加二九漸加至大便微澀再又從二九

卷五

積聚

五

利集

加起服之周而復始減至大半即勿服

伏梁丸

治心積

黃連

兩半

厚朴

五錢

黃芩

三錢

桂枝

丹參

茯苓

一錢

乾姜

菖蒲

巴霜

川烏

五分

紅豆蔻

二分

右除巴霜另研餘俱其研為末旋入巴霜和勻

蜜丸梧子大服如上法淡黃連湯下

痞氣丸

治脾積

黃連 八錢 厚朴 四錢 萊萸 二錢 黃芩 二錢 陳

乾姜 砂仁 錢半 人參 茯苓 澤瀉 一錢 川烏

川椒 五分 桂皮 巴霜 四分 白朮 二分

右研末服法俱如前淡甘草湯下

息奔丸 治肺積

黃連 一兩 厚朴 八錢 青皮 五錢 川烏 白豆蔻

桔梗 陳皮 三稜 天冬 人參 二錢 乾姜

白茯苓 川椒 紫苑 錢半 巴霜 五分

卷五 積聚 六 利集

右研末服法亦如前淡姜湯下

以上四方如秋冬月服加厚朴減黃連四分之

奔豚丸 治腎積

黃連 五錢 苦練 三錢 茯苓 澤瀉 菖蒲 二錢

玄胡 錢半 全蝎 附子 獨活 一錢 厚朴 七分

川烏 丁香 巴霜 五分 肉桂 一分

右研末服法亦如前淡鹽湯下

導氣枳殼丸 治氣結不散 心胸痞痛逆氣上攻

枳殼 木通 青皮 陳皮 桑皮 薑子

白丑 黑丑 三稜 莪米 茴香

右等分爲末姜汁麩糊丸梧子大橘皮湯下三

十九

血塊丸 治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附 四兩 桃仁 白朮 一兩 海石 二兩

右末神麩糊丸

卷五 積聚

七 利集

積塊丸 治血積

海石 三稜 莪米 香附 以上醋煮 桃仁 紅花

五靈脂

米糊爲丸白朮湯下

三因散聚湯 治聚氣在六腑隨其上下發作有時

令人心腹痞痛攻刺腰脇小腹脹二便不利

半夏 枳殼 川歸 四分 陳皮 杏仁 桂心

茯苓 一錢 甘草 附子 川芎 五分 枳殼 厚朴

吳萸 錢半 大黃 一錢 大便秘即去之

姜三片煎服

二陳湯 見中風

保和丸 見內傷

大七氣湯

三稜 莪木 青皮 陳皮 藿香 枳梗

肉桂 益智 香附 甘草

姜三片煎服

卷五 積聚

八 痢集

小溫中湯 治食積成痞塊 面色痿黃 肌膚虛腫 飲

食無味

香附 四兩 蒼朮 半夏 二兩 青皮 陳皮 黃連

針砂 一兩 白朮 苦參 五錢

神麴糊為丸

又方

針砂 香附 四兩 山查 神麴 二兩 黃連 兩半

草甘 蒼朮 半夏 一兩 白芍 五錢

一方加人參炒白朮一兩五錢有苦參用白朮用
苦參不用黃連。

三聖膏 貼積塊

用未化石灰半觔為末瓦上炒黃提出候熱稍減
入大黃末一兩炒熱仍提出入桂心末五錢畧炒
以米醋熬成膏厚紙攤患處。

琥珀膏

大黃 朴硝 一兩

卷五 積聚

九 痢集

其為末大蒜搗膏和貼

香積丸 治五積六聚氣塊。

三稜 枳殼 六兩 青皮 陳皮 莪朮 枳實

枳殼 藟子 香附 三兩 黃連 神麩 麥芽

驚甲 牛膝 桃仁 礪砂 砂仁 歸尾

木香 炙甘草 一兩 山查 四兩

右為末醋糊丸白湯下三四十九

大溫中丸 一名大消痞丸 治法同小溫中。

黃連 黃芩 六錢 姜黃 白朮 兩 枳實 五錢

半夏 四錢 人參 陳皮 澤瀉 甘草 砂仁

乾姜 炒麩 二錢 川椒 猪苓 三錢

右為末炊餅為丸

驗方

砂仁 青皮 陳皮 三稜 草果 赤茯苓

半夏 蒼朮 檳榔 神麩

姜三片煎服如大便不潤加葛子水香

勞者傷也。因傷而成勞者也。經云：陰虛生內熱，難經曰：至脈從下上，損脈從上下也。一損損於皮毛，皮聚而毛落；二損損於血脈，血脈衰少，不能榮於五臟六腑；三損損於肌肉，肌肉消瘦，飲食不為，肌膚四損損於筋，筋緩不能自收持；五損損於骨，骨痿不能起於床。然治損之法，損其肺者益其氣，損其心者調其榮，損其脾者調其飲食，適其寒溫，損其肝者緩其中，損其腎者益其精。劉河間曰：心肺損而色微，腎肝損而形痿，但機要所言感寒則損陽，損自上而下，感熱則損陰，損自下而上，獨以寒熱言之，恐未盡虛損之理，而不及難經之諒且博也。大抵勞病根因各自不同，酒傷肺，色傷腎，思慮傷心，勞倦飲食傷脾，忿怒傷肝，此五者皆能致勞也。大約酒色成勞者多耳，或謂六腑豈無成勞者乎？予曰：傷臟者多，六腑間亦有之。

肺勞

卷五

虛損

十一

刊集

肺如華蓋其氣輕清既不受寒亦不受熱然酒性本熱多飲則肺受火邪薰蒸日久以致鬱遏不清脹大不飲或喘或咳漸至音啞骨蒸寒熱皮毛焦乾如之何其可救也

欵冬花

紫苑

百部

五味

沙參

天冬

麥冬

萎蕤

腎勞

人之五火皆賴腎水制之色慾過度則腎水虛虛則

卷五

虛損

十一

利集

熱矣腎脈貫肝膈入肺中循喉嚨系舌本所以腎虛之人先動腎火延入肝膈遂挾相火便入肺中始則咳嗽久則發熱盜汗遺精骨痠肉脫甚至傷脾瀉泄作而危殆矣

熟地

枸杞

五味

肉桂

天冬

麥冬

心勞

心者血之原榮衛發動之所始也心不妄役則真血日生惟勞心焦思日久不置則思慮過度由是心血

日耗肝無所乘。臟腑無所潤。筋脉無所養。榮氣不行。邪熱隨作。經所謂陰虛生內熱者是也。熱甚。剋金。金衰。身瘦。日見銷鑠。而危亡待矣。此症不得志者多有之。

人參 茯神 栝子仁 酸仁 遠志 菖蒲
丹參 龍齒

脾勞

元氣靜則神藏。動則消亡。若勞倦過甚。飲食不節。二

卷五 虛損

三

利集

者皆使脾之元氣受傷。不能舒發。以致飲食不化。泄瀉頻作。血氣不生。肌肉不長。况脾者肺之母。脾氣衰。儼則肺失所資。津液不生日成。枯涸咳嗽。殊甚。而勞斯成。不可救矣。

蓮子 薏苡 山藥 扁豆 白朮 茯苓
人參 石斛

肝勞

大怒則血死於上。令人暴絕。名曰煎厥。故多怒之人。

肝火妄動而所藏之血隨火上逆大吐不止稍久則并臟腑腫中之血盡吐不留所謂相火一動則五火相煽而動火動則血隨之真血去多身成空廓以致金不制木木火凌肺經所謂侮其所不勝者也如是則發熱咳嗽脇痛喘急而勞日劇矣由此觀之勞病同名根因不治者當究其始末明在何經不可模糊泛治也

熟地 川芎 白芍 當歸 黃芩 銀柴胡

阿膠 童便

五勞見症

肺勞者咳嗽喘急衄血嗽血皮膚枯槁鼻塞聲沉時吐痰沫脉微虛而澀數

腎勞者足脛酸疼腰背拘急遺精白濁面色黧黑耳

輪焦枯脉沉細數

心勞者心神驚惕怔忡盜汗自汗心煩熱悶口舌生瘡咯血面赤脉洪而數

卷五 虛損

齒

刊集

肝勞者面色痿黃唇口焦燥飲食無味腹痛腸鳴瀉利四肢倦怠脉虛濡而數

肝勞者面青頰赤多怒虛陽不斂夢與鬼交甚則那縮筋急脉弦而數五勞之脉必帶虛數所以難治

脉經曰脉來軟者為虛緩者為虛微者為虛弱者為虛弦者為中虛脉來細而微者血氣俱

虛脉小者血氣俱少要畧曰脉芤者為血虛

脉沉小遲者脫氣又曰血虛脉大如葱管又曰

脉大而芤者脫氣

治勞要法

勞症有陰虛有陽虛有陰陽兩虛在精察而酌之勿令悞也凡氣皆陽也凡精血皆陰也陽虛者四君子陰虛者四物加知栢陰陽兩虛者合而用之此定理也如陽虛而悞用補陰之劑則吐逆痞悶瀉泄之症生焉其人懶倦陰虛而悞用補陽之劑則盜汗嗽熱憂遺之症成焉其人煩躁今世之醫者凡見人有自

卷五 虛損

五

利集

汗倦怠嗜卧飲食少進皆用補中益氣十全大補固當矣。至於陰虛而倦怠食少瘦弱盜汗亦每用之。甚者明見其吐血發熱咳嗽尤用之不置。是促之亡也。殊不知陰既虛而猶補陽則陽愈亢而陰愈虛。諸病悉加。將何望其有生耶。脾胃弱者知栢勿用。

陰虛久服補陽論

陰虛補陰理也。今悞補陽已非理矣。况久服乎。久服則大助陽邪燥灼真陰。真陰漸亡則陽邪益熾。真元之氣無所附麗乃成飛越。或吐血發熱。或二便燥閉不通。或筋骨悉痛。或精神恍惚。或五臟絕於內。而利不禁。勻水不入。死矣。

論勞病可治症

勞病失血發熱咳嗽。夢遺盜汗。皆陰虛也。而卒有可治者。皆脾胃大盛。飲食多進。致然大哉。坤土乎。萬物賴之以養者。此也。血氣賴之以生者。此也。蓋脾土一旺。則飲食自調。精血漸生。雖有邪熱。藥得以制之。消

之久則邪日退而正日復此病之所以可起也若脾胃一弱則養血生精清肺之藥不無出入加減用之而脾胃日愈壞矣將見元氣下憊雖資腎而腎不生精難養心而心不生血雖清肺而肺不生液蓋元氣一虧不能鼓舞乎諸經而生新陰補舊損也真陰不生則邪火日熾所謂不能壯水之主以制陽光也治何益哉予恒治十數人皆脾胃壯健元陽不虧伐相火之邪滋真水之正隨手輒効咸以是也故以告同

志

論真火動者病不可治

凡病真火動者皆不可治豈獨腎哉人之有腎猶木之有根水之有源制陽光健筋骨生精神其所係亦重矣愚者不知其重而御內太過腎室空虛遂生內熱挾相火而貫肝膈入肺中循喉嚨系舌本此咳嗽吐血潮熱之所由來也若傷損之輕知覺之早調養之專猶可冀其生也若至傷損之甚重失血之頻仍

邪火之日熾此真火之動於腎也不治

肺如華蓋其位高其氣清其體浮形寒飲冷先傷之
至於邪火尅金則傷之重矣故嗜飲之人肺先受熱
胃厝火邪逐日薰蒸或成肺脹則咳嗽喘急或成癰
痿則音啞無聲皮毛乾枯癯瘦骨立此真火之動於
而也不治

肝者將軍之官其性暴其動速無病則藏血有病則
逆血故經云大怒則令人煎厥暴絕使血菀於上蓋

卷五 虛損

六

利集

大怒之人先動其肝肝性猛烈氣即逆上血隨氣逆
大吐不止肝室空虛內火愈熾心雖生血肝不復納
心血雖臨不移時輒去矣此真火之動於肝也不治
心者君主之官神明出焉心火亢極形質焦枯兼相
火薰蒸日隆月熾忽爾大痛唇青甲黑朝發夕死百
無救一此真火之動於心也不治

脾者倉廩之官五味出焉故飲食入胃賴以運化脾
火暴盛血液枯絕胃雖能納脾失轉運泄瀉無度補

則愈甚清則濡甚脉細而數肌瘦骨立此真火之動
於脾也不治

世有真頭痛者火炎水滅也有真腹痛者陽亢陰亡
也皆真火之動也經曰暴病暴死皆屬於火其此之
謂歟然亦有屬寒者急温之猶可活也

勞病方

四君子湯 治氣虛

四物湯 治血虛

八物湯 治氣血俱虛

六君子湯 治氣血挾痰

十全大補湯 治氣血俱虛而挾寒暑者

以上五方並見中風

腎勞方

卷五 虛損

二十

利集

當歸 川芎 熟地 知母 黃柏 五味

天冬 麥冬 杜仲 肉桂 白芍

加竹瀝童便薑汁

心勞方

當歸 川芎 白芍 熟地 扶神 胡連

蓮心 遠志 菖蒲 硃砂

肝勞方

當歸 川芎 白芍 熟地 沙參 麥冬

五味 知母 貝母 桔梗 桑皮 骨皮

款冬 紫苑 兜鈴 百合 百部

加童便竹瀝姜汁

脾勞方

人參 白朮 茯苓 甘草 白芍 蓮肉

以仁 山藥 猪苓 澤瀉 扁豆

肺勞方 治肺勞短氣皮毛枯澁津液不通氣力損

乏脈來遲緩

卷五 虛損

三 利集

人參 黃芪 白朮 桂心 附子 姜棗

右方名黃芪湯合前五勞藥味參酌用之治虛

勞以不傷胃氣為主

二母散 治肺勞有熱不能服補氣之劑者

知胡 貝母

等分爲末白湯下二錢

六味地黃丸 治腎勞要藥凡腎經虛損新久憔悴

盜汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸痿弱下血咯

熟地 八兩 山藥 山萸 四兩 茯苓 丹皮

澤瀉 三兩

右末蜜丸 梧子大白湯下五六十丸 忌蘿蔔

人參固本丸 治肺勞虛熱

人參 一兩 天冬 麥冬 生地 熟地 二兩

右末蜜丸 淡鹽湯下五六十丸 忌蘿蔔

崔氏八味丸 治腎經水火俱虛

卷五 虛損 三 利集

熟地 山藥 山萸 四兩 丹皮 茯苓 澤瀉 一兩

附子 肉桂 五錢

大補陰丸 降陰火補腎水

熟地 龜板 六兩 黃柏 知母 四兩

雄猪脊髓和蜜為丸 淡鹽湯下

補陰丸 一名虎潛丸

黃柏 八兩 龜板 四兩 知母 熟地 三兩 白芍

陳皮 牛膝 二兩 瑣陽 當歸 兩半 虎脛骨 一兩

右末酒煮羊肉丸淡鹽湯下冬月加乾姜五錢

加味虎潛丸

人參 黃芪 白芍 黃栢 川歸 山藥 一兩

鎖陽 枸杞 脛骨 龜板 鬼絲 杜仲

故紙 五味 七錢五分 牛膝 二兩 熟地 四兩

煉蜜和猪脊髓丸梧子大淡鹽湯下五七十九

滋陰大補丸 補陰和陽生血益精潤肌膚強筋骨

熟地 二兩 牛膝 山藥 兩半 杜仲 巴戟 山萸

卷五 虛損 三 利集

肉苁蓉 五味 茯苓 茴香 遠志 一兩

枸杞 石菖蒲 五錢

右水紅棗肉和蜜丸淡鹽湯下非虛寒者少服

與上虎潛丸間服更妙

補腎丸

黃栢 龜板 杜仲 牛膝 陳皮 二兩 乾姜 五錢

冬月加五味子姜汁糊丸空心白湯下

龜鹿二仙膠

鹿角 十觔 龜板 五觔 枸杞 三十人參 十五

如法熬膏初服酒化一錢五分加至三錢空心

服

安神丸

治憂愁思慮傷心驚悸善忘夜不安

黃連

硃砂 一兩

當歸

生地

炙甘草

五錢

右末米糊丸

歸脾湯

治飲食過飽傷脾面黃善卧

人參

黃芪

白朮

茯苓

圓眼肉

棗仁

二錢

卷五

虛損

一兩

利集

遠志

一錢

當歸

木香

炙甘草

五分

人參養榮湯

治失血脈虛

人參

黃芪

陳皮

白芍

當歸

甘草

茯苓

五味

遠志

白朮

桂心

熟地

犀角地黄湯

治勞心動火吐血衄血

生地

生犀角

白芍

丹皮

右水煎服

天王補心丹

見火症

治勞慮傷心

補中益氣湯

見內傷

治勞倦傷脾



眩暈者目花黑暗旋倒也其狀頭眩目閉身轉耳聾如立舟車之上丹溪曰無痰不作眩此証鬱痰居多痰在上火在下火炎上而風痰故作眩暈經曰諸風掉眩皆屬肝木故治眩暈藥中當加制肝藥爲佐使然有氣虛血虛挾痰而眩暈者有傷風傷寒挾痰而眩暈者有痰厥眩暈者有因嘔吐衄瀝崩漏便血並產後失血過多而眩暈者有火動其痰作眩暈者

卷五 眩暈

五

利集

宜各推類治之氣虛四君子人參益氣量加菊花川芎大麻血虛四物加貝母天麻秦艽陳皮甘草傷風寒宜荆芥穗防風薄荷天麻白芷川芎南星白附子半夏痰飲加減白朮半夏天麻湯茶煎散諸失血過多者大補陰血自愈吐血卽眩暈者胸中有死血迷閉心竅而然是宜行血清心自安產後眩暈卽要畧謂新產婦有三症二曰病鬱胃是也初昏倒不知人急燒舊漆器薰鼻竅卽甦隨進十全大補倍參芪血

脫益無陽生陰長之義也火動其痰者二陳如薑茶
菴活蒼朮挾氣虛者亦以治痰爲主加補氣降火藥
人肥白而作眩者治宜清痰降火爲先而兼補氣之
劑人瘦黑而作眩者治宜滋陰降火爲要而兼抑肝
之劑此治眩運之大旨也

左手脉數熱多 脉澁而芤有死血 右手脉實有

痰積 脉虛大必是久病 左手人迎脉緩而浮大

者屬風

眩運方

四君子

見中風

治氣虛眩運

人參益氣湯

人參

生甘草

柴胡二分 黃芪

炙甘草五分

升麻

四分

五味

十粒

白芍

七分

四物湯

見中風

治血虛眩運

白朮 半夏 天麻湯

治痰厥眩運

白朮

神麩

一錢

黃柏

茯苓

澤瀉

天麻

卷五 眩運

天

刊集

黃芪

人參

蒼朮

麥冬

半夏

五分

乾姜

三分

十全大補

見中風

治產後眩運

川歸湯

治失血過多眩運

川歸

川芎

各等分

加人參

一方治眩運不可當者用大黃酒炒為末茶清調下
即愈虛弱人不可輕用

頭者身之元首一有痛楚無論標本宜先治之但
絡有三陰三陽之不同見症有血虛氣虛之不
又有風寒有暑熱有痰火痰厥有內傷有傷寒有
頭痛有肩稜骨痛有真頭痛症各不同治之者宜又
推類求之太陽頭痛惡風寒脉浮緊痛在巔頂兩額
角宜川芎羌獨活麻黃藁朮之 少陽頭痛往來
寒熱脉弦痛連耳根宜小柴胡主之 陽明頭痛發

卷一

頭痛

元

刺集

熱自汗脉浮長大痛連目皆頰齒升麻葛根石膏白
芷主之 太陰頭痛有痰體重腹痛脉沉頭重蒼朮
半夏南星主之 少陰頭痛三陰三陽經不流行而
足寒氣逆脉沉細宜麻黃附子細辛主之 厥陰頭
痛吐痰沫厥冷脉浮緩痛引目系吳萸湯主之此六
經頭痛兼挾外邪也 氣虛頭痛耳鳴九竅不利腸
胃之所生也痛在清晨治宜補中益氣倍參芪川芎
藁朮 血虛頭痛者自魚尾上攻頭痛多在日晡治

宜四物倍芎歸加芷辛。氣血兩虛者調中益氣加

川芎蔓荊細辛。痰厥頭痛眩暈白朮半夏天麻湯

風濕熱頭痛清空膏。風寒感冒頭痛防風羌活

藁本白芷。內傷頭痛仁痛乍止補中益氣加川芎

蒼朮山查神麩。傷寒頭痛而不止治見傷寒門

偏頭痛者頭半邊痛是也在左屬風及血虛風用荆

芥薄荷血虛芎歸栢芍在右屬痰與熱痰用蒼朮半

夏熟用酒炒芩連。有眉稜骨痛不可忍者此屬風

卷五 頭痛 利集

熱與痰用遐奇湯。若真頭痛者甚則腦盡痛手足

冷至節此火炎水滅也死不治。凡治頭痛通用茶

煎散茶調散二陳湯治頭痛皆用風藥者以高巖之

上惟風藥可到故也。頭痛須用川芎如不愈各用引

經藥

太陽川芎。陽明白芷。少陽柴胡。

太陰蒼朮。少陰細辛。厥陰吳黃。

巔頂痛宜藁本防風酒炒柴胡升麻。

內經曰寸口脈中短者頭痛也

脈經曰陽弦則頭痛

又曰寸口脈

痛○脈緊頭痛是傷寒

脈緊上寸口者傷風頭痛○

脈訣云頭痛短濇應須死○浮滑風痰皆易除

