

小兒慢驚神方

南京中医院
图书馆藏书



驚風論

驚風有急慢兩症。急驚屬實熱，宜用清涼。慢驚屬虛寒，宜用溫補。之病
若霄壤之相隔，治法若冰炭之相反。諸書多用一藥兼治急慢兩症，謬
妄太甚，貽害無窮，不可不審辨也。

慢 驚

莊在田曰：慢驚之症，緣小兒吐瀉得之爲最多。或久瘧久痢，或痘後瘍後，或因風寒飲食積滯，過用攻伐傷脾，或秉賦本虛，或誤服涼藥，或因急驚而用藥攻降太甚，或失於調理，皆可致此症也。其症神昏氣喘，或大熱不退，眼開驚搐，或乍寒乍熱，或三陽晦暗，或面色淡白青黃，或大小便清白，或口脣雖開裂出血而口中氣冷，或瀉利冷汗，或完穀不化，或四肢冰冷，並至腹中氣响，喉內痰鳴，角弓反張，目光昏暗，此虛症也。亦危症也。俗名天弔風、虛風、慢驚風、慢脾風，皆此症也。若再用寒涼，再行消導，或用膽星抱龍以除痰，或用天麻全蝎以驅風，或用知柏芩連。

以清火或用巴豆大黃以去積殺人如反掌實可畏也若治風而風無可治治驚而驚亦無可治此實因脾氣虛寒孤陽外越元氣無根陰寒至極風之所由動也治宜先用辛熱再加溫補蓋補土所以敵木治本卽所以治標凡小兒一經吐瀉交作卽是最危之症若其屢作不止無論痘後疹後病後不拘何因皆當卽用參朮以救胃氣薑桂杞熟等藥以救腎氣不惟傷食當急救之卽傷寒傷暑亦當急救之蓋其癥雖有寒暑實邪一經吐瀉業已全除脾胃空虛倉廩空乏若不急救恐虛痰上湧命在頃刻矣庸醫見之皆誤指爲熱爲食投以清火去積涼藥立時告變爲之奈何與其失之寒涼斷難生活不若失之溫補猶可救療此語發明吐瀉驚風之理最爲明透後之君子願無忽諸今將慢驚辨症臚列於後

慢驚吐瀉脾胃虛寒也

慢驚身冷陽氣抑遏不出也

(往往致此
服涼藥之後)

慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燦肺也

慢驚面色青黃及白氣血兩虛也

慢驚口鼻中氣冷中寒也

慢驚大小便清白腎與大腸全無火也

慢驚昏睡露睛神氣不足也

慢驚手足抽掣血不行於四肢也

慢驚角弓反張血虛筋急也

慢驚乍熱乍涼陰血虛少陰陽錯亂也

慢驚汗出如洗陽虛而表不固也



慢驚手足瘓癰血不足以養筋也

慢驚顫門下陷虛至極也

慢驚身雖發熱.口脣焦裂出血.却不喜飲冷茶水.進以寒涼愈增危篤.以及所吐之乳.所瀉之物.皆不甚消化.脾胃無火可知.脣之焦黑乃真陰之不足也明矣.大凡因發熱不退.及吐瀉而成者.總屬陰虛陽越.必成慢驚.並非感冒風寒發熱可比.故不宜發散.治宜培元救本.加薑桂以引火歸源.必先用辛熱冲開寒痰.再進溫補.方爲得法.經驗二方列後.

△逐寒蕩驚湯 ▽

此方藥性慍緩.專治小兒氣體本虛.或久病不愈.或痘後疹後.或誤服寒涼水瀉嘔吐.轉爲慢驚.清熱散風.愈治愈危.速宜服此.能開寒痰.寬

慢驚吐瀉脾胃虛寒也

慢驚身冷陽氣抑遏不出也

(往往致此
服涼藥之後)

慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燦肺也

慢驚面色青黃及白氣血兩虛也

慢驚口鼻中氣冷中寒也

慢驚大小便清白腎與大腸全無火也

慢驚昏睡露睛神氣不足也

慢驚手足抽掣血不行於四肢也

慢驚角弓反張血虛筋急也

慢驚乍熱乍涼陰血虛少陰陽錯亂也

慢驚汗出如洗陽虛而表不固也



慢驚手足瘓癰血不足以養筋也

慢驚顛門下陷虛至極也

慢驚身雖發熱口脣焦裂出血却不喜飲冷茶水進以寒涼愈增危篤以及所吐之乳所瀉之物皆不甚消化脾胃無火可知脣之焦黑乃真陰之不足也明矣大凡因發熱不退及吐瀉而成者總屬陰虛陽越必成慢驚並非感冒風寒發熱可比故不宜發散治宜培元救本加薑桂以引火歸源必先用辛熱冲開寒痰再進溫補方爲得法經驗二方列後

△逐寒蕩驚湯 ▽

此方藥性慍緩專治小兒氣體本虛或久病不愈或痘後疹後或誤服寒涼水瀉嘔吐轉爲慢驚清熱散風愈治愈危速宜服此能開寒痰寬



胸膈止嘔吐。蕩驚邪。所謂回元氣於無有之鄉。一二劑後。嘔吐漸止。卽其驗也。認明但係虛寒。卽宜服之。不必疑畏也。

胡椒一錢 炮薑一錢 肉桂一錢 丁香十粒
右四味研爲細末。以灶心土三兩。煮水澄極清。煎藥大半茶盃。頻頻灌之。接服後方定獲寄效。

△加味理中地黃湯▼

此方助氣補血。却病回陽。專治小兒精神已虧。氣血大壞。形狀狼狽瘦弱至極。皆可挽回。如法濃煎。頻頻與服。參天救本之功。有難以盡述者。
熟地五錢 焦朮二錢 黨參二錢 當歸二錢 炙芪二錢
故紙二錢 桑仁炒二錢 杞子二錢 炮薑一錢 黃肉一錢
炙草一錢 肉桂一錢 加生薑三片 紅棗三枚 胡桃二個



南京中医药图书馆版权

打碎爲引。仍用 灶心土二兩。煮水澄清。煎藥取濃汁一茶盃。加附子三分。另行煎湯。攏入藥汁內。量兒大小分數次灌之。如咳嗽不止者。加 櫻粟殼一錢 金櫻子一錢。如大熱不退者。加 泄瀉不止者。加 丁香一錢。只服一劑。卽去附子。止用 丁香七粒。隔二三日再用。附子二三分。蓋因附子太熱。中病者卽宜去之也。如用附子太多。則小便閉塞不出。不用附子。則沉寒肺脰。固結不開。如不用丁香。則水瀉不止。若小兒虛寒至極。附子又不妨用。至一二錢。此所謂神而明之存乎。其人用者審之。此方乃救陰固本之要藥。治小兒慢驚。稱爲神劑。若小兒吐瀉不止已甚。或微見驚搐。胃中尙可受藥。吃乳便利者。並不必服逐寒蕩驚湯。只服此藥一劑。而風定神清矣。如小兒尙未成驚。不過昏睡發熱不退。或時熱。或時止。或日間安靜。夜間

發熱以及午後發熱等症。總屬陰虛。均宜服之。若新病壯實之小兒。眼紅口渴者。乃實火之症。方可暫行清解。但果係實火。必大便閉結。氣壯聲洪。且喜多飲冷茶水。若吐瀉交作。則非實火可知矣。此方補造化陰陽所不足。實回生起死有神功。倘大虛之後。服一劑無效。必須大劑多服爲妙。近來所買之抱龍牛黃等丸。皆清熱化痰之藥。急驚最爲對症。若慢驚之甚者。下噦卽死。如鄉村製藥不及。急取鷄鳴窩要養鷄鳴已數十年者。糞泥下淨土一撮。去糞數寸者
不要有糞。煎水服立愈。屢試如神。