

T 7971/7940(5)

ASIAN LIBRARY
YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

JAN 22 1965

圖像本草蒙筌卷之四

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生 欽邑葉棐 鮑倚 校刊
婿胡一貫 姪晨
潭陽後學劉孔敦 若樸 增補

木部

桂 味甘氣大熱浮也陽中之陽也有小毒採皮宜冬至同餌忌

生葱火勿見用旋咀片餘剝須密紙重裹犯風免辛氣泄

揚種類 各處箇桂正圓無骨形類生交趾桂林牡桂匾

廣薄皮產谷官桂品極高而堪克進貢却出觀賓州名屬廣東

說世人以觀畫多懶書之故只作木桂皮極厚而肉理麓虛

官如寫黃藥作相薑作姜同意亦通乃發從嶺筒桂因皮嫩如筒卷束板桂謂皮老若板坦平柳桂係

至軟枝梢肉桂指至厚脂肉桂枝枝梗小條非身幹麓厚之處桂

木

心近木黃肉。但去外甲錯麤皮。品分既明。欺罔難入。又各主治。亦

須詳知。箇桂筒桂相同。

一說箇筒字近似人。誤書之習以成俗也。

養精神和顏色耐老。

牡桂板桂一類。堅骨節。通血脈。墮胎。四者性並辛溫。難作風寒。正治。柳桂桂枝味淡。能治上焦頭目。兼橫行手臂。調榮血和肌表。止煩出汗。疎邪散風。經云。氣薄則發泄是也。肉桂木桂性熱。堪療下焦寒冷。併秋冬腹疼泄賁。豚利水道。溫筋煖臟。破血通經。經云。氣厚則發熱是也。桂心。美之之義。性略守。治多在中。官桂。貴之之辭。味甚辛。治易解表。如此之異。蓋緣本乎天者親上。本乎地者親下。理之自然。性分所不可移也。然柳桂桂枝。入足太陽之腑。桂心入心。在手少陰之經。本經註云。桂有小毒。亦從類化。與黃芩黃連爲使。小毒何施。與烏頭附子爲使。全得熱性。與人參麥門冬甘草同用。能調中益氣。實衛護榮。與柴胡紫石英乾地黃同用。却主吐逆。

與巴豆礪砂乾漆穿山甲水蛭蝨蟲。如此有毒之類同用。則小毒

化爲大毒矣。春夏禁服。秋冬宜煎。

謹

按諸桂所治不同。無非各因其材而致用也。然本經謂桂止

煩出汗。仲景治傷寒。乃云無汗不得服桂枝。又云汗過多者。桂枝甘草湯。是又用其閉汗。何特反其經義耶。抑一藥而二用耶。噫。此正所謂殊途而合轍也。蓋桂善通血脈。本經言桂止煩出汗者。非桂能開腠理而發出汗也。以之調其榮血。則衛氣自和。邪無容地。遂自汗出而解矣。仲景言汗多用桂枝者。亦非桂枝能閉腠理而止住汗也。以之調和榮衛。則邪從汗出。邪去而汗自止矣。昧者不解出汗止汗之意。凡病傷寒。使用桂枝湯。幸遇太陽傷風自汗者。固獲奇效。儻係太陽傷寒無汗者。而亦用之。爲害豈淺淺乎。猶有謂仲景之治表虛。而一槩用欵虛汗者。此

又大失經旨矣

官桂



桂 牡



桂 箇



栢實

味甘辛。氣平無毒。近道俱有。乾州屬四川獨佳。屋邊者為宜。塚上者切忌。霜後採實。去殼取仁。先以醇酒浸曝乾。次取黃精汁和煮熱。筋連攪盡汁。纔休研細成霜。入劑方効。畏羊菊麩。麩諸石。羊

根菊花神麩白麩一切石

使牡獮瓜子桂皮。聰耳目。卻風寒濕痺。止疼。益氣血

去恍惚。虛損。欬汗。治腎冷腰冷。併膀胱冷。膿宿水。潤腎燥。體燥。及

面顏燥。澁不光。與陽道殺百邪。止驚悸。安五臟。頭風眩痛。亦可煎

調。久服不饑。增壽耐老。○側栢葉苦澁。翠區者採收。務向月令建

方。春採東夏採南。秋冬做此。纔得節候生氣。即止吐衄崩痢。重生髮鬚。眉為

燥濕僊丹。係補陰要藥。若合黃連煎服。小兒蟲痢立痊。白皮燒灰

敷火灼爛瘡。長毛髮亦驗。枝節釀酒。主歷節風痺。療癩疥尤靈。凡

疥瘡癩瘡及牛馬畜產有疥。並燒敷二三次。無不愈。

乾州栢實



密州側栢



身藥皮。以古微子氣寒陰中之陽降也無毒。樹尚蜀產。皮宜夏收。擇肉黃緊厚為優。去外褐。麤纒製。先漬蜜水。日際曝乾。次塗蜜糖。火邊炙燥。惡乾漆治三焦。二製則治上焦。單製則治中焦。不製則治下焦也。乃足少陰本藥。又足太陽引經。加黃耆湯中。使足膝氣力湧出。痿廢即差。和蒼朮散內。即二妙散俾下焦濕熱散行。腫脹易退。佐澤瀉。利小便。赤澁配細辛。擦舌頰紅瘡。一方同青黛研細入水片少許擦之亦効安虛噦虻蟲。瀉隱伏龍火。解消渴。除骨蒸。補腎強陰。洗肝明目。腸風連下血者立効。熱痢先見血者殊効。去臍腹內濕瘡。逐膀胱中結熱。女人帶漏亦可治之。○根名檀桓。如苓結塊。療心腹百病。主長生神僊。不渴不饑。安魂安魄。

謨按內經云。腎苦燥。故腎停濕也。活人解毒湯。用黃蘗黃連黃芩梔子。蓋梔子黃芩入肺。黃連入心。黃蘗入腎。燥濕所歸。各隨

其類而然也。上下內外。並可治之。積熱門中。誠為要藥。至今醫家。氣虛用四君子。血虛用四物。有痰用二陳。有熱用解毒。故常宗述而不易焉。

黃蘗



商州黃蘗



楮實

味甘。氣寒。無毒。迄道雖有。滎陽屬河南獨多。每產廢田。又名穀

實。葉類蒲萄。作瓣。實如彈子。結蓬。初生綠青。漸熟紅赤。待深秋採。摘浸水。以去皮瓢。取中子曝乾。投酒再浸晝夜。務蒸從巳至亥。任

用煎。

按能論

塵可長克皮膚。助腰膝。益氣力。補虛勞。

悅顏。骨車。助骨。明。寒主小兒。熱。食下使生肌。皮煎。利便。浸爛。又可作紙。煮。煮。煮。洗。癩。癢。立。毆。皮。開。白。汁。薦。收。塗。癬。更。敷。蛇。咬。○紙。燒。存。性。調。酒。汁。亦。止。血。暈。血。崩。剪。有。印。紙。燒。吞。中。有。印。信。斷。婦。人。產。如。神。効。

楮實



謨。按楮有二種。名亦不同。葉有瓣曰楮。葉無瓣曰構。一說皮斑者楮。皮白者構。多生。久。廢。穀。田。結。實。味。甘。又。因。名。曰。穀。也。詩云。爰有樹檀。其下維穀。是爾。即今幽州。猶云穀。荊揚交廣。

咸謂之構。每逢秋月。剝取其皮。或織為履。或搗作紙。賣色甚光澤。媒利無涯。所入醫方。惟貴其實。赤者類服。不老不饑。筋力倍增。行及奔馬。並載經註。決無欺人。奈何滋補藥中。用之稀少。惜哉惜哉。

淡竹葉

味甘淡。氣平寒。陰中微陽。無毒。竹類頗多。難指何是。惟嘗笋味。淡者為然。箠竹。雷竹。水竹。味淡兼甜。治病第一。笙竹。籊竹。味皆純淡。採用亦宜。苦竹。紫竹。苦辣而羶。不堪入藥。東坡蘇公云。淡竹者。對苦竹為文。除苦竹之外。皆淡竹也。迹此觀之。足可徵矣。逐

上氣。欬。喘。促。退。虛。熱。煩。燥。不。眠。專。涼。心。經。尤。卻。風。瘧。一種草類如鐵線莖似嫩

稷葉長尺餘亦名淡竹葉俗多根止消渴散毒補虛實通神明輕

採利小水治喉痺等證並神効身益氣皮茹削去青色惟取向裏黃皮主胃熱飢逆殊功療噎膈

區歲中。茹原。丁支川下。編幅。用。崖。漏。處。極。多。取。乾。

煮之亦可。燒取。歷與荆瀝一橫鋸截尺餘。直劈作數塊。

兩磚架起。緊火中烘。瀝從兩頭流出。少加薑汁調服。每歷一盃加生薑自然汁

二郤陰虛發熱。理中風噤牙。小兒天吊驚癇。入口便定。婦人胎產

悶暈。下咽即甦。衍義云。胎前不損子。產後不得虛。止驚悸。郤痰涎

痰在手足四肢。非此不達。痰在皮裏膜外。有此可毆。但世俗反以

大寒。置疑不用。殊不知係火煨出。又佐薑汁。有何寒乎。○竹肉狀

如肉臙。每生苦竹枝上。鷄彈般大。生啖毒多。戟人喉。類來紅。且令

爪甲變黑。須灰汁煮鍊三度。然後依常菜食之。殺三蟲。破老血。別

有功效。人未盡知。○竹葶。惟盛夏間。狀類鹿角色白。係慈竹逢雨

滋潤。每滴汁着地發生。同薑醬煮嘗。痢赤白治驗。○節內黃粉。即

天竺黃。俗云天竺國生非也。旋飛塵沙結成老竹。間或可得。形類黃土。一名

竹膏。治小兒急慢驚抽。療肥人卒暴風中。鎮心明目。解熱毆邪。○

竹筍發氣托痘瘡。更止消渴。利小水。○桃竹筍苦有毒。懶筍不成

是也。用搗成膏。六畜皮肉生蛆。納入盡出。灰汁煮纔可食。不爾亦

戟人喉。○更有僊人杖。味鹹。是筍成竹時立死。色黑如漆。收宜夏

初。惟苦筍竹多生。專主噦氣嘔逆。大人翻胃反食。以水煮嘗。小兒

驚癇夜啼。安身伴睡。痔漏去血。燒末湯吞。○舊篔簹亦載醫方。治

活蝨入腹為病。狀如癥瘕。煮服即除。

淡竹葉



直

無毒

入下直

土不拘。大水申流來。瀝清

別名何？不利。醫易可逢。八鍊餌延年。待自流。易奏捷。

効擇通明成懸。分向背陰陽。向南日月照者為陽脂。向北日月背者為陰脂。陽脂補陽。陰脂補陰。僊經亦云。不見日月者。皆可取服。以人多陰虛。欲其專補陰。爾製鍊有方。依式勿錯。水盛釜內。甑安水傍。白茅藉甑底。兩層黃沙。蓋茅上寸許。松脂任布。桑柴緊炊。湯減少。旋添。脂流盡。方出新笊。箒掠投冷水。沉釜底者勿用。候凝結。復炊如前。週畢三迴。色白如玉。研和群藥。加白茯苓。栢子仁。甘菊。花共劑。亦可單服。為丸酒吞。逐諸風。安五臟。除伏熱。胃脘解。消渴咽。喉輕身通神。延年耐老。熬膏貼瘡。毒長肉。作散治齒痛。殺蟲。實主少氣虛羸。兼毆風痺。花雖輕身益氣。發熱上焦。菩花底收曬乾。研末。羅細。雞清雞彈丸。成豆粒。暑痢止瀉。如神。根白皮。主辟穀不饑。補虛損勞乏。節性溫。燥血中之濕。卻脚痺軟疼。葉味苦溫。能生毛髮。搗爛。敷風濕瘡。效驗。

辟瘟疫氣靈。歷節諸風。漬酒可服。松蘿一名女蘿。詩云。葛藟。玃女。蘿施于松上。陶云。葛是寄生。

當用桑上者。女蘿當用松上者。苦甘無毒。煎濃可作吐湯。湧客痰。截溫瘧。利水道。敲頭風。掃頂上瘡。瘕去。項間瘤。癭虛汗。堪止。嗔怒能消。

松脂



茯苓 味甘淡。氣平。屬金。降也。陽中陰也。無毒。近道俱有。雲貴雲南貴州

獨佳。產深山谷中。在枯松根底。由木被斧斤砍伐。或老遭風霜折摧。枝葉不復上升。津氣旋向下泄。凝結成塊。乃名茯苓。因其本體

日准。文。義小。瓜。猶類龜鼈人形。並尚沉。

重結實

塊

久藏

白無木

蚌

收採須仗陰乾。咀片水煎。

黑皮淨削。研末丸服。赤筋盡淘。

茯苓中有赤筋最損目為丸散久服者研細未入細布袋中以冷水

揉擺如作葛粉狀澄取粉而筋滓在袋中者棄去不用若煎湯則不須爾方益心脾。不損眼目。忌酸物。

惡白欬。仍畏牡蒙。地榆雄黃秦苧龜甲。種赤白。主治略異。經上下

行走自殊。赤茯苓入心脾小腸。屬巳丙丁。瀉利專主。白茯苓入膀

胱腎肺。屬辛壬癸。補益兼能。甘以助陽。淡而利竅。通便不走精氣。

功並車前。利血僅在腰膂。効同白朮。為除濕行水聖藥。乃養神益

智德丹。生津液緩脾。散痰火益肺。和魂鍊魄。開胃厚腸。卻驚癇。安

胎孕。久服耐老。延年不饑。儻汗多陰虛者。誤煎傷元天壽。若小便

素利者。過服助燥損明。暴病有餘相宜。久病不足切禁。凡須細察

可妄投。○茯苓附結本根。因津泄少。謂既不離其本。故此為名。

體比苓略鬆。皮與木須去。所忌畏惡。悉倣於前。專埋心經。善補心

氣。止恍惚驚悸。除恚怒健忘。心木名實。松節載經。偏風致口渴。

治驗

謨

按經註有曰。松木既樵。根尚能生物者。何也。蓋因精英未淪。

沾其土氣。不能不為物爾。正猶馬勃菌。簞五芝。木耳。石耳之類。

多生枯木潤石糞土之上。則可知焉。其上菟絲下有茯苓之說。

甚為輕信者矣。又曰。茯苓為在天之陽。陽當上行。何謂利水而

瀉下也。經云。氣薄者。陽中之陰。所以茯苓利水瀉下。亦不離乎

陽之本體。故入手足太陽經焉。丹溪又曰。茯苓猪苓澤瀉。各有

行水之能。久服損人。八味丸用之。亦不過接引諸藥。歸就腎經

去胞中久積陳垢。以為搬運之功也。

第一卷白朮款後謨按宜參看。

茯苓



琥珀味甘氣平屬金陽也無毒出自松脂所化入土千歲纔成初

如桃膠久漸堅硬西戎多產色淡澈光南郡亦生色深重濁散首

光為奇入藥劑重濁不計手摩熱可拾草芥湯煮軟儼若飴糖遇物即粘如是

方妙今市家多煮鷄彈及青魚枕造成不可不細詳臨入藥研末

用湯調吞利水道通五淋定魂魄安五臟破癥結瘀血殺鬼魅精

邪止血生肌明目摩腎治產後血暈及兒枕疼療延爛金瘡併胃

腕痛○又種鑿者名異產同狀似玄玉而輕質亦松脂化出歷二

千載方得成形安神補益佳生肌破血尤善不堪造器見風即

開小兒帶之謂能辟惡

謨按丹溪云古方用琥珀利小便以燥脾土有功蓋脾能運化

肺得下降故小便可通也若血少而小便不利者用之反致燥

急之患不可不謹別說又云茯苓琥珀皆自松出而所稟各異

茯苓生成俱陰琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水

其効同也

墨味辛無毒擇係松煙注成摩入藥劑主治煙細纔効煙麓不靈

其桐油煙石油煙併粟首灰偽為者俱不可以治病也止血果捷

因黑勝紅故天行熱毒鼻下血數升水摩滴入若產後血暈崩

中卒暴來紅摩醋服之遊心纏眼中摩鷄血速點客忤中臍以摩

也聚頁心而心主心膚心肉

實 叻 寒 一枝捐地自活。人家多植門庭。實生莢

中。十月收採。粒大如豆。色紫而堅。一莢兩粒三粒者為良。若係單

粒五粒者勿用。小銅鎚擊碎。為牛乳浸宵。蒸過纔煎。景天為使。主

五內邪熱。去五痔腫疼。七月二十日取搗絞汁貯銅器內置高處曝

內三易止涎唾。補絕傷。京大明消乳痕。除男子陰瘡濕癢不歇。卻

女人產戶痛癢難當。仍理火瘡。且墮胎孕。酒吞七粒。催產尤良。嫩

房莢收煎代茶。去頭風明目補腦。老莢疎導風熱。亦可取搗煎嘗。

白皮煮酒治風。皮膚不仁服効。陰疝卵腫。卻壯熱驚癇。莖葉功

同。總治瘡毒。熬膏貼癰疽潰爛。汁漱口齒風疳。根作神燭可燒。

仍主喉痺寒熱。枝洗瘡住癢。煨搗齒殺蟲花。味甚苦炒黃。亦涼大

腸去熱理腸風瀉血。及皮膚風止。痔瘻來紅。併赤白痢。胃皖率

痛。殺腹臟蛔虻膠。主諸風化涎任。湯散丸服。卻風痺腹難舉動。

散風毒身如蟲行。噤口急風殊。破腦傷風立効。槐耳係菌。生

所生。堅如桑耳者良。用作細末。服。去婦人陰中瘡痛。治痔瘻。穀

道血流。

槐 實



枳實 味苦酸氣寒。味薄氣平。陰也。陰中微陽。無毒。商州屬河南所生。

似橘極小。擇如鵝眼。色黑味者良。近道亦生一種俗呼臭橘其皮

為綠衣者欺世媒利無益。損剉淨肉瓢。剉片麩炒用。本與枳殼

故凡入藥劑。必求黑色。與也。採。今醫者不以此泥。惟視

皮厚川

九大

宍也壳

性詳而緩治高。高者主氣

治在胸膈實小則性酷而速治下。下者主血。治在心腹故胸中痞。

肺氣結也。有桔梗枳殼湯之煎。心下痞。脾血積也。有白朮枳實湯

之用。白朮補脾枳實去脾經積此高下緩急之分。易老詳定以為

準的也。除脹滿消宿食。削堅積。化稠痰破氣。佐牽牛大黃芒硝。益

氣佐人參乾薑白朮。仲景加承氣湯內。取疏通破結之功。丹溪入

瀉痰藥中。有倒壁衝墻之捷。樹皮治風中身直。久不能屈伸。根皮

主痔瘻來紅。及腸風臌毒。樹莖併皮收採。水脹風痛齊毆。○其大

枳殼亦貴陳年。取翻肚如盆口。唇製剝瓢。剉片麩炒。瀉肺臌寬大

腸。結氣胸中。兩脇虛脹。者急服。發癰肌表。遍身苦癢者。宜加。逐水

飲停留。關節並利。破痰癖積聚。宿食亦推。同甘草瘦胎。即枳殼散和黃

連滅痔。即連殼丸能損至高之氣。不宜接迹服多。虛怯勞傷。尤當全禁。

第七卷青橘皮款後謨按宜參看。

枳實



女貞實

即冬青樹子

味苦甘。氣平無毒。鄉落幽居。多植遮護。能欺霜雪。又

名冬青。黑實遇冬。至採收。衣皮將布袋接淨。酒浸一宿。日曝待乾。

研末為丸。用旱蓮草熬膏合妙。搗碎漬酒。同生地黃投罐煮良。黑

髮黑鬚強筋強。力安五臟補中氣。除百病養精神。多服補血去風。

久服健身不者。樹皮涼而無毒。若漬酒每日飲。亦益肌膚。枝葉煎

可染非。

膏

口

紋細。函反堪為。○蟲白蟻

陳橙木

蟲石

八汁者

樹汁

蠟者有白有黑每食冬青

人謂蟲屎着樹而然非也亦有不變蠟者則結苞枝上初如黍米漸圓大青紫宛若樹之結實土人呼為蠟種來年春深則苞拆而蟲出延樹矣欲廣蓄者候苞將拆時逢秋刮取以水煮溶濾置冷連枝採繫他樹其蟲亦應候而出

器之中或濾冷水內亦可自然凝聚成塊文理瑩澈不忝石膏本

經原脫漏未書丹溪始珍重纔用嘗與戴原禮簡云白蠟者稟氣

收斂堅凝誠為外科要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡

皮同煎入長肉膏神効但未試可服否其合歡皮服之驗矣蠟有二種蜜白蠟人可服餌本經石蜜欵內曾已載詳其蟲曰蠟本經未載後因丹溪此簡有未試可服否一句迺知言此蟲蠟也故採之以

補脫漏百蠟塵取能治療蟲

女貞實



練音實即金鈴子味苦氣寒有小毒蛟龍極畏堤岸多栽在處有之川蜀

獨勝木高丈餘略大葉密如槐稍長花紅紫甚香實青黃類彈待

冬收採向日曝乾取肉堪煎去皮去核一說將核搗碎漿木煮一

伏時漉曬收藏亦堪入藥大抵用核莫用肉用肉莫用核此常理

也主中濕傷寒大熱煩狂理膀胱小腸疝氣吊痛利小便水道殺

三蟲疥瘍根性微寒雌雄兩種雄根赤無子大毒忌煎雌根白子

多微毒宜採擇向東者纔入藥靈略刮外青只留裏白單味煎酒

大能追蟲宜月前忌月後月半前蟲頭向上月半後蟲頭向下先啖雞彈餅引蟲口

開頓飲濃藥湯過晝即利多則成團追下少則逐條推來積聚行

疼痛止亦堪研細末敷作癢蟲瘡○又石茱萸即花落子外科亦

用醫者當知

棟實



味甘。氣溫微寒。無毒。生函谷及巴西河東。類烏豆。但略圓而
匾。外有紋理。六月採收。碎核殼取仁。去皮尖研爛。輔佐良藥。專治
眼科。消上下。炮風腫爛。弦除左右。背熱障努。肉退火止淚。益水生
光。麩子啖之。亦止鼻衄。

蕤核



厚朴

味苦辛。氣大溫。屬土。有火。陰中之陽。可升可降。無毒。樹甚高

大。榛乃別名。陝西川蜀多生。梓州

屬四

出者獨勝。凡資治病。秋盡

採皮擇厚脂。顏色紫瑩佳。去麁皮。薑汁炒。褐用。惡寒水。硝澤

寒水石硝

石澤

使炮熟乾薑。諸豆忌之。食則動氣。土中風寒熱。治霍亂轉筋。

止嘔逆吐酸。禁瀉痢淋露。消痰下氣。與秘實。大黃同用。實滿能泄。

溫中益氣。與陳皮蒼朮同用。濕滿能除。與解利藥同用。則治傷寒

頭疼。與洩痢藥同用。則厚腸胃。大抵味苦氣溫。故用苦則泄。用溫

則補。衍義云。平胃散中。用之最當。既溫脾胃。又走冷氣。再隨證加

減。妙不可勝言。潔古亦曰。治腹痛脹滿。散結之神藥也。儻患者虛

弱。須斟酌少加。對證不真。誤服太過。則反脫人元氣。豈不慎哉。若

氣實人服多。參耆。致成喘悶者。正此泄除不在禁也。孕婦忌用。女

科當

四

五

鼠瘦。益氣明眼睛。

厚朴



謨按丹溪云。厚朴氣藥。溫而能散。故泄胃中實也。平胃散用佐。蒼朮。正乃泄去上焦之濕。不使胃土太過。得復其平。致於和而已。非謂溫補脾胃焉。習以成俗。皆謂之補。哀哉。然治腹脹者。因味辛能提其氣故爾。

桑根白皮 味甘而辛。甘厚辛薄。氣寒。可升可降。陽中陰也。無毒。山

谷出。少。家園植多。山桑質堅。不堪作檐。家桑氣厚。葉可飼蠶。凡入劑中。須覓家者。近冬收採。如式製精。根出土外者。殺人。根向東行

者得氣得生也皮取近木洗淨。留白去青片。用銅刀咀成。惡鉛忌鐵。

稀蜜拌透。文火炒乾。為使續斷桂心。入手太陰肺臟。甘助元氣。補

勞怯虛羸。辛瀉火邪。羅謙甫曰。桑白皮瀉肺是瀉肺中火。非瀉肺氣也。火去則氣得安矣。止喘嗽。

唾血利水。消腫解渴。毆痰。刀刃傷作線縫。熱鷄血塗。即合。皮中白

汗取依四時。春夏取向上者。從升。枝幹皮也秋冬取向下者。因降。根皮也

汁敷金瘡。血止。剝白皮暴之。令汁得入瘡中。良也。敷蛇咬毒。消點唇裂。易差。染褐色

不落。釜中煎如糖赤。老痰宿血。並推葉採。經霜者。煮湯。洗眼去風

淚。殊勝。鹽搗敷。蛇蟲蜈蚣咬毒。蒸搗。晉撲損瘀血滯凝。煎代茶。消

水腫脚浮。下氣令關節利。研作散。湯調止霍亂吐瀉。出汗除風痺

疼。炙和桑衣煎濃。治痢諸傷止血。枝煎常飲。耳目聰明。去手足拘

攣。脚氣兼散。潤皮毛枯槁。風癢且毆。陰慾通便。眼眵退暈。利喘嗽

近氣

聖甚

北管口

開關利竅。安魂鎮神。久服

不餽取

六種

竹葉

錫熬稀膏加蜜攪稠濁退

火毒貯磁瓶夜臥將臨沸湯調下。每服一錢止。解金石燥熱止渴。染髮

髮皓白成烏。一方黑椹一升和科斗子一斤瓶盛封閉懸屋東向

脂如泥拔去白柴灰辛寒淋汁小毒合冬灰為爛藥醫外科著

奇功。觸惡肉死肌滅。疾疵黑痣能結鉛汞。曾益丹家。○桑耳有毒

味甘。古方入劑屢用。一名桑菌。又名桑黃。老樹上多雨即生。軟濕

者作蕈堪啖。採收到碎。醇酒煎嘗。散血如神。止血甚捷。黑者主女

人癥瘕崩漏帶下。及乳腫暴來。黃者治男子癖飲積聚腹疼。併金

瘡初得。若色黃熟陳白。止洩補益元陽。○桑花非指桑椹花為云。

乃樹上白蘚。其狀因與地錢花相類。故假此立名。刀削取之。火炒

入藥。性緩無毒。健脾胃澁腸。寒崩中。禁帶漏。鼻紅吐血愈。腸風下血

安。桑上蠹蟲主心痛。金瘡潰爛亦可生肌。○桑上寄生節間生

出葉厚軟如橘葉。莖肥脆類槐枝。別樹雖有不靈。獨桑氣厚甚妙。

儻求主治。須認精詳。或云碎其實。有汁稠粘者真。又曰折其莖。以

色深黃者是。固當宗此。辨別仍貴纏附桑枝。外科散瘡瘍。追風濕。

卻背強腰痛。篤疾女科安胎孕。下乳汁。止崩中漏血。沉疴建筋骨。

克肌膚。愈金瘡。益血脈。長鬚長髮。堅齒堅牙。寬服通神。輕身明目。

桑根白皮



桑上寄生



謨按木部之中。惟桑寄生最難得其真者。必須近海桑樹。生意

出。纏付桑枝。採得陰乾。

桑木氣厚。假桑之氣以為佳。爾故凡風濕作痛之證。古方每用獨滑寄生湯煎調。百發百中。今人服之。杳無奏其功者。豈非藥不得真之故歟。况古明醫用藥立方。必以主病者為君。所用川獨滑桑寄生。俱能去風勝濕。以為主藥。誠為合宜。奈今賣藥之家。因難得真。往往收採雜木寄生。指為桑寄生。媒利。種雖同類。氣味大殊。且川獨滑亦未辯認分明。每用土當歸假代。兩俱燥性。耗衛敗榮。無益有虧。寧不增劇。近幸芟山吳氏。辯認獨滑。原本羌滑一種。以節密輕虛者為羌。節疎重實者為獨。川續斷與桑寄生。氣味略異。主治頗同。不得寄生。即加續斷。便立名曰羌活續斷湯。使醫者不泥於專名。病家勿誤其假藥。仁恩溥濟。何其淵哉。

樛根白皮

味苦澁。氣寒。有小毒。南北俱各有生。其木最為無用。本多壅腫。難定墨繩。枝乃曲拳。不中規矩。與椿木相類。須辯認分明。無花不實。木身大。其幹端直者為椿。有花而莢。木身小。幹多迺矮者為樛。又曰椿木實而葉香。樛木疎而氣臭。今人不識樛名。故多呼為臭椿樹也。入劑挖東引細根。刮外取白皮。蜜炙。止女人月信過度。久痢帶漏崩中。禁男子夜夢遺精。滑洩腸風痔瘻。宿小水。毆蛔蟲。其莢收採曝乾。大便去血尤効。○椿白皮主疔腫。亦惟白者為良。止血功同。女科任用。

椿樹



十

一棗

一各不

一種皮赤。一種皮白。白者

先花後葉。其樹身皮。麤如粟粒。赤者先葉後花。其樹身皮細。賦而不。麤。葉皆相同。香臭無別。醫之所取。皆在白皮。故入藥無。問椿。但擇皮白者採收。不必以香臭為泥也。

榆皮

味甘。氣平。性滑利。降也。無毒。多生山谷。處處有之。取向裏白皮。旋曬乾入藥。勿令中濕。濕則傷人。通水道。除五淋。壓丹石。利關節。搗和醞醋。凡赤腫。薄敷煎成膏。飴。但寒。勦連服。老人服久多睡。孕婦服即滑胎。新剝搗爛如糊。用粘瓦石甚固。皮。遮敷癩。殺蟲立差。葉。壓石丹。尤靈。生服一兩。頓効。為羹日飲。水腫即消。花。主小兒驚癇。亦利尿管。閉澁。實。生有莢。作醬甚香。因味微辛。肺氣能助。殺諸蟲。消心腹惡氣。併卒心疼。療小兒塗痂。疔頭瘡。及諸癩疥。莢。作羹。少和牛肉。婦人食即止帶崩。

榆皮



秦皮 味苦氣寒沉也。陰也。無毒。產陝西郡州。及廬江川谷。木類。檀

木。根同槐。根葉如是。頭少光。皮多白點。不糙。糙。不。糙。糙。俗因呼為白棗

木。又呼石檀樹。苦樹。咸取像焉。秋末採皮。陰乾待用。漬水。水色侵

碧。書紙。紙面略青。此驗纔真。凡求勿悞。使大戟。惡吳茱。瓠。葵。防。葵。防。葵。

專眼科。去肝中久熱。煎汁澄淨。點洗無時。白膜遮明。視物不見者

旋効。赤腫作痛。流淚無休者。殊功。益男子精衰。止婦人帶下。小兒

發熱。渴。亦可作湯浴身。風寒濕痺。兼。熱。痢後重。且卻經云。以

苦堅。頭。也。久服髮黑。亦使身輕。○

秦皮



海桐皮

味苦。氣平。無毒。出雷州

屬廣東

及近海州郡。似桐皮而堅韌

白黃。收採無時。任煎湯液。主霍亂赤白久痢。除疔蠱疥癬牙蟲漬酒。治風癩殊功。漬水洗赤眼神效。堪作繩索。入水常存。浸不爛也

海桐皮



山梔子

味苦。氣寒。味厚。氣薄。氣浮。味降。陰中陽也。無毒。一名越桃

霜後收採。家園栽者肥大且長

此號伏擬梔子

只供染色之需。五稜六稜

弗計。山谷產者。圓小又薄。堪為入藥之用。七稜九稜方良。折梗及

鬚。研碎纔炒。

止血用須炒黑色。去熱用但燥而已。

留皮除熱於肌表。去皮卻熱於心

胸。

一說去皮瀉肺火。

其所入之經。手太陰一臟。因輕浮象肺。色赤象

火。故治至高之分。而瀉肺中之火也。本不能作吐。仲景用為吐藥

者。為邪氣在上。拒而不納。食令上吐。邪因得出。經曰。在高者。因而

越之。此之謂也。易不能利小便。易老用利小便者。實非利小便。乃

清肺也。肺氣清而化。則小便從此氣化而出。經曰。膀胱為津液之

府。氣化則能出者。此之謂也。本經又謂治大小腸熱。及胃中熱者。

此因辛與庚合。又與丙合。又能泄戊。其先于中州故焉。加生薑橘

皮。台豆。

加厚。

貫。余度。

煩。加茵陳。治濕熱發黃。加

甘草
潤骨
加香豉而建功。蓋煩者氣也。燥者燥者血也。氣主肺。血主腎。故用梔子治肺煩。用香豉治腎燥也。若加生薑絞汁。尤治心腹久疼。上焦客熱善噉。五種黃病。竟解。去赤日作障。止霍亂轉筋。赤白癩瘡。酒皸。皸鼻。五內邪氣。悉能除之。丹溪又曰。解熱鬱。行結氣。其性屈曲下行。大能降火。從小便泄去。人所不知也。

山梔子



枸杞子 味甘苦氣微寒無毒近道田側俱有甘肅州並屬者獨佳

春生嫩苗作茹爽口。秋結赤實。入藥益人。依時採收。曝乾選用。紫熟味甜。粗小膏潤者有力。赤黯味淡。顆大枯燥者無能。今市家多以蜜拌欺人。不可不細認。爾去淨梗蒂。任作散丸。明耳目安神。耐寒暑延壽。添精固髓。健骨強筋。滋陰不致陽衰。與陽常使陽舉。諺云。離家千里。勿服枸杞。亦以其能助陽也。更止消渴。尤補勞傷。葉搗汁注日中。能除風癢。去膜。若作茶。啜喉內。亦解消渴。強陰。諸毒煩悶。善噉。麩毒發熱。立卻。葉上蟲窠子。收曝。可同乾地黃作丸。不厭酒吞。甚益陽事。莖名僊人杖。須識皮膚骨節風能追。熱毒兼消。瘡腫可散。○地骨皮者。性甚寒涼。卽此根名。惟取皮用。經入少陰腎臟。併手少陽三焦。解傳尸有汗。肌熱骨蒸。療在表無寒。風濕周痺。去五內邪熱。利大小二便。強陰強筋。涼血涼骨。

謨安

竹左

心者。无名

人杖。此枸杞苗莖又名僊

人杖何併此三物。而同
立一名。古今方書。奏療或有有用之。但僉其名。而未細註其物者。
當考究精詳。必得證治相合。庶不失於孟浪也。

枸杞子



辛黃 味辛。氣溫無毒。原產漢中川谷。今則處處有之。人家園庭亦
每種植。木高數丈。花開兩番。臘結苞。似着毛小桃。春開。花於未葉
禿樹。比人呼為木筆。南人喚作迎春。花謝纔生葉。綴枝。葉盛復開
花。作朶。有紅紫二種。多香氣。熏人。凡收採入藥。同煎。宜未開。花紫

苞。蓋刷去毛。免射人肺。摘去心。不致人煩。畏惟菖蒲。蒲黃。黃連。石
膏。四藥。惡石脂。使芎藭。止頭腦風疼。面腫。引齒痛。眩暈。除身體寒
熱。鼻塞。有香臭。不聞。生鬚髮。殺蟲。禁清涕。通竅。久服。明目。下氣。輕
身。

辛黃



酸棗 味酸。氣平。無毒。生河東川澤。秋採。實陰乾。因肉味酸。故名酸
棗。凡仗入藥。碎核取仁。粒匾色丹。亦不易得。市家往往以棘實克
賣。不可不細認焉。能治多眠不眠。必分生用炒用。多眠。膽實有熱。
主開胃。下低。詹詹。寒炒作散。採竹葉煎湯送。

丁儻和言 知却可 志益肝補中。歛虛汗。啟煩
止渴。去心腹寒熱。五臟能安。療手足痠疼。筋骨堪健。久服長壽。核
殼燒末水調。刺入肉中。敷効。

酸棗



杜仲 味辛甘。氣平溫。氣味俱薄。降也。陽也。無毒。漢中屬四 產者第
一。脂厚潤者為良。刮淨麁皮。咀成薄片。薑汁潤透。連炒去絲。凡為
丸散煎湯。最惡玄參蛇蛻。補中強志。益腎添精。腰痛不能屈者。神
功。足疼不能踐者。立効。除陰囊濕癢。止小水夢遺。

杜仲



山茱萸 味酸澁。氣平微溫。無毒。多出漢中。遍生山谷。因名蜀棗。生
青熟紅。近霜降。摘取陰乾。惡枯梗。防風。防已。宜蓼實為使。入肝腎
二經。合散為丸。惟取皮肉。溫肝補腎。興陽道。以長陰莖。益髓固精。
煖腰膝。而助水臟。女人可勻經候。老者能節小便。除一切風邪。卻
諸般氣證。通九竅。去三蟲。強力延年。輕身明目。其核勿用。滑精難
收。

護安

氣

不

收其滑。入味。在。用。之。無非

耳耳
無書矣。

精

初詳其力，地通是又盡信書。則不如

山茱萸



合歡

即交枝樹

味甘。氣平。無毒。生產雍洛。並屬河南每植庭除。葉如槐葉。甚密

繁木似梧桐但枝軟。其枝互相交合。風來輒自解開。故因名曰合歡。俗又呼為交枝樹也。採皮及葉。不拘月時。利心志補陰。安五臟。明日令人事事遂欲。時常安樂無憂。皮採煎稠膏。散腫癰。續斷筋。骨。葉搗絞濃汁。浣衣服去黑垢黴。

合歡



接骨木

味甘苦。氣平。有小毒。

本經云無毒誤也

木高一二丈許。輕虛無心。

砍枝插土即生。近京多植。花葉並類陸英水芹。故又名木蒴藿也。專續筋接骨。易起死回生。折傷頻漬酒吞。風癢堪作湯浴。任煮三次。功力一般。產後諸疾亦毆。女科方藥中屢用。葉主瘡。生搗汁飲。

大人七葉小兒三葉

惟得吐寒熱竟除。根皮採收亦堪煎服。痰瘧痰飲吐去。

水腫水脹利消。見効即停切勿終劑。○又種折傷木多產資州山

屬

系

引

厚

八九月內採莖日乾。主

折傷解

產

柳立交。酒入。煮飲。並與前同。

接骨木



木槿

味苦氣平無毒。株幹不高。在處俱有。花淺紅。朝開暮歛。葉淡綠。秋瘁春生。沿栽則籬障可為。入藥須花枝各用。枝主痢後熱渴。令人得眠。絞汁度絲。軟滑易絡。花主瀉痢腸風。澁腸止血。作湯代茗。風癢漸毆。二者川之。並宜炒過。

木槿



伏牛花

味苦甘。氣平。無毒。一名隔虎刺花。惟生蜀益近郡川澤中。纔有。莖深赤刺多。葉青細。似葉葉而不光。花淺黃。如杏花而作穗。三月半後收採。陰乾。主大風遍身碎疼。療濕痺四肢攣急。五痔下血。堪止風眩頭痛。能毆。

伏牛花



南藤

即丁公藤

味辛。氣溫。無毒。出泉州榮州。

並屬福建

生南山山谷。常依楠木

故名南藤。葉如杏葉。略尖。苗似馬鞭。無節。皮色紫褐。收採無時。專

台虱

服非

重要

主風血。浦衰者起陽。性烈

血痢杜白

煎煎

且頭服體風毆逐悉効。○又有荆瀝

多截莖條。磚架火上。炙熏瀝取兩頭流滴。加薑汁傳送。

每瀝一盃加薑汁二

是茶消痰沫如神。治老人中風失音昏危。療小兒發熱驚癇抽搐氣

實能食者宜服。氣虛少食者忌之。故丹溪云。虛痰用竹瀝實療用

荆瀝。二味俱開經絡。行血氣要藥也。

牡荆實



猪苓

味甘苦淡。氣平降也。陽也。無毒。多產衡山。八月收採。作塊類猪糞。故此名猪苓。用須去淨黑皮。經入膀胱與腎。通淋消腫。滿除

味甘苦淡。氣平降也。陽也。無毒。多產衡山。八月收採。作塊類

濕利小便。蓋苦泄滯甘助陽。淡利竅故爾。衍義又云。行水之功居多。大能燥止津液。儻無濕證。勿輕用之。苦久煎嘗損腎昏目。

猪苓



紫葳

即凌霄花

味酸氣微寒。無毒。多生山谷。處處有之。初作蔓藤依木。旋

長歲久延引。直至杪梢。夏開黃赤色花。因以凌霄為譽。稱時採曝

惟畏鹵鹹。取其有守能獨行。故用女科調月信。治血痛要藥。補陰

衰捷方。崩中帶下立安。癥瘕血閉即逐。去產乳餘疾。散酒皸熱風

紫葳末

小生定

血乳

紫葳



南燭枝葉 味苦氣平無毒江左吳越最多江東州郡亦有初生甚矮越四五載僅與菘菜相侔又養漸長歷三十年方成木株而大葉類茶茗圓厚實若茱萸綴多謂本木株而似草類故名南燭草木又名草木之王取汁漬米甚烏炊飯食最甘美南人又曰烏飯樹葉是也治大人一切風疾多採煎湯療小兒快吞銅錢單用燒末悅顏色耐老堅筋骨健行久服身輕不饑多服髮白變黑上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之

謂也

南燭枝葉



烏藥

一名旁其

味辛氣溫氣厚於味陽也無毒此藥甚賤各處俱生雖稱

天台者香白固優不及海南者功力尤大根採旁附

直根不堪用有二種天台

者白而虛軟海南者黑褐堅硬

狀取連珠

如蠟珠連者佳

入足少陰腎經及足陽明胃腑

因多走泄不甚剛強諸冷能除凡氣堪順止翻胃消食積作脹縮

小便逐氣衝致疼辟疫瘴時行解蠱毒卒中攻女人滯凝血氣去

小兒積聚蛔蚘猫犬病生磨水灌効葉採入劑下氣亦靈但力緩

遲須醋浸炙

台州烏藥



茶茗 味甘苦。氣微寒無毒。江淮閩浙俱有。蒙山中頂獨佳。茶譜云

山有五頂。頂上各有茶園。其四頂茶園採摘不廢。惟中頂草木繁密。雲霧遮蔽。鷲獸時出。人跡罕到。春分前後。多構人力。俟雷發。聲併步採摘。三日而止。若獲一兩。以本處水煎飲。即驅宿疾。二兩輕者。欲售其價極貴。其狀與石蘇頗類。似非原摘嫩芽。疑必製造殊異。故爾少取煎飲。氣味果奇。始知前語不誣。無怪顯名而傳遠也。
早採細者曰茶。芽如雀舌。麥顆雖甚細嫩。猶未稱善。又種新芽一皆。有餘。晚採麤者曰茗。茶之粗者多。雜木葉不可不擇。故經云。粗茗已後採。入二經絡。手足厥陰。專清頭目。利小便。善逐痰涎。解煩渴。下氣消宿食。除熱治癭瘡。薑連生薑黃連同煎。止赤白下痢。香油調

末敷。湯火炮煨。眼目疼。嚼貼兩背。暑天瀉少。加醋吞熱服。宜冷服。

忌多則多服。少嚼。久服消脂。令人唐玄景云。釋滯消壅。一日之利。

暫佳。瘠氣侵精。終身之累。斯大損。多益少。觀此足徵。

謹按茶茗所治。本經以清頭目為上。後醫堅執。素問苦以泄之之說。乃云其體下行。如何頭目得清也。殊不知頭目不清。多由熱氣上熏。用苦泄之。則熱降而上清矣。且茶體輕浮。採摘之時。芽孽初萌。正得春生之氣。是以味雖苦而氣則薄。乃陰中之陽。可升可降者也。故云清利頭目。有何悖乎。

蜀椒 味辛。氣溫。大熱。屬火。有金與水浮也。陽中之陽。有毒。產自蜀。

川。八月收採。顆紅者為貴。口閉者殺人。製須炒出汗來。去目去黃。

殼。凡用先擇去目及閉口者。微炒。汗出。則有功力。炒畢。竟投石臼。殼內以杵舂之。搗去附紅黃殼。只取外紅皮。旋春。旋搗。以盡為度。

宜杏仁爲使。畏欬冬雄黃。郤心腹冷疼。及寒濕痺疼。並効殺鬼疰。蠱毒。併蟲魚蛇毒。尤靈。除骨節皮膚死肌。瘡傷寒溫瘧。不汗。上退。兩目翳膜。下毆六腑沉寒。通氣脉。開鬼門。仍調關節。堅齒髮。煖腰。膝。尤縮小便。理風邪。禁欬逆之邪。治噫氣。養中和之氣。消水腫。黃。疸。止腸澼痢。紅多食乏氣。失明。久服黑髮耐老。十月勿食。傷心健。忘椒。目味苦兼辛。行水而治水。蠱定痰喘。切藥。欬盜汗捷方。並宜。炒之。研末調服。葉和艾葱搗爛。少加醎醋拌勻。晉內外腎吊痛殊。功。敷獷狍伏梁。氣極驗。亦堪煮飲。氣甚辛香。○又種秦椒。乃出秦。嶺。氣味俱苦。生溫熱寒。製法與蜀椒相同。穎粒較蜀椒略大。所惡。又有三藥。防葵。雌黃。枯蔓。主遍身惡風。散四肢痿痺。滅癩生髮。悅。色通神。治口齒浮腫。動搖。併喉痺吐逆。調產後腹痛餘疾。及經閉。不通。世相傳此椒可制水銀。凡誤餌成毒者。服卽愈也。○崖椒。施。

州出。上氣喘嗽者須求。○蔓椒。雲中生。賊風變急者宜服。

蜀椒



吳茱萸。味辛苦。氣溫大熱。氣味俱厚。可升。可降。陽中陰也。有小毒。

所產吳地獨妙。故加吳字爲名。重陽採收。依法精製。湯泡苦汁。七。次。烘乾。杵碎。纔煎。畏紫白石英。惡丹參。硝石。用蓼實爲使。入肺脾。腎經。主咽嗑寒。氣噎塞。不通。散胸膈冷。氣窒塞不利。驅脾胃停寒。臍腹成陣絞痛。逐膀胱受濕陰。囊作疝。剝疼。開腠理。解風邪。止嘔。逆。除霍亂。仍順折肝木之性。治吞吐酸水。如神。厥陰頭疼。引經必。

用氣猛不宜多食令人目眩口開若久服之亦損元氣腸虛洩者尤忌沾唇為速下氣故爾根殺寸白三蟲前服即出枝療二便關格啣口立通並宜向在東南取之方獲効驗

吳茱萸



乾漆

味辛鹹氣溫屬金有水與火降也陰中陽也無毒漢蜀多生

欽州屬南直隸

亦產待季夏方取得陰濕纔乾

在厚熱晴日反難乾得陰濕雨天却易乾亦物

之性凡欲買求須驗好反濕者以物蘸起細而不斷斷而急收全

乾者纔佳乾者着日視之如鑿音瑩黑若鐵堅剛

狀類蜂房孔孔相隔者方美濕堪餽器血乾漆入醫方搗作粉

炒以文火畏鷄彈忌油脂又畏蟹黃見則化水

漆瘡塗即愈

資生夏為

使合湯散隨宜追積殺三蟲補中安五臟療男子風寒濕痺時作

癢疼治女人疝癥瘕堅不通經脈續筋骨及填髓腦消瘀血專主

絕陽痞結腰痛可驅血氣心痛能止丹溪云性急而能飛補近用

為去積滯之藥若用之中節積去後補性內行人不知也○生漆

向樹吸之

小竹筒挿樹皮內口含吸之溫酒下

立下長蟲住痛葉合清黏作散華佗

曾載方中利五臟殺蟲黑髭髮益氣擠汁塗癬瘡暈漸收

葉搗斷汁自滴

出也

峽州乾漆



鈎藤 味甘苦。氣微寒。無毒。湖南。北俱有。山上下盡生。葉細枝長。節間有刺。因類鈎鈎。故名鈎藤。三月採收。取皮日曝。專醫稚幼。不理別科。寒熱驚癇。手足痠痿者。急覓胎風客忤。口眼抽搐者。宜求。因莖長中虛。可鑽隙盜酒。小人每取。懸置甕中。口含略吸引之。酒出。洎洎不斷。

鈎藤



檳榔

味辛苦。氣溫。味厚。氣薄。降也。陰中陽也。無毒。嶺南州郡俱各有生。形類鷄心。尖長。性如鐵石。沉重。存坐正穩。中實不虛。破有錦紋。此品方妙。逐水穀。除痰滯。止心痛。殺三蟲。治後重。如神。墜諸氣。

極下。專破滯氣下行。若服過多。又瀉胸中至高氣也。

檳榔



謨按檳榔服之。苦以破滯氣。辛以散邪氣。久服則損真氣。多服

則瀉至高之氣。較諸枳殼青皮。此尤甚也。夫何嶺南煙瘴之地。

平居無病之人。朝夕如常。猛噬云。可辟除山嵐瘴氣之疾。習以

成俗。至今為然。吾儒有仕於彼者。亦隨其俗而噬之。使一身冲

和。胃氣竟常。被其耗折矣。正所謂非徒無益而反害之。因習之

弊。死而無悔者焉。羅謙甫曰。無病服藥。如壁裏安鼠。誠哉是言。

也。嘗聞用藥如用兵。朝廷不得已而行之。以禦寇爾。若無寇可

平。而無故發兵。不惟空費糧餉。抑且害及無辜。戒之戒之。

大腹 味苦辛。氣微溫。降也。無毒。樹與檳榔小殊。同生南海諸國。傳曰。向陰生者曰大腹。向陽生者曰檳榔。檳榔尖長。大腹圓矮。一說檳榔難得真者。今市所貨。並此代之。以薑鹽同煎。入疎氣藥妙。主冷熱諸氣。通大小二腸。止霍亂痰隔醋心。攻心腹大腸擁毒。○裹外粗殼名大腹皮。此樹鳩鳥多棲。糞毒最能為害。先浸醇酒後洗。豆湯下。隔氣亦佳。消浮腫尤捷。

大腹



密蒙花

味甘。氣平。微寒。無毒。產自川蜀。木高二丈餘。葉青冬不凋零。花紫瓣多細碎。十房一朶。故名蜜蒙。採花酒浸一宵。候乾。蜜拌蒸過。再向日曝。專治眼科。去青盲。膚醫止。駸淚赤。澁消赤脉。貫睛肉。掩除疳毒。侵背外遮。

蜜蒙花



櫻櫚子

味苦澁。氣平無毒。木高一丈二丈。多植嶺南江南。葉圓大。如車輪。萃干木杪。皮一匝為一節。重疊裹包。子黑作房。九月收採。陰乾入劑。血證宜求。澁腸禁洩痢腸風。養血治崩中帶下。其皮二

旬一剝。轉復上生。堪作睡薦。雨衣。以克家用。藥求陳者。燒研湯調。止鼻洪吐衄。殊功。塞腸風崩帶。立効。

櫻櫚



五倍子一名文蛤。味苦酸。氣平。屬金與水。無毒。在處生。季秋採。形類拳大。

色兼青黃。內多小蟲。俗又名百蟲倉也。療齒宣疳。及小兒面鼻疳瘡。治風癬。癢。併大人五痔下血。煎湯洗眼目。消赤腫。止疼。研

末。染鬚鬚。變皓白。成黑。專為收歛之劑。又禁瀉痢。腸虛。解消渴。生痰去熱。○百藥煎者。亦此造成。新鮮五倍子十斤。春鳥爛。細磁缸盛。將草蓋。會七晝

夜取出。復搗加桔梗甘草末各二兩。又會一七。仍搗。仍會務。肺脹。過七次。捏成餅。錠。曬乾。任用。如無新鮮。用乾倍子。水漬為之。喘欬不休。噙化數餅。即止。

五倍子



巴豆。味辛氣溫。生溫熟寒。性烈浮也。陽中之陽。氣薄味厚。體重而

降。有大毒。生自巴郡。一名巴椒。反牽牛。惡藜蘆。草忌蘆筍。醬豉。冷水。畏大黃。藜蘆。黃連。得火為良。芫花為使。八月收採。連殼陰乾。有蕩

滌攻擊之能。誠斬關奪門之將。凡資治病。緩急宜分。急攻為通利。水穀之方。去淨皮。心膜。油生用。緩治為消摩。堅積之劑。炒令煙盡。

黃黑熟加。一說炒令黃黑。似為太過。不如去心膜。煮五度。換水各煮一沸。為佳。雖可通腸。亦堪止瀉。

世所不能知也。丹溪云。能去胃中寒積。無寒積者忌之。本經又云。人吞一枝。便欲致死。鼠食三載。重三十斤。物性相耐。有如此夫。

戎州巴豆



蘇方木味甘鹹氣平可升可降陽中之陰無毒多生海外堪用染紅入藥惟取中心煎酒專行積血女科資通月水產後敗血立除外科仗散腫癰跌撲死血節逐同防風散表裏風氣調乳香治口噤風邪。

蘇方木



訶梨勒味苦酸氣溫苦重酸輕性急喜降陰也無毒嶺南俱生廣州獨勝六稜黑色為美火煨去核纔煎消宿食去腹膨且通津液破結氣止久痢兼逐腸風開胃溢腸毆痰住嗽又因其味酸苦有收斂降火之功故能治肺金傷極鬱道脹滿喘急欬嗽無休也。

廣州訶梨勒



皂莢味辛鹹氣溫有小毒所在各處有生懷孟州並屬河南者獨勝惡

麥門一味畏空青二參人參苦參入足厥陰引經宜以栢實為使種因

有二用亦各分理氣疎風長板莢須覓治齒取積猪牙莢當求去

弦去子煨熟俱宜蜜炙酥炙燒灰略異製度憑證活法在人堪作
散熬膏勿為丸煎液搗鼻噴嚏立至敷腫疼痛即除和生礬吐風
痰即稀涎散拌煉蜜為導箭即蜜導箭殺癆蟲精物主風痺死肌利竅通關
破癥墮胎○皂角刺乃載外科聖藥治潰瘍直達潰處成功

猪牙皂莢



楓香脂一名白膠香味辛苦氣平無毒性甚疎通木多蟲穴山谷俱產江
南獨多此烈日灼流白脂為外科敷貼要藥主風瘙癢瘡最捷退
虛浮水氣尤靈搽齒齦止齒痛近世不知誤為松脂明望者甚失

不經意矣樹皮性澁久痢堪毆○大楓子取仁殺蟲瘡疥癬○楓
菌誤食令笑不休惟飲地漿其毒即解

楓香脂



護按楓木連抱大者甚多並結毬而不結子本經以大楓子內
附但載主治餘無一言誠可怪也今詢市家所得咸云海舶貿
來疑必外番楓木別有一種生者不然何獨指此為名而不言
他木耶姑述之以俟識者再教

麒麟竭一名血竭味辛鹹氣平有小毒出自南番諸國麒麟樹脂結成其

樹高長婆娑可愛脂從中滴狀如膠餈又疑塊成形紅赤與血同色故今番賈收採貨實特名曰血竭又名曰麒麟竭也敲斷而有鏡臉光彩似能射人取摩指甲弦間紅透甲者方妙但與紫釧音音相類勿誤認假成真書載叮嚀用須仔細治跌撲傷損療惡毒瘡癰專破積血引膿竟毆邪氣止痛憑作膏貼任調酒吞

廣州麒麟竭



沉香力十味辛氣微溫陽也無毒出南海諸國及交廣崖州木類椿櫟節多擇老者砍仆漬以雨水歲久木得水方結香使皮木朽殘心節獨存

堅黑沉水燔極清烈故名沉香但種猶有精麗凡買須當選擇黃沉結鷓鴣斑者方是角沉似牛角黑者為然二種雖精尚未盡善儻資主治亦可取功若咀韌音軟柔或削自卷此又名黃蠟沉也品極精美得者罕稀應病如神入藥甚捷堪為丸作散忌日曝火烘補相火抑陰助陽養諸氣通天徹地轉筋吐瀉能止噤口痢痛可毆○又浮而不沉水者名棧香此品最麗半浮半沉與水面平者名煎香此品略次煎香中形如鷄骨者名鷄骨香凡入藥劑惟沉而不空者為上若雖沉水而有空心則是鷄骨謂中空而有朽路若鷄骨中血眼而軟嫩也形如馬蹄者名馬蹄香形如牛頭者名牛頭香並與沉香種同亦皆品之麗者難咀入劑惟蕪熏衣

謨按衍義云沉香保和衛氣為上品藥今人多與烏藥摩服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不

可方也

沉香



檀香味辛氣溫陽中微陰無毒產南海崑崙及江淮河朔專入肺
 上臟通行陽明經醋摩敷惡毒止疼水煎升胃氣進食腹痛霍亂
 可卻中惡鬼氣能毆○又紫真檀香主惡毒風毒○降真香焚煙
 直上天召鶴成羣盤旋于上主天行時疫狂熱毆宅舍怪異響聲
 小兒佩之辟惡邪氣

謨按東垣云檀能調氣而清香引芳香之物上行至於極高之
 處若並橙橘之屬佐以薑棗併葛根豆蔻縮砂益智通行陽明

之經在胸膈之上處咽嗑之中同為理氣之劑也

檀香



降真香

安息香 味辛苦氣平無毒惟生海外亦係木脂因香辟邪土人呼

為辟邪樹也七月七日裂其樹皮膠脂如飴隨卽湧出堅凝成塊
 其色黃黑燒煙鬼懼神歡研服邪毆惡逐鬼胎能下蟲毒可消

安息香

蘇合香味甘氣溫無毒來從西域賣自廣東氣極芬香色乃紫赤或云係諸香汁煎合成就一說是獅子屎故飾其名諸論紛紜難指孰是今市賣者多如膏油碎諸惡殺鬼物精邪去三蟲除蟲毒癩瘡仍禁夢魘尤通神明



龍腦香

即冰片

味辛苦氣溫微寒無毒來從海舶出自波斯木直長類杉皮有甲錯枝傍生發葉皆白正圓香即木脂結成狀若梅花細瓣片片潔淨氣甚熏人市家多用芥硝混攪不可不細擇也番嶺

色蒼如砂細碎龍腦輕浮潔白片片相伴細認自別磁罐藏貯燈草務加不致耗燭目熱赤疼調

膏點上即止喉痺腫塞搗末吹入立消疔毒生管中連敷漸歿和眼

藥敷舌脹出口外多摻自收病重者用五錢方愈仍治小兒痘瘡心煩狂燥妄

語取搗細末猪心血丸濃煎紫草茸湯送下茨實大粒竟能發透

更定心神○龍腦油出佛誓國中鑽樹取摩一切風氣○根下清

液又名膏香堪逐風涎可通閑竅

謹按丹溪云龍腦屬火世知其寒而通利然未達其熱而輕浮

飛越局方但喜香而貴細動輒與麝同為桂附之助然人身之

陽易動陰易虧幸思之節齋又云龍腦大辛善走故能散熱通

利結氣醫方目痛喉痺下疳多用之者取辛散也人欲死者吞

之氣散盡也世人誤以為寒不知辛散性甚似乎涼耳諸香皆


屬陽豈有香之至者而反寒乎

廣州龍腦



乳香 味辛苦氣溫陽也無毒亦出波斯國土赤松木脂所成垂滴成珠綴木未落者名珠香滴下如乳鎔榻地面者名榻香珠香圓小光明榻香大塊枯黧珠香効速榻香効遲凡欲用之不可不擇箬盛烘燥燈草同搗若合散丸羅細和入倘煎湯液臨熟加調療諸般惡瘡及風水腫毒定諸經卒痛併心腹急疼亦入敷膏止痛長肉更催生產且理風邪

乳香



丁香 味辛氣溫屬火有金純陽無毒生交趾廣州收春前秋後形有大小名列雌雄雄丁香如釘子長雌丁香似棗核大凡資主治母者用多專入腎胃二經又走太陰肺臟諸香能發凡氣善噉口舌氣積純氣殊功且止噫忒氣逆翻胃嘔霍亂嘔立効兼除心腹冷疼煖腰膝壯陽殺疳蠱堅齒治妳頭綻裂消蟲毒脹膨細末研成猶有兩治婦人陰戶常冷紗囊盛納陰內旋使轉溫老人拔去白鬢薑汁和塗孔中重生即黑丁香皮止齒痛驗根搗敷風腫良

雄丁香



雌丁香



胡桐淚 一名味鹹苦氣大寒無毒出甘肅州以西作鹼鹵地之上樹甚高大皮似白楊津液淪入地中乃與土石相着冬月收採狀如黃礬重實而堅多夾爛木又若硝石得水便消磁罐貯封勿令

融化。口齒門聖藥。瘰癧毒仙丹。毒熱腹滿心煩。水和服之。取吐。牛馬急黃黑汗。水研。嚙之。卽差。火毒。麩毒。並毆。金鐸銀鐸可用。切勿多服。令吐無休。


胡桐淚



阿魏 味辛。氣平熱。無毒。出波斯國中。生阿虞木內。其木長八九尺。皮色青黃。四季花實俱無。葉如鼠耳。斷其枝梗。汁滴如節。又乃堅凝。遂名阿魏。唐本註云。體性極臭。而能止臭。亦為奇物也。色黑者力微。黃散者為上。但今市家多煎蒜白假克。不可不細辨。爾。凡使研作粉。霜熱酒器上。裏過。置地待冷。入藥隨宜。去臭氣。殺諸小蟲。

下惡氣。破癥瘕。積碎瘟。禁瘧。卻鬼。毆邪。蠱毒。能消。傳尸。可滅。

廣州阿魏



盧薈 味苦。氣寒。無毒。波斯國土所出。木滴脂。淚結成狀。類黑飴。俗

呼象膽。味苦故云。誤服巴豆。毒能解除。殺蟲去疳。鎮心明目。治小兒癩

癩。驚搖。療大人瘡。瘻痔疽。癰發頸間。同甘草研勻。敷効。匿生齒縫。以鹽湯漱淨。點差。

廣州薈



沒藥 味苦辛氣平無毒黃黑類安息香出產自波斯國亦木脂液
逐日結凝成塊大小不侔斷碎光瑩可愛搗細入藥製同乳香主
墜墮跌打損傷療癰疽瘡癩潰腐破血立効止痛如神

沒藥



木鼈子

味甘氣溫無毒朗州

屬

所生藤莖甚大黃花綠葉子若

稻葉生青熟紅肉上有刺其核類鼈故此得名消腫突惡瘡除黥
黥粉刺兩勝蚌毒立効雙乳癰赤殊功止腰疼主折損匪專追毒
亦可生肌

謹

按烏頭毗穗亦名木鼈子兩物一名不可不識但此專入外

科而有追毒之効彼則徒載其名全無治病之能非比古人
三物同名而各有用也

木鼈子



蕪荑 味辛氣平無毒產河東河西有種大種小大蕪荑比榆莢大

甚氣臭如訊

音難聞

小蕪荑較榆莢小差


一說此即榆莢也

味辛醞醬堪

用凡資治療取大宜陳但市收藏多以鹽漬殊失氣味入藥無功
故求買必擇氣腥者為良儻修合務經火煨過纔用主五內邪氣
殺寸白三蟲化食除腸風逐冷止心痛散皮膚骨節風濕療痔瘻

疥癬瘡癩

蕪荑



雷丸

味苦鹹氣寒有小毒係竹之苓苗蔓鮮有建平屬南直隸出累累

相連狀如丸因而名此入藥炮用

甘草煎湯浸一宿尤殺毒

赤者殺人

善白者惡

扁蒼葛根使厚朴元荔

荔元花荔實

胃熱可解蟲毒能毆殺三蟲仍殺白

蟲利丈夫不利女子

非利益之利乃疎利也

主癩癩狂走瘰汗出惡風又作

摩積之膏專卻小兒百病久服陰痿尤宜慎之

雷丸



皮黑肉白

杉材

味辛氣微溫屬金有火陽也無毒江南深山多有栽植株類

松大而勁直葉附枝生若刺針凌冬不凋隨時收採煎服主心腹

脹痛及卒暴心痛殊功淋洗療風癩癢瘡併延片漆瘡立効節煮

浸搗脚氣腫痛茵煎吞治心肺卒疼

生老杉木上者

杉材



宜州杉菌



没食子

即無食子

味苦氣溫無毒出自西戎樹極高大葉似桃長綠花瓣

白心紅實結圓類彈丸初青熟漸黃白蟲蝕成孔眼者入藥紋細

無秋米者尤佳漿水浸砂盆硬者石上研盡切忌犯銅鐵濕須火

上焙乾益血生精安神和氣燒黑灰浴陰毒合他藥染髭鬚治瘡
潰肌肉不生主腹冷滑痢不禁

沒食子



柳花 味苦氣寒無毒岸側道傍在處俱植木高丈許秋瘁春榮初
生黃蕊是花漸乾為絮能治濕痺攣急及貼灸瘡多積捍作羶眠
柔軟清涼尤妙葉煎水洗騾馬疥癩瘡立愈及療心腹內血止疼
枝煮湯浴嬰兒寒熱疾即差更治風毒癰癤去癢根理齒痛而漱
出疳涎實主潰癰而逐去膿血柳膠結砂子子汁除渴消木中蟲
屑煎濃風濕疥瘍浴効

柳華



使君子 味甘氣溫無毒交趾多生嶺南亦有新採香潤陳久乾枯
用須慢火微煨去殼便可嚼食或和諸藥憑作散丸去白濁除五
疳殺蛔蟲止瀉痢因郭使君原用以治小兒後人竟名之白使君
子也

使君子



圖像本草蒙筌卷之四終

圖
像
本
草
蒙
筌
卷
之
四
終



