


南北經驗醫方大成

秋

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類 | 函 | 架 | 冊 | 號 | 門 |
| 三 | 二 | 三 | 三 | 〇 | 漢 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 書 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 門 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 類 | 冊 | 架 | 函 | 號 | 內 |
| 三 | 四 | 一 | 〇 | 〇 | 閣 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 文 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 庫 |



| | |
|------|---------|
| 內閣文庫 | |
| 番號 | 漢 12303 |
| 冊數 | 4 (3) |
| 函號 | 301 3 |





新編南北經驗醫方大成

卷之五



收氣不回者亦有噦而心下緊痞眩悸此乃膈間有痰故也當
詳其脉證施以治法大率胃實則噦胃虛則噦年高氣虛及婦
人產後多有此證皆是病深之候非易治也

(三因方)丁香散治咳逆噎汗

丁香 柿蒂 各一錢 甘草 炙 良姜 各一錢

右為末每服二錢用熱湯煎服不拘時

(活人方)橘皮乾姜湯治噦

人參 二兩 通草 桂心 橘皮 乾姜 甘草 各

右咬咀每服四錢水一盞煎六分服

活人方 半夏生薑湯治噦欲死

半夏 洗一兩 一分

生薑 七兩

右水二盞煎八分去滓分作二服

活人方 橘皮竹茹湯治噦逆

橘皮 一斤 竹茹 一斤半 甘草 炙二兩

人參 半兩 粳米 三十个 生薑 半兩

右吹咀水十盞煎至三盞作三服

濟生方 羌活附子散治吐利後胃寒咳逆

附子 炮去 茴香 炒各半兩 羌活 去芦 丁香 各一 乾姜 炮

右為末每服二勺水一盞煎少許煎七分空心熱服活人方

去丁香用木香三因方二香並用

濟生方 橘皮湯治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮 去白 一兩 人參 甘草 炙各半兩

石吹咀每服四勺水一盞竹茹一小塊生薑五片粳米二枚煎

七分溫服不拘時

濟生方 柿蒂湯治胃膈痞滿咳逆下止

柿蒂 丁香 各一兩

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時

宣明方 桂苓白朮散治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞閉結痛

悶推進飲食調和膈府

棟桂 乾生薑 各一 茯苓 去皮 半夏 各一

白朮 陳皮 去白 沃瀉 各半

右為末麩糊丸如小豆大生薑湯下二三十九日三服病在

膈上食後在下食前在中不計時候一法更加黃連半黃蘗

二水丸取効愈也

灸法 治咳逆其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈

夫及乳小者以一指為率正胃左女右与乳相直間

陷中動脈處是穴艾炷如小豆許灸參壯

頭痛

頭曰象天故居人身之上為諸陽之會頭疼之疾非正一端如痛引腦癩陷至泥丸宮者是為真頭痛且發夕死夕發且死并某物之可療今之體氣虛弱者或為風寒之氣所侵邪正相搏伏而不散發為偏正頭疼其脈多浮緊文有胃膈停痰厥而頭痛蓋厥者逆也逆塵而衝於頭也痰厥之脈時伏時見亦固有腎虛而氣厥并新沐之後當風露卧皆能令人頭痛治之當詳其所因風邪則驅散之痰聚則溫利之腎虛則補暖之尋當感胃頭痛發熱又宜隨證治之

(和劑方) 加減三五七散(方見中風門) 治風寒入腦大陽頭痛
(和劑方) 川芎茶調散(方見中風門) 治諸風土攻頭目偏正頭疼
(和劑方) 如聖餅子治凡寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛
防風半兩 南星一兩 洗 天麻半兩 乾姜一兩

川芎 甘草炙 半隻 川烏去皮 兩
右為末滴水口作餅子每服五餅同荊芥細嚼茶酒任下澹
察方加細辛

(三因方) 藿香散治脾虛傷風停聚痰飲上厥頭疼或偏或正并治夾腦諸風
草烏頭炮去 川烏頭湯洗七次去 乳香三皂角 藿香
右為末每服二錢薄苛煎湯食後調服

(三因方) 芎辛湯治氣虛頭疼
生附子 生烏頭各去 天南星 乾姜
細辛 川芎各一兩 甘草炙七錢半
右咬咀每服四錢水一盞姜七片茶芽少許煎服
(三因方) 芎木湯治著濕頭重眩暈痛極
附子生 白朮 川芎 桂心 各一分 甘草
右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗一箇同煎食前服

(濟生方)小芍辛湯治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不定

川芎一兩 細辛洗去土 白朮 甘草炙右半兩

右咬咀每服四勺水一盞姜五片茶芽少許煎服不拘時

(濟生方)菊花散治風熱上攻頭痛不止

石膏 甘菊花去梗 防風去芦 旋覆花去梗

枳殼去穢炒 蔓荊子 甘草炙 川羌活去芦各

右咬咀每服四勺水一盞姜五片煎七分溫服

(濟生方)葱附回治氣虛頭痛

附子一隻炮去皮臍

右為細末葱涎為丸如梧桐子每服五十回空心茶清下

(濟生方)三生回治廢厥頭痛

半夏 白附子 天南生各等分

右為末生薑自然汁浸蒸餅如菜豆大每服四十回食後

姜湯下

(濟生方)下真回治腎厥頭痛不可忍其脈李之則弦按之則堅

生硫黃別研 石膏不 者半 夏湯洗 硝石別研各

右為末研勻用生薑汁煮糊丸如梧桐子每服四十回食前

姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

(百一選方)都梁回治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前

產後傷風頭痛並皆治之

香白芷天塊一白色者洗以 次別用

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯點茶下

(活人方)人參順氣散治頭疼增寒壯熱四肢疼痛

麻黃去節一兩半 乾薑 甘草炙 白朮

人參 桔梗去芦 香白芷各一兩 白姜炮半兩

右為末每服三勺水一盞姜三片葱白二寸同煎連進取汁

(活人方)葛根葱白湯治感風熱頭疼不止

葛根 芍藥 川芎 葱白一把 乾姜各一兩 知母

右吹咀以水三升煎至一升半去滓每服一盞
(和劑方)通關散治感風發熱頭眩鼻塞

撫芎 二兩 川芎 一兩 川烏 一兩半 細辛 半兩
白芷 龍腦薄荷 各一兩半

右為末每服二錢葱白茶清調下薄荷湯亦可

(楊氏家藏方)必勝散治風寒流注陽經以致偏正頭疼久年不愈此藥最有神効

附子 大一隻生去皮臍切為四服以生薑自然汁一大盞
浸一宿火炙乾再於薑汁內蒸再炙再蒸以盡為度
高良姜 与附子 等分

右為末每服二錢臘茶清調下食後連進二服忌熱物少時
(簡易葉氏方)天香散治久年頭風不得愈者

天南星 半隻 陽悅去 川烏 去皮 白芷 各等分
右吹咀每服四錢水一盞煎一半入薑汁半盞煎八分温服

(本事方)治傷風感風一切頭痛

甘菊 各一兩 細辛 半兩 甘草 半兩 白芷 香附子 羌活
薄荷 各二兩 荆芥 二十文 茵陳 五錢 蒼木 泔浸 川芎

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當飯石膏末調下
(本事方)治丈夫婦人風虛氣虛一切頭痛

茵陳 五兩 麻黃 石膏 煨存性 各二兩
右為末每服一錢食後臘茶調下少臥霎時

(本事方)治漏正遠年近日一切頭疼
右用蘿蔔汁一罇殼許令病者仰卧右疼注左鼻左痛注右

鼻兩邊皆痛並注之
(本事方)治偏下頭疼
猪牙皂角 去皮筋 香白芷 白附子 各等分

右為末每服一錢食後臘茶清調下右痛右側卧左痛左側
卧兩邊皆疼仰卧

(本事方)治頭風方

香附子一斤烏頭二兩甘草二兩

右為末煉蜜如彈子大每服一團蔥茶嚼下

(濟生方)一字散治頭風

雄黃研細細辛洗去鹹川烏尖去皮生

右為末每一字姜汁茶芽煎湯食後調服

(仁齊直指方)芫花散治風塵頭痛

川芎 白芷 荊芥穗 軟石膏等分

右為末每服一匙食後泔湯調下

(秘方)治頭痛不可忍者

玄胡索七枚青黛二文猪牙皂角肥實者刮去

右為末用水調成小餅子如杏仁大用時令病者仰臥以

水化用竹管送入男左女右鼻中覓菜味至喉少酸令病

者坐却令咬定銅錢一箇於當門齒上當見涎出成盆即愈

澹寮方治偏正頭疼用川芎二兩香附子炒四兩共為末以茶

清調服得臘茶清尤好

(秘方)立効散專治氣虛頭痛

右用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二

次燒燥薰之曬乾用乳鉢研爛為末每服一字別入好茶沫

食後點服

(秘方)胡芎散專治頭痛

胡芎 乾姜炮 三稜各等分

右吹咀每服五錢水一大盞空心煎服

(經驗秘方)止痛太陽丹

川烏 天南星

右等分為細末葱白連鬚搗爛調末葉貼於太陽痛處

(按粹)立川芎散治偏頭痛神効

甘菊花 石膏 川芎各等分

右為細末每服三錢茶清調下

〔按辨方〕治頭痛不可忘

麻黃結根

石膏各乙兩

何首烏半斤

乾葛 七分半

右為細末每服三錢生姜三片水煎稍熱服

〔濟生方〕芎烏散治男子氣厥頭疾婦人氣盛頭疼及產後頭痛

悉皆治之

川芎

大台烏茶各等分

右為細末每服二錢臈茶清調服或用葱茶湯調服並食後

心痛

心為五臟之主一身之所聽命焉宜必安靜不可使有所傷之則痛若痛甚手足青過節者是名真心痛且發夕死夕發且死非藥物之所能療脈經云脈浮大弦長者死沉細者生凡心痛之疾醫經所載其種有九一曰受痛二曰疰痛三曰風痛四曰悸痛五曰食痛六曰飲痛七曰寒痛八曰熱痛九曰來去痛名雖不同其實皆由外感邪氣內傷生冷結聚痰飲停於心胞

傷於經絡重則心膈引痛輕則性忤而已蓋心乃藏血之府憂思勞役大過耗散真血心帝失輔亦能令人怔忡以致膽氣虛怯變生驚悸或因事聞聲卒然戰怯又夢寐之中忽墮層崖精神恍惚如有所見治法宜詳其所因若內外之氣相搏則宜驅散邪氣溫利痰飲心血有所虧損又當補益其營衛寧其心志壯其膽氣如此調之病無不愈矣

〔和劑方〕炒香散治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

麝香 別研

山茶 善汁

人參 半兩

木香 煨二

茯苓 去皮

不焙

茯苓 去皮

木

黃耆 各一兩

桔梗 半兩

甘草 各半兩

遠志 去心

炒

辰砂 三錢

別研

右為末每服二錢溫酒調服不拘時

〔和劑方〕降心丹治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上盛下虛小便赤白常服鎮心益血

熱乾地黃酒洗焙乾二兩朱砂研飛茯苓去皮人參各二兩

當歸去芦茯神二兩肉桂半兩山茱二兩

天門冬去心三兩 遠志甘草湯煮麥門冬去心二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓人參湯下

(和劑方)平補鎮心丹治心血不足時或怔仲夜多異夢如墮

崖常服安心腎益榮衛

白茯苓去皮五味子去核枝熱地黃酒蒸天門冬麥門冬

肉桂去皮各一兩 遠志甘草湯煮茯苓去皮山茱洗姜製

酸棗仁去皮車前子人參五女龍齒半兩 朱砂研

右為末煉蜜圓如梧桐大每服三十圓空心米飲溫酒任下

(和劑方)寧志膏治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘睡

卧不寧夢洩危陰一切心疾並皆治之

乳香水盆中研生辰砂研細水酸棗仁去皮取一兩

右和勻煉蜜圓如彈子大每服一圓溫酒麥湯空心他下

(和劑方)十四友園治心腎虛損神志不寧

白茯苓去木酸棗仁炒人參龍齒別研

肉桂阿膠焙粉散遠志心湯洗焙當歸洗熱地黃

黃耆右為末同別研四味細末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓食

後麥湯下

(三因方)扶令補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五

心煩熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

羊葶湯洗七次 前胡 紫蘇 白茯苓 人參

枳殼麩炒 桔梗 甘草炙 乾葛各半兩 當歸三兩

川芎各三分 陳皮 白芍藥二兩 熟地黃一兩半

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎食前服

(楊氏家藏方)靈砂寧志園治男子婦人久病後傷損榮衛失血

過多精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂二兩 夾石者用火給袋盛一銀石器內懸於器
角別用一子 紅水直取三兩 取并一 銀石器內可入
合別用三 夜夜取三 夜夜取三 夜夜取三 夜夜取三
鹿茸破炙黃 黃耆三兩 石菖蒲二兩 茯神去木 人參

右為末次入辰砂研勻用麩肉和杵一二千下園如梧桐子
每服三十園溫酒米飲空心任下

(簡易方)葉氏十補湯治諸虛不足安益心腎

白芍藥一兩 當歸酒浸 黃耆蜜炙 生乾地黄洗

茯神半兩 肉桂四錢 北五味三錢 天台烏藥

麥門冬去心 人參 白朮各二 酸棗仁炒

陳皮去白 木香煨 半芩煨 沉香各一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

(簡易方)是齋双補四平補精血不燥不熱

熟地黄半斤 補血 鬼絲子

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九人參湯下氣不須沉

香湯下心氣虛茯苓湯下心氣煩燥不得睡酸棗仁湯下腎
氣動苗香湯下小便少車前子湯下小便多益智湯下

(簡易方)葉氏育神散理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

赤石脂別研細入 白茯苓去皮 甘草 乾姜炮 當歸酒浸

龍骨別研細入 白茯苓去木 防風 人參去芦 白朮

紅芍藥各半 分 遠志去心 紫苑茸 桂心去皮 白朮

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分食後服

(簡易方)龍齒湯理心下怔忡常懷憂慮仲思多驚如墮險地小

便或赤或濁

官桂二兩 半芩二兩 人參去芦 白茯苓去皮

甘草炙 當歸 龍齒研 桔梗炒 茯神去皮 各

遠志去心 枳殼去核 炒各一兩 半 黃耆

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚梗米百粒煎服

(簡易方)葉氏定心湯理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精

人參 去芦 白茯苓 去皮 茯神 去木 黃耆 蜜炙 焙 各二兩

白朮 赤石脂 研 川芎 厚朴 姜製 官桂 去皮

紫苑 茸 防風 各二兩 麥門冬 去心 一兩半 甘草 炙 略

右咬咀每服三錢水一盞赤小豆七十粒並七分食後服

簡易方葉氏王遺園治心氣不足大補心腎

大木瓜 一個 去皮 穰 作 伯子 入 附子 在 一 盞 取 去 一 盞

大附子 一個 洗 去 皮 穰 作 伯子 入 附子 在 一 盞 取 去 一 盞

辰砂 一兩 研 入 附子 皮 穰 作 伯子 入 附子 在 一 盞 取 去 一 盞

一法用人參切片 砌定附子於十爪內 又用白磁碗盛木瓜

於一內蒸一七日 將於磁鉢內 爛研如糊 次入乾茯神末 拌

和園如梧桐子每服二十園人參湯下 溫酒亦可

簡易方葉氏雄朱園治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣

結不散 積成痰涎 雷惟心口室寒 心竅以致狂言妄語 呼奔走

顆塊朱砂一分 研 白附子一錢 烏末 雄黃 明淨者

右和勻以猪心血和園如梧桐子 別用朱砂為衣每服三米

用人參 葛蒲 並湯下常服一粒 能安魂定魄 補心益氣

簡易方葉氏人參固本園夫心生血二生氣二生精二盛則鬚

髮不白 容貌不衰 今人滋補血氣多用性熱之藥 殊非其治此

方蓋用生地黄能生精 用天門冬引入所生之地 熟地黄能

補精血 用麥門冬引入所補之地 又以人參能通心氣 使五味

併用實補益心血一方 又名二黃園

生地黄 洗 熟地黄 洗 再 天門冬 去心 麥門冬 去心 各二兩 人參 半兩

右為末 煉蜜 園如梧桐子 空心 溫酒 或鹽湯下 三十園

簡易方葉氏鎮心爽神湯治心腎不交 上盛下虛 心神恍惚 睡

多驚悸 小便頻數 遺泄白濁

石菖蒲 半兩 升麻 炙 四錢 人參 去芦 赤茯苓 酸棗仁

當歸 酒浸 焙 南星 炮 一 陳皮 去白 乾山菜 細辛 去苗

紫苑 去芦 半錢 川芎 不焙 五味子 通草

右咬咀每服三錢水一盞赤小豆七十粒並七分食後服

麥門冬 去心 覆盆子 各一合半 柏子仁 炒 柏杞子 各一

右咬咀每服四合水一盞 壺一匙 煎五分 去滓 取茶汁入麝香 以論甫煎一二沸 溫服 不拘時

(本草方) 辰砂 遠志 園安神 鎮心 消風 化痰

石菖蒲 去毛 遠志 去心 人參 茯神 去木 辰砂 各半兩

川芎 山萆 鐵粉 麥門冬 去心 細辛

天麻 半夏 麴 南星 煨黃 白附子 生各一兩

右為末 用生薑五兩 取汁入水 煮糊 園如菜豆大 別以朱砂

為衣 每服三十粒 夜臥生薑湯下

(濟生方) 益榮湯 治思慮過制 耗傷心血 心帝無輔 怔忡恍惚 夜多不寐 小便白濁

當歸 陽浸 黃芪 去芦 小草 酸枣仁 去殼 炒

柏子仁 炒 麥門冬 去心 茯神 法木 白芍藥

紫石英 一兩 木香 不見火 人參 甘草 炙 各半兩

右咀咬每服四合水一盞 薑五片 棗一枚 煎七分 不拘時

(濟生方) 龍齒 丹治心血虛寒 怔忡不已 痰多 恍惚

遠志 草 去心 耳 當歸 去芦 熟地黃 酒 薑 焙 紫石英 煨 醋 淬

官桂 去皮 不 琥珀 別研 附子 炮 去皮 臍 毒 酸枣仁 去殼 炒

木香 不見火 沉香 別研 南星 善 汁 浸 一 兩 龍齒

右為末 煉蜜 園如梧 桐子以朱砂 為衣 每服五十園 麥湯下

(濟生方) 茯苓 飲子 治痰飲 蓄于心 胃 怔忡 不已

赤茯苓 去皮 半 芩 湯 洗 茯神 去木 陳皮 去白

麥門冬 二兩 沉香 不見火 甘草 炙 栝榔 各半兩

右咬咀每服四合水一盞 薑五片 煎七分 溫服 不拘時

(濟生方) 遠志 丸 治因事有驚 心神不定 夜夢 驚 墮 小便白濁

遠志 泔 心 善 石菖蒲 醅 二 茯神 去木

白茯苓 去皮 人參 龍齒 各一兩

右為末 煉蜜 園如梧 桐子以辰砂 為衣 每服七十園 煎湯下

〔濟生方〕補心園治憂愁思慮過度心血耗散故多驚恐遺精盜汗

紫石英浸研 熟地黄洗 菖蒲 茯神去木

當歸去芦 附子炮去 黃香去芦 遠志去心炒

川芎 桂心不見火 龍齒各一兩 人參半兩

右為末蜜丸如梧桐子每服七十九卷湯下不拘時

〔濟生方〕心丹治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾並治之

遠志去心 熟地黄酒洗 新羅人參木煎仁 朱砂五十

當歸去芦 麥川冬去心 石菖蒲 石蓮肉炒 黃香去芦

茯神去木 柏子仁搗淨 茯苓去皮 益智仁各三兩 白朮

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂衣和

以夾生絹袋盛貯用麻線緊繫袋口却用瓦鍋一口盛水七

分重安銀罐一箇於鍋內大白汝蜜二十斤將菜袋懸之中

心不令著底使蜜浸過菜袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇

煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足 火取出淘去衆菜洗

淨朱砂令乾入牛心內仍用銀鍋於重湯內煮如湯乾復以
熱水從鍋弦添下候牛心並爛取砂再擦牛心如前法並九
七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分
米糝為丸如豌豆大陰乾每服二十九食後參湯麥湯麥門
冬湯任下

〔百一選方〕治心氣虛損

猪腰子一隻用水兩椀煮至盡半將腰子細切入人參半兩

去芦尾淨當飯半兩並內同煎至八分喫腰子以汁送下

尺腰子同上二味菜滓焙乾為末山菜糊為丸如梧桐子每

〔百一選方〕引神歸舍丹治心氣不足并治心風

附子一个 神七 歸五 舍以 丹天 治南 心星 氣一 不取 足朱 并砂 治一 心兩 風一

右為末用猪心血并麩糊為丸如梧桐子煎萱草根湯下

午之交各一服止十五圓

(百一選方) 補心神効園

黃耆 蜜炙焙 茯神 去木 熟乾地黃 三兩 遠志 四兩 人參 一兩
柏子仁 別研 酸棗仁 湯泡 七次 五味子 二兩 朱砂 一兩
右為末 蜜丸 如梧桐子 每服 五十九 米飯溫酒 任下 盜汗
止 麥麩湯下 亂夢失精 人參 龍骨湯下 卒暴心痛 乳香湯下
虛煩發熱 麥門冬湯下 吐血 人參湯下 大便下血 地榆湯下
小便出血 茯苓 車前子湯下 中風不語 薄荷 生薑湯下 風疔
涎潮 防風湯下

(和劑方) 九痛園 治九種心疾及冷氣 攻刺發痛 落馬墮車 痰血
停滯 並宜服之

狼毒 半兩 乾姜 炮 巴豆 去皮心腹炒 乾取霜
人參 去芦 附子 炮 三兩 吳茱萸 湯洗 七次
右為末 煉蜜丸 如梧桐子 每服 一九 空心溫酒下 卒空心腹
病痛 口不能言者 服 二九 立瘥

(濟生方) 愈痛散 治急心痛 胃痛

五靈脂 破 玄胡索 破 蓬莪朮 根 良薑 炒 當歸 各等分
右為末 每服 二錢 熱醋湯調下 不拘時

(濟生方) 加味七氣湯 治喜怒思憂悲恐驚七氣 為病發則心腹
刺痛 不可忍 及外感風寒 婦人血痛 並宜服之

半隻 湯洗 七次 五兩 桂心 玄胡索 各一兩
人參 甘草 半兩 乳香 三兩

右吹咀 每服 四丸 水一盞 善三片 煎服 不拘時

(和劑方) 二萋 治心脾冷痛 暖胃消痰

乾姜 炮 良姜 去皮 各等分

右為末 麩糊 四如梧桐子 每服 三十 四食後 橘皮湯下

(濟生方) 歸脾湯 治思慮過度 勞傷心脾 健忘怔忡

白朮 茯神 去木 黃耆 去芦 龍眼肉
酸棗仁 一兩 各 人參 木香 不見 甘草 炙 二兩 半

右吹咀每服四勺水一盞姜五片枣一枚煎七分温服

(楊氏家藏方)卻痛散治心氣冷痛不可忍者
五靈脂去炒蒲黃炒各一兩當歸去芦洗肉桂去皮
石菖蒲木香胡椒各一兩川烏炮七枚半

右吹咀每服四勺水一盞入鹽醋少許煎服

(秘方)治心脾卒痛
右用小烏沉湯一貼入百草霜爛研并益一捻煎服立愈

(按粹方)八物定志丸補益心神安定魂魄治瘵去昏中邪熱
人參兩半菖蒲遠志去心茯苓去心麥門冬去心各

茯苓乙兩朱砂乙分白朮牛黃研一分另右細末煉蜜為丸桐子大米飲下三十九不拘時候

(宜明方)沒藥散治一切心肚疼痛不可忍者
沒藥乳香各三川山甲炙木鱉魚子四枚
右為細末每服半勺至一勺酒大半盞同煎温服不拘時候

(瑞竹方)應蒲丸治心氣痛不可忍者

好茶末四兩棟乳香二兩
右為細末用臘月兔血和丸如雞頭大每服一九温醋
送下不拘時候

眩暈

眩暈之證發於卒然之間眼目昏花如屋旋轉起則眩倒雖經
云諸眩皆屬於肝二風上攻而致眩暈然休虛之人或外為
風寒暑濕之氣所干內為七情之氣所結鬱而生涎皆能令入
一時眩暈目暗口噤頭痛項強臨病之際宜詳以脉證辨之風
則脉浮而有汗寒則脉緊而掣痛暑則脉虛而煩悶濕則脉細
而重著加以吐逆如氣鬱生涎而暈者多令人眉稜用痛眼不
可開寸脉多沉有此為異至若疲勞過度上盛下虛全瘡吐衄
便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈各隨所因施以治法

(和劑方) 善附湯 (方見中寒門) 治一時為寒氣所中口不能言眩暈欲擗

(和劑方) 順元散 (方見瘧氣門) 治体虛瘧氣不順頭目眩暈

(本事方) 川芎散治風眩頭暈
山茱萸 一兩 山茱萸 各半兩
人參 茯苓 小川芎 各半兩

右為末每服二勺酒調下不拘時日三服不可誤用野菊花
(本事方) 羚羊角散治風邪乘於湯經上注頭目遂入於腦又或
痰水結聚曾瞞上衝頭目一切眩暈並皆治之

茯苓 各一兩 芎藭 羚羊角 甘草 各半兩 枳殼
半隻 湯洗 白芷 防風 附子 各一分

右咬咀每服四勺水一盞善三片煎七分不拘時
(濟生方) 三五七散治陽虛風寒入腦頭痛目眩耳內蟬鳴應風
寒濕痺脚氣緩弱等疾並能治之

天雄 炮去皮 細辛 各三兩 乾姜 炮
山茱萸 各五兩 防風 各五兩 山茱萸 炮各七兩

(濟生方) 芎朮湯治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎 半隻 湯洗 白朮 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四勺水一盞善七片煎服不拘時
(濟生方) 芎窮湯治一切失血過多眩暈不甦

芎窮 當歸 去芦酒浸各等分
右咬咀每服四勺水一盞煎七分溫服不拘時虛甚加附子

(濟生方) 沉香磁石園治上盛下虛頭目眩暈
葫蘆巴 炒 川巴戟 去心 陽起石 煨研 附子 煨去皮臍
椒紅 炒 山茱萸 取肉 山藥 炒 附子 煨 青鹽 別研

甘菊花 去 蔓荊子 各半兩 沉香 別研 磁石 火煨醋研 水飛
右為末酒煮米糊園如梧桐子每服七十圓空心鹽湯下

卒不能辨此沉香湯下養正丹亦可

(仁壽直指方) 芎朮除眩湯(方載濕門) 治感寒溫頭目眩暈

(張子和方) 芎黃湯治頭目眩暈

大黃

荆芥穗

防風各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

腰痛

夫腎受病則腰滯而痛故經云腰乃腎之府轉搖不能腎將傷矣要知腰痛之疾所感不一有因風寒暑濕傷于腎經發為腰痛者又有墜墮險地閃動腰脇氣血凝滯而痛者其為痛也或引於項脊傍及兩脇不可俛仰或腰下如有橫水如坐水中多令人面目黧黑腹脇脹滿大抵腰痛之脈皆沉弦又須明沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為風沉弦而濡細者為濕沉弦而實者為凝滯各推其所因感邪氣者驅散之凝滯者順其氣而調

其血如此治之病無不愈又有腎經虛憊心血耗散不能養其筋脈以致腰痛又當補其心腎筋骨自壯矣

(和劑方) 五積散(方見傷寒門) 治寒濕傷于腎經腰痛不可俛仰

兼氣加茱萸婦人血氣加桃仁

(三因方) 獨活寄生傷治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或變拳掣痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力並皆治之

獨活 三四

細辛

桂心 不見火

川芎

防風 去芦

牛膝 酒浸

白芍藥

人參

熟地黄

秦艸

去土

杜仲 煨去絲

當歸 一桑寄生 炒

甘草 炙

茯苓 各一分

右咬咀每服四分水一盞煎七分空心服

(三因方) 牛膝酒治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍

地骨皮

五加皮

薏苡仁 各一兩

川芎

牛膝

耳草

生地黄 十兩

海桐皮 二兩

羌活

右咬咀用絹帛裹茶入無灰酒內冬浪七日夏二五宿每服

一盃日三四服長今酒氣不絕一法加妙杜仲一兩

(三因方)杜仲酒治風冷傷腎腰痛不能屈伸
杜仲一斤切薑汁製炒斷絲

右用無灰酒三升浸十日每服二三合日四五服一方為末
用溫酒調一食空心服

(三因方)青娥丸治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛
杜仲一斤炒生薑十兩炒破故紙一斤半

右為末用胡桃肉二百二十箇湯浸去皮研成膏入少熟蜜
同如梧桐子每服五十圓鹽酒薑湯任下

(三因方)立安丸治五種腰痛常服補暖腎經壯健腰脚
破故紙 續斷 乾木瓜 牛膝酒浸

杜仲絲各一兩製去 革薺二兩
右為末蜜丸如梧桐子每服五十圓溫酒鹽湯空心任下

(濟生方)木附湯治溫傷腎經腰重冷痛小便自利

附子皮炮去 白朮各一兩 杜仲去皮炒絲去半兩

右吹咀每服四女水一盞薑七片煎七分空心溫服
(和劑方)小七香丸方見諸氣門治鬱怒憂思或因門到擷撲一
切氣滯腰痛

(濟生方)二至丸治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角 藥角二兩 附子炮去皮 桂心不見火
補骨脂炒 杜仲去皮炒 鹿茸酒蒸焙 青藍別研半兩

右為末酒糊同如梧桐子每服七十圓空心嚼胡桃肉鹽酒
鹽湯任下惡熱者去附子加肉蓯蓉一兩

(百一選方)補髓丹升降水火補益心腎強筋壯骨
杜仲去皮炒 補骨脂各十兩用芝蔴五兩同研以之麻
鹿茸一兩去毛酒炙 沒藥一兩別研

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉
三十次湯浸去皮并為膏入麩少許酒煮糊同如梧桐子每

服一百回温酒盐湯任下

(本事方) 芎藭湯治脇下疼痛不可忍者

桂枝 川芎 知辛 乾葛 防风 各半兩

芍藥 枳殼 麻黃 人參 甘草 一分

右吹咀每服五勺水一盞姜三片煎七分温服

(本事方) 枳實散治兩脇疼痛

枳實 一两 白芍藥 炒 雀腦芎 人參 各半兩

右為末空心姜枣湯調服二勺酒亦可

(本事方) 薏苡仁園治腰脇疼痛手足拘痺

薏苡仁 一两 石斛 用細者 附子 半 牛膝 椒仁 各一分

生乾地黄 各二分 知辛 人參 甘草

枳殼 枳子仁 川芎 當飯 各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服四十回酒吞下空心日三服

(濟生方) 推氣散治右脇疼痛腹滿不食

片子姜黃 洗半兩 枳殼 去核 桂心 火去皮 不見 甘草 三

右為末每服三勺姜枣湯調下酒亦可

(濟生方) 枳芎散治左脇刺痛不可忍者

枳實 炒 川芎 各半兩 粉草 各二分半

右為末每服二勺姜枣湯調下酒亦可

(楊氏家藏方) 牽牛園治冷氣流注腰疼不可僂仰

延胡索 破故紙 炒 黑牽牛 炒 二兩

右為末研煨蒜為園如梧桐子每服三十回葱酒盐湯任下

(仁存直指方) 分氣紫蘇湯治腹脇疼痛氣促喘急

五味子 去梗 桔梗 剉 紫蘇葉 桑白皮 炙 草菓仁

大腹皮 陳皮 洗 茯苓 甘草 炙 各一兩

右吹咀每服四勺水一盞姜二片入盐少許同煎空心温服

(仁存直指方) 異香散治腹脇脹服痞悶噎塞一切氣痞腰脇刺痛

蓬莪木煨 益智仁 甘草 荆三稜 煨 各

青皮

陳皮各三錢

石蓮肉一兩

厚朴

去皮姜

右吹咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚鹽少許煎服

濟生方 蒼朮丸治陰虛閃肋血氣凝滯腰痛

蒼朮子半兩 沒藥 一錢半 乳香 二錢半 另研

補骨脂炒 藏零仙 脫去 杜仲 去粗皮剉碎 合系煎

官桂 不見火 川當歸 去芦 酒潤切焙各半兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十九空心鹽酒任湯

濟生方 立安散專治腰痛

杜仲 去粗皮剉碎 橋核取仁炒

右等分為末每服入鹽少許溫酒調服食前

脚氣

脚氣之疾雖摠之曰氣而古今證治實為多端故千金論脚氣皆由感風毒所致又經云地之風寒暑溫皆作蒸氣足常履之

遂成脚氣古來無脚氣之說黃帝時名為厥而漢之間名為緩風宋齊之後始謂之脚氣其名雖不同其箕一也今之所感未有不由脾胃兩經虛弱坐臥行動之間為風寒暑濕之氣所干流注而成此疾得病之始多不令人便查會因他病乃始發動或奄然大悶怪三二日方乃竟之先從脚起或緩弱痺痛行起忽倒或兩脰腫滿足膝枯細或心中忪悸小腹不仁大小便秘澀或率轉筋骨節酸疼或惡聞食氣見食吐逆或胃滿氣急壯熱增寒其為候也不一治之須詳審乃可否則誤以為他疾治之若入腹攻心鮮不致危矣大抵脚氣之證發於外者大同而小異必須以脈辨其風寒暑濕然後施以治法若寒氣中三陽經者患必冷暑中三陰經者患必熱又以其脈浮而強者起於風濡而弱者起於溫洪而數者起於熱遲而濡者起於寒風者汗而愈溫者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈又當順四時調理不可拘一春夏疾盛者宜汗利之秋冬以後又須養

人氣虛實微加滋補防其過寒暄再作此皆嚴氏詳論及此
又如无汗走注為風勝亦急掣痛為寒勝腫滿重着為溫勝煩
渴熱頑為暑勝四氣兼中者但推其多者為勝分其表裏施以
治法亦三因至當之說古人得脚氣之初多用針灸取忌用熱
藥蒸泡恐逼邪氣入于經絡為難治也今之治脚氣者有一方
偶合於所患之証服之得愈便以為秘方其後遇病更不審其
脈証所因又服以前藥了証既殊非徒不能愈病適足以重病
戒之戒之

(和劑方)五積散(方見傷寒門)治風濕流注兩脚酸疼

(和劑方)香蘇散加換柳木瓜各換蘇散治風濕脚痛跣通氣道

紫蘇

香附子

陳皮

甘草

換柳

木瓜

右咬咀每服四勺水一盞薑葱煎服

(三因方)加味敗毒散治足二湯經受熱毒氣流注脚踝上掀赤

腫痛寒熱如瘡肉汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

去各

桔梗

甘草

人參

茯苓

川芎

大黃

蒼木

右咬咀每服四勺水一盞薑三片薄荷一捻煎服皮盧強痒

如蟬蛻煎

(和劑方)治血應痛因治風濕客於腎經血脉凝滯腰脚重疼項

背拘挛不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊

四斤

蒼木

浸一宿

香附子

去毛

陳皮

五斤

沒藥

別研

草烏頭

一斤

葳靈仙

洗二斤

右為末酒糊丸如梧桐子每服二十丸溫酒熱水任下

(和劑方)四斤治腎經虛寒下攻腰脚筋脉拘挛手痛不已獲

地艱辛脚心隱痛應風寒濕痺脚氣緩弱並宜服之

宣州木

天麻

去芦

從蓉

洗淨

牛膝

去芦

各斤

以上四味如前事治子用无灰酒五升浸春
秋各五日夏三日冬十日足耳出焙乾再入
附子去三兩虎骨塗酥炙三兩

右為末用浸菜酒打麩糊園如梧桐子每服五十園空心煎
木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

(和劑方)活絡丹治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注脚間筋
脉挛拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切痛
風走注並皆治之

川烏炮六兩乳香研二兩草烏炮去皮脂
地龍去土南星炮沒藥研二兩二包

右為末入研菜和勻酒糊園如梧桐子每服二十園空心冷
酒下荆芥茶亦得

(和劑方)換腿園治足三陰經為凡寒暑濕之氣所乘發為挛痺
緩弱上攻胃脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱辛
薏苡仁 南星炮 石南葉石斛 去根 枳柳

草解炙川牛膝酒浸菟活去芦防風去芦木瓜四兩

黃芪去芦當歸酒浸天麻去芦續斷各一兩
右為末酒麩糊園如梧桐子每服五十園溫酒鹽湯任下

服加附子肉桂蒼朮各一兩
(和劑方)木瓜園治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘挛腫滿疼痛行

獲艱雜牽動喘促面色鰓黑大小便秘澀
熟干地黄炮陳皮去白烏菜各四兩赤芍藥一兩

黑牽牛炒杏仁去皮牛膝酒浸石楠葉藤
當歸酒浸菴容酒浸續斷 乾木瓜各二兩

右為末酒煮麩糊園如梧桐子每服五十園空心溫酒下
(三因方)大黃左經湯治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫
痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛去苗茯苓 羌活 大黃蒸甘草炙
前胡 枳殼去穢厚朴去皮炒黃芩 杏仁去皮枳殼

右吹咀每服四勺水一盞姜三片枣一枚煎七分空心热服
腹痛加芍药秘结加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便秘结加
沃泻四肢瘡痒浸淫加升麻並等分

(三因方)半隻左经湯治足少阳经為風寒暑湿流注發熱腰脇
疾痛頭目眩暈嘔吐不食

半隻 湯洗 乾葛 細辛 白木 麥門冬 去心 三分

茯苓 桂心 不見火 防風 乾姜 炮

黃芩 甘草 炙 柴胡

右吹咀每服四匙水一盞姜三片枣一枚煎七分空心服
吐
同加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

(和劑方)八味園(方見諸濕門)治腎經虛寒脚氣入腹二脹
痛上气喘急此茶最能治之

(和劑方)經進地仙丹治腎氣虛憊風湿流注脚膝酸疼行步无力

川椒 微炒 出 干 四兩 兔絲子 酒浸 覆盆子 白木 一兩

白附子 羌活 防風 去芦 各 人參 三兩 烏茶 二兩

川烏 炮 一兩 附子 炮 四兩 茯苓 一兩 地龍 去土 赤小豆

骨碎補 三兩 甘草 一兩 木鱉子 去殼 草薢 二兩 狗脊

茯苓 酒浸 焙 牛膝 酒浸 南星 湯洗 姜製 黃芪 一兩 何首烏

右為末酒糊同如梧桐子每服四十回空心温酒下

(和劑方)黃耆回治腎臟風虛上攻頭面下注腰脚行步艱難一
切風痺痛痒不定並皆治之

川練子 川烏 炮 赤小豆 杜疾藜 去 茴香 炒

地龍 去土 炒 防風 去芦 各 烏茶 二兩 黃芪

右為末酒糊同如梧桐子每服五十回温酒益湯任下

(三因方)麻黃左经湯治風寒暑湿流注足太陽经腰足挛痺關
節重痛增寒發熱无汗惡寒或自汗惡風頭眩暈

麻黄 去节

防己

乾葛 细辛 白术 未泔浸 茯苓

甘草 独活 防风

右为末每服四勺水一盞姜三片枣一枚煎空心服自汗去
麻黄加肉桂芍药童着加白术陳皮无汗减桂加杏仁澤
泻並加等分

(和剂方) 養腎散治腎氣虛損腰脚疼痛

草烏頭生去附子炮二全蝎羊蒼木製一天麻三

右为末空心豆淋温酒調下麻痺收肘病亦随去

(三因方) 大料神机左经湯治風寒暑温流注三陽經腰足拘挛

大小便秘泄喘滿煩悶並皆治之

半隻湯洗乾葛 细辛 麻黄 去节 小阜 志

厚朴善製炒茯苓 防己 枳殼 去穢炒 甘草

桂心 羌活 防风 柴胡 黄芩 白姜

石吡咀每服四勺水一盞姜三片枣一枚煎服自汗加牡蛎

白术去麻黄、腫加沃瀉水通甚熱無汗減桂加橘皮前胡

并麻腹痛或利去黄芩加芍药附子大便秘加大黄竹瀝喘

滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

(三因方) 六物附子湯治而氣流沲於足太陰經骨節煩疾四肢
拘急自汗短气小便不利手足或時痺腫

附子炮去桂心各四白术三

甘草炙二防己四茯苓三

右吡咀每服四錢水一盞姜七片煎服

(三因方) 十全丹治脚气上攻心腹足心隱痛小腹不仁關節挛

痺爽痛無時煩渴引飲大小便或秘或利

石斛台酒浸狗脊尖去草薢 薤白 熟地黄

牛膝酒浸地仙子 遠志去心茯苓 杜仲去皮

(三因方) 烏菜平气湯治脚气上攻頭目昏眩脚膝酸爽行步艱

苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木 甘草炙 白芷 當歸 白朮 川芎

五味子 紫蘇子各等分 乾木瓜 人參 烏茶去木

右咬咀每服四錢水一盞善五片末二枚煎七分溫服

(三因方)木瓜牛膝園治寒溫四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛

木瓜却將鹽末四個切用蓋去穢未用針定蒸三次 木瓜却將鹽末四個切用蓋去穢未用針定蒸三次

川烏大者去皮去心用酒洗 巴戟薄切以酒煮乾研細為膏三兩

青鹽別研八分 狗脊燎去毛 牛膝酒浸 草薢

海桐皮九味各一兩 青皮 茴香炒 羌活

右為末入青鹽拌勻將前二膏搜和如硬再入酒杵數千下

園如梧桐子每服五十園空心鹽酒鹽湯任下

(三因方)茱萸元治脚氣入腹之內不仁喘急欲死

吳茱萸湯洗 木瓜去穢切片日乾各等分

右為末酒糊園如梧桐子每服五十園至百園酒飲任下或

以木瓜蒸爛研膏為園尤妙

(三因方)木通散治因脚氣之疾服補茶太過小便不通痲閉脹滿

梔子仁炒 赤芍藥 赤茯苓 甘草生各一兩 當歸

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服

(三因方)勝駿園治元氣不足為寒溫之氣所襲腰足孳拳脚面

連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子一個炮 當歸酒浸 天麻 牛膝並酒浸 木香

酸棗仁炒 熟地黄酒浸 防風去又各 木瓜四兩 羌活

乳香別研 射香別研 全蝎去毒 沒藥別研 甘草多各

右為末用生地黄二斤研爛如泥入無灰酒四升 煎如膏

以煎茶和勻杵令堅每兩作十園每服一園細嚼臨睡酒下

如冬月無地黃煉蜜園如梧桐子每服五十園鹽湯溫酒任

下一方加栝榔草薢薤蓉破故紙巴戟各一兩當痛地黃各

減一兩

(楊氏家藏方)五片園治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切寒温脚气並皆治之

没菜別研 川烏頭炮去 山菜各四兩 大木瓜 天麻
牛膝 去芦用无灰酒浸 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 虎骨 余酥炙尽黃色
右將木瓜爛蒸研作糊和菜末如不就更用元浸牛膝酒打糊搜勻杵一二千下園如梧桐子每服五十園温酒鹽湯下

(楊氏家藏方)葫蘆巴園治一切寒湿脚气腿膝疼痛行步無力
葫蘆巴酒浸 宿焙乾 破故紙 炒香各四兩
右為末用大木瓜一枚切頂去穰置菜在內以滿為度復用頂蓋之以竹簽定蒸熟爛研同前未盡菜末和為園如梧桐子每服五十園空心温酒下

(楊氏家藏方)越痛散治温攻注腰脚疼痛行步無力
杜仲炒一兩 半 延胡索 草薺各一兩
役菜一兩 當飯洗焙 肉桂 去皮

右為末每服三錢空心温酒調下

(濟生方)換柳湯治一切脚痛順氣防墮
換柳 香附子 去毛 陳皮 去白 紫蘇葉
木瓜 去穰 五加皮 甘草炙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服婦人脚气如當飯半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳實熱者加大黃

(濟生方)大腹皮散治諸證脚气腫痛小便不利
換柳 荆艾穗 烏菜 陳皮
紫蘇葉 各一兩 羅蔔子 炒半 沉香 不見炭 桑白皮 炙
枳殼 各一兩 半 大腹皮 三兩 乾宣木瓜 兩半 紫蘇子 炒
右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)神烏園治遠年日近乾温脚气
川烏 炮去皮 虎脛骨 酥炙 海桐皮 川草薺 各一兩

川牛膝酒浸 肉苁蓉酒浸各 金毛狗脊去毛半兩

右為末用木瓜膏為圓如梧桐子每服七十圓空心溫酒下

消生方加味四斤因治肝腎俱虛精血不足足膝酸爽步履不

隨如受風寒溫氣以致脚痛者最宜服之

虎脰骨酥炙 天麻

宣木瓜穰蓋 肉苁蓉酒浸焙

沒藥別研

乳香別研 各川烏炮去 川牛膝去芦酒浸

右為末入木瓜膏和酒糊杵煉為圓如梧桐子每服七十圓

空心溫酒鹽湯任下

醫家方治脚氣入腹衝心疼痛腫滿大小便秘

沉香

木香

羌活

白芍藥

換柳各五文 甘草

枳芎

青皮

枳殼各二文 紫蘇葉

木瓜焙

真蘇子六文

右咬咀每服四文姜三片同煎溫服

醫家方五獸三匱丹治因氣血耗損肝腎不足兩脚羸弱

鹿茸酥炙

麒麟竭即草

虎脰骨勸炙

牛膝

去皮酒浸

狗脊赤草根也 隙去毛各等分

右修事為末即五獸丹料也

宣木瓜

生一個去心刀薄去皮入上附子於內以附子末

白為度

即辰砂一兩附子旋火中空心入辰砂於內

三匱丹也 辰砂為末 附子旋火中空心入辰砂於內

右用三匱丹研膏調五獸末子為圓如雞頭大木瓜酒或降

氣湯任下

活人方木瓜散治脚氣

乾木瓜

大腹皮 一个 紫蘇

羌活各一分

甘草炙 木香

右咬咀合作三服每服水二盞煎至一盞通口服

御茶院方沉香大腹皮散治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫滿疼

痛筋脉不利

大腹子連破 沉香

桑白皮炒

換柳

茴香炒

白茯苓 去皮 木通 荆芥穗 紫蘇子炒 蘇葉

乾木瓜 二兩 枳殼 去穢 甘草 炒 陳皮 去白 烏菜

右咬咀每服五匙水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分

溫服如元蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎如竟大乾燥

即服如減神功

御菜院方四莖木瓜因治所腎脾虛為風寒暑濕之氣流注經

絡脚膝疼痛增寒壯熱或腫或痺發作不時

藏靈仙 苦苧藤 黃芪 續斷

蒼朮 橘皮 烏菜 茯神木 各半兩

右為末以火木瓜四枚去頂穢項菜在內却用頂蓋蓋定酒

酒蒸熟研為膏因如梧桐子每服五十因空心溫酒鹽湯任

下世傳木瓜因甚多此方為是

濟生方加減地仙丹治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣腫滿疼痛

地龍 煨去土 五靈脂 去石 烏菜 白膠香 別研 五加皮

椒紅 去汗 藏靈仙 木瓜 去穢 赤小豆 炒 川烏 炮

黑豆 煨去皮 天仙藤 蒼朮 剉 浸 木鱉魚子 各殺油

右為末酒糊因如梧桐子每服七十因空心鹽酒鹽湯任下

本草方思仙續斷因治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切凡

毒流注並宜服之

草薢 四兩 防風 考 薏苡仁 思仙木 剉 杜仲 剉 煨 絲

牛膝 酒浸 川續斷 羌活 各三兩 生地黃 五加皮

右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木

瓜成膏杵因如梧桐子每服五十因空心溫酒鹽湯任下

仁有直指方不老地仙丹治腎膠風毒輕脚壯筋

茯苓 剉 酒 當飯 虎骨 酒炙 牛膝 赤小豆

白南星 炮 川椒 去目 川芎 各一兩 草薢 鹽水 血竭

杜仲 姜製 羌活 何首烏 沒藥 剉 獨活 防風

木鱉子去油 地龍去土 茴香炒 乳香別研各半兩
右為末酒糊如梧桐子每服四十口 木瓜陳皮湯下
(仁有直指方) 木瓜散治脚氣

大腹皮 紫蘇 羌活 木香
茯苓 陳皮 甘草 鞞脂 宜木瓜

(秘方) 經効立應散治風濕脚氣
右咬咀每服三勺水一盞善麥煎服

麻黃去節炒 薑蠶各二兩 丁香一分 沒藥別研 乳香
右為末每一兩用酒一碗調服取醉蓋覆得汗即愈曾經蒸
泡者難愈

(秘方) 翁地仙丹專治風痺脚氣

天仙子一兩 川椒三兩 木鱉子四兩 白膠香五兩
五靈脂三兩 陳色好者 用酒好酒 黑牽牛六兩 黑豆八兩
草烏七兩 焦黃折 洗用之 在曲中并炒 赤土九兩

右為末同入白膠香木鱉子末用隔年好醋打麥糊杵千百
下日如梧桐子每服三十口茶清下病甚者頻進

(蓋陵歐陽康叔家傳方) 攢風散專治山濕脚氣先用此發散
麻黃不去 甘草不去皮 淮烏川草薺 杏仁各等分

右咬咀每服四勺水一盞煎服不可多進
(蓋陵歐陽康叔家傳方) 通真口專治脚氣秘結者用此通利

草薺各等分 破故紙 黑牽牛 淮烏羊兩用巴豆
右為末麩糊口如梧桐子每服十口空心鹽湯下如利數行
欲止之以冷水洗手即止

(蓋陵歐陽康叔家傳方) 加減至寶丹專治脚氣止疼痛除風溫

石膏水浸 當歸酒浸 骨碎補炒 煨榔各二兩
月室破 醋乾 白茯苓各三兩 木瓜生用
紫金皮生用 淮烏炒 赤三兩 白膠香二兩 水中
右為末蜜丸如彈子大嚼生薑一塊空心以好酒一盞送下

多以酒助藥力服後一持久用外應散薰蒸淋洗一方除紫
金皮木虱加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除紫金皮右
骨加白木木香川烏

(盧陵歐陽康叔家傳方)外應散治脚氣用此薰蒸淋洗

石楠葉 矮樟葉 西江杉片 藿香 紫金皮 藜蘆
獨活 大蓼 白芷 紫蘇 羌活 各等分

右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內
令病者以足加其上用厚衣蓋覆薰蒸痛處候溫熱可下手
時却令他人淋洗

(盧陵歐陽康叔家傳方)搜風散脚氣愈後可常服之

白芷 川芎 茯苓 甘草 芍藥 兩半
當歸 各兩半 陳皮 厚朴 枳殼 白木 兩兩
乾薑 炮 麻黃 去根節 桔梗 兩半 蒼朮 浸去皮 肉
右吹咀每服三勺水一盞薑四片煎服

(盧陵歐陽康叔家傳方)透骨丹專治脚氣

川烏 一兩 煨羌活 二兩 白茯苓 二兩 乳香 別研 各一兩
煨柳 楓 川芎 木香 兩半 沉香

右為末麩糊丸如梧桐子每服六十丸姜湯下

(盧陵歐陽康叔家傳方)黑虎丹治脚氣筋骨大弱步履不隨

白木 五加皮 肉桂 各半兩 煨柳 黑小豆 半升
川烏 黃芪 白茯苓 赤芍藥 杜仲 各兩半
附子 熟地黄 烏茶 各一兩 生蒼朮 羌活
當歸 川牛膝 虎脰骨 白蒺藜

右為末麩糊丸如梧桐子每服五十丸空心鹽酒下

(秘方)夢中神授方治脚氣神効

右用木鱉子每箇作兩邊起炊二畢切碎再炒用皮紙膠
油為度每一兩用厚桂一兩同為末熬酒調服以得醉為度
蓋覆得汗即愈

脚气止痛方用草麻子七粒去殼研爛如泥同蘇合香同打和貼脚心其痛即止

(又方)用草烏一味以麴酒糟搗爛貼痛處即止如赤麴糟生姜汁調草烏末亦可

五痺

九痺疫自有五種筋痺脉痺骨痺皮痺肌痺是也多由体虛之人腠理空疎為風寒濕三氣所侵不能隨時驅散流注經絡久而為痺其為病也寒多則掣痛風多則引注濕多則重著其病在筋者則屈而不能伸應乎肝其證夜卧多驚飲食少小便數其病在脉者則血凝而不流應乎心其證令人痿黃心下鼓气卒然逆喘不通噎乾善噫其病在骨者則重而不能舉應乎腎其證手足不遂而多痛心腹脹滿其病在皮者多寒遇寒則急

逢熱則縱應乎肺其證皮膚無所知竟气奔喘滿其病在肌肉者多不仁應乎脾其證四肢懈怠發咳嘔吐診其脉大而濇或來急而緊俱為痺之候也治之當辨其所感風寒濕三气注于何部分其表裏須從偏勝者主以茶餉又有停畜文飲亦令人痺又當隨證治之至如白虎歷節遍身痛者無非風寒濕三气乘之巢氏云飲酒多汗出入水遂成斯疾久而不愈令人骨節蹉跌恐為癩痼之病如有此證治之宜早為貴

(和劑方)五痺湯方見中風門治風寒濕之氣客留肌腠手足緩弱麻痺不仁

(三因方)附子八物湯治白虎歷節身痛如錐鍛不可忍

附子炮去

乾姜炮

芍藥

甘草炙

桂心各三兩

白朮四兩

人參三兩

右咬咀每服四勺水一盞煎七分食前服一方去桂心用乾地黄二兩

三因方烏頭湯治歷節風痛不可屈伸

麻黃去節 黃芪 芍藥 烏頭取一枚去烏頭 甘草五枚到以蜜二升

右咬咀每服四勺水一盞煎七分去滓入蜜再煎一沸温服

本事方芎附散治五種痺痛自腿臂間發作不定者

小川芎 附子 黃芪 白朮 紫胡

防風 熟乾地黄 當歸 桂心 甘草各等分

右咬咀每服四勺水一盞姜三片棗一枚煎空心服

濟生方蠲痺湯治手足冷痺腰腿沉重及身軀煩疼背項拘急

當歸酒洗 赤芍藥 黃芪去節

片子姜黃 羌活 甘草炙半兩

右咬咀每服四勺水一盞姜五片棗一枚煎八分温服不拘

時家藏方加防風等分

濟生方防風湯治血痺皮膚不仁

川當歸酒洗 赤茯苓 川獨活 防風二兩 赤芍藥

黃芩各一兩 杏仁去皮尖 秦艽去節 桂心不見火 甘草

右咬咀每服四勺水一盞姜五片煎七分温服不拘時

濟生方茯苓湯治停畜支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯洗七次 赤茯苓去皮 陳皮各一兩

枳實去穢 桔梗去芦 甘草炙各半兩

右咬咀每服四勺水一盞姜七片煎服不拘時

濟生方羌活湯治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活酒洗 附子炮去 秦艽 桂心

木香見火 川芎 當歸去芦 川牛膝酒洗

桃仁 骨碎補 防風去灰 甘草炙半兩

右咬咀每服四勺水一盞姜五片煎七分温服不拘時

濟生方虎骨散治白虎風肢節疼痛發則下可忍

虎骨酥炙 花蛇酒洗 天麻 防風去葉

川牛膝酒洗 白姜薑汁 川當歸酒洗 乳香別研

挂心 不見 甘草 各二兩 全蝎 去毒各半兩 射香 一匁 別研

右為末每服二匁豆淋酒調服不拘時

本事方 增損續斷 治風濕之氣痺滯關節麻木疼痛

人參 防風 麻角膠 白朮炮 各十兩 麥門冬

乾地黄 三兩 黃芪 續斷 薏苡仁 山芋

牡丹皮 桂心 山茱萸 白茯苓 石斛 各一兩

右為末蜜四如梧桐子每服五十四溫酒空心下

本事方 續斷 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 炒 川續斷 草薢 川芎 七匁半 乳香

天麻 各一兩 防風 附子 沒藥 半兩

右為末煉蜜四如梧桐子每服四十溫酒米飲任下

濟生方 黃耆酒治風濕痺痛筋脉挛急或身体頑麻並皆治之

當歸 去芦 雲母粉 茵芋葉 白朮虎骨 草薢

木香 不見火 仙靈皮 川續斷 各一兩 甘草 炙 白芍

黃耆 去芦 防風 去芦 官桂 不見火 大麻 石斛 去一

右咬咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日

每服一盞溫煖服之常令酒氣祖續為佳

宜明方 防風湯主之治行痺行走无坑

防風 甘草 當歸 赤茯苓 去皮

杏仁 炒熟 桂 已上各一兩 黃苓 秦艽 葛根 焙

右為末每服伍匁酒水合二盞空三枚生薑五片同煎至一

盞去滓溫服

宜明方 茯苓湯加減治痛痺四肢疼痛拘攣浮腫

茯苓 令 去皮 桑白皮 焙 防風 官桂

川芎 芍藥 麻黃 去毒

右為末每服五匁水一盞空一枚煎至六分去滓溫服以姜

粥投之汗泄為度效矣

宜明方 茯苓湯主之治著痺留注不去四肢麻拘攣浮腫

赤茯苓

桑白皮

防風

官桂

川芎

麻黃

芍藥

當歸

甘草 各等分

右為末每服二勺水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心溫服如欲吐汗以粥投之

宣明方升麻湯主之治熱痺肌肉熱極伴上如鼠走唇口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻 三兩

茯苓 去皮

人參

防風

犀角 鎊

羚羊角 鎊

羌活 鎊

官桂 半兩

右為末每服四勺水二盞生薑二片碎竹瀝少許同煎至一盞溫服不計時候

新編南北經驗醫方大成卷之五

新編南北經驗醫方大成卷之六

五疸

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過五疸一曰黃汗二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸是也黃汗之證身體俱腫汗出不渴狀如風水汗出染衣黃如藥汁此由脾胃有熱喜自汗汗出入水中洗俗故汗熱結其汗黃也黃疸之證食已即飢遍身皮膚及爪甲面目小便俱黃臥時身體又帶赤帶青者必發寒熱此由酒食過度臟腑熱極水穀相併積於脾胃復為風濕所搏結滯不散熱氣薰蒸所致若發於陰部其人必吐發於陽部必振寒而後熱穀疸之證食一即頭眩心中佛鬱不安而遍體發黃此由脾胃有熱大飢過為飲食所傷胃氣衝蓋所致也酒疸之證身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑此由飢中飲酒大醉當凡入水所致女勞疸者其證身

目昏黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過勞傷又於極熱之中房事之後入水所致如多渴而腹脹者難治大槩五種之病多是脾胃經有熱而後發黃治法各當究其所因分利為先解毒次之又有時氣傷寒傷風伏暑解散未盡赤令人發黃如疸狀口淡怔忡耳鳴脚弱微寒微熱小便白濁又當作虛證治之不可妄投涼藥愈傷血風臨病之際辨之可也

(三因方)白木湯治酒疸因下後變為里疸目青黃黑心中如啞
葑狀大便黑皮膚不仁其脉微而數
桂心 白木各一兩 枳實去白 豆豉
乾葛 杏仁 甘草各半兩
右咬咀每服四錢水一盞煎七分食前服
(三因方)當飯白木湯治酒疸發黃結聚飲疔心胃堅滿不進飲食小便黃赤其脉弦澀
茯苓 各三兩 當飯 白木 黃芩 半隻湯洗七次一兩

茵陳各二兩 甘草炙 枳實去白 杏仁去皮各二兩 前胡
右咬咀每服四錢水一盞煎七分食後溫服
(消生方)加減五苓散治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利
茵陳 各五分 赤茯苓 去皮 白朮 沢瀉

右咬咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時有用局方五苓散加茵陳亦可
(消生方)黃耆散治黃汗
黃耆去芦 赤芍藥 茵陳各二兩 石膏四兩
麥門冬 去心 豆豉各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時
(消生方)茵陳散治黃疸
瓜蒌 一个 石膏 一兩 甘草炙半兩

茵陳 木通 枳子仁各一兩 大黃炒
右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱白一莖煎服不拘時

〔濟生方〕穀疽口專治穀疽

苦參三兩 龍膽草二兩 牛膽一個

右為末用牛膽汁入少煉蜜為丸如梧桐子每服五十九空
心熱水或生姜甘草煎湯送下兼服紅山子亦可

〔濟生方〕葛根湯治酒疽

枳實去白 枳子仁 葛根二兩 豆鼓各一兩 甘中各半

右吹咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

〔濟生方〕滑石散治女勞疽

滑石二兩半 白礬二兩 括

右為末每服二錢用大麥粥飲調下以小便出黃水為度

〔濟生方〕秦艽飲子治五疳口淡咽乾發熱微寒

秦艽去芦 當歸酒浸 芍藥 白朮

官桂去皮不 茯苓去皮 熟地黄酒蒸 陳皮

小草 川芎各一兩 半是湯洗 甘草炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎服

茵陳湯治時行瘧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

大黃一兩 梔子仁三錢

咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

黃丸治酒積食積諸積面黃疽積硬塊

稜子半兩 牽牛半兩 巴豆四十九 黍米粉

未用梔子並湯和丸如棗豆大每服三九至五九

嚙菜瓜蒂散治黃疽遍身如金色累効

母丁香 黍米九寸 赤小豆半兩

右為極細末每夜兩鼻孔內嚙使睡明日取下黃水便服黃連散

方黃連散治大小便秘澁應熱累効

黃連二兩 川大黃醋搗 黃芩 炙甘草

右為極細末每服二錢食後溫水調下日三服

虫益毒

之為毒醫書所載雖有數種而中土少見之今古相傳多是
廣深山之人於端午日以蛇虺蜈蚣蝦蟇三物同罾貯之曬
食啖俟一物獨存者則謂之盡欲害其人審取其毒於
食中啖之若中其毒者令人心腹絞痛如有虫咬吐下血皆
肉若不即治食人五勝即死然此毒中人有緩有急急者
日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五勝而後死則
流注於傍人亦成盡注大抵試驗盡毒之法令病人咳唾
沉者是毒淳者非也或含一大豆其豆脹皮脫者盡也豆
皮不脫又非也又以鵲皮至病人卧下勿令知竟病甚者
古則非也治療之法必須審而後行試而後可今人凡有積
毒之病類乎盡者便以為盡尤為非也世說閩廣深山之
有以盡行毒於人者若欲知其姓名呼喚將去其病自愈

密

治

又一說病者善能知元中毒於何者之中終身不服此物其毒
亦不復作雖相傳如此俱未之見謹用載之以備搜覽

(三因方)解毒園治誤食諸毒草并百物毒救人於必死

板藍根四兩貫衆一兩青黛別研甘草主各一兩

右為末蜜園如梧桐子以青黛別為衣如稍竟精神恍惚惡
心即是誤中諸毒急取茶十五園爛嚼用新汲水下

(三因方)青黛雄黃散凡中毒及蛇虫咬傷即服此茶令毒氣不聚

上好青黛雄黃各等分

右為末新汲水調服二錢

(濟生方)丹砂園治盡毒

雄黃別研朱砂別研各蘇芳畧各妙鬼臼巴豆去殼心油

右為末蜜園如大豆母服三園空心乾姜湯下當轉下惡物
并盡等如煩悶後以鴨為羹食之

(濟生方)雄麝散治五種盡毒

雄黃末 麝香末 各半分

右取生羊肺如指大以刀開內裹茶吞之

消生方 礬灰散治中諸物毒

晉礬 建茶 各半分

右為末每服二錢新汲水調下得吐即效未吐再服

經驗秘方 治盪毒用升麻末三錢澆水調服水

又方 中盪下血者用蝟皮燒為灰細研以水調下二日進三

服立愈

又方 治五種盪毒以馬兜零根三兩搗篩分為三貼用一貼以

水大錢煎至五分去滓空心頻服當時吐盪出未快再服之以

快為度

諸淋

淋閉之疾其證有五氣石血膏勞是也氣淋為病小便澀常有

餘泄石淋為病莖中痛尿不得卒出膏淋為病尿似一出榮一
為病勞倦即發痛引氣衝血淋為病遇熱即發甚則溺血候其
鼻頭色黃者小便難也大柴此證多由心腎不交積蘊熱毒或
酒後房勞或七情鬱結或飲冷遂熱發散不動結于下焦小腸
膀胱受之則為癃閉淋閉其所為病皆一類也又有溫病後餘
熱不散當風取涼亦能令人淋閉故治法當以清心為先滑利
次之臨證用藥更須詳審

和劑方 五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或
尿如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

赤茯苓 六兩 赤芍藥 山梔子 仁 各一兩 當歸 其草 五兩 各
右吹咀每服二錢水一盞煎八分空心服

和劑方 八正散治大人小兒心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀癃
閉不通及熱淋血淋並宜服之

車前子

瞿麥

萹蓄

滑石

甘草

山梔子仁 木通

大黃各一斤

右咬咀每服三錢水一盞入灯心煎至七分食後温服

(和劑方)清心蓮子飲治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澀或欲成淋並宜服之

黃芩半兩

黃耆蜜炙 石蓮肉去心

白茯苓 車前子兩

人參焙

麥門冬去心

甘草炙

地骨皮

右咬咀每服三錢水一盞麥門冬十个煎發熱加柴胡薄荷

(和劑方)五苓散(方載中暑門)治伏熱小便赤痛如淋

(和劑方)石韋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出將腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

當飯去芦

瞿麥各二兩

石韋去毛

木通各二兩 甘草炙

王不留行各

右為末每服二錢空心小麦湯調服

(和劑方)導赤散治心虛蘊熱小便赤澀或成淋痛

生乾地黄

木通

甘草各等分

右咬咀每服三錢水一盞竹葉少許煎六分温服不拘時

(三因方)生附散治冷淋小便和澀數起不通竅中腫痛

附子生用

滑石

瞿麥

木通

半夏湯洗七次

右為末每服二錢水一盞姜七片灯心二十莖蜜半匙煎服

(濟生方)地膚子湯治諸病後体虛觸熱結下焦遂成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿出血

猪苓去皮

地膚子一兩

知母

黃芩 海藻洗各半兩

通草

瞿麥去梗葉

枳實麩炒

升麻 葵子

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

(濟生方)通草湯治諸淋

王不留行

葵子

通草

芎藭根

蒲黃炒

當飯去芦洗

桃膠

瞿麥

滑石各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

和劑方立效散治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草炙三兩 瞿麥穗一兩 山桅子去皮炒半兩

右咬咀每服五錢水一盞姜三片葱三個灯心三十莖煎服

〔濟生方〕小菊飲子治下焦結熱尿血成淋

生地黃洗四 小菊根 通草 滑石 山桅子仁

蒲黃炒 淡竹葉 當歸 去芦酒浸 藕節 甘草炙各

右咬咀每服四錢水一盞煎八分空心温服

〔濟生方〕鹿角膠山治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩 沒藥別研 油頭髮灰各一匁

右為末用茆根汁打糊四如梧桐子每服五十口鹽湯下

〔三因方〕鹿角霜口治骨淋多因憂思失志濁氣干清小便淋閉

如膏脂度劇筋力或傷寒温多有此證

鹿角霜 白茯苓 秋石 各等分

右為末麩糊四如梧桐子每服五十口空心米湯下

〔本草方〕火府丹治心經蘊熱小便赤少及五淋澀痛

木通 黃芩各一兩 生乾地黄二兩

右為末煉蜜拌固如梧桐子每服五十粒木通煎湯下

〔三因方〕髮灰散治小便尿血并治肺疽心衄吐血

右用髮規灰每用二匁以米醋二合湯一盞調服

〔簡易方〕葉氏治血淋方

阿膠二兩 熬炒 木楷令 赤茯苓 滑石 沃瀉 車前子

右咬咀每服三錢水一盞煎七分五更時服

〔澹寮方〕五淋散治膀胱有熱水道不通淋瀝不宜臍腹急痛或

尿如豆汁便如沙石淋膏尿血並宜服之

山茵陳二兩 去根 淡竹葉 四兩 木通 去節 滑石 赤茯苓 去皮各

甘草六兩 略 山桅子仁 炒十四兩 赤芍藥

右咬咀每服三匁水一盞煎服一方加當歸除木通滑石

〔仁齋直指方〕琥珀飲治尿血

右用琥珀為細末每服二錢灯心薄荷並湯下
徐同知祕方治血淋諸熱淋疾

山茵陳

淡竹葉

山梔子

滑石

甘草

木通

猪苓

瞿麥 各半兩

右為到每服五錢水一錢半灯心少許同煎去滓空心服如
大便秘澀加大黃兩半同煎

消渴

人身之有腎由樹木之有根根腎受病先必形体憔悴雖加以
滋養不能潤澤故患消渴者皆是腎經受病由壯盛之時不自
保養快情恣慾飲酒無度食脯炙及丹石等藥遂使腎水枯竭
心火熾熾三焦猛烈五臟乾燥由是渴利生焉醫經所載有消
渴內消強中三證消渴者多渴而利內消者由熱中所作小便

多於所進飲食而反不渴虛引短氣強中者虛陽強大不交而
精氣自泄太繁消渴之疾上盛下虛心脈多浮腎脈必弱故經
云脈洪大陰不足陽有餘則為熱中即消中也又云腎實則消
而不渴小便自利名曰消腎即內消也其治宜抑損心火根養
腎水消渴之人津液枯竭服剛劑過多防發癰疽之疾尤忌房
事并飲酒鹹食安麪之物切不可用金石之藥臨證慎之

和劑方黃耆六一湯治男子婦人諸虛不足胃中煩悸時常消
渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者並宜服之

黃耆 去芦蜜塗炙六兩 甘草 炙一兩

石咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分溫服不拘時

和劑方五苓散方載中暑門治伏暑發渴引飲元度

和劑方清心蓮子飲方載五淋門治心經蘊熱作渴小便赤澀

和劑方玄兔丹方載諸虛門治腎水枯竭心火上炎消渴引飲

和劑方八味回生方痰氣門治心腎不交消渴引飲 一方除附

子加五味子一腎氣回

三因方真珠回治心虛蘊熱或內積七情附飲過多皆致煩渴引飲無度小便或利或不

知母一法一分川連法去毛一兩苦參一兩玄參一法

鐵徹粉一分牡礪一分朱砂二兩麥門冬去心

天花粉兩金箔銀箔三兩豆黃去皮一法白

右為末煉蜜入生瓜蒌根汁少許同如梧桐子以金銀箔為衣每服三十回瓜蒌根麥門冬煎湯任下

三因方菴容回止消渴補心腎

黃耆鹽湯浸菴容酒浸巴戟酒浸沃瀉乾骨

菟絲子酒浸磁石煨碎牛膝酒浸桂心草薢

麻茸醋炙山茱炒熟地黃附子桂去皮鍾昔

遠志心炒破故紙炒五味子杜仲法去各半兩製法

石斛覆盆子山茱萸茯苓

右為末蜜回如梧桐子每服五十回空心米飲下

三因方黃連猪肚回治強中消渴

黃連去須梁米瓜蒌根茯苓各四兩

知母麥門冬去心各一兩

右為末用大猪肚一箇洗淨入菜末於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出菜別研以猪肚為膏再入蜜搜和前菜杵數千下同如梧桐子每服五十回參湯下一方加人參熟地黃乾葛濟生除知母梁米用小麦

三因方六神湯治三消渴疾

枇杷葉瓜蒌根乾葛蓮房甘草黃耆各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓

三因方鹿茸回治失志傷腎二虛消渴小便無度

鹿茸去毛麥門冬去心熟地黃耆五味子

雞脛脰去毛茯苓酒浸山茱萸破故紙炒茯苓

地骨皮 始上 人參 二分 牛膝 酒浸 玄參

右為末 蜜和 如梧桐子 每服三十回 米湯下

〔簡易方〕衛生 天花 治三消渴疾

黃連 便須三宿童子小 白扁豆 微二 辰砂 別研

鉄艶粉 別研 牡砺 煨 知母 苦參

天花粉 各半 芦薈 一分 金箔 銀箔 各二十片

右為末 取生瓜蒌根汁 和蜜和 如梧桐子 每服五十回 空心

麥門冬 湯下

〔簡易方〕地黃 飲子 治消渴 咽乾 面赤 煩躁

人參 去芦 生乾地黃 洗 熟乾地黃 黃耆 蜜炙

天門冬 去心 麥門冬 去心 沃瀉 石斛 去木 炒

批把葉 炒 枳殼 炒 甘草 炙 各等分

右吹咀 每服三錢 水一盞 煎七分 食後溫服

〔濟生方〕加減 腎氣 治腎水不足 心火上炎 口舌乾燥 多渴引

飲 肢體消瘦 並宜服之

山茱萸 取肉 白茯苓 牡川皮 去 熟地黃 酒蒸 沉香 不見

五味子 沃瀉 鹿角 鎊 山茱萸 炒 各一 官桂 不見 火

右為末 煉蜜和 如梧桐子 每服七十回 鹽湯米飲 任下 弱甚

者 加附子 一兩 兼進 黃芪 湯

硃砂 黃連 治心虛 蘊熱 或因飲酒 過多 發為消渴

硃砂 別研 宜連 三兩 生地黃 二兩

右為末 煉蜜和 如梧桐子 每服五十回 灯心 麥子 煎湯 送下

〔秘方〕烏梅 五味子 湯 專治 消渴 生津 液

五味子 巴戟 酒浸 百葉煎 烏梅 甘草 各等分

右吹咀 每服四 水一盞 空心 煎服

〔秘方〕茯苓 治三消渴 疾 累有 二效

五倍子 炒 蓮肉 一兩 龍骨 煨 兩半 左顧牡 石 火 煨

右用 茯苓 二兩 為末 煮糊和 如梧桐子 每服五十回 空心 鹽

湯下仍兼服靈砂黑錫

(仁育直指方)加味錢氏白朮散治消中消穀善飢

人參

白朮

白茯苓

甘草炙

枳殼

去穢麩炒各半兩

藿香葉一兩 乾葛二兩

木香

北五味子柴胡

右吹咀每服三錢水一盞煎服

(宜明方)大黃甘草飲子治男子婦人一切消渴不能止者

大豆

五升一煮三沸出淘苦水再煮

大黃

甘草

大者四兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前茶同煮三五時如稠強水少更添

且漱盛於盆中放冷令病人食豆渴食湯汁無時候食盡

如止渴燥罷不止再煮前茶不三次病悉去矣

(張子和方)葛根丸治消渴消腎

葛根

一兩

栝樓

三兩

鉛丹

二兩

附子

一兩炮去皮臍

右四味搗羅為細末煉為丸桐子大每服十九日進三服治

日飲碩水者春夏去附子

赤白濁

人之五臟六腑俱各有精氣腎為藏精之府而聽命於心貴於水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不交精元失守由是而為赤白濁之患赤濁者心虛有熱多因思慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之其狀漩面如由光彩不定漩脚澄下疑如膏糊治法當以赤白究其病源心虛者當清心調氣腎寒者溫補下元仍須清上使水火既濟陰陽叶和精氣自固矣凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而腎不足故士邪干水亦能令人便下渾濁史載之云夏則士燥而水濁冬則土堅而水清醫多峻補其疾愈甚只宜以平和之藥療之水火既濟脞去目堅其流清矣

(和劑方)通赤散(方載諸書) 治心虛蘊熱小便赤澀遂成赤濁

(心腎丸)治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

薨茸 牛膝酒浸 龍骨煨 白茯苓去 人參去

遠志去 附子 從蓉酒浸 山茱萸炒 五味子去

當歸去 黃耆 熟地黃洗 蒸兔絲子酒浸 成餅三

右為末用浸茶酒煮糊丸如梧桐子每服七十回麥湯下

(三因方)益志湯治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸酒浸 巴戟去 枸杞子 熟地黃酒浸

茯苓酒浸 牛膝酒浸 附子炮 桂心不見

山茱萸 白芍藥 甘草炙 防風各

右咬咀每服四錢水一盞薑五片鹽少許同煎空心服

(三因方)安中散治三焦虛寒短氣煩悶小便白濁精血不禁

熟地黃 巴戟去 龍骨各 遠志去

茯苓各 蛇床子炒 天雄皮 五味子

山茱萸各 茯苓酒浸 續斷各 兔絲子酒浸

右為末每服二錢溫酒調下

(簡易方)葉 定心湯方 載心痛門一理心氣不足勞血衰少過事

多驚心神不守夢中遺精白濁不已

(簡易方)葉氏鎮心爽神湯方 載心痛門一理心氣不足夜夢多

驚小便白濁遺精

(和劑方)茯苓丸治思慮太過心腎虛損真陽不固溺有餘瀝小

便白濁夢寐頻泄

菟絲子五 白茯苓三 石蓮肉二

右為末酒糊丸如梧桐子每服三十九空心鹽湯下

(和劑方)清心蓮子飲方 載五淋門一理心虛有熱小便赤濁有收膜

濟生方瑞蓮丸治思慮傷心小便赤濁

白茯苓去 石蓮肉炒 龍骨生 天門冬洗

麥門冬去 遠志洗 枳子仁 紫石英火

當歸酒浸 酸棗仁炒 龍齒各 乳香半

右為末煉蜜丸如梧桐子以硃砂為衣每服七十九空心溫

酒麥湯任下

（消生方）固精丸治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉酒浸陽起石火煨鹿茸炙韭子炒麻角霜

赤石脂火煨川巴戟去心白茯苓附子炮去皮附龍骨用生

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯任下

（楊氏家藏方）草薢分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻

數無度漩面如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏菜各等分

右咬咀每服四勺水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服一方

加茯苓甘草

（濟生方）羊脰炭丸治思慮傷脾三不攝精逐致白濁

厚朴去皮取肉薑汁製 羊脰炭火煨過通經一兩

右二味煮麩糊丸如梧桐子每服百九空心米飲下

（百一選方）固真丹治元勝久虛小便白濁婦人赤白帶崩漏下

血並宜服之

蒼朮四兩 用茴香一兩 鹽一兩 同砂令木黃為度

蒼朮四兩 用川烏一兩 炮製去皮尖切片子并川

蒼朮四兩 用紅椒一兩 和皮製去目并合木黃為度

蒼朮四兩 用酒故紙一兩 同炒去目并合木黃為度

右同為末同煮茶酒醋打麩糊丸如梧桐子每服三十回男

子溫酒鹽湯空心下婦人醋湯下

（澹寮方）五子丸治小便頻數時有白濁

菟絲子酒蒸 家非子 益智子 去皮 茴香炒 蛇床子 各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十回米飲鹽湯任下一方

（經驗方）桑螵蛸散治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白

心神恍惚瘦悴減食此證多因房勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸鹽水遠志甘草水菖蒲鹽炒龍骨煨研

用川椒為衣恐麻人咽喉加入前藥內亦可

（經方）桑螵蛸散治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白

心神恍惚瘦悴減食此證多因房勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸鹽水遠志甘草水菖蒲鹽炒龍骨煨研

人參去芦 茯神去木 當歸酒洗 鱉甲醋炙各

右為末每服二勺臨睡時人參湯下

(和劑方) 秘傳玉鎖丹治心腎俱虛小便白濁淋瀝不已漩面如膏夜夢遺精虛煩盜汗

茯苓去皮 龍骨二兩 五倍子十六兩

右為末水煮麩糊圓如梧桐子每服四十粒空心鹽湯下

(本草方) 猪苓口治年壯氣盛慾動所願不得意淫於外夢遺白濁

右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半其黃色不令焦地上空出去火毒半日取半其為末糊口如梧

桐子候乾更用前猪苓末二兩炒某微裂同於汝甌內藏之

空心溫酒鹽湯下四五十口

(仁壽直指方) 煉益散治漏精白濁

鹽白鹽入磁瓶內按實以瓦蓋定黃泥封火煨

白茯苓一日取出頓陸地上一夜用壺器收貯

山茱萸炒各一兩

右為末入鹽一兩研勻用麥肉和蜜口如梧桐子每服三十

口空心麥湯下

(仁壽直指方) 蓮子六一湯治心經虛熱小便赤濁

石蓮肉蓮心甘草炙 兩

右為末每服二勺灯心煎湯調服

(秘方) 治心經伏暑小便赤濁

人參 白木 赤茯苓去皮 香薷

沢瀉 木猪苓去皮 蓮肉去心 麥門冬去心各

右吹咀每服四勺水一盞煎服

(經驗方) 治小便白濁出髓條

酸枣仁 白木 人參 白茯苓

破故紙炒 益智淨洗 大茴香 左顧牡研各

右為末加青鹽酒為口如梧桐子每服三十口溫酒米飲下

(濟生方) 韭子九方載亦虛勞口治膀胱腎冷小便白濁滑數无

度者

(簡易方)葉氏育神散方載心痛門治夜夢驚恐小便白濁

水腫

岐伯所謂水腫有膚脹鼓脹腸覃石瘕者是也名雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土五行論之雖曰剋制腎水然非土則又不能防其汎濫水腫之疾究其所因皆由脾土有亏不能防制以致腎水浸漬脾土凝而不流遂成此疾其為證也發見之初裏裏微腫有若卧蚕緣起之狀微而至大以手按之則隨手而起如裏水其內上則喘急咳嗽下則足膝跗腫面目虛浮外腎或腫小便不利治療之法當辨其陰陽脈證若陰水為病者脈來沉遲色多青白不煩不渴小便澀少而清大腑多泄陽水為病者脈來沉數色多黃赤或煩或渴小便赤澀大腑多秘腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛

自能撲養腎水其腫自消虛弱者又當溫補下元尤宜節飲食絕生冷戒房事否則愈而復作凡腫證甚者肌肉崩潰足脛流水又若唇黑缺盆平腎凸脊平足平五者皆是五勝有損非可療之病又有內挾七情之氣停滯涎飲腹滿脇脹名為氣分及少血熱生瘡變為腫痛名為熱腫又當隨證施年治不可一塗而取要知此證脈深大者生沉細者死臨證施治宜詳審焉
(和劑方)五苓散方載中暑門治水腫小便不通者加木通茵陳
(和劑方)五皮散治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹胸脹上氣促急

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮 絡石
右咬咀每服三錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷
油膩堅硬 物澹滯察去五加皮地骨皮用陳皮桑白皮
(和劑方)神助散 旧名葶藶散 治十腫水氣面目四肢浮腫以手按之隨手而起咳嗽喘急不得安卧小便赤澀大便不利

沃膈一兩 椒目一兩半 黑牽牛炒取末 猪苓去皮 葶藶炒別研
右咬咀每服三勺葱白三莖漿水一盞煎至一半入酒半盞
調茶絕早向東立服如人行十里久又以漿水葱白煮稀粥
候葱爛入酒五合量人所飲多少須啜一升許自早至午當
利小便三四升或大便微利喘定腫減隔日再服必須善為
將理忌鹽麪房事

御茶院方 煨腎散治腎經積水流注經絡腿膝痠急四肢腫痛
甘遂半兩生 木香白一兩

右為末每服一錢以橫猪腰子一隻批開去筋膜搽茶在內
澆勻用薄荷裹定外用紙四五重再裹以水蘸濕於火內煨
熟臨卧細嚼溫酒送下當下黃水是其效也

御茶院方 葶藶水香散治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑
葶藶一分 木香半勺 茯苓一分 肉桂一分 滑石三兩
猪苓一分 沃膈 木通 甘草兩半 白朮一兩

右為末每服二錢白湯調下不拘時

御茶院方 葶藶口治脾經受濕流注四肢足脛浮腫小便澀收

赤茯苓大 桑白皮煨 黑牽牛半兩 猪苓半兩 郁李仁研 陳皮去白
漢防己 川羌活 苦葶藶半兩 白朮半兩

右為末煉蜜口如梧桐子每服五十口溫水送下不拘時

三因方 當飯散水腫之疾多由腎水不能拱養心火心火遂不
能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透經絡發為
浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

木香煨 赤茯苓 當飯洗 桂心 木通
赤芍藥 牡丹皮 煨榔 陳皮 白朮各等分

右咬咀每服三勺水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服
三因方 復元丹治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮心腹堅脹小
便不通兩目下腫

附子炮二兩 南木香煨 茴香炒 川椒炒出汗

獨活 厚朴去皮製 白朮炒 陳皮 吳茱萸炒
桂心各一兩 沢瀉 一兩半 肉豆蔻 煨 枳殼 各半兩

右為末糊口如梧桐子每服五十四紫蘇湯下不拘時
三因方十麥口治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通

甘遂 大戟 芫花各等分

右用麥子煮熟去皮核以肉杵爛如膏口如梧桐子清晨熱
湯送下四十口以利去黃水為度否則次早再服

三因方消腫口治水腫喘滿小便不利
滑石 木通 白朮 黑牽牛炒

通脫木 茯苓 茯神去木 半苾湯洗七次
陳皮各一分 木香 半分 瞿麥 穗 丁香 各半兩

右為末酒糊口如梧桐子每服五十四口灯心麥門冬湯下
三因方禹餘糧口治十種水氣凡脚膝腫痛上氣喘滿小便不利
利且是冰氣並皆治之

蛇含石 大者三兩以銀子盛入茶粹中煨茶一極細
真針砂 五兩先以水淘淨入醋中煨乾入
度却能 用銀子同茶入地炭火中煨極通
禹餘糧 三兩同入針砂內製

以上三物為主其次量人虛實入下項藥 治水多是取轉
惟此方三項藥非大戟并遂芫花之
此又有下項藥持故虛老人可服

木香 牛膝 酒浸 蓬朮 炮 白蒺藜 桂心 川芎
白豆蔻 土茴香 炒 京三稜 炮 羌活 茯苓
乾薑 炮 青皮 去白 附子 炮 當飯 酒浸 一夕各半兩 虛人若全

右為末拌勻以湯浸蒸餅揆去水和茶再搗極勻丸如梧桐
子每服五十九空心溫酒下最忌食鹽否則發疾愈甚

楊氏家藏方消腫口治水氣腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘急咳
嗽睡卧不安小便赤澀

淡鼓二兩新 巴豆一兩水并煮令 京三稜 煨

大戟新者 杏仁燒存性研各半兩 五靈脂去渣口

右為末以生麩水調搜和杵千百下口如菜豆大每服五十口
煎桑白皮湯送下大便秘者加至十口喘急者加杏仁去皮
尖煎湯送下忌甘草鹽醬

〔濟生方〕實脾散治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皮 白木 木瓜去穢 木香不見火 乾薑炮各一兩

草果仁 大腹子 附子 白茯苓去皮 甘草炙半兩

右咬咀每服四服水一盞薑五片棗一枚煎服不拘時

〔濟生方〕疎鑿飲子治水氣通身浮腫喘呼氣急煩躁多渴大小
便不利服熱茶不得者

羌活去芦 商陸 沢瀉 赤小豆炒 檳榔

秦艽去芦 木通 大腹皮 椒目 茯苓去皮 各等分

右咬咀每服四服水一盞薑五片煎七合溫服不拘時

〔濟生方〕鴨頂口治水腫面赤煩渴肢射俱腫喘急不安小便澁

甜葶藶炒 猪苓煮 漢防己各一兩

右為末取綠鴨頭血為口如梧桐子每服七十口木通湯下

〔濟生方〕赤小豆湯治血氣俱熱遂生瘡痂變為腫滿或煩或渴

赤小豆炒 當歸去芦炒 商陸 沢瀉 桑白皮炙

連翹仁 赤芍藥 漢防己 木猪苓去皮 沢瀉各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎八分溫服熱甚加犀角

〔濟生方〕三仁口治水腫喘急大小便不通

郁李仁 杏仁炮去尖 薏苡仁各一兩

右為末米糊丸如梧桐子每服四十口不拘時米飲下

〔濟生方〕加味腎氣力治脾腎虛損腰重脚腫小便不利

白茯苓去皮 附子炮二兩 沢瀉官桂不見火 川牛膝酒浸

車前子酒蒸 山茱萸炒 山茱萸取肉 牡丹皮去木各一兩 熟地黃

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

〔百一選方〕葶藶丸治肺氣咳嗽面日浮腫喘促不安小便赤澁

甜葶藶各一兩 紙炒令紫色 漢防己二兩 木通

杏仁二兩 黃二兩 去皮去取仁 麩貝母 煨令黃一兩

右為末 粳肉丸如梧桐子每服五十九並桑白皮湯下

三因方分氣補心湯治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急

大腹皮炒 香附子炒 去 白茯苓 桔梗各一兩

木通 甘草炙 川芎 前胡去苗

青皮炒 枳殼炒 白木各三分 細辛去苗 木香各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚同煎食前服

（和劑方）木香分氣口方載氣門治一切氣逆心胃滿悶腹脇脹

急咳嗽冷痰氣不升降並皆治之

（濟生方）麻黃甘草湯治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃去根節 四兩 甘草一兩

右咬咀每服三錢水一盞煮麻黃再沸後入甘草煎七分取

汗慎風老人虛人不可輕用

（仁府直指方）蘿蔔子飲治水病浮腫

蘿蔔子生用 赤茯苓精研 牽牛末炒 葶藶炒

甘草略 半隻製 川芎 枳殼 青木香

辣桂 青皮 陳皮 白色商陸各三錢

右咬咀每服三錢水一盞薑四片煎服

（仁府直指方）杏蘇飲治上氣喘嗽面目浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉

杏仁各兩 陳皮 桔梗 麻黃去節

桑白皮炒 阿膠炒 各七 柴芫 甘草炒 各

右咬咀每服三錢水一盞薑五片煎服

（仁府直指方）郁李仁丸治水氣乘肺動痰作喘身微腫

葶藶隔紙炒 杏仁去皮尖 防己 郁李仁炒

真蘇子 陳皮 赤茯苓各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服四十九食後紫蘇湯下

紫

經驗方大橋皮湯治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑泄並宜服之

橋皮兩半 木香二兩 羊滑石六兩 煨柳三兩 白木
茯苓一兩 木猪苓去皮 沃瀉 肉桂各半兩 甘草二兩
右以咀每服四錢水一盞姜五片煎六分溫服

經驗方茯苓散治諸般氣腫

芫花醋拌炒 沃瀉 郁李仁 甜葶藶
漢防己 葶藶各三 陳皮去白 白茯苓
白煨柳 瞿麥各半兩 滑石 大戟各七兩半
右為末每服二錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水如爛

羊脂為度忌鹽食百日

宣明方牽牛丸治一切溫熱腫滿等疾
黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石各等
右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑

湯下食後虛實加減

宣明方苦葶藶丸治一切水瘕氣通身腫滿不可當者

人參一兩 苦葶藶四兩 赤小豆鋪烏
右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎
桑白皮湯下日進三服空心食前此葶恐君子不信試驗之

宣明方葶藶木香散治溫熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澀
大使滑洩

葶藶 猪苓去皮 茯苓去皮 白木各一 滑石三兩
木香半兩 木通 沃瀉 甘草各半 辣桂一分
右為末每服三錢白湯調下食前此葶下水溫消腫脹止

洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃溫熱痞
閉極深而攻之不開是氣反為注泄此正氣已衰而多難
救也慎不可攻之而无乙耳

按才方大戟散治水腫腹大如鼓或遍身皆腫

大戟

白牽牛 頭末 木香 各等分

右為細末每服三錢以猪腰一對批開搽菜在內燒熟空心食之如食左腰子塌左臂右腰子塌右臂如腫不能全去亦腹遠胸壅甘遂末飲甘草水少許其腫尽去

〔殺粹方〕猪實子丸治水氣鼓脹潔淨府

猪實子一斗上并 白丁香 二兩 伏苓 二兩

右為末用猪實子膏為丸梧子大服至小便清利及腹脹消為度後服中治調養菜蔬落其中五補七宜即其理也

〔濟生方〕加味腎氣丸治腎虛腰重脚腫小便不利

附子 炮二兩 白茯苓 去皮 二兩 山茱萸 取肉

山萸炒 車前子 酒蒸 牡丹皮 去木各 官桂 不見火

川牛膝 酒浸 熟地黄 各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心米飲吞下

脹 水瀉

脹滿之疾古方以為鼓脹穀脹是也雖見之方治而其論自三因嚴氏始詳大抵脹滿之證多是脾胃素弱或病後失調外為風寒暑濕之氣所浸內為憂思七情之氣所傷及過食生冷飲漿之類并傷脾胃以致五勝傳剋陰陽之氣不得升降痰飲結聚中焦遂成脹滿之疾其為證也或腸鳴氣走漉々有聲或兩脇腰背痛連上下或頭疼嘔逆胃滿不食大小便為之不利其脈浮者易治脈虛小者為難至如積聚之證亦由脹脹而始又當以脈証辨之從五積治法更有水疽水氣脚氣及婦人血膨皆能令人脹滿又當各以類求之

〔和劑方〕沉香降氣湯（言見諸氣門） 治氣不升降胃膈痞悶 心腹脹滿

〔三因方〕大半芩湯治肝氣大盛勝射於脾胃不運化結聚涎沫

閉寒臟氣胃冷中虛遂成脹滿之病其脈多弦遲

半隻湯洗

桂心各五兩

附子

皮炮去

枳實

三兩各

茯苓

甘草炙

厚朴姜炒

當歸

川椒

炒出

汗去

人參

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚空心煎服

(簡易方) 四炒山治氣血凝滯腹內盪脹

枳殼

四兩

去穢切

作兩指

面大塊

分四

炒一兩

用蒼朮

一兩

同

用干漆

一兩

炒黃

去干漆

一兩

用茴香

一兩

同

炒去

茴香

上

右用元炒蒼朮四味同水二椀煎至一椀去滓煮麵糊如

梧相子每服五十山食後米飲下

(簡易方) 桃溪氣竇山治腰脇俱病如抱一甕肌層坚硬按之如

鼓兩脚腫滿曲膝仰臥不能屈伸自頭至顛中瘠瘦露骨一切

氣積食積并脚氣走注大便結寒熱往來狀如傷寒並宜服之

黑牽牛 二兩

大黃 一兩半

枳櫛

青皮

一兩

各

木香

羌活

川芎

陳皮

茴香

炒

當歸

各半兩

右為末用皂角膏四如梧相子每服一百四生薑灯心湯下

(簡易方) 是有推氣四治三焦痞塞氣不升降胃膈脹滿大便秘

澀小便赤少並宜服之

枳櫛

陳皮

黃芩

大黃

枳實

黑牽牛

生用

右為末煉蜜四如梧相子每服五七十四臨臥以溫熱水下

更量虛實加減

(濟生方) 平肝飲子治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿

頭暈嘔逆脈浮弦

防風

去芦

桂枝

不見火

枳殼

去穢

炒

赤芍藥

桔梗

各一兩

炒木香

不見火

人參

枳櫛

陳皮

甘草

炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

(濟生方) 紫蘇子湯治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶

腸鳴氣走瀝々有聲大小便不利脈虛緊而瀼

紫蘇子 一兩 大腹皮 草果仁 半夏 湯洗十次
厚朴 姜炒 木香 不見火 陳皮 木通
白木 枳實 去穢 人參 甘草 炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎服下拘時
〔濟生方〕枳實湯治腹脹發熱大便結脈多洪數此名熱脹

枳實 炒半兩 厚朴 姜炒一兩 大黃 酒蒸 桂心 不見火 甘草 炙各
右吹咀每服四錢水一盞薑棗煎服嘔者加半夏一分

〔濟生方〕朴附湯治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食
附子 炮去 厚朴 姜製各一分

右吹咀每服四錢水一盞薑七片棗二枚煎至八分溫服不
拘時加少木香尤佳

〔濟生方〕強中湯治食啖生冷過飲寒時水有傷脾胃遂成腹脹心
下痞滿有妨飲食是則腹痛

干姜 炮 白木 各一兩 青皮 陳皮 各去白 人參

丁香 各三兩 草果仁 附子 炮去 厚朴 姜炒 甘草 炙各

右吹咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎七分溫服不拘
時嘔者加半夏或食麩脹滿加蘿蔔子各半兩

〔濟生方〕桂香口治大人小兒過食雜菓傷脾令人腹脹氣急
肉桂 不見火 麝香 別研一錢

右為末用飯口如棗豆大大人十五口小兒七口熟水送下
〔濟生方〕大正無散治脾胃法弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹

滿有妨飲食 厚朴 姜炒 藿香葉 半夏 湯洗 陳皮 乾薑 炮各半

白木 各一兩 甘草 炙 枳實 去穢 桂枝 不見火 枳殼 去穢 炒

右吹咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎七分溫服
〔濟生方〕三稜煎口治心腹堅脹脇下緊硬胃中痞寒喘滿短氣

常服順氣寬中消積滯除膨脹 京三稜 生細切半斤搗為末以酒 青皮 去白 蘿蔔子 炒

神麴二炒 麥蘖炒 三兩 硃砂一飛 乾漆炒 杏仁湯去皮

右為末以三稜膏四如梧桐子每服二十四食後溫米飲下

〔澹寮方〕厚朴橘皮煎治傷冷澹泄腹肚脹其狀如覆栲白喘

息奔急氣不得舒

厚朴去皮 枳殼炒 乾薑炮 良薑洛分

青皮 陳皮各去白 肉桂去皮 全蝎去尾

右末醋糊四如梧桐子每服三十四生薑橘皮湯紫蘇湯下

〔澹寮方〕氣針四專治氣滯膨脹

全蝎并去毒 木香不見火 丁香 胡椒

肉豆蔻一兩 薑黃 青皮去白 各二兩

右末用蘿蔔子炒去殼取淨四兩爛研和菜用酒同姜汁各

少許煮糊四如梧桐子每服五十四煎紫蘇陳皮湯送下

〔澹寮方〕治氣鼓脇下痛引及背

青皮去白 川練子去巴 三稜 莪木煨

批

木通已炒 陳皮 甘草 枳榔

右吹咀每服四次水一盞橘皮橘葉同煎溫服

〔澹寮方〕導氣四治諸氣痞塞關膈不通腹脹如鼓大便虛秘又

治腎氣小腸氣等功効尤速

青皮水炒 莪木去毒 三稜去毒 枳榔去毒

菜萸去毒 乾薑炒 附子去毒 赤芍去毒

胡椒去毒 石菖蒲去毒

右各剉與所註茶炒熟去水蛭等並不用只以青皮等十件

為末酒糊四如梧桐子每服五四至七四空心紫蘇湯下

〔澹寮方〕附子粳米湯治喜怒憂思擾亂脇氣胃腹脹滿腸鳴走

氣嘔吐不食

半隻湯洗 粳米各 乾薑炮 甘草大 附子一枚

右吹咀每服四次水一盞二枚煎七分食前服

〔澹寮方〕煮附四治男子婦人氣虛膨脹或胃膈停痰或滯積氣

小便赤白濁並宜服之

香附子一法毛老薑六兩 不去皮鹽二兩 各上三件安砂茯苓神 去皮

北茴香淨白茯苓各 去皮各四兩大椒炒去目胡椒口者

右為末陳米糊如梧桐子每服五十回空心煎紫蘇湯下

小便多者研碎茴香濃煎湯下

〔按粹方〕中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治寒脹

人參去芦白木黃芩 去腐到炒半兩

炙甘草猪苓 各一兩黃連炒白茯苓各 去皮

縮砂仁乾生薑 各二枳實炒黃半各 湯洗七次

厚朴善製知母炒沃瀉三白陳皮

右細碾茯苓沃瀉生薑各為末另秤外共為細末秤入上

三味和勻水浸餅為丸如桐子大每服一百丸熱白湯送

下寒因熱用故焙熱服之食遠量人虛實加減

〔按粹方〕赤茯苓丸治脾濕大過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宜通

小便赤澁

葶藶四兩防己二兩赤茯苓乙兩木香半兩

右為細末麥肉為丸桐子大每服三十九並桑白皮湯送下

食前服

〔按粹方〕木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

木香三分厚朴四分青皮去白陳皮

益智仁白茯苓 各 沃瀉乾生薑

半隻湯洗吳茱萸洗當歸五分升麻

柴胡略草豆蔻皮蒼朮洗三分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓溫服食前忌生

冷及硬物息怒

〔按粹方〕木香分氣丸善治脾胃不和心腹脹兩脇脹脊膈注

滿腹嗽喘息刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有效

木香 檳榔 青皮去白 陳皮去白

蓬莪茂炮

乾生薑

當歸

姜黃

赤茯苓

白朮

枳殼麩炒

荆三稜 濕熱畏煨香

赤茯苓

肉豆蔻

秋冬加丁香炒

右為細末

白麩糊為丸 小豆大每服三五丸 生薑湯下忌

生加馬齒

按辨方調中順氣丸治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時

刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

京三稜

兩炮乙

大腹子

半夏湯洗

縮砂仁

檳榔

兩炮

沉香各半兩

右為細末水調為丸如桐子大每服三十九漸進五十九煎

陳皮湯下

積聚

五積六聚者五臟六腑之有所積聚也其為病諸書所載皆以
 內為喜怒哀憂思七情之氣剋制五臟結而不散乃成積聚之證
 故憂傷肺者以所勝傳之用遇夏則脾上旺傳射不行攻成肝
 積名曰肥氣其狀在左脇下大如覆杯似有頭足診其脈弦而
 細其色青兩脇下痛引小腹男子為積疝女子為癥聚失志傷
 腎者以所勝傳心遇秋則金肺旺傳射不行故成心積名曰伏
 梁其狀起於臍下大如臂猶梁之橫架於胃膈間診其脈沉細
 而花其色赤腹熱心煩面赤咽乾令人食少羸瘦甚則吐血怒
 傷肝者以所勝傳脾遇冬則腎水壯傳射不行故成脾積名曰
 痞氣其狀見於胃脘大如覆杯痞塞不通診其脈浮大而長其
 色黃遇飢則或遇飽則見腹常滿而足腫兼以嘔泄久則肉削
 令人四肢不收喜傷心者以所勝傳肺遇春則肝木旺傳射不

行故成肺積名曰息竟其狀覆在右脇下大如杯樣喘息奔隘
診其脉浮而毛其色白氣逆背痛目喜閉而瘡寒皮中時痛如
刺或如凡綠思傷脾者以所勝傳腎遇夏則心火旺傳對不行
故成腎積名曰奔豚其狀發於小腹或凌心下上下無時有若
奔走之狀診其脉沉而急其色黑飢則見飽則減小脘裏急腰
痛骨冷眼昏口乾久則令人骨痛少氣至如六聚之在六腑其
痛上下亦無常處在上則格在下則脹旁攻兩脇如有塊塊易
於轉動此其與五積為異耳雖曰氣之積聚而成此證余忖度
之必是因氣結聚廢飲或是積聚之物而後能堅硬如此發萌
之初早能辨其脉証投以茶餌或以導引之法尤云庶幾若其
見形於皮膚層之下某入腸胃薰蒸之所不及誠為難治之證九
積聚之脉實強者生沉小者死

(和劑方)丁香脾積丸方載諸氣門治諸食積結聚心腹引痛
(和劑方)溫白丸治心腹積聚久癥瘕塊大如杯棗心腸脹

二兩半
吳茱萸湯洗 皂莢去尖半兩 巴豆去皮心半兩 出油
柴胡去芦 乾薑炮 肉桂去皮 蜀椒去目炒汗 黃連
右為末入巴豆令勻煉蜜丸如梧桐子每服五丸薑湯下

(楊氏家藏方)木香檳榔煎治脾積氣塊腹脹走痛口吐清水

木香一兩 檳榔七枚 乾漆半兩 硃砂半兩 別研
肉豆蔻五枚 胡椒四十九粒 肉桂去皮一兩

右為末次入硃砂和勻煉蜜丸如梧桐子每服七丸薑皮湯下
(三因方)散聚湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心
腹絞痛攻刺腰脇小腹膜脹大小便不利

半隻湯洗 煨榔 當歸各三分 陳皮去白
杏仁去皮 桂心各二兩 茯苓
附子炮去皮 川芎 枳殼炒 厚朴姜製 吳茱萸湯泡

右咳咀每服四勺水一盞煎服大便不利加木黃

(三因方)肥氣回治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當飯頭 蒼朮 各一兩半 青皮 炒一兩 蛇含石 煨 醋淬

莪朮 三稜 鐵孕粉 略入醋煮三伏時久

右為末醋煮米糊日如菜豆大每服四十日當飯浸酒下

(三因方)伏梁回治心積起於臍上至心大如臂久不已病煩身體解股皆腫環臍而痛具脉沉而芤

茯苓 厚朴 人參 枳殼 去核 熬炒

白朮 半芩 湯洗 三稜 煨 各等分

右為末煮麩糊日如梧桐子米飲下二十四作散酒調亦可

(三因方)痞氣回治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收黃瘴飲食不為明層心痛徹背心其脉浮大而長

大烏頭 一分 炮去皮尖 附子 半兩 炮 赤石脂 煨 醋淬

川椒 炒出汗 乾薑 二兩 桂心 半兩

右為末蜜日如梧桐子朱砂為衣每服十日米湯下

(三因方)息黃湯治肺積在右脇中如覆杯久不愈病洒之寒熱氣逆喘咳發為肺癰其脉浮而毛

半芩 湯洗 吳茱萸 湯洗 桂心 人參

甘草 炙 桑白皮 炙 葶藶 各二兩半

右咳咀每服四勺水盞半薑七片棗二枚煎食前服

(三因方)奔豚湯治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨疼女氣其脉沉而滑

甘李根皮 干薑 各一分 當飯 川芎

白芍藥 甘草 炙 黃芩 各二兩 半芩 湯洗 四兩

右咳咀每服四勺水盞半煎七分服

(簡易秘方)勝紅回治脾積氣滯胃膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮 青皮 三稜 莪木二味同
乾薑炮 良薑 各一兩 香附炒去毛二兩

右為末醋糊四如梧桐子每版三十回姜湯下
〔本事方〕研破四治一切積聚痰飲心脇引痛

硃砂京三稜別末乾薑 香白芷

巴豆去油各 大黃別末 乾漆各一兩 木香

青皮 胡椒各一分 煨榔 肉豆蔻各一个

右為末曬醋二升煮巴豆五七沸復下三稜大黃末同煎三

五沸入硃砂同煎成膏却入別菜和勻拌回如菜豆大每服

五回姜湯下

〔本事方〕枳殼散治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶嘔吐痰逆口

苦吞酸常服順氣寬中除痰癖消積聚
枳殼 京三稜 陳皮 益智仁
莪木 煨榔 肉桂各一兩 乾姜

厚木 青皮 肉豆蔻 甘草

右咬咀每服三勺水一盞姜枣同煎七分熱服不拘時

〔濟生方〕香稜回治一切積聚破痰癖消癥塊

蓬木細切 巴豆去殼巴豆三十粒 青皮去白 丁香各半

川練子炒 茴香炒 京三稜酒浸 枳殼去白 木香不見

右為末醋煮麩糊四如梧桐子以朱砂為衣每服三十回姜

鹽湯下温酒亦可不拘時

〔濟生方〕如應回治老人一切虛寒痰癖積塊攻脹疼痛

黑附子皮一兩 胡椒各七 錘去 硃砂三勺 水一盞 化在鹽

木香不見火 破故紙炒 草撥各一兩

右將飛過硃砂末分在附子麩內却用所刺附子末蓋口以

冰和白麩裹約牛乳厚慢火內煨令黃熟去麩同木香等為

末却將元畏附子熟黃麩為末醋調煮粥四如菜豆大每服

二十四食後生薑湯下

〔濟生方〕磨積口治腸胃虛寒氣癖於背腹之外流于兩脇氣逆喘急久則榮衛凝滯潰為癰膿多致不救

胡椒一百五木香不見火全蝎去毒十个

右為末粟米飲為口如藜豆大每服二十四橘皮湯下

〔濟生方〕大七氣湯治五積六發狀如癥瘕隨氣上下發作有時

心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

益智仁兩半陳皮各去白朮三錢蓬朮香附子炒兩半

桔梗去芦肉桂不見火藿香葉甘草炙三分青皮

右咬咀每服五粒水二盞煎一盞去滓食前溫服

〔楊氏家藏方〕善合口方載翻胃門療中脘積聚痰氣胃膈結痞

〔百一選方〕五香蠲痛口方載脾胃門冷物所傷脾胃久積成癖

〔宜明方〕消飲丸治一切積聚痰癖氣塊及大小結背痛不能抑按

天南星半隻芫花自然銅各等分

右為末醋煮麩糊為丸如桐子每服五七丸食前溫水下

宿食

甚

人之有身藉五穀以生故胃以納之脾以剋化之脾胃喜暖不宜以生冷傷之脾虛者不善調養飢飽失時或過飡飲食并一切生冷之物脾胃怯弱不能剋化停蓄胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔惡胃滿噎噫或泄或利其臭如拍壞雞子或米穀不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之須究其原又須量人氣躰虛實病證淺深投以茶餌病之淺者則消化之甚者必須推利而後調補脾胃或有因挾寒暑之氣而泄者又當以脈證辨而料理〔和劑方〕丁香脾積口方載諸氣門治食積心腹膨脹不得剋化〔和劑方〕感應口治男子婦人小兒停積宿食冷物不能剋化有傷脾胃或泄瀉臭如拍壞雞子或下利膿血並宜服此通利

百草霜用朴家杏仁去皮川乾姜炮

巴豆七十粒肉豆蔻去皮

油研細如粉

膜

取仁要肥者

兩

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百一十

一百二十

一百三十

一百四十

一百五十

一百六十

一百七十

一百八十

一百九十

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

二百十

二百一十

二百二十

二百三十

二百四十

二百五十

二百六十

二百七十

二百八十

二百九十

三百

三百一

三百二

三百三

三百四

三百五

三百六

三百七

三百八

三百九

三百十

三百一十

三百二十

三百三十

三百四十

三百五十

三百六十

三百七十

三百八十

三百九十

四百

四百一

四百二

四百三

四百四

四百五

四百六

四百七

四百八

四百九

四百十

四百一十

四百二十

四百三十

四百四十

四百五十

四百六十

四百七十

四百八十

四百九十

五百

五百一

五百二

五百三

五百四

五百五

五百六

五百七

五百八

五百九

五百十

五百一十

五百二十

五百三十

五百四十

五百五十

五百六十

五百七十

五百八十

五百九十

六百

六百一

六百二

六百三

六百四

六百五

六百六

六百七

六百八

六百九

六百十

六百一十

六百二十

六百三十

六百四十

六百五十

六百六十

六百七十

六百八十

六百九十

七百

七百一

七百二

七百三

七百四

七百五

七百六

七百七

七百八

七百九

七百十

七百一十

七百二十

七百三十

七百四十

七百五十

七百六十

七百七十

七百八十

七百九十

八百

八百一

八百二

八百三

八百四

八百五

八百六

八百七

八百八

八百九

八百十

八百一十

八百二十

八百三十

八百四十

八百五十

八百六十

八百七十

八百八十

八百九十

九百

九百一

九百二

九百三

九百四

九百五

九百六

九百七

九百八

九百九

九百十

九百一十

九百二十

九百三十

九百四十

九百五十

九百六十

九百七十

九百八十

九百九十

一千

一千一

一千二

一千三

一千四

一千五

一千六

一千七

一千八

一千九

一千十

一千一十

一千二十

一千三十

一千四十

一千五十

一千六十

一千七十

一千八十

一千九十

二千

二千一

二千二

二千三

二千四

二千五

南木香 去芦二兩半 丁香 一兩半

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味并為細末与前三味同拌研令細用蠟篋先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾淨更以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔衣數淋傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤周凡春夏修台用清油一兩秋冬用清油一兩半於鍋內熬令香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項菜末成劑分作小錠子以油單紙裹之旋回服餅每服三十回空心姜湯下

(和劑方) 紅回子(方載脾胃門)壯脾胃消宿食去膨脹

(三因方) 五百回治宿食留飲積聚中脘噎息吞酸心腹刺痛

巴豆 膜別研 縮砂仁 胡椒 烏梅 去核 丁香

右件各一百箇為細末炊餅糊為回如菜豆大每服五七回熟水煨卧送下

(濟生方) 黑回子治中脘有宿食不消吞酸惡心口吐清水或心

腹刺痛飧泄如痢

烏梅肉 七個 百草霜 三分 杏仁 去皮尖別研 三七枚

巴豆 油去殼并 半隻 湯洗 七次 縮砂仁 三七枚

右為末和勻煮麩糊負如黍米大每服二十回姜湯下

(濟生方) 如意真治氣虛積冷停食不消心下堅痞噎宿腐氣及霍亂吐瀉米穀不消一切食癥之疾並皆治之

枳殼 去白 檳榔 陳皮 乾姜 黃連 去頭各

蓬朮 三稜 半隻 湯洗 七次 巴豆 三七粒 連殼用

右除巴豆外到如豆大用好醋煮乾去巴豆余藥焙為細末薄糊回如菜且大每服十回加至十五回用茶清姜湯任下食後溫服孕婦不宜服之

(濟生方) 阿魏回治脾胃怯弱過食肉麩生菜之物停滯中焦不

能射化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘悉皆生之 阿魏酒浸化 官桂 不見火 蓬朮 炒 麥蘗 炒

神麴炒 青攻 去白 蘿蔔炒 白木

乾姜炮 百草霜 三分 巴豆 去殼油 三七个

右為末和勻用薄糊口如菜豆大每服二十口不拘時姜湯送

上麴傷用麴湯下生菓傷用麴香湯下

浙方混元鄧山房神效感應口常服消宿食除積帶不助臑腑

陳皮 青皮 黃連 礞石 全丁香 蓬朮 濕紙裹服

香附子 見白 半隻 水浸去 三稜 畧煨 肥烏梅有肉者 一百文重 巴豆 三百粒 肥白者 去衣膜

已上藥各一兩淨研為細末 右用瓷罍一隻盛巴豆上以烏梅肉蓋之却用陳米醋浸過 與烏梅肉平於甕坐蒸至極熟以巴豆紅色為度却搗二件 令極爛次用糯米糝和前件諸藥搜勻搗千百杵以黑色為 度裹于口如蘿蔔子大每服一十口宿食不消陳皮湯下

帶苗香湯下酒後嘔吐淡姜湯下

〔按粹方〕丁香煨飯丸治食傷大陰又治卒心胃痛

丁香 一匁 丁香皮 三匁 炙甘草 匁二 甘松 三匁 去

縮砂仁 匁三 益智仁 匁三 京三稜 匁一 廣茂 匁一 炮

香附子 三 木香 一匁

右為細末湯浸餅為丸如菜豆大每服三十九白湯送下 或細嚼亦可不拘時候

〔按粹方〕消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈

黃連 去須 六匁 黃芩 剉 八匁 黃色 姜黃 白朮 各一兩

人參 四匁 甘草 匁二 縮砂仁 三匁 枳實 色 匁五 黃

橘皮 四匁 乾生薑 二匁 半隻 湯 煨 神麴 色 匁五 黃

〔二方〕加沃瀉 厚朴 各三 猪苓 二匁 半 右為細末湯浸餅為丸如桐子大每服五七十丸至百丸

白湯送下食後

〔按粹方〕木香枳木丸治破滯氣消飲食用胃進食
 木香一兩 枳實兩 白朮三兩
 右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大五十九丸溫水送下
 〔瘡寮方〕三稜煎丸方載膨脹門治膏中痞塞喘滿氣短常服順
 氣寬中消積滯

自汗

心之所藏在内者為血潑於外者為汗蓋汗乃心之液而自汗
 之證未有不由心腎俱虛而得之者故陰虛陽必湊發熱面目
 汗陽虛陰必乘發厥而自汗此固陰陽偏勝所致又有傷風中
 暑病濕兼以驚怖房室勞極歷節腸癰癢飲產辱等病亦能令
 人自汗如睡中不覺汗出者是名盜汗亦心虛所致其脈多微
 而滴濡而虛治之宜斂心氣益腎水使陰陽調和水火升降其
 汗自止自汗之證若兼以他病又當各類求之

〔和劑方〕三建湯一方載諸虛門一如汗不斂加肉桂黃耆治真氣不
 足上盛下虛面赤自汗小便頻數

〔和劑方〕牡蛎散治諸虛不足及大病後休虛津液不固休常自汗
 黃耆去苗土 麻黃根 淨洗各一兩 牡蛎煨研通赤

右咬咀每服三勺水一盞小麥百餘粒同煎八分不拘時服
 〔和劑方〕黃耆建中湯一方載諸虛門一男子婦人血氣不足常自汗

〔和劑方〕木附湯一方載感濕門一治風濕相搏不嘔不渴時或自汗
 〔和劑方〕麥煎散治榮衛不調夜多盜汗四肢煩夜肌肉消瘦

知母 石膏 甘草炙 滑石 白茯苓 醋半 人參
 地骨皮淨洗 赤芍藥 亭藎 杏仁 麩炒 麻黃 不去根
 右為末每服一勺浮麥煎湯調服

〔和劑方〕防己黃耆湯一方載感濕門一治風濕相搏時自汗出
 〔濟生方〕黃耆湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自
 汗或盜汗不止並宜服之

黃耆去芦蜜炙 白茯苓去皮 熟地黄 酒蒸肉桂 不見火

天門冬去心 麻黃根 虎骨各一兩 五味子

小麦炒 防風去芦 當歸酒浸 甘草炙各半兩

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎七分溫服不拘時發厥

自汗加熟附子發熱自汗加石解

(和劑方)正元散(方載諸虛門)治下元氣虛心腹脹滿夜嘗自汗

(澹寮方)撫芎湯治自汗頭眩痿逆惡心

撫芎 白木去油 橘紅各一兩 甘草炙半兩

右吹咀每服四勺水一盞姜七片煎至八分溫服

(和劑方)桂枝湯(方載傷寒門)治傷風脈浮自汗惡風

(濟生方)春附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆去芦蜜炙 附子炮 去皮臍各等分

右吹咀每服四勺水一盞姜十片煎八分食前溫服

(濟生方)小草湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃耆去芦 當歸酒浸 麥門冬去心

石斛去根 酸棗仁炒 去殼各一兩 人參 甘草炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

(濟生方)地仙散治大病後煩熱不安及一切虛勞煩熱並宜服之

地骨皮去木 防風去芦 甘草炙半兩

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

(三因方)人參竹茹湯治胃口有熱嘔吐咳嗽虛煩不安

人參半兩 竹茹半兩

右作六服用水一盞半姜七片竹茹一團並溫服一方加橘

紅一兩

(和劑方)辰砂炒香散(方載心痛門)治心氣不足精神恍惚虛煩

少睡

新編南北經驗醫方大成卷之六

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

新編南北經驗醫方大成卷之七

健忘

健忘者陡然而忘其返也雖曰此證皆由愛思過度損其心胞以致神舍不清遇事多忘然過思傷脾亦能令人健忘治之須兼理心脾神凝意定其証自除

(和劑方)寧志膏方載心痛門治心神恍惚一時健忘

(和劑方)定志丸治心氣不定恍惚多忘常服安神定志

遠志法醋心人參法醋菖蒲三兩白茯苓三兩右為末煉蜜四如梧桐子以朱砂為衣每服二十九丸米飲下

(和劑方)壽星丸方載中風門治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘

白木 茯神去木 黃耆去芦 龍眼肉

(濟生方)歸脾湯治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

酸枣仁各一兩 人參 木香各半兩 甘草炙一分半
右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎溫服不拘時
百一選方朱雀丸治心神不定事多健忘心火不降腎水不升
茯神去皮 沉香半兩 並為細末
右煉蜜丸如小豆大每服三十九食後人參湯下

癩痢

癩痢之疾諸方所載並作一證治之愚謂癩與痢雖以一藥而論故癩者全歸於心痢者歸乎五勝所謂癩者神不守舍言妄語如有所見動經年歲不得即愈若心經有損是為真病如心經蓄熱則當清心除熱如痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人因血氣迷心或因產後惡露上衝而語言錫亂神志不守者各當隨其証治所謂五痢者馬痢一痢雞痢猪痢牛痢是也其為証也卒然之祭旋暈顛倒口眼相引手足搐搦背脊

強直口吐涎沫食頃乃甦原其所因五勝之間或為七情之氣鬱結或為六淫之邪氣所傷閉塞諸經一時痰涎壅併心膈致有此證馬痢作馬嘶者應乎心羊痢作羊叫者應乎脾雞痢作雞聲者應乎胃猪痢作猪叫者應乎腎牛痢作牛吼者應乎肺此又以五行合五臟而言須詳考其因施以治法大抵當以祛痰順氣為先然後辨其有無風寒暑濕之氣方可補其五勝又有在母腹中受驚及幼小時有所感觸而成此證又當辨之
(和劑方)碧霞丹治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視時作搐搦并五種痢疾並皆治之

石綠細研九度 附子尖 烏頭尖 蝎指七十個
右為末入石綠令勻麩糊丸如雞頭大每服用薄荷汁半盞化下一回更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急斡開灌之

(和劑方)牛黃清心丸(方載中風門)治心氣不足神志不定驚恐

悽怖虛煩少睡常發狂竈言語錯亂

(三因方)六珍丹治風痲卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫指

通明雄黃 葉子雌黃 未鑽真珠各一兩
鉛或兩 藥 丹砂 半兩 水銀 一兩半

右為末研令極細蜜和杵三二下方日如梧桐子每服五

回姜枣湯吞下

(楊氏家藏方)五痲口治癩痲發作不同久年新日並宜服之

全蝎 二錢 去 半隻 洗二兩 雄黃 一錢 半 蜈蚣 半 条 去 頭 足 全
天南星 一兩 烏蛇 一兩 酒 浸 一 夕 射 香 別 研 白 礬 一 兩
白附子 半兩 皂角 四兩 槌碎 半升 將
白姜 一兩 半 炒 去 絲 朱砂 一 分 別 研

右為末姜汁煮麩糊丸如梧桐子每服三十九丸姜湯下

(楊氏家藏方)虎睛丸治痲疾發作涎潮搗搗精神恍惚肘作謔語

犀角屑 虎睛 一對 微炒 大黃 各 一 兩 遠志 各 心 梔子

右為末煉蜜口如菜豆大每服二十口溫酒食後送下

(濟生方)控涎丹治諸痲久不愈者頑涎結聚變生諸證並宜治之

生川烏 去皮 半隻 姜 蚕 屨 一 味 不 煨 到 一 生 姜 汁
全蝎 十 個 去 毒 鉄粉 三 錢 甘遂 二 錢 半

右為末姜汁打糊口如菜豆大朱砂為衣每服十五口食後

用姜湯下忌甘草

(百一選方)歸神口(方載心痛門)治心氣不足作事多忘癩痲

亂語並皆治之

(和劑方)金露口治痲迷心竅恍惚狂言婦人癩血上衝或歌或

笑言悟狂丸並皆治之

生乾地黄 焙 貝母 一 兩 各 巴豆 干 去 心 一 兩 鹽 三 十 沸 焙
黃連 二 兩 洗 梔子 去 皮 柴胡 去 皮 吳茱萸 七 湯 洗 防風 去 皮
紫苑 去 苗 菖蒲 一 兩 浸 乾 姜 炮 白 朮 各 去 皮 蜀椒 去 汗

厚朴去皮 枳殼去白 幣甲米醋 人參去芦 甘草炙
 甘松一兩 各 草烏頭一兩 芎藭去芦 桂心不見 (一方用丹遂)
 右為末以麩糊如梧桐子每服五口 心中癢患善湯下 心
 痛酸石槓皮湯下 口瘡蜜湯下 頭痛不膏湯葱茶下 一功脾
 氣攝皮湯下水瀉氣瀉陳皮湯下 赤白痢甘草乾姜湯下 曾
 疝噎通草湯下 婦人血氣當飯酒下 疝氣嵐氣小腸氣及
 下墜附子湯下 傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞鶴
 膝並用鹽湯鹽酒下

(三因方) 控涎丹 (方載痰氣門)

(濟生方) 八珍散 治產後血迷 心竅言謬不正狀如癲狂

人參 石菖蒲 生地黃 川芎 各 兩
 朱砂 別研 防風去芦 各 細辛 淨洗 甘草 炙半兩
 右為末每服一匙 薄荷湯下 不拘時地黃多恐膈脾胃不
 者以當飯代之

(濟生方) 黑龍丹 治產後敗血衝心不省人事狂言如癲

當飯去芦 酒浸 生地黃 五靈脂 川芎 高良姜 三兩
 以上剉入汝錫內紙筋鹽泥固脩炭火煨令通紅火冷取出
 細研入後茶
 生硫黃 花莖石 百草霜 乳香 琥珀
 右五味一兩 一匙細末同前茶和勻米醋煮麩糊如彈子
 大每服一四服時再入炭火煨茶通紅入姜汁內浸碎以無
 灰酒合童子小便頓服神效不可述

陰癩

陰癩之證其種有四 一曰腸癩 二曰氣癩 三曰外腎浮腫 四曰
 水癩 是也 究其所因 皆是腎經虛寒 或為勞役所傷 或為風濕
 之氣所侵 結而不散 久則腎氣虛憊 而成此證 外腎腫脹者 偏
 有大小 或堅硬如石 或臍腹絞痛 其則膏囊腫脹 成瘡 肘出黃

水病而至此未易治也腸癰亦然惟氣癰水癰元氣之可愈
又有小兒自生以表外腎偏墜者此又宿疾不必醫療可也
(和劑方)茱萸內消丸(方載諸氣門)治腎虛為邪氣所搏結成寒
疝伏留不去陰囊偏墜痛連膀胱小腸氣刺奔豚疼癢不可
忍者並皆治之

(和劑方)麝香大戟丸治陰癰腫脹并小腸氣

菊芋巴

兩

大戟

麝香

煨榔

回香

木香

川練子

附子

訶子

煨薑

煨酒

回香

木香

右為末獨留川練子以好酒二升葱白七枚長四寸煮川練

子去核取肉和菜杵口如梧桐子空心姜酒下十四

(濟生方)橘核丸治四種癰病知核腫脹有大小或堅硬如石痛

引臍腹甚則層囊腫脹成瘡時出黃水或成癰潰爛

橘核丸

海藻

昆布

海帶

木通

川練子

取肉

批仁

厚朴

姜炒

木通

木通

木通

枳實

桂心

不見火

木香

不見火

各半兩

各半兩

各半兩

各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯任下

虛寒甚者加熟川烏一两堅脹久不消者加同破二丸旋入

(濟生方)牡用散治小兒外腎偏墜

防風

牡丹皮

去木

各等分

各等分

各等分

各等分

各等分

各等分

各等分

右為末每服二丸溫酒調服如不飲酒鹽湯煎亦可

(活人書)竹皮湯療交接勞後陰囊腫脹痛入腹中刮竹青皮一

升以水三升煮一半去滓分服立愈

(百一選方)三茱丸治小腸氣并外腎腫痛

石茱萸

破故紙

香

青鹽

青皮

山茱萸

茴香

黑牽牛

吳茱萸

去翅

去翅

去翅

去翅

去翅

去翅

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子每服五十九先喫炒桃仁十

五个却以溫酒鹽湯送下炒茴香酒更佳

痼冷

人之身貴乎陰陽升降平和無偏若有偏勝是即為病痼冷之證皆以人身真陽耗散脾胃虛弱加以食凌冷物有傷其脾胃痼結其冷於臍府不散以致手足厥逆畏冷增寒飲食不化嘔吐涎沫或大腑洞泄或小便頻數其為証也尤多治之須暖下元兼理脾胃若又有脾虛而畏寒者令人咳嗽又當於咳嗽門求之

(和劑方) 姜附湯方載中寒門治一切沉寒痼冷諸証

(和劑方) 沉香畢澄茄散治內執積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃臍府自利小便滑數小腸一切氣痛並治之

- 附子炮去 畢澄茄
- 肉桂去皮 補骨脂炒 沉香
- 木香 川練子炮去 醋炒 川烏炮去 胡芦巴炒
- 巴戟天去心
- 桃仁去皮尖 兩

右以咀每服三盃水一盞入鹽少許並八分

(和劑方) 三建湯

(濟生方) 洞陽散治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脈細

- 附子炮去 鍾乳粉略 天雄官去 川烏
- 陽起石火煨 朱砂火特方 胡各一兩

(和劑方) 椒附回方 門治內狹積冷臍腹弦急痛引腰背

(澹寮方) 附子茴香散治氣虛積冷心腹絞痛

- 肉豆蔻 茴香炒 白朮炒 木香 人參
- 白茯苓 乾姜炒 附子炮去 下香甘草後略
- 右以咀每服三盃水一盞鹽少許煎七分空心服
- 紫沉並回治虛寒積冷伏滯陰氣心腹膨脹兩脇疼痛

巴豆霜一分 酒半升 先入 硫黃極細水研 青皮 胡椒
 何媿研半升 藥凡入七酒 棋柳 官桂不見火 乾姜三分 丁香
 良姜七兩 水煎六 沉香一斤 別煉 朱砂別研 木香不見火
 右為末次入硫黃朱砂二味研勻入前膏於臼內抹三十下
 曰如梧桐子每服三十九丸陳皮湯下
 百一選方雄朱丹治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變為癆瘵
 朱砂 雄黃各二兩
 以上用汝合 一个先以牡丹皮二兩內外薰黃入菜於內以
 白醋和臈茶作餅蓋定合口以赤石脂固濟合縫又用赤石
 脂泥裹合子一重再用黃泥密筋又裹一重先以草火燒令
 乾次以炭火五片漸添至一秤候火力稍清取出掘地坑
 一尺埋一宿去火毒取出研入後菜
 附子一 胡椒 赤石脂 官桂 丁香

萹撥 木香 沉香 白木略一 乳香半兩 當歸前
 右為末入前菜研勻以清酒二升二分熬去二分入附子末
 煮糊曰如梧桐子每服十元空心溫酒鹽湯任下

積熱

積熱者熱毒蘊積於其內也夫人固有体氣素實一時感觸熱
 毒之氣或鬱積臍膈之間或在心肺之內令人苦咽乾涎唾
 稠粘眼眵多淚口舌生瘡大小便秘結又有陰盛血衰三焦已
 燥服餌酒炙之物并丹石之藥愈助其熱結滯於內亦能令人
 變生諸証治之須詳其脈證若在心膈者清之結于臍膈者蕩
 滌之更量人氣体虛實輕重用藥
 和劑方三黃湯治積熱結滯臍膈大便和結心膈煩燥
 黃連去須 黃芩去須 大黃煨各十兩
 右咬咀每服四勺水一盞煎七分空心服

〔和劑方〕荆黃湯治風熱結滯或生瘡癩

荆芥 四兩 大黃 一兩

右吹咀每服三勺水一盞煎六分空心服

〔和劑方〕涼膈散治大人小兒胸膈積熱口舌生瘡瘰癧不利煩燥多渴腸胃不和泄便溺不利一切風熱並皆治之

連翹 二斤半 甘草 炙 川大黃 朴消 各二十兩

薄荷 葉 去梗 黃芩 山梔子 仁 各十兩

右吹咀每服三勺水一盞入竹葉七片蜜少許同煎食後服

〔和劑方〕洗心散治風塵痰滯心經積熱口苦唇燥眼眵多淚大便衣結小便赤澀

白朮 一兩半 麻黃 和節 當歸 去苗尾 荆芥 穗

芍藥 甘草 炙 大黃 面裹 煨 去面切

右為末每服二勺水一盞生薑薄荷各少許同煎溫服

〔和劑方〕八正散〔方載五淋門〕治大人小兒心經蘊熱咽乾口

目赤睛疼勝腑秘結小便赤澀

〔和劑方〕三黃湯治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤澀大便秘結並宜服之

黃連 去須 黃芩 去葉 大黃 煨 各十兩

右為末煉蜜如梧椰子每服四十丸熱水吞下一方用腦

麝香 為衣 同如大豆夜間陰化一兩同亦好

〔和劑方〕龍腦散一治蘊積邪熱咽喉腫痛心煩鼻衄又痰熱咳嗽中暑煩燥傷寒餘毒發熱並宜服之

縮砂 仁 荜薤 根 各三 藿香 葉 二兩 石膏 四兩

日草 六兩 大梔子 仁 微炒 十二兩

右為末每服二勺用新水入蜜調下傷寒餘毒潮熱蓋汗除

蜜入竹青煎服

〔和劑方〕龍腦雞蘇口消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽唾血鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾疽口甜膽疽

口苦並宜服之

柴胡浸一宿 二兩 和木通以湯半升 生乾地黄六兩

黃耆一兩 麥門冬四兩 阿膠如 蒲黃炒各二兩

甘草兩半 人參二兩 木通二兩 雜蘇一葉一斤

右除別研藥外並搗為衣將好蜜二斤先煉一二沸然後下

生乾地黄末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢火熬成膏勿

令焦然後將其餘藥末同和為圓如豌豆大每服二十元嚼

破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐

血麥門冬煎湯下惟諸淋用重煎子煎湯下

(和劑方) 甘露飲治胃中客熱牙宜齟腫咽膈乾燥吐氣腥臭或

胃經受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼而炒 石斛去芦 甘草炙 枇杷葉淨去毛 干熟地黄

黃芩去心 麥門冬去心 天門冬焙 山茵陳生干 地黄

(和劑方) 消毒犀角飲治大人小兒內蘊邪熱痰涎塵滯或腮項

結核過生瘡癤已出未出並宜服之

防風八兩 鼠粘子炒碎 荊芥穗 甘草炙各十

右咬咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

(和劑方) 碧雲治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒消 青黛 寒水石 石膏 煨各研升

朴消 消石 甘草並湯 馬牙硝各等分

右將甘草湯入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消溶入青

黛和勻噴破盒內候冷結凝成霜研為末每用以許含化嚥

津如喉閉不能嚥下用竹筒吹茶入喉中

(和劑方) 薄荷煎治口舌生瘡痰涎塵塞咽喉腫痛

薄荷一斤 縮砂仁半兩 腦子別研 川芎末兩

甘草半兩 取木二兩 右為末入腦子和勻煉蜜成劑任意嚥嚼和劑方無腦子

有桔更

御茶院方神芎四治心经積熱凡痰塵滯頭目赤腫或有瘡癩
咽膈不利大小便閉結一切風熱之證並宜服之

大黃生

黃芩各二兩

牽牛生

滑石各四兩

黃連

薄荷葉

川芎各半兩

右為末滴水四如梧桐子每服五十四溫水食後下

御茶院方酒蒸黃連四治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連半斤淨用酒二升浸以在器置

右為末滴水四如梧桐子每服五十四食前溫水吞下

御茶院方玄明粉以朴消煎過澄濾五七遍至夜於星月下露

至天明自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨

地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入

甘草生熟二兩為末一處攪勻臨睡時量用之或一錢二錢

露

此

以桃花煎湯或葱白湯下此茶大治邪熱所干膈上氣滯五
臟秘澁其朴消本性寒燒過性溫無毒

本事方清氣散治風塵痰涎上膈煩熱

枳殼

川芎

柴胡

前胡

茯苓

甘草

獨活

羌活

青皮

白木

人參

各半分

右為末每服二錢水一盞荆芥一穗煎七分服

經驗方大竺散治膈積熱煩躁多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子

去殼連翹各三錢甘草一兩

苡苳根一兩

六分

雞冠雄黃半兩鬱金用皂角水煮切片焙干三錢

右為末每服一錢食後臨卧新汲水調服

按粹方潤肺湯發明內治大腸燥結不通

升麻

當歸尾

生甘草

煨大黃

桃仁

麻黃

熟地黃各一錢

生地黃二錢

紅花三分

右件到如麻豆大都作一服水三盞先件茶濕煎至一盞熱服食前

(按粹方)滋腎丸發明內治不渴小便閉邪熱在血分也

黃蘗 三兩 剉碎 酒拌 蒸十 知母 二兩 酒蒸 干肉桂 一兩 半

右上一味氣俱厚以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂當火邪同
休故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熱水為九百淋湯下

吐血 (附) 咳血 衄血

人身之血猶水行地中百川皆理則無壅決之患一身之間榮
衛失調七情四氣相干氣血逆亂然後變生吐血咳血諸證夫
血之妄行固由積熱所致然其證多端難以一槩而論有因飲
食過飽負重傷胃而吐者有思慮傷心并積熱而吐血衄血者
有勞傷心肺又為七情所干而咳血吐血者心主血肝藏之而
脾為之統過思傷脾亦能令人吐血治之須究其因傷胃者調
胃安血勞心者補益其心志熱則清之氣鬱則順之傷脾則安
之吐血之脈宜沉細不喜浮數吐而不咳者易治唾中帶紅線

者難醫為其有所損故也病之淺者惟有早灸膏肓而已致若
肺生疝瘡從高墜下一應傷折皆能吐血傷寒汗後不解鬱結
經絡隨氣湧泄吐血衄血又當從各類求之

(和劑方)大阿膠 治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血
勞傷肺胃吐血嘔血並宜服之

麥門冬 去心 乾山藥 熟干地黄 各 五味子 杜仲 各 半兩

遠志 去心 川參 防風 各 半兩 貝母 炒 茯苓 各 一兩

阿膠 炒 一兩 茯神 去木 白朮 根 栝子仁 人參 各 一兩

右為末煉蜜 四如彈子大每服一元水一盞煎六分 和滓服

(和劑方)龍腦雞蘇 治方載積熱門 治膈熱咳嗽或吐血衄血
(和劑方)必勝散 治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並治之

小薊 并根用 人參 去芦 蒲黃 炒 當歸 去芦

熟乾地黄 川芎 烏梅 去核 各 一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

(和劑方)批把葉散(方載中暑門)治暑毒攻心嘔吐鮮血

(和劑方)鵬散治大人小兒喉閉生瘡疔瘻熱毒鼻衄出血

山菜六斤生腦子七兩研甘草二十兩牙硝四兩

鵬散生別研麝香四兩研

右為末每服半錢如茶煎服

(和劑方)三黃元(方載積熱門)治積熱吐血咽膈不利

(三因方)龍骨散治鼻衄過多用龍骨不拘多少研為末用少許

吹入鼻中凡九竅出血皆可用此茶吹之一方用拖子如前

(三因方)扶令補心湯(方載心痛門)治心虛為邪氣所傷吐血

(御茶院方)麝香取治鼻衄不止

白礬別研白龍骨各半兩麝香別研半字

右三味拌和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹

茶於鼻中或以濕紙一茶鼻內尤妙

(本事方)茜梅元治衄血無管

茜草根 艾葉 各一兩 烏梅肉 焙于半兩

右為末煉蜜元如梧桐子每服二十四烏梅湯下

(本事方)天門冬元治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬一兩甘草 白茯苓 阿膠各半兩杏仁炒 貝母

右為末煉蜜元如梧桐子每服一元嚥津嚥化日夜可十元

(簡易方)是齋白木散治積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷

胃而吐血者最宜服之惟忌食熱煎炒一切發風之物

白木三兩人參去芦 白茯苓去皮 黃耆一兩 柴胡去芦

山菜 百合三分 甘草炙半兩 前胡去芦 柴胡去芦

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎六分溫服

(簡易方)王醫師固榮散治叶血便血

白芷半兩 真蒲黃炒 甘草炙三分 地榆去芦一兩

右咬咀每服二錢溫酒調服如氣壯人加石膏半兩

(簡易方)選奇董香散治咳血成勞肌體消瘦常服能解肌熱

黃耆蜜炙 麥門冬去心 熟地黄 桔梗炒

白芍藥醋一 甘草炙一方

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分溫服

〔濟生方〕歸脾湯方載健忘門治思慮傷脾不能統攝心血以此

行或吐血下血

〔濟生方〕犀角地黄湯治傷寒汗下不解鬱干經絡隨氣湧泄為

衄血或清道閉塞流入胃脘吐出血如鼻衄吐血不盡餘血

番致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角 生地黄 白芍藥 牡丹皮去木各

右咬咀每服四錢水一盞煎八分溫服如潮熱發壯加黃芩

大黃腹滿脉大而遲只依本方不須加減

〔濟生方〕茜根散治鼻衄不止

茜根 側柏葉 阿膠蛤粉炒 黃芩 生地黄兩 甘草酸半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎八分溫服不拘時

〔濟生方〕天門冬湯治思慮傷心吐血衄血

遠志乾心 白芍藥 天門冬 麥門冬各去心

黃耆去芦 藕節 阿膠蛤粉炒 沒藥

當歸去芦 生地黄兩 人參 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

〔濟生方〕大薊散治飲啖辛熱傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽

大薊根洗 犀角 升麻 桑白皮炙

蒲黃炒 杏仁去皮 甘草炙半兩 桔梗炒一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

〔濟生方〕加味理中湯治飲酒傷胃遂成吐血

乾姜炮 人參 白朮各一兩 乾葛 甘草炙各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服不拘時

〔濟生方〕雞蘇散治勞傷脉經唾內有血咽喉不利

雞蘇葉 黃耆去芦 生地黄洗 阿膠蛤粉炒 貝母去心

白茅根兩 桔梗去芦 麥門冬去心 蒲黃炒 甘草炙各

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎七分溫服不拘時

〔濟生方〕藕汁飲治吐血衄血不止

生藕汁 生地黄汁 大菊汁各三 生薑一

右件茶汁調和令勻每服一小盞不拘時

〔濟生方〕赤芍藥湯治瘀血蓄積心下脹滿食入即嘔名曰血嘔

赤芍藥半斤 陳皮一兩

右吹咀每服四錢水一盞姜七片煎七分溫服不拘時

〔大全良方〕四生四九吐血衄血陽兼於陰血熱妄行宜服此

生荷葉 生艾葉 生栝葉 生地黄各等分

右爛研四如雞子大每服一四水三盞煎一盞濾過溫服

〔活人書〕黃芩芍藥湯治鼻衄

黃芩 芍藥 甘草各等分

右吹咀每服三錢水一盞煎六分溫服

〔百一選方〕治鼻衄用局方四物湯加側柏葉煎服

〔按粹方〕門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參五分 黃耆乙女 五味子乙女 芍藥

甘草乙女 紫苑乙女 當歸身 麥門冬各五分

右吹咀分作二服水煎食後

〔按粹方〕黃芩芍藥湯治虛寒不能飲食衄血吐血

黃芩 白芍藥 甘草一 法加生薑黃耆

右二藥治傷寒衄血吐血嘔血

〔按粹方〕雲歧子犀角地黄湯寸花血在上焦

生地黄二兩 黃芩乙兩半 黃連乙兩 大黃半兩

右吹咀水二盞秤一兩煎至一盞去滓食後服

〔按粹方〕生地黄湯治鼻衄昏迷不省

生地黄三五斤 如不暇取汁使患者生喫吸汁又以其冲塞

鼻須更血止取服汁尤佳

下血

人之滋養一身惟氣與血血為榮氣為衛榮行脈中衛行脈外故心主血肝藏之而脾為之統貴於氣順則血調若內因七情并酒食所傷外為四氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人下血若風入腸胃者其脈浮下血必在糞前是名近血停積于大腸者其脈沉滯血在糞後又各遠血脫寒者其脈沉微下血無痛積熱者其脈洪數純下鮮血甚則兼痛傷濕者脈沉而遲下血如豆汁又有因氣鬱結酒色過度并過食多膾因毒生喪亦能令人下血又當以五臟所傷辨其證治風濕則祛之寒則溫之熱則清之停滯則疎滲之氣則調之有毒者解利之下血之證非止一端大槩血得熱而行遇黑而止用某當審之

(和劑方)敗毒散(方載傷寒門)治凡熱流入大腸經下血不出因酒食毒加巴豆炒黃連去巴不用

藎

(和劑方)胃風湯(方載下痢門)治風溫乘虛入于腸胃或下瘀血者

荆芥 二兩 燒 亂髮

枳殼 去白 二兩 燒 一兩

槐花

甘草 炙

槐角 各一兩 燒

蝟皮 兩 各

右將所燒藥同入藎籠內黃泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼搗羅為末每服三勺水一盞煎七分空心服

(和劑方)黃連香薷散(方載中暑門)治伏暑純下鮮血

(和劑方)黑玉丹治腸風積熱下血不止

刺蝟皮 兩 十 到 猪鬃蹄 個 百

牛角腮 兩 十 到 槐角 六兩

敗梭 一 八 兩

脂麻 四兩

苦練根 五兩

亂髮 皂角 水 洗

雷丸

藎

右剉碎用藎籠內燒存性研為細末入乳香二兩麝香八分研和令勻用酒打麪糊丸如梧桐子每服二十粒先細嚼胡椒一枚空心以溫酒吞下多進得效

(和劑方)香連丸(方載下痢門)治冷熱不謂下血如痢

〔和劑方〕槐角丸治五種陽風下血痔瘡脫肛下血並宜服之

槐角去一兩地榆

黃芩

當歸去芦酒浸一宿焙干

防風去芦

枳殼去白殼炒各半斤

右為末酒糊丸如梧桐子每服三十九空心米飲下

〔和劑方〕三黃丸方載積熱門治三焦蘊熱下瘀血者

〔三因方〕伏龍肝湯治先黃後血謂之遠血兼治吐血

伏龍肝半斤甘草炙

白朮

阿膠

黃芩 乾地黃各三兩千金作干姜

右咬咀每服四勺水一盞煎空心服虛者加附子

〔本事方〕槐花散治腸風膿毒下血

槐花炒

枳殼

荆芥穗

枳殼各等分

右為末每服二勺空心米飲調下

〔本事方〕槐角散治腸胃不調脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼各一兩 槐角二兩

甘草

烏梅

右咬咀每服五勺水一盞煎服

〔楊氏家藏方〕聚金丹治腸胃積熱或因酒毒大便下血腹中熱痛作渴脈來弦數

黃連

炒一兩

兩

水浸

一兩

生用

黃芩

防風

去芦各

二兩

右為末煮麩糊丸如梧桐子每服五十九米泔浸枳殼水下

不拘時冬月宜入大黃一兩

〔濟生方〕蒜連丸治勝毒下血鷹爪黃連去須不拘多少為末用

抽頭蒜一個煨香熟研和入白杵極爛丸如梧桐子每服四

十九空心陳米飲下

〔濟生方〕烏梅丸治大便下血不止烏梅三兩燒存性為末用好

醋打米糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

〔濟生方〕加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉

生地黃

當歸

酒浸

川芎 各一兩

枳殼去白 荆芥穗 槐花炒 甘草炙 各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜三片烏梅女許同煎空心溫服

烏梅同接燒 香白芷不見 百藥煎燒反存性各等分

右為末米糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

濟生方 斷紅丸 治腸腑虛寒下血不止面色痿黃日久癰瘻

側柏葉炒黃 川續斷酒浸 鹿茸去毛 附子炮去皮臍

黃耆去芦 阿膠炮粉炒 當歸去芦酒浸 白芷各一兩 枯半兩

右為末醋煮米糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

宣明方 黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連 雞冠花 貫衆 川大黃

烏梅略 甘草炙

右為末每服或夕用溫米一下日三服不計時候

張子和方 黃連貫衆散 治腸風

黃連 雞冠花 貫衆 大黃各二兩

烏梅二兩 甘草三錢炙 枳殼炮 荆芥各二兩

右為細末二大錢溫米飲下食前

按粹方 當歸和血散 治腸癖下血溫毒下血

槐花 青皮各六分 當歸身 升麻各二錢

荆芥穗六分 川芎四分 熟地黃 白木各六分

右為細末每服二三錢清米飲調下食前

按粹方 升陽去熱和血湯 治腸癖下血作派其血唧出有力而

遠射四散如篩春二月中下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱

毒所作也當去溫毒和血而愈

生地黃 牡丹皮 生甘草焙 熟甘草

黃耆各二錢 當歸身 熟乾地黃 蒼朮

秦艽 肉桂各三分 橘皮二分 升麻七分

白芍藥二分半

右咬咀都作一服水四盞並至一盞去滓稍熱服空心

(按粹方)結毒丹治腸風下血藏毒下血諸大便血疾
枳殼去心 葶藶去心 藏靈仙 黃耆 陳皮去
椿根白皮 何首烏 荆芥穗 已上各半兩

右為末酒糊為丸桐子大每服五七十九陳米飲入醋少許
煎過放溫送下

(按粹方)阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血
黃連炒 二 梔子仁 半兩 阿膠炙 令 黃蘗去粗皮炙

右為粗末每服四錢水一盞並服無時
(經驗方)地骨皮散治腸風痔瘻下血不止

地骨皮 鳳眼根皮 並用 一 一 者 一 去土不用
右二味各等分同炒微黃色搗為細末每服三錢空心溫酒
服忌油膩物食

痔漏

痔之五種牡痔腸痔血痔牝痔脉痔是也究其所因皆素蘊
熱毒或過食燒炙新酒久坐血脉不流或因七情之氣鬱結乎
臍膈之間其毒不能消散發而為痔或藏於肛門之內或突出
於外大者如蓮花雞冠核桃之狀小者如牛疥雞心鼠尾櫻桃
之類名狀更多其實皆山勝毒所致故蘊毒深者其狀大蘊毒
小者其形小或流膿水或出鮮血行坐之間病者殊為之苦久
而不治血氣衰弱必然成漏今之治法多用刀線割剔其痔雖
有藥可以封固然其毒在內無由而去必有再作之理否則成
漏轉而為難治之證諸方多有服食敷貼之藥今人用之必見
有效揆度其理其病既有形於外非服藥之能愈必須用去毒
消痔之藥點之俟其毒盡痔消方可為愈切不可用砒霜等毒
藥恐致人奄忽慎之慎之又無痔者肛門左右別有一竅流

出膿血名為單漏治之須用溫煖之菜補其內又以生肌肉之
菜敷於外其竅在皮膚者易愈勝胸右損而生竅者未易治也
〔和劑方〕槐白皮膏治內外諸痔久年不愈者
〔和劑方〕槐白皮膏治內外諸痔久年不愈者

槐白皮 棟實 各五兩 赤小豆 二合 桃仁 六十枚
當飯 三兩 甘草 白芷 各二兩

右咬咀以煎成猪膏一斤微火煎至黃色菜可成膏以貼瘡
〔御藥院方〕槿藤子丸治腸癖下血痔漏結核疼痛

茴香炒 槿藤子 一个 重七錢者 皂角刺 燒存性 枯白礬
枳殼 去白 煨皮 半兩 白附子 炮 乳香 二錢半 蝟皮 燒存性
右為末醋麩糊丸如梧桐子每服五十回空心溫酒下如痔
瘡痛醋研五七團塗患處

〔三因方〕五灰散治五種痔不問內外並宜服之

蠶甲 治壯 蝟皮 北 蜂房 月 蛇蛻 一 諸左足懸蹄 日 治 一 一

右燒 隨證倍用二分為末并花水調二錢空心卧時服
〔本事方〕洗痔方枳殼不拘多少為末每服二錢水一大椀
瓶內煎百沸先以黃蘗而後洗之
〔濟生方〕蝟皮日治五種痔漏

猪左足蹄 黃牛角腮 蝟皮 一枚 同 防風 去芦
貫衆 槐用子 炒 蠶甲 半兩 枳殼 去白生用
雞冠花 槐花 炒 黃耆 去芦 雷丸 黃連
香白芷 當飯 酒浸 油髮灰 玄參 麝香 別研半錢

右為末米糊日如梧桐子每服百回空心以米飲湯送下年
高并虛弱者不宜服

〔濟生方〕蝟牛膏敷痔有效蝟牛一枚麝香少許用小破合子盛
蝟牛以麝香搽之次早取汁塗痔處
〔經驗方〕五丁膏治痔一切蘊毒癢為痔瘡不問遠年近日取
似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外並皆治之此方親傳之專科

劉叔茂累試皆驗不敢自秘

蕎麥灰半斗 荆柴 老枝枝 山白竹 剝柴

以上四般柴截作二尺許長以斧鑿破成片各取一束曬乾於火上燒過置攤內為炭防為風所化俟燒盡却以水於窩內煮出灰汁又用酒滿以花帛實其窩置蕎麥灰於酒漏內以所煮四股炭汁淋之然後取汁於窩內慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰固丹和成膏以瓦瓶貯之上用石灰傳而不令走氣臨用時却去石灰以冷水調用冷病者以水洗洗淨痔瘡仰卧抬一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹篋挑茶塗痔上須臾痛息用紙搭去茶再塗如此三四遍要痔瘡如墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五遍六七日後膿穢出盡其瘡自消

（經驗方）黑山子專治久年痔漏下血用之累驗
乾姜 百草霜一兩 木饅頭二兩 烏梅

敗櫻

栢葉

油髮各五錢

以上七味各燒灰存性却入後菜

桂心三錢

白芷五錢 各不見火

右九味為末醋糊四如栢桐子空心米飲下三十日

寬腸四五灰膏塗痔瘡之後或腸臍秘結不通者用此菜寬腸

黃連

枳殼各等分

右為末麩糊四如栢桐子每服五十日空心米飲下

（宣明方香殼丸）治濕熱內甚因而飽食腸癖為諸痔久而成痔

木香

黃蘗各三

枳殼去穢

厚朴各半

黃連一兩

蠟皮一個

當飯四錢

荆芥穗三錢

右為末麵糊為丸如栢桐子大每服二三十丸溫水下食前服

（一方）黃耆葛花丸治腸中久積熱痔瘻不血疼痛

黃耆

葛花

生地黄焙

黃赤小豆花各

大黃

赤芍藥

黃芩

當飯各三

蛭皮一个 抵柳 白茯苓 皂角子仁半两
 右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九至三十九煎桑白
 皮湯下食前槐子煎湯下亦得
 (按辨方)蒲黃散治下部痔漏
 蒲黃一兩 血竭半兩
 右為細末每用少許貼患处

脫肛

月 大腸為表裏故肺勝蘊熱則肛門閉結肺勝虛寒則肛門
 脫出此三因之論又有婦人產育用力過多及小兒久痢後勝
 寒皆能使肛門突出治之必須溫肺勝補腸胃久則自能收矣
 (和劑方)釣腸口治內外諸痔及肛門腫痛或下膿血腸風下血
 以致肛門脫出並宜服之
 苾蓐二匁燒 胡桃仁十五个 不油者 燒存性 白礬煨 白附子

雞冠花兩 炒 枳殼去白 炒 附子去皮 生 訶子各二核 去核
 白礬各半 右為末以醋煮麩糊如梧桐子每服三十回空心溫酒下
 (和劑方)乳香口治諸痔并腸風下血肛邊或生結核腫痛或已
 成瘡大使艱難肛腸脫出
 枳殼去白 炒 牡礪煨半兩 乳香研 白丁香各一分
 華澄茄煨半兩 大黃蒸焙 鶴虱炒 芫菁去頭足 各半兩
 右為末粟米糊口如梧桐子每服二十四回腸氣臘茶清下諸
 痔煎薤白湯下諸漏煎鐵屑湯並空心下
 (三因方)蛭皮散或肛門或因洞泄或因用力太過脫出不收
 蛭皮一个燒 磁石煨等分 桂心各半兩
 右為末每服二錢米飲空湯調下肘後方治女人陰脫加鱉
 頭一枚燒灰研入
 (三因方)香荆散治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子

荊艾穗各等分

右為末每服三匙水一大椀煎熱淋洗又方用五倍子為末每用三錢入白礬一塊水二椀煎洗立效又方用木賊不以多少燒存性為細末糝肛門上按入即愈

三因方聖散子治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少許為細末乾貼患處

百一選方治脫肛以槐花槐角各等分炒黃為末用羊血蘸菜炙熱食之以酒送下以猪膽去皮蘸菜炙服亦可

紫葢膏治勝熱肛門脫出以紫背葢一大握又名魚腥草搗爛如泥先用朴消水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用菜於臀下貼坐自然收入

遺尿失禁

人之流尿藉心腎二氣之所傳送蓋心與小腸為表裏腎與膀

胱為表裏若心腎氣虧陽氣衰冷傳送失度則必有遺尿失禁之患故經云膀胱不利為癃不約為遺是也治之宜補送下元清心寡欲又有產蓐不順致傷膀胱及小兒胞冷俱能令人遺尿失禁又當隨證施治

和劑方二氣丹治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小便不禁

硫黃細研

肉桂去皮為末各一分

乾姜炮為末

朱砂研為末

附子一投大者胞去皮臍為末半兩

以麩糊為四如梧桐子每服五十四鹽湯空心下

佛萊院方秘元丹治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨三兩

呵子十枚

縮砂一兩

靈砂一兩

右為末麥糯米粥丸如梧桐子每服五十四空心鹽酒下

三因方家韭子曰治大人小兒下元虛冷小便不禁或成白濁

常服補養元氣進美飲食

家韭子六兩

鹿茸四兩

菴蓉酒浸

牛膝酒

熟地黄 當飯各二兩 巴戟 去心 兔絲子 酒浸 各

杜仲 去皮 炒 石斛 去苗 桂心 乾姜 炮者 一兩

右為末 酒糊 如梧桐子 每服一百口 空心 鹽湯 溫酒 任下
小兒 須作 小口 服之

(三因方) 茯苓 白茯苓 各等分

赤茯苓 白茯苓 各等分

右為末 以新汲水 梅洗 澄去新沫 控干 別取 地黄汁 与好酒
同於 銀石器 內熬成膏 搜和 如彈子 大空心 鹽酒 嚼一

(三因方) 雞內金 散治遺尿失禁

雞脰脰 一具 并腸 淨洗 燒為灰 男用 雌者 女用 雄者

右研為末 每服二勺 酒飲 調服

(濟生方) 兔絲子 日治小便多 或致失禁

兔絲子 洗淨 附子 泡去皮

鹿茸 酒炙 各 肉蓯蓉 二兩 雞脰脰 炙 桑螵蛸 酒炙

右為末 酒糊 九如梧桐子 每服七十九 空心 鹽湯 鹽酒 任下

(澄齋方) 治小便遺失

阿膠 炒珠子 牡礪 煨 鹿茸 酒炙 桑螵蛸 酒炙 各

右為末 糯米糊 九如梧桐子 每服五十粒 空心 鹽酒 下

(澄齋方) 桑螵蛸 散治男子小便頻數 如稠米 泔色 此由勞傷 心

腎得之 有服此 藥不終劑 而愈 大能安神 定志

桑螵蛸 鹽水 遠志 去心 菖蒲 鹽炙 龍骨

人參 茯神 當飯 蠶甲 醋炙 各

右為末 每服二勺 臨卧時 人參湯 調服

咽喉 (附) 重舌

咽喉者 為一身之樞要 与胃相接 呼吸之所 從出 若胃膈之間
蘊積 熱毒 致生風痰 壅滯 不散 發而為咽喉之病 喉內生瘡 或
狀如肉 高為腫 為痛 窒塞 不通 吐涎 不下 甚則 生出重舌 治之

尤宜先去瓜痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝于上腭而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病須詳審其証施以治法

(和劑方)其特湯治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所礙

苦桔梗 一兩 甘草 炒二兩

右咬咀毒服三勺水一盞煎七分食後溫服

(和劑方)如聖勝金錠治咽喉急閉腮頰腫痛并單蛾双蛾結喉重舌木舌並皆治之

硫黃 細研 川芎 臘茶 薄荷 去枝梗

川烏 炮 硝石 研 生地黃 各二兩

右為末烈生葱汁搜和為錠每服先用新汲水灌漱次嚼生

薄荷五七葉却用茶一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連進

三服并以此錠安患處其病隨茶便消

(和劑方)荆黃湯方載積熱門治(腑實熱咽喉腫痛大便秘結

咽喉之証多是風熱上壅然後成之非實熱不可服

(和劑方)五香散治咽喉腫痛毒氣結塞不通急宜服之

木香 沉香 雞舌香 麝香 三分別研 薰陸香 各一

右為末入麝香研勻每服二勺水一盞煎服不拘時

(御藥院方)碧玉園治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞冰漿不下

或生瘡癰重舌木舌並宜服之

青黛 盆硝 蒲黃 甘草末 各一兩

右同研勻用汝糖丸每兩作五十九元每服一元噙化或一

茶末摻咽膈內亦如

(御藥院方)麝香朱砂園治咽喉腫閉或作瘡癰或舌根脹

馬牙消 性用 鈿白霜 三勺 鵬砂 三兩 龍腦 三勺

燒寒水石 棟半者 麝香 二勺 朱砂 半兩 甘草 一十兩

右研極細用甘草膏和丸如梧桐子朱砂為衣噙化一二元

(御藥院方)如聖散治瓜痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

雄黃 細研

白礬

飛過 葱芦 厚皮去心 不可生用

猪牙皂角

去皮 炙

右為末用一字嚙入鼻內吐痰為愈

(三因方) 玉鑰匙治心熱喉閉及纏喉風

焰消

一兩半

鴨砂

半兩

腦子

一字

白毒蚕

一分

右研勻以竹管吹半入喉中立愈

(三因方) 塞附子治腑寒咽閉吞吐不利用大附子一隻去皮臍

切作大片塞塗灸令黃舍一津甘味盡更以附子片塗塗灸用

(三因方) 解毒雄黃丸治纏喉唯風及上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛

雄黃 飛

鬱金

各一分

巴豆

去皮出油

二七個

右為末醋糊丸如菜豆大茶清下七丸吐出頑涎即愈

(楊氏家藏方) 一字散治喉閉氣塞不進飲食不下者

雄黃 別研

蝎梢

七枚

白礬

生研

藜芦

各一分

猪牙皂角

七

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎為愈

(簡易方) 烏犀膏治咽喉腫痛及一切結喉燥喉道與纏喉閉喉

急喉飛絲

入喉壅舌木舌等證

皂莢

兩條

碎用冰

三升

浸一肘久

好酒

一合

研破

甘草

二

汁

右拌和前茶用

鴨毛

點少許於喉中

以出盡頑涎為度却嚼

甘草

二

汁

荅津

若木舌先以粗布蘸水搭舌令軟次用

姜片擦之然後用茶

(本事方) 利隔湯治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉

荊芥穗

防風

桔梗

甘草

各一兩

右為末每服二錢沸湯煎服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

(濟生方) 二聖散治纏喉風急喉痺

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

炒去絲

齒半兩

右為末每用少許以竹管吹入喉中

牛蒡子

炒

甘草

各一兩

右為末每服二錢沸湯煎服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

(濟生方) 二聖散治纏喉風急喉痺

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

炒去絲

齒半兩

右為末每服二錢沸湯煎服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

(濟生方) 二聖散治纏喉風急喉痺

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

炒去絲

齒半兩

右為末每用少許以竹管吹入喉中

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

炒去絲

齒半兩

右為末每用少許以竹管吹入喉中

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

炒去絲

齒半兩

右為末每用少許以竹管吹入喉中

(濟生方) 二聖散治纏喉風急喉痺

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

炒去絲

齒半兩

右為末每用少許以竹管吹入喉中

鴨窠膽

二錢半

白毒蚕

（濟生方）白礬散治纏喉風急喉閉

白礬 三錢 巴豆 三枚 去殼分作六辨

右將白礬於鉢內慢火熬化為水置巴豆其內喉乾去巴豆取白礬研為末每用少許以竹管吹入喉中立愈本方去巴用烏雞子清調白礬灌入喉內

（濟生方）絳雪散治咽喉腫痛噤物妨碍及口舌生瘡

龍腦 半字 鵬砂 一錢 硃砂 三錢 馬牙硝 半錢 寒水石 一錢

右研勻每用一字搽於舌上津燕之

（百一選方）治咽喉腫閉以山豆根洗淨新汲水浸少時用一塊

入口中嚙之嚙下苦汁未愈再用又方用甘草白礬為末每以半錢許入口中津液嚙下

（濟察方）牛蒡子湯治風熱上攻塵咽喉腫痛或生癰瘡有如肉齧

牛蒡子 玄參 升麻 桔梗 去苦
犀角 鎊 黃芩 木通 去節 甘草 各等分

右以咀每服四錢水一盞姜三片煎八分溫服不拘時

治喉痺胃用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁

吞下或動大胸即解或用醃醋同研取汁嚙引出涎更妙

治咽喉腫痛方用欵艾葉旋取研汁逐時吞下亦佳

（經驗方）治喉閉用鼓槌草土牛膝以二味生搗爛取汁灌下

否則灌鼻中得吐即為愈

（經驗方）治咽喉用土烏茶即一棹根以酸醋兩盞煎一盞先

嚙後嚙後吐出痰涎為愈

（經驗方）治咽喉牙關緊閉用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹

管煎出巴豆油在紙上以此紙作摺子點燈吹滅以煙薰入鼻

中即時口鼻涎流牙關開矣

（按粹方）催急如聖散治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關

緊急不省人事

雄黃 細研 燕草 生用 白礬 飛 一 猪牙皂角 去皮炙黃

右等分為細末每用一豆大鼻內噓立効

張子和方治走馬咽痺
右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右
但有者用二枚

眼目

人之有兩眼猶天之有兩曜視万物察纖毫何所不至日月有
一時之晦者風雲雷雨之所致也眼之失明者四氣七情之為
害也大抵眼目為五勝之精華一身之至要故五勝分五輪八
卦名八廓五輪者肝屬木曰風輪在眼為鳥睛心屬火曰血輪
在眼為二眦脾屬土曰肉輪在眼為上下胞肺屬金曰氣輪在
眼為白睛腎屬水曰水輪在眼為瞳子至若八廓無位有名膽
之腑為天廓膀胱之腑為地廓命門之腑為水廓小腸之腑為
火廓腎之腑為風廓脾胃之腑為雷廓大腸之腑為山廓三焦

蒸

之腑為沃廓此雖為眼目之木根而又藉血為之包絡五勝或
蘊積風熱或有七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五勝所屬
而見或腫而痛羞澁多淚或生障膜昏暗失明其證七十有二
治之須究其所因風則驅散之熱則清涼之氣結則調順之切
不可輕用針刀點割偶得其愈出乎倖倖一或不然為終身之
害又且不可過用涼劑恐冰其血脉凝而不流亦成固疾當量
人老少氣體虛實用藥又有腎虛者亦能令人眼目無光或生
冷翳止當補煖下元益其腎水北方之人患眼最多皆是日冒
風沙夜卧熱炕二氣交蒸使然治之多用涼藥北方稟受與南
方不同故也疹豆之後毒氣鬱於心肝二經不能自己發於眼
目傷于瞳人老素無治法
和劑方明目流氣飲治肝經不足內受風熱上攻眼目視物不
明常見黑花當風多淚隱澹難開或生障翳婦人血風時行暴
赤一切眼疾並皆治之

大黄炮

牛蒡子炒

川芎

菊花 去枝

白蒺藜炒去

细辛 去苗

防风 去苗

玄参 去芦

山柰 去皮

黄芩 去芦

甘草炙

蔓荆子

荆芥 去梗

木贼 各一根 草决明 半两

苍术 米泔浸 炒二两

右为末每服二勺临卧用冷酒调下

(和剂方)七宝洗心散(方载精热门)治风壅痰滞心经精熟邪气

上衝眼涩睛痛或腫或赤迎风多淚怕日羞明並皆治之

(和剂方)洗肝散治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱眵眵淚

薄荷 去水

當歸

羌活

防风 各去芦

山柰子仁

甘草

大黃

川芎 各二兩

右为末每服二勺食後熱水調下

(和剂方)蜜蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤腫痛

蜜蒙花 揀淨

石决明

用鹽同東流火煮一伏時出研粉

杜蒺藜 炒去

木賊

羌活 去芦

菊花 各枝各

右为末每服一勺臘茶清食後調下

(和剂方)菊睛散治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子 三兩

菴苈子 酒炒

巴戟 去心

甘菊花 揀四兩

右为末煉蜜同如梧桐子每服五十口温酒鹽湯食後下揚

氏家藏方加五味子三兩

(和剂方)撥雲散治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛怕

日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活

防风

柴胡

甘草 炙各一斤

右为末每服二勺水一盞煎食後温服薄荷清調茶并菊花

苗煎湯皆可服忌諸毒物

(和剂方)蟬花散治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一

切凡毒傷肝者並宜服之

穀精草 去土

菊花 去梗

蟬蛻 淨洗

羌活

甘草 炒

白蒺藜 炒去

草决明 炒

防风 去芦

山柰子 去皮

川芎 不見

蜜蒙花 去枝 木賊 洗淨 荆芥 穗 去梗 黃芩 土 蔓荊子 去皮 各

右為末 每服二勺 食後用茶清調服 或荆芥湯調亦可

(和劑方) 菊花 散理肝受風毒 眼目亦腫 皆暗 羞明 多淚 流痛

菊花 六兩 羌活 去芦 白蒺藜 炒去 木賊 去 蟬脫 各三兩

右為末 每服二勺 食後茶清調下

(和劑方) 蟬花 無比 散治大人小兒 風毒傷肝 或為氣攻 一切眼

目昏暗 漸生翳膜 及久患頭風 牽搐 兩眼漸小 連眦赤爛

小兒瘡疹 入眼 白膜遮睛 赤淚 隱痛 並皆治之

茯苓 炙 甘草 炙 防風 去芦 各 石決明 鹽水 煮

川芎 羌活 當歸 洗焙 各 芍藥 去土 各

黃蘗 炒去 蟬退 去頭足 蒼朮 去皮 炒 蛇蛻 炙一兩

右為末 每服三勺 食後米泔調服 茶清亦得 忌毒食等物

(和劑方) 明眼 地黃 口治男子 婦人 肝虛 積熱 上攻 眼目 翳膜 遮

睛 多淚 此茶 多治 肝腎 兩經 俱虛 凡邪 所乘 并治 暴赤 翳眼

牛膝 去芦 石斛 去苗 枳殼 面炒 杏仁 去油 研細

防風 四兩 生地黄 熟乾地黃 洗焙 各一斤

右為末 煉蜜 口如 梧桐子 每服三十口 食前 鹽湯 溫酒 任下

(和劑方) 湯泡散 治肝經不足 凡熱上 塵眼目 赤淚 睛疼 多淚

赤芍藥 當歸 洗焙 黃連 去須 各等分

右為末 每服二勺 用極滾湯 乘熱 燻洗 冷即 痔溫 日三五次

(和劑方) 四生散 (方載中風門) 治肝腎 風毒 上攻 眼赤 痒痛 不時

羞明 多淚

(御茶院方) 白龍散 去翳膜 明眼目 用川芒硝 五兩 取真白如雪

者 置銷金銀 錫子內 以新瓦 燒用 熟炭火 於磚外 慢二 煑 鎔

清汁 以鉄鉗 出 鎔傾 茶汁 在別器 中凝 滲如 玉色 者方 好

研令 極細 入龍腦 各等分 用點 退翳膜 或吹入 鼻中 立有神 效

(御茶院方) 芎藭 口治 遠視 不明 常見 黑花 久服 明目 有功

芎藭 菊花 荆芥 薄荷

甘草 各一兩 蒼朮 二兩 米泔浸一

右為末煉蜜口如梧桐子每服五十四食後茶清下

(市藥院方) 荆芥散治肝經蘊熱眼目赤腫

荆芥穗 當飯 赤芍藥 各一兩 黃連 一兩

右吹咀每服三夕水一盞煎三沸濾去滓洗病眼

(三因方) 千金神麴口明眼目百歲可讀細書常服有功

神麴 四兩 磁石 二兩 碎服 光明朱砂 一兩

右為末煉蜜口如梧桐子每服二十九食後米飲下

(楊氏家藏方) 捲簾散治久新病眼昏澁難開翳膜遮睛或成翳

肉或暴發赤眼腫痛並皆治之

爐甘石 四兩 黃連 七兩 朴消 半兩 細研

以上先將爐甘石末入甘鍋內開口煨令外有霞色為度次

將入黃連朴消水中浸飛過候乾又入黃連半夕水飛過再

候乾次入

白礬 生用 二兩 半飛 賦粉 別研 黃連末 半兩 青藍 膽礬

白丁香 別研 乳香 別研 鉛白霜 各半兩 銅青 兩半 硃砂 別研

右為末同前件茶合和令勻每用少許點眼

(楊氏家藏方) 黃連散治肝受風熱眼絃赤爛

乳香 別研 黃連 半兩 荆芥 去百穗 灯心 一百莖

右吹咀每用二夕水一盞煎至一盞濾去滓熱洗

(簡易方) 加減駐景口治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

車前子 炒二兩 熟地黄 洗 當飯 去尾 各 楮實子 無器

川椒 各一兩 五味子 枸杞子 各二 兔絲子 酒製 用

右為末蜜糊丸如梧桐子每服三十九食前溫酒鹽湯任下

(本事方) 地黄口治肝經風熱上攻眼目治痛不可用補茶者

熟乾地黄 兩 黃連 決明子 各一兩 沒藥 光明朱砂 各半兩

甘菊花 防風 羌活 杜心

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九食後熱水下

〔本草方〕治腎經虛冷冰候不升不能上達肝木致令眼目昏暗
或赤或流痛痒无時

川芎

荆芥

天麻

川烏

牽牛

茯苓 金釵石斛各等分

右為末煉蜜丸如豆大朱砂為衣每服一九薄苛茶嚼下

〔濟生方〕决明子散治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤淚
胛肉或痒或痛羞明多淚

黃芩

甘菊花

木賊

决明子

石膏

赤芍藥

川芎

川羌活

甘草

蔓荊子

石决明各一兩

右為末每服三勺水一盞姜五片煎至六分食後服

〔濟生方〕桑白皮散治肺壅塞毒氣上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛

玄參

桑白皮

枳殼

川升麻

杏仁

旋斛花

防風

赤芍藥

黃芩

甘菊花

去種

甘草炙

甜葶藶

右咬咀每服四勺水一盞薑三片煎至八分食後

〔濟生方〕補腎丸治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸

磁石

煨醋碎七

兔絲子

酒蒸各

五味子

熟地黄

酒

枸杞子

楮實子

覆盆子

酒浸

肉蓯蓉

酒

車前子

酒蒸

石斛

去根

沉香

別研

青鹽

別研

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十回空心鹽湯下

〔濟生方〕養肝丸治肝血不足眼目昏花或生眩淚

當歸

酒浸

車前子

酒蒸

防風

去芦

白芍藥

酒

別研

熟仁

別研

熟地黄

酒蒸

川芎

楮實

各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十回鹽水送下不拘

〔濟生方〕羊肝丸治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝

一貝生用

黃連

去須別研

為末

黃連

未杵和園

一

右先將羊肝去筋膜於汝盆內搥爛入黃連末杵和園

桐子每服五十口用熟水送下不拘時和劑方用白羊
（經驗方）治爛弦風眼目疼痛時常出淚

黃連 淡竹葉 醋 柏樹皮 二兩 一半生 一半干
右吹咀水二升煎五合稍冷用滴 一兩目爛處

（經驗方）治爛弦風用覆盆子葉不拘多少日乾搗爛如粉以
畏之須用男孩乳汁浸少時點眼中

（經驗方）治暴赤眼初發用并麻葛根湯三貼每貼加蟬蛻七
作三服如未退用敗毒散加大黃又不退却用五膈寬中散酒

調墜下氣 左順則平矣
曾帥幹家藏杞苓口專治男子腎勝虛耗水不上升眼目昏暗

遠視不明漸成内障
白茯苓 八兩 真枸杞 四兩 酒 當飯 酒 青鹽 一兩 兔筋子 酒浸

右為細末煉蜜口如梧桐子食前湯下七十口
曾帥幹家傳導赤散治心勝積熱上攻眼目兩皆浮腫血侵白

羞明洒淚

牛蒡子 炒 榆子 槐子 炒 生乾地黃 黃芩 各等

右為末食後麥門冬湯調二服

曾帥幹家傳車前散治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳

人羞明多淚

蜜 花 葉 枝 羌活 菊花 去枝葉 白蒺藜 炒 去刺 龍膽草 淨洗 各等

粉 草 決 目 車 前 子 炒 黃 芩 龍 膽 草 淨 洗 各 等

右為細末每服二勺食後飯湯調服

曾帥家傳五味子園治心肝二經蘊積凡邪并腎勝虛耗眼

昏暗或生翳膜 阿膠 非粉 炒 熟地黃 一洗 各 白茯苓 去皮 麥門冬 半 山 茶

五味子 二兩 貝母 炒 柏子仁 人參 各 一 兩 百 部
茯神 法 皮 木 遠志 根 去 取 防 風 去 葉 杜 仲 去 皮 二 兩 姜

右為細末煉蜜口如彈子大食前煎湯嚼下一口

宣明方黃連膏治一切眼目赤痛內攀睛凡痒淚落不止

朴硝半斤去上焙干用白丁香半斤以水一黃連斤半

右取冰朴硝香釜內熬至七分淘出令經宿水而浮牙者取

出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁照

乾硝用猪羊膽和加蜜點之効矣

宣明方碧霞丹點一切惡眼風赤者

龍腦

麝香

硃砂各二

沒藥

血竭

乳香

銅青各一

鵬砂三

右為末滴水和丸如梧桐子大用一九新冰化開點之立効

新編南北經驗醫方大成卷之七

