

27394

察證辨治啓迪集卷之八目録

道三編

○小兒門

一療兒醫難之說　一諸証因源　一醫師病家謹節

○嬰子保護篇

一拭纖法　一除痰去癖之法　一臍帶斷法

一護臍法　一臍風撮口証治　一臍汁

一通便法　一貼顱之法　一摘泡之法

一洗浴法　一乳哺之法　一乳母之戒慎

一養法　一月裏看承

○詳審觀察篇

一審脉　一觀形　一察色
一聽聲　一視手紋　一察外証
一五臟虛實証治　一臟氣虛實勝乘証治　一變蒸証候
一顯陷顯填証治　一解顱証治　一壽夭弁察
一小兒惡候
○雜病証治篇
一驚風因源　一急慢驚風弁論　一合病戒偏治
一急慢驚風治方　一林中誠驚風不治証　一慢脾風証弁
一搐發証治　一驚搐先証　一五癇察療
一天癇証治　一吐瀉因証治　一腹脹証治
一腹痛弁治　一夜啼証治　一兒痰弁治
一吃泥　一欬嗽弁治　一欬逆因治
一脫肛奇治　一口瘡治法　一牙痈治法
一重舌木舌証治　一弄舌　一齒不生
一語遲　一行遲　一脚拳不展
一手拳不展　一鶴節　一滯順冷熱
一項軟筋軟　一脫囊　一慈病
一丁奚哺露証治　一龜胷龜背　一尾骨痛
一惡　一客忤　一瘧疾
一痢病　一霍亂　一諸汗

一落癖
一遍身赤腫
一癩頭 附白禿不髮
○疳証篇
一腎疳難治 劇疳五絶之說
一無辜疳毒
五疳保童圓
一方
胡黃連丸
一方
一浮腫小便不利
一耳後月蝕瘡
一諸熱証治
一疳因
一治疳方治
歌
化虫丸
下虫丸
大蘆薈丸
肥兒圓
一丹毒 一名赤瘤 一名赤遊風
一癬瘡 附胎毒瘡 煉銀癬
一通治例
一五疳
一疳瘡 七方
木香丸
如聖丸

一灸法
○痘癍篇
一痘疹
一瘡疹察証
一痘証順逆輕重
一痘瘡色弁
一出不快証治
一辨不藥而愈
一惡証狀
一湯地風
一弁內外因
一傷寒痘疹表裡前後
一弁治例
一偏用戒慎
一痘疹虛實証治
一形氣証治
一隨經治例
一安汗之變
一乳嬰童丱之兩治
一瘡後餘毒 九条
一論中称名方劑
一治痘雜法 二十三条
一痘疹形証皆數輕重
一瘡後餘毒
一治痘方法
一瘡疹入目
一妊婦瘡疹

五加皮散　至聖丸　鱉血丸
大連翹湯　化毒湯　麻黄黄芩湯
百祥丸　人南散　山梔子湯
紫蘇飲　蜜蒙花散　蟬蛻散
消風散　五苓散　脾積圓
小柴胡湯　木香槇榔丸　四物湯
白虎湯　來復丹　人參竹葉湯
止汗散　阿膠散　人參敗毒散
鼠粘子湯　凉膈丸　五香連翹湯
十六味流氣飲　五積散　十補湯

卷之八目録畢

○小兒門
○療兒醫難之說

察證辨治啓迪集卷之八

日東洛下雖知苦齋道三編

圖 小兒方序曰古人云寧望十丈夫莫望一婦人寧望十婦人不望一小兒何也

蓋小兒謂之啞科疾痛不能言（精神猶未備 形声尚未正 脉理猶未全）所以難理者（語不能問其得病之由 脉不能診其必然之理）況臟腑虛實更變易如反掌主治者苟有毫髮之差以致千里

之謬

諸証因源

傳 夫孺子在襁褓（内無七情六欲之交戰 外無大風大寒之相侵）奚其

幼科之疾若是之繁且甚與

抑考其証（大半胎毒 小半傷食）而外感風寒之証十而一耳

變蒸 痘疹 斑爛 驚悸 風癇 發搐

痰壅 赤瘤 白禿 解顱 重舌 木舌

已上諸証豈非孕母不謹胎毒所致與

墓 小兒肝與脾病多（肝只有餘 脾只不足）大人亦然病因

有二（曰飽 曰煖）

傳 夫小兒之在胎（母飢亦飢 母飽亦飽）辛辣適口胎氣隨

熱情欲動中胎息輙躁

或（多食煎煿 恣味辛酸 嗜慾無節 喜怒不常）皆能令子受患

其爲母者（胎前既不能謹節 產後又不能調護）惟務姑息不能防

微杜漸

或（未滿百脾而與鹹酸之味 未發週歲而與肥甘之物）百病由是而生

吐瀉黃疸五疳腹脹傻痛水腫瘧痢痰涎

豈非（吃物過傷 調養失宜）之所致與

醫師 病家 謹節

傳 抑且小兒臟腑脆嫩而（孟浪之劑 峻寒峻熱之藥）俱不

得急軟綿裹手指蘸連年汁拭口中惡汁更以蜜少許調辰砂末一字抹口中鎮心解惡毒一生免痘患踰月預防之

可輕用

古者婦人妊子寢不側座不邊立不蹕不食邪味厥有旨哉今見稟性溫良之婦有娠不嗜慾不縱口生子而少病痘稀亦可以爲師法

○嬰子保護篇

○拭穢法

婦 小兒生下坐婆急綿裹指拭去兒口中惡物令盡不可遲若嚥入腹生諸疾

○除痰去癖之法

惠 炙甘草細切水煎去滓綿裹指蘸灌兒口中令嚥須臾吐痰涎及瘀血方與乳汁年長智昏無病也

婦 既綳裹了以黃連甘草二味煎汁綿蘸令兒咂三日則佳也

○臍帶斷法

惠 初生氣欲絕不能啼者蓋因難產氣悶或冒寒所致急以綿絮包裹未可斷臍帶且將胞衣置炭火上燒之仍用大紙撚蘸油燒臍帶得火氣由臍腹須臾氣回方可斷浴臍帶也

婦 先斷臍帶可只留三寸許帶中有小虫急去之留

林面目黄赤气喘啼声不出胎热流心脾舌強唇青口撮飲乳有妨真姜蜜炒去絲黄右末蜜調塗口又小児齗上有小泡子如粟米以口湯蘸熟帛裹指輕擦破即口開便安

之必異病或線扎定然後洗之不然濕氣入腹生臍風

兒生三日烙臍帶三壯為中別處勿加火艾恐成驚癇

◎護臍之法

斷臍之後為水濕所傷或襁褓濕氣傷於臍中或風冷乘之臍腫多哭不乳

黄栢　釜下黑　乱髪灰

右等分為細末少許傅之

◎臍風撮口証治

傳小兒臍風提口目臍斷傷風或尿在胞中遂成臍風發熱面赤啼聲不出名曰撮口風

赤足金頭蜈蚣一条　瞿麥五分　蝎稍四个　彊蚕七个

右末鵝管吹入鼻中如嚏噴吽聲可治後用薄苛汁調服之

○臍汁

寮臍中汁出并痛用枯礬傅之

或以黄栢末傅之

○通便之法

惠初生一便不通腹脹欲絶急令婦人熱湯漱口吸

婦 咂小兒前後心并臍下手足心共七處每處九三五次漱口吸咂紅赤爲度須臾自通遇此法乃再生

○貼顖之法

惠 出胎時被風鼻塞天南星末薑汁調爲膏貼于顖上病去除之

○摘泡之法

惠 初生下即死急看口中上腭有泡以手指摘破用綿拭淨便活若入喉不可治矣

婦 每日頻於無風處看小兒上腭頰內有白泡起以指甲刮破拭淨之

○洗浴法

婦 小兒初生浴躰

寅卯酉日吉　壬申丁巳癸巳日凶

洗浴小兒用益母草金銀草煎汁則必不生諸瘡

良 小兒浴湯冷熱失所則令兒驚亦致五藏疾矣

小兒臍帶未脫不可頻浴頻浴則水入臍中致臍風撮口

小兒新生浴之用五根湯終身不生瘡疥

柳　桃　棟　梅　槐　謂之五根

○乳哺之法

婦 乳母當擇精神爽健性情和悅肉肥無疾謹節飲食安心絶欲則佳矣

惠 凡初乳先須揑去宿乳○每欲寐即奪之○啼未定勿與之○乳母小兒俱禁肥甘濃厚之物

乳哺
- 後不與
- 食乳
- 脾胃怯弱乳食相併難以尅化
- 幼則成嘔而結於腹中作痛
- 大則成癖積
- 從此始

○乳母戒慎

纂 乳母飲食下咽乳汁便通情欲動中乳脉便應若不謹節兒之病立至

康 違和說

兒生
- 三旬而陰氣純厚子稱襁褓
- 兩月而陰氣方生兒呼爲牙
- 在百日名姹星
- 至半歲而爲誇
- 週期而陰陽各半
- 千日乃真氣方奢
- 此際全

在乳母
- 能調則和
- 不調則違



婦 乳母交接即乳兒必生癖妳婦不可頻飲酒恐小兒痰嗽驚昏能調和乳哺看承愛護如法則病不生也

纂 乳母初病其尿必數即須調理母安則兒安防患於未形善之善者也

○護養之法

惠 天氣和暖抱之使見風日則血盛氣剛可堪風寒○常令著地氣使筋骨壯○若厚衣過煖傷皮膚損血脉發瘡瘍汗出腠理開風邪易入○十六歲已前陰氣未成不過溫飽下体主陰得寒涼則陰易長○腸胃尚脆而窄凡魚肉麪燒炙稠粘等物背宜禁絶苟務姑息隨所欲積成痼疾雖悔何及

婦 夫天寒用父母常著舊衣忌新綿大煖則筋骨軟弱勿令兒枕乳母臂作豆袋枕之

良 乳母與兒同睡口鼻氣吹小兒顱門兒必鼻塞

母過愛襁衣遇寒火烘兒必毋毒熱疾乳母以兒衣服晒月下被恶鳥羽屎落遂成無辜之疾或將恶相異物嬉戲忽見遂成驚忤

○調護看承

惠 有胎中受驚故未滿月而發驚內吊目睛上視腹硬手足抽掣角弓反張痰涎壅盛名胎驚宜辰砂研牛黄少許乳汁調抹入口中太妙母服防風通聖散

○生赤肌膚如丹塗者

先用牛黄散托裹
次用藍葉散塗外
乳母服清凉飲子

林生地黄湯治兒生胎黄生地赤芍芍飯拾右水分煎兒母俱服

○生黄生下遍躰如金黄色身熱二便不通乳食不進啼不止因母受濕熱或衣被太煖所致宜漸減厚衣新綿服生地黄湯子母俱服之

○初生不大便用葱头任入肛門內次用牛黄散送下朱砂丸

○鼻塞乳汁不下用牙皂草烏葱涎杵成膏貼顖會穴甚妙

△○詳審觀察篇

惠 凡小兒之疾不能言

△惟當
- 審脉
- 觀形
- 察色
- 聽声
- 視手紋
- 詳外証

○審脉

惠 凡診小兒大指按三部一息六七至平和八九至發熱五至內塞弦脉風癇沉緩傷食促急虛驚急氣不和沉細冷浮風小大不調鬼祟浮大數風熱伏結物聚單細痃癖若風腸痛多喘嘔而脉洪有虫浮而遲潮熱者胃寒也脉乱不治變蒸之時身熱汗出不欲食食即嘔吐者脉乱無苦也

傳 七八歲曰齔九十歲曰髫始可以一指探掌後三部之脉以一息七八至為無病十一歲至十四歲曰童丱以一息五六至為常脉也遲則為寒○數則為熱○浮則為虛風沉則為積痛浮而數者為乳癇驚悸○虛而軟者為慢驚瘈瘲○緊而實者為風癇○牢而實者為便秘洪數者為熱○沉而弦者為食積腹痛○伏結為傷食○緊而弦者為氣急風寒○軟細者為虫痃○若氣促脉代散乱無倫次者死在須臾而不治也

業幼科者其可不盡心於此乎

○觀形

林 觀形先視其眼若兩眼無精光黑睛不運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神藏於內而外若昏困神氣不脫者無妨

○察色

神 察形色之圖



傳 額赤心熱 鼻紅脾熱 左腮青肝有餘 右腮白肺不足 頦白腎虛

又 肝病面青 心病面赤 脾病面黃 肺病面白 腎病面黑

先要分別五藏形証 次看稟受盈虧脏氣 虛實明其標本而治之無不可者

額印堂山根 額紅大熱燥 青色有肝風 印堂青色見人驚 是火紅 山根青隱隱驚主是重重

年壽

年壽上平并更陷 時人壽夭亦其由 忽曰痢疾黑色候 霍乱吐瀉黃色浮

鼻準

鼻準人中 鼻準微黃此疫幾 深黃死証黑應危 人中短縮吐曰痢 唇及死候黑匝圍

正口

正口當紅号曰平　燥葛脾熱即黄生
白主失血黑繞口　青黑驚風盡死形
承漿　兩眉　黄多吐逆是真形
承漿青色食時驚　久病眉紅死証逞
煩躁夜啼青色吉
兩眼
白睛青色有肝風　有積黄色未及瞳
若見黑睛黄色見　傷寒病後此為縱
風池　氣池　兩顴　躁煩啼叫色鮮紅
風氣二池黄吐逆

更有兩顴胚樣赤　肺家客熱此非空
兩太陽
太陽青色驚方始　紅色赤淋崩藥起
要知死証是如何　青色從兹生入耳
兩瞼
兩瞼黄為痰實咽　青色客忤紅風熱
傷寒赤色紅主淋　二色請詳分兩頰
兩顴　金貴　風門
吐虫青色滯顴黄　二色顴間兩自詳
風門黑疝青驚水　紋青金貴主驚狂

眉頰　唇眼

傳痢疾眉頭皺　驚風面頰紅

渴來唇帶赤　毒熱眼朦朧

山根

山根若見脉横青　此病明知兩度驚

赤黑困疲時吐瀉　色紅啼夜不曾停

太陽　一首

青脉生於左太陽　須驚一度見推詳

赤是傷寒微燥熱　黑青知是乳多傷

右邊青脉不須多　有則頻驚怎柰何

紅赤爲風抽眼目　黑青三日見閻羅

眼背搐

先望孩兒眼色青　次看背上冷如氷

陽男搐左無妨事　搐右令人甚可驚

女搐右邊猶可治　若逢搐左疾非輕

歪斜口眼終爲害　縱有仙丹也莫平

鼻　面　唇　腹

鼻門黑燥渴難禁　面黑唇青命莫存

肚大青筋俱惡候　更嫌腹有直身紋

命門部位之圖



中庭與天庭　司空及印堂　額角方廣處

有病定存亡　青黑驚風惡　体和滑澤光

不可陷兼損　唇黑最難當　青甚須憂急

昏暗亦堪傷　此是命門地　醫師妙較量

目內証

赤者心熱 導赤散
淡紅心虛熱 生犀散
青者肝熱 瀉青丸
淺淡者 補之
黃者脾熱 瀉黃散
無精光腎虛 地黃丸

此驚邪入

肝　心　腎　肺　脾

面目俱青眼睛竄視

面紅唇紅惕惕夜啼

面青惡叫齒妳咬牙

面色淡白喘息氣之

面黃嘔吐不食虛汗多睡

又面部赤紅乃心氣絕蓋心屬火主炎上故知心絕死

又胸背百會穴下有一條青脉下對耳尖久而愈青不治

聽聲

(察)聲
- 呼 悲 — 是肝病
- 歌 慢 — 是脾病
- 呻 沉 — 是腎病
- 笑 雄 — 是心病
- 哭 促 — 是肺病

聲清是膽病　聲短是小腸病
聲速是胃病　聲長是大腸病
聲微是膀胱病　已上腑病也
已上臟病也

聲
- 細長是實
- 輕是虛
- 沉麁是風
- 短細是氣
- 麁是熱
- 短澀是瀉
- 細長是痢
- 實是秘澁

(惠)睡中驚啼聲
- 浮者易治
- 沉不響者難治

(傳)忽作鴉聲心氣急此時端的命難過氣喘汗流

(林)身不熱手拿胷膈定遭殃
聲如鴉中彈者不治

(◎)視手紋

(傳)一歲至六歲曰嬰孩惟以
- 男左手
- 女右手
- 次指三關

脉以爲驗病輕重死生之訣名曰虎口

第
- 一節
- 二節
- 三節
- 名
  - 風關無脉則無病有脉則病輕
  - 氣關脉見則病重尚可藥治而已
  - 命關脉見則病劇九至一生惡候

也多不治　三關通度脉候是極重之証必死

次指三關之圖

一風關易治
二氣關病重
三命關死候

三關青是四足驚
三關赤是水驚
三關黑是人驚

青如魚刺在
風
氣
命
關
易治初驚之候黑色難治
主疳劣身熱易治
主虛風傳脾難治

如懸針
赤色在氣關生疳兼肺積熱可治
命關凡在此脉不問五色皆死候
三關通度如懸針慢驚難治

青黑在風關主水驚易治

如水字在
風
氣
命
關主
驚風入肺咳嗽向赤
驚風疳極
不拘五色三關通度者不治

如乙字在
風
氣
命
關
主肺蔵驚風易治
主驚風病重
青黑色主慢驚風難治

如曲虫在

如環在

此紋若在

凡頭面上或肚腹上有大脉併青筋如此者并是食毒物及驚積難治

(惠)歌曰紫風紅傷寒　青驚白色痃　黑時回中恩

黃即困脾端

(林)第一節紫是驚痃青紋是肝痃白紋肺痃黃紋脾痃赤紋心痃惟黑色紋爲腎痃難治

第三節青黑紋現三關通度斜入指甲者不治

○審外証

(惠)咬牙甚者發驚○口吐涎沫而叫者虫痛○昏睡

(林)善嚏將發瘡疹○吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也○不露睛者胃實熱也○吐稠涎咯血者肺熱也○

瀉青白穀不化者胃冷也○吐瀉乳不化者傷食

宜下之○身熱飲水熱在內也○身熱不飲水熱在外也○瀉青黃者胃熱毒也○呵欠面赤風熱也○呵欠面青驚風也○呵欠面黃脾虛驚也○呵欠而多睡者內熱也○呵欠而氣熱者傷風也

搖頭揉目　肝熱生風　多淚憎明　三焦積熱

鼻出清涕　肺經感寒　頰赤面黃　風傷腑熱

盜汗頻頻　藏府虛熱　胃熱生斑　氣傷冷厥

長噓嚙齒　風盛氣生　上竄搖頭　涎高胷結

小便淋赤　熱聚膀胱　喉腫丹瘡　肺之受熱

噯噦泥土　脾臟生痒　消渴口瘡　心家積熱

面黃浮腫　積氣所致　行遲語澁　胎積氣傷

項硬肝風　氣傷木舌

惠先視其眼無光精不運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神藏於內而外若昏困神氣不脫者無妨

圖語遲心氣不足五六歲不能言菖蒲丸　長大不得行

肝腎虛筋骨弱羚羊角丸　長齒不生齒乃骨餘腎所主腎虛而然地黃丸　髮久不生生則不黑腎衰也地黃丸

尿深黃久則尿血五苓散　尿不通久則脹滿捻頭散

心痛吐水虫痛安虫丸　心痛不吐水冷心痛理中丸

凡病先虛或合下者先實其母然後下之假令肺虛而痰實此可下先當益脾後方瀉肺

○五臟虛實証治　錢氏曰

肝主風

王林

實則目直大呼呵欠項急頓悶瀉肝散

虛則咬牙多欠地黃丸

熱則手尋衣領乱捻物直視不搐

有風目連瞤不搐

心主驚

實則哭哭發熱飲水而搐導赤散

虛則困卧悸動不安粉紅丸

熱則肖熱不言而有就涼之意故合面卧

脾主困

實則困睡身熱飲水瀉黃散

虛則吐瀉生風異功散

困弱則困睡泄瀉不思食

實則悶乱喘促有飲水者有不飲水者瀉白散

肺主喘

虛則哽氣長出氣阿膠散怯肺辰白

熱手搐眉目鼻面

悶乱氣麁喘促哽氣者難治肺虛損故也

腎主虛

無實也惟瘠疹脅實則黑陷百祥丸

腎虛兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱即解面色皖白此皆難養縱長不過八八之數若恣色不及四旬而亡

虛則畏明補之

視病之虛實

虛則補母

實則瀉子

○臟氣虛實勝乘証治

王林

小兒初在襁褓未有情慾只是形躰脆弱血氣未定腑臟精神未完所以有臟氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往為外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫錢論脫略幸而契古補之

案古曰五臟子母虛實鬼賊微正若不達肯意不易

得而入焉

在前者爲實邪　在後者爲虛邪
妻來乘夫爲微邪　夫來乘妻爲賊邪
本臟自病爲正邪

○心主熱自病則大熱瀉心湯
實則煩熱黃連瀉心湯
虛則驚悸生犀散
肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散
肝乘心虛邪風熱大卷活湯下大青丸
脾乘心實邪瀉而身熱瀉黃散
腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸

凡心病必先調肝腎二臟腎者心之鬼肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求于肝清其源也或診其脉肝腎二臟俱和而心自生病察其心家虛實治之

○肺主燥自病則喘嗽燥則潤之
實則喘而氣盛瀉白散
虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散
心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散
肝乘肺微邪惡風眩冒憒嗽羌活膏
腎乘肺實邪憎寒嗽清利百部丸
脾乘肺虛邪躰重咳痰瀉嗽人參白术散

凡肺病必先觀心之虛實若心火炎盛鑠金先抑心氣後喫肺藥若心氣和即看脾脉若脾氣虛冷即不能相生而肺家生氣不足則風邪易感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實中焦

熱隔則肺大腸不通故患肺熱者多脾實得之
心氣盛瀉之脾氣虛益之脾氣實通之故有抑
心益脾通脾三藥若診其脉心脾二臟俱和而
肺自生疾則但察肺家虛實而治之

○肝主風自病則風搐拘急肝苦急急食甘以緩之
實則風搐力大瀉青丸
虛則風搐力小地黃丸
心乘肝實邪壯熱而搐利驚丸凉驚丸 瀉白
肺乘肝賊邪氣盛則前晨呵欠微搐當瀉肺先補本臟 地黃
脾乘肝微邪多睡体重搐先瀉青丸搐止且後証治之
腎乘肝虛邪憎寒呵欠搐羌活膏

○肝病必先察肺腎二臟根其病所起腎者肝
之母金者木之賊今肝病若非腎水之不能相
生必是肺金之鬼來相攻擊其來在肺攻其鬼
其來在腎滋其根然後審其肝家本臟之虛實
而寒溫之

脾主濕自病則泄瀉多睡体重昏倦脾苦濕急食
苦以燥之
實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散
虛則泄瀉白色睡露睛白术散
肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯
心乘脾虛邪壯熱体重而瀉羌活黃芩蒼术甘
草湯
肺乘脾實邪能食不大便而嘔橘柳湯下葶藶
九
腎乘脾微邪惡寒而泄理中丸

凡脾病必先察肝心二臟之虛實根其病之所起肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼勝心氣虧則脾家生氣不足盛者抑之虧者益之診其脉肝心二臟俱和則是脾自生病察其虛實而治

○腎主寒自病則足脛寒而逆

人之五臟惟腎無實小兒奮奮麥黑陷則是腎實水尅心火是以水能制火也

心乘腎微邪內熱不悪寒柱枝丸

肺乘腎虛邪喘嗽皮澁寒百部丸

肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中丸

脾乘腎賊邪体重泄瀉身寒理中丸

本臟虛弱是自己正令不行乃鬼賊之所尅

當補本臟之正氣腎病必先求之於脉若脉臟安和而腎忽然受病者不過脾之濕相刑於腎而生病若脾肺二臟俱和而腎自病則察其本臟而治之

○大抵五臟各至本位即氣盛不可更補至所尅位不可更瀉

○變烝証候

變烝有十變五烝者乃生精神意智也俗謂之牙生骨長如蚕之有眠龍之脫骨虎之轉爪

丹溪曰是胎毒散也每變發為虛熱諸証有胎氣壯實暗變而無發証者此

骨脉藏府由變而全胎毒亦因變而散也

傳 夫小兒之初生



未分娩之後每三十二日一發熱或



此爲長血脉全智惠之常候不須治而自愈

諸家所論自生之日始每三十二日一變凡人有三百六十五骨節除手足四十五碎骨外正有三百二十骨自生下骨而上一日十骨三十二日乃爲一變骨氣始全一變生一藏或一府十變則藏府始足矣

兒醫者可不審乎

小兒在母腹乃生骨氣藏府成而未具全自生之後即長骨脉藏府神智變者易也生變遂者自內而長自下而上每變異情異於前也三十二日爲一周十周則小蒸畢計三百二十日生骨氣乃全而未壯

一變生腎志　二變生膀胱耳骫冷

三變生心喜　四變生小腸汗出微驚

五變生肝呼　六變生膽目不閉

七變生肺聲　八變生大腸膚熱而汗

九變生脾智　十變生胃不食腸痛吐乳

此後乃齒生言知喜怒

其治（不汗而熱者發其汗　大吐者微下）不可別治

林　心包絡三焦俱無形狀故不變蒸也

變主裏始得之上唇有白珠泡子身熱微驚或嘔七日變訖

變兼蒸主表始得之上唇微腫身熱額熱或作涼作熱唇口鼻乾哽氣嘔逆時驚多帝十三日蒸訖

二大蒸主表裡唇口乾燥欬嗽哽氣腹痛前十變五蒸既訖後又有三代蒸

六十四日爲一大蒸計三百八十四日

又六十四日爲二大蒸計四百四十八日

又六十四日爲三大蒸計五百一十二日

至五百七十六日變蒸既畢

所以變者生五藏也變而蒸者養五藏也兒乃成人也

變蒸之時切不得艾灸即宜少與乳食亦不可妄投藥餌若不依此必致殺兒

王　變者上氣蒸者躰熱變蒸有輕重

輕者躰熱虛驚耳冷微汗唇中白泡狀如珠子

重者寒熱脉亂腹疼啼叫不能乳食輙吐哽

袖 變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形躰成就是五藏之變氣而七情之所由生也

○顖陷顖填証治

袖 顖陷者曰藏府熱飲水漿致泄痢久則血氣虛不能上充腦髓故陷不滿○用狗頭骨炙黃爲末雞子清調付之

顖填者腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家藏府不調其氣上衝爲之填脹顖突而高毛髮短黃自汗是也○防風栢子仁白及各末乳汁調塗顖上十日愈

傳 顖門腫起定作風此候應知最是凶忽陷成坑如盞足未過七日命須終

○解顱証治

袖 解顱生下而腎氣不盛長必少笑白睛多眩白色者多愁少喜年大頭縫開解而不合腦不足也人無腦髓猶木之無根○細辛桂心乾薑各末乳汁調付顱上乾則再塗面赤則愈

解顱曰母氣虛與熱後也用八物加酒炒黃連煎服以帛束緊白斂傅之

○壽夭弁察

良 凡小兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其壽夭

初生 叫聲連延相屬者壽

聲絶而復揚急者不壽

啼聲散啼聲深汗出不流頭四破尿凝如脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人

小兒回舒轉首遲滯費人雕琢壽相也

小兒預知人意身輕力懦者難養也

枕骨不成能言而死

尻骨不成能倨而死

小兒初生 掌骨不成能匍匐而死

踵骨不成能行而死

髕骨不成能立而死

金 小兒陰大而黑與身色相等者可養之子也

黑睛大白睛少面黑眼中黑白分明壽相也

小兒陰小而白者難養之子也

白睛大黑睛少面皯白非壽相也

○小兒惡候

林 一十五候歌

眼上赤脉 下貫瞳人 顖門腫起 兼及作坑

鼻乾黑燥　肚大青筋　目多直視　覩不轉睛
指甲黑起　忽作鴟聲　虛舌出口　嚙齒咬人
魚口氣急　啼不作聲　蚘虫既出　必是死形
用藥速救　十無一生

察　小兒中風熱喘鳴肩息脉（緩生　急死）
小兒痢疾脉浮大腹痛者必死
乳子病熱脉懸小手足（温則生　寒則死）
小兒困汗出如珠著身不流者死
小兒有病胸陷口唇乾目直視口中氣冷頭低卧
不舉身手足垂軟身体強直掌中冷皆不治

恵　小兒無故驚起忽然大叫是火大發其氣虛甚故
也必死

傳　痘五不治
痒塌寒戰咬牙渴不止　痘紫黑色喘喝不寧
灰白色陷頂腹脹
氣促泄瀉渴　頭温足冷悶亂飲水

○雜病証治篇

○驚風因源

傳　經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純
陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金受制而無以

乎木故（肝木當有餘而脾土常不足也）父母失於保養（衣服寒暄不調外邪侵襲飲食飢飽失節中氣損傷）故急慢驚風之候作矣

○急慢驚風辨論

傳夫（急慢）驚風屬（肝木風邪有餘之証脾土中氣不足之候）治宜（清涼苦寒瀉風藥中和甘溫補中劑）

急驚之候曰聞不常之聲或駑馬禽獸之吼以致面青口噤或聲嘶而厥發過則容色如故良久復作

○身熱面赤引飲口鼻中氣熱二便黃赤惺惺不睡○蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發日

宜用利驚丸瀉青丸宜風散

慢驚之証多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致驚搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒二便青白肯睡露睛目上視手足瘛瘲筋脉拘急○蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天吊風者即此候也宜用黃耆湯參朮湯白朮散

錢氏謂（急驚慢驚）為（無陰之証心經實熱無陽之証脾土虛甚）也天民按小兒急慢驚風其虛實寒熱如天淵之隔故（急驚者十生一死慢驚者十死一生）俗醫不諳此理混為一

途而治誤人多矣

丹溪曰
- 慢驚養脾參朮煎湯下安神丸
- 急驚養血藥作湯下降火清痰丸子

惠 急驚陽証也俱腑受病客痰熱於心膈宜降火下痰養血○小兒急驚方搐不用驚惶但扶持不可擒捉蓋風氣方盛恐流入經絡或至手足拘攣擺跳口中出血尋衣摸躰噴藥悶乱心中痛絶忽大吁者不治

慢驚陰証也臟受病尓雖靜乃危一名瘈瘲似搐而不甚搐面青白身冷口氣冷多啼不寐目上視牙噤嘔涎或自汗多曰病後或吐瀉脾胃虛損宜温白丸芽藥○或肢冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛鵝聲口舌白瘡髮直頭摇喘急瘀響口眼手足一邊牽引者不治

陽動而速故陽病曰急治之合涼瀉
陰靜而緩故陰病曰慢治之合温補
俗以一藥通治之甚妄

○合病戒偏治

王 身涼脉浮沉精神倦急不吐不瀉又能乳食發搐者亦是半陰半陽合病正如傷寒半是表半是

裏也

有急驚涼瀉不愈或與吐下藥太過變爲慢驚

○有慢驚溫補不愈或與溫補劑太過變爲急驚

況小兒（藏氣未實神氣未完）而有夾火夾熱夾痰夾食病日不同至風邪內陷入藏入府亦與中風相似故治此者本錢氏虛實補瀉法不致犯禁之誤藥有太過不及之失

○急慢驚風治方

傳 利驚丸治急驚風神効

天竺黃 二分 輕粉 青黛各一分 黑丑 頭末半兩生用

右研勻蜜丸如梧子大一歲一丸三歲二丸五歲三丸溫薄荷水下食後

漏青丸治肝熱急驚搐搦等証

羌活 大黃煨 川芎 梔子 龍膽 當歸 防風各等分

右細末蜜丸如芡實大每服半丸竹葉湯下

宣風散治急驚風搐搦不定

柴胡 二枚 陳皮 五分 甘草 一分 黑丑 四兩半生半炒取頭末一兩

右細末蜜湯調下半分食前

黃耆湯 治慢驚風之神藥也

黄耆二分 人參一分 甘草一字炙 加白芍藥一分

右細切作一服水一椀煎至半椀食遠服

上三味皆甘温能助元氣甘能瀉火經曰熱淫于内以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪

白术散 治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將成慢驚風者服之奇効

人參 白术 木香 茯苓白 甘草炙 藿香 各二分

干葛二分

右細切分二服水煎温服

益黄散 治風木旺右關脉洪大掌中熱腹皮熱或寒水乘脾土嘔吐腹痛瀉利青白亦可瀉火補金大補其土是爲神治之法

黄耆二分 陳皮去白 人參各一分 白芍七分 生甘炙甘各五分 黄連少許

右細切水煎食前服

安神丸 治邪熱驚啼心痛面黄頰赤壯熱

麥門冬 馬牙硝 白茯苓 山藥 寒水石 炙甘各半兩 辰砂一兩 龍腦一字

右爲末密丸糖水化下慢驚用參朮煎湯化下

○林中誠驚風不治証

林 項筋無力　魚口氣麁　齒齒咬人　瀉如瘀血

目似開不開　身軟口噤　不食　木舌乾澁

反張脊強　頤陷不動　啼不作聲　冷汗如油

至如慢脾　灸之不醒　視不轉睛　眼上赤脉

皆不可治

○慢脾風証辨

林 小兒慢風蓋爲吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟

脾所受故曰慢脾若逐風則無風若鎮驚則無驚

但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神不

沉迷痰涎凝滯而然

一云九小兒頭雖溫

眼珠青白
腹脹
泄瀉
嘔吐
渴

而足冷已上

五証忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益

真湯一服每服三分更加全蝎一枚○身冷粘汗

出直卧如尸喘嗽頸軟二便不禁虛痰上攻氣麁

者不治○且慢脾十救二抵當生胃回陽

補脾益真湯　治小兒胎稟怯弱外實裏虛吐妳糞

便青色而成慢風氣逆涎潮直視四肢抽掣或因變蒸各件而作或因特拘驚嚇而作或因誤服鎮心寒凉藥而作

木香　當皈　人參　黄耆　丁子　訶子
陳皮　厚朴　甘草　肉豆蔻　草果　茯苓
附子炮各七分　全蝎去毒微炒每一服用一个

右㕮咀每服三分水盞半薑二片棗一枚煎熱服服訖心腹揉動以助藥力候一時久喫乳食

○渴者去附子丁子豆蔻加苓參○瀉者加丁子訶子○吐者加丁子半夏陳皮○腹痛者加厚朴良薑○腹脹者加厚朴丁子前胡枳殼○咳嗽加前胡五味子去附桂果蔻○痰喘加前胡枳殼赤茯苓去附丁蔻果○足冷加附子丁子厚朴

○氣逆不下加前胡枳殼去附歸蔻○惡風自汗加官桂黄耆

○搐發証治

傳 男發搐目左視無聲右視有聲　女發搐目右視無聲左視有聲　相勝故也更看所發時早晨發搐曰寅卯辰時潮熱目上視手足動搖口流涎頸筋急此肝水太旺當地黄丸補腎瀉青丸抑肝

日中發搐曰巳午未時潮熱心神驚悸目上視白睛赤色牙緊口縱四肢動搖此心火太旺（地黃丸補肝導赤散瀉心）

月晚發搐曰申酉戌時潮熱搐而喘目微斜視睡則露睛肢冷大便淡黃水此肺病（補脾益黃散抑心導赤抑肝瀉青）

夜間發搐因亥子丑時潮熱不堪搐而卧不穩身体溫無壯熱目斜視喉痰大便銀褐色乳食不消多睡不醒（益黃散補脾導赤散抑心）

傷（風發搐口氣熱呵欠頻悶肢搖大青膏散之）（食發搐身溫多睡吐而不食先退搐 初曰餅子 後安神丸）

（真者內生驚癇不過三二次必死）

百日內發搐有真假二証（假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝邪發搐口氣熱大青膏散之）

地黃丸治肝肾肾小兒年長不能行神効

熟地 山茱萸 山藥 澤瀉 牡丹

白茯苓 各三分 甘草 炙各半分

右為末蜜丸熱水空心下

導赤散治心熱

生干地黃 木通 甘草 炙各半分

右細切入淡竹葉水煎食後溫服 一本無甘有芩

益黃散治脾胃虛寒脾肾体黃腹大好食泥土肺肾

氣喘口鼻生瘡等証

陳皮一分 青皮 訶子 甘草炙各半分 丁子二分

右細切水煎溫服天民每加參术各一分神効

白餅子治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生痰

滑石 輕粉 半夏洗 南星各一分 巴豆二十四个去皮心炒

右研巴豆後入衆藥末飯丸薄苛湯下

○驚搐先証

(王)目眩目白目青目斜目闔目轉目瞪声焦声嗄声

顫聲輕咂口弄口撚舌露筋哽氣噎氣撮唇噎乳

噎食忽定睛吐涎仰身搖頭擦面藏頭畏明手縮

手顫足攣不伸恍惚精神失張眠睡不寧睡中喜

笑心煩啼哭咬人面臉弄色或紅或青伸舒用力

微微作聲有已上候驚搐先証也預防之

夫驚搐在陰陽兩証（陰者拇指在內陰拳逆陽者拇指在外陽拳順）也

凡身体壯熱耳輪鼻尖及肢梢俱冷忽發搐者此非

驚是痘搐也○痲疹能發搐風火相爭故也

○五癇察療

(傳)凡治小兒五癇背當隨臟治之每藏各有一獸所

屬

犬癇反折上竄犬吽肝

如羊癇目瞪吐舌羊叫心牛癇直視腹滿牛叫脾雞癇驚跳反折手縱雞叫肺猪癇口吐沫猪叫腎也五色丸治之

五癇重者死○病後甚者亦死

風 廢手足如癱或口喎

食 傷内食肢搐角弓反張大聲吐食方定

惠 驚 癇 瘲頭目斜口目或一目或双目或昏或邪視

痰 似狂耳不聞目不視如夢如醉或日發經年發

飲 手足搐動食不知飽數日不食寐中發飽亦發

灸法治急慢驚風危証及諸癇痙病絹帛縛兩手足大指甲角縫半甲半肉之間艾灸三壯先足後手

或髮際或顴會或神庭

五色丸

辰砂別研 珠末各五分 水録二分半 雄黄一兩

黑鉛二分半同水熬

右煉蜜丸如麻子大每服三丸薄苛湯下

○天麻証治

林 小兒壯熱翻眼手足搐掣如魚之上鈎皆由乳母過食熱毒即乳兒兼挾風邪所致解利風熱則應手而愈○小兒蘊熱痰塞經絡頭自仰名爲天吊乳香雄黄白丸甘草荆芥人參天麻之類主之

○吐瀉因証治

傳經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱○又曰濕勝則濡泄○夫兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食鬱則成熱熱鬱則酸酸而成吐作瀉此必然之理也

又曰食滯於胃口者爲吐大小腸者爲瀉

有生下而遂吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃爲吐也丹溪曰錢氏五補五瀉之法俱可選用

小兒初生下吐蓋口中穢惡拭掠不盡嚥入喉中故吐水瓜丸主之

水瓜末 木香末 射香末 輕粉 檳榔末各一字

右研匀麪糊丸黍米大每服二丸甘草湯下

初生三日內吐瀉壯熱不乳大便不消或白色知是傷食當下之而後和胃下之白餅子和胃益黃散

初生三日已上至十日吐瀉不乳乍熱乍涼大便青白不消益黃散

吐瀉泄黃傷熱乳泄青傷冷乳皆白餅子下之而後益黃散玉露散

玉露散 石膏 寒水石各半兩 生甘草二分半

右爲末每服一字溫水調下

惠 嘔吐吐乳不止恐脾風白术散或掌中散

驚吐目驚而吐乳面青安神丸藿香湯下

冷吐益黃散姜棗煎服

積吐脾胃傳食不化所吐酸臭益黃散 姜梅湯服

熱吐熱湯發吐小柴胡加生姜

交吐父母交後即乳兒吐乳眼慢糞穢氣 四君主之

泄瀉錢氏補瀉俱可用丹溪曰頻瀉將成慢驚用白

术散

驚瀉目驚而瀉用丹溪方

積瀉瀉下極臭穢腹痛宜消積

冷瀉藏府虛冷洞泄如水宜白术散

熱瀉口渴尿赤或五心熱宜五苓散

痢瀉瀉如爛泥肚緊用蟾蜍丸

腎瀉面黑齒消脫骨力弱腹痛多泄白膿

傳 小兒吐瀉若有不須下者即用溫中丸

人參 白术各一兩 甘草炙一分

右爲末麪糊爲丸糊米飲下

惠 掌中散 治吐乳

白豆蔻 砂仁各十四粒 甘草一寸半炙

右爲末安掌中乾嗽牙兒乾摻口中

○腹脹証治

傳小兒腹脹由脾胃虛氣攻作也

實
虛
腹脹
悶亂喘滿可下之
不喘滿不可下若誤下脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛（肺主皮胞腮脾主四肢）之類

母氣虛甚則目胞腮腫也色黃者屬脾治用搗氣丸漸消之不可以丁子木香桂蔻大溫散藥治之

蓋脾虛氣未出腹脹而不喘者可以溫散藥治之上下分消其氣則愈若虛氣已出附肺而行則脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣

小兒易爲虛實脾虛不受寒溫
- 服寒則生冷証
- 服溫則生熱証

胃久虛熱多生疳病或引飲不止

脾虛不能勝濕隨肺之氣上行於四肢若水狀濕氣浸浮於肺則大喘當服搗氣丸而愈

搗氣丸治小兒虛脹如腹大加蘿蔔子

胡椒一兩　蝎尾去毒半兩

右爲細末麵糊爲丸如粟米大每服五丸米飲下

○方治腹脹

蘿蔔子 紫蘇梗 乾葛 陳皮 各等分 甘草 少許

右細切水煎服食少者加白术

○腹痛辨治

惠 腹痛丹溪云多曰邪正交争臟氣相擊而作有挾熱挾冷又云多是飲食所傷

挾熱作痛面赤或壯熱手足心熱四順清凉加青皮枳殼

挾冷作痛面或白青冷甚面黑指爪青理中湯

傳 治飲食所傷腹痛

白术 一分半 陳皮 青皮 山查 去核 神麯 炒 麥芽 炒 縮砂 各一分 甘草 炙半分

右爲末清米飲或白湯調下有寒加藿香吳茱萸熱加黄芩

腹痛口氣温面黄目無精彩及多睡畏食或大便酸臭當磨積白餅子下之後和胃白术散

心腹痛面皃白口中清水出發痛有時蚘虫痛也小兒本怯故胃冷虫動而心頭痛與癎略相似但目不斜手不搐耳安虫散主之

安虫散 室鑑用米糊爲丸名安虫丸

黄粉 炒黄色 槟榔 川練子 去核 鶴虱 各二兩 枯丸 二分半

右爲末臨痛時米飲下

○夜啼証治

傳 小兒夜啼心經有虛有熱

人參 黃連姜炒 甘草 竹葉 二十片

右細切入生姜水煎服一本無人參

一方 燈花三顆 以乳汁調抹兒口或抹乳上令兒吮之

○兒痰辨治

傳 小兒風痰壅盛

南星五分切片 以白礬湯泡晒乾 白附子 二兩

右二件共末麪糊丸姜蜜薄荷湯化下

小兒痰熱骨蒸

二陳湯半兩加升麻二分 葛根 白芍 各一分半

人參一分 五味子三十粒

右細切分三貼加姜棗水煎服

○吃泥

傳 小兒吃泥胃氣熱也

石膏 茯苓 陳皮 苓 术 各等分

右細切水煎溫服

○咳嗽辨治

惠 治嗽大法 盛即下之 久即補之 更量虛實以意增減

有肺盛者咳而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之

有肺虛者咳而哽氣時時常出氣喉中有聲此久病也以阿膠散主之

有嗽而咳膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之

有嗽而吐水或青綠水者以百祥丸下之

○咳逆因治

惠 咳逆上氣曰乳哺無度內夾風冷傷於肺氣或啼叫未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下用紫蘇飲

○脫肛奇治

用東壁土泡湯先薰後洗

一方用五倍子為末付而頻托入之

一方用鱉頭燒存性香油調付

○口瘡治法

傳 小兒口瘡用黃栢細辛各等分為末付之

白屑滿舌及兩腮名鵝口用髮纏指頭醮井花水拭口令淨以煆過黃丹掺之即愈

一方用黄連爲細末蜜水調服

○牙痛治法

一方治走馬牙痛　枯礬　黄丹　京棗連核燒存性

共爲末付之

一方用白礬置於五倍子内煆過爲末付之

○重舌　木舌　証治

林　重舌乃心脾熱也蓋心候於舌脾之脉絡出於舌下故心脾熱則血氣俱盛附之根而重生一物形如舌而短小曰重舌○著頰及上腭曰重腭著牙龈曰重龈○木舌者其舌腫大而滿口中緊硬也

治法皆當鍼刺去其血也

或敷之

- 真蒲黄
- 髮灰
- 牙硝
- 焰硝
- 竹瀝浸黄栢点之
- 釜下土醋調塗舌下
- 蜂房灰酒研傅舌下三四次
- 蛇蛻炙燋爲末傅舌下

皆効

傳　鍼舌下紫脉出悪血即愈

竹瀝調蒲黄末付之

○弄舌

林　傳　脾臓微熱令舌絡微緊時時虚舌舐之治之勿用冷藥及下之當少與瀉黄散漸服之○或飲水鑒

疑為熱非也飲水者脾胃虛津液少也

又如面黃肌瘦五心煩熱弄舌即為疳黃胡黃連丸加減用之

大病後弄舌者因

瀉黃散

藿香 七分 梔子 一分 石膏 半分 甘草 七分半

防風 四分

右細切作一服用蜜酒炒香熟以水一盞煎至半盞時時與之

○齒不生 林

齒者骨之餘髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

芎黃散 治小兒久齒不生

川芎 當歸 白芍 地黃

山藥 各一兩 沉香 五分 粉草 三分

右為末溫鹽湯調服半錢仍用少許擦牙根

一法雄鼠糞三七粒兩頭尖者每日用一粒揩齒根上至

二十一日當生

○語遲

林 小兒在胎其母卒有驚怖邪乘心舌本不通長四

五歲猶不能言菖蒲丸治之

人參　菖蒲　麥門冬去心　遠志去心姜汁炒

川芎　當歸各三分　乳香別研　辰砂別研各一分

右爲末煉蜜丸如麻子大米飲下十丸

○行遲

林乃稟氣氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束腎主骨骨弱不能載故行遲也宜地黃丸方見前又用五加皮散

虎骨丸治小兒筋骨虛弱行遲

虎骨酒炙赤　當歸　川芎　桂心

酸棗仁酒浸炒　生地黃　白茯苓　防風

牛膝各等分

右爲末煉蜜爲丸如麻子大每服十丸或酒下木瓜湯下

○脚拳不展

林乃稟受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮無力不能伸屈宜牡丹地黃牛膝山茱萸補骨　右剉煎

○手拳不展

蓋稟受肝氣怯弱致兩脉攣縮兩手伸展無力宜飯芄　蕙　風　羌　酸棗

○鶴節

林 乃禀受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露乃得之腎虛精髓内枯膚革不能榮爲邪氣所襲曰就枯悴其始如鶴脚之節宜地黄丸方在前

○滯頤冷熱 林

乃口涎常流而漬於頤頷也

冷証 ○涎者脾之液脾胃虛冷故流涎不能收約宜温脾散

半夏湯泡 丁香 水香各五分 白姜蚕 白朮 青皮 陳皮各二分半

熱証 ○通心飲通心氣利小便退潮熱分水穀

木通去節 連翹 瞿麥 梔子 甘草 黄芩

右等分細剉水煎温服

春加蟬蛻防風 夏加茯苓車前 秋加牛蒡子升麻 冬倍翹梔

口瘡加地黄野苧根

○項軟筋軟

林 治項軟 五加皮末酒調塗敷項骨上

一方 附子去皮尖 南星剉等分

右爲末薑汁調貼項軟處

右爲末糊丸麻子大每一歲十丸米湯下

肝膽風熱致令筋軟

小茸丸　治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸　蓯蓉　牛膝　木瓜　兎絲　地黄

當歸　天麻　杜仲　青塩各等分

右爲末煉蜜丸塩湯化下

○脫囊　惠

脫囊腫大墜下不収用紫蘇莖葉爲末水調付荷葉包之

又野白蘇葉末濕則摻之乾則香油調付

雖皮潰子墜

甘神効此用紫蘇示同力也

○慰病

惠慰病孕婦被恶祟導其腹中致令兒病其証下利寒熱去來或令兒喫孕母乳示作此病宜龍膽湯

龍膽　柴胡　黄芩　釣藤皮　桔梗　芍藥

甘草　茯苓各二分半　蜣螂二枚　大黄二兩濕紙裹煨

右細切水煎服之得利即止量大小多少與服

○丁奚哺露証治　惠林

手足極細頸小骨高尻削休瘻臍突胸陷啼叫或生穀癥是名丁奚

虛熱往來頭骨分開飜食吐虫煩渴嘔噦是名哺露

二者皆是無辜種類之疾最爲難治宜十全丹救之

青皮　陳皮　蓬朮煨　白豆蔻　川芎

五靈脂　枳椇　芦薈各五分　木香

史君子焙　蝦蟆灰各三分

右爲末猪膽汁浸蒸糕丸麻子大每服二十丸米飲下

○龜肖龜背

傳林　龜胸乃肺熱脹滿攻於肖膈胸高如龜

○蓋乳母多食酒麪熱物五辛炙煿得之

加芩瀉白散　治小兒龜肖

桑白皮蜜水拌炒黄色一分　地骨一分　甘草炙半分

加黄芩一分

右細剉水煎温服

傳　龜背小兒生下客風入肯逐於骨髓即成龜背治之以龜尿點背脊骨節即平

取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出或令向龜於明鏡則必尿出

灸肺俞三五壯

○尾骨痛　纂

臀火盡處太陽所過於此尾骨痛屬陰虛有痰陰虛補血四物加炒栢酒知少桂爲引痛不止加乳沒

有痰二陳加知栢澤必用前胡木香爲引陰虛故痰甚也痛不止亦加乳沒

○中惡 惠

小兒中惡卒死以蕊白內下部及鼻中立活

○客忤 林

小兒神魂微弱外邪客氣卒暴觸忤口吐青黃白沫面色變易喘腹痛反側癡癡狀似驚癇但眼不上竄視其口中上腭左右若有小小腫泡

即竹針刺之指甲摘破服蘇香圓姜湯化開頻頻與服

安神丸亦可方在前

一方 竈心黃土 蚯蚓糞 等分

右研細水調塗兒頭上及五心

○瘛疾 惠

小兒瘛疾與大人同法施治但藥劑減少耳

○痢病

林 小兒痢病逐積解熱依大人治法施療

逐積紫霜丸脾積圓之類

解熱連栢赤芍苓榆之類

惠 凡小兒痢疾亦作食積論之

初得時木香檢槲丸下之而後用术　芍　苓

甘　滑石

○裏急後重加檢殼木香

久不止者用豆蔻　粟殼 炒黃

史君子丸　治臟腑虛滑肾瘦下痢此安蚓補胃治

脾肥胞

史君麩煨取肉一兩　厚朴製　甘草炙　訶子各五分半生半熟

陳皮一不　青黛如熱驚熱瀉用之

右爲末煉蜜爲丸米飲化下

○霍乱　惠

小兒霍亂治法與大人同宜詳証撰用

來復丹能通暢三焦分陰陽兼治反胃嘔吐中暑脅

亂

若吐瀉後已覺虛損若虛發熱必變慢脾用米飲

下特効

若胃氣已衰四君加陳皮調理

○諸汗　林

發熱自汗虛煩宜人參黃耆散

人參 黃芪 白芍各五分 甘草三分

右㕮咀入浮麥三十五粒水煎溫服

盜汗 睡而汗出肌肉虛也止汗散

胃怯汗（上至項下至臍）胃虛也宜益黃散方在前

六陽虛汗（上至頭下不過肩）不須治之

○痞癖 林

因寒溫不調乳哺失節或啖糯米食生冷瓜果脾胃微弱不能消化致五臟不利三焦壅滯腹內結硬或發寒熱如瘧漸致羸瘦

木鱉膏 治痞癖

木別子（多用去殼） 獨蒜（半分） 雄黃（半分）

右擣爲膏入醋少許蠟紙貼患處取積後調理

宜

異香散 治腎氣不和腹脇膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食難化噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛能破癥瘕結聚大消宿食沉積調五臟三焦和胃進食

蓮肉（一兩） 莪朮（煨） 三稜（炮） 益智（炒）

甘草（炙各六兩） 青皮 陳皮（各三兩） 厚朴（製二兩）

右細末每服二分姜棗鹽水煎溫服

灸法

灸乳下一寸左右各三壯

小兒癖氣久不瘥宜灸中脘一穴章門二穴各七壯

臍後脊中灸二七壯

治小兒脇下滿瀉利躰重四肢不收痃癖積聚腹痛不嗜食寒熱灸脾俞二穴各七壯

○浮腫小便不利

林 小兒通身浮腫小便不利以五苓散加燈心長流水煎時時灌服小便利則俞萸於無風處頻浴汗出腫消餘並依大人浮腫參治

○丹毒（名赤熛 名赤遊風）

惠 林 小兒丹毒赤腫身熱如火由風熱毒氣在於腠理搏於血發於外其皮上熱而赤如丹塗之狀若治不得其法肌肉壞爛毒氣入腹則殺人矣

藍青　知母　甘草　杏仁　梔子　黃芩

升麻　柴胡　寒水石　石膏　赤芍　羚羊角　生地黃　麥門冬　黃連　黃栢之類

細剉煎服

青黛土朱爲末井水入蜜調敷

又大黃　朴硝　浮萍　水苔　梔子　生地

研爛蜜水調敷

林 小兒赤遊行於上下至心即死杵菘菜傅之

修真秘肯 治小兒丹瘤 蓖麻子五个 去皮研入麵一匙水調塗之甚妙

廣利方 治小兒火丹熱如火遶腰杵馬齒莧傅之日二

惠 五十 種丹毒如三日不和攻入腸胃則不可治

簒 小兒赤瘤熱毒鬱結肉間發於皮膚赤如榴宜用生地 通 荆芥 桃 苦寒帶表之劑外苓翹連之煎湯入芒硝泡洗之

又以芭蕉根汁塗之

海上方 治小兒丹毒腫痛如火 大黃朴硝細末水調敷之

○遍身赤腫

林 小兒遍身赤腫乃是久伏熱毒之氣防其入腹之腎則殺人宜

防已散

防已五分 朴硝 犀角 黃芩 黃芪 升麻各二分半 右㕮咀入竹葉五片水煎與服

○耳後月蝕瘡

林 治小兒耳後月蝕瘡

胡粉和玉塗上

黃連末傅之

惠 黃連枯礬細末付之

○癬瘡 附胎毒瘡煉銀癬

惠 妳癬用赤芍 黃連 蛇床子 等分 輕粉 少許

右爲末油調付

胎毒瘡小兒一二歲內頭滿延乃遍身生瘡皆因在胎中父母恣情交合所致

先與化毒丹消毒飲 方在痘部

却用父小便以鵝翎刷洗青黛末乾擦之效

眉叢中生瘡名曰煉銀癬穿山甲前膊鱗炙焦爲末入輕粉少許油調付

○癩頭 附白禿不髮

傳 小兒癩頭用通聖散酒拌焙乾每服一分煎服外以燒紅炭入水中乘熱洗之更以胡麥子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲抹油調付之

又松樹厚皮燒存性二兩黃丹一兩枯礬黃連大黃各五分輕粉二分共末熱香油調付

惠 小兒白禿瘡先剃頭去瘡痂死血出盡河水洗拖

乾用輕粉韶粉付

頭禿瘡秘灸

耳後或腦後傍摸有核如彈按之不痛當頭灸五

七壯如幼少三壯即頭禿瘡不發

一方治白禿瘡及髮中生癬取能脂付之

林 治小兒白禿頭瘡團團白色以牛屎傅之

予毋秘録 治小兒白禿瘡搗揄白皮醋和塗之虫

即出髮即生

傳 治小兒白禿髮不生汁出滲痛濃者陳香薷汁少

許和胡粉傅上

千金方 治小兒頭無髮鯽魚燒末醬汁和傅之

○諸熱証治

林 惠 潮熱者胃熱也時間發熱過時即退來日依時發

熱此欲發驚也地骨皮散主之

地骨 知 柴 参 苓 半 甘 等分

右細剉水煎

壯熱者心熱也一向熱而不已甚則發驚癇也導赤

散主之 方在前

一云觀其睡口中氣温或合面睡及上竄咬牙皆

冒心熱也導赤散主之有就冷之意故合面而卧

風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有風証入參生犀散主之方在後

一云肝熱者尋衣捻物瀉青丸主之

肝心熱目視不搐瀉青丸導赤散主之

濕熱者脾熱也但溫而不熱也瀉黃散主之

肺熱者手揩眉目鼻面甘桔湯主之

桔梗五分　甘草一兩

右細剉水煎溫服

肺盛復有冷風胷滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺瀉白散主之後發散風冷肺只傷寒則不胸滿

肺虛熱唇深紅色少服瀉白散

肺臟怯唇白色宜補肺阿膠散主之

若悶亂氣粗喘促喉氣者難治肺損故也

脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相榮故名曰怯肺主唇白白而澤者吉如枯骨死

惠冊溪云

上竄搖頭咬牙心熱連甘○額上紅心熱連○目連閉肝熱柴風甘○左腮紅肝風瀉青丸○右腮紅肺風瀉白散○鼻上紅脾熱瀉黃散○頦下紅腎熱知柏甘○五心煩熱傷食証也

濕熱肖膈煩滿皮膚色如橘黃睛白赤黃加減瀉黃散

骨蒸熱及病後餘熱 林

小兒骨蒸肌膚煩赤口乾日晚潮熱有盜汗五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉及大病餘毒不解或傷寒後食肉体熱不除宜生犀散

大黃 蒸焙 鱉甲 醋炙 麥門冬 黃芪 秦艽 犀角 鎊 桑白 人參 茯苓 地骨皮 赤芍 柴胡 枳殼 各等分

右㕮咀入青蒿少許水煎○一方有知母○有痰加半夏

一方犀角 地骨 芍 柴 葛 甘 各等分

右㕮咀入薄荷水煎 瘧疾生姜煎服

○通治例

林 四君子湯 調脾胃進飲食隨証加味量兒大小用之

人參 白朮 白茯苓 甘草 各等分

右㕮咀入棗姜水煎加陳皮縮砂各六君子湯○殺虫苦練根煎湯調服○常服調氣加山藥○吐

瀉腹痛煩渴加芡藿葛白扁豆○心神不定怔忡心煩加辰砂茯神○驚啼手足微搐睡卧不安加全蝎釣藤白附○脾腎虛弱生風多困加半夏沒石子冬瓜仁○發渴加乾葛木瓜枇杷葉○胃冷嘔沫加丁香○脾胃不和倍术姜棗或六君子更佳○傷食加神麯○涎嗽加杏桑半○風壅邪熱加荆風○頭面生瘡加括桔○盜汗加陳皮浮麥黄耆○虛汗多夜啼加犀角麥門冬○小便赤澁加麥門冬茯苓○吐逆四肢逆冷低陷加藿香丁子○泄瀉加陳皮厚朴○赤痢加芍皮○滑泄加煨訶子○霍乱吐瀉手足冷加白薑○腹脹去棗加枳殼木通蘇子○大便不利加大黄朴硝○小便不通加木通車前○喘嗽加知貝杏蘇子○唾血加生地藕節○衄血加梔子竹葉

○疳証篇

○腎疳難治

劇疳五絶之説

小兒五疳之証唯腎疳為害最速者蓋禀受不足腎虛受邪熱氣奔上焦故以走馬喻初作口氣次弟齒黑甚則齦爛熱血迸出為齒牙脫落宜急治之縱得全活齒不復生

其餘諸疳或飲水不已滑泄不休舌上黯黑目睛青筋眼角黑氣小便如乳牙黑骨枯脫肛痃逆氣促唇白腹高人中平滿抱著手足垂韡無力襯著脚心全不知痛身体變冷爲五絶皆不可救也

○疳因

惠 丹溪云小兒嬌嫩飽則易傷飲食不調甘肥無節或嬰兒缺乳粥飲太早耗傷形氣延及歲月五疳病成甚者肖陷喘嘘直瀉腫滿腹脇疼脹肌肉光紫與夫疳勞渴瀉而槁色脅齒露張肚硬不食者雖盧扁難治其攻

儘 經曰數食肥令人內熱數食肥令人中滿 蓋其病曰肥甘所致故命名曰疳

若夫或乳哺未息胃氣未全父母不能穀氣未完襁褓乳子或四五歲孩提調攝惟務姑息舐犢之愛遂恣食肥甘與瓜果生冷漸成積滯膠固以致身熱躰瘦面色萎黃或肚大青筋虫痛瀉利而諸疳之証作矣

錢氏云兒疳多曰大病後吐瀉以藥下之致脾胃虛損亡津液而成此說特一端耳未可悉以爲然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致與

○五疳　惠林

腎疳、体瘦身有瘡疹寒熱時作頭極熱足冷如氷宜

地黄丸方在前

心疳、面黄臉赤煩滿壯熱心煩口瘡虛驚宜黄連丸

脾疳、体黄肚大愛吃泥土脹滿氣麁利下酸臭宜益

黄散

脾疳、搖頭揉目白膜遮睛汗流腦熱合面而卧筋青

髮立肉色青黄羸瘦宜生熟地黄湯

生地　熟地　芎　苓　殼　杏　連　麯

甘　䕷　地骨　天麻

肺疳、欬嗽氣逆多喘揉鼻咬甲寒熱宜清肺湯

桑白　紫蘇　前　苓　䕷　翹　風　苓

桔　地　天門　甘

○右細切水煎温服

○無辜疳毒

右細剉入生薑水煎温服

惠無辜疳毒、腦後項邊有核如彈按之轉動而不痛

其間有虫如米粉不速破之則隨氣流散淫蝕臟

腑以致肢体作瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高

皆由氣血虛羸所致用三稜鍼刺破膏藥貼愈

林 蕪荑丸 治無辜疳毒

蕪荑 黄連 胡黄連 青黛 蝦蟆炒焦等分

右為末作丸米飲下

丸晒小兒衣須火烘恐雌鳥落羽所汚虫入小兒

皮毛亦致此疾

○雜疳

傳

骨 筋 疳則 瀉血而瘦 喜卧冷地 宜地黄丸

內 疳則 目睫腹脹利色無常或沫青白瘦弱 此冷証也木香丸

外 鼻下赤爛自涕鼻頭有瘡不結痂繞耳而生白粉散

熱疳潮熱如火大便乾澁肌肉黄瘦雀目夜視不見

用胡黄連丸

冷疳時時泄瀉虛汗如雨不止至聖丸

脊疳虫食脊胎身熱下利羸瘦頰咬指甲大芦薈丸

乾疳瘦悴少血舌乾搭口癡眼乾渴身熱手足青冷

大便乾結宜鱉血丸

蛇疳食肉太早或腸胃停蓄肥膩其証多啼嘔吐清

水腹痛脹滿唇白紫黑腸頭及齒痒宜下虫丸

尿白乳哺失節脾傷便濁白色久而成疳亦心膈伏

熱兼而得之宜茯苓散

莪稜 苓 縮各五分 青陳滑甘各二分半

右爲末門冬燈心湯調下

走馬牙疳牙斷潰爛由臟腑虛熱乳食不調致成疳病內有疳虫上蝕齒牙腫爛消黑口多臭氣鼻疳上焦壅滯疳虫上蝕鼻中赤痒壯熱啼叫皮毛乾焦肌膚瘦削鼻下連唇生瘡赤爛宜麝香散

麝半分別研 雄黃研 升麻各二分半 白礬枯五分

右細末人乳汁調敷

○治疳方法

林五疳保童圓 治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑相調或乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好食肥膩甘酸之物即成五疳謂五臟疳也並皆治之

黃連 白蘞 龍膽 青皮 五倍子 蟾頭炙焦 夜明砂炒 楝根 雄黃 麝香 青黛 天漿子 熊膽 芦薈 胡黃連各一兩

右爲末糯米糊丸麻子大一歲兒每服一丸米飲下一方有乾蝸牛炙

化虫丸 治因疳生虫五心煩熱

蕪荑　黄連　神麯炒　麥芽炒等分

右爲末麵糊丸粟大空心米飲下○五疳陳皮湯下○寒熱往來薄荷湯下○虫咬心痛苦練子湯下○乳癖氣結或下利赤白腹痛後重腸鳴泄瀉陳米湯下○加烏梅炒陳皮治喫泥土炭五心煩熱鼻赤齒搖

歌曰

小兒疳病瘦尫羸　保童丸内入蕪荑
更兼苦練史君子　等得孩兒日漸肥

一方治小兒疳病肚大用癩蚵蛂三个五月五日佳將塩塞口内用碗蓋地上候死了新瓦上文武火焙乾爲末　木香　槟榔各五分　輕粉一貼

右爲末和匀前藥猪肉蘸喫利出黑糞効

一方加巴豆燒存性

下虫丸　治蛔疳

水香　貫衆　桃仁　蕪荑焙　楝根皮酒浸焙　槟榔各二分　輕粉半分　蝦蟆炙焦三分　史君子五十个煨取肉

右爲末麪糊丸菉豆大每服二十丸天明肉汁下加歸　連各二分半　治肯疳疳勞

傳　木香丸　治冷疳

木香　青皮　槟榔　肉豆蔻各二分半

麝香二分別研續隨一兩去油蝦蟆火者三个燒存性

右爲末蜜丸薄苛湯下

胡黃連丸　治熱痢

胡黃連　黃連各半兩　辰砂二分半別研　蘆薈

麝香各一分　青黛半分

右細末和勻飯丸麻子大米飲下一方用蝦蟇

半兩焙乾不燒

惠大蘆薈丸　治脊痢即胡黃連丸內去辰砂蝦蟇加槟榔蕪荑蟬退

傳如聖丸　治冷熱痢瀉

史君子一兩　胡黃連　黃連　蕪荑炒各二兩

麝香半分別研　乾蝦蟆五个酒煮成膏

右細末和蝦蟆膏丸麻子大人參湯下

一方治痢積腹大

胡黃連去痢積果積　阿魏醋浸去肉積各五分　麝香當門子四粒

黃連炒去熱積酒積　神麯炒去冷積各二分

右爲末和飯丸麻子大米湯送下一方有蘆薈

半分

肥兒圓　治諸痢多因關乳喫食太早或因患泄瀉

胃虛虫動目漸羸瘦腹大不能行髮竪發熱無精神

黃連　神麯各一兩　麥芽炒五分　木香二分
槟榔三个　史君子　肉豆蔻麵裹煨各五分

右爲末麪糊丸蘿蔔子大每服三二十丸量兒歲數加減熟水吞下

○疳瘡

惠自孩提至成童潮熱發瘡乃疳氣使然疳虫蝕其肌膚空虛疳熱流注遍身熱瘡發渴無已

銅青散　治走馬牙疳口内生疳瘡牙斷潰爛齒黑欲脫或出血臭氣

白芷　馬芽硝　銅青各一分　麝香一分

右爲末敷口角擦齒上

蟾酥散　治走馬牙疳齒龈臭爛浸蝕唇鼻一應疳瘡

蚵蛾燒　黃連　青黛等分

右爲末入麝少許敷之

洗方　大腹皮　苦參　白芷等分

右細剉煎湯淋洗尤妙

一方　甘草　黃栢　馬鞭草　連鬚蕊

荊芥各等分

右細切水煎洗之

金線錠子　治走馬牙疳凡貼疳瘡無如此藥最効

人言一分　雄黃半二分　乾胭脂半分　飛羅麪四分

右細末水和搓成條如線先用米泔洗淨患處

搯碎貼神効

傳　白粉散　治疳瘡

烏賊骨未七　白芨未七　輕粉一七

右和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

林　聖惠方　治小兒疳瘡虫蝕鼻用熊膽半分湯化

調容於鼻中

○灸法

林　疳瘦灸尾骨上三壯脫肛瀉血亦灸此

瀉痢痃癖積聚臍腹痛不嗜食痰喘寒熱腹脹黃

瘦灸脾俞二穴各七壯在十一椎兩旁各一寸半

○痘瘡篇

○痘疹源因

傳　經曰諸痛痒瘡皆屬心火

夫小兒痘瘡之証最爲酷疾不日之間死生反掌蓋因胎毒藏命門遇歲火太過熱毒流行之年則痘毒從之而發作矣一發則出於心肝脾肺四臟而腎無留邪者爲吉也若初發便作腰痛見點則紫黑者多死蓋毒氣留於腎間而不發越故耳錢氏有百祥丸大下之法然活者十無二三

太抵痘瘡之法多歸重於脾肺二經蓋脾主肌肉肺主皮毛故遍身爲之斑爛也

林　夫小兒斑駁癍毒之病俗言癍子是肺胃有熱其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰蒸於膚狀如蚊蚤所咬赤斑遍体凡赤斑十生一死黑斑十死一生

又云藏府蘊熱不同表裏受証各異

疹

小兒時氣欬嗽聲重涕唾稠粘目眵惙赤煩熱渴燥此則肺胃蘊積熱毒發則易出一出遍於肌皮見而漸沒病在表受毒之淺此名疹子俗曰麻子

斑

又或時行温毒薰蒸病在裏受毒之深發皮膚遍躰狀似錦紋或如虫咬痕類小豆大或赤或黑是名曰斑

水痘

又有水痘一証與正痘不同易出易靨不宜燥湿

苟濕之不爲害但不能結痂則爛成瘡矣

○辨內外因

瘡欲出而未出曰發搔者是感風寒之邪而內發心熱宜惺々散或升麻葛根湯參蘇飲

瘡欲出而未出而吐利者是中焦停寒或挾宿食宜四君加縮陳但挾宿食紫霜丸

丸

惺惺散 术 桔 細 參 苓 甘 括 各三分

右細剉作一服入薄荷三葉水煎與服

木香參蘇飲 參 三分 蘇 桔 葛 前 各四分 陳 苓 各半 木 一分半 半一分 殼 炒

右細切入生姜水煎溫服

紫霜丸 杏仁 五十枚去皮尖 赤石脂 一兩別研 巴豆 三十粒去膜油 代赭石 煆醋淬研一兩

右各別研和勻餅爲丸食前米飲下或乳汁送下

傳 夫嬰兒之胚胎必資以長其形緣母失節慎本內標外縱慾恣飡感其穢毒之氣藏之臟腑近自孩提遠至童丱值寒暄不常之候瘡疹由是而發曰其所受淺深而爲稀稠焉

夫瘡疹皆由子在母腹浸漬食母血穢而成毒皆太陰濕土蘊滯君相二火之所作也或因天寒傷表傷裹痘曰是而生當外者外治內者內治中外皆和其

痲自出○惡寒者發之○表大熱者奪之○渴者清之○秘者通之○驚者安之○泄者分之不可熱一

○傷寒痘疹表裡前後

瘡疹証狀雖似傷寒而其治法實異

傷寒瘡疹從表入裏裏入表也

○瘡疹察証

傳夫小兒瘡疹大抵與傷寒相似發熱煩躁險赤唇紅身痛頭疼作寒作熱嚏噴呵欠喘嗽痰涎始發之時有曰傷風傷寒曰時氣傳染曰傷食發熱嘔吐曰跌撲驚恐畜血而得者或爲目竄驚搐如風之狀口舌咽喉肚腹疼痛自汗下利發熱不發熱証候多端卒未易弁必須以耳冷尻冷驗之蓋瘡疹屬陽腎臟無証其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脉赤縷爲之真凡瘡疹分人清濁就形氣上取勇怯

林瘡疹由內相勝也惟斑疹能作搐疹爲脾所生脾

虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜爲熱神氣不安因搐癇○斑子爲心所生心生熱熱則生風風屬肝二臟相傳風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母括蔞湯主之

惠宜弁外感瘡疹食傷

外感錢氏曰傷寒身躰重而面黃女面赤喘急惱寒口中氣熱呵欠頻悶項急也

痘疹則腮赤多嚏噴悸動昏倦四肢冷尻冷耳冷

潔古云凡傷風則皮澁拘急鼻塞斑疹則睡中驚悸呵欠嚏是爲易識矣

傷食則大便酸臭腹緊不消化畏食宜下之

○辨治例

傳痘疹治法首尾俱不可妄下但溫涼之劑兼而濟之

- 解毒
- 和中
- 安表
- 而已

大抵

- 虛者益
- 實者損
- 寒者溫
- 熱者清
- 之

凡熱不可驟遏但輕解之若無熱則瘡又不能發也

大法

- 活血
- 調氣
- 安表
- 和中
- 溫涼之劑兼而治之此平治之法也

輕清消毒

溫涼者如

黃耆　木香　當歸　前胡　葛根　升麻　之輩

佐之以芎芍殼桔紫通羌之屬則調適也

夫痘疹用藥固有權度二便不可不通一有秘結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄看大便黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑

若一秘結目閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而變矣

傳王氏指迷曰痘疹亦時氣之一端一人受正傳染其餘

又曰瘡疹有熱則易出一出遍及於肌膚

張喚曰痘子氣均則出快蓋血隨氣行氣逆則血滯

錢氏曰肝風心火二臟交爭而致搐

又曰痘疹未形而先搐大忌涼心蓋瘡屬心心主血心寒則血不能行

大抵治驚推平肝利小便均氣最妙

仁齋楊氏曰大熱當利小便宜五苓散導赤散小熱當解毒宜消毒飲四聖散

林或（不出黑陷）服藥不効者用無價散刼之
若五七日痂不焦是內發熱熱氣蒸皮中故瘡不
得焦痂宜風散導之用生犀磨汁解之使熱不生
必著痂矣

惠若憎寒困倦而成縮伏是脾虛也急宜先治預保
脾土

○偏用戒慎錢氏田氏不備劉張專京陳氏貴溫

惠丹溪曰痘瘡之論錢氏為詳田氏保嬰庶幾近理
然二書多略而不備劉張多用涼藥陳氏多用溫
藥專門不通者偏用之立見殺人

陳氏之意蓋歸重於太陰二經（手太陰肺主皮毛惡寒　足太陰脾主肌肉惡濕）故
用桂附果有寒濕量而用之若不問寒熱虛實槩
投之寧無誤妄之禍哉

傳近時治痘疹者悉宗陳文中木香散異功散殊不
知彼立方之時必運氣在寒水司天之令及值嚴
冬大寒為因其氣鬱遏痘瘡不得起發紅綻故用
辛熱之劑發之其宜也
今人不分時令寒熱一槩施治誤人多矣

愚按陳氏之二方乃素問從治之法又謂之熱曰

熱用者也

蓋痘瘡熱毒怫鬱于內而不得發起故

輕重用（參歸朴橘 附木桂蔻）等之辛散刼鬱之劑一二服刼而開之使鬱于內者盡目藥氣而發越乎外故痘子陷伏灰白色者皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如一二服後刼而不起者亦不可多與多則反其毒轉增黑爛咽閉聲沉而死

近世儒醫悉引內經病機諸痛痒瘡皆屬心火之語以正陳氏之失此（知常而不知權）之論也故後人不決疑當用而不敢用袖手待斃哀哉

傳今醫往往不同（依陳氏而行者多用熱藥 宗劉張而治者多用涼劑）是故不偏於熱則偏於寒此刻舟求劍之道也

經曰（寒者熱之 熱者寒之 微者逆之 甚者從之 逆者正治 從者反治）多觀其事（陳氏用從治之法權 劉張用正治之法常）也

然皆不外乎參朮耆甘芎歸芩茯芍藥等補氣血藥為主治焉

亦當看時令寒熱緩急施治固不可執一見也

林古方以升麻葛根湯治痘疹已發未發皆可服世習以為常蓋（葛根升麻）性皆寒涼能虧損胃氣尚

小兒臟腑虛弱恐氷凝血脉使未出者陷伏上下已上者不能起張上故
陳氏只用於未見紅斑之先戒於已出紅斑之後
愚謂小兒纔覺發熱未明痘証疑似之間不如用
參蘇飲加青皮木香尤爲穩當若痘証已明或微
見根窠光澤紅活者亦不必服此
愚古方凡痘出宜温煖不令通風
後人執此二句不知天令人事通變致誤者多若
已出身熱天暄何必蓋覆不使之通風乎當以脉
爲主
林冊溪曰讀前人之書當知立言之意苟不知其意
求適於用不可得也痘疹之論錢氏爲詳歷舉源
流明經絡分表裏虛實開其治法証以論辨深得
著書垂教之躰使後人如求方圓於規矩較平直
於準繩引而伸之觸類長之可謂無窮之應用也
今人不知致病之因不求立方之意倉卒一試設有不應并
其而棄之近曰局方之學行素問之道不明皆喜
温而惡凉喜補而惡解利忽得陳氏方論遂以爲
錢氏不及也雖然陳氏亦可謂善求病情歸重於
太陰經也
○痘証順逆輕重

傳 其爲証 宜發起宜紅活凸綻
不宜鬱滯不宜紫黑陷伏

危痘疹 春夏爲順 秋冬爲逆

身躰 温暖者順 寒凉者逆

能食 不食 而大便 實者順 利者逆

輕者 作三次出眼中無 大小不一 根窠紅活乳食如常 頭面稀少肥滿光澤大小便調 一齊並出瀉渴不止

重者 密如蚕種身温脹外白内黑外黑内赤 瘡灰白色頭温足冷

輕變重 犯房室不忌口 先曾瀉 飲冷水餐凉藥妄下妄汗冒風寒 食生冷過飽失飢誤服升麻湯 信巫不信醫不避織

重變輕 避風寒 常和暖 大便稠

忌生冷 避織

先發搔而後發瘡者生 瘡後發驚者危

春膿疱 金 尅木 夏黑陷 水 尅火 秋斑 火 尅金 冬疹 土 尅水

皆不順也 雖重病十沽四五 黑者無問何時十難救一二

其候或寒戰噤牙或身黄腫紫急百祥丸下之下

後悪寒不已身冷汗出耳尻反熱者死

林 瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順 水穀不消者逆

是 脾強腎退即病出而安 食乳不化者脾虚不能制腎故自泄難治

○痘瘡形証日數輕重

傳　微甚者其邪在腑發細疹狀如蚊蟲所螫點點赤色俗名麩瘡臟發痘瘡狀如蹠豆根赤頭白穴出膿水俗名豆瘡

二三日始見微微欲出或如黍粟菉豆水珠光澤明淨者佳

四日大小不等根窠紅光澤者輕

綢密隨頂併瀉者重

六七日瘡形肥紅光澤者輕不須服藥

身熱氣喘口乾腹脹足指冷者重

八九日長疋紅滿瘡蠟色者輕不須服藥

寒戰悶乱腹脹煩渴氣急咬牙者至重

十日十一日瘡當結靨痂欲落之時將愈

十二十三日當靨而不靨者為逆身熱稍利之以防其餘毒身不壯熱或腹脹或瀉渴異功散救之

○痘疹虛實証治

傳　靨當察色詳証以弁表裏虛實用藥

其吐瀉不能食為裏虛

不吐瀉能食為裏實

吐瀉陷伏二者俱見表裏俱虛

夫灰白色陷頂多汗為表虛

紅活凸綻無汗為表實

痘疹初出色白大補氣血○但見紅点忌葛根湯

忌表虛也又諸痛為實諸痒為虛

如表（虛者瘡易出而難靨　實者瘡難出而易收）

如裏（實則出快而輕　虛則發遲而重）

如（表實裏虛則陷伏倒靨　裏實表虛則發慢收遲）

裏

表（實而（補則結壅毒　用實表之藥則潰爛不結痂））

治法三日已前未見紅點必用升麻湯參蘇飲以發其表務令發汗爲度○若未汗表猶未解雖略見紅點隱約於肌肉間而升散開發之劑尚未可除

凡痘瘡須分氣虛血虛用補藥（氣血（虛用（參朮　四物））加解毒藥酒炒芩連各解毒）

蓋芩連爲瘡家之要藥酒炒（以制峻寒之性　獨存酒涼解毒之能）故痘瘡用殺其毒耳

雖分氣血虛實多屬氣血不足當於不足中別其優劣以補氣血藥中分輕重當用以平爲期耳

痒塌者當於形色脉上分虛實

實則脉有力氣壯實　實

虛則脉無力氣怯虛　虛（痒（如大便不通少用大黃下結糞　以實表之劑加涼血藥））

氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以鵝翎刷瘡上潤之

乾者宜退火止用輕清之劑荆芎升猇之類

○痘瘡色辨

傳 凡痘瘡
- 炉灰白色淨者作寒
- 紫黑色
- 齊湧躁悶者為熱
- 黑者屬血熱涼血為主
- 白者屬氣虛補氣為主
- 中黑陷而外白起相兼而治

五臟（形色見証）其源實系於心一云相火之氣所為

故入於未
- 肝則成水疱疱色如淚其形小俗名麸瘡
- 肺則成膿疱膿稠濁如涕其形大俗名豌豆麻豆
- 脾則成瘾疹其色淺黃而如糠麸其形小
- 心則成斑其色純赤其形小

腎居下獨不受於毒故無候但耳尻冷耳若痘瘡黑陷耳尻反熱者為逆

見証
- 呵欠頻悶肝証
- 時發驚悸心証
- 乍涼乍熱肢冷多睡脾証
- 面腮燥赤咳嗽肺証
- 腎在腑下不受穢濁故獨無証

傳 痘瘡將成就而脚色淡者宜助血藥芎歸酒洗芍藥之類

或如紅花色紫者宜涼血解毒芩連升麻葛之類

○甚者必用犀蓋犀能解痘毒

將靨時白色如豆殼者因初起多飲水

其腦不齊名曰倒腦不好宜服實表之藥及消息

○便何如

大便秘宜利若秘內煩外熱者小柴胡加穀最穩

小便秘宜利若澁赤大連翹湯甘露飲

○形氣証治

瘡已出聲不變者形病也形病身溫者宜解毒防風湯

瘡未出而聲變者氣病也宜補肺散加生黃芪

若

瘡已出而聲不出者形氣俱病也

大便閉者宜當飯丸

形氣俱病素弱兒宜預服十奇散

肺主氣氣不足則致

瘡頂陷塌不綻肥

自汗聲不出

並宜十奇散

自汗倍芪

聲不出倍桔

心主血血不足則致

根窠不紅

皮白色

不光澤

並宜芎歸湯加紅芍紫良方

解毒防風湯　防風一分　地骨　生芪　芍藥　大力子炒各半分

○右細切水煎或爲末湯調服

補肺散　膠珠半分　大力子炒三分　馬兜鈴半分　甘二分半

杏仁三粒去皮　糯米一分炒

右剉分二服煎食後時時服加生芪半分

當歸丸　歸半兩　連一分半炒　大黃二分半　甘一分半

右細末丸食前米飲下漸加至利爲度

十奇散　芪　參　䕷各一朱　朴　桔各一朱　桂三朱　芎

風　甘　芷各一朱

右細末酒水溫調下或剉煎亦可

芎䕷湯　䕷　芎各二朱半

右細剉水煎溫服

○隨經治例

林王海藏云痘瘡治法大抵傷寒同治隨經用藥最爲高論

治（傷寒當發散　痘疹行溫平有大熱宜解毒）

傳六經証治

○大陽病惡寒身熱尿赤澁出不快宜荊芥湯

○少陽病乍寒乍熱出不快宜連翹湯

○陽明病身熱目赤大便閉實瘡遍肌肉出不快宜

升麻葛根湯加紫草

○大陰病自利厥冷宜附子理中湯木香散

○少陰痘瘡黑陷口舌燥宜四物加紫紅（二陰）

○厥陰病舌卷卵縮時發厥逆宜異功散

病法當救裏故溫劑助之

荊芥湯　荊　芥各六分　甘　風　芎子

右細剉水煎溫服

連翹湯 翹 風 瞿 荊 通 柴 車 皈
赤芍 滑 蟬蛻 芩 柴各三分 甘
右細剉水煎溫服二便自利者不用

升麻葛根湯 葛 升 芍 甘炙各一分
右細剉加粳米五十粒紫草三分煎與

理中湯 參 甘炙 术 姜炮各八分
右細剉加炮附水煎熱服

木香散 木 參 桂 青 芩 前 大腹皮
訶煨去核 半 丁子 甘各三分
右細剉加姜棗煎與

異功散 木 皈 桂 术 芩 陳 朴 參
蔻 丁子 半泡七次 附泡各三分
右細剉加姜棗煎與

三陽証治

九痘瘡春夏爲順當純陽之時也

足脛熱
兩腮紅
大便秘
小便赤
渴不止
上氣急
脉洪數
九七証不宜服熱藥

瘡疹一發便密如蚕種布或如糠粃者合清表升麻

葛根湯加翹

瘡未出而先搐是兼外風寒宜犀角地黃湯

瘡出不快清便自調知其在表當微發散升麻葛根

湯

若瘡青乾黑陷身不大熱二便澁滯是熱蓄於內大

黃煎湯下宣風散

若表大熱者不可下

若瘡已發稠密微喘渴欲飲水宜微下之

當歸丸　外以黃柏膏塗面佳

值盛夏暑熱正熾適瘡大發煩渴大便實者宜甘露

飲

犀角地黃湯　犀角鎊　生地　牡丹　赤芍各等分

右細剉水煎溫服

黃柏膏　柏一兩酒炒　菉豆一兩去殼　甘草四兩

右細末以生麻油調從耳前至眼眶並厚塗之

日三二次如用早能令瘡不至面縱有亦稀少

甘露飲　生地　熟地並酒洗　天門　麥門　枇杷葉

免去毛　枳殼麩炒　黃芩　石解　茵陳　甘草

右各等分細剉水煎食後溫服

○三陰証治

凡痘瘡發於秋冬爲逆當純陰之時也

凡七証不宜服寒藥

足脛寒
腹虛脹
糞青色
面㿠白
嘔乳食
目睛青
脉微細

痘盛出四肢逆冷或自利係太陰脾經異功理中急溫之

痘平塌灰白色不澤是正氣不足宜十奇散倍芪加附

或四肢厥冷時發搐搦係厥陰宜異功散加防風青皮

○出不快証治

傳 凡痘瘡出不快者有五証

一証天時嚴寒爲寒所折不能起發宜散寒溫表冬寒甚紅斑初見正氣散調解散可也

正氣散 甘 炙三 永半 陳 藿 朮 各半 永 朴 半 各姜製 各一 永半

右剉入姜棗煎與

調解散 青 陳 殼麩炒 桔 參 半 泡七次 芎 通 葛 各四分 甘 蘇 各二分

右細剉入姜棗煎與一方加紫草糯米

一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散

生地　麥門　煎湯調服

辰砂五苓散　五苓散加辰細研爲末是也

小柴胡
白虎
人參竹葉　湯宜擇用

一証服凉藥損傷脾胃或胃虛吐利當温中益氣宜

理中湯吐利甚加附

一証或成血疱一半尚是紅點此毒氣發越不透必

不能食大便如常者宜半温裏半助養之劑四聖散

加減紫草湯亦可

一証外實之人皮膚厚肉膩密毒氣難以發泄因出不

快宜消毒與透肌散○若大便秘實於消毒飲內

加大黃梔子煎與○瘡出大稠宜犀角地黃湯解

毒防風湯○血氣不足宜十奇散○咽嗌不利宜

如聖湯加苛殼○口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘

露飲

透肌散　紫　升　甘各一

右細剉水煎温服

消毒飲　牛蒡子三錢炒　荆一錢　生甘半錢　風半錢

右細剉水煎加生犀尤妙

如聖湯　桔梗紅　甘草一分　一方加牛

右細剉水煎時時溫服

瘡出不快

活血散　加防風湯　白芍藥

右細末每服一分溫水調下止痛酒調尤驗

王海藏曰四肢出不快加防風一方赤芍也

紅花湯　紅花一合

右以水半外煎百沸服之

紫草湯　治瘡出不快及大便自利

紫草　木香　茯苓　白朮各一分　甘草半分

右細切作一服入糯米一百粒水煎食前服

四聖散　紫草　木通各一分　甘草　枳殼麩炒黃色各半分

○治痘雜法

傳解肌之法　葛根升麻紫蘇之類可也

或氣實煩躁熱熾大便秘結則犀角地黃湯

或紫草飲多服能利之

大便不通者少加大黃尤宜仔細斟酌不可妄用孟

浪

小便赤澁者分利小便則熱氣有所滲而出

凡瘡疹但覺身熱証似傷寒

疑似未明（或惺惺散 參蘇飲）

熱甚者（升麻葛根湯 人參敗毒散）

若見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也

凡瘡疹初欲出時身發熱耳尻冷呵欠欬嗽面赤必是出痘之候宜升麻葛根湯加大力子痘必稀而易愈

一方以辰砂一味細末看兒大小或（一分半）蜜水調服（多少者可少無）

痘熱之時大力子爲末蜜調貼顯門免眼障之患

凡痘初出之際胷前稠密急消毒飲加芩紫煎服減食者加參

痘瘡初出之時色白者便當大補氣血參朮芪芎升葛甘木丁子酒歸白芍如大便泄加訶蔻

凡痘初發時自汗不妨蓋溫熱薰蒸故也甚者少以參芪實表

凡痘初發時煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以涼藥解其標

凡痘瘡已出少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子快斑湯之類（疎則毒少）

凡痘瘡（密則毒甚宜清涼藥解之酒炒芩連之類也雖數服亦不妨不害眼）
凡黑陷用無病小兒糞燒存性蜜水調服
瘡（乾者宜退火此用輕清之劑荊芥葛之類濕者肌表間有濕氣也宜瀉濕藥芷風之類蓋風能勝濕也）
咽喉痛者如聖湯鼠粘子湯
喘滿氣壅者麻黃黃芩湯
痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難膿粘衣著席濕痛難轉側宜白龍散敗草散
白龍散　黃牛糞日乾火煅成灰取心中白者爲末帛裹撲之
敗草散　用蓋屋及墻背上遠年腐草洗焙乾細末帛裹撲之

（惠）或以麥麩摻席簟上可若膿後二便自利下黃黑則毒氣已減不必用藥一或閉焉則腸胃壅毒脉結凝滯毒無從而瀉眼閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而告變矣宜消息之

○隱伏倒膿黑陷

（傳）一証變壞歸腎黑陷宜宣風散
一証外感風寒所致（冬宜五積散減麻黃加桂芩春宜不換金正氣散加芩芷風）
一証乳食所傷內氣壅遏宜調解散或四君加縮木　芍　紫大便自利理中可也

不換金正氣散　朴　藿　甘　半　术　陳各半分

右細剉入棗薑水煎溫服

陷入者加味四聖散

更以胡麥酒薄付其身噴其床帳衣被併以厚綿衣蓋之若未起獨聖散入木香煎服

其壞瘡者一日內虛泄瀉　二日外傷風寒　三日變黑歸腎

惠瘡黑陷青紫者錢氏百祥丸下之不黑者謹勿下

下後身熱氣溫欲飲水者可治　水穀不消或寒戰者爲逆

冊溪曰所下者瀉膀胱之邪可治者知其脾強土可以治水也

然百祥丸太峻宜以宜風散代之

瀉後溫脾參　术　苓等分　朴　木　甘各半爲妙

蓋發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢不可消

已而又泄之腎水乎此錢氏不判之秘旨也

陷伏紫黑弁曰有胃寒榮衛氣虛而陷伏者

瘡斑皆白肌膚慢不欲食或嘔大便溏小便清白宜

溫之活血散人齒散

虛寒甚而自利雖附子理中豆蔻亦可少用瘡出爲

期

有毒氣內外壅遏熱蓄不散毒氣壅於肌膚急出不得遂致倒膈黑色蓋血活如朱砂如雞冠色若毒癥血聚則黑色由毒氣暴出瘀熱搏之故血凝而不得出爲黑膈其証最悪○二便秘腹脹喘滿煩躁者宜山梔子湯

○安（汗下）之變

心傳

九（已發 未發）並與紫蘇飲爲當

者（虛 實 冷 熱 益 損 溫 平）之是爲權度備喻而言亦如庖人籠蒸之法但欲鬆耳

毒發於表

毒根在裏

若苟安（汗下）

汗則栄衛益虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間変証者多矣

下則內氣益虛不能出而反入由是土不勝水変黑歸腎

身体振寒
耳尻反熱
眼合肚脹
其瘡黑壞

十無一生

汗下二說古人深戒以此

林或脾衰腎旺致黑陷歸腎以百祥丸下之是皆不得已而用之十救其一二○下之後若加寒戰身冷汗出不食水穀不化耳尻反熱者乃脾弱腎水勝其死必矣

醫者其下膀胱於既壞之後何若保脾土於未陷之先爲上策

○辨不藥而愈 附慎戒

傳 凡六証並不須服藥

痘脚稀疎 根窠紅綻 不瀉不渴 乳食不減 四肢温和 身無大熱

惟宜善加調護須使居室温屏

忌 聞諸穢氣 見外人 犯房色 近月水婦人腋臭者

宜燒大黄蒼朮以辟惡氣燒木香亦佳勿燒沉檀

降真乳香脳麝

林 凡瘡疹乳母慎口又不可令飢不可令受風冷必當腎而變黑難治也

○平治方法

傳 諸治以平爲期万不失一

石壁胡氏曰小兒難任非常之熱不可任非常之冷

若熱藥太過輕則吐利腹脹重則陷伏倒靨是宜温凉適中可也

仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發史氏曰比之種豆值天時暄暖則易生

凡值天時不正鄉隣痘瘡盛發宜服三豆湯

三豆湯　赤豆　大黑豆　菉豆各一升　甘草三兩

右淘淨用水八升煮熟逐日空心任意食豆飲汁七日未不出

憲一云氣虛用參朮血虛用四物各加酒炒芩連等解毒藥調解之法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者得急溫歸芪朮輩涼前葛升類佐以芍殼桔梗通紫甘之屬則可以調適矣

○乳嬰童兒之兩治

傳乳嬰當兼治乳母俾其氣血清和飲食有節投以調氣通榮之劑以釀其乳兒飲之則瘡心肥滿光澤無陷伏之憂

童兒當備切脉審表裏虛實以汗下之苟不實不虛則但保其中和使脾氣流暢則肺金籍母之助膿速痂成無倒塌之憂

壯盛而膚腠厚密尤須預為汗解二便結澁者宜下之利之庶無患也

○危惡証狀

傳痘疹五不治

痒塌寒戰咬牙渴不止○痘紫黑色喘渴不寧○

身体振寒
耳尻互熱
眼合肚脹
其瘡黑壞
右十無一生

灰白色陷頂腹脹○頭温足冷煩亂飲水○氣促
泄瀉渴

憲 痘疹死候

瘡正出而吐利者困○出而譫語不止者惡候○
便血而乳食不化者脾虚已死○瀉血而瘡爛無
膿不治○大小便秘目閉聲啞肌黑者死○遍身
黑陷目閉無魂者死○面色青黑者死○瘡後發
驚者危○面黑或鼻有黑氣不治○燥渴尿澁泄
瀉不食者危○頭面腫瘡盡抓破臭爛不可近或
足冷至膝不治○面腫鼻陷目閉咬牙不治○痘

瘡黑焦風攻頤頷唇項腫硬或胸膈高突不治
○痘疹入目

憲 瘡疹入目蓋心熱毒生肝風肝主目熱毒衝之故
為目患涼膈丸蜜蒙花散主之○秦皮散洗之○
或目食毒物睛突出外仙靈皮散○暴赤腫痛麻
子散○患半年一年餘者蟬蛻散○目中痘瘡成
翳者大黄散○瘡入眼襄侵睛者樺皮散○赤脉
侵睛者羚羊角丸

傳 決明散 治痘入目
草決明子 赤芍 甘草 天花粉

右等分細末食後茶清下

撥雲散　治痘毒入眼

羌活　防風　柴胡　甘草炙各等分

右細剉水煎食後臨卧時服○或細末薄苛汁茶清或菊苗煎湯調皆佳

忌藏塩鮓醬濕麪炙煿炊氣一切發風動火之物

洗方　黄連剉　白滑石研　銅青等分

右用絹帛包泡湯候温洗瘡傷眼目

治出疹眼内有翳

輕粉　黄丹各等分

右研匀左右眼翳吹入左右耳内

○瘡後餘毒

痘癰者毒氣當出而不得出流於脾經則瘍發四肢手腕并膝臏腫痛頭項胸脇赤腫宜消毒飲或五香連翹散解之未成膿者小柴胡加減用之重者或面赤便秘渴嗽睡中驚叫尿赤澁或十六味流氣飲去附加大黄若禀受怯弱臚後面青不能飲食身躰倦怠無熱証與調平藥安養之不可一於解利也虛則十補湯加殼桔

傳　凡痘後不問壅毒發於何經初起紅腫時却用黑

菉赤三豆以嚴醋浸研絮時時以鵝翎刷之隨手退去神効

必勝膏　馬齒莧杵汁　猪膏脂　石蜜

右三味共熬爲膏塗腫處

毒氣流於太陰脾經壅發四肢消毒飲

流入大腸則便膿血或下腸垢或大便秘結

犀角地黃湯

一小兒瘡後二旬大便不通糞燥爲痛垂死用硝黃巴豆及蜜導俱不通愚令一婦以真麻油含口內用小竹筒一个納穀道中吹油入腸內須臾即通真良法也

㊟若又瘡疹後再作瘡疹者此亦餘毒未盡宜解利之氣虛者未可解利

滅瘢散　治瘡疹愈後痂已落其瘢尤黑或凹或凸

韶粉　輕粉　猪脂　調塗

升麻同蜜煎敷亦可

○傷地風

㊟瘡疹愈後忽遍身青或黑色手足厥冷口噤涎喘如鋸者此名中地風瘡疹方愈榮衛尚弱而暴感時令寒暑風雨地氣毒氣襲虛而入致之宜

罩 胡苟切覆也

消風散二錢入蟬蛻末二錢分三服酒生薑薄荷汁數點湯調只二三服立醒

或少汗而解再出瘾疹而愈

○妊婦瘡疹

傳 孕婦發痘罩胎散可也○胎動不安安胎飲○身熱甚木香參蘇飲○或瘡稠密十奇散倍芍歸減桂加香附烏藥○如胎已五月則桂半之屬俱不必禁

罩胎散 苓 朮 歸 白芍 赤芍 柴 葛 參 桔 條芩 風 陳 荊 殼 此 膠 糯 芷 甘 芎 縮 大熱加鬱金各三分 右細剉作一服水二盞前堂一盞柿蒂七个苧根七寸瓜蔕一个用磁器煎以荷葉解定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

安胎飲 大腹皮酒洗焙乾再黑豆汁洗 參 陳 朮 白芍 歸 芎 香附童尿浸 縮 藕 苓 甘各半錢 右細剉爲一服入燈草七莖糯米一撮煎食前溫服

○論中稱名方劑

林 五加皮散 治三歲不能行

五加皮一兩　牛膝　木瓜各五分

右爲末每服　米粥飲調次入好酒兩滴調勻

日二服

惠至聖丸　治冷痢

丁香　丁皮　木香　厚朴製　史君煨　陳皮

肉豆蔻濕紙裹煨

右爲末麪糊丸麻子大米飲下

惠鱉血丸　治痢勞

人參五分　川芎　蕪荑　柴胡各一兩　史君二兩

胡黃連　黃連各二兩用鱉血二盞吳茱萸二兩和二連浸一宿次日炒

右去茱萸并血同衆藥爲末粟米粉糊丸麻子

大食前熟水下

林大連翹湯　治痘瘡發熱

村連翹　防風　梔子　甘草各等分

右細剉水煎溫服減梔子名連翹防風湯

同化毒湯　治痘疹已出出不快

紫草茸　升麻　甘草各等分

右細剉入粳米水煎溫服

惠麻黃黃芩湯　治痘疹出不快煩躁不得眠

麻黃去節一兩　赤芍　黃芩各半兩　桂去麄皮　甘草炙各一分

右細剉水煎溫服

同百祥丸（一名南陽丸）治嗽而吐氷

用紅芽大戟陰乾水煮軟去骨晒乾再納汁中

煮汁盡焙乾

右爲末水丸粟米大每服一二十丸研赤芝麻

湯下

林人齒散　治痘疹初出光壯忽然黑陷心煩性躁

氣喘妄語或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必

死　人齒（燒存性）

右爲末每齒作一服酒下

惠山梔子湯　治瘡疹毒黑色

梔子　白鮮皮　赤芍　升麻（各一兩）　寒水石

甘草（半兩）

右細剉入紫草薄苛少許水煎服

紫蘇飲　治欬逆上氣乳哺無度內挾風冷乳與氣

相逆氣不得下

蘇子　訶子　蘿蔔子　杏仁（去皮炒）　木香

人參（各一分）　青皮（各七分半）　甘草

右㕮咀每服一分水煎溫服

林蜜蒙花散　治痘疹諸毒氣入眼昏暗生翳膜

蜜蒙花 各半 青箱子 決明子 車前子 各半

右爲末白羊肝一片破開二片摻藥令勻却

合作一片濕紙裹煨於地上出火毒空心米泔

嚼下

回 蟬蛻散 治驚風天釣心熱夜啼瀉疾

蟬蛻 六十个去足翅 荆芥 一兩 甘草 蜜炙 大黃 煨 黃芩 各四

蝎梢 五十个去毒

右細剉每服一錢水半盞入白茅根少許煎至

半分二三次服

鑿 消風散 荆 甘 炙 陳 朴 各五 白姜蚕

蟬蛻 炒 參 苓 風 芎 藿 羌 各二

右細末荆芥茶清調下

五苓散 脾積圓

小柴胡湯 木香槟榔丸

四物湯 白虎湯

來復丹 人參竹葉湯

止汗散 阿膠散

人參敗毒散 鼠粘子湯

凉膈丸 五香連翹湯

十六味流氣飲 五積散

十補湯

已上一十七方宜閱諸書不收舉

所從證經籍

心傳衍著得蘭說惠宗

丹溪心法
醫學正傳
義本草
明醫雜著
効方
室秘藏
醫說
濟方
醫林正傳

玉機微義
致餘論
本集本草集要
疑
液
難知
篆
百

小醫經小學
醫經小學
醫經精義
林醫林集要或集
湯本草
此方
丹溪要
傷寒問

鑑衛生宝鑑
外科精要
內經
脾胃論
選醫方選要
掌活人指掌
全金九集

脉經 王氏〃 脉訣 辨和〃 局 和劑〃方
因 王〃方 灵 〃樞 本事 〃〃方
鍼經 靈樞 濟 〃生 難 八十一難經
垣 東〃十書 原 〃病式 珍 神〃方
秘 丹溪秘傳方 臺 外〃秘要方 龍 龍木論
聚英 針灸〃〃 源 巢氏病源論 集驗 外科〃〃
明 醫學發〃 精要 外科〃〃 囊 青〃雜纂
瑣 〃碎錄 婦 〃人良方或良 詩 毛〃
痢 廣〃要語 千 〃金方 博 〃物志
事 〃林廣記 兒 小〃方 小神 小兒神藥方
察 〃病指南 錢 〃氏小兒方 廣 〃利方
海 〃上方 子母 〃〃秘錄 迷 王氏指〃方
嬰 田氏保〃集

九六十四部之隱括樞機久試既効耳拾集之而成此書云

察證辨治啓迪集卷之八畢

右此一部予從少壯及老年閱數十醫書而為切脉并證配劑最樞要者抄出之近年集之分門部類而書為八卷以欲啓迪後学耳

于時元亀三壬申年七月吉日

洛下翠竹庵　盍静翁道三

慶安貳己丑歳　仲秋日　千村次郎右衛門　開板