


得
効
方



四
五

世醫得效方卷第四

大方脉雜醫科

諸積

肉積三稜煎口治脾虛為肉食所傷停久不散作為腹滿膨痛或泄瀉每服三十五口淡薑湯食後

服方見諸氣類

阿魏口治脾胃怯弱食肉食麪或食生菜停滯中焦不能剋化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或秘

阿魏酒浸化

官桂不見火

蓬朮炮

麥蘖炒

神麩炒

青皮去白

蘿蔔子炒

白朮各半

百草霜三錢

巴豆去殼油

乾薑炮半



右為末和勻用薄糊口如菜豆大每服二十口不拘時薑湯送下麩傷用麩湯送下生菓傷用麩香湯下

血積(抵當湯)治瘀血凝滯腹內刺痛或膀胱痛身面微黃

水蛭 剉炒

蜜虫 去翅足炒

桃仁 炒去皮尖

大黃 蒸三字

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未利更服

氣積(木香流氣飲)熱者(分心氣飲) 方並見諸氣類

水積重者(十棗湯)治泛飲水漿多感冷濕胸腹脹滿瀝瀝有聲喘急氣促面色痿黃

芫花 赤炒

甘遂

大戟

黑牽牛 炒取

右各等分為末每服一錢先將紅棗十枚煎湯

一盞調溫再單飲棗湯送下平日服病不除明

日更服加半錢利後糜粥自養但服(加味控涎

口)尤効 方見喘急類

輕者(青木香) 方見諸症通治類

涎積(炒粉) 治積聚涎塊結於心腹之間致令心

腹刺痛日久不愈或乾嘔減食

蚌粉 兩一

巴豆 七粒去殼及膜

右二味同炒令赤去巴豆不用只以醋口其粉如梧桐子大丈夫臍腹痛炒茴香酒吞下二十

口婦人血氣炒薑酒下敗血衝心童子小便和
當歸酒服常服薑酒下

控涎口空心茶清下三七粒方見痛類

魚蟹積香蘇散多加生薑陳皮煎

菓菜積平胃散加丁香麝香為末熟鹽湯調服麝

香湯下阿魏口三十粒立效方見脾胃類

酒積冷者平胃散加丁香縮砂麥芽神麴或香蘇

散亦可加入並用薑棗鹽煎空腹服丁香香縮砂各

少許為散細嚼
名醉解寶屑勿

熱者麴蘖口治酒癖不消心腹脹滿噫醋吞酸呃

逆不食脇肋疼痛

神麴炒剉

麥蘖炒各一兩

黃連去鬚半兩巴豆三粒去殼
同炒令轉色去巴豆不用

右為末沸湯搜口如梧子大每服五十口食後

薑湯下

茶積磨積口治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米半升用巴豆七粒去殼同
炒令赤色去巴豆不用

青皮炒去穰 陳橘紅各二兩

右為末好醋搜和為口如豌豆大每服二十口

食後用淡薑湯下

粉片素粉積紫蘇濃煎汁加杏泥服即散

麴積阿魏口濃煎蘿蔔子湯下方見前

糞糕傷積加味青木香口治糞糕傷脾噫酸不食

心腹作痛百藥不效宜用青木香口三百粒白丁

香十粒小酒麴二錢同為末入巴豆三粒更研和
令勻蒸餅為口如棗豆大每服二十口漸加至三
十口生薑橘皮湯下宿滯既去其疾自安只用小
酒麴木香二件為末鹽湯調服口有酒香是效
虛人沉積盧氏感應口治虛弱人久積不可直取
宜此藥多用蠟置庶使久留腸胃又不傷氣能消
磨至盡又有脾氣偏虛飲食遲化止宜助脾養胃
不須用剋化藥自然平復又名如神木香口

黃蠟

真者十兩

透再易帝至油盡成白霜為妙

巴豆

百粒去皮尖研為粉用帝教重裹搗

杏仁

七十粒去皮尖研

木香

濕紙裹煨

肉豆蔻

煨裹

乾薑

炮

丁香

煨乾

葦澄茄

片子薑黃

百草霜

青皮

湯洗去穢炒各一兩

乳香

研三錢

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外並為末却同

前四味拌和研勻先將上項黃蠟十兩於銀石

器內鎔化作汁用重綿濾去渣以無灰酒一升

於銀石器內煮蠟鎔袞取起候冷其蠟自浮於

酒上去酒不用春夏修合用清油一兩秋冬用

一兩半大銀器內熬令香熟次下酒煮蠟四兩

同化作汁乘熱拌和前項藥末十分均勻了候

稍凝分作劑子用罐子盛之半月後方可服如

服旋圓如蘿蔔子大任意服之二三十口加至

五十口無礙此藥以蠟多雖難口然日子愈細

其功愈博臨睡須常服之若欲治病不拘時候
治豆積香蘇散三錢水一盃煎服加白芥子一撮
炒研入用
通治大抵治積以所惡者攻之以所喜者誘之則
易愈

〔太乙神明再造感應〕治虛中積冷氣弱有傷不
能傳化心下堅滿兩脇膨脹心腹疼痛噫宿腐氣
及霍亂吐瀉或復逢澁赤白膿血相雜米穀不消
久病形羸面黃口淡不能飲食多服有效又能消
化酒毒

肉豆蔻
木香二兩

川薑炮
萹澄茄

百草霜各二兩
京三稜各一兩

巴豆心一百粒去

酒蠟四兩
丁香各一兩

杏仁皮一百粒去

右除巴豆杏仁外並為末次下巴豆杏仁等和
勻先將油煎蠟令鎔化傾在藥末內和成劑入
臼內杵千餘下旋口如菘豆大每服三五口熟
水吞下食後臨卧服小兒如黍米大二三口乾
薑湯下傷滯糞白有效

紅口子治冷積停滯腹痛淡薑下三十口方見痰
縮砂香附湯合和平胃散治食積食前蘇鹽湯調
服方見諸氣

煎空心服方見傷寒陰
證及和解類

握藥宣積

巴豆

硫黃

乾薑

葶子

良薑

白檀榔各等分

右為末研飯為口如中指頭大用時早朝用椒湯洗手了麻油塗手掌中握藥一口移時便瀉欲得瀉止即以冷水洗手

利藥蕩積

巴豆

水一百粒去殼洗四十次

五靈脂

白薑

赤茯苓

各一兩

右為末醋糊口如菜豆大每服七口冷茶清五更初服或欲瀉止冷水洗手面脚三處立住萬金口治諸般食積氣積血氣蠱脹之類

石菖蒲去根節到如米大半斤重斑猫半斤重

去是翅同菖蒲慢火炒不可燒了如菖蒲黃色

揀去斑猫用小布袋盛起菖蒲兩人牽掣布袋

去盡斑猫屑止將菖蒲研為末用米醋煮糊為

口如梧桐子大每服二三十口隨意加減温酒

而熟水不拘時候治蠱脹加香附子末湯調吞下

治腫亦快

五積

肝積肥氣口治肝之積在左脇下如覆杯有頭足

龜鱉狀久久不愈發咳嘔逆痰瘕連歲月不已其

脉弦而細

青皮

炒二兩

當歸鬚

蒼朮

各一兩半

蓬朮

三稜

鐵孕粉

各三兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

蛇含石

三股醋淬

右為末醋煮米糊口菜豆大每服四十口當歸

浸酒下

心積伏梁口治心之積起於臍上至心火如臂久
久不已病煩心身體解股皆腫環臍而痛其脉沉
而抗

茯苓

厚朴

薑汁製炒

人參

枳殼

醋炒去穢

白朮

半夏

洗七次

三稜

慢火煨熟乘熱剉

右等分為末煮糊口梧子大米飲下二十口食

前日兩服作末酒調服絕勝

脾積痞氣口治脾之積在胃管覆大如盤久久不
愈病四肢不收黃瘡飲食不為肌膚心痛徹背背
痛徹心脉浮大而長

大烏頭

一分炮去皮尖

附子

半兩炮去皮臍

赤石脂

煨醋淬

川椒

炒出汗

乾薑

炮各二兩

桂心

半兩

右為末蜜口如梧子大朱砂為衣每服五七口

米飲下漸加口數

肺積息賁口治肺之積在右脇下大如覆杯久久
不愈病洒洒寒熱氣逆喘嗽發為肺癰其脉浮而
毛

半夏

湯洗七次

吳茱萸

湯洗

桂心

甘草

桑白皮

炙

葶藶

炒各二兩半

右劉散每服四錢水一盞半薑三片紅棗二枚煎七分去滓食前服

腎積奔豚湯一治腎之積發於小腹上至心如豚奔走上下無時久久不已病喘逆骨痿少氣其脉

沉而滑

甘李根皮乾焙

乾葛各一分

當歸

川芎

白芍藥

甘草炙

黃芩各二兩

半夏湯洗七次四兩

右劉散每服四錢水一盃半煎七分去渣服

灸法一

卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿奄奄欲絕此為奔豚氣先急作湯以浸兩手足頻頻易之後

灸氣海百壯穴在臍下一寸半又灸關元百壯

穴在臍下三寸又灸期門百壯穴直兩乳下第

二肋間端傍一寸五分

奔豚腹腫灸章門百壯穴在大橫外直臍季肋

端

奔豚搶心不得息灸中極五十壯穴在臍下四

寸

六聚

散聚湯一治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疔痛攻刺腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹臌脹大小便不利或復泄瀉淋瀝無度遺精白濁狀若虛勞

半夏湯洗七次

擯榔去

當歸各三分

橘皮

杏仁去尖炒

桂心各二分

茯苓

甘草炙

附子炮去皮

川芎

枳殼去穢炒

厚朴薑汁製炒

吳茱萸湯洗各一兩

右判散每服四錢水一盞半煎七分去渣食前

服大便不利加大黃煎服

荆蓬煎治同上方見痰飲類

息積

磨積治腸胃因虛氣癖於育膜之外流於季脇
氣逆息難積日頻年醫所不治久則榮衛停凝一
旦敗濁潰為癰膿多致不救

胡椒五百五木香一分全蝎十箇去苗

右為末粟米飲口如菜豆大每服十五口橘皮

湯下

化氣湯治息積癖於腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食諸藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

縮砂仁 桂心 木香各一分

甘草炙 茴香炒 丁香皮

青皮炒 陳皮 生乾薑

蓬朮炮各半兩 胡椒 沉香各一字 錢

右為末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯調服

一導引法一

以兩手拇指壓無名指本節作拳按髀趺坐扣齒三十六屏氣二十一息嚥氣三口再屏息再嚥如是三作以氣通效遇子午卯酉時則行然按摩導引之法甚多隨意用之皆可不必拘此法餘見養生書

癥瘕

一大消石口一治七癥八瘕聚結杯塊及婦人帶下絕產并欲服丹藥腹中有癥瘕者當先下此藥但去瘕瘕不令人困

硝石

三兩

大黃

四兩

人參

甘草

各一兩

半重

右為末以三年苦酒三升置銅石器中以竹作準每一升作一刻拄器中先納大黃常攪不息使微沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻極微火熬使可口則口如梧桐子大每服三十口米湯下四日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔正赤黑等三二升後忌風冷如產婦

小三稜煎治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫醋吞酸脇肋刺痛胃膈痞悶并脾氣橫泄

京三稜

蓬莪朮

各四兩

芫花

一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋五升浸蒲封器口以灰火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦

焙乾為末醋糊口如菜豆大每服十五口生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下

三聖口治積年癥瘕癰塊諸藥療理不瘥至效

船上硫黃兩一 水銀兩半 硃砂一分 飛

右三物乳鉢內衮研如粉却以生鉄銚內用文武火熬鎔成汁以火箭攪令勻停冷刀剗下以帛裹置地坑內埋一宿取出再研細次以

赤芍藥 當歸 京三稜

蓬莪朮 紅花各一分

並細剉以法酒一升煎及一半澆出砂盆內研生布裂汁再熬放冷入飛羅麪為糊搜口如菜

豆大治因產後傷於飲食結伏在腹脇時發疼痛不可忍者當歸浸酒一升逐旋取酒煖下七口至十口每服磨癰塊空心温酒下三口至五口所是藥渣裂了焙乾為末別入

乾地黄兩半 真蒲黃 芫花各一分 焦黃兩微

右為末以前一般糊口如菜豆大治女人血臟冷氣攻心疼及一切血疾温酒下十口

一握七口治臟腑宿蘊風冷氣血不和停滯宿飲結為癥瘕杯塊及婦人血癥腸胃中寒飲食不下欬逆脹滿及下痢赤白霍亂轉筋及踠蹙拳攣脚膝疼痛行步不能常服健脾暖胃堅骨強陽

神麩半斤 大附子二隻 炮甘草二兩

右為末煉蜜口每左手一握分作七口細嚼米
飲下

妙應丹治諸臟氣虛積聚煩悶及飲食中蟲毒或
食水陸果瓜子卵入腹而成虫蛇魚鱉或宿食留
飲婦人產後敗血不消女子月水不通結為癥瘕
時發寒熱唇口焦黑肢體瘦削嗜卧多魘食少腹
痛大便糟粕變成冷痢

附子四箇六錢重者生去皮脐剉作瓮入
砂共一兩七錢重麩製裏煨熟去麩

不用

葦撥

木香煨

青皮

破故紙各三兩半

右為末麩糊搜口如梧子大每服三十口生薑

橘皮湯下洩痢米湯下加至五十口

灸法灸內踝後宛宛中隨年壯又灸氣海百壯其

穴在脐下一寸五分

久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利遶脐絞痛灸天樞

百壯其穴在脐傍二寸勿針

積聚堅大如盤冷脹灸胃管二百壯其穴在上

管下一寸

心痛附脾疼

風證重者蜜附湯治冒涉風邪入腹拘急切痛或
吐或泄狀如霍亂

附子去皮脐切作四片以蜜煎令附
子變色以湯洗去蜜切半兩

桂心

芍藥各三分

甘草四錢

右劉散每服四大錢水一盃半薑五片棗二枚煎七分去渣食前服大便秘結入白蜜半匙同煎一沸

輕者分心氣飲加厚朴枳殼炒蘿蔔子各半錢南木香少許煎食前服方見諸氣類寒證加味麻黃湯治惡寒發熱外因心痛內攻五臟拘急不得轉側

麻黃洗去節湯焙乾

桂心

白芍藥

細辛

乾薑炮

甘草炙各三兩

半夏湯洗七次

香附子炒去毛各半兩

右劉散每服四大錢水一盃半生薑五片煎七分去滓食前服大便秘大黃如棊子大兩枚煎

加味四七湯治寒邪客搏心痛

桂枝

白芍藥

半夏洗各一兩

白茯苓

厚朴去麋皮薑汁炒

枳殼炒

甘草炙各半兩

人參

紫蘇葉各一兩

一方加明乳香玄胡索各半兩

右劉散每服四錢薑七片棗二枚煎食前服

七情七氣湯治七情之氣鬱結于中心腹疔痛不可忍

半夏

人參

甘草

肉桂各半兩

右劉散每服三錢生薑三片煎不拘時服

沉香降氣湯每服二錢枳殼半片煨切片蘇葉三

皮食鹽少許煎湯再入濃磨沉香一合服未效
再加乳香三粒方見諸類

分心氣飲加栗殼二枚木香少許煎

食傷香蘇散加生薑石菖蒲半夏煨枳殼煎不拘

時候服方見傷寒類

感應口每服三七粒鹽梅湯下方見諸類

熱證氣針口治久積風熱疎利滯氣寬胸膈止刺

痛

木香

青皮白去

大黃炮

檳榔各一兩

黑牽牛生二兩半炒

右為末煉蜜口如梧子大溫水下三十口

通心飲加枳殼燈心麥門冬車前子各半錢煎方見

小方科急驚類治同上

虛證卻痛散治心氣冷痛不可忍者

五靈脂去砂

蒲黃炒各半兩

當歸

肉桂去麋皮

石菖蒲

木香

胡椒各一兩

川烏炮一兩半

右劉散每服四錢水一盃食鹽米醋少許煎服

大已寒口治冷心痛方見泄類

紫沉煎口治虛寒積冷伏滯陰氣膨脹心腹疔痛

兩脇刺疼妨悶用之如神重者緊服

沉香煎一兩煉蜜半斤

阿魏升一兩酒半化盡

沒藥化一兩搗碎酒半升研

巴豆霜銀一分器內煮十餘沸

硃砂一兩酒半升煮化去石分三巴豆酒內熬

成膏後下

硫黃極細水研 檳榔 木香不見

胡椒 青橘皮去白 良薑水煮六七

官桂去麋皮 人參去蘆各 乾薑分三

朱砂研別 丁香不見火

右除硫黃朱砂外先用諸藥為末次入二味研

勻入煎膏搜入白朮三二下口如梧子大每

服三二口橘皮湯下如暴卒心痛嚼破醋湯吞

下立効

一加味小建中湯治心腹切痛不可忍按輕却痛按

重則愈皆虛寒證服熱藥并鍼灸不瘥此藥主之

桂心三分 甘草炙半 白芍藥一兩

遠志去心

右剉散每服四大錢水一盃半薑五片棗一枚

煎又方不用遠志只用當歸半兩亦効

卒痛雞舌香散治心腹卒痛安胃進食調冷熱定

泄瀉老少通用

丁香一枚 甘草半 高良薑一

白芍藥二

右為末每服二錢陳米飲調食前服

一玄胡索散治卒心痛或經年不愈者玄胡索一兩

甘草二錢為散水一盃煎至半盃頓服如吐逆分

作三五次服

〔又方〕安息香一味為末沸湯調獨效

〔又方〕莪朮為末沸湯調立愈蛤粉研細熱湯調亦效

〔木香勻氣散〕治冷心痛有效方見諸氣類

〔蘇合香口〕治卒暴心痛方見中氣類

〔倉卒散〕治氣自腰腹間掌急疼痛不可屈伸腹中冷重如石痛不可忍白汗如洗手足冰冷久不瘥

垂死方

山施子四十九箇連皮燒半過

附子一枚炮去皮脐

右剉散每服二錢酒一小盞入鹽少許煎七分

溫服又治胸痞切痛

虫痛〔蕪荑散〕治大人小兒虻咬心痛經云虫貫心

則殺人欲驗之大痛不可忍或吐青汁黃綠水出

涎沫或吐虫出發有休止此即虻心痛宜速治之

乾漆搥碎炒令烟盡一錢 雷丸 蕪荑各半

右為末每服三錢溫水七分盃調和服不拘時候甚者不過三服小兒每服半錢重

真心痛大抵心為諸臟之主其正經不可傷傷之而痛者則手足青至節朝發夕死夕發旦死不假履治其久心痛者是心之支別絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不死發作有時經久不得瘥也通治〔手拈散〕主心脾疼

草菓仁 玄胡索 五靈脂

沒藥

右等分為末每服二三錢溫酒調下米飲亦可
香附散治心脾疼不可忍者

高良薑去蘆 香附子去毛炒

右為末每服二錢入鹽米飲調下

訶子散治心脾疼冷痛不可忍一服見效及老幼
霍亂吐瀉其效如神

訶子炮核去 甘草炙 厚朴薑汁炒

乾薑炮 草果去皮 陳皮

良薑炒 茯苓 神麴炒

麴蘖炒各等分

右為末每服二錢候發刺不可忍時用水一盃
煎七分入鹽服

九痛口治九種心痛蟲痛疰痛風痛悸痛食痛飲
痛冷痛熱痛往來痛兼治卒中惡腹脹痛口不能
言又治連年積冷流在心胃并冷腫痛上氣落馬
墜車等疾

附子三兩炮 狼毒炙 巴豆去皮炒

人參 乾薑炮 吳茱萸浸洗炒

右為末煉蜜口如梧桐子大每服空腹溫下三
口卒中惡心痛不能言服三口

撞氣阿魏口治九種心痛五種噎疾疰氣塊冷
氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸
水丈夫小腸氣婦人血氣血刺等

阿魏酒浸一宿 胡椒各二錢半 甘草

茴香

川芎

青皮

陳皮

丁香皮炒

莪朮炒各一兩

縮砂

桂心

白芷炒各半兩

生薑

四兩切作片用鹽一兩淹一宿炒黑色

右為末阿魏糊口如鷄頭大每藥一斤用朱砂

七錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下二粒至三粒

婦人血氣醋湯下常服茶酒任下二粒並嚼細

嚥食前服

失笑散治敗血冷氣心痛方見症氣類

浮椒口治脾疼不可忍及療冷氣疼

陳菜萸二兩

浮椒即胡椒

蚌粉炒赤色各一兩

右為末醋糊口如梧子大每服二十口用溫酒

或鹽湯下遇發時服甚者不過二三服立效

附米散治脾積氣婦人諸般氣痛

香附子五兩炒去毛赤色止

莪朮醋煮

甘草各二兩

右為末每服二錢入鹽少許百沸湯空心點服

九氣湯治心脾疼不可忍下九痛口一服而止與諸

氣類神仙九氣湯同九痛口方見前

三和散治腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便或澀

加生薑燈心縮砂仁煎服仍服理中湯半貼立效

或加白茯苓厚朴各二錢方見諸氣及泄瀉類

神保口治心氣築刺痛甚柿蒂燈心湯下方見諸氣類

奪命抽刀散治男子婦人脾胃積冷中焦不和心

下虛痞腹中痛胃脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲

食不下噫醋吞酸口苦無味不思飲食及婦人久
患冷氣刺痛男子或當空露卧感受風露之邪得
心痛積年服之大效

乾薑 至入巴豆半錢同炒

良薑 入斑猫一百箇同 石菖蒲 二兩二錢不見火

糯米 二兩半炒

右為末每服二錢鹽少許沸湯點服不拘時或

温酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蚌粉去巴豆

加蚌粉入抽刀散一內煎服若尋常氣痛不用巴

豆只加炒蚌粉亦得或甚而心腹痛大便秘者

巴豆同粉研爛同抽刀散醋糊口服二三粒大

腑通為度

一參朮散一治虛弱人脾疼

人參

白朮 去芦炒

乾薑 炮

白豆蔻仁

縮砂仁

丁香

寒食橘皮

甘草 炒略

右等分剉散每服三錢薑三片煎取藥汁調炒

過真蚌粉一大錢併服

一加味烏沉湯一生氣補血心腎虛損之人服此勝大

建中湯

人參

當歸 大者去芦

白朮 炒各一兩

沉香 兩半

天台烏藥

白茯苓 去皮

附子 煨去皮臍

肉桂 去麋皮

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空

心服

單方治苦熱食冰雪過多又頻飲冷漿積冷于中脾疼半歲不愈

漢椒

二十粒浸於漿水中二宿漉出還以水吞之其病即脫更不復作

大理中口治因食水太過脾疼久不愈以水煎一

二日服立效又方治心脾氣痛加泡過茱萸三十

粒入口末皆可

方見泄浮類

神效散治遠年近日一切脾疼遇食冷物或天氣

寒陰冷便作胃間一點痛起或引入背脊痛不可

忍服之即絕根

南木香

青皮

陳皮

麥蘖

大枳殼

京三稜

蓬莪朮

神麴

甘草

北白芍藥

川白芷

肉桂去皮

玄胡索

破故紙

葶澄茄

丁香

右剉散每服三錢水一盃半生薑三片棗子一枚煎至七分空心服臨睡加鹽一捻再煎兩沸忌麪食豆腐一切生冷
苗薑湯治男子婦人一切心腹脹滿氣滯走痛神效

茴香

青皮

良薑

天台烏藥

夜炒黃為度

右剉散每服三錢水一盃薑五片棗一枚煎空

心服

單方治一切心痛無問久新服之良久當利即愈
或作冷淘但忌用鹽

灸法心痛有三虫多涎不得反側上管穴主之

若心痛身寒難以俛仰心疝衝冒不知人中管
主之陰都二穴在通谷穴下一寸灸三壯主

心腹絞刺痛不可忍

嘔吐

風證藿香散治風邪入胃嘔吐自汗或身疼

人參五錢

厚朴

藿香

陳皮各一兩

半夏五錢

芍藥一兩

官桂

粉草各五錢

右劉散每服四錢生薑五片紅棗一枚煎食前

服養胃湯兼用亦效

寒證理中湯專治胃虛感寒嘔吐不止方見霍亂類

枳梗半夏湯治寒熱嘔噦短氣煩悶飲食不下方見

痰瘧類

暑證香薷散治傷暑飲冷當風取涼嘔吐不止香

薷散一兩半重二陳湯一兩重二藥合和作六服

生薑三片烏梅一箇煎方見傷暑及痰瘧類或加鹽煎

五苓散治同上藿香煎湯服未效生薑自然汁調

下消暑口熱薑湯下方見傷暑類

濕證加味治中湯治體虛感冒雨濕嘔吐

人參 白朮 乾薑

青皮 陳皮 藿香

半夏各五錢 甘草三錢

右劉散生薑三片紅棗一枚煎服

七情大藿香散治憂愁思慮七情傷感氣鬱於中

爰成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉 半夏麴 白朮

木香不見火 白茯苓去皮 桔梗去芦

人參 批把葉拭去毛

官桂不見火 甘草各半兩

右為末每服三錢水一大盃生薑五片棗子一

枚煎至七分去渣溫服不拘時候

痰證大半夏湯治心氣不行鬱生涎飲聚結不散

心下痞鞭腸中漑漑聲食入即吐或因酒食甜冷

聚飲之為也

半夏二兩湯洗十二次完用 人參三錢三字

右分四服每服水三盃蜜二錢重和水揚勻入

煎藥煎至六分去滓溫服一法有生薑七片治法

曰嘔家先渴今反不渴者以心下有支飲故也

治屬支飲

半夏口一治熱痰作嘔每服五十口淡薑湯下不拘

時候方見痰類

養正丹治冷痰作嘔每服三十口鹽湯空心下方見

類癆冷

加味理中湯治痰浮於上嘔吐不已加半夏丁香酌量用每服四錢水煎不拘時熱服再入生薑亦可

方見泄瀉類

食證二陳湯治胃腹脹滿因傷宿食或吐後噫敗卵氣加丁香縮砂生薑七片烏梅一箇煎未效服一治中湯治同前兼療中寒飲食不化吞酸嘔噦食則膨亨脹滿嘔逆

古入參

白朮

乾薑炮

甘草炙

青皮

陳皮

各等分

右劉散每服四大錢水一盃半煎七分去滓大便秘入大黃棊子大兩枚

血證茯苓湯治憂怒并氣攻血溢停留胃管噎聞

血腥嘔吐食飲及妊娠中脘宿冷冷血侵脾惡聞食氣病名惡阻

半夏

一兩湯洗七次

茯苓

熟地黄

各二兩

橘皮

細辛

人參

芍藥

川芎

各一兩二錢

右劉散每服四大錢水二盃薑七片煎七分去渣空腹服有客熱煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母腹冷下利者去地黄入桂心炒胃中虛熱大便秘小便澀去地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢

當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或因熱損發或因酒發主之

當歸

乾薑炮

熟地黄

藥皮

小薊

羚羊角鎊

阿膠

芍藥

黄芩

甘草

炙各三分

兩半

兩

右剉散每服三錢水二盃竹茹一塊如指大煎

至八分去滓入伏龍肝以頭髮灰蒲黃各半錢

匕再煎至七分不以時服

氣嘔菜萸人參湯治氣嘔胸滿不納食嘔吐涎沫

頭疼

吳茱萸

五兩湯洗數次

人參

三兩

右剉散每服四大錢水一盃半薑五片棗三枚

煎七分不以時服

藿香正氣散治氣嘔大效每服三錢水一盃半性

薑三片木瓜二片煎熱服

方見傷寒陰證類

加減七氣湯治氣鬱嘔吐

半夏

二兩半湯洗

人參

蘇桂

厚朴

各一兩薑汁炒

茯苓

一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服三錢半薑七片棗一枚煎服加木

香亦得

熱嘔竹茹湯治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根

三兩

半夏

湯泡七次二兩

甘草

炙一兩

右剉散每服五錢水二盃入竹茹如棗許大薑

五片煎至七分去滓取清汁微冷服不以時候

二陳湯加白竹青煎效

方見痰癰類

通心飲治心脾蘊熱作嘔每服三錢燈心藿香葉

煎方見小方
科急驚類

小柴胡湯治胃中挾熱煩燥聚結涎沫水入即吐

或因胃熱伏暑及傷寒伏熱不解每服三錢加入

參烏梅生薑五片紅棗一枚煎方見傷寒類

三乙承氣湯治嘔吐水漿不入或食已即吐大便

秘或利而不鬆快時覺腹滿者或下痢赤白而嘔

吐食不下者或大腸小腸膀胱結而不上為嘔

吐隔食

大黃

厚朴

枳殼

芒硝各半兩

甘草一兩

右剉散每服四錢水一盃半薑三片煎六分却

入硝細細啜服

冷證嘔吐四逆湯治胃中虛四肢厥冷食即嘔吐

或因冷食傷胃或累經汗下致虛胃氣但脉弱小

便多復利身有微熱見厥者難治方見傷寒類未效

服金液丹每服九口米飲下丁胡三建湯生薑十

片煎吞下方見痼冷類

通治藿香正氣散治胃口有虛熱作嘔生薑三片

木瓜二片煎方見傷寒類

香白口治氣不順痰涎壅盛嘔吐不止

青州白圓子

青木香口

右各三十口生薑湯吞下

炮附子口治胃脘有熱胃中有寒嘔吐不止

附子炮去皮

右為末以糊口如梧子大就濕以大黄末五錢為衣每服十口加至二十口用薑湯下

快氣湯治一切氣心腹脹痛胃膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

香附去毛三分 甘草四錢 縮砂仁去皮八錢

右為末每服一錢鹽湯點下常服快氣美飲食養脾

勻理湯治體虛上氣壅盛中脘痞塞嘔逆翻吐水飲不入其證急速

木香方見諸類 勻氣散方見諸類 理中湯方見霍亂類

右二藥合和鹽湯調服一匕立效

人參散治吐逆及瀉後除煩渴常服調中和氣

白茯苓 人參各半兩 白乾葛一兩 藿香 木香 甘草各一分半

嫩黃耆去芦一分半

右剉散每服三錢水一盃半煎七分去滓溫服瀉後渴甚者每服加滑石末二錢同煎

丁香煑散治脾藏伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛痰逆惡心寒嗽中滿藏腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述

丁香不見火 紅豆去皮 青皮去白 甘草炙 川烏炮去皮 陳皮去白

乾薑炮

良薑

炮去芦頭

益智

去皮五兩半

胡椒二兩

右劉散每服二錢水一盃生薑三片鹽一捻煎

至七分空心食前稍熱服滓再煎病退即止極

神妙

灸法乾嘔灸尺澤穴在肘約上動脈灸三壯又灸

乳下一寸三十壯

乾嘔不止粥蒸皆吐灸間使穴三十壯其穴在

掌後三寸兩筋間若四厥脈沉絕不至者亦灸

之便通此起死人法

吐嘔宿汁吞酸灸神藏穴百壯其穴在二肋傍

二寸上直兩乳

嘔逆噦噫灸石關百壯其穴在陰都穴下一寸

霍亂

風證桂枝湯治惡風自汗嘔吐下利增寒發熱頭

痛眩暈方見傷風類

寒證陰經理中湯治惡寒無汗霍亂吐下脹滿食

不消心腹痛胃膈痞塞或昏暈緩弱

人參去芦

乾薑炮

白朮

去芦

甘草炙各三兩

右劉散每服四大錢水一瓊煎七分去渣食前

服遠行防霍亂煉蜜為口如梧子大每服三五

十口如作末每服方寸匕酒調下亦得若轉筋

者加石膏煨三兩若臍上築者腎氣動也去朮

加桂心四兩腎惡燥故去木恐作奔狔故加桂
吐多者去木加生薑三兩下多者復用木悸者
加茯苓二兩渴欲得水加木合前成四兩半腹
滿加人參合前成四兩半若寒者加乾薑合前
成四兩半腹滿者去木加附子服藥後食頃食
熱粥一盃微自溫覆勿發揭衣被噦則加丁香
吐利止身體痛不休者審其元因以和解之如
寒初因傷風用桂枝之類所謂治有本也

陽經(香蘇散)治身熱無汗霍亂吐下臉赤多痰加
藿香葉土烏藥烏梅生薑煎甚妙方見傷寒
和解類
暑證(香薷散)治傷暑飲冷霍亂作渴熱煩每料加
丁香半夏藿香烏梅陳皮紫蘇木瓜各一兩生薑

五片煎四肢冷加熟附子煩渴生薑自然汁調(五
苓散)方並見
傷暑類仍用半夏口熱薑湯吞每用三
立效
方見痰
瘧類

濕證(除濕湯)治滿身重著或多食生冷揮霍之間
吐利俱作

半夏湯洗厚朴去麋皮切薑
汁炒各一兩
藿香葉去土陳皮去白各
五錢甘草三錢
蒼朮米泔浸一
兩切炒赤

右劉散每服四錢水一盃半生薑七片紅棗一
枚煎熱服不拘時候

七情(七氣湯)治喜怒憂思悲恐驚七氣鬱發致五
臟互相刑剋陰陽反戾揮霍交亂吐利交作寒熱

眩暈痞滿噎塞

半夏湯洗五兩

厚朴去麩汁炒

桂心各三兩

白茯苓去皮

白芍藥各四兩

紫蘇

橘皮去白各二兩

人參去芦一兩

右剉散每服四錢水一瓊半薑七片棗一枚煎七分去滓空心服

胃氣口治憂思過度脾肺氣閉聚結涎飲留滯腸

胃氣鬱於陰凝寒於陽陰陽反戾吐利交作四肢

厥冷頭目眩暈或復發熱無治老人胃寒大便反

秘姪娘惡阻全不納食

硫黃

不拘多少入猪膽內縛兩頭以米泔酒

石膏

同硫黃煮一法

半夏

湯洗五兩

人參去芦

白茯苓各一兩

右為末生薑自然汁釋炊餅糊為口如梧子大

每服五十口至百口空心米湯入少生薑汁下

食傷紅圓子治脾胃虛冷飲食不節宿食留飲聚

癖腸胃或因氣不調衝冒寒濕忽作霍亂吐利併

心腹疔痛腸胃纏刺疲倦不勝方見痰類

理中湯加青皮陳皮治胃脘有寒亦效方見前

轉筋木瓜湯治霍亂吐下不已舉體轉筋入腹則

悶絕

木瓜乾一兩

吳茱萸湯洗半兩

茴香半錢

甘草錢一

右剉散每服四大錢水一盃半生薑三片紫蘇

十葉食鹽一撮煎七分去渣食前服仍研生蒜貼心下脚心上

煩渴扶苓澤浮湯治霍亂吐利後煩渴欲飲水

赤茯苓去皮四兩 澤瀉二兩 桂心

甘草炙各兩 白朮去芦兩半

右剉散每服四大錢水一盃薑三片煎七分去

滓食前溫服又方有小麥五兩

麥門冬湯治霍亂已愈煩熱不解多渴飲水小便

不利

麥門冬心去 橘皮白去 半夏湯泡

白茯苓去皮 白朮去芦炒 人參

甘草炙各兩 小麥半合

右剉散每服四錢水一盃半生薑五片烏梅一

箇煎至八分去渣溫服不拘時

水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利口乾煩

渴

黃丹錢一兩二錢 巴豆去皮心五箇

右同研勻用黃蠟鎔作汁和為口如梧子大每

服五口水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

又用薑附湯清煎沉冷服之大效熱因寒用之法

也見中寒類

乾霍亂鹽湯治忽然心腹脹滿疔刺痛疼蠱毒煩

冤欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間

便至悶絕亦涉三因或臟虛或腸胃素實故吐利

不行
極鹹鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡
不吐更服吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治
俗人以為田舍淺近鄙而不用守死而已凡有
此病即先用之續以理中湯倍加橘紅與之或
藿香正氣散加官桂茯苓煨積殼就吞蘇合香
口妙

通治藿香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂

小便不利加車前子每料各一兩

訶子散治老幼霍亂吐利一服取效方見心痛類

加味薑附湯治吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脈沉伏

附子炮

乾薑

人參

各一兩

甘草

五錢

右剉散每服四錢水二盃煎至一盃空心服腹

痛加官桂小便不利加茯苓每料各五錢

養正丹治霍亂轉筋咳逆不定病勢危篤每服三

十口鹽湯下方見痛冷類

胡椒湯治霍亂吐瀉

胡椒七粒

生菜豆

二粒

右為末宣木瓜湯溫和調下

奇方一盞醋一盃同煎八分溫服二盃鹽梅鹹

酸等物皆可煮服

又方南星末三錢棗三枚薑五片煎極熟服治吐

下四肢逆冷不省人事一服可效半夏為末薑汁

點亦一服效白礬為末每服十大錢沸湯點服亦
驗

熏洗法一治霍亂轉筋

陳大蓼一把水三升煮取二升乘熱熏洗仍飲
半瓊凡用蓼須家園種者

鹽熨方一治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽二盃紙包紗護頓其胸前并腹肚上一截
以熨斗火熨氣透則蘇續又以炒鹽熨其背則
十分無事

灸法一治霍亂轉筋欲死氣絕惟腹中有暖氣者可
用其法

納鹽於臍中令實就鹽上灸二十七壯名神闕穴

立效併灸臍下一寸半名氣海穴二十七壯妙

痰飲

懸飲一棗湯一治飲水流在脅下咳唾引痛一歲不
愈者

芫花微炒

甘遂

大戟炒

右等分作末水一盃半棗十枚煎八分去棗調

藥壯人一錢羸人半錢平旦溫服不下者次日
更加半錢下後糜粥自養若已下不可服

五苓散一治流行水飲每服二錢沸湯調小便更不

利加防已佐之方見傷暑類

支飲一防已桂枝湯一治膈間支飲其人喘滿心下痞
堅面色鰲黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不

愈

支助漢防已

三兩

桂心二兩

人參四兩

下

石膏

六兩

右剉散每服四大錢水一瓊半煎七分去滓温

服虛者即愈實者三日復發再服不愈宜去石

膏加茯苓四兩芒硝一兩半微利則愈

茯苓五味子湯治支飲手足冷多唾口燥氣促小

腹上衝胃咽手足痺面熱翕然如醉因復下流陰

股小便難時復眩冒嘔腫

茯苓

四兩

桂心

甘草

各三兩

五味子

二兩

半兩

右剉散每服四錢水一盃半煎七分去滓空腹

服服之衝氣即低反更咳滿者去桂加乾薑細

辛各三兩咳滿止而復渴衝氣更發者以細辛

乾薑為熱藥此法不當逐渴反止者為支飲也

支飲法當冒冒者必嘔嘔者復滿半夏二兩半

以去其飲飲去嘔則止其人形腫與痺加杏仁

二兩半若面赤如醉以胃中熱上熏加大黃三

兩須詳證加減

溢飲大青龍湯治溢飲身軀疼重汗不出拘急痛

麻黃

去節湯洗七錢半

桂心

甘草

各二錢半

石膏

雞子大

杏仁

四十箇炒去皮

右剉散每服四大錢水一瓊半薑五片棗二枚

煎七分去滓空腹温服一服汗者勿再服復服

汗出多亡陽虛逆惡風煩燥不得眠也

小青龍湯治溢飲支飲倚息不得卧及喘滿者

麻黃湯去節洗

芍藥細辛

桂心

乾薑炮甘草炙各三錢三字

五味子錢二

半夏三錢湯洗七次

右剉散每服四錢水一盃半煎七分去滓空腹

服渴者去半夏加栝蒌根三錢三字微利去麻

黃加芫花一鷄子大炒入噎者去麻黃加附子

一枚炮小便不利者去麻黃加茯苓半兩喘者

去麻黃加杏仁三錢三字欬而上氣肺脹其脉

浮心下有水氣者胸中痛引缺盆加石膏二錢

半研

痰飲參蘇飲治痰飲停積胸中中脘閉嘔吐痰涎

眩暈嘈煩忪悸噦逆及痰氣中人停留關節手脚

躡曳口眼喎邪半身不遂食已即吐頭疼發熱狀

如傷寒以薑七片棗子一枚煎空腹服噦者加乾

葛腹痛加芍藥方見傷寒和解類

五苓散治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀為

痰飲結聚胸臆之間令人頭目昏眩胃膈脹滿欬

嗽氣急嘔逆腹痛伏於中脘亦令臂疼不舉腰腿

沉重久而不散流入於脾脾惡濕得水則脹脹則

不能消化水穀又令腹中虛滿而不食也或腸間

漉漉有聲

半夏

一兩

南星

一兩每箇切作十數塊以上二味用水洗次用

半夏 白礬三兩 研碎調入水內再浸三日

乾薑 良薑 炒

茯苓 各一兩 木香 丁香 不見

青皮 去穢 陳皮 去穢 各一兩

右為末用神麴一兩大麥蘖二兩同碾取末打糊和藥為口如梧子大每服三十口至五十口溫熱水下不拘時候常服溫脾胃去宿冷消積滯化飲食辟霧露風冷山嵐瘴癘不正非時之氣或因酒癖停飲痰水不去或心膈痰逆時發嘔逆昏暈心疼累藥不效並皆治之
氣痰一四七湯一治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉間咯不出嚥不下并治中脘痞滿

痰涎壅盛上氣喘急

半夏 兩五 茯苓 兩四 紫蘇葉 兩二

厚朴 兩三

右到散每服四錢水一盃薑七片棗一枚煎入分不拘時候服若因思慮過度心氣不足小便白濁用此藥下青州白口子最效一方又用半夏五兩人参官桂甘草各一兩生薑煎服名七氣湯大治七氣并心腹絞痛

二陳湯每料加木香沉香各五錢南星二兩治氣不順上壅作痰每服三錢生薑五片煎服

風痰加味壽星口蝎麝白口子星香飲治風壅痰

盛治方並見風科通類

熱痰一芎辛散一治壅塞痰盛清頭目及治踰月語音不出服他藥亦不能去乃是燥熱所致用此藥數服而愈

二刺川芎

細辛

防風

桔梗

白芷

甘草

羌活

桑白皮

兩半

右剉散每服二錢水一盃半生薑二片薄荷三葉煎至七分不飢不飽時溫服

一枳殼半夏湯除熱痰下氣寬中利膈清上治痞滿

枳殼

半夏

黃芩

桔梗

甘草

錢五

右剉散每服四錢生薑三片桑白皮七寸烏梅

一箇煎未效加甜葶藶馬兜鈴防己薄荷立效
熱痰黃色是也

虛證一順元散一治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤

宜服之

方見傷寒陰證類

黑錫丹治下虛上壅頭暈痰盛服之立愈

靈砂丹治上盛下虛痰涎壅盛此藥最能鎮墜升

降陰陽安和五臟

方並見痼冷類

八味一治脾虛不得尅制腎水多吐痰唾而不咳

者

方見脚氣類

暖胃一治去虛痰利冷飲

硫黃

研

白礬

各一兩同炒

半夏

二兩薑汁炒

丁香

茴香

炒

木香

各一兩

為末薑汁煮麩糊丸梧子大每服二十九空心米飲下

靈白口治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂

青州白圓子

各一兩 各研

右和勻生薑自然汁和米糊丸如梧桐子大每服三十口空腹人參湯或棗湯下

通治二賢湯治痰實食後胃滿遠年痰飲服之愈

薄橘紅

兩四

甘草

兩一

右為末沸湯調服其功在茯苓半夏枳實南星之上

茱萸口治頭疼背寒嘔吐酸汁不思飲食小便不

利氣壅昏眩

白茯苓

吳茱萸

各二兩 湯洗去木

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九不拘時候熱水吞下服後便澀中作茱萸氣是驗他痰

藥不能及此一方只將茱萸酒浸三宿以茯苓末拌之候乾或湯或酒下百餘粒亦效

快活口常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼

一兩 半炒

桂

一兩 括梗

半夏

湯洗七次 各二兩

右為末薑汁糊丸梧子大每服二十九食後薑

湯下

茯苓口治臂痛不能舉手或左右時復轉移由伏

痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不升故上行攻臂其脉沉細者是也後人謂此臂痛乃痰證也用以治痰無不效者

茯苓兩一

枳殼麸炒去穢半兩

半夏兩二

風化朴硝一分

右為末薑汁煮糊丸如梧子大每服三十九生薑湯下累有人為痰所苦夜間兩臂常若有人抽牽兩手戰掉至於茶盃亦不能舉只以此藥治之皆隨服隨愈世間所謂痰藥者多矣至於立效未有如此藥之妙也

倍术散治酒癖五飲

冒寒飲水過多

停水在心下或兩脇胃中腸間動搖有聲皆由飲酒

白术兩二

附子炮去皮一兩

右剉散分三服水一大盃薑十片煎空腹服臍

臍微動即安

一方除附子加乾薑肉桂各一兩為未蜜丸梧桐子大每服二十五

食前大飲下

桂辛湯下痰飲散風邪止痰嗽聰耳鼻宣關竅利

咽膈清頭目解冒眩進飲食

桂去麋皮

細辛去芦土

乾薑炮

人參去芦

白茯苓去皮

甘草炙各二兩

五倍子

陳皮白去

白术

半夏湯洗七分各三分

右剉散每服二錢水二盃煎至一瓊去渣食前

温服

一丁香半夏口一治脾胃宿冷嘔吐痰水噫氣吞酸

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮

藿香葉

半夏

湯洗七次薑汁淹炒黃三兩

右為末薑汁糊丸如小豆大每服四十九薑湯下

二陳湯煎送下青州白口一治眉心并眉梁骨疼

又治臂疼或麻木或戰掉皆痰飲所作宜服痰瘰

類白口方見風科通治類

一控涎口一治同上

方見臂痛類

二生湯一專主治疼

附子生去皮臍

半夏生用

右等分剉散每服四錢水二盃生薑十片煎七

分去滓空腹溫服入少木香煎尤佳

一破痰消飲口一治一切停痰留飲

青皮

陳皮

京三稜

川薑

草果

蓬朮

良薑

濕紙裹煨各一兩

右為末水麩糊丸如梧子大陰乾每服五十九

薑湯下

一破飲口一治五飲停蓄胸腹結為癥癖支滿胸脇傍

攻兩脇搶心疼痛飲食不下翻胃吐逆九種心痛

積年宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤癩癩厥暈心

氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治療久服

尤妙且不傷臟氣

華撥

縮砂仁

烏梅

丁香

木香

青皮

胡椒

蝎梢

巴豆

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服五七丸臨卧薑湯吞下曾有婦人頭風服之亦效且斷根不復發豈頭風即痰飲耶

導痰湯一切痰頭目旋暈或痰飲留積不散胸膈痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕唾稠粘坐卧不安可思飲食

半夏

枳實

右剉散每服四錢水二盃生薑十片煎八分食後溫服

天南星

赤茯苓

橘紅

三陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或

中脘不快或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜

服之一方加丁香方見痰瘕類

荆蓬煎口破痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈痞悶通和三焦升降陰陽順氣消化宿食

荆三稜

蓬莪朮

以上二味用去皮巴豆二十粒於銀石器內文武火炒令乾黃色去巴豆却用湯浸去白木香 枳殼 青皮

川茴香

微炒

檳榔

一到各兩

右為末麩糊丸如菉豆大每服三十九食後生

薑湯下

〔理中湯〕治停痰留飲加茯苓半夏導利之

方見霍亂類

咳逆

〔冷證〕丁香柿蒂散治吐利及病後胃中虛寒咳逆

至七八聲相連收氣不回者難治

人參

茯苓

橘皮

半夏

良薑

丁香

柿蒂

各一兩

生薑

一兩

甘草

五錢

右剉散每服三錢水一盃煎乘熱頓服或用此

調〔蘇合香丸〕亦妙

〔木香勻氣散〕治同上用萊菔子湯泡研取汁調熱

服方見諸症類

〔沉香降氣湯〕〔縮砂烏沉湯〕治同前蘇葉三皮鹽少

許煎湯點熱服

方見諸氣類

〔橘皮乾薑湯〕治胃中有寒咳逆

橘皮

通草

乾薑

桂心

人參

甘草

右各等分剉散每服四錢水椀半煎六分溫服

日三服

〔羌活附子散〕治吐利後背寒咳逆

羌活

去聲

附子

炮去皮臍去

茴香

炒各半兩

乾薑

炮

丁香

各一兩

右劉散每服二錢水一盃鹽少許煎至七分空心熱服

葶澄茄散療噫氣咳逆

葶澄茄

良薑各二兩

右劉散每服二錢水一盃煎六分沸投醋半盃取出時呷之甚妙

熱證小柴胡湯治同上每服三錢水一椀半薑二

片柿蒂三箇煎熱服方見傷寒陽證類

橘皮竹茹湯治胃虛膈熱者

橘皮去白二兩

人參

甘草炙各半兩

右劉散每服四錢水一椀半竹茹一小塊生薑

五片棗二枚煎至七分去滓溫服不以時服

灸咳逆法乳下一指許正與乳相直骨間陷處婦

人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴灸艾炷如小豆

大灸三壯男左女右只灸一處火到肌即瘥不瘥

不可治也其穴只當取乳下骨間動脈處是

世醫得効方卷之四

世醫得效方卷第五

大方脉雜醫科

脾胃

虛證丁沉香隔湯治氣滿不快飲食不入胃膈痞悶或時膨脹腹中刺痛等證

丁香

沉香

木香

並不見火

人參

去芦各半兩

青皮

去白

神麴

各一兩

茯苓

去皮

甘草

炙

陳皮

去白

厚朴

薑汁製

草果仁

藿香葉

去土

半夏

泡七次

縮砂仁

去殼各二兩

白豆蔻

去殼

白朮

去芦炒

麥蘖

炒

香附子

炒去毛各一兩

右剉散每服三錢水一盃半入生薑三片紅棗二枚同煎去渣熱服又方治氣滿不食以四味香蘇散同煎大人尤宜服未效更服丁香煮散加葷撥良薑各一兩方見嘔吐類

穀神嘉禾散治中滿下虛五噎五膈脾胃不知胃膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛可進飲食或多痰逆口苦吞酸胃滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊臟氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之常服有神養氣和補脾胃進美飲食

批把葉去毛薑汁炙石斛細剉酒拌和
沉香分鎊三薏苡仁微炒木香三分

縮砂去殼杜仲去麋皮用薑汁與酒合
藿香葉去土隨風子如塗炙令香熟焦三分

穀蘖微炒丁香半兩
半夏一分用湯洗七遍生薑一分切作

白朮去蘆炒青皮去白大腹子微炒
檳榔炒半陳皮去白桑白皮微炒

白豆蔻微炒人參去蘆五味子微炒
白茯苓去皮神麴微炒甘草微炒

右剉散每服三錢水一盃入生薑三片肥棗二枚同煎至七分溫服不拘時候及療四時傷寒能調理陰陽使無妄動尅日得安如療五噎入乾柿一枚同煎十服見效如膈氣吐逆羸困入

薤白三寸棗五枚同煎婦人亦可服

四君子湯治脾胃不調不思飲食

人參去芦 甘草炙 白茯苓去皮

白朮去芦各

右剉散每服三錢水一錢煎至七分不拘時服

一方加橘紅名異功散又方加陳皮半夏名六

君子湯嘔吐加藿香縮砂泄瀉加木香肉豆蔻

附子建中湯治脾氣虛寒腹脇脹滿身體沉重面

色萎黃嘔吐不食水穀不化大腑自利

肉豆蔻麩裏 白豆蔻仁 附子炮去

厚朴去皮薑 白朮去芦 乾薑炮

紅豆 神麴炒各 丁香

胡椒 木香不見 甘草炙各

右剉散每服四錢水一盃半生薑五片紅棗一

枚煎至七分去渣溫服

參苓白朮散理心脾氣弱神昏體倦飲食不進多

困少力中滿痞噎心忪上喘嘔吐泄利

人參 白茯苓去皮 白朮去芦

山藥 甘草各一 縮砂仁

桔梗去芦 薏苡仁 蓮肉各半

扁豆薑汁浸去

右為末每服二錢棗湯下小兒量歲數與之此

藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟

千金養脾口一治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃吐食心胃痞滿脇肋虛脹胃腹刺痛牽引背脊食少易傷言微氣短口苦舌澁惡心嘔噦喜睡嘔酸久病泄利腸胃虛滑痰後氣不復常飲食無味形容憔悴酒後痰多

人參

白朮

白茯苓去皮

甘草

山藥炒

木香

丁香

白扁豆炒

縮砂仁

薏苡仁

益智仁

藿香葉

紅豆

肉豆蔻

乾薑炮

高良薑

三稜炮

莪朮炮

神麴炒

麥蘖炒

陳皮

枳殼炒

茴香炒

苦梗炒各一兩

右為末煉蜜口如彈子大每服一口細嚼白湯下溫酒亦得空心食前常服溫養脾元進羨飲食

治中湯一治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉方見傷寒陰證類

平胃散一治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

蒼朮

去麩皮米泔浸二日一斤二兩

厚朴

去麩皮薑汁拌炒

陳皮

去白各一兩二錢

甘草

炒三分

右為末每服二錢以生薑三片紅棗二枚煎湯
調服或鹽湯調空心食前熱服常服調氣煖胃
化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣為
散煎亦可加人參尤妙

胃丹朱砂稟太陰之精不經火煅以丁附等脾藥
陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虛心火怯弱不
養脾土冲和失布中州虛寒飲食不進胃膈痞塞
或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐
食臍氣虛寒米穀不化心腹絞痛泄利不止應是
一切脾胃諸疾不問男子婦人皆可服

朱砂大塊不夾石者十二兩半 羅參去芦 縮砂去殼
肉豆蔻麩裏煨 葶藶去殼 白豆蔻去殼

紅豆 高良薑剉碎 附子炮去皮
白朮去芦 厚朴去皮薑汁拌炒 丁香不見火
藿香葉去土 五味子去梗 乾薑炮去土
胡椒 益智仁 麥門冬去心
草果仁 橘紅去白已上各一兩

右將人參等一十味各如法修製剉如豆大以
銀鍋一口用白砂蜜二十兩將藥一半同蜜拌
勻入銀鍋內以夾生絹袋盛貯朱砂懸胎入銀
鍋內以棗柴火重湯煮三日三夜取砂淘淨焙
乾入乳鉢用玉槌研直候十分細米糝為口如
菘豆大陰乾每服十粒加至十五粒空心食前
用人參湯送下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯

送下忌食猪羊血

補真口大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎火不温不能上蒸脾土冲和失布中州不運是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑滯泄此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然古云補腎不如補脾予謂補脾不若補腎腎氣若壯丹田火經上蒸脾土脾土温和中焦自治膈開能食矣

葫蘆巴炒

附子炮去

陽起石煨

川烏炮去

兔絲子淘淨

沉香不見火

肉豆蔻麩裏

肉蓯蓉酒浸

五味子去核

鹿茸去毛酒

川巴戟去心

鍾乳粉各

右為末用羊腰子二對治如食法葱椒酒煮爛入少酒糊杵和為日如梧子大每服七十口空心食前米飲鹽湯任下

進食散理脾元虛冷不思飲食久病脾虛全不食者及胃虛有風不食只三服便效

甘草

肉桂去麩

良薑炒

陳皮去白

青皮去麩

訶子五箇

草豆蔻三箇

川烏炮

水

右剉散每服二錢水一中盃生薑二片煎七分空心服

熱證一浮黃散治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰

痛心煩唇口乾燥壅滯不食

藿香葉 七錢 石膏 煨 縮砂 去殼

山梔子 去殼 甘草 半兩 防風 去蘆 四兩

右剉碎同蜜酒炒香焙為細末每服三錢水一

大盃煎至七分溫服不拘時候

一枳殼口治脾實心腹壅滯四肢疼悶兩脇脹滿大

小便不利方見秘

一橘皮竹茹湯治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓 去皮 陳皮 白 枇杷葉 拭去

麥門冬 去心 青竹茹 大 半夏 湯 七 兩

人參 去蘆 甘草 半兩 黃芩 半兩

右剉散每服四錢水一盃半薑五片煎至八分

去渣溫服不拘時候

一安脾散治胃氣先逆飲食過傷或憂思蓄怒宿食

痼癖積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯

疾女人得之多由血氣虛損男子得之多因下元

冷憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸

臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速療

遲則發煩渴大便秘水飲纖悉不得入口不旋踵

斃矣

高良薑 一兩 以百年壁土三合 碎用水二百碗 煮乾薄切成片

南木香 二大 草果 去殼 煨 胡椒 半兩

白茯苓 白朮 丁香 懷乾

陳橘皮

湯洗去穢

人參

去芦各半兩

甘草

炙一兩半

右為末每服二大錢食前米飲入鹽點服鹽酒亦得

薤白粥治翻胃無問久新冷熱

人參

一兩細切以水一盞煎取三合

雞子

三箇去黃

薤白

二莖

熟稀粟米粥

右以雞子白及薤白粟等三味熟調攪然後煖

人參湯相和更調攪頓服之不限早晚服無忌

當時便定准煎服萬不失一如思食即與粟米

粥飲漸漸加粳米和之

熟水草果飲法

烏梅肉

四兩

草果

乾薑

炮各三兩

赤茯苓

二兩

甘草

炙半兩

右剉散每服用半兩水一碗半煎至一碗去滓

磁器盛如熱水隨意服之

桂苓散治翻胃發渴

半夏

四錢

桂心

甘草

各三錢

赤茯苓

四兩

澤瀉

四兩

右剉散每服四錢生薑煎服

三稜煎口治宿食積聚翻吐酸穢

方見諸氣類

正胃散治翻胃嘔逆菜食俱不下結腸三五日至

七八日來大便不通如此者必死之疾

白水牛喉

一條去兩頭并筋膜脂肉節節取下如阿膠片黑牛不可用須就

宰牛人買下修事了臨病時旋灸修合

右用喉節以好米醋一大盞浸頻翻令勻微火炙乾再蘸再炙醋盡為度存性不得見太陽火為末每服一錢食前用陳米飲調下輕者一服見效

粉靈砂治脾疼翻胃

靈砂 一兩

蚌粉

同炒略煆

丁香

胡椒 各四十粒

右為末生薑自然汁煮半夏糊口如梧子大每服三十口翻胃煨生薑湯吞下虛人脾痛炒鹽

湯下

青金丹治一切吐逆

水銀 八錢

生硫黃

右二件入無油鉢內用慢火化開以柳木篦子撥炒或有烟焰以醋洒之結成砂子再研為細末用米粽尖杵和為口如菜豆大每服三十口用薑橘皮煎湯送下不拘時服

大掌中金治翻胃服水藥不得者

大綿附一箇生薑自然汁一椀煮乾為度母丁香一箇為末以少許安掌中心舐喫立效

丁附散治翻胃

大附子

一粒以蓋覆之線縛着置銀器中浸以生薑自然汁及蓋而

止慢火煮乾為度

右為末用一錢匕糝舌上漱四下若煩渴徐徐食糜粥忌油膩生冷

大倉口治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

陳倉米

一升用黃土炒熟去土不用

白豆蔻

二兩

丁香

一兩

縮砂仁

二兩

右為末用生薑自然汁法口如梧子大每服一百口食後用淡薑湯送下

小半夏口治翻胃及不欲飲食

大薯半夏

湯洗七次

胡椒

右等分為末薑汁口如梧子大每服三五十口

薑湯下

六丁口治翻胃如神

五靈脂

五錢

生辰砂

一錢

母丁香

一兩不見火

右為末入黃狗膽糯米粽子尖為口如雞頭大

每用薑湯化下

香牛飲治噎噎翻胃吐食神效

先以羯牛用

繩掛開牛口以淨布巾抹令口舌淨却拖牛舌出

來候有涎出以椀盛之每服用八分蓋為一服研

好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令溫先以絹帛

束縛中脘胃口令極緊候氣喘乘熱解開隨氣喘

一二口便服藥時先對病人說煮白粥惱煩之并

煎丁香汁和粥服藥罷隨與粥喫

一盞滾口治翻胃膈氣

丁香

木香

肉豆蔻

縮砂青皮

陳皮 胡椒 草撥 沉香各半

鹽右為末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二瓣入

煎去殼巴豆一粒用餅藥調麪裹蒜片慢火煨熟

去巴豆及麪只將蒜研成膏將前項藥末一半

東搜和為口如梧子大每服三十口於鹽內滾過

蘿蔔湯調前藥末二錢吞下神效

溫胃散治翻胃

真附子一箇去皮將分作四塊生薑一兩研

水一盞慢火同煮至水盡取附子切

右為末每服一錢空腹鹽湯下

治翻胃嘔吐大便秘結虛冷者用靈砂或養正丹

溫而利之又蘇合香口用四分感應口用六分

研作細口薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱

結用蜜煮凝捻作指鉞納後部導之或用獐猪

膽一枚取汁入法醋少許以筆蘸滴灌於後部

或燒皂角於桶內熏穀道或用連根葱白一握

漢椒五十粒擣細作餅焙熱和輕粉掩臍續以

葱椒煎湯熏盪身下

又方翻胃

真蚌粉

右每服二錢薑汁米飲調下

治吐逆不止

真黃丹四兩研細用米醋半升入銚內煎

粟米飯為口如梧子大醋酵湯吞七口不以時

一時住

灸法兩乳下各一寸以瘥為度又灸臍上一寸二寸壯又灸內踝下三指稍斜向前三壯中腕一穴在臍上四寸足三里二穴在膝下三寸各灸七壯或九壯其效尤著

導引方除腹肚冷風宿疾積胃口冷食欲進退吐逆不下正坐兩手向後捉腕反拓席盡勢使腹絃絃上下七左右換手亦然

乾食方惟食乾飯餅盡去羹飲水漿藥亦用口自不反動調理旬日奇效有人三世死於胃友至孫收效此方

咳嗽

風證神木散治四時溫疫頭痛項強發熱增寒身體疼痛及傷寒鼻塞聲重咳嗽頭昏並皆治

蒼朮

五兩米泔浸一宿切焙

香白芷

細辛

去葉土各

羌活

去芦

川芎

甘草

炙各一兩

右剉散每服三錢水一盃生薑三片葱白三寸煎七分溫服不拘時候如覺傷風鼻塞為末葱茶調下

三拗湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭目痛眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿短氣

傷寒陽證類

杏蘇湯治傷風身熱有汗惡風病證挾熱服杏子湯不得者此藥穩當也

不橘紅女藥蘇紫蘇葉

杏仁去皮

杏蘇五味子湯泡半夏七次桑白皮蜜略

貝母去皮白朮炒各一兩甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一錢半生薑五片煎至八

三分去滓溫服不拘時候

人參荆芥散治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言

語不出咽乾項強鼻流清涕

荆芥穗去芦麻黃去根細辛洗

桔梗去芦陳皮去白半夏湯洗七次

杏仁去皮通草洗

甘草炙各半兩右剉散每服四錢水一盃半薑五片煎食

後溫服

寒證金沸草散治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已

增寒發熱無汗惡寒煩燥或風熱壅在膈間唾黃

濁水甚者咯血方見傷寒

小青龍湯治表有寒邪喘水飲咳嗽急不得睡卧

方見傷寒

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘

急聲重鼻塞頭目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子炒赤茯苓去陳皮去麻黃去根節

桑白皮炙杏仁去皮

甘草炙半兩右剉散每服二錢水一觔煎至七分去渣食後

温服

暑證(六和湯)治傷暑痰生咳嗽喘滿加麥門冬烏

梅煎就吞(消暑口) 一方見傷暑

濕證(白朮散)治五臟傷濕咳嗽痰涎增寒發熱上

氣喘急

白朮 二兩 五味子 各一錢 茯苓 各一錢 甘草 一錢

半夏 四箇洗去滑破作十六片

右剉散分作十六服每服水一盃半薑五片紅

棗二枚煎至七分空腹服

不換金正氣散治傷濕四肢重着骨節疼痛洒淅

咳嗽

厚朴 去皮薑汁製

藿香 去枝土

甘草 盪

半夏 煮

蒼朮 米泔浸

陳皮 去白

加木瓜 每葉一兩只用五錢

右等分剉散每服三錢水一盃半生薑三片棗

子二枚煎至八分去渣食前稍熱服忌生冷油

膩 傷寒陰證用之亦效

七情團參飲子治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失節

致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒壯熱羸瘦

困頓將成勞瘵

人參 去蘆 紫苑茸 洗

阿膠 蛤粉炒

百合 蒸 細辛 洗去土

欵冬花

杏仁 去尖炒 天門冬 湯洗七次

半夏 湯泡七次

經霜桑葉 五味子 各一兩

甘草 炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分去渣食後溫服因氣而嗽者宜加木香效而唾血有熱加生地黃效而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極而咳嗽者加黃耆因損而唾血者加沒藥藕節效而嘔逆腹滿不食者加白朮倍加生薑效而小便多者加益智仁效而大便澇者去杏仁加鍾乳粉效而面浮氣逆者加沉香柑皮煎

一分心氣飲治憂鬱得嗽

每服三錢加枳殼去穢一錢北五味十粒生薑三片

煎方見諸氣類

熱證積殼半夏湯治上焦有熱咳嗽黃痰痞滿阻食加防己甜葶藶馬兜鈴薄荷葉各半兩每服薑三片桑

白皮七寸煎方見痰飲類

貝母散治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘

知母

新瓦上焙

貝母

已豆七粒同貝母炒略熟去已豆不用各一兩

右剉散錫糖一塊同煎服一方以二母為末入已豆霜少許臨卧用生薑二片蘸藥夾定細嚼

嚥下

紫苑膏治同上

枇杷葉

木通

欵冬花

紫苑

杏仁

桑白皮

各等分

大黃

減半

右如常製為末蜜口櫻桃大食後夜卧嚙化

玉芝曰治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去芦 乾薄荷 白茯苓去皮 白礬枯過

天南星米泔浸三日 半夏湯洗七次薑汁和作餅

右為末生薑汁煮麩糊口如梧子大每服三十

口食後薑湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

金沸草散治同上每服三錢生薑桑白皮烏梅煎就右服半夏圓方見傷寒陽證

及痰癰類

黃連阿膠口治肺熱咯血亦治熱瀉

黃連淨三兩 赤茯苓二兩 阿膠炒

右黃連茯苓為末水調阿膠和口如梧子大每

服三十口食後米飲下黃連茯苓能抑心火肺

得其清則嗽止

小柴胡湯治嗽久不瘥身有煩熱啜冷水而暫止者

加桑白皮北五味子棗子煎不拘時服煩熱加麥

門冬嗜卧減食加白朮煎方見傷寒陽證類

洗心散治心熱上炎肺經胃膈滿痛咽乾口燥咳

嗽殊甚方見積熱類

冷證藿香正氣散寧肺和胃祛痰治嗽通暢三焦

進美飲食生薑三片鹽梅一箇杏仁七粒去皮尖

北五味子七粒同煎就服青州白圓子方見傷寒陰證風科

通治類

理中湯治肺虛咳嗽痰唾清白飲食日減多嘔當

溫養脾土則生肺金用五味子炒阿膠煎湯調服

立效方見霍亂類

杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰

飲停積治一切 咳喘不問長短風寒內傷

立效 人參 半夏泡 茯苓 細辛

監壽 乾薑 官桂 杏仁 白芍藥 細辛

甘草 五味子 杏仁 白芍藥 細辛

右各等分 剉散 每服四錢 以水二椀 薑四片 煎

至七分 去渣 溫服 不以時 此藥最宜 冷嗽熱嗽

非所宜 若脈浮緊 身熱無汗 惡風 脈浮 身熱 無

汗 惡寒 而嗽 加少麻黃 去節 熱服

丁香 半夏口 治肺胃虛寒 咳嗽方見痰

胡椒 理中口 治寒嗽 冷痰 吐白涎 沫續續不止 不

能飲食 欬冬花梗去 華撥 陳皮 熟地 麥

乾薑 甘草 良薑 寒 薑 芥

胡椒 細辛去葉各 白朮二兩 白朮二兩

右為末 蜜口 如梧子大 每服十口 溫湯米飲 任

下 不拘時候

黃耆 建中湯 治冷嗽 加半夏 麴乾薑 五味子 同煎

空心服方見傷

養榮湯 治冷極 嗽可加熟附子 白豆蔻 北五味子

蜜炙粟殼 蚌粉 炒阿膠方見虛損類 以下

皺肺口 治久嗽

欬冬花 人參 五味子 官桂去皮

紫苑 白石英微帶青 鍾乳粉口

右等分為末 用羯羊肺一具 去皮尖 杏仁半斤

水煮肺爛為度去筋膜與杏仁同研極爛和眾藥曰如梧子大陰乾每服五七十口至百口糯米飲下食後臨臥服

時行人參飲子治寒熱上壅咳嗽痰涎

人參苦梗五味子赤茯苓去皮

白朮炒各一兩枳殼炒甘草各兩

右剉散每服四錢水一椀半薑五片煎至七分去滓食前溫服嗽多者加桑白皮一兩痰多加半夏麴一兩寒暑之交氣盛人衣厚作壅忽痰盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗攻其邪必成大病此方佳處在赤茯苓能導心熱枳殼能踈肺壅故易效一方有半夏一兩又云寒壅者

加杏仁不去皮尖紫蘇各半兩

二服散治暴嗽

阿膠二片生薑十片大烏梅三箇

甘草一錢紫蘇十葉杏仁去皮尖

大半夏三箇罌粟殼二箇

右剉散水一盞煎至六分去滓臨臥服

敗毒散升麻葛根湯香葛湯各件每用四錢生薑

烏梅桑白皮煎有效酌量用之方並見傷寒類

勞嗽蛤蚧散治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲

食

蛤蚧一對人參去芦百部去心

款冬花去枝紫苑茸各半貝母

阿膠

蛤粉炒

鱉甲

醋炙

柴胡

去芦

肉桂

去粗皮

黃耆

蜜炙

甘草

杏仁

湯浸去皮尖

半夏

生薑汁製 各一兩

右為末每服三錢水一椀半生薑三片煎至一盃不拘時溫服肉桂雖去風寒有熱人不肯服則當改用細辛

風痰嗽白圓子散治一種咳嗽直至嗽頓吐飲食痰物俱出盡方少定此乃肝木剋脾土風痰壅盛宜以青州白口子方作生料更加少木香丁香橘紅天麻全蝎去毒足僵蠶炒去嘴足服有效損嗽當歸飲治男子因打損負重女子因勞苦用力而傷肺經肺經既損遇風寒則為咳嗽或咳血

或至紫黑宜用此藥去心肺間瘀血仍灸肺腧病

即甦

肺腧穴在三推下一兩傍各一寸半

蘇木

生地黄

當歸

大黃

赤芍藥

右為末酒調服得利去瘀血即止服養榮湯調

理

通治澄清飲治諸證痰嗽服他藥不效者下

南星

蚌粉

知母

貝母

半夏

白礬

右各等分剉散每服三錢水一大盃生薑五片

去滓澄清俟溫徐徐吸服食後臨睡服小兒亦

青用得效

青金丹治肺虛壅咳喘滿咯痰血

杏仁去皮尖 牡蠣取粉入杏仁同炒 黃
青黛一兩

右研勻入黃蠟一兩鎔搜和口如彈子大壓匾
如餅每日中用柿一箇去核藥在內濕紙裏煨
約藥鎔方取出去火毒細嚼糯米飲送下一方
名甲乙餅治咳出血片無涎內有血條不問年
久月深但聲在一服效用青黛一分牡蠣粉二
錢匕杏仁七粒去皮尖研蠟圓了湯使並同前
入參清肺湯治肺胃虛寒咳嗽喘急胃膈噎悶脇
肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噫引痛及療肺痿
勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦

怠減食

地骨皮 人參 甘草 阿膠麩炒
杏仁去皮 桑白皮 知母 烏梅去核

桔梗去芦 罌粟殼去蒂蓋

右等分剉散每服三錢水一錢半烏梅棗子各
一枚同煎至一瓊去滓食後臨卧加蜜半匙攪
勻澄清吸服效

蠟煎散順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

欵冬花 紫苑洗土焙乾 甘草炙

五味子炒半 桑白皮炒 桔梗

杏仁去皮 紫蘇葉各一兩

右剉散每服四錢水一錢黃蠟少許煎食後臨

卧温服

神效散一治一切喘嗽

用皂角一條作兩邊去子每子入巴豆一粒線繫定童子小便浸一宿火上炙令焦黃去巴豆不用或入二粒亦不妨却以杏仁半夏各一合入麻油內煎令折裂為度同為末每服一字乾柿點藥細嚼或用白米糖蘸喫亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應物妙不可言

參蘇飲一治上膈泛熱咳嗽聲重

方見傷寒和解類

寧肺散一治大人小兒諸咳嗽

玄胡索 一兩

枯礬 二錢半

右為末每服二錢用軟錫糖一塊和藥含化小

兒一錢用蜜亦可

杏仁煎一治咳嗽失音不出

杏仁 去皮尖研三兩

生薑汁

蜜

砂糖 各一兩半

桑白皮

木通

貝母 各一分

紫苑

五味子

右剉散用水三升煎至半升入杏仁砂糖蜜薑

汁再煎成稀膏每服挑一匙頭含化更加知母

款冬花各一兩効

二陳湯一治咳嗽嘔痰

方見痰癘類

款冬花散一治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胃膈

煩悶痰實涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢

體倦疼咽嗑痛

欵冬花 去梗

知母

桑白皮

洗焙

半夏 各一兩

麻黃

阿膠

去粉炒

貝母 去心

各四兩

杏仁

去皮尖

甘草

各二兩

右剉散每服水一盞薑三片煎至七分去滓食

後溫服

單方葶藶散治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡卧

甜葶藶

紙炒今紫

右為末每服二錢水一盃煎至六分不拘時溫

服

又方治穀氣素壯人久嗽即效粟殼一味淨去筋

膜蜜炙為末每服用蜜湯下

又方治羸弱久嗽屢效九尖拒霜葉為末用魚鮓

蘸服

又方治久嗽漸成勞瘵鳳尾草為末用魚鮓蘸服

即效

嚼藥防已散

薄荷

百葉煎

枯礬

防已

甘草

右剉散入口細嚼旋旋嚥下治熱嗽失聲有效

星砂口治一切風痰利胸膈壯脾胃及消痰積溫

中順氣內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之

神效

南星

洗四兩

良薑

縮砂仁

各一兩

香附子

去毛

右為末生薑自然汁煮麩糊為口如梧桐子大

每服三十日生薑湯下不計時候夏月傷生冷尤宜服

捷徑方治久病痰嗽百藥未效

橘紅一斤去白要陳久者 甘草 鹽各四兩

右用水五盃慢火煮煎藥焙乾為末白湯點服

滴油散治痰嗽面浮

真蚌粉一味新瓦炒令通紅地上出火毒拌青

黛小許同淡蘆水滴麻油數點服即愈

灸法一上氣欬逆短氣胃滿多唾唾惡冷痰灸肺腧

五十壯又法灸兩乳下黑白際各百壯即瘥咳

嗽咽冷聲破喉猜猜灸天突五十壯穴與灸喘急同

膏盲腧在四椎下五椎上各去脊三寸近胛骨

僅容一指許多灸之亦效

喘急

風證麻黃散治傷風喘急坐卧不安痰涎壅塞涕

唾稠粘手足冷痺

麻黃去根節十兩 肉桂去皮六兩 欵冬花去莖枝

訶子皮各五兩 甘草各五兩 杏仁三兩去皮

右剉散每服三錢水一盃半入好茶一錢煎至

八分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥

末入茶和勻沸湯點或乾嚙亦得忌魚酒炙博

猪肉腥臊等物

溫肺湯治肺虛久感風邪喘咳不能坐臥可思飲

食

白芍藥

細辛 去芦葉洗

五味子 去核炒

乾薑 炮

肉桂 去皮

半夏 煮熟

陳皮 去白

杏仁

甘草 炒各三兩

右剉散每服三大錢水一盃半煎至八分以絹帛拭汁食後服兩服滓再煎一服一方去芍藥細辛可加減用

金沸草散治肺熱傷風喘嗽痰實

方見傷寒陽證類

寒證加味三拗湯治肺感寒邪發喘

杏仁 去皮尖

陳皮 一兩

甘草 三錢

麻黃 一兩

北五味子 七錢

桂枝 五錢

右剉散每服四錢水一盃半生薑三片煎喘甚加馬兜鈴桑白皮夏月減麻黃

香葛湯參蘇飲素有熱者宜服此

方並見傷寒和解類

藿香正氣散治渾身拘急增寒喘嗽頭目昏重加

五味子杏仁去皮尖鹽梅煎有泄不用杏仁 方見傷寒

陰證類

七情四磨湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右各濃磨水和作七分盃煎三五沸稍溫服或

下養正丹黑錫丹

四七湯治驚憂氣過上喘

半夏 製二兩半 茯苓 二兩 厚朴 製一兩半 紫蘇葉 一兩

右剉散每服三錢半薑七片棗二枚煎服

紫蘇子湯治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促

煩悶腸鳴氣支漉漉有聲大小便不利脉虚緊而

紫蘇子一兩

大腹皮

草果仁

半夏湯洗七次

厚朴去皮薑汁製

木香不見火

陳皮

木通

白朮

枳實去穢炒

人參

甘草炙各半兩

右劉散每服四錢水一瓊薑三片棗二枚煎至

七分不拘時

熱證洗心散治心肺俱熱致胸滿壅盛口乾作渴

發喘喉中腥氣每服二錢薄荷茶清調下

八正散治同前用燈心二十莖淡竹葉一皮煎並方

見積熱類

葶藶散治過食煎燻或飲酒過度致肺壅喘不得

卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶炒

桔梗去芦

瓜蒌子

川升麻

薏苡仁

桑白皮炙

葛根各一兩

甘草炙半兩

右劉散每服四錢水一盃半生薑五片同煎食

後温服

小柴胡湯治服熱藥過多或身有煩熱作喘數服

即安

金沸草散加甜葶藶桑白皮煎方各見傷寒陽證類

枳殼半夏湯加防己薄荷煎方見痰飲類以上

加味控涎口治風熱上壅或中脘停留水飲喘急

四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚服之得利則效

大戟 芫花

甘遂

甜葶藶 巴豆去殼各一兩

黑牽牛取頭末

白芥子兩炒二

右為末米糊口粟米大每服三七粒茶清吞下

或溫水亦可服後未可服甘草藥及熱水

虛證蘇子降氣湯治氣虛發喘不得安枕宜用舊

鹽梅杏仁去皮尖北五味各少許煎吞黑錫丹五

十粒方見諸氣及癆冷類

鍾乳石治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不能坐卧遠

年日近並皆治之

滑石兩半

鍾乳粉見成者一兩

南星炮切片生薑製

右為末煑乾柿去蒂核搗細搜藥為口如梧子大每服四十口薑棗煎湯下氣弱人更服養正

丹方見癆冷類

胡椒理中石治肺胃受冷氣短減食時吐痰水喘

促濃煎人參湯吞服甚妙方見咳嗽類

安腎石見虛損類治腎寒多唾上喘人參鹽湯下八味石

亦可見脚氣類養正丹均有效方見癆冷類凡動作喘甚者均宜服效

紅椒石治虛勞喘嗽眩暈

靈砂一兩細研

人參

木香各二錢半

大香附子揀淨

大紅椒

去合口并子焙出汗各半兩

右為末糕糊口如麻子大每服二十口空心搗

皮湯下

通治一人參定喘湯治肺氣喘喉中有聲坐卧不安
胸膈緊滿及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去芦一兩

罌粟殼蜜炙二兩

麻黃去節

半夏麩

甘草炙各一兩

桑白皮兩半

阿膠炒一兩

五味子半一兩

右剉散每服三錢水一盃薑三片煎至七分食

後溫服

九寶湯治經年喘嗽通用常服屢效

麻黃去節

橘紅

腦荷各一兩

辣桂

紫蘇

桑白皮炒

杏仁去皮尖

大腹子連皮

甘草炙各半兩

右剉散每服三錢薑五片烏梅一箇水一瓊半

同煎食後臨臥服或入童子小便半盃尤妙

杏參飲治因墜墮驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘

急不安

人參

桑白皮

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子麩裏煨取肉

半夏湯泡七次

桂心不見火

杏仁去皮尖炒

紫苑洗

甘草炙

右等分剉散每服四錢水一盃半生薑五片紫

蘇七葉煎至七分去滓溫服不拘時候

分心氣飲治氣逆脉伏發厥而喘者方見諸氣類

秘傳降氣湯治氣不升降上熱下冷作喘生薑紫

蘇葉同煎就服玉華白丹效方見諸氣類玉華白丹方見痲冷類

加味白朮散治喘嗽每遇飲酒必發

陳皮

半夏

人參

白茯苓

白朮

甘草

山藥

炮各二兩

白扁豆

製一兩半

縮砂

桔梗

炒

石蓮肉

薏苡仁

各一兩

右劉散生薑桑白皮煎服效

水煮木香口治喘急泄瀉加官桂生薑煎服

方見下痢類

神保口治久喘胃膈滿悶飲食不進每服七口生

薑柿蒂湯下

方見諸氣類

玉液散治久近喘嗽口乾作渴

瓜蒌根

知母

貝母

去心炒各一兩

甘草

人參

右末每服二錢先鎔下黃蠟二錢同入米飲調

下食後服

神應丹治肺氣喘急晨夕不得睡不問久新一服

見效

砒石

一兩

菘豆

六兩

右二味同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹一

兩同研爛用紙做卷五七重如豆筒又入砒石

黃丹以黃泥固濟復燒紅為度又入黃丹一兩

麩四分為口如粟米大又以黃丹二兩為衣每

服二粒新井花水下得効即止

胡桃湯治痰喘

胡桃肉

三箇

生薑片

三片

右臨卧食畢飲湯三兩呷又再嚼如前飲湯就
民枕即安

〔葶藶〕又名防己口大治肺氣咳嗽面浮目腫喘
促睡臥不得步履艱難小便赤澀等疾兩分每

漢防己

甜葶藶

隔紙炒
令紫色

杏仁

微煨
去皮

及雙仁
各二兩

右為末棗肉為口如梧子大每服三十口煎桑
白皮湯下不拘時候

〔炙肝散〕治喘併痰嗽兩服病不復作

白礬

飛過
研

五倍子

為末

右每服各一錢以生猪肝火上炙熟蘸菜食後
臨卧服

〔人參清肺湯〕治喘急噎塞加桔梗欵冬花方見咳

〔清膈散〕治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣

南星

一兩

鈔白霜

少許

桑白皮

一兩

白附子

五錢

右剉散生薑三片煎食後臨睡服

〔灸法〕肺腧各十一壯穴在第三椎下兩傍各去一

寸五分天突穴在頸結喉下五寸宛宛中灸七壯

立效

泄瀉

風證香薷香蘇散治傷風自汗瀉泄每服四錢生

薑木瓜煎服

方見傷暑及
傷寒和解類

不換金正氣散體虛傷風冷瀉加官桂烏梅方見

類

胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下膈中虛滿大腸受濕下如豆羹汁或下瘀血日夜無度並宜服

人參 白茯苓去皮 芎藭 桂心不見火

當歸 白芍藥 白木炒 甘草炙

右等分剉散每服四錢水一盃半入粟米百餘粒煎至七分去滓空腹稍熱服胃氣弱者不宜多服

火炊口治風氣行於腸胃泄瀉

火炊草一味為末醋糊口每服三十口空心服

寒證理中湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉

青黑無治傷寒挾寒而利臍下冷名驚瀉證效

人參 白朮 乾薑炒 甘草炒各一兩

加茯苓 厚朴薑製各二兩

右剉散每服三錢水一盃煎空心服

加味治中湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉

乾薑炮 白朮炒 青皮去白 陳皮去白

縮砂仁各一兩 人參 甘草炙各兩

右剉散每服四錢水一盃半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時或無進感應口

暑證香薷散治傷暑煩渴引飲所下如水暑方見傷類

胃苓湯治傷暑煩渴引飲所下如水暑方見傷類

五苓散暑方見傷類 平胃散暑方見傷類

右二錢合和紫蘇烏梅煎湯下未效加木香縮砂白朮丁香煎服一來復丹亦可方見痢冷類或感寒濕水泄平

胃散理中湯蘇梅米湯調下

通苓散一分利水穀解煩熱止泄瀉

猪苓去皮 白朮去芦 澤瀉去毛 赤茯苓去皮

車前子 木通 茵陳 瞿麥

右劉散每服四錢水一盃半燈心麥門冬煎服

六和湯治暑瀉小便赤澀方見傷暑類

水浸丹治感暑口乾煩渴頻瀉方見霍亂類

濕證藿香正氣散治腰脚冷痺小便自利肢體重

著所下黃黑方見傷寒陰證類

胃苓湯治傷濕瀉每服二錢蘇葉三皮食盐少許

調熱服

白朮附子湯治腸胃虛受濕腸鳴泄瀉自汗

白朮二兩 附子炮 茯苓去皮各一兩

右劉散每服四錢水一盃半生薑七片棗子一

枚煎至七分去滓溫服不拘時候

麴芎治臟腑受風濕泄瀉不止

芎藭 神麴 白朮 附子各等分

右為末糊口如梧子大每服五十口米飲下

七情加味藿香正氣散治飲食中憂怒傷脾腹內

膨滿泄瀉頻併或作晨泄加丁香縮砂良薑南木

香各半錢生薑三片紅棗二枚煎效

木香散治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下泄米穀

不化飲食無味肌肉瘦瘁心多嗔恚婦人產後虛冷下泄及一切水瀉冷痢

木香破故紙各一良薑砂仁

厚朴薑製各赤芍藥陳皮肉桂

白朮各半胡椒茱萸各一肉豆蔻四

檳榔一

右為末每服三大錢用不經水猪肝四兩批薄重重糝藥漿水一碗入醋茶脚小許入甑蓋覆煮熟入鹽葱白三箇生薑彈子大同煮欲盡空心作一服冷食之初微澹不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑泄只是一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能食冷則漿水煖食之若只

用漿水煮猪肝為口如梧子大每服五十口用

粥飲下亦效若暴瀉只一服

熱證黃連香薷散治熱瀉澹痢大便熱煩燥小便

赤喜飲冷香薷散每一兩加宣連五錢剉碎合和

燈心二十茎車前草二根同煎方見傷暑類

五苓散治法湯引同上方見傷暑類

黃連阿膠口每服五十口米飲下空腹服方見咳

升麻葛根湯小柴胡湯治傷寒身熱目疼煩渴泄瀉二藥和合用生薑陳米烏梅煎服立效方並見傷寒陽

證類

藥皮湯治協熱泄瀉亦治血痢

藥皮三兩黃芩二兩黃連一兩

右到散每服四錢水一大錢煎至七分入阿膠末半錢再煎少頃溫服

調胃承氣湯治大實熱下利識言此有燥屎也夫泄瀉反用大黃者乃因所利而利之此治熱瀉也非大實勿妄輕用之方見傷寒陽證類

冷證去麻黃五積散炒過名和氣飲治脾胃宿冷腹內切痛或外感風寒內傷生冷泄瀉黃白色不止或肝經受寒面色青慘厥而泄利生薑三片鹽梅一箇紅棗二枚同煎大效方見傷寒陰證類

豆附口治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻炮

附子炮去皮

白茯苓各四兩

乾薑炮

木香不見火

肉桂去麋皮各二兩

丁香一兩不見火

右為末薑汁糊為口如梧子大每服五十口加至一百口薑湯吞下粥飲亦可空心食前服

薑附湯治下泄如水或青或白臍腹痛手足冷脈細欲絕漸漸短氣由陽氣暴絕為陰所迫則注下不止陽復則生不復則死又不止灸氣海百壯傷寒虛證驚澹亦效方見中寒類

大已寒口治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疔痛脇肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗久痢休息

葶藶各四兩 肉桂各四兩 乾薑各四兩 高良薑各六兩

右為末煮麩糊口如梧子大每服三十口空心
米飲下

加味四柱散治臟腑虛怯本氣衰弱脾胃不快不
進飲食時加泄利晝夜不息

人參去芦 白茯苓皮去 附子炮去皮臍

木香濕紙包 訶子濕紙包炮取

右到散每服二錢薑二片棗一枚煎至六分服

加味三建湯治洞泄不止

大川烏 綿附 天雄三味並炮鹽

木香 肉豆蔻煨 訶子去核各

右到散每服三錢生薑十片紅棗二枚鹽梅一

箇陳米一撮同煎空腹熱服未效仍服來復丹

來復丹治同上方見痢冷類

茱萸斷下口治臟寒腹痛泄瀉不止

艾葉炒 赤石脂 川薑各半 吳茱萸

縮砂仁 肉豆蔻 附子炮去皮臍

右為末麩糊口如梧子大每服五十口食前米

飲下

猪臟口治臟寒泄瀉不進飲食氣體倦怠

吳茱萸淨去枝梗不以

右用獐猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟

內兩頭扎定慢火煮令極爛用甌蒸熟尤好將

薑二味於白內杵千下令極細口如梧子大每服

五十口米飲下

〔猪肚〕治臟寒泄瀉先用製成厚朴附子二味生薑棗子煎服空心仍服此〔猪肚〕

加味甘川烏蒸附子炮各二兩乾薑炮白朮

厚朴各一兩半良薑炒肉豆蔻煨葶撥

〔右為末用猪肚一隻淨洗以川椒一兩去目

茴香一兩大麩二兩入猪肚內用線縫定酒醋

煮爛取出川椒茴香大麩焙乾為末均和前藥

以猪肚杵和得所為口如梧子大每服五十口

空心米飲送下

〔椒艾〕治臟腑虛寒泄痢不止

〔來烏梅〕去核二兩半揉成無滓艾一兩

乾薑 赤石脂

〔煎日〕川椒炒去目黑附炮裂各一兩

〔右除烏梅外同為末將蒸過烏梅肉研勻更入熟棗肉蜜少許和口如梧子大每服二十口米

飲下

〔茱萸湯〕治脾泄多老人腎虛謂之水土同化

吳茱萸取淨不少

右用白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能

煖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分

〔解清濁也〕

〔大理中〕治大便虛滑不禁

〔人參〕白朮 乾薑 甘草各等分

右為末煉蜜口如指頭大每一口用平胃散一
六貼煎化服便止加鹽梅同煎尤妙
六君子湯治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴
泄瀉

人參 甘草 白茯苓 白朮

肉豆蔻 濕紙裹煨熟到碎 訶子 煨去核

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎服或
為末熱鹽湯調服亦可

養氣湯治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十口空

心米飲吞下多服收功 方見痢

冷熱不調參連口治腸胃虛弱冷熱不調泄痢腸
鳴日夜無度

艾葉 用細末秤二兩半焙

乾薑 炮取半末二兩用艾末

宣連 一兩半到炒色紫揀去菜莖不用

訶子 煨去核 木香 一兩半為麩末將

人參 去芦 白朮

烏梅 去核焙

百草霜 別研 白茯苓 去皮 酸石榴皮 炒

當歸 洗焙 地榆 已上各 赤石脂 質膩

龍骨 各一兩煨 阿膠 二兩蚌 罌粟殼 二兩

右為末將前項艾膏和為口如梧子大每服五
十日陳米飲下

戊己口治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化腸

鳴腹痛或嘔胃不食或嘔吐不止或嘔吐不止或嘔吐不止

黃連吳茱萸白芍藥泡七次

右等分為末用糊口如梧子大每服三四十口

空心食前濃米飲下或下

腎泄安腎口治腎洩腹痛無定處似痢非痢骨痛

面鰲腰脚時冷用七氣湯送下安腎口方見虛損類七氣湯

見心類震靈丹治同前每服三十口炒破故紙棗子煎湯

調鍾乳粉少許空心送下小兒腎泄白膿褐汁面

黠齒脫俚人怯寒震靈丹末入些鍾乳粉以棗煎

炒破故紙取熱汁調下效

金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一

切虛冷之證並皆治之已上二方並見痢冷類

脾泄灸肝散治久患不愈

白朮白芷白芍藥桔梗

右等分為末炙鹽肝蘸服

和氣散即除麻黃五積散治久虛脾泄大效方見傷寒類證

朴附口治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止及翻胃

惡心臍膈滑泄

厚朴薑汁製綿附子炮去皮

神麴錢炒五乾薑兩炮三

右為末酒煮麴糊口如梧子大每服三十口空

腹心食前米飲或鹽湯下

脾腎泄木香散一治脾腎俱虛泄瀉

肉豆蔻

麩裹 燒

破故紙

炒

白朮

十口空

白茯苓

各半 兩

木香

甘草

各二錢

右劉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前

溫服

二神口一治脾腎虛弱泄瀉不止全不進食

肉豆蔻

二兩

破故紙

四兩 炒熟

右為末用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮

棗爛去薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和

杵口如梧子大每服三十口鹽湯下立效弱甚

加茯苓二兩木香一兩

積證香蘇散一治食傷脾胃噫生熱氣及所泄穢氣

殊甚或腹緊塊痛水煎吞盧氏感應口一每服三七

粒立效久患豆積泄瀉不止經驗方見傷寒和

縮砂香附湯一治傷食成積下瀉與平胃散合和每

服二錢紫蘇葉食鹽煎湯調常服有效方見諸氣

酒泄虛者香茸口一治飲酒多遂成酒泄骨立不能

食但再飲一二盃泄作幾年矣

正和嫩鹿茸

草火燎去 毛酥炙黃

肉豆蔻

火煨各

煨生麝香

別研 一錢

右為末白陳米飯為口如梧子大每服五十口

空腹米飲下熱者酒蒸黃連口方見下

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥芽神

麴各五錢為末空腹米飲調二錢立愈

晨泄又名瀉泄(香薑散)

平胃生薑

如四兩豆大

黃連

二兩

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃

連末每服二錢用蠟茶清調一劑而愈又用米

飲酒調治白痢尤妙若欲速效一料只作二服

五味子散治五更天明溏泄一次名腎虛泄感陰

氣而然

五味子

揀去梗

吳茱萸

半兩

右同炒香熟研為末每服二錢用陳米飲調下

食前空心服或加破故紙炒香肉豆蔻煨裂為

末蒜膏為口如梧子大每服三十口米飲下大

效

滑泄大斷下口治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入

脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗

耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消

索五臟之液不收謂之五虛此為難治略能食者

生

附子

肉豆蔻

牡蠣

煨秤各一兩

細辛

乾薑

炮

良薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴皮

醋煮乾為

度焙乾各一兩半

白礬

枯

訶子

去核各一兩

右為末糊口如梧子大每服三十口粟米湯下

豆蔻飲治滑泄神效

陳米

一兩

肉豆蔻

麩裹煨

五味子

赤石脂 研各半兩

豆右為末每服一錢粟米湯飲調下日進三服

乳豆 治滑泄不止諸藥無效

肉豆蔻 生為末

右以通明乳香用酒浸透研成膏和前藥末為

口如梧子大每服五十口空腹飯飲下

葶撥 治滑泄妙甚

葶撥

川薑 炮

丁香 不見

附子 炮去皮

吳茱萸 炒

良薑

胡椒 已上各一兩

山茱萸 去核

草豆蔻 去皮各半兩

右末棗肉口梧子大每服五十口食前陳米飲

管下日三服

固腸 治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸 揀淨

黃連 去鬚

罌粟殼 去穢蒂各等分

右為末醋糊口如梧子大每服三十口空腹米

飲下

暴瀉 硫黃散治所下如破水

生硫黃

白滑石

右為末溫水調下立止 大每服四十口食後

車前散 治暴瀉不止小便不通

車前子

右為末每服二錢米飲調根葉亦可立效

針頭 治夏月水瀉不止

大巴豆 一粒去殼

右以針刺定燈上燒存性不可過研細用蠟如
[神麴] 治暴瀉不止
乳倒流水吞服食前一服效

[車前神麴] 炒一兩 菜萹半兩 湯七次

右為末用醋糊口如梧子大每服四十口食前
米飲下

[肚蒜] 治水泄

獾猪肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內以肚子
滿為度自晨至晚以肚蒜糜爛為度杵成膏子
入平胃散同杵口如梧子大每服三十口鹽湯
或米飲空腹服

[粟殼] 治暴瀉

肉豆蔻炮

粟殼去赤膜蒂

右為末醋糊口如梧子大空腹米湯下三十口

[單方] 鍾乳粉一味棗肉為口治久瀉極甚棗湯下

小兒亦可服

[灸法] 泄利不止灸臍中名神闕穴五壯或七壯艾

炷如小筋筋大及關元穴三十壯其穴在臍下

三寸草

通治真入養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不

調臟腑受寒下痢泄瀉或便膿血有如魚腦裏急

後重臍腹痛日夜無度胸膈痞悶脅肋脹滿全

不思食及治脫肛墜下酒毒便血諸藥不效者並

皆治之

參重墾粟殼去蒂蓋三人參去蘆當歸去尾各

肉桂去麩皮訶子去核木香不見火

肉豆蔻麩裏煨白朮六錢白芍藥六錢

甘草八錢

右剉散每服二大錢水一錢半煎至八分去渣

食前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈

忌酒麪生冷魚腥油膩如臟腑滑泄夜起久不

單瘥者可加炮附子三片煎服此的有神效或有

積用縮砂煎湯下感應口二三七粒俟其積消然

後服此

香連口治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩

渴米穀不化腹脹腸鳴胃膈痞悶脇肋脹滿或下

痢膿血裏急後重夜起頻併可思飲食或小便不

利肢體怠惰漸即瘦弱並宜服之

黃連去蘆鬚二十兩用吳茱萸一

木香四兩同炒令赤去茱萸不用

右為末醋糊口如梧子大每服二十口飯飲吞

下空腹食前日進三服

人參散治瀉後煩渴方見嘔吐類

世醫得效方卷第五終

甘肅醫學效方卷第五

豐樂散

肉桂

肉桂

入參

下

...


...

黃

...

...

...



...

...

...

...

