

陶節菴傷寒全生集目錄卷之三

辨傷寒呃逆例第一

雜瀉心湯

加味小柴胡湯

橘皮半夏生姜湯

羌活附子湯

丁附理中湯

橘皮乾姜湯

乳香硫黃散

丁香柿蒂散

灸期門法

辨傷寒胸脇滿例第二

辨傷寒結胸例第三



大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

加味柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

柴胡枳桔湯

枳實理中湯

三物白散

茯苓半夏湯

加味二陳湯

加味犀角地黄湯

蘇合香丸

辨傷寒心下痞例第四

瓜蒂散

辨半夏瀉心湯第一

甘草瀉心湯

辨瀉心湯黃連瀉心湯附子瀉心湯

五苓散

開別條

十棗湯

柴胡枳桔湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

枳實理中湯

木香理中湯

辨傷寒自利例第五

葛根黃芩黃連湯

黃芩湯

小柴胡湯

猪苓湯

防風芍藥湯

白頭翁湯

理中湯

人參白朮散

附子湯

真武湯

通脉四逆湯

四逆散

白通湯

大承氣湯

八桂散

三黃熟艾湯

辨傷寒便膿例第六

黃連湯

四物阿膠湯

黃連阿膠湯

鷄子黃連湯

大黃酒

三黃補血湯

黃連胃風湯

阿膠湯

辨加減芍藥湯

桃花湯

當歸附子湯

桂枝六合湯

辨傷寒譫語例第七

辨傷寒鄭聲例第八

辨傷寒懊憹例第九

梔子豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾姜湯

辨傷寒發斑例第十

升麻葛根湯

加味羌活散

人參化斑湯

加味小柴胡湯

消毒犀角湯

大青升麻湯

犀角玄參湯

玄參升麻湯

梔子杏仁湯

黃連一物湯

黃連解毒湯

加減三黃石膏湯

通脈四逆湯

調中湯

大建中湯

人參三白湯

青黛一物湯

苦酒雞子湯

辨傷寒發黃例第十一

茵陳湯

梔子升麻湯

龍膽湯

得効方本

茵陳犀角湯

茵陳五苓散

一方杏

瓜蒂散

茵陳四逆湯

茵陳茱萸湯

茵陳理中湯

擦黃法

辨傷寒發狂例第十二

陽毒升麻湯

升麻湯

升麻六物湯

加味升麻湯

梔子升麻湯

玄參升麻湯

梔子仁湯

三黃石膏湯

猪苓散吐法

奪命丹

辨傷寒心下滿例第十三

辨傷寒咳嗽例第十四

人參杏仁湯

三物湯

辨傷寒喘例第十五

麻黃石膏湯

葛根黃芩湯

五味湯

加減五味湯

辨蘇陳九寶湯例第二十一加減瀉日散

辨傷寒心下悸例第十六

辨小建中湯例第二十二桂枝甘草湯

辨桂苓甘草湯例第二十三

辨傷寒身振例第十七

辨傷寒戰慄例第十八

辨傷寒腹滿例第十九

辨傷寒腹痛例第二十

辨傷寒小腹滿例第二十一

辨傷寒小便不通例第二十二

清肺飲

黃芩湯

八正散

清心蓮子飲

滋陰化氣湯

滋腎丸

滋陰益氣湯

辨傷寒小便數例第二十三

辨傷寒小便難少例第二十四

辨傷寒小便自利例第二十五

辨傷寒不大便例第二十六

調胃承氣湯

小承氣湯

大柴胡湯

密導法

製大黃法

解大黃芒硝法

四物麻仁湯

當歸潤燥湯

麻仁脾約丸

辨傷寒無表裏證例第二十七

小柴胡湯

傷寒全生集卷三目錄

終

小承原曲

四時麻子湯

藥大黃湯

大柴胡湯

附胃承原曲

小承原曲

當續開熱湯

藥大黃湯

容導湯

小承原曲

陶節菴傷寒全生集卷之三

會稽 玉符朱映壁訂正

鎮江 醫官何主爨重校

姑蘇 醫生戈如璧同叅

辨傷寒呃逆例第一

夫呃逆者俗謂呃忒是也。纔發聲於咽喉則遽止。軋軋然連續數聲。其聲短促不長。古謂之噦。非也。噦與乾嘔無異。但其聲濁惡而長。比之呃忒大有徑庭矣。若將呃逆紊為噦與咳逆。悞人尤多。然呃逆有因胃

中實熱失下而作。有因胃中痰飲而作。有因服寒涼之藥過多。胃中虛冷而作。且其氣皆從胃中起。至胸嗌之間。而爲呃忒矣。胃熱失下。大便不通者。承氣湯下之。便軟者。以瀉心湯主之。有潮熱。小柴胡湯。胃虛有熱者。橘皮竹茹湯主之。有痰飲者。橘皮半夏姜湯主之。加茯苓枳實陳皮桔梗。若胃冷者。橘皮乾姜湯主之。甚者。丁附理中湯。加吳茱萸主之。若過服寒涼藥多。胃寒呃忒者。丁附理中湯。加吳茱萸木香姜汁主之。凡其氣自臍下直冲於胸嗌間。呃忒者。此陰症。呃忒也。其病不在胃矣。其病下虛。內伏陰火。或悞服寒藥。遂至冷極於下。迫其相火上冲。卒集於胸中。而爲呃忒。亦欲盡也。病人煩燥。自覺熱甚。他人以手按其肌膚則冷。此爲無根失守之火。散亂爲熱。非實熱也。乃水極反似火。陰症類似陽也。若不識此。悞用涼藥。下咽卽效。當用羌活附子湯。加官桂人參木香陳皮半夏砂仁。急溫其下。令其陽回。陰火降。呃忒乃止也。若陰症及因胃寒。呃忒不止者。外用乳香硫黃散。嗅法。內用丁香柿蒂散服之。則止。再灸期門中脘氣



海關元此良方也。但手足溫煖脉重者為有生矣。又有瘀血而疔瘡。有形物也。壅塞其間。雖柿蒂亦不應。

瀉心湯

治胃熱呃逆而便軟者。黃芩中乾姜下人參下

沙木半夏下黃芩中乾姜下人參下

黃連上甘草下加茯苓陳皮

水姜煎服

加味小柴胡湯本方有加減法

治陽症口苦脉弦發熱呃忒者。或潮熱呃忒者。

軟柴胡上黃芩中半夏下炙甘草下

丁州人參中枳實黃連中渴加天花粉知母

心下痞加枳實黃連。渴加天花粉知母。

心煩加姜汁黃連。水姜煎溫服。

橘皮半夏生姜湯本方自有加減法

治伏痰飲呃忒者。

陳皮上半夏上生姜中加茯苓

枳實寒熱桔梗瓜砂仁

心煩加姜汁黃連。水姜煎加姜汁服。

羌活附子湯

本方自有加減法

治陰症寒極嘔逆呃忒者。

羌活

上

附子

上

茴香

中

丁香

中

乾姜

下

甚者加吳茱萸官桂砂仁人參陳皮。○寒氣

逆上加沉香。○腹中痛加良姜。○水姜煎磨

木香姜汁溫服之。

丁附理中湯

本方自有加減法

治胃寒呃逆及治服寒涼藥過多傷胃呃忒者。

丁香

上

附子

中

乾姜

中

人參

中

白朮

中

甘草

下

加吳茱萸

丁香官桂

中

砂仁

中

陳皮

中

甚者加良姜。○冷氣逆上者加沉香。○水姜

煎磨木香姜汁溫服。

橘皮乾姜湯

治胃中虛寒呃逆者。

橘皮

乾姜

加半夏

白朮

砂仁 人參 丁香 枳實 中 枳實 甚 氣

寒重不止用前丁附理中湯甚良。

乳香硫黃散

治陰寒呃忒不止者用此切法。

乳香

硫黃

艾

各二錢

為細末用。好酒一鍾煎數沸。乘熱氣使病人鼻嗅之外用搗生姜擦胸前最效。

丁香柿蒂散

治陰症呃逆及胸中虛寒呃逆不止者。

丁香

柿蒂

各一錢五分

茴香

乾姜

良姜

陳皮

各一錢

各為細末用熱姜湯調下未止宜再服。

灸期門法

婦人屈乳頭向下盡處骨間動脈是穴。男女乳

小者以手一指為率。陷中動脈是穴。男左女右

灸三五壯。

蘇精辨傷寒胸脇滿例第二

胸脇滿者。胸滿乃腹間氣塞滿悶。非心下滿也。脇滿者。脇肋脹滿。非腹中滿也。蓋表邪傳裏。必先胸以至腹入胃。是以胸滿多帶表証。宜微汗。脇滿多在半表半裏之間。宜和解之。又有邪熱或痰食結在胸中。爲實者。必須湧吐之也。傷寒胸滿心煩者。柴胡陷胸湯。脇下硬。加青皮。牡蠣粉。往來寒熱。胸脇滿者。小柴胡加桂白芍藥。脇下痛。加青皮。川芎。木香。若胸中痞氣滿悶。小柴胡加枳桔。未效。加瓜蒌黃連。渴去半夏。加

貝母乾葛渴甚加天花粉。治痞滿須用枳殼桔梗爲要。藥經云。病人手足冷。脈乍緊。邪結在中心。心下滿而煩。飢不能食。病在胸中。宜吐之。又寸脈微浮。或伏胸中痞硬。氣上冲咽喉。不得息。此爲胸中有寒者。宜吐之。有痰實結胸中。亦宜吐之。用瓜蒂散。若胸脇不快。腹滿悶。唇青。手足冷。脈沉細。少情緒。或腹痛欲嘔者。此因生冷傷于太陰脾土。用理中湯。去參朮。加砂仁。枳殼。木香。內寒甚者。加干附。兼有外感寒者。用五積散。加減治之。夫抵枳殼瀉至高之氣。枳實瀉至低之氣。故心之上。胸之分。枳殼瀉之心之下。胃之分。枳實瀉之瓜。萸仁能瀉肺。洗滌胸中痰垢之要藥。故胸滿而煩者。加之外。用生姜搗粗去汁。炒熱揉熨胸脇。大抵陽証不可太熱。絹包漸漸揉熨胸脇。或痰或氣。或滿或痛。或硬或食。或寒俱用此法。以辛散之。自然寬矣。若候服寒涼藥過多。反成寒實結胸。脹滿不通。湯藥不入者。又當用姜附丁桂以溫開之。及中寒邪結胸脇間。此與治法同。

結胸證問此與前證同

結胸證不人者久不愈因無病下熱以虛陷之及中寒邪

實於表者則邪氣乘虛而入為寒實證因熱者不為

結胸證有結胸者則為合病或為併病因出結以辛散之自然

大寒則下利不可下大熱則下利不可下結胸者宜下之

結胸證之入裏者宜下之然用生薑瀉心湯去其結而散其邪

實證之入裏者宜下之然用承氣湯去其結而散其邪

結胸證之心下硬者宜下之然用承氣湯去其結而散其邪

結胸證之辨傷寒結胸例第三

結胸痞氣雖開前條恐論未盡故再明之蓋結胸者

緣太陽証自汗當服桂枝湯散其邪候用承氣下之

表邪乘虛內陷結于心胸間反成真結胸也當分輕

重治之未經下者非結胸也乃表邪傳至胸中未入

乎腑証雖滿悶尚為在表正屬少陽部分只須小柴

胡加枳桔以治其悶如未效以小陷胸合小柴胡去

半夏一服如神世俗皆不知其妙若真結胸不按自

痛連臍腹硬手不可近大熱大渴者名大結胸用大

柴胡湯

陷胸湯。若按之方痛。心下硬。名小結胸。用小陷胸湯。若懊懣發熱煩渴。心下痛硬。大便秘。昏悶。名熱結胸。少與大陷胸湯加黃連。若懊懣滿悶。身無熱。口不渴者。名寒結胸。用枳實理中湯。重則三物白散。若心下怔忡。頭汗出。無大熱。先渴後悶。痛揉之。有聲。汨汨者。名水結胸。用半夏茯苓湯。傷寒陽正吐衄。血不盡。畜在上焦。胸腹脹滿。硬痛。身熱。漱水不嚥。喜忘如狂。大便黑。小便利。名血結胸。用犀角地黄湯。又有食結。支結。微結。痰結。治各不同。要在明辨治之。凡結胸証悉具煩燥者。死。結胸脈浮大者。不可下。下之則死。陽明病。心下硬滿。不可下。下之利不止者。死。此邪氣自表傳裏。全未爲實。宜吐之。凡結胸有兼發黃發斑。有兼發狂或呃忒者。最重。但脈微細沉小。而手足冷者。皆難治也。若脈沉緊沉滑沉實。或數大有力。乃可攻之。一切結胸証。先理其氣。用枳殼桔梗以寬之。外有姜粗揉熨法。甚良。其食結開在食積條下。大陷胸湯。二輪煎至八分。入葶藶一二匙。去酥入。治大熱大結胸証。不按自痛。口燥渴者。

大黃 芒硝 甘遂

用水二鍾煎至八分入芒硝一二沸去粗入  
甘遂末和勻溫服如人行十里時大便以利  
為度勿再服。不利宜再服。○凡熱甚如大結  
胸石硬而痛者及結胸項強如柔痙下之則  
和。

大陷胸丸

大黃 三錢 葶藶 一錢 杏仁 二錢 芒硝 二錢

先將大黃葶藶為細末後入芒硝杏仁或研

成膏入甘遂末人壯用一分弱者半分研勻

入白密丸如彈子大每服一丸用水一鍾煎

至六分服過一宿大便乃利如不利再服一

丸須連粗服之不可去粗也。

小陷胸湯

本方自有  
加減法

治小結胸按之則痛者。

黃連 上 半夏 下 瓜蒌實 中 生姜 下

發熱潮熱寒熱加柴胡 三錢 ○熱甚加黃芩 ○

口渴加天花粉乾葛去半夏乾嘔用陳皮胸



內悶加枳殼桔梗。○心下痛加枳實黃連。○

小便少加茯苓。○有痰加杏仁五味子。○心

中煩熱加山梔。○水姜煎服。

加味柴胡桂枝湯

治發熱微惡寒。肢節疼痛。微嘔。心下支滿。悶者。

柴胡<sup>上</sup> 黃芩<sup>中</sup> 半夏<sup>下</sup> 人參<sup>中</sup>

甘草<sup>下</sup> 桂枝<sup>中</sup> 枳實<sup>中</sup> 黃連<sup>上</sup>

加桔梗 瓜蒌仁 水姜煎服

柴胡桂枝湯

治傷寒五六日。或已發熱而復下之。後胸脇滿

微結。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。或往來寒熱

心煩者。此為未解也。

柴胡 黃芩 桂枝 乾姜

瓜蒌根 牡蠣粉 甘草 煎法如前

心下痞硬。加枳實。煎法如前。

柴胡枳桔湯

治發熱小結胸。脉弦數。口苦。心下硬痛。胸中滿

硬。或脇下滿硬。而發熱者。或日晡潮熱。或往來

寒熱或耳聾目眩或心煩而嘔或痰熱煩渴並治。

柴胡<sup>上</sup> 黃芩<sup>中</sup> 半夏<sup>中</sup> 甘艸<sup>下</sup>

枳殼<sup>中</sup> 枳實<sup>中</sup> 瓜蒌仁<sup>上</sup>

有痰加陳皮。○心下痞滿硬加枳實。○渴加

天花粉。○煩熱加黃連山梔。○水姜煎服。

枳實理中湯 本方自有加減法

治寒熱結胸心下滿悶按之痛者及胃口著寒

傷生冷者。

枳實<sup>中</sup> 乾姜<sup>中</sup> 人參<sup>中</sup> 白朮<sup>中</sup>

甘草<sup>下</sup>

加砂仁桔梗陳皮厚朴有寒甚加熟附。○生

姜冷飲食胃口著寒加草菓丁香。○有寒痰加

半夏。○水姜煎服仍用生姜二二三兩搗粗擦

胸中為要。

三物白散

治寒實結胸并水結姜粗擦胸中心上為妙。

桔梗<sup>二錢</sup> 貝母<sup>一錢</sup> 巴豆<sup>一錢</sup>

另研

右將二味為細末。入巴豆研勻。以白湯調下。壯人五分。弱人二分半。服下。病在膈上則吐。膈下則瀉。如服之不吐利。以熱稀粥一盞飲之。則吐利。如未動。宜再服三分。助其藥力。如吐利不止。進冷稀粥一盞止之。

茯苓半夏湯

治水結胸。但頭汗出。心下滿。揉之汨汨有聲者。是也。

茯苓 上

半夏 中

枳實 中

桔梗 下

厚朴 中

大腹皮 下

木通

蒼朮 上

陳皮 中

如小便不利。用五苓散利之。若水結大便實者。以大陷胸湯利之。風寒濕咳。南星於薑

加味二陳湯

治痰實結胸。喘咳。胸脇滿痛。作寒熱。脈洪滑。心煩口渴者。

茯苓 上

半夏 中

陳皮 下

枳實 中

甘草 下

桔梗 中

杏仁 中

貝母 下

瓜蒌仁中黃連中胸腹滿加砂仁去甘草○痰渴去半夏加知

母天花粉嗽加五味○喘加桑皮蘇子○脇

滿痛加青皮白芥子木香○有熱痰結加柴

芩竹瀝姜汁少許去半夏有寒痰結加乾姜

姜汁去貝母黃連○風痰結加南星竹瀝姜

汁○火痰加山梔黃芩竹瀝姜汁少許去半

夏其火痰即紅痰乃上焦火鬱而發也○水

姜煎服

大抵痰結症須用導痰以鵝毛桐油皂莢末

入喉中探吐痰出為愈設或咯吐不出身熱

喘急滿悶喉中漉漉有聲如水車響者此名

肺家獨喘難治也

大抵傷寒陽毒熱實大結胸藥下雖通其結

胸硬痛不軟喘急身熱而燥渴狂亂不安取

白頸活地龍四條水洗淨入砂盆內研如泥

加生姜汁二匙生薄荷搗汁二匙如無用乾

薄荷煎濃汁二匙亦可再入片腦一分牛黃

薄荷煎濃汁二匙亦可再入片腦一分牛黃

一分辰砂一分研勻。更用井泉水半盞調前  
汁徐徐灌下。令盡良久。漸覺寒戰後。穩睡一  
頓飯時。外用生姜粗搽法。當安睡有汗則愈。  
若服下一時不應。須再服。神效矣。

一切寒結。熱結。水結。食結。痞結。痰結。支結。大  
小結胸。痞氣結者。俱用生姜搗爛如泥。去汁  
取渣炒熱。絹包漸漸揉熨心胸脇下。其滿痛  
豁然自愈。如姜粗冷。再入姜汁。再炒再熨。揉  
之以愈爲效。惟熱結用冷姜粗。再入揉之。不  
可炒熱。醫當慎之。

又有傷寒衄血。將解未盡。或熱極吐血不盡。  
庸醫不知。遂用寒涼之劑。止住其衄血。留結  
于心胸之分。故滿痛而成血結胸也。用加味

犀角地黄湯。

加味犀角地黄湯。

治陽証將解。衄血不盡。或陽熱已深。吐血不盡。  
留在上焦爲痰血結胸。手不可近。但漱水不欲  
嚥。喜忘如狂。大便黑。小便自利是也。

犀角上 牡丹皮中 生地上 大黃中

赤芍中

水煎溫服。如血未下，加桃仁、紅花、枳實。婦人熱入血室，身涼胸脇滿，如結胸狀，譫語者，以小柴胡加生地、紅花，再刺期門穴，隨其實而瀉之。

辨傷寒心下痞例第四

痞者，太陽証。當服麻黃湯發汗，而候用承氣下之，而成痞滿。此因虛邪留滯，若欲下之，必待表症罷而後可。宜用柴胡、枳桔湯。如惡寒汗出痞滿者，附子瀉心湯。服後小便不利者，五苓散。表未解，心下滿悶者，名支結。柴胡桂枝湯。如熱甚而痞者，大黃黃連瀉心湯。如冷熱偏勝者，附子瀉心湯。寒多熱少者，半夏瀉心湯。要知瀉心非瀉心火之熱，乃瀉心下之痞滿也。謂氣鬱不通，泰故也。若下早而成者，則表邪乘虛內陷。

結於心胸間。但滿而不痛者為痞氣。若不因下早而為痞者。乃表邪傳至胸中。未入乎腑証。雖滿悶尚為在表。只用小柴胡枳桔湯。未效。只以小柴胡合小陷胸湯如神效。其痰結氣結水結食結。開各條不錄。

半夏瀉心湯

本方自有加減法

治傷寒候下。早遂為心下痞滿硬而不痛者。

半夏

中

黃芩

中

黃連

上

乾姜

中

太人參

中

甘草

下

若發熱潮熱。並加柴胡。渴加乾葛。半夏少

用。小便少加赤茯苓。嘔加陳皮。生姜。

心下滿加枳實。大便利加白朮茯苓。去枳實

黃芩。加白芍藥。水姜煎服。

甘草瀉心湯。煎麻黃散。黃芩。枳實。其原載而更

治傷寒下利日數行。穀不化。腹中雷鳴。心下硬

滿。乾嘔。心煩不得安。此非結熱。乃胃空虛寒氣

上逆。故使硬也。

灸甘州

下

乾姜

下

半夏

下

黃芩

中

黃連

下

人參

中

水姜棗煎服

大黃黃連瀉心湯

治傷寒心下痞。按之硬。關脈浮。內實熱盛。不大便者。對症與也。

中大黃 中黃連 中黃芩 中芍藥

治右用麻黃沸湯一鍾漬之。以物蓋定。須臾去

甘草相熱服。煎麻黃沸湯漬服者。取其氣薄而退

虛熱也。白芍藥。水姜煎服。

附子瀉心湯。味味實。大野味。味白。木。芥。芥。去。味。實。

治心下痞而復惡寒汗出者。對症與也。水姜煎服。

大黃 黃連 黃芩 附子

水一鍾煎半鍾。用百沸湯一鍾乘熱漬之一

時許。絞出。粗入附子溫服。對症與也。

五苓散 開別條

治心下痞滿。服瀉心湯痞不解。口渴煩燥。小便

不利者用之。對症與也。

十棗湯 味味末。以水一斗。煎取五升。分五服。每服一升。水一斗。煎取五升。分五服。每服一升。

治傷寒身熱汗出發作有時頭疼心下痞硬滿。

引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒。此表解裏未



和也。

芫花

五分

甘遂

一分

大戟

一分

右為細末。用大棗十枚。以水一鍾煎至半鍾。

去棗將湯調藥末。壯人五分。弱人二分半。如

欲大便利水。下勿服。以冷稀粥補之。

柴胡枳桔湯

大抵發熱胸中痞滿者。小柴胡加枳殼桔梗以

利之。若心下痞滿者。加枳實黃連以瀉之。心煩

胸滿有痰者。加瓜蒌橘紅以消之。

旋覆代赭湯。其寸血寒。其人脈利。宜皆不可用。

治心痞噎氣不除。開前條不錄。取也。為煎。咳不

治旋覆花。末代赭石。參。以甘草。合水

半裏

一

生薑

枳實

五

砂仁

桂枝人參湯。自寒也。

治脇熱下利。心下痞硬。表裏不解者。知不足息。

瓜蒂桂枝

上

甘草

下

白朮

中

人參

中

乾姜

中

大棗

十

水

凡治痞若脈浮緊。無汗惡寒者。此表未解也。

宜汗之。脉緩惡風有汗者。桂枝湯和之。待表解。方可攻裏也。○水姜煎服。

瓜蒂散

治寸口脉微浮。胸中痞硬。氣上衝咽喉。不得息者。此胸中有寒也。

瓜蒂

一錢半  
炒黃

赤小豆

一錢  
五分

二味研末。合和勻。每服一錢。以香豉一合水。煮一鍾。煎至七分。去粗調下藥。取吐為度。如不效。再服。其亡血家。并人弱脉虛者。不可用。

此

枳實理中湯

治中氣虛寒。不能運化。氣滯不通。或傷食不化。

痞滿者。開前條。

木香理中湯

治不因下。早而心下痞滿。按之軟。乃氣痞也。

陳皮

下 半夏

下 甘草

下 木香

下

白朮

中 砂仁

中 枳實

中 青皮

中

氣痞大便秘實。加枳榔。大黃。有煩熱。加姜炒。

黃連水姜煎服。

凡一切痞氣。卽用枳殼片入鹽炒。或麩皮炒。

熱用布包揉熨。軟快爲效。如不效。用炒姜粗

絹包熱熨。甚效甚速。

木香煎中湯。

蘇合香煎中湯。

治中湯。治寒不消。腹中脹滿。不食。身冷。不語。

麻黃湯中湯。

治中湯。治寒不消。腹中脹滿。不食。身冷。不語。

辨傷寒自利例第五

傷寒自利者。不因攻下而自瀉利。俗呼漏底傷寒。是

也。蓋下利者。有協熱協寒之別。要在明辨治之。夫傷

寒下利。多責於熱。熱邪傳裏。裏虛協熱。亦爲下利。雜

病下利。多責於寒。傷寒三陽下利。身熱。太陰下利。手

足溫。少陰厥陰下利。身涼無熱。此其大槩耳。要知瀉

青白爲寒。瀉黃赤黑爲熱。大抵瀉利。如小便清白。不

澁。大便青完。穀不變。有如鷺溏。或吐利腥穢。小便澄

清。口不燥渴。其脈沉細無力。或遲。或微。或伏。或身雖

發熱手足厥冷。或惡寒踈臥。皆屬寒也。若渴飲水漿。口中乾燥。小便或赤。或黃。或澁。或不利。大便利下之物。皆如垢膩之狀。其色或黃。或赤。或黑。去後皆熱臭。氣煖如湯。後重如滯。其脈多數。或浮有力。或瀉。或弦。或洪。或實。此皆屬熱也。亦有邪熱不殺物消化者。但脈數而身熱。口燥渴而小便赤黃。或澁。以此別之。夫寒因寒。中臟腑熱。因熱邪傳裏表。因胃受風邪。木來侮土。故令暴下。或溫。或攻。或固下焦。或利小便。隨証施治。但凡下利。切不可發汗。若汗之。使邪氣內攻。復泄其津液。胃氣轉虛。必成脹滿也。蓋先治利。利止內實。正氣得復。邪氣自解。則微汗出而愈。蓋下利爲內虛。若發其汗。則內外俱虛。變証出矣。若夫下利。譫語目直視者。不利厥逆。煩燥不眠者。下利發熱。厥逆自汗者。不利厥冷。無脈者。灸之不溫。脈不出者。下利一日十數行。脈反實者。下利脈弦。大熱不止者。五者之中。最急也。蓋五臟氣俱絕。利不止。六腑氣俱絕。手足寒。此誠言也。太陽與陽明合病。必自下利。葛根湯。其脈浮而長。太陽証候。下利遂不止。脈促者。表未解。

也。喘而汗出。葛根黃芩黃連湯。太陽與少陽合病。必自下利者。黃芩湯。其脈浮而弦。陽明與少陽合病。必自下利。其脈弦長而滑。乃有宿滯也。宜小承氣湯下之。太陽証未解而悞下之。遂協熱利。心下痞硬。表裏未解。入參桂枝湯。凡下利。煩熱而渴。小便不利者。五苓散。內熱心煩。加炒黃連。腹痛。加炒芍藥。陽明下利。心煩不得眠。小便不利者。猪苓湯下利。熱甚。飲水下重者。白頭翁湯下利。脈滑而數者。有宿食也。小承氣湯下利。譫語者。有燥屎也。小承氣湯下利。更心煩。心下滿而按之軟者。虛也。梔子豉湯。凡溼熱水瀉。注下。小便不利而口渴者。五苓散。加滑石。木通。車前。腹痛。加炒芍藥。凡內虛胃熱。煩渴瀉利。脈弱者。七味人參白朮散。若發熱者。用參胡三白湯。去黃芩。加炒黃連。凡下利。純清水。心下硬痛。口中燥渴。脈沉實有力者。急下之。大承氣湯。此利乃自飲湯藥而利。是傍流糞。水自有燥屎結實在內。非寒而利也。凡協熱則利。下赤黃。腸垢膩者。臍下必熱。黃芩湯。熱毒入胃。下利赤黃垢膩者。黃芩湯。協熱下利不止。三黃熟艾湯。已上

皆陽証之下利也。白通湯治之。太陰下利而不渴。脉沉者。理中湯。寒甚。脉細。加附子。若腹滿。小便不利者。五苓散。合理中湯。若嘔。加藿香。半夏。生姜。溼多而瀉不止者。倍加蒼白朮。如腹脹。加厚朴。腹痛。加炒芍藥。及肉桂。木香。以溫之也。少陰自利而渴。小便色白者。虛故引水自救。下虛有寒。故便色白也。附子湯治之。凡泄利下重。四逆者。四逆散。脉沉者。加附子。凡傷寒四五日。腹痛。小便不利。四肢沉重。疼痛。下利者。此有水也。真武湯治之。凡下利。脉微者。白通湯。若厥逆。乾嘔。煩燥。無脉者。白通湯。加豬膽汁。湯服後。脉暴出者。死。微續者。生。若下利。咽痛。胸滿。心煩者。猪膚湯。凡下利。清穀。裏寒。外熱。手足冷。脉微。欲絕。其人面赤。或咽痛者。通脉四逆湯。凡下利。惡寒。而踈臥。手足溫者。可治。逆冷。無脉者。不治。若下利止。而頭眩。時時自冒者。死。吐利。手足厥冷。煩燥。欲死者。吳茱萸湯。主之。○厥陰傷寒。先厥冷。發熱者。下利必自止。再厥者。必復利也。凡厥逆而利。當不能食。反能食者。爲除中。脉不出者。死。大汗出。熱不去。內拘急。四

肢冷又下利。厥逆惡寒者。茱萸四逆湯。大汗出。大下利。厥冷者。四逆湯。下利有微熱。脈弱者。令自愈。下利。脈數有微熱。汗出者。令自愈。設脈緊者。爲未解也。凡下利。脈沉弦者。下重也。脈大者。爲未止。脈弱者。爲欲愈也。雖發熱不死。下利。脈沉而遲。其人面少赤。身有微熱。下利清穀者。必鬱冒。汗出而解也。若微厥。面戴陽。利不止者。附子湯。凡下利。脈數而渴者。令自愈。設不愈者。必便清膿血。以有熱故也。凡下利。脈絕。手足厥冷。卒時。脈還。手足溫者。生。脈不還者。死。若傷寒。六七日。不利。便發熱而利。其人汗出不止者。死。蓋有陰無陽故也。凡發熱而手足厥冷。七日下利者。爲難治。傷寒下後。續得清穀下利。裏寒外熱。身疼痛者。當先救裏。四逆湯。清便自調。急當救表。桂枝湯。尺脈弦。腸鳴泄利。腹痛者。冷痛也。小建中湯。寒毒下利。面戴陽者。下虛也。四逆湯。胃寒下利。鴨溇色白。臍下必冷。腹脹滿。小便清白。四逆湯。寒毒入胃。下利。或如鴨溇色。理中湯。甚者加附子。凡傷寒。傷水。作利。脈浮。表未解者。仲景以小青龍湯去麻黃。加芫花。葢散表邪。兼治

水也。若小便不利，大便瀉，水作利者，五苓散甚不止。加芫花，蓋水去則利止也。凡傷寒，上二部脈皆平，心下硬而利者，腸胃有宿積也。大承氣湯下之，下利脈大者，虛也。以其強下之，故設若脈來浮，因爾腸鳴者，當歸四逆湯。下利瘥至期年，自復發者，以其病根不盡故也。宜下之。大承氣湯，陽明少陽合病，下利頭痛，胸滿乾嘔，往來寒熱，脈長大而弦，為負負者死。若長大不弦，為順。宜下之。下利嗽而嘔，煩不得眠，猪苓湯。凡傷寒下利，清穀者，即米穀未化，此胃虛內寒，口不渴，身不熱，蓋不變而下也。宜溫之，以四逆湯主治也。

葛根黃芩黃連湯

乾葛 黃芩

黃連

甘草

水煎服

黃芩湯

本方自有

黃芩

黃連

甘草

白芍藥

發熱加軟柴胡。瀉多加白朮。小便少加

茯苓。腹痛加炒芍藥。少用黃芩。嘔加半

夏。嘔而有痰聲加橘紅。



小柴胡湯

治發熱下利不止後有加減法黃芩○頭眩半

柴胡○甘草○白朮○黃芩○芍藥○

半夏○

腹痛去黃芩加炒芍藥○口乾加乾姜烏梅

○小便少加赤茯苓○大便利其小便不利

煩渴者加白朮茯苓猪苓澤瀉○熱甚加滑

石○惡熱甚煩渴者用炒黃芩炒芍藥

○下利口燥舌乾作渴或不渴者此因胃虛

不津液少也不可用天花粉蓋天花粉能利大

腸也但大便瀉利煩渴者只可加乾姜人參

大白朮茯苓麥門冬烏梅五味知母以和之也

即知母亦滑泄者宜酌用之

猪苓湯

治自利心煩不得眠小便不利者

白朮猪苓

澤瀉

滑石

茯苓

阿膠

水煎化溫服

防風芍藥湯

防風芍藥湯

治瀉身熱脉弦腹痛或頭疼自汗者。

防風<sup>上</sup> 白芍藥<sup>上</sup> 黃芩<sup>中</sup> 水煎服

白頭翁湯

治熱利下重者

白頭翁<sup>上</sup> 黃連<sup>中</sup> 黃栢<sup>中</sup> 秦皮<sup>下</sup>

水煎服

大承氣小承氣大柴胡皆主下利之藥也至若傷寒內實腹中有燥屎結滯則稀糞水從旁流下為利也故其脉來滑數有力或潮熱譫語乃

可下之再用以手按臍腹硬痛是也此通因通

用之藥

理中湯

人治協寒下利如鶩溏者或米穀不化手足寒脉

沉細或遲腹痛口不渴身不熱者用之脉虛人

弱加入參須倍虛泄瀉者倍加白朮內寒倍用

乾姜寒甚加附子腹痛去白朮加炒芍藥肉桂

佐之小水不利而瀉口渴者此水穀不分別也

宜五苓散合理中湯○若瀉利嘔逆或吐倍加

藿香葉陳皮半夏生姜和其胃氣○若氣不調

用木香嘔逆呃逆不止加丁香良姜若臟寒瀉

不止加肉蓯訶子菖菝甚不止加赤麻炒熟附

○若臍下悸腎氣動也去白朮加肉桂治奔豚

也○若臍下悸腎氣動也去白朮加肉桂治奔豚

人參白朮散除吐瀉霍亂米瀉不止手足寒利

聖治脾胃虛弱協寒下利或口乾發熱者

人參上白朮中茯苓中木香下

下葛根中藿香葉中炙甘草下白朮中

白朮水姜棗煎服

附子湯姜煎服

治少陰下利內虛脈沉者實

附子上茯苓中人參中白朮下

白芍藥下水姜煎服

真武湯姜煎服

治少陰下利腹痛小便不利脈沉內有水者

茯苓上白芍藥中白朮中附子下水姜煎服

水姜煎服○嗽加五味子細辛○若利不止

密炒粟穀。水燈心煎服。

三黃熟艾湯

黃芩

中

黃連

中

黃柏

上

熟艾

下

猪苓

澤瀉

芍藥

加蒼朮

水燈心烏梅煎服。

大黃芩海再一二煎服。

白朮煎服。○熟艾煎服。○白朮煎服。

大黃

芩

海

再

大黃

芩

海

再

煎

急辨傷寒便膿血例第六。○白朮煎服。

衝脉為血之海。即血室也。男女俱有此血氣。亦俱有

此衝脉。得熱血必妄行。在男子則下血。謔語。其邪熱

由陽明而傳。在婦人則寒熱似瘧。邪乃隨經而入。此

為熱入血室。迫血下行。則協熱而動也。挾血之脉。乍

澁乍數。或沉或伏。血熱交併。則脉洪盛。大抵男多于

左手。女多于右手。見之。又有陰寒為病。下利膿血者。

乃下焦虛寒。腸胃不固。清濁不分。而下利膿血也。一

為協熱。一為陰寒。臨症精別。古人謂血熱無寒。又云。

得熱則行。得冷則凝。皆大槩言之耳。大抵十分中有八九分屬熱。一二分屬寒。不可一例取之。陽症內熱。則下鮮紅之血。陰症內熱。則下紫黑成塊。或如豚肝狀。夫陽症則脈數。苦數而有力。為實熱。用苦寒之藥。若數而無力。為虛熱。不可用苦寒之藥。須補血藥。內少佐一二味寒藥可也。若陰症則脈遲。若遲而有力。為有神。可治。遲而無力。為無神。難治也。凡下利膿血。身熱脈大。為難治。身涼脈小。為易治。凡下血脈洪大。急硬不和者。死。脈雖大而和者。乃可治也。太陽之病。不解熱結胸臑。其人如狂。而血自下者。可用桂枝湯。若瘀血用桃仁承氣湯。陽明下血。譫語胸脇滿如結胸狀。夜則見鬼。此為熱入血室。小柴胡加生地丹皮。當歸血不止。加黃連地榆。有瘀血加紅花桃仁。少陰下利膿血。用桃花湯。腹滿或痛。身熱下利膿血。或如魚腦。或如爛肉汁。或如荳汁者。此溼氣毒氣入胃。並用桃花湯。黃連阿膠湯。選用下利無表裏症。脈數不解。消穀易饑。數日不大便。此有瘀血。輕則小柴胡加桃仁。大黃重則用桃仁承氣湯。下焦有瘀血如狂。或

喜忘小腹痛滿硬小水自利大便黑或身目黃桃仁承氣湯下之

黃連湯

本方自有加減法

治下血及便膿血

黃連

中

黃芩

中

黃柏

中

阿膠

下

常服血腹滿加炒山梔芍藥○下血不止加烏梅升

四物湯與四物湯合用○水煎服

治下血膿血

四物阿膠湯

本方自有加減法

川芎

中

當歸

中

芍藥

中

地黃

中

烏梅

下

井州

下

地榆

中

黃連

上

大黃阿膠

中

身熱加軟柴胡○中渴加乾葛○脉弱加人

參○胃弱加白朮○血不止加椿皮○膿血

不止加阿膠○水煎磨墨溫服

黃連阿膠湯

治濕熱下利膿血

鷄子黃連湯

本方自有  
加減法

黃連

上

芍藥

中

阿膠

加當歸

生地

白朮

黃連

黃連

人虛加人參。○身熱加軟柴胡。○身熱加烏梅乾葛。○血不止加地榆椿皮。○水煎服。

大黃酒

治下利便膿血。裏急後重。腹中痛。晝夜煩併不止。宜用川大黃五錢。將好酒一鍾浸一宿。次日溫飲之。

三黃補血湯

本方自有  
加減法

黃連

阿膠

加治脉數無力。血虛下血。

何當歸

上

川芎

中

芍藥

中

生地

中

熟地

中

升麻

下

柴胡

上

黃芪

中

地榆

中

升麻

下

加黃連

○

京墨

○

人弱加人參。○渴加烏梅乾葛。○膿血不止

加阿膠。○水煎服。

黃連胃虛湯

本方自有  
加減法

黃連

黃連

治下血人虛者

黃連

黃連

人參中 重白朮中 茯苓中 川芎中

黃連上 芍藥中 木香下 黃連上

官桂下 粟米下

膿多加阿膠。血多加地榆烏梅炒蒲黃。

血甚不止加烏梅椿皮京墨。有熱加柴胡。

水煎服。柴胡中 黃芩中

阿膠湯 治熱毒入胃下利便膿血。

三黃黃連上 山梔中 黃栢中 阿膠中

渴加烏梅。水煎服。甘草中

加減芍藥湯 治便膿血和血則便膿血自愈。調氣則後重自

當除。芍藥中 地黃中 當歸上 川芎下

木香下 黃連中 黃芩中 阿膠中

地榆中 甘草下

裏急後重加枳殼煨榔。發熱加軟柴胡升

麻。腹中痛熱甚者加酒浸大黃。渴加烏

麻。腹中痛熱甚者加酒浸大黃。渴加烏

麻。腹中痛熱甚者加酒浸大黃。渴加烏

麻。腹中痛熱甚者加酒浸大黃。渴加烏



梅○水煎服其苦味即去大黃○

桃花湯治少陰下利膿血○脉沉加赤石脂乾姜炒粳

米水煎服黃連○脉沉加赤石脂乾姜炒粳

水姜煎服黃連○脉沉加赤石脂乾姜炒粳

當歸附子湯治陰症下利膿血○脉沉加赤石脂乾姜炒粳

當歸附子湯

治陰症下利膿血○脉沉加赤石脂乾姜炒粳

附子中阿膠中地榆中芍藥中

辨乾姜中謹語烏梅七中赤石脂中甘草中

謹語者水姜煎磨墨調服精氣奪則虛故脉實則謹

語桂枝六合湯中實熱上乘於心心為熱入胃則神

思治陰症下血紫黑如豚肝唾中呢喃重則不垂

川芎中當歸中芍藥中熟地中

官桂上附子中水姜煎服

凡厥陰傷寒先發厥後熱不退者必便膿血

也脉數有力從陽症治脉沉無力從陰症治

凡陰症內寒下血必用乾姜炒半黑用之如

凡陰症內寒下血必用乾姜炒半黑用之如



且夫譫語蓋非一端。有潮熱自汗內實者。有腹滿喘急內實者。有舌乾口燥內實者。有下利純清水心下硬痛者。有三陽併病。有三陽合病者。有表虛裏實者。有熱入血室者。有汗多亡陽者。有大熱入胃。胃燥屎結實者。有過經不解。有下後驚惕。有火劫等証。有陽厥大便實。皆發譫語也。又有不可治者。直視下利。譫語者死。汗多亡陽。脉短。譫語者死。舌強舌硬。舌黑。譫語者死。與夫喘滿氣逆上奔。自利氣脫而下奪。俱死証也。若陽症譫語妄言。身當有熱。脉當洪大。而反手足厥冷。脉沉細而微者。不過一日死矣。若陽病內實者。其人日晡發潮熱。譫語。大便秘實。手足乍冷乍溫。面赤煩渴。手心腋下澀澀然。汗出其脉沉實。或滑數。揚手擲足。揭去衣被。大渴譫語者。但當大柴胡湯下之。若轉屎氣者。急用承氣湯下之。凡潮熱譫語未可下者。且與小柴胡減半夏枳實。若渴欲飲水。口乾舌燥者。人參白虎湯。若表裏大熱。煩渴譫語。脉洪數者。以小柴胡合白虎主之。若胃實大便結者。調胃承氣主之。腹滿譫語者。以手按之。病人腹中

硬痛。或喘滿燥渴。手不可近者。此乃燥屎內實。宜小  
 承氣湯下之。若腹滿按之軟者。或時滿時減者。為裏  
 虛不可下也。宜理中湯溫之。下利譫語者。脈若滑數。  
 有宿食也。用承氣下之。此燥屎結實心下。有硬痛燥  
 渴。此利乃稀水。或湯飲汁。傷流大腸而為利也。要在  
 脈滑數者。乃可下之。此通因通用。陽明併病譫語者。  
 與太陽病罷。但發熱。手足熱而汗出。大便難而譫語  
 者。下之。則愈。此陽明內實。故下之也。調胃承氣湯。陽  
 明合病譫語者。腹滿身重。難以轉側。口中不仁。面垢  
 遺尿。自汗。譫語者。白虎湯。○表虛裏實譫語者。傷寒  
 四五日。六七日。喘滿。脈沉為在裏。而反發其汗。津液越  
 出。大便難。譫語者。此表虛裏實也。宜調胃承氣湯下  
 之。若未可下者。人參白虎湯主之。○熱入血室。譫語  
 者。在男子。因邪熱傳入陽明病。則失血。譫語。在婦人  
 則寒熱似瘧邪。乃隨經而入。此為熱入血室。小柴胡  
 加生地。丹皮。當歸。主之。若血畜下焦。其人喜忘如狂。  
 小腹硬滿而痛。小便自利。大便黑。與夫下利無表裏。  
 症。脈數不解。消穀易飢。曾不大便。此為畜血。譫語。宜

全生集

卷之三

三

下血則愈。用桃仁承氣湯。○若男婦畜血上焦結胸硬痛燥渴。漱水不欲嚥。或身黃口出讒語。經云。挾血如見崇。用犀角地黃湯。重則桃仁承氣湯下之。○大抵當汗失汗。熱畜在裏。熱化爲血。其人喜忘如狂。血上逆則喜忘。血下畜則內爭。是必小腹痛。俱當下血爲愈。未可下者。人冬白朮湯。主之。○熱入血室。諸病得病無熱。但狂言煩燥不安。精采不與人相當。此太陽本病。邪結膀胱。其人如狂。與五苓散利之。加辰砂末。○亡陽譫語者。因發汗過多不止而爲亡陽。不可下。宜柴胡桂枝湯。和其榮衛。以通其津液。則愈。與夫溼溫風溫。重發其汗。亦爲亡陽。前湯主之。其亡陽譫語。脉短者。死。脉自和者。愈。○大熱入胃。譫語者。太陽病一二日。煩燥以火熨烘其背。而大汗出。此大熱入胃。胃中水竭。燥擾至十餘日。振慄自下利者。此爲難解。故其汗從腰以下不得出。欲小便不得而反嘔。又欲失溲。足下惡風。大便硬。小便當數而反不數。及多大便也。其頭卓然而痛。其人足下必熱。此穀氣下流故也。此症最難治。○過經譫語者。十三日不解。謂之

過經譫語。以有熱也。當下之宜從緩治。調胃承氣湯。元氣弱者。大柴胡湯。虛甚用蜜導法。○驚惕譫語者。傷寒八九日下之。胸當煩滿。小便不利。一身盡痛。不可轉側。柴胡加龍骨牡蠣湯。○火劫譫語者。因傷寒不得汗。以火劫取汗。因發譫語。用小柴胡加龍骨牡蠣湯。○錯語者。乃語意差錯。而胡說也。若自知覺者。邪之輕也。如差錯而自不知者。此邪熱甚。而正氣衰也。若錯語呻吟。乾嘔不得眠。黃連解毒湯。或發熱。或日晡潮熱往來。寒熱口苦。胸滿錯語者。小柴胡加黃連主之。不得眠。加山梔。若脈洪數。潮熱煩渴。心煩錯語者。人參白虎湯。若脈滑數。潮熱煩渴。口乾舌燥。大便不通。譫語者。大柴胡湯下之。凡脈弱人虛。精神不足。譫語者。竹葉石膏湯。虛甚譫語。柴胡三白湯。加黃連。麥門冬。五味子主之。

獨語者。傷寒十餘日。日晡發潮熱。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸床。而不安。微喘。直視。脈弦。小便利者。生。脈澁不利者。死。若病熱輕。其脈滑數。有力。大便不通。大柴胡下之。加芒硝。如未可下者。用小

柴胡合白虎湯加黃連芩桂主之。○狂言者謂邪熱亢盛發狂叫喊而言也。或棄衣而走登高而歌。此陽明內實也。宜大承氣湯下之。備詳發狂條下。傷寒痰結胸中難出。亦有煩燥亂語而言也。開後痰症類寒條下。

辨傷寒鄭聲例第八

鄭聲如鄭衛之音。轉不正也。蓋汗下後病人失本音。而正氣虛。則鄭重語散。不知高下。乃精氣奪之候。大抵鄭聲乃因汗下後。或自利。正氣內虛。將脫。或手足並冷。脉息沉細無力。口鼻氣息短少。語言輕微無力。接續出入之氣。且促。或短氣難以布息者。皆是元氣將脫。是鄭聲也。若昏沉上氣喘促。或發呃不止。不知人事者。死也。如氣息不促。手足頗溫。其脉沉細者。急以白虎湯加人參五味麥門冬。助其元氣。或濃煎獨

參湯徐徐呷之亦良法也。因參其五原起其病

本其病或必咳嗽息不至手足厥逆其病或脈者

脈弱或瀉氣也者皆宜參湯發其病不立不咳

對脈病人之原且也或脈弱以不息者皆宜參湯

並令其息或脈無七日鼻息息或少許言轉無此

病者宜參湯以因之不舒短自休五原內或脈短者宜

而五原或氣喘重或喘不咳高下不舒原者宜參湯

假氣或喘喘之者宜參湯不立也蓋其病不可參人失本皆

辨傷寒瀉藥與人

辨傷寒懊憹例第九

一、蓋半發不盡起則必

懊憹者鬱悶不舒之貌。蓋表症誤下。正氣內虛陽邪

內陷於心胸之間。重則為結胸也。邪在胸中則宜吐

熱結胃腑則宜下。凡傷寒汗吐下後。虛煩不眠。若劇

者必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯。若氣少加炙甘

草。若嘔者加生姜。凡發汗或下之。而煩熱胸中窒者。

梔子豉湯。凡傷寒五六日大下後。身熱不去。心下結

痛者。梔子豉湯。若下後心煩腹滿。臥起不安。梔子厚

朴湯。若傷寒醫以丸藥下之。身熱不去微煩者。梔子



乾姜湯。陽明病無汗。小便不利。心中懊懣者。必發黃。治在發黃條下。陽明病脉浮而長。口燥咽乾。腹滿發喘。身熱汗出不惡寒。反惡熱。身重者。下之。則胃中空。虛客氣動胸。心中懊懣。舌上胎者。梔子豉湯。又陽明下之。心中懊懣而煩。此胃中燥。屎內實。不大便。宜小承氣湯下之。若腹滿。大便初硬後溏者。不可下也。

內梔子豉湯。心間重。腹脹。欲吐。少腹內實。中脘宜吐。

與豉者。梔子不啻香豉。豉末。豉精。十五。厚肉。豉。豉。豉。

辨用。水先煎梔子。至一鍾半。後下豉。豉服必得。

辨吐。即止。不吐。宜再服。或以手指探吐。

夫梔子厚朴湯。熱不散。裏寒表虛。熱氣乘虛出于皮。

膚而為梔子。輕則厚朴。神重枳實。鈔紋。水姜煎服。候。

投梔子。乾姜湯。不汗。當下。不下。下後未解。皆能致此。

也。慎不梔子汗。重乾姜泄。更水姜煎服。然斑之纔萌。

與蚊跡若病。及平素有內寒。大便溏者。不用。手足陽。

脉洪大。病人昏憤。先紅後赤者。斑也。脉不洪大。病人。

。

。

。

喘身熱汗出不惡寒反惡熱身重者下之則胃中空

虛寒氣 哉諸人平素自內寒大便則斷者不眠又陽明

下之心 餅子 懷而 薄姜 胃中燥 水姜煎服 不大便宜小

承餅子 薄姜 胎 腹滿大便初硬後溏者不可下也

梔子 餅子 中 軍林 中 味實 下 木姜煎服

餅子 軍林 中 香豉

切服止下 坭宜再服 延以手背 雜以服必得

夫辨傷寒發斑例第十 夫熱則傷血 血熱不散 裏寒表虛 熱氣乘虛出于皮

膚而為斑也 輕則如疹子 重則如錦紋 或本屬陽候

投熱藥 或當汗不汗 當下不下 下後未解 皆能致此

也 慎不可發汗 重令開泄 更加斑爛也 然斑之纔萌

與蚊跡相類 發斑多見于胸腹 蚊跡只見于手足 陽

脈洪大 病人昏憤 先紅後赤者 斑也 脈不洪大 病人

自靜 先紅後黃者 蚊也 其或大便自利 怫鬱短氣 燥

屎不通 黑斑 如果實 醫者 此雖虛醫 復生 不能施其

全生集 卷之三 四

巧矣。凡汗下後不解。足冷耳聾。煩悶咳嘔。便是發斑之候也。其發黃者。其毒甚大。其自脈射。其毒亦甚。傷寒發斑者。蓋因汗下失當。熱毒蘊於胸中。乃發斑也。紅赤爲胃熱。紫色爲熱甚。紫黑爲胃爛。故赤斑五死。五生。黑斑十死。一生。大抵鮮紅起發。稀朗者吉。雖大亦不妨。但忌發如針頭稠密。成片紫赤者難治。雜黑爛斑者死也。凡斑既出。須得脈洪數有力。身溫足溫。易治。若脈沉小。足冷。元氣虛弱者難醫。凡斑欲出未出之際。且與升麻湯。先透其毒。若脈虛。加入人參。若食少大便不實。加白朮。若斑已出。不宜再發也。夫斑不可汗。汗之則增加斑爛。不宜下。下之則斑毒內陷。如脈洪數。熱盛煩渴者。人參化斑湯。若消斑毒。犀角玄參湯。及大青四物湯。如熱毒內盛。心煩不眠。錯語呻吟者。黃連解毒湯。加玄參升麻大青。熱甚煩渴。喘咳者。解毒合化斑湯。若斑勢稍退。內實不大便。謔語潮熱者。大柴胡加芒硝。甚者用調胃承氣湯。曾治一人傷寒八九日。發斑。四肢強硬。昏沉謔語。不知人事。大便四五日不通。以調胃承氣湯一下而愈。如未可

下有潮熱煩渴者宜以小柴胡去半夏加瓜蒌合解  
毒湯若解胃熱斑爛之毒必用黃連大青犀角玄參  
升麻石膏知母黃芩山梔黃柏之類要在察其病情  
合宜則用也。此湯去痰解熱散內實不大寒不  
時氣發斑者乃天行時疫之氣也。人感者則增寒壯  
熱身體拘急或嘔逆喘嗽或胸中煩悶燥熱起臥不  
安或頭疼鼻乾呻吟不得眠此斑候也。一切斑來勢  
急者發熱一二日便出斑來勢緩者發熱四五六日  
而出也。凡治斑必察病人元氣虛實脈來有力無力  
爲主若脈微弱元氣虛者以柴胡三白湯次察斑欲  
出未透者以升麻葛根湯如胃弱以四君子合升麻  
葛根各升君湯也。如斑不透加紅花若斑疹初出有  
表症增寒壯熱頭疼骨痛拘急胸滿者加味羌活散  
加紅花若發出斑而稠密或咽痛不利者犀角解毒  
飲玄參升麻湯凡斑出脈數煩渴潮熱不解者小柴  
胡隨症加減若斑出嘔逆用解毒湯加陳皮生姜山  
梔若喘嗽不止小柴胡加貝母瓜蒌知母石膏若咽  
痛用黃連解毒湯加連翹牛蒡黑玄參升麻桔梗甘

草若斑出毒盛黃連解毒湯加玄參大青犀角石膏  
知母宜忌避香臭。蓋恐觸其斑也。凡斑已出未出之  
時候不可急投寒涼之藥。并寒冷之物。恐傷胃寒。先  
將嘔吐。又不宜汗下。虛其表裏。若脈弱者必先因有  
房事。要在審問明白。如有夾寒者。必先助其元氣爲  
要也。○溫毒發斑。即時氣也。蓋冬時應天寒冷。而反  
大溫。人感不正之氣。而爲病也。治例與時氣同法。但  
溫毒尤盛。用玄參升麻湯。犀角大青湯。人參化斑湯。  
青黛一物湯。黃連解毒湯。選用。其溫熱二症發斑者。  
治與傷寒同法。此由怫鬱之極。自內而發於外。亦非  
輕也。○陽毒發斑者。其証狂言下利咽痛。斑如錦紋。  
用陽毒升麻湯。犀角玄參湯。黃連解毒湯。人參化斑  
湯。選用。備詳陽毒條下。○內傷寒發斑者。因暑月得  
之。先因傷暑。次食寒涼之物。并居涼處。內外皆寒。逼  
其暑火浮游於外。而發斑也。曾治一人病發寒熱間  
作。有斑三五點。鼻中微血出。兩手脈沉澀。皮膚按之  
殊無大熱。此內傷寒發斑也。用調中湯數服。而愈。若  
夾暑用香薷扁豆主之。○陰症發斑者。亦出胸背手

足但稀少而淡紅色也。此人元氣素虛，先因慾事內損腎經，或候服涼藥太過，遂成陰症。伏寒於下，逼其無根失守之火，聚於胸中。上熱薰肺，傳於皮膚而發斑點。但如蚊蚋蚤虱咬痕，然斑大紅點，俱以調中湯。溫胃加以茴香炒芍藥。寒熱脈微者，大建中湯則其陽回，陰火自降，其病乃愈。此治本不治標也。凡見斑不可專以斑治，須察其脈之浮沉，病之虛實，則為善治斑也。

升麻葛根湯，其由熱鬱之毒自內而發，然亦非

治斑欲出而未出者，此湯升發已見斑者不可

用。發斑毒來寒熱如麻，口苦即算，而高平壁

升麻中 葛根中 芍藥中 甘草下

脈弱加人參，再加紅花。○水煎服。

加味羌活散

治斑疹初出，增寒壯熱，頭疼體痛，胸滿不利者。

羌活上 獨活中 柴胡上 前胡中

人參中 枳殼中 桔梗中 人參中 茯苓中

川芎中 升麻中 芍藥中 甘草下

水姜煎服斑盛加黃連。

人參化斑湯

治斑

出熱

盛脉

洪數口渴謔語潮熱

知母

石膏

知母

甘草

味和粳米

水煎服加竹葉斑盛加大青

加味小柴胡湯

治發斑往來寒熱或潮熱口苦咽乾而渴耳聾

脇痛寒熱胸滿心煩而嘔喘嗽並宜服之

柴胡

人參

黃芩

半夏

甘草

黃連

升麻

芍藥

玄參

大青口乾去半夏加天花粉咽痛加桔梗荆芥

若嘔加陳皮生姜去甘草斑毒加犀角

大青胸中煩滿不利加瓜萋枳殼痰火

上喘加知母瓜萋桑皮喘渴脉數大加石

膏胸脇滿痛加枳殼桔梗心下痞硬加

枳實黃連水姜煎服

消毒犀角飲

治發斑癰疹。咽喉腫痛。毒氣擁盛者。

犀角上 牛蒡子中 荆芥上 防風中

甘草下 桔梗下 薄荷上

斑盛加大青。○內熱用芩連。○水煎服。

大青升麻湯

大青 升麻 山梔 黃連

水煎服

犀角玄參湯

治發斑毒盛。心煩狂亂。咽痛者。

犀角上 升麻中 香附中 黃芩中

通玄參中 玄參中 甘草中

水煎加大青服。

玄參升麻湯治症 本方加大青

黃芩上 升麻中 乾草下 水煎服

梔子杏仁湯 水煎服

治傷寒壯熱疼痛。內外皆熱。發斑譫語發狂。

山梔上 升麻下 黃芩中 芍藥中



石膏

中

知母

中

杏仁

下

柴胡

上

甘草

下

豈豉

內

水煎服

煎

水煎服

煎

黃連一物湯

水煎服

黃連解毒湯

黃連

黃芩

山梔

玄已開前條不錄本方加大青

加減三黃石膏湯

治熱症發斑紫赤煩渴脉洪數者

黃芩

黃連

黃柏

山梔

石膏

知母

升麻

芍藥

玄參

甘草

粳米

甚者加犀角。斑毒盛加大青

通脉四逆湯

治陰症發狂身冷無脉斑黑昏沉者用之

乾姜

附子

人參

甘草

大蜜水姜煎入童便猪膽汁如煩燥冷服

調中湯

白朮

芍藥

黃連

治陰症發狂

川芎

黃芩

黃連

蒼朮

砂仁

芍藥

藿香

甘草下 桔梗下 半夏下 陳皮中

枳殼中 川芎中 羌活上 麻黃上

桂枝中 白芷中 木姜煎服

大建中湯煎人童身發熱六咳熱全服

當歸上 芍藥中 白朮上 麥冬中

黃芪中 甘草下 肉桂下 茯苓中

人參中 川芎中 附子中 半夏中

熟地中 茯苓中 水姜煎服

人參三白湯 開前條不錄

青黛一物湯 凉水調服

苦酒雞子湯 治熱毒發斑咽痛聲音不出心煩不眠

治熱毒發斑咽痛聲音不出心煩不眠

大猪胆半酒盞 米醋一盞 雞子黃一個

面右三味同煎至八分則四次服汗出乃愈

傷寒黑斑曾治一人傷寒七八日因服涼藥過

多遂遍身手足冷厥逆遍身黑斑惟心頭温煖

乃伏火也診其六脉沉細昏沉不知人事不能

言狀如屍遂用人參三白湯加熱附乾姜服下

一。時斑色漸紅。手足漸溫。煖。然後甦醒。復有餘熱不除。此伏火。緩作。以黃連解毒湯。加竹葉石膏調服。則愈。又。令。調。並。盛。其。黑。斑。其。心。煎。成。對。大。抵。一。切。發。斑。疹。先。將。紅。紙。撚。油。燈。照。看。病。人。面。部。胸。堂。背。心。四。肢。有。紅。點。起。者。乃。發。斑。也。若。大。紅。點。發。於。皮。膚。之。上。謂。之。斑。小。紅。點。行。於。皮。膚。之。中。不。出。起。者。謂。之。疹。蓋。疹。輕。而。斑。重。也。先。苦。將。姜。汁。噴。於。斑。上。已。發。後。照。輕。重。陰。陽。寒。熱。虛。實。而。用。藥。京。本。隨。用。

辨傷寒發黃例第十一

發黃。溼熱交併。民多病瘴。瘴者。單陽而無陰也。太陰脾土溼熱所蒸。色見於外。必發身黃。濕氣勝。則如薰黃。而晦。熱氣勝。則如橘黃。而明。傷寒至發黃。熱勢已極。且與畜血症大抵相類。但小便不利為黃。小便自利為畜血。又有內傷陰症。亦有發黃者。須當明辨之。不可混作濕熱。而治一切發黃。設或寸口無脈。鼻中冷氣。與夫形如烟煤。搖頭直視。環口黧黑。舉身發黃。此皆真臟絕也。瘀熱在裏。但頭汗出。到頸而還。身無

汗渴飲水漿。小便不利。此爲痰熱在裏。因汗不越。必發黃。其色如橘子色之黃明也。大便不通者。茵陳湯。小便不利者。茵陳五苓散。○濕熱發黃。一身盡痛。發熱口渴。小便不利。色如熏黃。暗而不明也。用茵陳五苓散。大便實者。茵陳湯。寒溼發黃者。病人身疼。發熱而黃。頭疼鼻塞而煩。其脈大。自能飲食。腹中和無病。病在頭中寒濕。用瓜蒂散。搐鼻中。取黃水出。則愈。或用神朮湯。加麻黃茵陳。微汗之。溼家發黃。一身盡痛。不能轉側。身熱。色如薰黃。小便不利。茵陳五苓散。小便自利。朮附湯。身煩疼。麻黃湯。加蒼朮。○痞氣發黃。病人心中滿硬。按之。不痛者。是也。宜半夏瀉心湯。加茵陳。枳實。小便不利。宜茵陳五苓散。加山梔。蓋痞消。則黃自退也。○結胸發黃。病人心胸滿硬。按之痛。或手不可近。大陷胸湯。加茵陳。蓋結去。則黃自退也。○畜血發黃者。其人身黃。脈沉結。小腹滿硬。小便自利。大便黑色。其人如狂。此爲畜血在下焦。用桃仁承氣湯下之。蓋血下。則黃退也。○內傷寒發黃者。其人脾胃素虛。或食寒涼。生冷。

之物。或傷食結搏。停滯不散。中州變寒。而發黃也。或嘔吐。或腹滿。或腹痛。或自利。小便短少者。宜調中湯加茵陳。或理中湯加枳實。茵陳。青皮。陳皮。草果。逆冷。脈沉。加附子。溫之而愈也。○陰症發黃者。其人兩手脈沉。細遲。肢體逆冷。肉上粟起。或氣促。嘔悶。舌上白胎。而滑。遍身發黃。或時煩燥。面赤。或時欲投泥水中。或欲坐井中者。此陰黃也。輕用理中。加茵陳。重用四逆湯。加茵陳。○凡治陰黃。須用熱湯溫之。或以湯盛盆中。將病人坐於上。以布蘸熱水搭其黃上。乃愈。○凡發黃如合麩。相似。淫熱瘀血。血証發黃者。則多有之。其內傷寒發黃。陰証發黃者。則間或有之也。經云。脈沉渴欲飲水者。必發黃。陽明病無汗。而小便不利。心中懊惱者。必發黃。○又被火劫。額上微汗出。小便不利。心中懊惱者。必發黃。○大抵身熱煩渴無汗。小便不利者。必發黃也。

茵陳湯黃面日悉黃。咳金小野。數少。諸藥不效。

茵陳上 梔子中 大黃下

水燈心煎服。○若小便利。如皂角針。灰汁色。

狀則黃從小便出也。野麻收身黃如金色。

梔子升麻湯  
梔子 升麻 大黃

治發黃面目悉黃如金小便濃汁少諸藥不効

不味者必發黃也

除中茵陳上山梔中大黃中梔子中大黃中小頭

中頭柴胡上升麻下龍胆下梔子下出小便不

或出大人弱大便實去大黃加木通猪苓中水燈心

其內葛煎服黃白並發黃飲限開如赤之也發云和

發龍膽湯中野麻中熱血血痛發黃飲限多赤之

治傷寒時氣瘀血發黃

草龍膽上生犀角中升麻下茵陳下

加山梔木通黃連中水燈心煎服中大便實

者加大黃中茵陳中草中犀角中升麻下

得効方中發黃并發斑散初起者宜服之

茵治發黃身目悉黃如金色小便如濃者煮栝汁諸

藥不効者中草中水燈心煎服

茵陳中黃連中山梔中大黃中梔子中

黃精 柴胡 甘草 龍胆

升麻 木通 滑石

大便實。加大黃。○虛弱。加人參。○目睛黃倍

藥。加龍胆草。○水燈心煎服。

茵陳犀角湯。日悉黃。咳金。小便數。咳。黃。赤。淋。者。煎

替治時氣發黃。并發斑者。

茵陳上黃龍胆草中犀角 升麻下

山梔上黃連上木通中黃柏中

共搗為細末。每服二錢。真牛乳一鍾。水一鍾

煎。

茵陳五苓散

治溼熱發黃。渴飲水漿。小便不利者。

茵陳中白朮中茯苓中猪苓中

澤瀉中官桂下

小便赤澁。加木通。黃柏。山梔。滑石。去桂。○身

熱。加柴芩。去桂。○目睛如金。加龍胆草。黃連。

去桂。○渴。加天花粉。去桂。○水煎服。

六方

煩渴不寧。心燥發黃。小便不利者。以辰砂益元

散調茵陳五苓散二三錢乃効

瓜蒂散

治寒濕發黃。瓜蒂、天芩、佩蘭、去林。○水煎服。

瓜蒂五分、母丁香五分、黍米三分、赤荳三分

右為細末。於鼻中搐之。口噙水。鼻中黃水出。

乃愈。

茵陳四逆湯

治陰黃。脉沉遲厥冷。腰以下自汗。

茵陳上、附子上、乾姜中

虛弱加人參。○水煎服。

茵陳茱萸湯

治陰黃。腹痛。或脉伏不出。

吳茱萸上、當歸中、附子下、木通下

乾姜中、茵陳上、人參中、水燈心煎服。

茵陳理中湯

治陰黃。腹痛。或自利者。及內傷寒發黃者。

茵陳上、白朮中、乾姜下、人參下

小便不利。合五苓散。○脉沉足冷。加附子下。



○內傷生冷之物發黃者本湯去人參加枳實青皮陳皮草菓木香砂仁○水姜煎服

擦黃法黃煎熟去其苦味又內新寒發黃者

用茵陳一把姜半片搗爛絲裹週身擦之最効

此為良法

吳茱萸 薑 附子 木香 砂仁

茵陳 黃芩 芍藥 枳實 木香 砂仁

茵陳 黃芩 芍藥

茵陳 黃芩 芍藥 枳實 木香 砂仁

辨傷寒發狂例第十二 辨傷寒發狂例第十二

傷寒發狂最為惡候其例多般要在明辨治之陽盛

發狂者陽盛則四肢實實則登高而歌也此傷寒熱

毒入胃併入於心遂使神不寧而志不定始得少臥

不安妄語悲歎甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋

罵詈叫喊不避親疎大渴欲飲獨陽亢盛重陽者狂

此神明之亂皆非素所能為乃病之使然也一切發

狂奔走勢不可遏者須於病人處生火一盆用醋一

碗傾於火上其煙衝入病人鼻內仍將姜汁噴於病

人頭面身體手足即安方可察其陽狂陰燥用藥若病初起頭疼發熱惡寒體痛表症皆除已後熱邪傳裏大渴飲水目赤唇焦舌乾齒燥狂妄不寧脉來洪數有力大便實者急宜大承氣下之不大下之何能止也如熱勢輕未可大下者宜加減三黃石膏湯治之但見舌卷囊縮難治間有可生亦宜急下不可緩也與陰症囊縮者決不祥矣若發狂直視便溺自遺與夫汗後大熱脉躁疾狂言不能食或也陽明經病欲作汗而狂者病人欲食小便反不利大便自調骨節痛翕然如有熱狀奄然發狂澀然汗出而解此水不勝土穀氣與汗共併故發狂脉緊者則汗出而愈也○若畜血發狂者傷寒六七日或八九日其人發狂脉沉數乃熱在下焦小腹硬滿而痛或身黃小便自利以其有畜血也宜桃仁承氣湯下盡黑物則愈熱輕者喜忘如狂脉微身黃唇痿舌青口燥或但漱水而不欲嚥者又無寒熱小便自利大便黑色此亦畜血証也輕用犀角地黃湯甚者桃仁承氣湯下血則愈○若太陽不解熱結膀胱其人如狂而血自下

者愈。若外不解與桂枝湯外已解內不消但小腹急結。或硬痛滿。小水自利。大便黑。亦畜血証也。桃仁承氣湯。此三者雖如狂。未至于狂也。○驚狂者。傷寒脈浮無汗。醫以火逼取汗。必驚狂。臥起不安。宜桂枝救逆湯。調辰砂末。溫病發狂者。乃冬月伏寒所化。至春時因溫氣而發也。表症在者。芎蘇散合羌活沖和湯。加柴葛。若半表半裏者。小柴胡湯。若脈大胸滿多痰。發狂者。小柴胡加枳桔瓜蒌山梔升麻吐之。若脈浮數壯熱而不得汗出者。宜六神通解散汗之。若表裏俱實熱盛者。宜三黃石膏湯主之。○若邪熱傳裏燥渴譫妄。大便秘實者。當用大承氣湯下之。○若熱病發狂者。乃冬月伏寒所化。至夏月因炎暑而發。其熱勢比之溫病尤加盛也。○若發衣。用神木湯加芎蘇。○若發狂無汗。脈數大者。六神通解散汗之。熱甚者。三黃石膏湯主之。裏熱燥渴譫妄。大便實。脈洪實者。大承氣下之。

一切熱病發狂。切不可掩閉床帳。務用揭開放入爽氣。良久隨用銅鏡按在心胸間。熱勢稍退。即除。若傷

寒溫熱勢太盛發狂燥渴不止者將硝一斤研細用水一盆用青布方圓一尺許三五塊浸於硝水中微攪半乾搭在病人胸膛并後心上頻易冷者搭之如得睡汗乃愈如熱極盛此法不能解當用解結湯開在結胸條下服後作寒戰汗出乃愈○若熱極舌出不收者用麻黃湯洗淨將冰片牛黃麝香研末點舌上即收此爲良法時行發狂者與此同治法大抵傷寒溫熱病及時行發狂者○若得汗出者生不得汗出者死○若脈小逆冷者難治正謂溫熱時氣不得汗出則發狂也要在察而治之○陽毒發狂者其人素有積熱於內因患傷寒又失汗下乃熱溫爲病六脈洪大而數其症舌卷目赤唇黑鼻如烟煤或面赤咽痛狂言下利赤黃大渴欲死或發斑黃頭面胸背狀如錦紋或如碗蓋之類而發狂者七日內可治七日外則難治也宜陽毒升麻湯甚者三黃石膏湯大抵與陽盛發狂治例相同因有發斑咽痛故曰毒也○陽厥怒病發狂者因陽氣暴折而難決故善怒也病名陽厥蓋陽暴折鬱而多怒則發狂也治以鐵落

飲者以金制木之法也。取鐵性沉重之義，最能墜熱開結。倍以平肝降火之劑。若兼痰火內盛而狂者，宜入竹瀝姜汁，加芩連降之。調辰砂末。○又有陰症發燥，如發狂狀，實非狂也。其病初起，無頭疼，不煩燥悶。蓋陰極發燥，欲坐臥於泥水井中者，或欲陰涼處坐。燥亂不安者，皆如狂也。但手足逆冷，脈沉細，雖煩渴不能飲水者是也。用霹靂散溫之，宜冷服。甚則身寒微熱，面赤戴陽，足冷煩燥不安，脈數大無力，乃裏寒下虛。此虛陽伏陰而燥，宜入參四逆湯冷服。但見厥

冷下利，煩燥不眠，脈不出者，難治。庸醫不治陰症，似陽又不詳陰脈。虛陽上隔而燥，見其面赤身熱而誤作陽狂。實熱反與涼藥，則反成大害矣。用涼水半盞試之，入口即吐出而不納者是也。蓋水性則寒，故知陰極而燥也。須詳脈有力無力，此為定法。

陽毒升麻湯

治發斑狂言下利吐膿血咽喉

- 犀角 中
- 升麻 中
- 射干 中
- 桔梗 上

甘艸 下

斑毒盛加大青黃連。○水煎服

升麻湯

治傷寒傳變不解變成陽毒。身重腰背痛。煩悶

燥渴不安。狂言亂走。目赤唇焦。鼻黑如見鬼狀。

或吐血下利而脈洪數。面赤斑如錦紋。咽喉痛。

吐膿血六日可治。七日則不可治也。

升麻上 甘草下 當歸中 川椒下

雄黃中 山梔中

水煎溫服。如人行五里。再服取汗。蓋汗出則

毒出也。

升麻六物湯

治陰毒發狂而喘。

升麻中

大青上

梔子上

杏仁中

黃芩中

葱白

水煎服

加味升麻湯

治熱病發狂。不得汗出。心煩不眠者。

升麻下

蒼朮中

麥冬中

麻黃中

黃芩上

大青上

石膏上

淡竹葉十三片

水煎温服取汗。

梔子升麻湯

治陽毒發斑狂。温熱病發狂。用此藥探吐。

升麻

中

柴胡

上

梔子

上

生地

中

水煎服

玄參升麻湯

治發斑狂言咽痛。

升麻

下

玄參

上

甘草

下

桔梗

中

加犀角黃連。名犀角玄參湯。○水煎服

梔子仁湯

治陽毒發斑狂。煩燥面赤咽痛者。

梔子

上

赤芍

中

大青

上

升麻

下

黃芩

石膏

上

杏仁

中

柴胡

上

甘草

下

豈豉

知母

水煎服

三黃石膏湯

治傷寒陽毒温熱病發狂。不得汗熱甚者。

黃連

上

黃芩

中

黃柏

中

山梔

石膏

上

知母

下

麻黃

中

甘艸

下

荳豉

中

升麻

下

加乾姜與芍藥名加減三黃石膏湯。○水姜

一片。加葱煎服取汗出愈心煩加辰砂。

猪苓散吐法

治温病身不熱煩渴發狂小便不利者

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠

各一

前若為末白湯調服仍以涼水一鍾飲之以鵝

餅于翎探吐。

### 奪命丹

治傷寒熱結胸中口噤不能言陽毒狂言不得

汗及温熱時行病不得汗醫不治遂謂死人精

魂已竭宜此湯救之。

釜底墨

一兩

竈突墨

一兩

梁上倒掛塵

一兩

牛黃

一錢五分

黃芩

一兩

麻黃

一兩

小麥奴

一兩

加辰砂

二錢

黃連

一兩五錢

雄黃

三錢

真珠

一錢

寒水石

一兩

各為細末煉蜜為丸如彈子大以新汲水一



蓋研一九於水中。令化盡服之。若病人渴欲  
 飲水者。與之多飲為妙。不欲飲水者。亦宜強  
 與之。須臾當發寒汗。出乃解。若服下一時許  
 不作汗。宜再服一鍾。以汗出為止。  
 凡小柴胡大承氣調胃承氣白虎湯或小柴  
 胡合白虎。或白虎合黃連解毒。或三黃石膏  
 湯。皆可選用。此俱是發狂宜用之方也。

辨傷寒心下滿例第十三

心下滿者。正在心之下。胃之上。此自滿也。非下之而  
 滿也。若因下早而致滿者。此為痞氣也。別有治條。凡  
 心下滿。以手按之。則散而軟者。此虛氣也。如不發熱  
 者。以木香和中湯主之。○若發熱者。以小柴胡加枳  
 實姜炒黃連。去黃芩治之。○若按之汨汨有聲而軟  
 者。此停水也。用小半夏湯合減桂五苓散治之。○若  
 按之硬痛者。有宿食也。輕則消導。重則用承氣下之。  
 其少陽症。寒熱嘔而口苦。脇痛脈弦。心下滿者。若未

曾下。乃表邪傳至胸中。未入乎腑。証雖滿悶。尚爲在表。正屬少陽部分。只用小柴胡。加枳梗以治其悶。如未効。仍以小柴胡合小陷胸湯。一服豁然神効。世俗皆所未知也。○若寒在胸中。心下滿而煩。飢不能食。宜瓜蒂散吐之。陽明病。心下硬滿者。不可下。下之則利。利不止者死。又脉浮大有力。心下滿硬。有熱燥渴。譫語大便實者。此屬臍病。宜攻之。按此言屬臍者。宿屎在臍也。故可下。若食在胃口。未入於胃。亦未可下也。備詳食積類傷寒條下。○大抵腹中滿。心下滿。胸中滿。俱不可用甘草糖棗甘甜之物。蓋甘能補氣填實。故也。外用前擦法甚良。

辨傷寒咳嗽例第十四

咳者俗呼爲嗽。肺爲邪干。氣逆不下。有肺寒而咳。有停飲而咳。有邪在半表半裏而咳。治各不同。凡表寒咳者。脈浮緊。惡寒身痛拘急無汗。用麻黃湯三物湯。汗之。痰吐如膠者。金沸草散主之。○若有熱者。參蘇飲去半夏木香。加桑皮杏仁麻黃汗之。察時令用藥。若表寒未解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。小青龍湯主之。若虛人感冒風寒而咳。或惡風頭疼乾嘔。宜人參杏仁湯主之。凡傷寒三四日傳少陽經。脈弦口苦。

發熱惡寒而咳者。小柴胡去參加五味乾姜少許。麥冬知母貝母。若發熱胸中滿而咳者。加瓜蒌黃連。若渴加天花粉去半夏。若胸脇滿發熱而咳者。加枳殼桔梗。凡少陰病脉沉四肢逆冷而咳者。四逆散加乾姜細辛五味。若少陰病四肢沉重痛而自利而咳者。此裏有水也。真武湯主之。凡太陽病若身熱咳嗽乾嘔微喘而利惡寒腹痛。小青龍湯主之。若身涼咳嗽乾嘔微利心下滿脇下痛。十棗湯主之。按小青龍湯治太陽表寒停水也。十棗湯治太陽裏寒停水也。真武湯治少陰裏寒停水也。各有加減法。凡陰症手足逆冷。脉沉而咳者。四逆湯加五味主之。大抵傷寒咳嗽不與雜病同也。按仲景治法有嗽者。不分陰陽二症。俱用五味乾姜。病初起。卒難便用五味。恐其酸收。閉住邪氣故也。然後用五味者。蓋收肺氣保肺金。而止嗽以乾姜之辛。溫肺金而散逆氣。辛先入肺矣。用者詳之。

人參杏仁湯

人參中

半夏下

茯苓中

細辛下

乾姜

中

甘草

下

桂枝

中

芍藥

中

五味

中

杏仁

中

水姜煎服。○按此即小青龍加人參杏仁也。

五三物湯

生甘草

下

麻黃

上

杏仁

中

水姜煎服。

辨傷寒喘例第十五

喘者在邪在表而喘。有邪在裏而喘。有水飲而喘。在

表者心腹滿而不堅。脉浮緊。惡寒。身痛。無汗而喘。宜

麻黃湯汗之。若表有風邪發喘。脉浮緩。有汗。宜桂枝

湯。更加厚朴杏仁主之。經云喘而汗出。宜和之。汗不

出而喘。宜發之。凡汗後飲水者。水停心下。有水氣。乾

嘔發熱而喘。或咳者。小青龍湯主之。凡發汗後汗出

而喘。無大熱者。麻黃杏仁甘草石膏湯主之。凡太陽

病。誤下之。利不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。葛

根黃芩黃連湯主之。凡陽明病。內實不大便。潮熱腹  
堅滿。自汗。燥渴而喘者。大柴胡加厚朴杏仁主之。甚  
者用承氣湯下之。凡太陽與陽明合病。喘而胸滿者。  
不可下。宜麻黃湯主之。凡陰症厥逆。脈沉細。氣短促。  
喘而無汗者可治。宜四逆湯加五味杏仁主之。若冷  
汗自出如油。或汗出髮潤。或額汗出如珠不流。喘而  
不休者。皆死症也。凡虛人脈伏。若手足厥冷而喘者。  
五味湯主之。凡暴感風寒。脈浮緊。無汗而喘者。蘇陳  
九寶湯主之。凡熱盛有痰。脈弦數而喘者。不可汗下。  
用小柴胡知母瓜蒌貝母桔梗陳皮和之。胸脇滿。加  
枳殼桔梗青皮。去甘草。心下滿。加枳實黃連。去甘草。  
舌燥飲水而喘者。加石膏知母天花粉。去半夏。然雖  
發喘。病之常也。其或直視譫語。或目上視。或目斜視。  
汗出喘滿者。俱不治也。

麻黃石膏湯

麻黃

上

石膏

上

杏仁

中

甘草

同

水姜煎服。秘方用加細茶桑皮。名五虎湯。  
定痰喘如神甚効。又名萬應化痰湯。此乃劫

劑不宜久服。凡虛人自汗盜汗者皆不宜也。

葛根黃芩湯

葛根上

黃芩中

黃連中

加甘草

麻黃水煎服

五味湯

治喘而脈伏者

百藥大人參上

五味膏

麥冬中

杏仁中

陳皮中

薑下

棗三枚

黃連中

水姜煎磨沉香温服

加減五味湯

治喘而氣促者

橘紅

桔梗

紫蘇

五味中

人參上

麥冬中

杏仁下

煎桑皮中

水姜煎磨沉香服

蘇陳九寶湯

桑皮中

甘草下

茯苓中

官桂中

麻黃中

薄荷上

陳皮中

蘇葉中

杏仁中

烏梅

生薑

水姜葱白煎服。

生姜

加減瀉白散

黃芩

刺芩

瀉葉

治煩熱胸膈不利。上氣喘促。口燥或咳者。

桑皮

知母

橘紅

黃芩

貝母肺 栝梗中

甘草

瓜萇

地骨皮

中 加蘇子

中 杏水煎服

桑皮

諸喘為惡候。故非輕也。盛則為喘者。蓋非肺氣

盛也。乃肺中邪火盛也。所以瀉白者。瀉肺中之

火也。非瀉肺也。又如瀉心湯。非瀉心也。乃瀉心

下之痞滿也。凡看文字有餘。當認作不足者。蓋

受病為不足。氣為有餘也。



受風寒者不可飲水也  
下之則愈也其言又云不可飲水也

曰本辨傷寒心下悸例第十六

悸者怔忡也。心中築築然動氣而不安也。其証有二  
焉。一者氣虛。一者停飲。其氣虛者。陽氣內弱。心中虛  
空而悸。又汗下後。正氣內虛。亦令人悸。與氣虛而悸  
則又甚矣。治法皆須實其浮氣也。其停飲者。因飲水  
過多。停滿心下。心火惡水。不能自安。而為悸也。治法  
須分水氣。雖有餘邪。必先治悸。與水。免使水氣散之  
而成他証也。故經有云。傷寒二三日。心中悸而煩者。  
小建中湯。少陰病。四肢逆冷。而心中悸者。四逆散加

茯苓桂主之。凡飲水過多而悸者。宜茯苓甘草汁合五苓散分利之。太陽發汗過多。其人兩手自冒。心下悸。欲得按者。宜桂枝甘草湯。凡厥而心下悸者。此有水氣。當先治水。茯苓甘草湯。不然水入胸中。必作利也。凡汗下後。內虛而悸者。小建中湯。合人參三白湯主之。若脉沉細者。真武湯主之。經云。先煩後悸。為熱。竹葉石膏湯。加參。先悸後煩者。為虛。宜小建中湯。若太陽病。小便利者。以飲水多。故心下悸。茯苓桂枝白朮甘草湯。小便少者。必裏急。猪苓湯。陽明病。壯熱

往來。心下悸。小便不利。心煩喜嘔。小柴胡加葛根茯苓。令太陽汗後。臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝白朮甘草湯。太陽汗不解。仍發熱。心下悸。頭眩。肌體瞶動。振振欲擗地者。真武湯。少陽耳聾目赤。胸滿而煩。妄加吐利。則悸而驚。與小建中湯。有熱。小柴胡湯。主治也。

小建中湯 本方自有加減法

治三日心中悸者。不與以丸。重立芍藥。○

桂枝 上 甘草 下 芍藥 中 膠飴 中

水姜棗煎服。○陽虛自汗。加黃芪。名黃芪建

中湯。○脉沉足冷。加附子。名附子建中湯。○  
若血虛腹痛。加當歸。名當歸建中湯。夫建中者。  
立也。盖因中氣不足。以此重立之也。○嘔吐  
者不可用此湯。盖甘能發嘔。○吐衄者不可  
用此湯。盖因重得甘則逆上。○中滿不可用  
此湯。盖因甘能補氣填實故也。

桂枝甘草湯。○夫汗多則心虛。欲得乎

汗者。將水以物揚之。千數遍。至水上有珠者是

也。取其揚之無力。不助腎邪而尅心火也。

桂苓甘草湯

治水停心下而悸者。

桂枝中 茯苓上 甘草下 水煎服

辨傷寒身振例第十七

振者身振振而動搖也。蓋汗吐下後太過，使氣血虛而作也。若汗吐下後，心下逆滿，氣衝胸起，則頭眩身振，振動搖者，茯苓桂枝白朮甘草湯。太陽發汗不解，仍發熱，心下悸，頭眩，身暈動振，振擗地，真武湯。大抵氣血俱虛，不能榮養筋骨，其身不能主持，故為振搖也。須大補氣血，曾用人參養榮湯，數服其效。又一人身搖不得眠者，以十味溫胆湯，倍用人參，得效矣。

甘草  
木煎

水部

熱

通

戰慄不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其  
戰慄。不汗。邪氣以寸和盛。頭暈目眩。入參湯。然其

辨傷寒戰慄例第十八  
戰慄陰陽相爭。故身為之搖也。邪氣外與正氣爭。則  
為戰。邪氣內與正氣爭。則為慄。傷寒六七日欲解之  
時。必發戰而汗出解也。戰則正氣勝。故得汗而解。慄  
則不戰。而但心戰。頭搖。鼓頷。遂成寒逆者。有之。此陰  
氣內勝。正氣虛極。不能勝邪。宜姜附四逆湯。故經云。  
陰中于邪。必內慄而戰。邪在上焦。陰氣為慄。足膝逆  
冷。便溺妄出。皆此類也。凡戰主外。其人森然寒聳。則  
身戰。搖慄主內。則心戰也。經云。寒之傷人。使人毫毛

畢直鼓頷戰慄而無汗者。此表寒而戰慄也。當發汗。病有戰而汗出。因得解者。蓋其脈浮而緊。按之反芤。此爲本虛。故戰而汗出得解也。又云脈陰陽俱停。謂無偏勝。以其寸關尺三部大小浮沉同等。雖劇當愈。必先戰慄汗出而解也。若脈浮數。按之不芤。其人元本不虛。若欲自解。則汗自出而解。不發戰也。夫戰者。邪氣將出。邪正交爭。其人本虛。是以發戰。且正氣勝邪。則戰已發熱。大汗出而解也。若正氣不能勝邪。雖戰無汗。爲難治。若得半日。或至夜有汗者。亦爲解也。凡小柴胡湯証。而以他藥下之。柴胡証不罷。而仍在者。復與小柴胡湯服之。此不爲逆服湯。良久必蒸蒸而振發。寒熱汗出而解也。若不發戰而心慄者。此陰中於邪。必內慄也。凡正氣怯弱。寒邪在內。是必爲慄。蓋戰者。正氣勝邪欲解也。慄者。邪氣勝正。故爲重也。又有傷寒。厥陰逆。至第六七日。脈得微緩微浮。爲有脾胃脈也。故知脾胃氣全不再受尅。邪無所容。否極泰來。榮衛將復。水升火降。則寒熱作而大汗解矣。

未榮津液於水長火斜限寒精并而大行積矣  
 脾胃初少始吸吸全不再受故保無通容各賦  
 又本弱寒無創並至後六十日視時始發始  
 蓋輝者五原熱深始始少對者亦原熱五始  
 中飲津必內對也此五原始保寒保亦由是必  
 而此寒熱并出而難進者不發理而心對者出  
 者與與小寒時易知也此不為並則易見入必  
 此小寒時易知而以藥下之藥時不謂而此

辨傷寒腹滿例第十九

腹滿者。腹中脹滿也。脾為中央之土。所以腹滿多屬  
 太陰也。腹滿不減者為裏實。須下之。腹滿時減者為  
 裏虛。當溫之。若解表內不消。非大滿。猶生寒熱。亦未  
 可下。是邪全未入腑也。若大滿大實大堅有燥糞。雖  
 得四五日。亦可與下。謂邪已入腑也。若太陰腹滿時  
 減。復如故。此虛寒從下上也。宜理中湯加厚朴木香。  
 若太陰症。誤下因時腹滿而痛。桂枝芍藥湯。痛甚者。  
 桂枝大黃湯。陽明症。潮熱譫語燥渴喘滿不大便者。

大柴胡湯大實大滿者用調胃承氣湯噦而腹滿小便難者小柴胡加茯苓三陽合病腹滿身痛難以轉側譫語口中不仁小柴胡湯有汗白虎湯凡太陽吐食腹滿食不下枳實理中湯加丁香厚朴木香治之少陰六七日不大便腹脹滿痛急下之大承氣湯腹皮痛者脾不勝水水與氣搏皮肉之間腹滿而鳴漉漉有聲小半夏茯苓湯加桂下利腹滿身疼痛先溫裏以四逆湯後攻表以桂枝湯汗後腹滿當溫厚朴半夏生姜人參湯吐後腹滿內實當下少與調胃承氣湯下後腹滿臥起不安當吐梔子豉湯加厚朴腹脹滿者陰陽不和也宜桔梗半夏湯大抵陽熱爲邪則腹滿而咽乾陰寒爲邪則腹滿而吐利食不下也一切腹滿以手按之而痛或手按之不可近者此爲內實若按之可揉而軟者皆爲內虛也



內實者。按之可料。而燥者。皆為內實也。  
 一。以熱藥以平熱之。而熱者。平熱之。不問其清也。  
 頃刻。滿而則。其氣。無平。頃刻。而。其。食。不。可。  
 熱。者。皆。宜。以。平。也。宜。以。平。也。宜。以。平。也。  
 涼。者。不。宜。以。平。也。宜。以。平。也。宜。以。平。也。

辨傷寒腹痛例第二十二

凡腹中痛。邪氣入裏。正氣相搏。則為腹痛。陽邪傳裏。而痛者。其痛不常。當以辛溫之劑和之。陰寒在裏。而痛者。則痛無休時。欲作利也。當以熱劑溫之。有燥屎宿食而痛者。則煩而不大便。腹滿而痛也。當以苦寒之劑下之。諸痛為實。則痛隨利減。此為裏實。凡大陽証下。早因爾腹痛者。屬太陰。桂枝加芍藥湯。太實痛者。桂枝加大黃湯。凡中脘痛。屬脾土。太陰症。脈沉遲。內寒者。理中湯。加木香砂仁。若下利清穀。或欲絕者。四

逆湯。小腹痛屬厥陰。茱萸四逆湯。加當歸木香。凡內實腹痛。并遶臍硬滿刺痛。煩燥發作。及燥屎痛。宜下之。小承氣湯。若潮熱不大便。從心下至小腹硬滿而痛。手不可近者。用大陷胸湯。凡胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯。如脈弦。腹痛無寒熱者。芍藥甘草湯。凡脈弦口苦發熱。腹中痛者。小柴胡去參加炒芍藥。若寒熱交作。腹痛加肉桂芍藥。寒多去苓。倍加桂。熱多去桂。倍加苓。連柴胡。凡少陰發熱。手足冷。腹痛。或咳。或悸。或小便不利。或泄瀉後重。四逆散。加附子。炒芍藥。官桂。吳茱萸。若發熱。脈洪。弦。腹痛者。芍藥黃芩湯。傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趨小腹者。欲作利也。四逆湯主之。大抵腹痛有虛有實。若可按可揉而軟者為虛。若不可按不可揉而硬者為實。又有寒有熱。有血有食。當明辨之。治法先將凉水一盃與病人飲之。其痛若緩。身有熱者屬熱痛。當用涼藥清之。清之不已。而遶臍硬痛。煩熱譫語。大便實者。屬燥屎痛。當用寒藥下之。如食積痛。必噫氣惡食。酸臭。如痛處不移。或在脇下。或小腹。必硬滿。小水自

利大便黑。此皆痛隨利減之法也。若飲水愈加作痛者。屬寒痛。當用溫藥和之。和之不已。而或四肢厥冷。腹痛吐瀉者。急用熱藥投之。須詳脈來有力無力。乃為良法也。人難之。其法。...

實又直寒。木熱。血直。金管。...

辨傷寒小腹痛例第二十一

小腹痛者。臍下滿也。若胸滿心下滿。腹痛滿皆為邪氣。而非物。今小腹痛。則為有物。而非氣矣。若小便利者。則為畜血之症。小便不利者。乃溺澀之症。滲利之劑。宜分兩途。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。小腹痛。急滿者。小水自利。用桃仁承氣湯。下盡黑物。則愈。太陰身黃。小腹痛。小水不利者。與五苓散。利之。小便清白。為愈。有陰虛寒症。小腹痛。滿痛者。又當茱萸四逆湯。溫之。甚者。灸關元氣海穴。又有病人。手足厥冷。脈沉。

不結胸。小腹滿。按之則痛者。此冷結腸膀胱。宜四逆湯。及灸關元穴。凡病人素有痞氣。連在臍旁。痛引陰筋者。名臟結。死症也。大抵以手按小腹。硬滿而痛者。為實。不痛者。為虛。乃良法也。

辨傷寒小便不通例第二十二  
 傷寒小便不通。或中熱發黃。水飲停滯。皆以利小便為先。惟汗後亡津液。則以利小便為戒。設或小便不利。見頭汗出者。乃為陽脫。關格病也。○太陽經發熱。脈浮。無汗。煩渴。小便不利。五苓散。若自汗多。不可用也。若引飲過多。小便不利。下焦畜熱。脈浮。五苓散。脈沉。猪苓湯。若太陽身黃。脈沉結。小腹滿。小便不利者。為

辨傷寒小便不通例第二十二  
 傷寒小便不通。或中熱發黃。水飲停滯。皆以利小便為先。惟汗後亡津液。則以利小便為戒。設或小便不利。見頭汗出者。乃為陽脫。關格病也。○太陽經發熱。脈浮。無汗。煩渴。小便不利。五苓散。若自汗多。不可用也。若引飲過多。小便不利。下焦畜熱。脈浮。五苓散。脈沉。猪苓湯。若太陽身黃。脈沉結。小腹滿。小便不利者。為

畜血茵陳五苓散甚者茵陳湯。○陽明病發潮熱汗多者小便固少不可利。恐胃汁乾也。若利之必喘渴而死。脉洪大舌乾口燥飲水不止者人參白虎湯。若大便乍易乍難小便不利而熱者此有燥屎也。調胃承氣湯下之。若頭汗出壯熱渴飲水漿小便不利及陽明無汗心中懊憹小便不利此二者必發黃。茵陳湯加木通滑石去大黃大便不通加大黃下之。○少陽症發熱口苦咽乾或嘔或心下悸胸脇滿小便不利脉弦數者小柴胡去芩加茯苓口渴加竹葉麥冬天花粉去半夏。○大陰腹滿自利若小便不利無熱脉沉者理中合五苓散加厚朴木通分利其小便大便自止也。○少陰四五日小便不利四肢沉重大便自利者真武湯。若四肢冷或咳或悸小便不利或泄利下重者四逆散加熟附。○厥陰寒閉厥冷脉伏囊縮入腹小便不利四逆湯加通草茯苓茱萸當歸再灸關元丹田氣海兼熨法甚良。○凡治風溫風溼小水不利者詳見本條。陰虛火動小便赤澁不利者四苓散加木通滑石生地黃栢知母。若內熱甚大便不

通小水赤澁不利者。八正散若不渴小便不利者。熱在血分也。四苓散加黃柏知母生地當歸木通白芍。○夫膀胱為津液之府。氣化而能出也。若有汗多者。津液外泄。小便固少。不可利。恐重傷津液也。待汗止。小便自行矣。凡小便自利不可妄利。恐引熱入膀胱。則變畜血証也。昔四逆散治熱入膀胱。小便不利。此則變畜血証也。昔四逆散治熱入膀胱。小便不利。此則變畜血証也。昔四逆散治熱入膀胱。小便不利。此則變畜血証也。

野清肺飲

○少劑四五日。小野不除。四逆散重六野。

潤氣治熱在氣分。渴而小便不利。此上焦有熱。肺氣

天亦傷而不清。故宜清肺飲。日服三次。少野不除。

茯苓

上

白朮

中

猪苓

中

首澤瀉

中

琥珀

中

木通

中

甘草

下

薄荷

中

瞿麥

上

扁畜

上

滑石

上

紙骨

中

水燈心煎服。之令小便不除。是熱

黃芩湯

治肺家燥渴。小便不通。此熱亦在氣分。

黃芩

上

山梔

中

山蘇

中

骨

中

合五苓散去桂。○水燈心煎服。

八正散

血。或治小便不利。六野不除。

治熱在血氣之分實熱大便不通者

車前上 瞿麥上 木扁蓄中 甘草下

木通中 大黃中 山梔上 滑石下

水燈心煎服

清心蓮子飲

治虛熱在血氣之分小便不利或頻數

黃芩中 黃芪下 人參上 地骨中

車前中 麥冬中 石蓮肉中 赤茯苓中

甘草梢 加黃連 水燈心煎服

滋陰化氣湯

治熱在血分不渴膀胱有熱氣不旋化或過服

熱藥小水不利者

知母中 黃栢上 木通中 生地中

滋劑甘草梢下 加陳皮 木香 當歸

水燈心煎服

滋腎丸小動苦不盡以車前草生煎藥汁

治陰虛小水不利熱在下焦不清臍腹滿悶

知母二兩 黃栢兩

酒浸晒乾為末。肉桂末二錢。滴水為丸。每服

一百丸。白湯送下。或下熱心前微熱即

若小便苦不通。以車前草生取連根葉搗爛

攪汁。再入生白酒半盞。和勻送下。立効。

滋陰益氣湯。木香、當歸

治虛熱小便數。木香、當歸

熟地、人參、黃芪、當歸、白朮

陳皮、升麻、甘草、軟柴胡

知母、黃柏、麥冬、車前

生地中 水燈心煎服

一切小便不利。先將麝香半分。填患人臍中。上

用葱白田螺各搗爛成餅。封於臍上。用布帶縛

住良久。下用皂莢燒煙薰入陰中。其水竇自通。

婦女亦用皂莢煎湯薰洗。不便處。小水自通。



辨傷寒小便數例第二十三  
 小便數者。頻欲便而不多也。腎與膀胱虛而挾熱。滑  
 則水通。澁則小便難。故澁淋而數起也。若自汗而小  
 便數者。雖有表証。不可用桂枝。為亡陽走津液也。太  
 陽自汗。四肢拘急。心煩微惡寒。脚攣急。小便數。候服  
 桂枝湯。得之便厥者。與甘草乾姜湯。加芍藥。太陽病  
 吐汗下後。小便數。大便硬而譫語者。有燥屎也。小承  
 氣下之。若陽明自汗而小便數。脉浮數。胃不和而譫  
 語者。調胃承氣湯。若太陽陽明小便數而大便秘。此  
 用葶藶白田。與各書。關丸。桂枝。效。觀。士。只。亦。帶。解。  
 一。氏。小。數。不。除。去。解。藥。香。半。合。與。患。入。劑。中。土。  
 坐。此。中。水。煎。心。煎。煎。

辨傷寒小便數例第二十三  
 小便數者。頻欲便而不多也。腎與膀胱虛而挾熱。滑  
 則水通。澁則小便難。故澁淋而數起也。若自汗而小  
 便數者。雖有表証。不可用桂枝。為亡陽走津液也。太  
 陽自汗。四肢拘急。心煩微惡寒。脚攣急。小便數。候服  
 桂枝湯。得之便厥者。與甘草乾姜湯。加芍藥。太陽病  
 吐汗下後。小便數。大便硬而譫語者。有燥屎也。小承  
 氣下之。若陽明自汗而小便數。脉浮數。胃不和而譫  
 語者。調胃承氣湯。若太陽陽明小便數而大便秘。此

各脾約約者束也。儉也。謂約束津不行也。用脾約丸。陽脉浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則難。是為脾約。用前脾約麻仁丸。又有腎陰虛少。小便頻數者。清心蓮子飲。加黃柏知母麥冬治之。亦

辨傷寒小便難少例第二十四

辨傷寒小便難少例第二十四

陰虛則小便難。陰虛者陽必湊之。因膀胱受熱。故小便赤澁而不能流利也。又云雖不大便六七日。小便少者。但初硬後溏不定。或硬攻之不溏。須小便多。屎定硬。方可攻之。乃胃中水穀不分。雖通而不多也。陽明中風。脉浮緊。身黃鼻乾。氣短腹滿。潮熱而嘔。心脇痛。小便難。小柴胡加茯苓。大便不通者。用調胃承氣湯下之。太陽病小便難者。以飲水多。必心下悸。茯苓桂枝白朮甘草湯。小便少者。必苦裏結也。猪苓湯主



氣為慄足膝逆冷便溺妄出用四逆湯治之。及灸關元穴甚良法也。

邪不逆也。

王晉與謝淵其

與孫登事出太師會集其小便自利尿濕熱內

則則自汗清熱發其汗則其內濕氣盡而熱不可

小便自利者宜與邪熱者大便必硬宜大柴胡下之

辨論寒小便自利條第二十五

去再辨傷寒不大便例第二十六

不大便者謂大便不通皆因發汗利小便耗其津液

所以腸胃乾燥而轉屬陽明裏症多矣有陽經邪熱

傳入正陽明胃腑大便不通者有邪熱傳入少陰經

而大便不通者有傳入厥陰大便不通者俱當急下

之三承氣選用大便通而熱愈也有不當下便者在

於脈虛浮惡寒舌上白胎或嘔此猶帶表邪未解不

可攻其嘔者因邪全未入腑雖有陽明症亦不可攻

也小便清者知邪不在裏仍在表也亦不可攻若不

轉屎氣者。內無燥屎也。俱不可攻。但初硬後溏。脈浮而數。大便不通。燥渴雖能食者。此爲實熱也。名曰陽結。若目中不明者。得屎自解也。宜大柴胡下之。甚者用小承氣湯。○脈沉而遲。不渴不能食。身體重。大便反硬不通者。此爲虛寒也。名曰陰結。用四物麻仁湯加熟附。若嘔者。用金液丹。外用蜜導法。○若陽脈浮而溏。小便數而大便難者。名曰脾約。宜麻仁丸。○太陽症曾經汗下。吐後微煩。小便數。大便硬。用蜜導法。若再下之。必清穀不化。若陽明自汗過多。或已經發

汗而小便自利。大便不通者。此爲津液內竭。不可攻之。宜蜜導法。若元氣實者。宜承氣下之。

凡傷寒陽症。大便五六日不通。頭疼身熱燥渴者。又當下之以大柴胡。甚者用大承氣湯。此因大便燥結不通。邪熱之氣上攻於頭而痛也。

調胃承氣湯

治正陽明胃腑病發熱。自汗譫語燥渴喘滿發黃。俱此湯下之。

大黃土芒硝中甘草下

熱加茯苓。○渴加石膏。○水煎服。

小承氣湯

治發熱燥渴譫語大便不通小水短赤此湯下

隨之承氣湯

大柴胡湯上枳實下厚朴下

有熱加柴苓

治日晡潮熱及傷寒表裏俱見之症

宜柴胡上黃芩中枳實中

而小大黃上降也半夏中渴去之加天花粉中

蜜導法

治陽明自汗多而燥結不通

用好蜜煎成如膏子一二時許將皂莢麝香

細辛為末和蜜捻成條子放入穀道中其便

即通

製大黃法

用錦紋川地者佳酒拌焙乾收用不傷陰血

壯盛熱極者生用

解大黃芒硝法

治服之而下利不止者。

將參朮乾姜甘草熟附子茯苓訶子肉果粟  
穀陳皮升麻木通加烏梅燈心煎臨服入炒  
大壁土一匙調下。所以取土氣以助胃也。

### 四物麻仁湯

治陰結不大便者

當歸 上

川芎 中

芍藥 中

熟地 中

乾姜 下

麻仁 中

附子 中

桂 下

加皁莢

### 當歸潤燥湯

治腸胃燥大便不通

當歸 上

芍藥 中

川芎 中

桃仁 中

熟地 中

生地 下

麻仁 中

### 麻仁脾約丸

治小便數大便秘者

厚朴 半兩

麻仁 一兩

枳實 一兩

杏仁 半兩

煉蜜為丸。白湯送下五十九。

小柴胡湯大野錄

小柴胡湯

柴胡

黃芩

芍藥

當歸

枳實

甘草

治胃氣大野不

當歸國氣湯

辨傷寒無表裏証第二十七

夫無表裏証者。又非表症之可發。又非裏症之可下。俱宜用小柴胡湯和解之。

小柴胡湯

有加減法。備開少陽條下。

人參

甘草

半夏

柴胡

水姜煎服