



醫寶鑑雜病篇卷之八上

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君許俊 教撰

癰疽下

腸癰腹癰

關元欲屬小腸天樞欲屬大腸丹田欲屬三焦其穴分隱痛者為疽上肉微起者為癰也

鹽○腸癰為病小腹腫而強按之則痛小便數便

淋時時汗出發熱而復惡寒身腹臍錯腹成急如

腫狀甚者腹脹大轉側有水聲或遠臍生瘡膿從

瘡出或有出臍中者惟大便下膿血者自愈○

濕熱鬱積腸內成癰脉遲緊者宜大黃牡丹湯或

五香連翹湯坊見下之脉孔澁者四物湯血塊加

桃仁紅花玄胡索木香脉洪數者三仁湯小腹痛

尿澁者膿滯也宜牡丹散○腹皮急按之濡身

無熱乃陰冷所致宜牡丹散或內托十宣散加茯苓甚者敗醬故小腹痞堅按之痛身有熱乃結熱所成宜大黃牡丹湯或桃仁承氣湯方靦黃黑散方○腸癰冷熱證雲母膏為丸牛膝湯吞下利去瘀膿即愈或蠟礬元亦佳方見○腹癰者生於肚腹皮裏膜外左關脉洪數而腹痛甚者是也治法

同腸癰

脉法

腸癰難知脉滑可推數而下熱腸癰何疑遲緊未膿下以平之洪數膿成不下為宜翹○跌陽脉滑而數當知尿膿也辨○腸癰之脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁辨干

大黃牡丹湯

治腸癰脉遲緊膿未成可下之大黃芒硝各一錢半牡丹皮桃仁瓜蒌仁各二

針
錢半右剉作一貼水煎服有膿卽下膿無膿卽下
血。一名大黃湯一方有冬瓜仁無瓜萇仁神效

三仁湯

治腸癰腸中病痛縱非癰疑似間便可服薏
苡仁三錢冬瓜仁二錢半桃仁牡丹皮各二

錢右剉作一貼水煎服

馱。一名薏苡湯因

牡丹散

治腸癰冷證腹軟而痛時下膿血牡丹皮人
參天麻白茯苓黃芪薏苡仁桃仁白芷當歸

川芎各一錢官桂甘草各五分木

香三分右剉作一貼水煎服

敗醬散

治腸癰身無熱腹濡冷薏苡仁二錢半敗醬
一錢半附子炮五分右剉作一貼水煎服小

便當下膿血而愈

名薏苡附子敗醬散

黃黑散

治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙一兩取末二錢半芫子一兩取末一錢黑牽

牛子一兩取末二錢右和勻分二貼每取一貼蜜水調空心服以利為度

腸癰治驗

一婦腹痛百方不效孫兆診曰腹痛脉當沉細今反滑數此腸癰也雲母膏作丸温

酒吞下服一兩下膿血而安

肘正肘頭銳骨端是穴灸百壯下膿血而安

臂癰

臂上手陽明經分生癰此得之入風之變者傷于風者上先受之宜服白芷升麻湯

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芩各四錢生黃芩三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢

酒紅花甘草各五分右剉分二

貼每取一貼酒水各半煎服

驚癰

驚居小腹之後又在於下此陰中之陰也其道遠其位僻雖曰多血氣運不到血亦罕來中年後不

可生癰終有腫痛參之脉證但見虛弱便與滋補
氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之
禍如指諸掌○○癰癰初起未成膿者隔蒜灸再
用葱熨法欲作膿者內托羗活湯痛甚者仙方活
命飲○坊腫硬者托裏消毒飲坊見潰後宜加味
十全湯坊見尻醫生癰堅硬腫痛宜內托羗活湯
坊見

懸癰

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間
初發如梧子大甚痒漸如蓮子數十日後始覺赤
腫如桃子即破若破而小大便皆從中出者為難
治宜服國老膏○此疾首尾常服國老膏雖患
亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救○初起作痛
尿澀者仙方活命飲坊見去大黃服之膿已成者
急鍼之久成漏者加味十全湯坊見蠟礬元坊見
○穀道中生瘡取水巾苳葉細搗綿裹納下部曰

三卽
愈

國老膏

治懸癰橫紋大甘草帶節一兩四寸切以山
問長流水一碗文武火慢慢薰水灸自早至

午乾則投前水再灸直待水盡看甘草中心潤透
爲度細剉好酒二升煎取一升空心隨量飲之三
日一服二三服可保無虞此藥雖不卽消過二十
日後必盡消有人患此瘰已破服兩貼瘡卽合甚

妙精要

便癰

俗名便毒實血疔也一名騾馬癰此奇經衝任爲
病而癰見於厥陰經之分野其經多血故又名血
疔或先有疔瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱
鬱血聚而成初發宜疎利之卽散變膿後如常用
托裏內補之藥傳○便毒處所上不在腹下不在
腿介乎兩者之中也搗○便癰生於腿胯小腹之

間或一邊腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散

方活命飲坊見仍戒房室行動臥○使癰宜蘇方

散牡蠣大黃湯千金內消散黃黑散五香連翹湯

三坊消毒飲玉燭散神奇散○便毒取大蜘蛛一

個研細熱酒調下得○便毒初起射十三寸生姜

如指大搗細順流水煎服以瀉為度因用阿膠醋

煮塗患處胡○生山藥砂仁同搗塗上即消又生

姜一塊蘸米醋磨取干步峯泥付腫處即

消干步峯即人家行步地上高塊是也

蘇方散治便癰木鱉子當歸尾赤芍藥白芷川芎射

干大黃金銀花穿山甲沒藥蘇木甘草各八

分右剉作一貼酒

水各半煎服

牡蠣大黃湯治同上大黃牡蠣煨各二錢五分甘草

一錢黃瓜萋一個右剉作一貼水煎服

雜病篇

傳正

消毒飲

治便毒三四日可消皂角刺金銀花防風當歸大黃瓜蒌仁甘草各一錢三分右剉作一

貼水酒各半煎服仍頻

提掣項中髮立效

玉燭散

治便毒腫痛大黃芒硝各二錢川芎當歸赤芍藥生地黃甘草各一錢右剉作一貼水煎

空心服

神奇散

治便毒魚口瘡便毒潰膿者牡蠣大黃各三錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿

山甲三片土炒木鱉子三個去殼黃蠟

三兩右剉分作二貼酒水各半煎服

雙解散

治便毒大黃黑丑炒頭末各一錢半官桂白芍藥澤瀉桃仁各一錢甘草七分右剉作一

囊痈

貼姜五片水煎空心服先小便快是熱

從小便出也後大便利皆是稠毒

效

者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲

道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安勿藥可

也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開罌丸

懸掛水出以麩炭末付之外以紫蘇葉包裹仰臥

養之○癰疽入囊者曾治數人悉以濕熱入肝經

處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫罌丸懸掛者

皆不死○取紫蘇葉焙乾為末付之如燥香

油潤之皮脫者青荷葉包之其皮自生

附骨疽

附骨疽與白虎飛尸歷節皆相類但歷節痛則

走注不定白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽

痛深按之亦無益○白虎飛尸亦能作膿着骨而

主及其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一病但淺

深不同耳○附骨疽筋骨之內痛如錐刺外則

全無赤腫突起初因露卧風冷或乘涼浴水寒濕

龔深初起痛不能轉寒熱無汗經久寒鬱為濕變
 而為膿膿成即用火鍼使毒不得內潰初起
 宜漏蘆飲子五香連翹湯坊見疎下之次用內消
 升麻湯在尻鬻宜內托羌活湯坊見在腿內羌活
 防已湯在腿外托裏黃芪湯黃連消毒飲坊見潰
 後久不愈宜蟾蜍膏赤木元平肌散初起大
 痛而肉色不變名附骨癰三生散最妙兼用青皮
 甘草節二味煎服附骨疽與緩疽石疽賊風
 相類宜辨
 而治之附

緩疽石疽賊風辨

緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓之間
 其熱緩慢積日不潰久方紫黑皮

肉俱爛故名曰緩疽○腫與皮肉相似疼而堅硬
 如石故謂之石疽生商陸根搗爛和鹽少許塗付
 日一換即軟○賊風由風邪搏於骨髓故其痛亦
 徹骨遇寒則甚外證惡寒有汗痛處常欲熱熨失

治則變為癰曲偏枯○緩疽石疽宜服補虛托裏溫熱之劑賊風宜服越婢湯疎通之劑

始發預防法

環跳穴痛不已防生附骨疽急用青草蒼栢湯服此不愈加麻黃一錢用二三

貼又不效恐疽將成急掘地坑以火燒紅沃以小便令患人赤體坐其上以被圍抱下體使熱氣熏

蒸氣血暢而愈

漏蘆飲子

治附骨疽初起宜服他惡瘡初起亦可服大黃一錢半漏蘆白歛黃芩麻黃枳實升

麻赤芍藥朴硝甘草各一錢右判作一貼水煎服

內消升麻湯

治附骨疽疎下後用此大黃升麻當歸黃芩赤芍藥枳實各一錢半甘草一錢

右判作一貼水煎服

羌活防已湯

治附骨疽發於太陽厥陰太陰分者羌活川芎蒼朮各一錢二分防已木香連

翹射干白芍藥木通當歸尾蘇木甘草

各七分右剉作一貼酒水各半煎服正

托裏黃芪湯

治附骨疽發於足少陽陽明分者當歸尾一錢七分柴胡一錢半白芷一錢二

分連翹鼠粘子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻

甘草各五分右剉作一貼酒水各半煎服正

蟾蜍膏

治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡口出大蝦蟆一枚亂髮雞子大猪脂四兩右以猪

脂煎二物令稠去滓凝如膏貼之先以桑白

皮烏豆煎湯淋洗瘡口拭乾然後却貼之效

赤朮元

治附骨疽久不差赤朮一斤泔浸去油用川椒葱白同煮黑色焙乾茴香破故紙川練子

炒赤茯苓白芷桃仁各一兩右為

末蜜丸梧子大溫水下百丸得效

平肌散

治附骨疽成漏久不合老狗頭骨蝦露蜂房
亂髮灰各二錢半新桑白皮末一錢一分半

右為末入輕粉麝香各少許
濕膠乾糝乾則油調付之髓

三生散

治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房蛇蝎
亂髮各等分燒存性為末每取三錢温酒調

下空

心保

青草蒼栢湯

治附骨疽始作宜預防青皮一錢半甘
草節五分蒼朮黃栢各三錢右剉作一

貼水煎和姜汁三匙空心飲之一方
加桂枝火加條芩體虛加牛膝

流注骨疽

流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素
有痰火或感風寒邪氣流行至其痰注之處

而發多生四肢或胸腹腰髻關節之處初起宜葱
熨法坊見實者十六味流氣飲坊見兼服竹瀝達

痰九疔靨通用榮衛返魂湯合二陳湯疔靨令其
自消自潰若潰後久不斂宜以托裏爲主更佐以
豆鼓餅琥珀膏鱘規膿成以火鍼破之臥。流注
起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢經絡澁於所
滯而後爲流注也蓋流注者傷寒之餘毒骨疽者
流注之敗證也。翻。挾飲流注於胸背頭頂腋脇
腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血朝雖
或有綴紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿或有薄
血或出清水或如紫汁又有壞肉如敗絮或又如
瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不硬破之
亦無膿血鍼口努肉突出惟覺咽喉痰塞作寒作
熱榮衛返魂湯主之。醫。骨疽者由瘡潰後氣血
不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出盡方愈蓋人身
有正骨附骨傳合成形附骨出則愈後如常正骨
腐出則爲終身廢疾隨腫硬之處潰後久不愈則
必出碎骨外用附子餅灸或葱熨法祛散寒邪補

接榮氣則骨自

脫瘡自歛矣門

榮衛返魂湯

主一切痰飲為患專治痰腫又治癰疽

烏枳殼茴香烏藥當歸甘草各一錢右判作一貼

酒水各半煎服樽一名追風通氣散一名通順

散又名何首烏散此方宜與十宣散相間用之並

加忍冬藤門。凡氣血逆於肉理令壅結為癰疽

此藥大能順氣行血自然榮衛通順不生變証尤

合內疽門。虛加炮附子實加大黃痰盛加南星

半夏腫毒堅硬不穿加川芎麻黃葱白全蝎穿山

甲流注加獨活流注者氣血凝滯加獨活則可以

動一身血脈血脈既動豈復有流注乎門。此藥

治流注癰疽發背至於收壞病活死肌揖患於未

萌之前拔根於既愈之後大能順氣活血益氣陽

也血陰也只調陽不和陰則氣耗而凝肌必不活

如五香連翹之類是也。只和陰不調陽則血旺而氣弱病必再作。如內補十宣之類是也。此藥兼之真神仙妙劑也。

劑也。

疔疽

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日死。發於足傍名曰厲疽其狀不大初從小指發急治之去其黑者不消輒並不治百日死。發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不衰急斬之否則死。膏梁之變足生大疔。疔瘡初發突起如疔蓋故謂之疔。近世多見因食自死牛馬禽獸之肉而發或感襲天地暴蒸之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發其形有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺於一二日之內比之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍疔其毒尤疔。疔瘡發無定處在手足頭面節背骨節間最急其餘處爲緩。

疔疽形證

疔疽生黃惡中或紫黑色初發必先痒後痛元寒後熱四肢沉重頭痛心驚眼花將

大重則嘔逆為難治_三○瘡頭黑硬如釘四畔帶

赤如火盤根突起隨變焦_四○幾腫大而光轉為

濕爛深孔透肌如大鍼穿之狀_五○外證心驚頭

痛拘急惡寒四肢痛強或寒感交作頰舌間赤黑

點點如珠_六○或不痛痒只麻木寒熱眼中流火

牙關緊急時時驚惕甚則嘔吐_七○_八○神危嘔以鍼嘔

瘡不痛無血是其候也又中陷

如釘蓋撼之有根是疔也_九

疔疽治法

凡疔瘡毒氣攻心欲死以鍼刺瘡心若竟痛有血下_一○銚子若累刺至心則皆不痛_二○

血者急刺百會穴痛有血者下銚子若無血以親

人熱血代之_三○猶活三四宜用迴瘡銚子碧霞銚子

迴瘡蟾酥銚子_四○又法急以艾炷灸之鍼釘四

邊皆令血出以迴瘡銚子維之上用膏藥貼之因

服五香連翹湯于金瀝蘆湯疔坊疎下之若鍼之
不痛無血者以猛火燒鐵鍼通亦於瘡上烙之令
如焦炭取痛為效亦緝前錠子經一二日膿潰根
出服托裏湯散以取平復治法急用飛龍奪
命丹或雄黃丸下之去其毒熱次服化毒丸及二
活散實者初嚴賽命丹坊見三丸以葱酒發
表虛者服保生錠子以解毒通治紫金錠返
魂丹一捻金神效奪命丹蟾酥丸獨蟾丸五聖湯
還魂散于金
消毒散選用

紅絲疔

疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用
鍼於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳

香等膏於疔瘡內塗之鍼時以痛者知痛出血為
好否則紅線入腹必致危殆疔生兩足多有
紅絲至臍疔生兩手多有紅絲至心疔生面部多
有紅絲入喉者俱難治急鍼其絲出血以泄其毒

方可保

生肌

魚臍疔

又有一種瘡頭黑深形如魚臍破之滲出黃水四畔浮漿謂之魚臍疔其毒尤甚絲瓜葉

連鬚葱白韭葉各等分研搗如泥取汁以酒和服

其滓貼腋下如病在左手貼左腋下在右手貼右

腋下在左腳貼左膀在右腳貼右膀在身中貼心

臍并以帛縛住候肉下紅絲皆白則安矣或蛇退

燒灰雞子清調付肉

服神仙解毒丸

脫疽疔

內經曰膏梁之變足生大疔蓋因膏梁酒色蘊積惡毒或久患消渴之餘多有此瘡靈樞

經所謂發於足傍名曰厲疽發於足指名曰脫疽

其狀赤黑者死不治治不衰急斬之否則死正謂

此也謂之脫疽以其指節潰爛脫去也

色赤自潰先用隔蒜灸內服仙方活命飲坊見還

魂散重者色黯不痛先用隔蒜灸更服賽命丹貼
上及補葉庶可保生。甚者赤變為黑急須在指
則斬在內則割否則黑延上足必死外治用桐油
及無名異煎一沸入川椒一勺看瘡大小剪蓼葉
在內同煎浸七日後單

以此葉貼瘡上即安

一方 治疔疽危篤二服即愈輕者一服效土蜂房一
窠蛇蛻全者一條右盛器中黃泥固濟火煨存

性為細末每一錢空心好酒調服少頃腹中大
痛痛止而其瘡已化為黃水矣因服五聖湯

疔疽死證 疔瘡含蓄毒氣矣出才許痛痒異常一二
日間害人甚速是光在瘡疽之上也

疔毒入心則日乾煩悶恍惚似醉嘔吐不定危證
也萬病解毒丹鉗鐵世以黃連當歸煎湯化下或
賽命丹淵然真人奪命丹皆可服。疔毒入心
腹則煩悶嘔逆恍惚癡暗其斃可立待也。疔

瘡走黃過心者難治若太重則嘔逆嘔逆者難治
如用乳粉托裏散防見止之疔○疔疽出冷汗者

死旺○人有暴死者多是疔毒急以燈照遍身
若有小瘡急灸之并服賽命丹亦有復甦者

拔疔法

疔瘡有毒根在內須拔去乃可救黑牯牛牽
於石上必撒糞候糞上生菌取焙乾與菥蓂

草葉等分為末用竹筒兩頭去節套在疔上陷入
肉內以線繫縛取藥末一匙滴水和之放於筒內

少時藥滾起則疔自拔起未效則漸加度數其疔
必拔去後以金銀白芷散調之○宜用迴瘡

錠子或保生錠子四聖旋生散拔去疔根調治
○蒼耳莖葉燒灰醋調塗疔上乾則易不過十度

卽根出和雄黃尤妙○蟬蛻白殭蠶為末醋調
留瘡口塗四圍竣疔根出拔去○蟻娘安濃米

泔小盞中以火逼之虫熱喫泔及困死取腦中白
肉新瓦上焙為末熱酒調二錢服仍以少許塗疔

上根自出註。一云蜚蠊於心腹下度取之其肉稍白貼疔上根出即愈。斑猫一枚捻破以鐵

刺疔上封之根即出。取黑虱十枚置疔上以荻箔繩作炷炙虱上即根出。白狗屎燒存性和酒

服又塗疔上根自出。苦苣取莖中白汁塗疔上出根。馬齒莧和梳垢爛搗封疔上根出。韃

食疫死牛馬禽獸肉生疔

近見患疔者皆是食自死牛馬禽獸之肉而生此疾

十患十死宜急取紫金錠半錠淡酒化下重者服一錠外用凉水磨塗疔上日夜各數次或吐或利

神效。白頭蚯蚓八九條搗爛和酒濾去滓飲之其滓塗疔四圍留頭出毒氣。大蜘蛛一個放疔

上有唾其毒連易三五個其毒自敗以蜘蛛入水不傷蛛命又兼用蜈蚣法。方觀下

紫金錠

一名萬病解毒丹治癰疽發背諸腫諸疔瘡惡瘡一切腫毒。每取半錠淡酒化下。

重者一錠外以涼水調塗患處一日

數次即效惟已潰出膿血者忌服

返魂丹

治十三種疔瘡危惡者雄黃白礬枯各二錢
硃砂膽礬各一錢牛蟾酥血竭銅綠各一錢

輕粉沒藥乳香各五分射香一字蝸牛生不拘多

少右為末以蝸牛蟾酥研爛和丸芡實大每一丸

令病人先嚼葱白三寸許放在掌心將藥丸裹在

葱內以熱酒一盞吞下煖處卧汗出為效○內經

曰汗之則瘡已蓋此

藥能化毒為汗也

一捻金

治疔疽即賽命丹坊見為末每服二三分温
酒調下如服賽命丹後毒未盡起再用此藥

催之服此藥後

身涼者即死

神效奪命丹

治疔瘡惡瘡及破傷風昏沉危急者硃
砂三錢半為衣輕粉血竭各二錢枯白

卷之三 雜病篇 三

礬蟾酥各一錢銅綠一字蝸牛二十個右末用初

男乳汁和丸梧子大硃砂為衣患人自嚼生葱白

數條吐出裹藥一丸以溫酒吞下如吐

逆以熱酒壓下遍身汗出毒氣自消

蟾酥丸

治疔瘡惡瘡無名腫毒硃砂雄黃各三錢麝香一字右末端午日取蟾酥和丸黍米大蔥

酒下三

九

五聖湯

治疔疽皂角刺一兩大黃金銀花甘草各五錢黃瓜萸一個右剉酒二升同煎至八分溫

服

還魂散

治疔瘡及癰疽能令肉消去毒化為黑水從小便出萬無一失知母貝母白芨半夏天花

粉皂角刺乳香金銀花穿山甲各一錢右剉作一

貼好酒一碗同煎至半碗去滓乘溫盡服將渣搗

爛加芙蓉葉一兩蜜水和付瘡上
如乾以蜜水潤之過一宿自消

千金消毒散

治疔瘡發背一切無名惡瘡腫毒初發
脉洪數弦實欲作膿者當歸金銀花各

二錢大黃芩硝連翹黃芩赤芍藥各一錢皂角刺
牡礪天花粉各五分右剉作一貼酒水各半煎服

春回

迴瘡錠子

治疔疽神效草烏一兩巴豆肉七個蟾酥
粳米大七粒麝香一字右為末麪糊和作

錠子先鹹瘡頭至痛見血用此錠紐入以膏藥貼
之重者於瘡四圍紐之二三日疔根自拔出

一名迴生
錠子

碧霞錠子

治疔瘡及惡瘡不覺痛銅錄一兩礪砂一
錢蟾酥一錢右末飯和作錠子先鹹刺疔

心出血以錠子紙
之用膏貼之精義

迴瘡蟾酥錠子治疔瘡天雨星欵冬花巴豆肉黃丹

細末用新蟾酥和勻如黍米大作錠子先以鍼刺
疔頭有血出下錠子以膏藥貼之膿出自差精義

飛龍奪命丹治疔瘡及惡瘡珠砂三錢砒礬一錢半

麝香一錢二分半南星半夏各一錢斑貓十二個
去足翅巴豆十二個去皮油右為末蟾酥炙和丸

紅豆大五分內取一分加入斑貓四個然後稔成
錠子如小麥大先用鍼刺疔心下錠子用飯粘紙

封口用前四分內一丸
喻在舌上凉水送下細

雄黃丸治同上雄黃鬱金皂角全蝎各一錢巴豆肉
十四個麝香少許右末滴水為丸菘豆大茶

清下二
十九傳

化毒丸

治同上 硃砂 硃砂 雄黃 各一錢 龍腦 射香 各五分 輕粉 一字 蟬蛻 二十枚 右為末 蟾酥 和

於舌上取涎而愈

二活散

治疥瘡 羌活 獨活 當歸 烏藥 芍藥 赤芍 芍藥 金銀花 天花粉 連翹 白芷 甘草 節 各二錢 紅花 蘇木

荆芥 蟬蛻 乾葛 各一錢 牛檀香 一錢 右為末 每服三錢 蒼耳 煎湯調下

獨蟾丸

治疥瘡 及一切惡瘡 蟾酥 取得 九如 菉豆 大一蟾 或作一九 多者作二九 每取一九 置石

上卧片時 其苦水 滿口 即嚙下 或鍼刺 疔頭 納一九 於中 紙貼 護之神效

保生錠子

治疥瘡 蟾酥 三錢 雄黃 二錢 為末 用青桑 皮生者 二兩 同擣 如泥 六分 重捻 作錠子

硃砂為衣陰乾以冷葱湯磨服八分仍用冷葱湯
吞下外用鍼刺疔頭將錠子插入被蓋出汗二日

爛出即愈體虛清貴人及婦女胎前後毒淺者最宜

神仙解毒丸

治疔瘡魚臍瘡諸般惡瘡初發白礬不
拘多少熔化作丸如菜豆大硃砂為衣

每十九葱白煎湯送下一服立消

金銀白芷散

治疔疽金銀花二錢皂角刺一錢半黃
芪當歸白芷甘草各一錢檳榔川芎防

風天花粉各五分右為末分三貼
每取一貼酒水各半煎連渣服

四聖旋疔散

治疔瘡生於四肢勢微者先用醋調此
末塗疔上次服托裏之藥其疔自出巴

豆肉五分輕粉硃砂白蠟各
二錢半右為細末醋調用之

精義

癰疽雜證

有癰疽煩渴有癰疽嘔逆有癰疽痰盛
有癰疽寒熱有癰疽作痛有癰疽泄瀉

癰疽煩渴

熱毒方盛或發大渴此乃毒氣攻心令舌
乾煩渴但用補心氣藥內補即止清。癰

疽發渴乃氣血兩虛入物湯虧覘加黃芪麥門冬

山茱萸五味子。加減八味元虧覘治癰疽渴

疾首尾通用最佳老人尤宜。清膈竹葉湯竹

葉黃芪湯人參黃芪湯黃芪六一湯金銀花散五

味子湯忍冬丸忍

冬湯見防選用

癰疽嘔逆

未潰時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當
作陰虛補之若年老人潰後嘔不能食宜

參苓白朮膏防覘補之何間謂瘡瘍嘔者濕氣侵

于胃也宜倍白朮防。癰疽及疔瘡惡瘡毒氣攻

心則多嘔逆宜乳粉托裏散生姜甘桔湯。食不

能下服藥而嘔六君子湯防覘加木香縮砂防。

或用獨參湯即愈心丹

癰疽痰甚

癰疽生痰有二一者胃寒二者鬱熱俱宜二陳湯或榮衛返魂湯坊見加南星半夏

嗽。痰盛喘急六君子湯加姜枣煎服或補中

益氣湯坊觀加麥門冬五味子桑白皮煎服翻

癰疽寒熱

癰疽未愈之間先嘔痰而寒熱汗出而止或連日或間日宜服加味不換金正氣散

翻。癰疽虛證寒戰明乳香研細半兩每一錢熟

水調下戰發於肝乳香着肝而溫寒戰隨止抽

癰疽作痛

癰疽不可不痛亦不可大痛未潰前痛者為熱毒便秘者內疎黃連湯坊見膿脹痛

者鍼之已潰膿出而反痛者虛也翻。癰疽寒熱

虛實皆能為痛若熱毒之痛以寒涼之劑折其熱

若寒邪之痛以溫熱之劑熨其寒虛而痛者補之

實而痛者瀉之翻。膿潰之後反痛者虛也宜補

之穢氣所觸者宜和解之風冷所逼者宜溫散之
補者當歸苗芩之類和解者乳香芍藥之類溫散
者防風桂枝之類。膿血既泄腫痛尤甚人參
黃芪湯或十全大補湯。虧覲加麥門冬五味子。翻

○止痛當歸湯二
仙散香靈散選用

癰疽泄瀉

癰疽泄瀉宜乳粉托裏散以木香白茯苓
煎湯調下加味不換金正氣散佐之。搗。

腹痛泄瀉咳逆昏憤急用托裏溫中
湯或用六君子湯。虧覲加炮附子。翻

清膈竹葉湯

治癰疽煩渴竹葉升麻黃芪蜜炙瓜蒌
根麥門冬冬一錢生地黃黃芩赤芍藥

人參知母白茯苓甘草炙各七分半
右剉作一貼入粳二枚水煎服。精

竹葉黃芪湯

治癰疽惡瘡發渴竹葉生地黃各一錢
半黃芪麥門冬當歸川芎黃芩赤芍藥

人參半夏石膏甘草各七分半右
剉作一貼入姜五片水煎服

人參黃芪湯

治癰疽潰後少食不眠煩熱黃芪蜜炙
人參白朮各一錢升麻六分陳皮蒼朮

麥門冬當歸神麴甘草各五分黃
栝四分右剉作一貼水煎服

黃芪六一湯

治癰疽頑渴黃芪蜜炙六兩甘草炙一
兩右剉每三錢入姜二束二煎服此藥

大治渴疾常服可免癰疽之患
兩半生用半盞水潤蒸三次粉草一兩半生半炙

右末每二錢
白湯點服

金銀花散

治同上金銀花四兩甘草炒一兩
右為末分三貼水酒相半煎服

五味子湯

癰疽口燥舌乾此腎水竭也此藥治之五
味子黃芪生人參麥門冬甘草各一錢右

到作一貼水煎
日服三五次精

乳粉托裏散

治癰疽惡瘡毒氣攻心迷悶嘔吐喉舌

返出毒氣不致內陷菘豆粉四錢乳香一錢右爲

末每二錢甘草湯調時時呷下一方新水調服

○一名內托散一名護心散一名內托香粉散

○一方癰疽疔瘡惡瘡須服此預防毒氣攻心菘

豆粉四兩乳香一兩硃砂三錢右爲末每

二錢甘草湯調下名曰乳香護心散

生薑柑桔湯

治癰疽毒氣上衝咽膈空塞嘔吐不已
桔梗一兩甘草生姜各五錢右剉井水

煎服

搗

加味不換金正氣散

治癰疽寒熱往來或挾風邪或
內氣虛餒蒼朮橘紅半夏麴蘗

香葉厚朴各一錢二分半甘草炙一錢白茯苓川芎各七分半木香五分右剉作一貼入姜五葉二

水煎服

止痛當歸湯

治癰疽穿潰疼痛人參黃芪當歸白芍藥生地黃官桂甘草各一錢右麤末水

煎服日

三劑

仙散

治癰疽疼痛不可忍白芷末潰用五錢貝母潰用五錢右剉每七錢半作一貼酒水相

半煎

服

香靈散

治癰疽腹痛辣桂二錢半木香白芍藥五靈脂各一錢二分半右麤末每三錢入姜末煎

服

托裏溫中湯

治癰疽陽氣下陷腹痛泄瀉咳逆昏悶
附子炮二錢乾姜羌活各一錢二分半

甘草炙一錢並智丁香沉香木香茴香陳皮
各五分左右剉作一貼入姜五片水煎服

癰疽通治藥

千金漏蘆湯五香連翹湯仙方活命飲升
陽益胃散千金內消散仙傳化毒湯榮衛

返魂湯紫金錠養命丹淵然真人奪命丹飛龍
奪命丹忍冬丸忍冬酒忍冬湯皆可用施

千金漏蘆湯

治五發癰疽及疔瘡內疽
切熱毒惡腫皆治之坊見一

五香連翹湯

癰疽瘡疔癰癰結核乳癰內疽
一切惡瘡毒腫皆治之坊見

仙方活命飲

一切癰疽惡瘡毒腫皆治之內外諸證
並治排膿止痛消毒之聖藥也坊見

升陽益胃散

五發癰疽及內外一切
惡瘡毒腫皆治之坊見

雜病篇

千金內消散

五發癰疽及背癰內疽一切惡瘡
毒腫乳癰腸癰便毒皆治之坊見

仙傳化毒湯

癰疽發背內疽乳癰一切
無名腫毒皆治之坊見

榮衛返魂湯

凡氣血逆於肉理令瘡結為癰疽毒腫
此藥大能順氣勻血調和榮衛逆治一

切諸癰
坊見

紫金錠

治內外癰疽惡瘡疔瘡無
名腫毒乳癰便毒坊見

養命丹

治內外癰疽發背疔瘡乳癰魚口
便毒一切無名腫毒惡瘡坊見

淵然真人奪命丹

五發癰疽發背疔瘡惡瘡
無名腫毒皆治之坊見

飛龍奪命丹

治五發癰疽發背疔瘡惡瘡乳
癰附骨疽一切無名腫毒坊見

忍冬元

通治一切癰疽諸瘡消渴後發疽尤宜服此

忍冬草不拘多少根莖花葉皆可用右入瓶

內好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許

搗為細末以所浸酒打麵糊和丸梧子大每服百

丸酒飲

任下

忍冬酒

治一切癰疽惡瘡背癰乳癰不問發在何處

初發便當服此百發百中忍冬藤生取一抱

以葉入砂盆研爛入酒少許調和塗付四圍中心

留一口又取五兩搥碎甘草生一兩到入砂瓶內

水二碗文武火煎至一碗入好酒一大碗

煎至三沸分三服田父野老最宜服此酒

忍冬湯

治一切癰疽內發外發乳癰腸癰常服托裏

消毒或加黃芪當歸各二兩尤妙方與上忍

冬酒方

癰疽鍼法

鍼者末如劍鋒以取大膿。夫癰氣之息者宜以鍼開除去之。註云息與瘰同死肉也。納○癰疽成膿以馬啣鐵作鍼形如韭菜兩面皆利可以橫直開裂以取膿血。精○癰疽如椒眼數十粒或如蜂窠蓮房而膿出痛不除宜以鉞鍼橫直裂之則毒血挾膿出而愈。○癰疽作膿若不鍼烙毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不鍼烙反攻其內欲望其生豈可得乎。瘡皮薄惟用鍼以決其膿血不可烙也。○凡近筋脉骨節處不得亂行鍼烙。○癰疽皮厚口小膿水出不快者宜用鍼烙。○大抵用鍼只欲引膿出如

鍼刺無膿是氣伏也不可用鍼烙。子

蟻鍼法

癰瘡初發漸大以濕紙一片搭瘡上其一點先乾處即是正頂先以水洗去人皮鍼取大

筆管一個要於正頂上却用大水蛭一條安其中煩以冷水灌之。蛭當吮其正穴膿血皮皺肉白是

毒散無不差如毒大蛭小須用三四條方見效若吮着正穴蛭必死用水救活屢試奇效如血不止以藕節上泥塗之得○蟻鍼一法可施於輕小證候若癰疽大毒積在臟腑徒竭其血於外無益也

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難穴者不用烙以開竅脉膿何由出○

膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則

毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功乎

潰瘍也淵○癰疽成膿宜烙可用銀篋大二分長

六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得膿為效淵○

近代良醫只以金銀鐵鋌其樣如鍼者以木炭熟

火猛燒通赤蘸油烙之尤妙隨鍼烙出膿者順也

如膿不出實者撚髮為紐虛者以紙為紐於紐上

蘸藥紐入鍼孔引出膿毒如腫不退疼不除急服

排膿托裏湯藥以助其勢。膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出。

癰疽灸法

凡癰疽之法或因內有積熱或因外寒鬱內熱若於生發之處艾灸以散其毒治之于早

可以移深為淺改重為輕諸項灸法皆好惟騎竹

馬灸法鍼覲尤為切要此消患於未形之策。

癰疽已覺微漫腫硬皮不變色脉沉不痛者當外

灸之引邪氣出而方止經曰陷下者灸之如外微

覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者

不可灸如有膿水亦不可灸當鍼之命保癰疽初

覺腫痛先以濕紙覆其上視之先乾處是頭也大

蒜切片安頭上以大艾炷灸之二壯即換一蒜痛

者灸之不痛不痛者灸至痛乃止大槩以百壯為

准最要早覺早灸為上如有頭則不必紙覆也

○若十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄

餅鋪頭上聚艾于餅上灸之旺○初發小點一二

餅鋪頭上聚艾于餅上灸之旺○初發小點一二

日急以蒜片貼其中心以小艾炷灸五壯而止

○始發一二日十灸十活三四日六七活五六日

三四活○灸法所以暢達拔引鬱毒此從治之

意也譬如盜入人家必開門逐之使出萬一門不

開無從而出必傷主乃已○頭為諸陽之會若

有發宜灸艾炷宜小壯數宜少三五壯而已腹背

則多灸為妙○多灸則內服乳粉托裏散防火

氣入心○有善治癰疽者皆於搶上灸至二三

百壯無有不愈但艾炷小作之小則人不畏灸灸

多則作效必矣○隔蒜灸法豆豉餅灸法桑枝

灸法附子灸法硫磺灸法土餅

灸法並治癰疽惡瘡腫毒

艾灸治驗

一人發背醫療逾月勢益甚有張生者教以艾火灸其上至一百五十壯知痛乃止

明日攝去黑痂膿盡潰肉理皆紅不復痛乃以膏

藥貼之口一易易時剪去黑爛月餘乃平復

灸石癰法

堅硬不潰各曰石癰當上灸百壯石子當碎出鱗

灸發頤法

此瘡最險頭面腫大牙齒亦脫解開頭髮尋頂螺中灸二十一壯如不達灸至四十

九壯而

止癰

灸疔疽法

大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度不爆難愈灸百壯無不愈

傳正

灸便毒法

用細草隨患人左右手量中指自手掌盡處橫紋量起通三節至指盡則佳不量爪

甲切斷即將此草於手腕橫紋量起引草向臂當

中草盡處即是穴艾炷如麥大灸二三壯腫消痛

止即

安得

調理及禁忌法

癰疽患時將理法選風邪○少睡卧○
勿驚憂○勿嗔怒○徐行動○省言語

○戒閨房○絕思慮○防觸穢○聽好事○瘡癩

洗○藥常助○盥漱聞香○二便順序○澤飲食

內充無飢飽失度○付藥運掉屈伸瘡口常加愛

護○妄用惡草愈滋其毒○不忌飲食反害其瘡

搨○惡肉去盡瘡口收斂欲平之際尙忌起立行

步揖待賓客酒肉宴會噴怒沐浴勞動等事直待

瘡痂平復精神如故氣力完全方無所忌百日內

慎勿觸犯韃○癰疽最宜節慎飲食其熱毒方甚

或發大渴多飲冷水及水漿之類此乃毒氣攻心

令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑卽止矣○

凡癰疽勿食羊雞牛鵝魚麩煎烤炙炒法酒等味

犯之必發熱蓋厚味能引起宿火之熱此誠富貴

參養口腹者所宜謹守若冬寒與虛老人寧無權

法乎畧加滋味以補胃氣庶易收斂○膿潰之

後氣血虛弱則可食羊肉鵝鶻蔓菁蘿菹姜醬貳
齋稀粥軟飯若肌肉漸生思想滋味則宜食白熟
酥餅蒸粥羹湯熟軟溫和不勿令大飽齋○諸痛痒
瘡瘍皆屬於心如茯苓葎神遠志益智石菖蒲等
項須當佐助於其間抑使病人不得憂恐嗔怒勞
精疲神有觸於心尤關利害補○背疽之人難於
隱伏用菜豆十餘斗作一大袋隱伏則自然心涼
身安齋○瘡瘍而赤雖伏火熱禁不得攻裏宜發
表以去之○瘡瘍齋胃俗呼
昏迷慎不可下汗之則愈疎

單方

凡三十七種
有陶潛膏

硃砂雄黃

古之瘍醫以五毒攻瘍中物也凡解瘡毒
不可無雄黃硃砂疎○硃砂雄黃膽礬白

礬磁石置瓦盒中火煨三日夜其烟上着蓋中以
雞羽掃取之以注惡瘡則惡肉附骨膿血卽潰出

大而愈此五

毒也歌

伏龍肝

諸癰疽發背一切腫毒以雞子黃和塗之或醋調或大蒜同研貼之並佳

煉石

諸惡腫及發背取石子火燒赤醋淬十餘度取屑為末醋調塗之即此造磨磴尋常石也

甘菊

治癰毒及疔腫垂死菊葉搗取汁飲一升神效○又取莖葉塗付疔上亦效名曰陶潛膏

野菊花

治疔瘡野菊花菜豆為末酒調飲醉睡覺痛定熱除

生地黄

治一切癰腫地黃搗為泥攤布上糝木香末於中再攤地黃泥貼腫上三度差

芫蔚莖葉

療疔瘡乳癰及諸腫毒搗取汁飲之滓外付

白鳳仙花

治癰疽發背取花連根葉搗爛先以米醋洗患處後付藥一日一換如神

辟荔

治背癰取葉爛研取汁和蜜飲數升以滓付瘡上一方細研和酒絞取汁煎敷沸服之

黃芪

治癰疽久敗瘡排膿止痛濃煎服之內托陰證瘡瘍必用之藥也

忍冬藤

治一切癰疽腫毒花莖與葉生搗煖酒調服

蒼耳

主疔瘡取莖葉燒存性醋調塗疔上當出根加雄黃尤妙○又方蒼耳一握生姜四兩搗取汁

入酒和服治疔毒入心嘔逆者效

白芷

治發背乳癰能止痛生肌蝕膿○敗膿不去加白芷即去

茅鍼

癰毒惡瘡不作頭酒煎茅鍼取汁服一鍼一孔二鍼二孔必穿穴

大黃

治癰疽熱毒大黃酒洗到二錢甘草一錢煎服脉實高粱之人宜服

茨菰

取根莖搗付腫毒癰上
即消水煎服亦效

槐花

治百腫瘡毒槐花四兩炒香入酒
二碗煎二三沸去滓盡服即消

黃桑葉

癰疽瘡口成大窟不斂經霜黃桑
葉為末頻糝瘡中或煎湯洗之

乳香

止痛長肉令諸瘡內消
凡血滯則氣壅經絡
滿急而作痛腫乳香能破宿血消腫止痛為瘡

家奇藥也

皂角刺

治癰疽能鑽引至痛處亦能宣毒
燒存性為末薄酒調不一錢

檨木皮

煎湯洗諸瘡敗爛及
乳癰諸瘡最佳

生龜

刺取血塗癰疽腫
毒即消神驗

蜘蛛 治懸癰取大者一個研爛調服隨病左右側卧良

脂麻油 治癰疽發背毒瘡初作便服使毒氣不內攻麻油煎十餘沸候冷一斤好酒二碗和勻分

五次温服一日夜盡此神仙截法 亦解陰證沉毒

雄雀屎 一名白丁香治癰腫已有膿未潰出以醋調雀屎如小豆大付之即穿出膿

甜瓜子 主腹內結聚破潰膿血最為腸胃腹內癰要藥為末酒下二三錢

蜀葵花 諸癰瘡腫毒痛不可忍葵根爛搗貼之立效。黃蜀葵花葉入塩研爛付之亦效

蒟 小蒜也治癰毒瘡腫叫呼不得卧取獨頭蒜細搗麻油調和厚付瘡上乾則易神效

人口中唾 凡癰癩微有紅頭隱疼者急用不語津唾頻頻塗之自消飲酒了不可用

猪鬃

治癰疽潰爛取猪鬃濃煎取清浸洗妙

商陸

熨除癰腫付惡瘡一切熱毒腫商陸根和少鹽搗付日一易效

苧根

癰疽發背未成膿者苧根葉熟搗付上日數易腫消即差

醋

消癰腫歌曰發背疔瘡識者稀醋磨京墨遠四圍生姜猪膽同塗上天明恰似鬼神移

赤小豆

消熱毒癰腫作末雞子清調塗之即差亦治一切腫毒作痛

芙蓉

治發背瘡癰諸般腫毒及杖瘡芙蓉花及葉並晒乾為末醋調付杖瘡雞白清調白蓮尤佳

荆芥

搗爛和醋付疔腫甚效又水煎取濃汁服之亦可

人屎

癰疽發背欲死取野人乾屎燒存性醋和如泥付腫上乾則易甚良又治疔腫封其上一日根

本草綱目卷之六十三雜病篇

本

穉

心應難費十翅之亦不林便服使壽氣不內功
誌關叶誦於六聖甚效又斤好酒一宛和勻分

芙蓉

配葶魚末醋臨於好蠶白背臨白蠶大圭丹
前發背發齋醋蠶動毒又好發芙蓉蘇又葉並

赤小豆

文唱美衣或一吐動毒亦減本
微蒸毒熱動外末幾平青臨空山農林

醋

四圍主美醋觀同空上天即制以史帳錄
出動觀如日發背發蠶蒸蘇翻觀京墨戲

帶

計於上日燂昆觀前噴蓋樺
乘血發背未如觀香帶妙葉煥付之亦效關

商

商剉妙味必益計於日一長效樺狗頭蒜
燙剉藥動於要藥石一吐燒毒動效林

蒜

對煎如帶氣我妙醋頭隱疾者急用不語洋
出燕直衝觀如散觀消飲酒了不可用關

東醫寶鑑雜病篇卷八下

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 許_臣涉 奉 教撰

諸瘡

大風瘡

脉風成爲癩癩者榮衛熱腐其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢積_納。大風之原有三種

五死一種風水二種傳變三種者自不調攝。五

死者一曰皮死疥木不仁二曰肉死割切不痛三

曰血死潰爛成膿四曰筋死手足脫落五曰骨死

鼻梁崩塌眼斷唇翻聲啞。又曰一風者肺受病

先落眉毛二風者肝受病面起紫疱三風者腎受

病脚底先穿四風者脾受病遍身如癩五風者心

受病先損其目。或者墳墓居址風水不吉或父

母夫妻家人遙相傳染或在外不謹糞坑房室床

鋪衣被橋上樹下歇息去處命值委死凶星遭此
惡疾宜服消風散追風散磨風元兼用洗藥敷藥
彌然○大風者是受得天地間殺物之風古人謂
之厲風者以其酷烈暴悍可畏也得之者須分在
上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫
中出在下者以通天再造散取惡物重積於穀道
中出所出雖有上下之殊然皆不外乎陽明一經
蓋陽明者胃與大腸無物不受乃脾肺二臟之腑
也脾主肌肉而肺主皮毛乃腑及於臟病也○
服藥下虫積後用防風通聖散助調之重者又
與換肌散夫上下同得者甚重自非醫者神手病
者鐵心罕能免此若遇此疾切須戒搯及一切口
味公私世務悉宜屏去○此疾須治得愈若不
絕味斷慾皆不免再發而終於不救孫真人曰嘗
治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋
無人能守禁忌耳○初起白屑紫雲如癩風然

或有遍身白皮脫落如蛇蛟狀繡起白屑者白
花蛇丸眉鬚落者三蛇丹鼻崩者換肌散補氣瀉
柴湯通用凌宵花散加味苦參丸換骨丸大麻風
丸紫雲風丸追魂追命再造散烏蛇芍參元可選
馬脂○治癩以蒼耳葉為君更以酒煮烏鱉魚代
補蛇之或缺為末糊丸梧子大茶清下七八十九
更入紫萍尤捷數月而安○脈藥瘳後終
身不得食牛馬驢騾等肉犯者復發必死繡

消風散

第一日服白芷全蝎人參一兩右為末每二
錢勿食晚飯次日空心溫酒調下身上微燥

為效
類

追風散

第二日服瀉血追虫錦紋大黃六兩爵金蟬
脫各一兩八錢炒皂角刺一兩半右為末初

服五錢或六錢入大風油一錢半朴硝少許入內
好溫酒一碗調化五更空心服之直待辰時又如

前調藥一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水盥
漱淨然後服藥必以蜜解口切不可卧良久痛瀉

數次不妨以薄粥補之○此藥老弱者難治五十
以下者可治精壯者十日內三服謂如正月初一

日服消風散初二日服追風散初三日服磨風

丸又如此周而復始瘦弱者十日內一服類

磨風丸

第三日服日進二次當歸羌活獨活川芎天
麻細辛防風荆芥威靈仙麻黃何首烏蔓荆

子牛蒡子車前子皺面草薺蟻蒼耳草各一兩右
晒乾為末酒麩糊和丸梧子大溫酒下五七十九

日二服仍用後

藥熏洗糝付糝

洗藥

治滿身瘡爛地骨皮荆芥苦參細辛各二兩右
判以河水煎用大桶盛浸浴熏洗通身出血為

類效

敷藥

治瘡爛遍身黑狗脊細蠟寒水石硫黃白礬枯
各二兩蛇床子二兩朴硝五錢右為末臘猪脂

調付
妙顯

浴法

治遍身癩瘡桃柳桑槐楮五般枝多水濃煎
湯盛大桶浸坐沒頸一日浴湯如油安矣註

醉仙散

治大風癩瘡胡麻牛蒡子枸杞子蔓荊子各
一兩同炒白蒺藜苦參瓜蒌根防風各五錢

右細末每十五錢末入輕粉二錢拌勻每服一錢
茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內

出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿血惡臭氣
病根乃去矣研○服此藥時須斷鹽醬醋諸般魚
肉油膩燒炙之物只吃次粥及煮熟時菜并
烏蛇白花蛇淡酒煮熟食之以助藥力研

通天再造散

治同上皂角刺黑大者一兩半大黃煨
一兩白牽牛頭末三錢炒三錢生薑金

五錢石爲末每二錢或三錢早晨面東好酒調下
當日利下惡物或膿或虫嘔服藥後泄出虫視
其色如虫黑色乃是多年赤色是爲近年三四日
後又進一服直候無虫乃止後取防風通聖散
服調理痛斷滋味胡

換肌散

治大風年深毛脫鼻塌深重者取效如神烏
蛇白花蛇地龍各一兩當歸細辛白芷天麻

蔓荆子威靈仙荆芥穗甘菊苦參紫參沙參木賊
不灰木甘草炙白蒺藜天門冬赤芍藥赤箭何首

烏石菖蒲胡麻子草烏蒼木木鱉子川芎各二錢
半右爲末每五錢温酒調下酒多爲妙其中紫參

不灰木雖
無不妨

補氣瀉榮湯

治癩風先砭瘡上令惡氣消盡後服此
藥連翹升麻各六分桔梗五分黃芩生

地黄各四分黃芪蘇木黃連地龍全蝎當歸各三分
分白豆蔻人參各二分甘草一分半胡梧淚一分
麝香少許桃仁三個爲泥蜜虫炒水蛭炒各三個
爲末右剉除胡桐淚麝香蜜虫水蛭另末外都作
一貼水一盞酒一盞煎至一盞去滓入細
末藥煎至七分早飯後午飯後服之鍊

凌霄花散

治癩風神效蟬殼地龍炒白殭蚕全蝎炒
各七個凌霄花五錢右爲末每二錢熱酒

調下

加味苦參丸

治大風瘡苦參四兩防風荆芥蒼耳子
胡麻子皂角刺各二兩半蔓荆子牛蒡

子枸杞子何首烏禹餘糧蛇床子各七錢半白芷
四錢右爲末皂角煎膏和丸梧子大茶清或酒下

五十丸

換骨丸

治癩風苦參浮萍各一兩半大黃槐花白芷川芎各一兩二錢半蒼朮一兩乳香沒藥沉

香木香各三錢麝香五分右為末以麻黃五斤煎膏和丸彈子大每一丸溫酒化下忌風二三日

大麻風丸

治大麻風初起遍身瘡點五色不知痛痒麻木證苦參一斤龜活獨活白芷白欬白

茯苓天花粉何首烏各一兩三錢皂角刺當歸各二兩七錢右為末別用皂角一斤剉水煎五日去

滓熬膏和丸溫

酒下百丸

紫雲風丸

治癩初起如紫雲癩風或發紫血疱瘡何首烏四兩五加皮白蠟蚕苦參當歸各二

兩全蝎一兩半槓實羌活獨活白芷細辛生地黃

防已黃連赤芍葯蟬退防風荆芥蒼朮各一兩右

為末酒糊和丸梧子大溫

酒或米飲下七八十丸

返魂追命再造散

治大風癩皂角刺一兩半大黃一兩右為末每二錢冷酒調下馮虫

山

一治大風勢重不可救者皂角刺一二

片九蒸九晒研為末食上濃煎大黃湯調下一錢

一旬鬚髮再生肌膚悅潤

眼明倍常其效如神

烏蛇苦參元

治癩風及惡癬苦參二斤半烏蛇肉八兩石菖蒲四兩右為末蜜丸梧子大茶

清下百

丸煉

愈風丹

治癩疾深重一名三蛇丹治大風髮脫眉落遍身麻木瘡爛烏蛇白花蛇土桃蛇各一條

並酒浸三日取肉為末苦參一斤剉搗取頭末四

兩皂角濃煎汁熬膏和九梧子大以防風通聖散

煎水吞下五

十九日二

白癩瘡 癩風初起白屑剝落又一種每朝瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄黃元明觀兼

服白花蛇丸

白花蛇丸 治癩風白屑瘡痒皮膚皴燥白花蛇一條

當歸二兩川芎白芷生地黃防風荆芥黃芩連翹胡麻子何首烏升麻羌活桔梗各一兩右為末將浸蛇酒和水煮麩糊和丸梧子大茶清下

五七十丸

白花蛇酒法 治大風癩瘡白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先安酒麩次將蛇以絹袋盛之

頓於麩上然後以糯飯和勻頓於蛇上以紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每温

酒一盞調蛇末一匙服之仍以酒脚并糟做餅食之○烏蛇釀酒法亦同上

鍼法

癩風者素刺其腫上已刺以銳鍼鍼其處按虫

其惡氣腫盡乃止常食力食無食他食聖○病

大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出

天疱瘡

一名楊梅瘡與癩大同多由肝脾腎風濕熱之

毒因男女房室傳染形如楊梅蝦紅濕爛痒痛

紫脉山死血但不可令出太過恐損真氣聖

若属心多生乳脇○形如鼓釘黃豆者属脾多生

滿面○形如綿花者属肺多生毛髮○形如紫蒲

荀按之緊痛者属肝腎多叢生於尻鬻兩陰筋骨

癩瘡

之處○形如魚泡內多白水按之不緊者謂之天

疱瘡乃此類之輕者聖○初起即服防風通聖散

一貼去麻黃以去內毒再用一貼去硝黃發汗以

去外毒以後用加減通聖散丸多服之此方為首

尾要藥輕者一劑重者十貼後宜服化毒散三日

東醫寶鑑

卷下 雜病篇

六

却用吹藥三日瘡乾欲落欲落再服化毒散三日
後量用通聖散加減嗽○失治久則風毒流入經
絡而成頑癬或氣血虛敗而成漏或悞服水銀輕
粉而成風惟腫爛流膿出汗病至於此治之爲難
亦有蝕傷眼鼻腐爛玉莖拳攣肢體與癩無異嗽
○初起宜服消風敗毒散加減通聖散加減通聖
丸西聖復煎丸消腫遺糧湯○筋骨痛宜香鰾湯
通仙五寶丹仙遺糧湯換骨散回生保命丹茯苓
湯○成漏宜象牙丸○通治宜用活魂丹水硃丸
六六丸天疱丸三黃敗毒散取輕粉法○外治宜
洗方搽方熏鼻方吹藥方照藥方

方滅癩法禁忌法鵝掌癬治方

加減通聖散

治楊梅瘡初起牛蒡子一錢二分防風
白鮮皮赤芍芍藥連翹黃芩各一錢金銀

花五分梔子仁當歸尾各七分荆芥槐花各六
分白殭蚕甘草各四分右剉作一貼水煎服嗽

加減通聖丸

治同上即前方共半斤再加苦參半斤右為末酒糊或蜜和丸梧子大酒飲任

下七十

丸散

化毒散

治楊梅瘡重者生大黃一兩煎熱穿山甲五錢煎白殭蚕三錢煎蜈蚣一條當歸尾五

錢

右為末每二錢

溫酒調下日二服門

消風敗毒散

治天疱楊梅瘡初起當歸尾川芎赤芍

黃栢連翹防風各八分羌活金銀花甘草各五分
蟬殼二個初服加大黃二錢芒硝一錢半下

用右剉作一

貼水煎服春

皂根丸

治楊梅瘡成頑癬當歸二兩黃芪一兩半人參陳艾各一兩麻黃五錢皂角樹根皮四兩

本草綱目卷之六 雜病篇

右為末蜜丸梧子大土
茯苓湯下五十九丸

仙遺糧丸

治楊梅瘡後腫塊成癰土茯苓一斤防風

鮮皮皂角刺各五錢白芥子四錢當歸身七錢右
為末蜜丸梧子大酒飲任下五七十九丸或浸酒服

忌生冷雞豬魚
煎炒等物

西聖復煎丸

治楊梅瘡後腫塊經年破而難愈百方
不效用此如神乳香沒藥孩兒茶丁香

各一兩白花蛇阿魏血竭各四錢俱為末白麩炒
一斤蜂蜜六兩煉香油四兩煎熟大棗二十枚去
皮核右和勻擣千杵丸如彈子大每一丸土茯苓
二兩水二碗煎至一碗入藥丸再煎至半去渣溫

服

消腫遺糧湯

治楊梅瘡後腫塊土茯苓十五兩木通薏苡仁防風防已赤茯苓金銀花木呖

白鮮皮皂角刺各五錢白芥子炒研四錢當歸身七錢右剉分作二十貼每一貼水煎服朝夕兩服

研

香鰾湯

治楊梅瘡毒筋骨疼痛齒根麻黃烏葯細茶槐花炒用椒各五錢魚鰾三錢以芝麻同炒

成球乳香一錢右剉分作二貼每一

貼姜葱各五水煎服二三貼即愈

通聖五寶丹

治楊梅天疱綿花等瘡潰爛見骨或筋骨疼痛或遍身疱疹或成赤白癩鵝掌

癬或皮破肉爛口臭難當一切頑瘡惡毒並皆治之鍾乳粉三分丹砂二分琥珀片腦各五釐真珠

二釐半右細末每服五釐另入飛白霜二分半炒

過合作一貼每日取土茯苓一片水煎取汁十碗

以湯一碗入藥一貼攪勻晨服其茯苓湯須一日服盡不可別用湯水服一料即愈神驗乃治楊梅

天下古今第一仙方也
春回○飛白霜疑是輕粉

仙遺糧湯

治楊梅風毒或誤服輕粉以致癱瘓筋骨疼痛毀肌傷骨者服此除根永無後患土

茯苓七錢

兩者

防風木瓜木通薏苡仁白鮮皮金

銀花各五分皂角刺四分右剉作一貼水煎日三

服

換骨膏

治天疱瘡筋骨疼痛土茯苓四兩皂角刺一兩半天花粉當歸荆芥麻黃梔子連翹各一

兩乳香沒藥各一錢半右剉分作十貼每

取一貼水三碗煎至一碗分二次服之

回生保命丹

治楊梅天疱頑瘡及輕粉毒筋骨腫痛不拘新久皆效槐花一兩輕粉四錢二

分硃砂四錢川芎白芷雄黃各三錢當歸炒二錢
丁香香血竭孩兒茶各一錢乳香沒藥各五分牛黃

四分右為末棗肉入米粉打糊和丸黍米大用
土茯苓一兩牙皂半個同煎湯吞下日三服

夫
茯苓湯 治遠近楊梅天泡瘡毒甚至腐爛肌肉膿汁
流出臭不可聞痛不可忍蕙以仁皂角刺木

灰白芷當歸尾黃栢生地黃牛膝白芍藥防風各
一兩皂角川椒紅花各五錢甘草節羌活各七錢

金銀花二兩土茯苓四兩右剉分作
十五貼每一貼水煎服日二次

象牙丸 治楊梅瘡成漏象牙三錢驚甲猬皮並燒各
一個右為末棗肉和丸櫻桃大每一丸空心

以童尿化下茶清亦可七日後
取三味末豬膽汁調付瘡上

活魂丹 治楊梅天泡瘡潰爛喉穿鼻崩膿淋漓血
竭乳香沒藥銅綠白礬枯黃丹穿山甲煨焦

各一錢輕粉蟾酥各五分射香一家右細末蝸牛
研如泥和丸菘豆大每一丸重者二丸細嚼葱白

異藥熱酒送

下空心

水硃丸

治年久楊梅頑瘡不愈者水花硃柳一錢
枯白礬朱砂各一錢半右為末用全蝎酒煎

膏和勻分作六丸分三日服以羊

肉鮮魚等物送下丸日全愈

六六丸

治天庖楊梅瘡輕粉一錢三分黃丹八分朱
砂雄黃各五分乳香射香各三分右為末糯

米糊和勻分作六丸每

日茶清下一丸

天庖丸

治同上輕粉一錢半朱砂雄黃陳石灰各半
錢右為末陳米飯和丸菘豆大每三丸茶清

吞下
始瘡

三黃敗毒散

通治天庖楊梅等瘡防風荆芥連翹白芷當歸赤芍芍藥黃芩黃連梔子地骨皮

五加皮白鮮皮木瓜苦參蟬退金銀花薏仁白殭蚕皂角刺黃栢白蒺藜川芎樹膠木通斷膠甘

草各一兩土茯苓一斤半右剉分作

二十五貼每取一貼水煎服日二餐

取輕粉法

取出腹內輕粉之毒可免後患用開口川椒每空心以土茯苓煎湯吞下三十粒即

利輕粉於椒內從大便出洗起

川椒服以椒內無輕粉乃止門入

仙遺糧

善治久病天庖楊梅癰漏及曾誤服輕粉肢體廢壞筋骨疼痛者能收其毒而祛其風補

其虛。右一味為末蜜丸梧子大川椒煎湯吞下

五十九鼻崩眉落筋緩骨拳者皆效但初起肺熱

便秘者

勿服門入

一方 治楊梅天庖諸瘡香油二斤入水一盞煎至白烟起收貯每用黃酒一鍾入油一盞溫服日三

次服盡全愈。又方鴨一隻餓二日只與白水飲之用輕粉一兩粳米飯四兩拌勻喂鴨待吃盡以

葦根槌碎泡水令鴨飲之解去輕粉之毒待鴨毛落盡煮鴨食之

洗藥方

治楊梅瘡爛防風蒼耳子地骨皮荆芥苦參細辛各三兩剉以河水煎盛大桶浸浴薰洗

通身出汗出血為效。又方苦參蛇床子白礬荆芥濃煎湯浸洗。又桃柳桑槐楮濃煎湯浸

浴亦佳

搽藥方

治楊梅天庖遍身瘡爛杏仁十四枚鉞挑火上燒半生半熟輕粉一錢片脂二厘為末猪

膽汁或香油調搽。又野菊花素米根煎湯洗後防風通聖散同蚯蚓糞為末略炒蜜調付之極

妙嗽○又用千金散射香輕粉散

千金散

治楊梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢輕粉孩兒茶白礬枯各五分膽礬三分射

香二分右為末先以豬膽汁洗瘡後搽上

麝香輕粉散

治天庖瘡爛及諸惡瘡白礬乳香各一兩輕粉五錢射香半錢右為末每取少

許糝付之始瘡

薰鼻方

治楊梅天庖瘡瘡熏鼻甚奇黑鉛水銀各一錢朱砂乳香沒藥各五分血竭雄黃沉香各三

分右為末和勻捲作紙撚七條用香油點燈放床上令病人放兩脚包住上用單被通身蓋之口擒

凉水頻換則不損口頭初日用三條後日每用一條熏之

錫熔化入二味和勻研末捲作紙撚九條每早晚
各一條用紙作罩勿令泄氣熏鼻孔男左女右口
喻涼水溫則易之一日熏
三次三日九次全愈

吹藥方

治楊梅天庖瘡黑鉛八分溶化入水銀一錢
同結成餅銀珠輕粉各錢半炒白礬雄黃各

一錢爲末束肉搗勻分作六丸每取一丸放火籠
內令病人以巾包頭口吹眼看其藥丸待烟盡自
止當日早午晚各吹一丸次日早午吹二丸第三
日只早吹一丸吹後三五日或口流涎以黃連棗
豆煎湯解之又服化毒散坊見三日後
以加減通聖散九坊見調理斷根

照藥方

服茯苓湯後次用照藥水銀黃丹炒白錫各
一錢血竭末五錢京香三分無麝香者右爲

末用熟艾鋪紙入藥在中捲作條放盞內入香油
一碗將藥條作燈心點火安木桶內四圍用單被

圍住勿泄氣眼看燈口噙涼

水熱則換水盡藥條為度

滅癩法

治天疱楊梅瘡愈後癩痕紅黑用大黃白礬等分同研擦患處其痕即去如常

禁忌法

天疱楊梅瘡忌食牛馬狗肉雞猪魚生冷及酒麪茶油膩辛辣等物痛斷酒色宜少食

翻

鵝掌癬

凡天疱楊梅瘡脈輕粉愈後手掌上發癬退皮一層生生不絕名曰鵝掌癬亦曰鵝掌風

宜服蒼耳散擦玉脂膏

大菊花蒼耳末以線縛定煮爛食之次日用白鮮

皮皂角雄黃各五分鈇炒水銀三分為末臨臥以

鵝脂姜汁調擦次早以磁鋒磨刮去龕皮眼蒼耳

散擦玉脂膏更須勞宮或內關穴斷根

黃丹輕粉等分為末猪油調擦一川烏草烏何首

烏天花粉赤芍藥防風荆芥蒼木地丁

各一兩艾葉四兩煎水熏洗立效

春回

蒼耳散

治鵝掌癬猪牙皂角土茯苓甘草各二錢蒼耳子金銀花皂角刺防風荆芥連翹各一錢

天麻前胡蛇床子各五分右剉作

一貼姜一片川椒一撮同煎服

玉脂膏

治同上牛乳栢油融燭燭香香油黃蠟各一兩溶化乃入胡粉二錢輕粉一錢半麝香五分

右為末入內攪勻抹癬上火

土烘擦再烘再擦如神

瘰癧

瘰癧之證內經謂之結核是也生頸前項側結核如大豆如銀杏曰瘰癧生胷腋下堅硬如石形

如馬刀蛤曰馬刀刀○結核連續者為瘰癧形長

如蛤者為馬刀腳○繞項起核名曰蟠蛇癧多生

肩項或赤或白或沉或浮初生如豆久似核年月

浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三

生六七是也用性努力思慮過久則疼痛赤腫早
 治為上綱。○流注癰者婦人多有之其性急噪其
 氣怫鬱其心熱著初生在項破後流注四肢遍體
 結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或
 流膿汁是也又名千歲瘡化氣調經湯主之。○
 瘰癧始起於小陽不守禁忌延及陽明大抵食味
 之厚鬱氣之積皆此二端招引變換以其屬膽經
 主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經
 行寒熱不作則可生稍久轉為潮熱危矣自非斷
 慾絕盧食淡雖神聖不可治也。○膽與肝合且
 主筋病則筋累累如貫珠寒熱焮痛乃肝氣動而
 為病也當清肝火為主宜清肝益榮湯。○五藏柴胡
 清肝湯。○癩觀梳子清肝湯。○肝燥火動而筋攣
 補中勝毒餅為主多怒火宜清肝解鬱湯。○五藏
 寒熱單夏枯草散。○通用貓頭丸。○海藻散。○堅丸。○
 治法大槩以地膽斑貓為主。○滌泄小便以瀉心火。

立應散是也然性甚峻服後量體調治實者宜熱

丹虛者托裏益氣湯方見人臍○瘰癧之毒莫不

有根地膽斑貓製度如法能使其根從小便中出

或如粉片或如塊血或如爛肉皆得其驗耳但毒

根之行小便必澁當以木通滑石輩導之然使毒

必從小便出者何哉蓋諸痛痒瘡瘍皆屬於心故

也也○通治宜化氣調經湯貓頭丸海藻散堅丸

宣熱丹三聖丸小犀角丸散腫潰堅湯內消丸琥

珀散蠟礬元天花散夏枯草散○瀉肝膽火宜梔

子清肝湯○瀉毒宜立應散薄荷丹白蛇散四聖

散○補虛補中勝毒餅益氣養榮湯○馬刀

槍宜連翹散堅湯消腫湯柴胡通經湯端

化氣調經湯

通治流注瘰癧橘皮二兩香附子酒浸製姜活白芷各一兩牡蠣粉天花粉皂

角刺甘草各五錢右為研細末每二錢清酒調下日三服

末每二錢清酒調下日三服

梔子清肝湯

治肝膽火盛耳後頸項胸乳等處紅腫痛寒熱柴胡二錢梔子酒炒牡丹皮

各一錢三分赤茯苓川芎赤芍芍藥當歸牛蒡子各一錢青皮甘草炙各五分右剉作一貼水煎服

補中勝毒餅

治瘰癧馬刀瘡黃芪一錢半連翹一錢防風升麻柴胡甘草各五分當歸生地

黃熟地黃白芍藥陳皮人參各三分右為末湯浸蒸餅調和捏作二餅子曬乾每一餅搗為末白湯

調下

夏枯草散

大治癰癧散結氣有補養厥陰血脈之功夏枯草末六錢甘草末一錢右和勻每二

錢茶清調下○又取一兩水煎服虛者多服益善兼服十全大補湯虧配加香附遠志貝母治瘰癧

馬刀退寒熱之聖藥也

貓頭丸

治瘰癧馬刀已破未破皆效貓頭骨一個炙
蝸蝓一個以朱砂三錢填入腹內瓦上炙焦

南星白礬各一兩右為末黃蠟熔化
和丸菜豆大臨臥米飲下三十九丸

海藻散堅丸

治瘰癧馬刀堅硬形瘦潮熱兼治癭氣
神麩四錢海藻昆布草龍膽蛤粉通草

貝母白礬枯真松蘿各三錢半夏二錢右為末蜜
丸菜豆大蔥白湯下三十九丸或取末二錢溫酒調

服

宣熱丹

解瘰癧風熱之毒自小便出薄荷皂角連翹
何首烏蔓荊子三稜荆芥各一兩右為末熱

醋浸豆豉二兩半搗膏和九楮

子大熱水下三十九日一服

三聖丸

通治瘰癧丁香五十粒斑貓十個去毒炒麝
香一錢右為末鹽豉五十粒湯浸研如泥和

九菘豆大每服五七丸空心温酒送下日進三服
五七日外覺小便淋澀或下如青筋膜之狀是病

之根也

小犀角丸

治諸癰應效如神常服去根黑丑半生半

錢右為末皂角二條去皮弦子湯浸絞取汁一碗
新薄荷二斤取汁同熬膏和丸梧子大連翹薄荷

湯吞下三十丸食後服

散腫潰堅湯

治癰癰及馬刀瘡堅而不潰或潰出膿

水黃芩一錢酒洗半生半炒草龍膽酒
洗六分瓜蒌根酒洗黃柏酒炒知母酒炒桔梗昆
布海藻各七分柴胡六分炙甘草三稜酒洗莪朮
酒炒連翹各五分葛根白芍藥當歸梢各四分黃
連酒洗升麻各三分右剉作一貼水浸半日煎服

食後去枕低頭而卧含一口作十次嚥下徐徐服之另搗一料為細末蜜丸菜豆大每取百丸以煎

藥湯送下

內消丸

治癰癤結核熱毒鬱滯服之內消黑丑八兩取末青皮陳皮各二兩右為末以薄荷皂

角各三兩煮爛取汁熬膏和丸菜豆大

以荆芥茶清吞下三十丸食後服

琥珀散

治癰癤結核內消神效白丑頭末滑石白礬

琥珀各五分斑貓三錢去翅足炒甘草

三錢琥珀二錢右剉分作六貼水煎服

天花散

治癰癤潰爛疼痛金銀花二錢赤芍藥一錢

正當歸各一錢貝母七分沒藥五分

乳香二分右剉作一貼酒水煎服

立應散

治癩癰馬刀瘡連翹赤芍藥川芎當歸滑石甘草各五錢黃芩斑貓去毒炒各三錢白丑

頭末生土蜂房蜜水洗飯上蒸晒乾各二錢半川烏尖七箇右為末每一錢濃煎木通湯調下臨卧

服毒從小便出如粉片血塊是也未效再服斑貓性毒濟以烏尖或衝上麻悶嚼葱白茶清下以解

之如尿澁益元散或五苓散燈心煎湯調下宣毒後繼服薄荷丹解其風熱

薄荷丹

解癩癰毒服藥從小便出後常服此薄荷皂角連翹何首烏蔓荆子三稜荆芥各一兩右

為末豉二兩半以熱醋澆豉令軟研為糊和丸梧子大熟水下三十九髓

白蛇散

治癩癰馬刀丸瘦寒熱作痛白蛇肉二兩青皮黑丑頭末半生半炒各五錢犀角二錢

半右為末每一錢入輕粉五分研勻五更以糯米飲調下巳時利下惡物乃病根也十日後再服後

用四聖散補之永斷根門

四聖散 治癩癰用白蛇散取轉後用此補之海藻石決明煨羌活瞿麥各一兩右為末每二錢米

飲調下日三服下
清水盡為妙

蠟礬元 治癩癰馬刀惡瘡衛護內膜驅解諸毒自然內消神效勸觀

益氣養榮湯 治懷抱抑鬱癩癰流注日日發熱或潰而不斂黃芪一錢半人參白朮各一錢

當歸酒洗川芎白芍藥酒炒生地黃陳皮香附子貝母各七分柴胡桔梗地骨皮甘草炙各五分右

剉作一貼水煎服日二次

連翹散堅湯 治馬刀癩癰流注遍體作核作瘡柴胡一錢半草龍膽酒炒四次土瓜根酒炒

各一錢二分黃芩酒炒三次一錢當歸梢生黃芩蓬朮酒炒三稜酒炒連翹白芍藥酒炒各七分炙甘草五分黃連酒炒蒼朮各四分右剉作一貼水浸半日乃煎去枕仰卧一口作十次嚥之留一口送下丸藥另取一劑爲細末蜜丸棗豆大每百丸以煎藥水送下更以龍泉散塗之

消腫湯

治馬刀瘡連翹二錢生黃芩柴胡各一錢二分天花粉黃芪各一錢當歸梢甘草各七分

鼠粘子黃連各五分紅花二分右剉作一貼水煎服

柴胡通經湯

治少陽經分項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡桔梗二錢柴胡連翹當歸尾黃

芩黃連並酒炒鼠粘子三稜甘草生各

一錢紅花一分右剉作一貼水煎服

一方

治癰癤烏雞卵一枚穿頂納斑貓一箇紙封其竅蒸熟去貓日一服煎五積散勩送下四五

效即

外治法

凡癰瘻馬刀荏苒日久內必成膿若腫高消軟其人面色萎黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以

鍼刺核中用追毒蝕肉鉸子維之用膏貼之精義○

治法以火鍼刺入核中納蟾酥膏于中外用綠雲

膏貼之三日後取去核中稠膿膿盡取去核外薄

膜先破初起之核一枚以絕其源服藥則後出者

皆愈或不能收如銀杏者盡皆開了用藥取之其

自潰者猶如十果之腐熟肉雖潰而核猶存故膿

水淋漓久難得愈治法用鐵烙燒赤烙去其破核

猶存者併肉潰處次用金寶膏追去蠹惡之根遂

能長肉

而愈

蟾酥膏

蟾酥如大三
寒水石寒

白丁香十五枚巴豆肉五粒
各少許右各另研合和再研

蜜丸菘豆大每一丸或二丸三丸納入鍼
竅中如膿未盡再納數丸以膿盡為度

綠雲膏

黃連大黃黃芩玄參黃柏木鱉子肉各一錢
右剉香油一兩同煎焦色去滓入松脂五兩

再煎成膏濾入水中扭拔如金色再熬放溫入猪
膽三個汁銅絲醋浸一宿去滓三錢攪勻如常攤
貼如瘡口不乾加乳
香沒藥輕粉尤妙

金寶膏

去腐肉惡肉不傷良肉桑柴灰五碗以沸湯
十碗淋濾取汁穿山甲煨胖二兩信砒一錢

杏仁七枚三味同研細生地黄二兩朱砂一錢輕
粉麝香各半錢右將灰汁下鍋煎膿下甲末等及
地黃汁候焦乾下射香次下輕粉次下朱砂候將
成膏下炒石灰末一兩以成塊子收入罐內勿見
風每取付核上再付即
去舊藥併醫即效

禁忌法

人有此患不惟懲忿窒慾其於飲食百味一切
戒之謹○切忌毒藥點蝕及妄用鍼刀割破必

死戒
之續

糝貼藥

凡瘰癧馬刀惡瘡宜用糝蠶散貓蝠散代炙散
龍泉散蝸牛散燒灰散生肌散選用○初起未

破十香膏琥珀膏雜坊見常貼之可自消○治

瘰癧神效方白膠香海蝶蛸降真香等分爲末糝

患處外以水紙掩之一夕而退○又方未破者蜜

蜂二十一一個蛇蛻七分半蜈蚣二條端午前收者

右用香油四兩同熬成入光粉二兩以桑枝七條

急攪候冷出火氣七日收貯每用攤紙上貼患處

○此二方不須服藥只

貼上五七日可便消

糝蠶散

治瘰癧糝蠶三個白朮砒霜各一錢右並
水煨爲末糝爛肉上三日其核卽下

引

貓蝠散 治癩癧多年不愈神效
貓頭骨一個 蝙蝠一個
個右二味俱撒黑豆上同燒存性研爲末乾

馱 糝

代灸散

治癩癧潰爛臭不可聞
鉛粉雄黃各一錢 輕粉五分 射香二分 右爲末 用槐皮一片 將鍼

密刺孔 置瘡上 上糝藥一撮 以炭火灸熱其氣自然透入 瘡中 痛熱爲止 二三次全愈

龍泉散

治癩癧 鉛粉龍泉粉炒即磨刀礪上粉也 昆布蓬朮三稜各五錢 三味酒浸炒乾 右極細

末 熟水調塗瘡上即效 癩癧先出一個用四楞鐵環定住 不令出移 破作口了 以油紙然維之 勿

令合了 以絕其瘡源 其效至速 如瘡不破 或病人不肯破 龍泉散塗之 三日一易

蝸牛散

治癩癧潰與未潰皆可 蝸牛不拘多少 以竹簽貫穿瓦上晒乾 燒存性爲末 入輕粉少許

取猪骨髓調勻攤紙花貼瘡上一
方蝸牛肉七個丁香七粒用如上法一

燒灰散

治同上大田螺并穀肉燒存性爲末破者乾糝未破者油調付續

生穰散

治同上生穰一個取四足臍尾莆并兩耳右燒存性爲末油調先洗瘡後塗之立效續

洗傅方

治瘰癧白芷荆芥煎湯溫洗拭乾貼膏藥膿汁出盡後半夏南星血竭各一錢輕粉少許

爲末唾

調傅續

難治可治證

帝曰寒熱癰癧生於頸腋者何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣留於脉

而不去者也帝曰決死生奈何岐伯曰反其目視

之其中有赤脉上下貫瞳子見一脉一歲死見一

脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半

死見三脉三歲而死見赤脉不下貫瞳子者可治

也經閉。婦人患癰癧經調及經閉無潮熱者可治

日服一貼七八日自消。男子患癰癧有潮熱者

咳乃癰癧傷證之標也。故勞瘵類有曰腹中有塊

頸上有核最為難治。癰癧延及

胸中中府雲門肺經部分者死效

灸法治癰癧以手仰置肩上微舉肘取之肘骨尖上

灸法

是穴隨患邊灸七壯或二七壯神效效。又法

於掌後手腕盡處橫紋量起向臂中心直上三寸

半是穴灸三壯即效效。秘法肩尖肘尖二穴即

肩隅肘膠二穴宜灸此穴疎通經絡效。

癰核上每灸七壯隔蒜片灸之尤妙效。

獨形而小核者為結核效。結核者火氣熱甚則

鬱結堅硬如果中核也不須潰破但熱氣散則自

消效。結核在一身如腫毒若在皮裏膜外多是

濕痰流注作核不散問其平日好食何物吐下後

結核

用藥散核。痰癥推動消軟。結核在頸項。

二陳湯痰方加酒炒大黃桔梗柴胡連翹煎服。

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂

角刺白殭蚕煎水入麝香少許服行太陰厥陰之

積痰則自消。通身有核多是痰注宜加味小

胃丹竹瀝達痰丸二防見通用海帶丸含化丹

痰湯內托白欽散消解散消核丸

海帶丸治痰核瘦氣久不消海帶青皮貝母陳皮各

等分右為末蜜丸彈子大食後嚙化一丸

含化丹治耳項結核酒蒸大黃白殭蚕青黛牛膽南

星各等分右為末蜜丸彈子大食後嚙化一丸

消風化痰湯治結核因風痰鬱結白附子木通各一

錢南星半夏赤芍連翹天麻白殭蚕

丸

消風化痰湯

治結核因風痰鬱結白附子木通各一錢南星半夏赤芍連翹天麻白殭蚕

蒼耳子金銀花天門冬桔梗各七分白芷防風羌活皂角各五分全蝎陳皮各四分甘草二分右剉

作一貼姜五

片水煎服

春回

開氣消痰湯

治胸中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者桔梗便香附白

僵蚕各一錢陳皮黃芩枳殼各七分檳榔前胡半夏枳實羌活荆芥射干威靈仙各五分甘草四分木香三分右剉作一貼

入姜三片水煎服

醫

肉托白斂散

治腋下痰核因酒怒氣發腫痛潰膿久不差赤芍芍當歸連翹各一錢白芷白

欽片芩酒炒瓜蒌仁各八分川芎天花粉乳香各七分防風桔梗柴胡各五分白蒺藜生甘草各四

分右剉作一

貼水煎服

春回

消解散 治咽喉結核腫痛頸項不得舒轉兩腋下或有塊如石硬南星半夏各一錢陳皮枳實桔

梗柴胡前胡黃連連翹赤芍藥防風獨活白附子蘇子蓬朮蔓荊子木通甘草各五分右剉作一貼

姜三片燈心一團同煎服

消核丸 治頸項耳後結核三五歲成癭不紅不腫不作膿者橘紅鹽水拌焙赤茯苓大黃酒煨連

翹各一兩片芩酒炒梔子炒各八錢半夏麴玄參酒拌牡蠣蝦童便汁另研天花粉瓜蒌仁桔梗各

七錢白殭蚕炒六錢生甘草節四錢右為末湯浸蒸餅和丸菜豆大白湯下八九十九

又方 治項後少陽經中瘡瘡結核或赤硬腫痛生山

神藏藥 一塊去皮草麻子三個去皮右研勻攤貼如

右和勻每服一錢至二錢茶清調下。又方治

瘦瘤

痰核瘰癧商陸根生南星合搗爛塗之立消
又方南星草烏等分為末姜汁調塗立消
大蜘蛛研爛好酒浸去

滓臨卧温服甚效

人身氣血凝滯結為瘦瘤瘦則憂恚所生多着於
肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長
堅硬不可移者各曰石瘦肉色不變各曰肉瘦筋
脉露結各曰筋瘦赤脉交結各曰血瘦隨憂愁消
長各曰氣瘦五瘦皆不可決破決破則膿血崩潰
多致夫枉疰○瘤亦氣血凝滯結聚而成初作梅
李皮嫩而光漸如盃卵瘤各有六骨瘤肉瘤膿瘤
血瘤石瘤脂瘤亦不可決潰肉瘤尤不可破破則
殺人惟脂瘤決去其脂則愈疰○瘦瘤總皆氣血
凝滯結成惟憂恚耗傷心故瘦多着頸項及肩
也勞慾邪氣乘經之虛而住故瘤隨處有之
通治瘦瘤蠟礬元从服用自然消縮最妙

指○五癭六瘤或軟或硬無痛無痒宜破結散人
參化癭丹海帶九坊見 砥掌散神效開結散治脂
瘤方枯瘤方化瘤膏南星膏牖○服治癭瘤藥先
須斷厚味餅○凡癭瘤疣贅等至年衰皆自內潰
理於年壯可無後患也齶○癭瘤初起通用十六
味流氣飲虧觀單蜘蛛方久服蠟礬元外付南星
膏

破結散

治五癭及瘤即上海藻散堅丸也齊○有人
生癭大如茄子潮熱形瘦百治不效得此方

去松蘿代真桑寄生一倍服
三五日其癭自消散而愈

人參化癭丹

治癭瘤海帶海 蛤粉昆布上四味皆
焙澤瀉炒連翹各一兩猪鬃羊鬃糊

燭乃曠中 各十枚切片焙乾右為末蜜丸芡實大
食後嚙化一九日三嚙○癭瘤多用昆布海藻海

帶鹹能軟堅

之藥治之

舐掌散

治瘦海藻黃連各一兩右為末取少許置掌中時時舐之津液嚥下如消三分之二止藥

甌

○一方海藻海帶昆布蓬朮青鹽等分為末蜜丸彈子大喻化嚥下日三調

神效開結散

治瘦瘤皆效沉香二錢木香三錢陳皮四錢真珠四十九粒火煨猪鬃肉子澁

頭下能龍牙一板如

棗大微瀰色紅者每二錢臥時冷酒調和徐徐嚥下輕者三五服效

重者一料

全愈

治脂瘤方

一種脂瘤粉紅色全是痰結用鍼決去脂粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥點

其蒂竦茄落即用生肌

膏貼之防其出血

枯瘤方

砒礪砂黃丹雄黃輕粉各一錢斑猫皮三

和丸捏作碁子樣暴乾先炙三壯於瘤頂以藥餅蓋上以黃柏末水調貼之數日自然枯落

化瘤膏

治肉中腫起生瘤漸大白飲一兩大黃川芎赤芍藥黃芩黃連當歸白礬各五錢吳茱萸

二錢半右為末雞子黃調勻攤帛貼之

南星膏

治癭瘤生天南星大者一箇細研滴醋三五點為膏先將鍼刺痛上却以藥攤紙上貼之

癭貼

取效如無生者乾者為末醋調用之

又方

治氣癭鍼砂浸水缸中平日飲食皆用此水十日一換鍼砂服半年自消

癭瘤結氣海藻一斤洗去鹹酒三升漬數日稍稍飲之○海藻昆布等分為末蜜丸常含化噍汁

○夏枯草散瘦結氣水煎頻服卽愈
○瘦瘤水煎服之
○治瘦瘤大蜘蛛一箇插酒頭

服臥○羊靨鹿靨酒漬

炙含嚙汁七日差

灸法

治瘦灸天突三七壯又灸肩髃男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯妙

疔瘻

漏者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蟻蛄瘻蜂瘻虬蟬瘻蟻蟻瘻浮疽瘻癰瘻轉筋瘻是為九瘻其證

穿孔一深膿汁不盡風冷併入涓涓而成漏矣

○漏喜發於項腋及陰僻肛門之間療治失節卽

生寒熱凡癰疽諸癩苟有宿膿朽骨停蓄其間皆

為之漏癰○內經曰陷脉為瘻留連肉腠者是也

可用附子灸法蒜餅灸法鍼灸見灸之瘡口維翠

霞散或翠霞鏡子維之外貼膏藥

○治法温散風冷為急宜温解散內寒散○收水次之宜牽牛

酒○生肌又次之宜龍骨牡蠣人齒犬牙加血竭

乳麝髮灰內外相維生肌必矣或平肌散麝觀人
牙散蜂房散選用○通治宜加味蠟礬丸內生肌
丸乳麝雲母膏溫經丸○外治宜截疔散雄黃膏
黑靈散○熏方洗方取从漏中朽骨方治心漏方
取漏虫法

禁忌法

溫解散

治漏瘡散風冷蒼朮厚朴陳皮藿香半夏麩
川芎白芷細辛各一錢官桂白薑甘草炙各

七分右剉作一貼入
薑三棗二水煎服

內塞散

治疔癭瘡久不差人參黃芪當歸白茯苓防
風白芷桔梗川芎遠志厚朴官桂赤小豆甘

草炙各五錢附子炮一個右
為末每取二錢溫酒調下

牽牛酒

引漏瘡中惡水自大腸出黑牽牛頭末二錢
入諸腰子內以線札縛濕紙泡慢火煨熟空

心細嚼温酒送下一各猪腎酒夫水屬腎也
腎虛水溢則滲漉於漏瘡行腎之水無如黑牽牛
取細末入猪腎服之則借腎入腎兩
得其便惡水既泄則不復淋漓矣調

人牙散

治漏瘡惡瘡能生肌人牙煨油髮灰雄雞內
金各等分右爲末入麝香輕粉各少許和勻

濕則乾糝乾則油調付
之調○一名齒髮散調

蜂房散

治久年漏瘡露蜂房炙黃七錢半穿山甲焦
龍骨各二錢半麝香少許右爲末臘猪脂調

付之

加味蠟礬丸

治久新諸漏象牙五錢露蜂房白殭蚕
蛇蛻燒血竭木香各三錢乳香二錢白

礬二兩右爲末黃蠟四兩熔化和勻衆
手作丸梧子大温酒下二三十九丸調

內生肌丸 治漏瘡枯白礬鹿角屑芝麻 一兩爲末
蜜丸梧子大溫酒下三十九 後去麩

角加象牙一兩黃蠟
和丸常服斷根

乳麝雲母膏

治漏瘡穿山甲一百片伴粉同炒候焦
起炮去粉取甲爲末四兩入乳香末一

錢麝香末半錢夾和雲母膏十五

貼和丸梧子大溫酒下三十九

溫經丸

治隔脈久瘦附子二兩 浸炮七次去皮臍
厚朴官桂白米乾薑木香甘草炙各一兩右

爲末蜜丸梧子大米

飲下三五十九

截疔散

治年深疔癩瘡白斂白芨黃丹蜜陀僧各二
錢黃連一錢龍腦麝香輕粉各二分右爲末

乾糝或

紅之

雄黃膏

治久年冷瘡油髮灰黃蠟各五錢雄黃末硫黃末各二錢半香油二兩右和勻熔化候成

膏貼

之髓

黑靈散

通治漏接露蜂房五錢牡蠣粉黃丹硫黃研各二錢半右同炒烟盡為末入油髮灰二錢

半麝香少許右

和勻糝付髓

翠霞散

治漏瘡惡瘡去毒生肌滑石五錢銅綠二錢半輕粉一錢龍腦麝香粉霜各二分半右為

末蘸經瘡口上

以膏貼之髓

翠霞錠子

治久冷漏瘡內有死肉銅綠寒水石煨清石各三錢白礬輕粉砒礪雲母石各一錢

二分半右極細末合糊為錠子如麻

黃麗細量瘡深淺縫之上貼膏藥髓

熏漏瘡方

艾葉五倍子白膠香苦練根右等分割
加燒香法置長桶內坐其熏之

洗漏瘡方

凡漏瘡孔中多有穢惡常須避風洗
芷露蜂房或大腹皮苦參煎湯熏洗
乾

取東向石榴根皮為末乾糝以殺
淫虫嘔○凡諸瘡切忌生水洗

取久漏中朽骨方

久瘡及痔漏中有朽骨宜取去之
烏骨雞脛骨硫磺實之鹽泥固濟

火煨通紅取出去泥研為末飯丸粟米大以
紙撚送入竅內外用膏藥封之其骨自出

治心漏方

曾前有孔常出血水謂之心漏此病醫書
少載人多不知鹿茸酥炙附子炮鹽花各

等分右為末棗肉和丸梧子
大空心溫酒下二十九

取漏蟲法

取活蟪魚數條合盤屈以竹簽串定香油
塗上下覆瘡上以布巾繫定良久覺痒痛

不可忍取蟪入水中有虫如線出焉未盡再覆虫
盪後以艾湯入日礬洗淨黃連檳榔末糝什治賺

瘡亦
妙臥

禁忌法

凡漏切忌亡情房勞尤戒怒氣
不然則核則大漏則水多腫

單方

治漏瘡疔瘰癧橡斗子十二個一實黃丹一實
白礬兩藥相合定麻皮纏了燒存性研細入麝

香少許洗淨糝之名曰烏金散瘡○取瘡蟪虫剪

云兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯一易不過七

枚無不效○鼯鼠燒取膏塗之最妙○鯉魚鱗

魚取膏塗之并食其肉甚效○鯉魚腸火炙封

瘡口半日許覺痒開看虫出差鞋○煉松脂填瘡

口合滿日三易即效鞋○蝮蛇膽取汁塗之鞋○

肛漏多孔熟犬肉煎

藍汁食之七日差

灸法

从漏瘡之內踝上二寸灸三壯在上則灸肩井鳩尾

鳩尾神○冷漏多在腿足之間先雖積熱所注灸則為寒宜用附子灸法硫黃灸法

疥癬

疥瘡有五一日乾疥皮枯屑起宜吳茱萸散○二日濕疥嫩腫作痛流汁淋漓宜一上散○三日砂

疥細如砂子或痛或痒宜剪草散○四日虫疥痒

不知痛易於傳染宜硫黃餅○五日膿疥合漿稠

膿色厚嫩痛宜三黃散○癬瘡亦有五一日濕癬

狀如虫行搔之汁出○二日頑癬全然不知痛痒

○三日風癬又名乾癬搔生白屑○四日馬癬微

羊白點相連○五日牛癬如牛領皮厚且堅○疥

癬皆血分熱煉以致風毒尅於皮膚浮淺者為疥

深沉者為癬疥多挾熱癬多挾濕疥狀如披介甲

癬狀如走苔癬大槩相同○治疥宜升麻和氣飲一掃散神異膏如聖散油調立效散○治癬宜

麻豆膏蠟猫膏胡粉散連粉散○通治疥癬宜一

上散秘傳一擦光當歸飲子何首烏散蕪荑散淨

萍散燻○凡疥痛甚加寒水石痒加黑狗脊微

痒加蛇床子有虫加雄黃喜温熱加硫黃心

吳茱萸散 治乾疥及春月發者以此開鬱蛇床子三

錢寒水石二錢半白礬吳茱萸各二錢黃

柏大黃硫黃輕粉各一錢樟腦半

錢檳榔一箇右為末香油調付用

一上散 治疥癬痛痒蛇床子炒黑狗脊細貴白膠香

錢半硫黃吳茱萸各三錢斑猫十四箇去翅足石

為末臘猪脂或香油調先以蒼耳煎湯洗去痂後

掌中擦藥令熱鼻中鳴二三

次却擦瘡上一擦即愈訓

剪草散 治砂疥蛇痒子三錢寒水石蕪荑各二錢剪

刀草枯白礬吳茱萸黃柏各一錢蒼朮厚朴

雄黃各五分輕粉一錢

右爲末香油調付服

硫黃餅

治虫疥及毒湯火灸燙者礬製硫黃一兩爲末用水調成餅貼磁碗底覆轉用熟艾一兩

川椒

三錢爲末火燃熏乾碗黃臨用先以藥湯水洗拭後用麻油調碗黃末擦之服

三黃散

治膿疱疥瘡治熱爲主黃芩黃連大黃各三錢蛇床子寒水石各二錢白礬一錢黃丹五

分輕粉無名異白芷木香各

三分右爲末香油調付服

升麻和氣湯

治疥瘡痛痒乾葛二錢陳皮甘草各一錢半升麻蒼朮桔梗各一錢赤芍藥七

分半大黃五分半夏當歸茯苓白芷各三分乾薑

枳殼各二分右剉作一貼入薑五片灯心十五葦

水煎

服

一掃散 治一切瘡疥藜蘆皮三錢時粉鉛粉各一錢
半雄黃七分輕粉一錢右爲末另用大鯽魚

一箇入香油煎候熟去
魚攤冷調藥擦瘡效

神異膏 治同上全蠟七箇皂角二錢巴豆去皮七箇
蛇床子末三錢雄黃另研三錢輕粉一字清

油一兩黃蠟半兩右先用全蠟皂角巴豆入油煎
變色去三味入蠟融化放冷入雄黃蛇床輕粉和

勻成膏先以藥水洗瘡拭
乾後乃上藥擦之神效

如聖散 治肺臟風變生瘡疥浸展胡粉一兩黃連七
錢半蛇床子五錢水銀二錢半右爲末生麻

油調
塗焗

油調立效散 治濕疥浸淫久不差輕粉綠礬黃柏硫
黃各等分右爲末生麻油調洗瘡後塗

良方... 益... 卷下... 雜病篇... 完

搽

麻豆膏

通治諸癬麻油二兩入巴豆肉草麻子肉各十四粒斑貓七粒熬煎至枯黑色去滓却入

白礬五錢蘆薈末三錢攪勻成膏塗擦之凡遍

身生癬獨莖羊蹄根另搗白礬末以米醋調成膏

塗擦之如輕粉

黃丹尤妙切

蝎猫膏

治牛皮癬全蝎斑貓各十枚巴豆肉二十枚香油一兩右同熬候色焦者先去之去盡三

物了乃入黃蠟一錢候熔收貯朝擦暮愈不損皮

肉○一方治遍身牛皮癬川烏草烏何首烏白

芷蘇木各等分右○入臘豬脂同熬至白芷焦

色去滓候冷入鹽少許常挑一匙空心酒調下○

胡粉散

治癬神效胡粉硫黃雄黃各二錢半硃礬一錢二分半大草烏生一箇斑貓一箇蝎稍七

枚麝香少許右爲末先以羊蹄根蘸

醋擦動患處次用藥少許擦之

連粉散

治風癬濕瘡黃連胡粉黃柏黃丹枯白礬各五錢輕粉龍骨煇甘石各五分右爲末乾糝

或油調

塗研

秘傳一擦光

治疥癬及諸般惡瘡神效白礬枯六錢

蛇床子苦參燕莢各五錢雄黃硫黃川椒大風子肉各一錢半輕粉樟腦

各一錢右爲末生猪脂調付

當歸飲子

治遍身疥癬腫痒流膿當歸赤芍藥川芎生地黃防風荆芥白蒺藜各一錢二分何

首烏黃芪甘草各七分右剉作一貼入薑三片水煎服

何首烏散

治遍身疥癬瘙痒荆芥穗威靈仙蔓荆子何首烏防風甘草各等分右

為末每取二錢
溫酒調下

蕪荑散

治疥無問新久亦治癬白蕪荑一兩檳榔吳茱萸各五錢硫黃二錢右為末猪脂或香油

調擦

之

浮萍散

治諸疥癬及癩瘡浮萍四兩當歸川芎赤芍藥荆芥穗麻黃甘草各二錢右剉分作二貼

入葱白三莖豆豉六

十箇同煎服出汗

洗藥

治疥癬瘙痒生瘡細辛荆芥白芷川芎黃芩防風地骨皮甘草各等分右篩末每取二兩水二

大碗煎十餘沸乘溫淋湯患處各曰八仙散

何首烏陳艾等分濃煎浸洗治遍身疥癬

瓜藤煎湯浸洗亦佳

○溫泉浴最妙

單方

硫黃生用治疥癬及惡瘡嗅其臭不止可愈疥瘡

雄黃治疥癬殺虫為末付之鞋○水銀

滓研臘猪脂擦疥殺虫立效○藜芦治疥癬作

末生麻油調塗鞋○羊蹄根治疥癬爛搗和醋付

之妙鞋○治頑癬槌樹皮加巴豆斑猫入砒少許

為末水調付○芝麻生取油付疥癬及惡瘡甚

妙鞋○牛皮癬从皮鞋底燒灰入輕粉少許油調

付○田螺煮熟取肉用酒酵炒熟食除一生瘡

疥○臘猪脂生礬杏仁加輕粉少許搗擦治疥

癬妙鞋○鴉鴿治从患瘡疥食之甚良鞋○治遍

身疥癬硫黃蛇床子白礬各二錢水

銀滓三錢右為末薑汁調擦立效

鍼灸法

治瘡疥頑癬取絕骨三里間使解谿委中或

瘡疥取曲池合谷三里絕骨行間委中○治癬

八月八日日出時令患人正當東向戶長跪舉兩

手持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中左右兩
火俱下炙七壯七日愈慎○一女子兩股間濕癬
下至膝痒痛流黃水百藥不效戴人以鍼當痒時
刺百餘處血出盡煎鹽湯洗之四次方除蓋濕淫
於血不可
不鍼也柯

癩頭瘡

頭上生瘡如癩防風通聖散賦為末酒浸焙
三次食後白湯調服日三調○鹽湯溫洗一上

散坊見付之外不愈者神效明○頭瘡宜服酒歸
飲外用雄黃水銀等分為末臘猪脂半生半熟調
付之濕爛者燕窠土黃柏為末乾糝叭○白禿頭
瘡宜神應膏醫○頭面瘡密陀僧硫黃各二錢輕
粉少許右為末猪脂調付明○又方臘月馬脂油
塗擦極妙明○又方松皮灰五錢黃白膠香各
二錢半枯白礬大黃黃柏各一錢一分右為末熱
油調付明○小兒癩頭瘡松脂一兩懸龍尾黃丹

各三錢白芷五錢松樹枝水銀雄黃白礬各二錢
右爲末另用香油入亂髮煎爛調勻付之明又
方爛木耳爲末蜜調付明又炭燒紅淬長流水令
熱洗之明又胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲
末油調付連床散如聖黑膏亦佳明
○又兔絲子或蒺藜子煎湯洗之明

酒歸飲

治頭瘡酒當歸白木各一錢半酒芩酒芍藥

半酒黃柏酒甘草各一錢酒天麻蒼朮蒼耳各七分
作一貼水煎日三服服後穩睡片時明

神應膏

治白禿頭瘡羊糞燒存性爲末
用鴈油調塗一二次即愈明

連床散

治小兒癩頭瘡及身上諸瘡黃連五錢蛇床
子五倍子各二錢半輕粉少許右爲末荆芥

湯洗後油

調付明

如聖黑膏

治小兒白禿頭瘡豆豉半升草龍膽蕪荑各二錢半右燒存性為末香油半斤熬至

四兩下藥調勻付之神效

人面瘡

多生膝上亦有臂上生者古書云寬業所生須清心誨過內服十六味流氣飲勸觀久者大苦

參丸腎氣丸勸觀外用貝母為末付之着痂而愈

叭○人身有瘡如人面面目口鼻皆具昔有一人

左膊上生瘡以物食之皆能食灌以酒則面亦赤

色醫者教以歷試諸藥皆無苦至貝母其瘡乃聚

眉閉口其人喜曰可治即取貝母末

和水灌入口中數日成痂而愈

大苦參丸

治人面瘡及腫瘡苦參二兩防風荆芥白芷川烏生赤芍藥何首烏川芎獨活梔子

皂角蔓荆子赤茯苓山藥白朮藜黃芪羌活白附

子各五錢草烏炮一錢半右為末水煮麩糊和丸

栝子大每服五七十九空

心酒下不飲酒以茶代馱

陰蝕瘡

夫陰瘡大暨有三等一曰濕陰瘡二曰妬精瘡三曰陰蝕瘡亦曰下疳瘡也○濕陰瘡者由腎

虛風濕邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汁出狀如疥癬

○妬精瘡者由壯年从曠房室思色動慾以致敗

精流入莖内陰上生瘡赤腫潰爛作白痛痒妨悶

○陰蝕瘡者由熱結下焦經絡澁滯或婦人子宮

有敗精停留或月水未斷與之交合房勞後又不

洗浴邪穢留滯遂令陰莖連累丸腫痛小便加淋

經久潰爛侵蝕肌肉膿血不止遂成下疳瘡久不

愈則必成楊梅瘡宜服仙遺糧湯坊見預防之寒

熱尿管宜食正散枋便濕熱甚則腫痛尿澁莖中

痒痛或出白津宜龍膽瀉肝湯勦腫潰後入物

湯勦覲加柴胡梔子知母久服馱○下疳瘡日小

不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤俗云疳瘡

末已便毒復來生也。蠶○陰頭腫痛生瘡各為下
疔乃督任衝三脉之會其瘡一生則便毒厲風瘡
次第而來先宜升麻葛根湯點靨發出繼服涼血
解毒丸即愈不必服輕粉毒藥。蠶○如精瘡初發
在陰頭如粟拂之即痛甚出清膿作白孔蝕之大
痛婦人有生於玉門內正似疔蝕瘡但不痛為異
蠶○治法以大豆甘草湯漬之洗毒散煎湯浴之
磨風膏溫潤之蠶○通用消疔敗毒散涼血解毒
丸

涼血解毒丸

治下疔瘡苦參四兩黃連二兩連翹一兩半大黃一兩二錢半惡實生乾地黃

白芷各一兩防風石膏各五錢右為末荆芥

煎湯打糊和丸梧子大空心溫水下百九丸

消疔敗毒散

專治下疔瘡柴胡一錢半黃柏赤芍藥赤茯苓木通草龍膽各九分連翹荆芥

黃連蒼朮知母各七分防風獨活各六分甘

草三分右剉作一貼燈心一團水煎服團

洗瘡藥

凡下部諸瘡常須藥湯淋洗以去濃汁惡水宜洗瘡湯大豆甘草湯洗毒散洗下疳方端

洗疳湯

治下疳瘡用練子黃連瓦松川椒葱根艾葉右等分煎水以青布蘸洗立效醫

大豆甘草湯

治陰蝕下疳瘡甘草一兩赤皮葱三莖黑豆一合槐條一握右濃煎取清候溫

浸浴日

二劑

洗毒散

治陰蝕瘡及諸般惡瘡蛇床子地骨皮大薊麻黃荆芥防風枯白礬各三錢葱白三莖煎

湯溫

洗研

洗下疳瘡方

黃柏黃連當歸白芷獨活防風朴硝荆芥各三錢入銅錢五十文烏梅五箇鹽

一匙同煎取湯日洗
四五次乃付糝藥

糝付藥

藥水淋洗後乃用糝付之藥宜栢蛤散津調散
鳳衣散旱螺散截疳散劫見珍珠散磨風膏或

糝或
付端

栢蛤散

治下疳濕瘡黃栢以磁鋒刮取末蛤粉右末
等分糝上即愈蓋黃栢去熱蛤粉燥濕也

津調散

治如精瘡黃連欬冬花等分右為末先以
地骨皮蛇床子煎水洗拭乾乃津調付

鳳衣散

治下疳瘡鳳凰衣煨細地黃丹各一錢輕
粉片腦各少許右為末糝或鴨子清調付

門入

旱螺散

治同上白田螺殼煨
為末香油調搽

腦麝輕粉各少許右
婦精瘡溪港中陳入

殼爲
妙蠟

珍珠散

治下疳瘡黃連
鉛粉五倍子炒
后

白沒藥孩兒茶輕粉
各等分爲末以米

泔洗後
糝上齧

磨風膏

治陰蝕瘡蛇床子五錢大
二十箇枯白礬樟腦各二錢
川椒輕粉水銀

各三錢雄黃一錢半銀硃一錢
右爲末生麻
油和丸彈子大每用少許呵津遍擦之
獸

一方

治下疳瘡并玉莖蝕了盡用此藥也
初只少莖頭耳黑鉛五錢化開投
長出來如

不見星入寒水石三錢半輕粉二錢半
鵬砂一錢
右爲極細末先以葱艾椒煎水洗患處
乾糝

治舌被人咬斷
有效如神
錮

又方

治年少陽道興強當泄不泄不泄強泄脹斬嫩皮初如鍼服畏疼不敢泄刮日久連莖潰爛痛

楚日甚用荆芥黃柏

生葱地骨皮煎水洗去

膿靨以訶子燒灰入

少許乾搽患處仍斷房

事臨睡喫冷水勿令阻道興

起脹斷瘡歷歷堅自安矣

又方

莖頭三五乳小漏瘡出血微膿油髮灰津唾調

付仍米飲調服

錢甚妙

○外腎疳瘡陰蝕瘡

殼黃連輕粉為末香油調塗

○婦精瘡陰蝕瘡

油髮膏黛麝香少許右為末或糝或津唾調付

○陰莖上生瘡取月經布燒灰蜜調塗即愈

○疔瘡蝸牛焙乾枯白礬為末濕則乾糝或油調

付

不治證

下疳瘡重者心中病痛悶絕虛煩甚者不治

廉瘡

生於兩脚腫爛吳穢步履艱辛此瘡生於廉骨為

重以其骨上肉少皮薄故難愈治法當先取虫然

後外貼膏藥內服蠟礬丸蠟觀之類須翹足端坐

勿多行履庶可全愈蠶○廉瘡生兩膝上初起嗽

腫作痛三陰虛也宜入物湯刺觀若患處黑黯惡

寒少食屬肝腎虛宜八味丸勸觀久不愈者大苦

參丸方規吐○外廉瘡先以葱湯洗次貼龍骨膏

或馬齒膏濕熱者審土膏○內廉瘡先以鹽湯洗

次貼蠟礬紙○內外通用爐灰膏勸規點去瘀肉

後貼黃蠟膏○廉瘡及脚膝生瘡苟方虛損門

黃芪丸勸觀服之即愈○內外廉瘡宜粉麝散

神捷膏馬齒膏翠玉膏白膠香散貼藥三方鍼法

洗法取虫法端

龍骨膏

治外廉瘡龍骨乳香沒藥密陀僧各二錢海
螵蛸一錢半皂角子五箇燒存性右為末用

綿紙兩重以鍼插亂孔香油調藥
夾內縛貼瘡上隔日翻貼之賦

馬齒膏

治廉瘡馬齒莧煎取汁一釜入
黃蠟五兩再熬成膏塗之賦

窰上膏

治外廉瘡从年窰灶土或灶心黄土黃柏赤
石脂黃丹各五錢輕粉乳香沒藥各一錢右

爲末香油調成膏先以茶清洗後油紙攤藥貼之
以巾縛定縱痒不可忍直待結痂去之未愈再貼
賦○灶心土以燥濕清熱黃柏之辛以散
火邪乳香沒藥以散瘀血可謂十全矣賦

蠟礬紙

治內廉瘡神效綿紙疊十二重看瘡大小剪
成方片以紙燃鈞住另用麻油二兩入川椒

四十九粒慢火熬黑去渣入槐枝四十九寸煎枯
黑去渣入黃蠟一兩枯礬一錢輕粉二分煆熔化
卽入前紙令油滲透勿令焦黃取起貼時先以藥
水洗拭用紙齊齊貼上以巾繫縛周時取下近瘡

紙一重候紙取
盡則瘡全愈

黃蠟膏

治內外腫瘡香油一兩入油髮如梅大熬消
化入白膠香三錢黃蠟一兩熔化入龍骨赤

石脂血竭末各三錢攪勻候冷盛磁器每用捏
作薄片貼瘡上絹帛縛定三日後翻過貼之

粉麝散

治外腫瘡臭爛數十年不愈生龜殼一箇醋
一碗塗炙醋盡為炭火煨放冷右為末入輕

粉麝香各一錢和勻先
以葱湯洗後塗上

神捷膏

治內外腫瘡久年不愈清油半斤先煎入黃
蠟一兩松脂五錢熬至成珠候冷入乳香沒

藥輕粉血竭孩兒茶柏白礬龍骨煨各三錢川椒
四錢右為末攪勻收貯先以藥水洗淨用油紙以
鍼刺孔攤藥貼瘡上二日換三次二日
後一日換一次每換藥必洗淨貼上

翠玉膏

治賺瘡瀝青四兩黃蠟銅綠各五錢沒藥三錢石將香油半斤同黃蠟瀝青於火上熔化

次下銅綠沒藥末旋旋攪勻成稠將藥傾冷水中看瘡大小捻作餅子貼之以帛繫定三日一易

白膠香散

治內外賺瘡白膠香赤石脂枯白礬各五錢黃丹乳香沒藥輕粉各二錢右為末乾

糝或油調付

單方

治賺瘡黃蠟一兩猪膽一箇輕粉二錢右熔化和勻攤油紙上貼之

石膏各一兩青黛五錢龍骨一錢右為末香油調付

石脂一錢二分右為末香油調付以巾包定除根

冷賺瘡鹿角灰油髮灰乳香為末清油調付

爛瘡成白从不乾好砂糖屑津調塗付日二

次三日愈爛紅絹蚕空璽並燒灰胡粉各三分

真珠煨二分枯礬髮灰白麩各一分右

為末黃蠟二兩熔化調勻貼之神效翻

鍼法

賺瘡色紫黑先以三稜鍼刺去惡血冷水洗淨乃貼膏藥忌日光火氣陽氣如有黑腫未盡可

再出血以紫黑血盡為度翻

熏洗方

治賺瘡臭爛先以海桐皮石榴皮煎湯洗後牛蒡子半兩研為末燒熏之無海桐皮則地

骨皮代之翻槐枝葱白川椒煎湯

或茶清淋洗搥乾後乃貼膏藥翻

取蟲方

久賺瘡宜取出生蟪魚數條以清油塗腹下置瘡上盤屈以帛繫定少頃覺痒不可忍然

後取視腹下有小竅皆虫也未盡再付却用死人

脚脛骨燒灰油調付翻○久賺瘡蠹魚腸以五味

火上炙貼虫

出即去之翻

腎臟風瘡

初起兩足時熱脚跟作痛多於內脛或膝上生瘡如癬漸大失治則延及脛股遍身者有

之以腎氣丸動覲為主佐以四生散動覲黃芪丸

動覲外付白膠香散坊見○四生散末每取二錢

入猪腎內煨熟空心鹽湯嚼下尤妙○血風瘡

與腎臟風瘡相類乃三陰經風熱鬱火血燥所致

瘙痒不常膿水淋漓潮熱盜汗宜四物湯加

浮萍黃芩或當歸拈痛湯是覲外治磨風膏坊見

大馬齒膏塗之○下疳瘡亦與腎臟風瘡相類

生於脚脛或打撲而成其瘡口狹皮肉極開皮薄

如竹膜極痒痛黃水淋漓積年不愈又易染他人

患者須忌房室取韭菜地地龍養為末入輕粉清

油調付或白犬血塗之又付檳榔散○

腎臟風宜服活血驅風散外用雞心散○

大馬齒膏

治兩足血風瘡馬齒莧焙乾玉錢黃丹茜
柏枯礬孩兒茶各三錢輕粉一錢右為末

桐油或麻油調勻攤油紙上先
以藥水淋洗挹乾後乃貼之

檳榔散

治足上生瘡潰爛臭穢全蠍七個斑貓十四
個巴豆肉十四粒檳榔一個香油一兩半右

漫火煎先入蠟次入貓次入豆次入檳見豆黑色
入蠟一兩候熔去滓只取蠟油入黃柏炙蛇床子
各二錢雄黃硫黃黃丹海螵蛸各一錢白膠香黃
連杏仁輕粉各半錢右爲末入蠟油中調勻藥水
洗瘡付之
立效

活血驅風散

治腎臟風瘡痒痛此由肝腎虛爲風濕
所侵也蒼朮炒杜仲姜汁炒肉桂天麻

薏苡仁橘紅檳榔厚朴枳殼各六分當歸川芎白
芷細辛白蒺藜炒桃仁白芍葯半夏五靈脂甘草
各五分右剉作一貼姜五片束二
枚同煎入乳香末少許空心服

雞心散

治腎臟風發瘡疥雞心檳榔二個破開以黃丹三錢合在內濕紙裹煨全蝎六個硫黃四

錢入輕粉青黛各半錢麝香少許右和勻磁器收貯每用少許清油調作兩掌掩外腎女掩兩乳各

睡至醒次日又用之經驗效

單方

脚肚上生瘡漸大爬搔不已痒不可忍石榴根皮煮取濃汁稍冷拂瘡上冷如冰雪即成痂

浸淫瘡

初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延至遍身用苦練根燒存性為末猪脂調付濕則乾

慘先用苦參大腹皮煎湯洗之○浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治

○小兒浸淫瘡

宜用苦瓠散

苦瓠散

苦瓠二兩蛇蛻燒灰蜂房微炒各五錢梁上塵一合右為末油調攤帛貼之

單方

卒得浸淫瘡不早治周身則殺人胡麻生爛喂

米熬黄杵末水調付之鞣○雞冠熱血

付之鞣○胡燕窠中土水和付之鞣

凍瘡

冬月凍傷成瘡流水俗呼為凍瘡宜用生附取白

欵散如神散臘享膏○凍耳瘡爛貝母末乾糝

之呶○足凍爛生瘡黃丹猪脂調付鞣○足跟凍

瘡潰破以川椒煎湯洗刮去腐肉鍼刺出血馬勃

末調牛骨髓付之鞣○凍瘡雄雉雞腦一枚入黃

蠟等分清油減半熬膏塗之呶○五倍子煎湯洗

後取兔腦髓雀

腦髓付之鞣

生附散

治凍瘡爛痛生附子

為末麩水調付之鞣

白欵散

治凍耳成瘡黃柏白欵各五錢

右為末鹽湯洗後油調付之鞣

如神散

治凍瘡皮爛痛不可忍大黃細末新水調塗瘡上痛止立效

關

臘享膏

治凍瘡猪脂獾油各二兩半香油二合半海松子油一合松脂黃蠟各三兩七錢半右各

煉去滓和合成膏先以藥水洗後塗之

湯火瘡

凡湯火燒傷初時強忍痛急向火炙強忍一時即不痛慎勿以冷物搨之使熱毒不出免爛人

筋骨用寒水石三兩半黃柏黃連黃芩梔子大黃

赤石脂各五錢片腦少許右為末鴨子清調付酒

調亦可呷○湯火瘡宜赤石脂散保生救苦散黃

柏散冰霜散四黃散熯○火燒以好酒洗之以鹽

付上○皮脫者酒蒸牛皮膠付之○湯傷者以淋

過第二次灰滓付之○熱酒傷者糯米粉炒黑末

酒調付之○湯火燒

瘡大黃當歸油調付心

赤石脂散

治湯火傷瘡赤石脂寒水石大黃各等分右為末新水調塗之

保生救苦散

治湯火熱油所傷爛痛寒水石大黃黃柏各等分右為末生麻油調塗或乾摻

棟

黃栢散

治同上雞子殼黃栢朴硝大黃寒水石各等分右為末新水調塗之

冰霜散

治湯火熱油所傷皮爛肉痛寒水石朴硝青黛牡蠣煨各五錢輕粉半錢右為末新水或

油調塗

之

四黃散

治同上大黃黃芩黃連黃栢白芨各等分右為末新水調塗之

單方

湯火瘡黃蜀葵花為末油調付妙或滴水研爛付亦佳

卷之六 雜病篇

側柏葉搗爛如泥冷水調塗以帛繫定二三日愈

鞞○生梨切片貼之不爛止痛鞞○生胡麻搗爛

如泥付之鞞○生白礬為末香油調塗鬻○湯火

傷及熱油傷白蜜塗之竹中白膜貼之日三痛立

止即愈鞞○醋泥付之

無痕豆醬汁付之妙鞞

翻花瘡

翻出一肉突如菌或如蛇形長數寸雄黃為末

付之內服十全大補湯或八物湯貳勸叁倍參

芪歸木外用藜蘆為末猪脂調塗日一易候元氣

漸復腫毒將盡時塗之則努肉自入否則雖入復

出若誤用鐵刀蝕灸必危慎之貳○中品錄子專

治翻花瘡貳○一名綿花瘡一名廣東瘡川芎天

花粉各五錢輕粉二錢半朱砂雄黃各一錢二分

半麝香五分右為末蒸餅和丸菖豆大每服七丸

至九九溫酒下貳

中品錠子

專治翻花瘡及瘦瘤白礬三兩八錢半乳香沒藥各五錢半朱砂三錢半黃七分半

硃砂五分熟五分生砒霜一兩半火煨黑烟止用

淡青烟右為末面糊和勻捻作錠子量瘡插入

單方

治翻花瘡馬齒莧燒灰猪脂調付
棘○柳枝葉煎濃作膏塗之棘

漆瘡

人有惡漆者因見漆中毒生瘡面痒而腫遍身
痛生蟹取黃塗之效○石蟹取汁頓塗之棘○臘

茶末油調付柳枝葉煎湯洗○芒硝湯浸冷洗

之鈎○鉄漿頓洗即差棘○井中荅搗付之棘○

川椒煎湯洗之即愈棘○生姜真汁付之亦可研

○雞子黃塗之棘○韭葉研付之棘○紫蘇葉搗

爛擦之

軟癩

癩小癩也世謂之熱癩大如酸或如豆色赤而
內有膿血也○宜用猪頭散三物散大黃膏○

雞抱卵殼燒灰入輕粉少許油調付之○大枳殼一枚去瓢磨令口平以稠麩糊塗四唇覆貼癩

上自破膿出甚妙

豬頭散

治軟癩愈而復作野蜂房二三個燒為末另用巴豆肉三七粒清油煎三沸去豆取油調

效此方療病有效人以為豬頭為謝故名之○又枯白礬末油調付亦

三物散

治鬚邊生軟癩名發鬚有數年不愈用此極妙豬頭上毛貓頭上毛各燒存性各一撮鼠

屎一枚右為末加輕粉少許清油調付

大黃膏

治軟癩大黃黃白當歸各等分右為末以生地黄汁調塗之○

有名無名諸惡瘡

蒲萄瘡天行斑瘡月蝕瘡內疔瘡癩瘡走皮癢瘡白蛇纏瘡魚目瘡熱毒

瘡火斑瘡此皆有各瘡也○此外皆無名諸惡瘡也○又有洗瘡法殺虫法生肌法諸瘡中風水作

痛法

蒲萄瘡

瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用冰梅菴之神愈

天行斑瘡

人身發天行斑瘡一身周匝如火瘡皆戴白漿不治則數日必死差後瘡癩黥一歲

方滅此惡毒之氣所為取好蜜煎升麻數數洗拭塗之韎○又煮葵菜葉以蒜壅啖之數日即止

月蝕瘡

小兒多有之生耳後隨月盛衰胡粉炒黃枯白礬黃丹黃連輕粉各二錢乾胭脂一錢

香少許右為末香油調塗韎○又黃連枯礬末付之妙

內疳瘡

生於口上腭初發如蓮花根蒂小而下垂乃大治法以鈎刀決其根燒鉄烙以止其血次

以雄黃輕粉粉霜白芷白欵為末付之以槐枝作枕其牙頰問毋使口合一兩時許瘡癥定合口自

便次日出膿用

生肌散付之

癩瘡

生手足間相對如新茱萸痒痛折裂有孔如蝸久不愈杏仁乳香各三錢硫黃輕粉各一錢半

右為末麻油三錢入黃蠟五錢熔

化入前藥末攪煎成膏塗之

走皮癩瘡

生滿頰項發如豆梅蔓延兩耳流汁濕爛先用桑寄生驅搗桑根皮各一握白芷

黃連各少許煎湯洗之候血盡次用皂莢竹笋皮

燒存性黃柏白芷藍葉等分為末清油調塗神效

○手癩瘡皂角枯礬輕粉黃柏黃連為末敷之

○小兒胎癩頭生紅餅瘡先以艾葉白芷大腹

皮葱白煎湯洗後生藍

葉生艾葉入蜜搗付

蛇纏瘡

身上生瘡有頭尾儼似蛇形初起宜隔蒜於頭上炙之雄黃為末醋調付之又酒調服之

丸勸觀每服百丸大有神效

魚日瘡

遍身生瘡如魚目無膿又名征虜瘡升麻到水濃煎入蜜二三匙鵝翎蘸拭洗瘡

熱毒瘡

遍身生熱毒瘡痛而不痒粘着衣被夜不得睡菖蒲作末厚布席上恣卧其間不五七日

其瘡如矢應手神驗
宜用紫草膏葵花散

火斑瘡

人常近火則多生火斑瘡出汗痛痒黃栢薄荷葉為末糝之即安或煎湯洗亦佳

諸般惡瘡

諸般遍身瘡及惡瘡出膿血痛痒宜涼血飲又平血飲合人參敗毒散

疎風解毒散合掌散松脂貼散二黃膏貝母膏金華散爐灰膏青金錠子一掃光生肌散黃蠟膏洗

藥方殺虫方生肌方諸

瘡中風水方單方婦

平血飲

治諸瘡遍身出膿血痛痒即升麻葛根湯財
加生薑薄荷生地

黃麥門冬煎服

涼血飲

治血熱生瘡赤芍葯黃芩川芎荆芥生芑麥
門冬天花粉甘草各一錢右剉作一貼入燈

心十莖竹葉

十片煎服

連翹飲

治惡瘡遍身痛痒及血風瘡連翹赤芍葯當
歸荆芥防風惡實川芎梔子黃芩瞿麥木通

生乾地黃瓜蔓根麥門冬甘草各七分

右剉作一貼入燈心一團水煎服

疎風解毒散

治遍身瘡痒痛白芷細辛蒺藜子炒麻
黃檳榔當歸生乾地黃川芎赤芍葯

獨活白牽牛微炒桑白皮炒蒼朮炒枳殼甘草炙
各七分右剉作一貼入黑豆七十粒紫蘇五葉生

姜五片同

煎服搗

紫草膏

治熱毒瘡紫草茸黃連黃柏漏蘆各五錢赤
小豆末菉豆粉各一合右為末猪脂或清油

調日三

付搗

葵花散

治一切熱瘡鬱金黃連黃柏梔子葵花
各等分右為末冷水調膏貼之神效

合掌散

治遍身生瘡百藥不效檳榔五個為末硫黃
生研五錢輕粉半錢右為末每一錢安手掌

內油調夜臥時塗外腎不得洗

手但擦手令乾一二日即愈

松脂貼散

治一切惡瘡及無名瘡黃柏黃連松脂
膩粉土蜂窠以甘草各一錢右為末另

取水銀一錢放在掌心以唾擦為泥入磁器中和藥末及清油令如稀餡先以藥水洗瘡拭乾塗之

即愈治疥尤妙效

二黃膏

治一切惡瘡清油三兩煎巴豆肉一十粒微

末各一錢和勻成膏以藥水洗瘡後擦付二三次神效

貝母膏

治諸惡瘡貝母三錢半夏勝南星勝五倍子白芷黃柏苦參各二錢半黃丹一錢半雄

黃一錢右為末蜜水調付或乾糝

金華散

治一切濕熱惡瘡亦療小兒黃丹一兩黃柏黃連各五錢輕粉一錢右為末藥水洗後糝

之貼之

爐灰膏

治一切惡瘡除去
痰肉最妙規

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快及多年疔瘻瘡白丁
香銅綠硃砂粉霜輕粉各五分麝香龍腦

各一字右為末麪糊和搥作錠
子緝入瘡口中或慘付亦可黏

一掃光

治小兒頭瘡及多風子瘙痒成瘡膿水不止
細茶水銀各一錢同研細牙皂川椒各二錢

右為末油
調擦上翻

生肌散

治一切瘡斂口大效寒水石煨滑石各一两
烏賊骨龍骨各五錢蜜陀僧枯白礬乾胭脂

定粉各二錢半右為
末乾慘瘡中妙黏

黃蠟膏

治諸瘡能生肌香油黃蠟松脂各等分
右熔化待凝貼之加油髮灰尤妙粘

洗藥方

治諸般惡瘡黃柏茵陳荆芥葱白藿香煎水
淋洗為妙效得○洗諸般惡瘡毒艾葉細茶葱

白桃枝柳枝川椒膿

煎湯入鹽頻洗春回

殺蟲方

治惡瘡有虫膽礬輕粉乳香各一錢礪砂雄
黃土蜂房各二錢龍骨虎骨白礬露蜂房各

二錢半麝香五分片腦一字右為末藥水煎後付

之神效齣○諸瘡殺虫檳榔五錢黃連二錢半穿

山甲五片燒灰麝香一字右為末茶清調

塗得○諸惡瘡有虫須用斑蝥藜蘆取

生肌方

凡治惡瘡令生肌宜用生肌散翠霞散黃蠟
膏三坊○凡看瘡內肉黑色勿上生肌散宜

用消蝕之藥直待黑肉去盡方可上生肌散取○

如開瘡口用生肌去死肉用煨砒生好肉去砒加

枯白

礬門入

諸瘡中風水發腫毒

凡瘡瘍未合風入為破傷風濕入為破傷濕二者害人最急宜

慎之

○諸瘡入皂角水及惡水熱毒不止皂角

于燒存性研二錢半砂糖末五錢和勻如膏貼瘡

上韃○諸瘡中風水疼腫鯉魚目燒灰研付汁出

即愈諸魚目並得韃○又方川椒一升和麩作餅

灰火煨熟斷開口封合瘡上冷則易出水即差韃

○又方桑柴灰淋汁漬之冷復易韃○又方葱白

連鬚煮湯洗之或連莖葉煨研署付韃○又方薤

白搗爛火炙令熟付瘡上以帛裹定冷則易出水

即差韃

單方

治惡瘡及諸瘡生胡麻油塗之妙生麻油亦可
韃○馬齒莧爛搗付上便愈韃○熊膽汁塗之

妙犬膽亦可韃○蟾蜍燒灰油調付諸惡瘡甚妙

韃○久遠惡瘡不差蛇蛻皮燒灰猪脂調付韃○

朝生暮落花一名鬼蓋卽朝菌也生糞穢處如菌
作末和油塗之甚佳牛糞上黑菌尤佳韃○一切
惡瘡蜈蚣十枚端午日收乾作末油調付韃○臘
猪脂療惡瘡和雄黃輕粉付之妙衛○鰥鼠膏主
惡瘡塗之妙韃○經霜芭蕉葉爲末香油調付研
○石灰淋取汁溫洗妙韃○雄黃硫黃治惡瘡爲
第一韃○一婦人臍下連二陰患惡瘡熱痒而痛
大小便澁出黃汁百治不差有人教先以溫水洗
拭取馬齒莧四兩青黛一兩同研勻付瘡上乾則
易新者仍服八正散妨觀二十日全愈韃○諸惡
瘡貝母末入雄
黃少許參之韃

東醫寶鑑雜病卷八下終