

始



常用新藥集

第十二版

特 217
981

常用新藥集

紀元二千六百年

第十二版

日本新藥株式會社新藥部編纂



改 版 歴

第一版	明 治 四 十 三 年
第二版	明 治 四 十 四 年
第三版	明 治 四 十 五 年
第四版	大 正 二 年
第五版	大 正 十 二 年
第六版	大 正 十 五 年
第七版	昭 和 四 年
第八版	昭 和 六 年
第九版	昭 和 九 年
第十版	昭 和 十 一 年
第十一版	昭 和 十 三 年

序

醫學の進歩を経とし、藥學の發達を緯として、輒近我國新藥界の進展は實に目覺しいものがある。

然し發展過渡期の常として所謂玉石混淆時代に屬し、日毎に提供される新藥が餘りに夥しく、又同質異名のものが可なり多くて、之を使ふ臨床醫家は其の識別取捨に大なる悩みを感ずると云ふ事である。

日本新藥株式會社新藥部編纂の常用新藥集は現今市場に使用されて居る殆ど總ての新藥の組成、適應症、用法、價格等を表解的に記述し、五十音順、又は藥效別の索引によつて何れの方向よりも、求むる新藥を直ちに見出し、其の本質の大様を知るに便ならしめたものである。

直截的な記述ではあるが、三千餘種の新藥を網羅し、其の取扱ひの所屬を區別し、又同質異名の 新藥を一括する等、本書によりて所謂新藥の大勢を推知する事が出来るから臨床醫家及び藥業家の利便鮮少にあらずと信ずるものである。

京都帝國大學 名譽教授

醫學博士 森 島 庫 太

序

本邦新薬業者の数は大凡三百にのぼり其發賣にかゝる新薬新製劑は實に三千餘を算してゐる。

新薬類の増加は畢竟醫藥學發達の徴であつて治療界の日進月歩も、全く新薬に依つてなされてゆく之感がある、例之化學療法劑 p-Aminobenzolsulfonamid の發見を始めとして肺炎治療に對するスルファピリヂンの出現、カラザールに五價アンチモン劑の登場の如きがそれであるが而し一方斯く重寶な新薬も玉石混淆雨後の筍の如く簇出しては、肝腎の使用者側に却つて迷惑視せられる虞れなしとせぬ。

編者は此點に鑑みて多數の新薬新製劑の大様を迅速に推知しそれ等を旨く使ひ分け得る様に索引配列等編輯上に意を用ひたのである。

新集載品 **新** は六百餘（自昭和十二年十月至昭和十五年五月）發賣中止品、價格訂正品、各數百に及ぶ。

長期戦時下、醫藥品の需要は激増し輸入は杜絶せんとしつゝあつて需給に著しき不均衡を生じた爲め漸次重點主義的生産に傾きつゝあるので或は十五年五月本稿締切後に於て製造中止、輸入杜絶品が殖えたり價格の變動を生じたものが可成りある事と思はれるが能ふ限りの正確を期してゐる。

昭和十五年七月

日本新薬株式会社新薬部長

谷川慶治郎

目次

改 版 歴	前 2 頁
森島庫太先生序	前 3 頁
編 者 序	前 4 頁
目 次, 凡 例	前 5 頁
五 十 音 索 引	前 6 頁
本 文	1 頁
ワ ク チ ン 一 覧	565 頁
絆 創 膏 一 覧	577 頁
農 藝 藥 品	579 頁
寫眞藥醫用試藥一覽	581 頁
新薬業者名簿とマーク	583 頁
醫藥品關係業者名簿	597 頁
醫育藥育機關一覽	602 頁
藥 效 別 索 引	604 頁

凡 例

- ◎本文配列の順序は原名（英文、獨文、又は佛文）により之を A. B. C. 順とせり。従つて五十音に依つて索搜の場合は卷頭の五十音索引を、用途によつて索引の場合は卷末、藥效別索引を用ふ。
- ◎價格は昭和十五年五月に於ける定價（A 價）を記す。

略 字 解

毒 藥	劇 藥	麻 藥
新 提 供 品	賣 藥 部 外 品	賣 藥
粉 末	液 劑	注 射 劑
錠 劑	膠 球	食 料 品
日 本 藥 局 方 藥 品	準 局 方 藥 品	
賣 藥 配 伍 許 可 の 意	醫 療 範 圍 に て 許 可 の 意	

五十音索引

五十音

ア 前7	カ 15	サ 20	タ 25	ナ 29	ハ 33	マ 41	ヤ 43	ラ 44	ワ 47
イ (井) 10	キ 17	シ 21	チ 25	ニ 30	ヒ 34	ミ 41	イ (井) 10	リ 45	井 (イ) 10
ウ 10	ク 17	ス 22	ツ 27	ヌ 30	フ 36	ム 42	ユ 43	ル 46	ウ 10
エ (エ) 11	ケ 18	セ 24	テ 27	ネ 30	ヘ 39	メ 42	エ (エ) 11	レ 46	エ (エ) 11
オ (ヲ) 13	コ 19	ソ 24	ト 28	ノ 32	ホ 40	モ 43	ヨ 44	ロ 46	ヲ (オ) 13

いろは順

い (ゐ) 前10	へ 39	る 46	た 25	な 29	の 32	け 18	あ 7	み 41	せ 24
ろ 46	と 28	お (を) 13	れ 46	ら 44	を (お) 13	ふ 36	さ 20	し 21	す 22
は 33	ち 25	わ 47	そ 24	む 42	く 17	こ 19	き 17	え (え) 11	
に 30	り 45	か 15	つ 27	う 10	や 43	ゑ (え) 11	ゆ 43	ひ 34	
ほ 40	ぬ 30	よ 44	ね 30	い (ゐ) 10	ま 41	て 27	め 42	も 43	

索

引

ア

アイエム.....	224	アストフェン.....	33
アイシユリン.....	231	アストマトリン.....	33
アイゼル液.....	233	アストマトール.....	33
アイゼンピタローゼ.....	541	アストマン.....	33
アイハルン錠(後原試験).....	179	アストモリジン.....	33
アイロール.....	9	アスパラエキス.....	30
アイデルミン.....	9	アスピタ.....	34
アヴィホルモン.....	39	アスピラ.....	30
アヴェルチン.....	39	アスピリン(各社).....	31
アウトカンファー.....	38	アスポール.....	32
◇亞鉛華絆創膏.....	577	アスモン(濃厚).....	30
ア-オー(A-O).....	24	アセコリン注射液.....	3
アカルノン.....	3	アセチラルサン.....	4
アクチゾール.....	10	アセチールヒヨリン.....	4
白色アクチゾール.....	10	アセトナール(製剤).....	3, 4
アクチワイス(シオノ).....	10	アセブタ.....	29
アクトコール.....	10	アーセミン.....	28
アクトヨジン.....	5	アゾチール.....	39
アクリカール.....	5	アゾパン.....	39
アグリン.....	9	アダオール.....	34
アークレミン.....	27	アダキシリン.....	34
アケビン末.....	9	アダリン.....	5
アコイン.....	5	アチグル.....	4
アゴピリン.....	9	アチドール(バプシン).....	4
アゴメンジン.....	9	アヂブロン.....	6
浅川氏腸チフス診断液.....	29	アヂホリン.....	6
アシドージン.....	4	アチロビン.....	5
アジファイール.....	34	アツブサ.....	3
亞硝酸アミール球.....	15	アーデー.....	5
アスカリス.....	29	アデノスベルゾン.....	5
アスカリドール.....	30	アデフィン.....	6
アスコイル.....	29	アテブリン.....	35
アスコルチン.....	29	アテモニン.....	35
アスター.....	32	アテンピン.....	35
アストイン.....	34	アトイリン.....	35
アストナリン.....	33	アトカルミン.....	35
		アトキシール.....	37
		アトキシリン.....	37
		アトキノール(鷲膏).....	36
		アドツシアスト.....	8

アドゴール	6	アビレキシシ	25
アトシヤール	37	アビレン	2
アドース(糖衣錠)	7	アフチミン	24
アドソール	7	アブテドリ	3
アドソルビン	8	アブフリ	2
アドニゲン	6	アフリドール石鹼	8
アトニン	36	アブリナ	25
アドネフリ	6	アプロヂル	3
アドノール	6	アベチ	24
アドヒシ	6	アベテグリン	24
アトフアニール	36	アベリー(ソリッド.Bi)	1,2
アトフアン(ザルベ, グラチン)	36	アベリサチ	1
アトミノゼ	35	阿片散	9
アトムラチ	35	アボセシ	25
アトモル	36	アボセーフ	25
アトラミン	37	アボテクト	25
アドリナリン(各種)	7	アボテスト	3
アトロゾ	38	アボロ	25
アトロベリン	37	アマイヂ	14
アトロモール	37	アマコ内服ワクチン	565
アドロン	6	アミターゼ	14
アナアスチ	15	アミトーゼ	15
アナビオン	16	アミノゼ	15
アナブチ	16	アミノバル	14
アナブトール	16	アミノフォルミン	14
アナブトールゼラチン液	16	アミロール	14
アナルゲシ	16	アムネジ	15
アノドリン	18	アムフトロビン注射液	15
アニマザ	18	アムロギ	15
アニマチ	18	アメバソ	14
アニモスターゼ	18	アメバロール	14
アヌゾール	24	アラピスト, パウダー	26
アネミキユア	17	アラボン	26
アネステジ	16	アランチ	26
アネルゲン	39	アリザチ	12
アノキゾール	18	アリストール	27
アノクロ	18	アリヘミン	11
アバカ	1	アリマリン(各種)	27
アバナール錠	1	アルエシ	13
アーバン	38	アルカフエン錠	11
アビクル	25	アルカンザ	11
アピロン	2	アルゴエレクトロゾール	26
アピタン	39	アルゴクローム	26

アルコツド	11	アンチウルチコール	24
アルゴワギノール	531	アンチエクツエマン	20
アルコン軟膏	26	アンチエヌレシ	21
アルサミノール	27	アンチエメージン	20
アルジモン(錠)	28	アンチエンチ	20
アルシリン(ワイス)	12,13	アンチカロリン	20
アルゼンフェラチ	159	アンチクレブチ	20
アルゼンフェラトーゼ	159	アンチコンブル	20
アルゼンフェローゼ	160	アンチスクロヂ	22
アルゼンブルトーゼ	54	アンチスメン	17
アルゼンヘモグロビン	199	アンチチレオイジン	23
アルゼンポリタミ	401	アンチツツシ	23
アルソゾ	28	アンチターベン	23
アルソバル	28	アンチトール	23
アルゾール(製劑)	13	アンチトルヂ	23
アルテヂ	13	アンチヒーベル	21
アルテリオン	29	アンチセベレミン	21
アルテロジエン	28	アンチピレチ(ピレチンと改稱)	414
アルトジ	29	アンチフステ	21
アルトギ	29	アンチフラミ	22
アルバルギ	10	アンチフルギ	21
アルバジ	11	アンチフロヂスチ	22
アルバルゴール	10	アンチベリベリン	20
アルファ, ベータ	12	アンチマダロミ	21
アルベ	13	アンチモナール	22
アルレスチ	12	アンチモヒ	22
アルワヂ	13	アンチレブリーゼ	39
アレブシ	11	アンチレブロール	21
アロカス	27	アンツイトリン	24
アロトン	12	アンテン	19
アロナール	12	アンテヒポリ	19
アロフェン丸	12	アンテロイム	19
アンギョーリン	17	アンテヘモロイド	19
アンキロール	17	アントラゾール	19
アンゲネ	17	アンドリン	17
安息香酸アンモン	14	アンドロスチ	17
安息香酸カルチウム	72	アントロビン	24
安息香酸カルシウムカフェイン	68	安那加注射液(各種)	69
安息香酸ソーダカフェイン	69	アンブール填充器	15
アンタゴニン(原液)	18		
アンタストール	19		
アンタチヂ	18		
アンチアルギ	19		

硫黄エレクトロイド	135
イオール	232
醫家用オプチン	360
イクイプロミン	147
イクイヨジン	147
イクタゲル	224
イクタミン	223
イクテルミン	222
イサチラツク	230
池田タウリン	223
イコラール	222
イグロシン	223
イサチロン	230
イサツエン	229
イザトール	230
イサビスチン	229
イサラキチン	229
イソミン	230
イスウルクス	231
イスチヂン	231
イースト	556
イスフォリン	230
イスラビン(ロチノン)	231
イツタン	231
イデチゲン	223
イドラカフィン	223
イドレン	223
イヒタルピン	222
イヒチオール絆創膏	578
イヒチオールワギン	531
イヒパフ	222
イブシロン	228
イブス	222
イプロバン	228
イブロリン	222
イベトン(プロム)	232
イペロール	222
イボタン錠	220
イマミコール(ネオ)	224

イ

イミノール	224
イヨレン	233
イラクミン	228
イラドール	229
イリレン	224
医療用炭素	88
イルメリン	228
イレグリン	229
イログランドール	224
インクレタン	226
インシュリン(各社)	226
インズリン(ドライ)	227
インゼリン	226
インヂゴミン AA	225
インムニジン	225
インチジン	225
インテスチノール	227
インテリゲン	227
インテレニン	227
インドラミン	225
イントロチツド	227
インファンチナ	225
インフルエンザ菌コクチゲン	255
インフルエンザ菌ワクチン	567
インヘプトン	225
インベリン	227
インベル糖(無水、注射)	228

ウ

ウアバイン注射液	446
ウアバニン	522
ウアルダバステル	532
ウアレンドイン肉汁	532
ウイオフォルム(エンテロ)	537
ウイカゾール	536
ウイガントール	536
ウキスダリン	538
ウイステチン	538

ウイタクローム	539
ウイタコーゼ	540
ウイタフォルチン	540
ウイタベリチン	538
ウイタホリン	544
ウイタミニン	542
ウイタミラーゼ	541
ウイタミンA(日本新薬)	542
ウイタミンA(各社)	542
ウイタミンB(中村)	542
ウイタミンB ₁ (コメツト)	543
ウイタミンD(通研)	543
ウイタソート	545
ウイダロン	536
ウイビー	533
ウイベリン(エキス)	535
ウイロール	538
ウヴァルミン	527
ウエイノトロープ	534
ウエトレン	535
ウエルパス	548
ウエロヂゲン	535
ウオガン	546
歌橋亜鉛華絆創膏	577
歌橋ゴム絆創膏	577
歌橋ビツク(肉厚)	577
歌橋レーヨン絆創膏	577
ウタロイド	527
ウマルモン	522
ウムスチン	523
ウラルゴール	523
ウリストール	524
ウリノーゲン	524
ウルゴンブーチ	524
ウルボン	522
ウレアーゼ	524
ウレロン	524
ウロカンフ	524
ウロサミン(ゴノ)	525
ウロジール	526
ウロセレクトタンB	525
ウロタン	526
ウロチラミン	527

エ

エ

ウロテナミン	526
ウロデリン	524
ウロトロピン注射液	526
ウロトロプロマトン	526
ウロトロプロセブチン	526
ウロノール	525
ウロフラビン	525
ウロミン	525
ウロメチン	525
ウロロギン	525
ウワウミン	528
ウワウール	528
ウワウルシ葉	527
ウワウルチン	529
ウワウルプリュー錠	528
ウワコンク	529
ウワゾルチン	528
ウワトロ丸	528
ウワソ	528
ウワデコン	527
ウワヨエキス	529
ウヅルシン	528
ウワローゲン	527
ウワローゼ	527
ウンデン	523
エイワンバンク	375
エイヨーゲン	133
エヴィバンナトリウム	154
エキサミン	154
液状ソマトーゼ	466
液状ゾルガナール B	465
液状レゲロート	422
エキスチン	154
エキセ	154
エキソホン	155

液體絆創膏	578	エビロチン	146
エキヂン	133	エフエチン	145
エキホス(グアヤコール)	154.155	エフエド, パパベリン	158
エキリジン	133	エフゲン	161
エキリトン	133	エフババ, アトロピン	166
疫痢ワクチン	565	エフエドナリン	142
エクイニン	133	エフエトナール	145
エクシン	132	エフエトニン	145
エスウワセン	150	エフエドノン	142
エスザリン	472	エフエドナリン	143
エス, シー, エス	453	エフエドリン(各種)	143
エスキニン	149	エフエドロ, チミツシン	502
エスピリン	472	エフエプトール	145
エスポミン	150	エブシン	154
エスモデル	149	M. T. R. (微量診察)	304
エスヨヂン	463	エムブリミン	138
エゾファア	149	エムプロール(各種)	137.138
エゾファイラキシン	150	エモール	140
エタイノキシール	150	エモン	140
エタギン	150	エーラミゾール	133
エチオジール	150	エラルソン(遊 沃度)	134
エチナール	8	エリオザン	148
エチラミン	8	エリカチン	148
エデラ	132	エリコン	148
エーテル(麻酔用)	8	エリジペリン	149
エドナ	133	◇エリタ	137
エナジン	140	エリチーラン	136
エナルモン	140	エリヂン	149
エネツクス	141	エリトリン	149
エノカール	141	エリナコール	148
エノサンA	141	エル, エム	268
エバカ	132	エル肝	134
エバトカルニン	207	エルゴクリン	147
◇エパール	154	エルゴチン滅菌注射液	148
エブクレーム	153	エルゴプトール	147
エビオス(注射, 結晶)	132	エルゾバン	137
エビオスB ₁	132	エルドホルム	134
エビダ	146	エルボン	134
エビテール	147	エルスチン	148
エビナトール	146	エルミール	148
エビネフリン	146	エレクトラルゲン	136
エビリーゼ	146	エレクトラルゴール	136
エビレンカゼイン	146	エレクトロイド(各種)	134.135

エレドン	136	オイグフォルム	151
エレブリン	147	オイコダール	151
鹽化アドリナリン	7	オイスタブチン	153
鹽化カルシウム	93	オイゾート	153
鹽化カルシウム溶液(各種)	93	オイツッシン	153
鹽酸アボモルヒネ	25	オイトルミン	153
鹽酸エビレナミン	146	オйнаルコン	152
鹽酸エフエドリン(各種)	142.145	オイバグエリン	152
鹽酸エメチン(各種)	138.139	オイバコ	152
鹽酸コカイン注射液	100	オイファイリン	152
鹽酸シノメニン(バラ)	462	オイベリン	151
鹽酸トロパコカイン(各種)	514	オイミドリ	152
鹽酸ハルミン	202	オイメノール	152
鹽酸ピロカルピン	393	オイラチン	151
鹽酸プロカイン末	406	○オイロ	153
鹽酸モルヒネアトロピン注射液	302	オヴアラーデン, トリフェリン錠	370
鹽酸モルヒネ液	302	オヴアリアル	370
鹽酸ヨヒンビン	557	オヴオグランドール	371
鹽酸レミジン	423	オウリー	369
圓城ペプトン	557	オオホルミン	359
エンスパモール	141	オオホルミンルテウム	359
エンスパン	141	オカサ	355
エンヂアスターゼ	556	オガルヂン	354
エンツアイマ	142	オキシドール	372
エンテロ, ヴイオフォルム	537	オキシウリン	372
エンテロノン	142	オキシフル	372
エンテロバチン	142	オキシピリン	372
エンテロール	141	オキホルモン	355
エンドヨヂン	141	オギモール	354
エントラ(エントラスチン)	142	オーキゾール	354
エンピオ	138	オクサン	371
エンピオール	138	オクスベル	372
エンフシン	141	オクスベルチン	372
エーシツブ	30	オクソチン	372
エーシユリン	34	オクチヌム	353
		オーゲン	38
		黄降汞軟膏	300
		オサミノール	366
		オサピン	366
		オサンチゲン	366
		オスキ	367
		オスゲン	367
		オスバニール	367

オ ラ

オイクビン	151
-------	-----

オストアミナール	367	オフチン	360
オストシン	367	オブトニグム	362
オストログランドール	354	オブトピン	362
オスワクチン	564	オブナール	354
オスワツクス	368	オブリバー	361
オスザルサン	368	オボキナーゼ	360
オーセイ	355	オボゲニン	360
オセンタ	353	オボスタチン	361
オソヂン	367	オボボン(スコボラ(コ、アトロピン))	361
オタゴール	368	オボラール	371
黄疸出血性スピロヘーター血清	22	オーホリン	359
オートジゼニン	38	オボレニン	361
オートジン	38	オーマ	354
オチトール	368	オムスタリン	358
オチモン	353	オムセー	358
オツエニン	373	オムゼニン	357
オツエノール	373	オムソール	357
オツソフイット	367	オムソルヂン	358
オトツクス	369	オムトミン	357
オトニン	368	オムナヂン	356
オトスクレロール	368	オムナール	356
オトリジン	368	オムナーゲン	356
オトレオン	369	オムニカイン	356
◇黄軟膏(◇印)	358	オムニージェン	357
オニムシン	358	オムニン	357
オーネス	355	オムラミン	357
オノーヴイタミン B	359	オムール	357
オノシユリン	358	重湯末	357
オバクール	353	オーラムキン	38
オバホルモン(ペンツアート球)	369	オラルチード	362
オバリアン	370	オラール, テトラゲノスト	362
オバリヂン	371	オリザニン(糖)	365
オバリン	371	オリザニン結晶液	366
オバレニン	424	オリザピトン	366
オパロン	360	オリフリン	356
オピサン	360	オリゼー	365
オー, ビー, シー	353	オリボリン	365
オピソート	371	オリボール	364
オピール	360	オルガネシウム	363
オブソレン	361	オルガル	363
オブタール油	353	オルキモン	362
オブタルソン	361	オルゾル, ゴールド	364
オブタンデント	353	オルチゾン	364

オルトフォルム	364
オルトベリン	364
オルヒス(コムバウンド錠)	362
オルビゾール	355
オルヒチン	363
オルフオン	363
オルメヂン	363
オレキシチン	363
オロピンチン	356
オンセンズ	359

カ

芥子 pasta	447
カヴイドール	250
カウザルツ	87
カウフチン	108
カウレチン	87
カカチン	68
ガクチリン錠	485
カクロリン液	246
カケミ純葡萄糖液	185
カコヂリン	68
カコヂリン(ジャマ)	68
柏木チアスターゼ	250
カスカラエバキユアント	85
カスカラサグラダ糖衣錠(各種)	85
カスカリン	86
カスタロール	86
カスピス	85
カゼオザン	86
カーダ	246
カーター氏リツトルリパーゼ	85
ガタフオリン	172
ガダミン	171
カタミン	86
カタラツクス	87
カタリサチン	250
カタルチン	86
カタロイシン	87

果糖(結晶)	167
「カット」脱脂麥角	454
「カット」デギタリス葉	122
カデヒヨール	68
カナベリン製剤	248
カネロン	249
カビゾール	81
カビヤ	249
カビラルサン	82
カブソリン	81
カブホルモン	82
カブレミン	81
カフローゼ	246
カプロミン	68
カーフライン	70
壁島式微毒診断セット	246
カーボゾルピン	83
カーボニン	83
カポノール	81
カマトンカンファ	247
カマフエトン	76
カマリン	247
カミツレ濕布液	247
カムラジン	81
カムステリン	80
カムナホール	77
カンパノール	77
ガメヨヂン	172
ガメラン	172
◇カモボン	247
櫃の實	251
カヤノール	251
カヨザリン	70
カラシミン	82
ガラシン	171
ガラクトサン	171
カラニウム	82
カリクレイン	246
カリザニン	76
カリフォルム	247
カリブロン	246
カルキョール	246
カルクヴィタコーゼ	74

【カ】

カルコーゼ..... 75
 ガルコン..... 172
 第一カルシウム糖液..... 182
 カルシオ, コラミン..... 106
 カルシウム, ヘモグロビン..... 199
 カルシツブ..... 76
 ガルスチン..... 171
 ガルダン..... 172
 カルチアゾール(エフエドリン)..... 84
 カルチウム_Lサンド⁷(製劑)..... 78
 カルチウム舍利別(製劑)..... 74
 カルチオコラミン..... 106
 カルチオザルツ..... 76
 カルチオヂウレ..... 72
 カルチコール(製劑)..... 71
 カルチゾール..... 72
 カルチトーゼ..... 76
 カルチノン..... 84
 ◎カルチフアン..... 72
 カルチプロナート_Lサンド⁷..... 71
 カルチン..... 76
 カルツアナ..... 247
 カルデキサ..... 74
 カルデツクス..... 84
 カルニヴァール..... 84
 カルニイン..... 84
 カルビタ錠(カルシオ, ビタカルチン)..... 76
 カルノドール(坐薬)..... 85
 カルピン..... 82
 カルフオ, レイヨール..... 75
 カルフラヴィン..... 74
 カルブンケン..... 249
 カルベン..... 70
 カルボン錠..... 83
 カルマザン..... 75
 カルモチン..... 75
 カルモル..... 75
 カルヨヂン..... 75
 ガレリン..... 171
 カロシン..... 430
 ガロステリン..... 171
 カロナジン..... 250
 ガロフオス..... 171

カロリー縮..... 75
 カワクリン..... 250
 カワサンタール..... 250
 河野ピツク..... 578
 乾燥甲状腺末(チレオイド)..... 504
 乾燥睾丸實質..... 362
 乾燥松果腺錠..... 249
 乾燥上皮小體錠..... 383
 乾燥胎盤實質..... 117
 乾燥乳腺實質..... 282
 乾燥腦下垂體前葉錠..... 396
 乾燥腦下垂體全腺..... 396
 乾燥卵巢黃體膠囊..... 107
 乾燥卵巢實質(無黃體)..... 370
 肝臓末..... 265
 カندان..... 81
 カンヂオリン..... 81
 カンチロス..... 249
 カンデニン..... 77
 カントール..... 249
 カンパノール..... 77
 カンピロミン..... 80
 カンピロン..... 80
 カンファアホルモン..... 77
 カンフエナール..... 430
 カンフオキシシン..... 80
 カンフオコール..... 78
 カンフオリン..... 79
 カンフオロイド..... 78
 カンプトール..... 247
 カンプル吸入劑(櫻木)..... 79
 カンプル注射液(無菌)(各種)..... 78
 カンプル注射液(各種)..... 78
 カンプル葡萄糖注射液..... 79
 カンプル油(三共)..... 78
 カンプル油(無菌)(各種)..... 78
 カンプロリン..... 80
 カンベトン..... 77
 カンペロール..... 77
 カンボイン..... 247
 カンホトニン..... 80
 カンポリジン..... 80
 肝油球(各種)..... 101

肝乳(三共)..... 447
 肝油(高橋氏改良)..... 101
 肝油(各種)..... 101

キ

九研内服ワクチン..... 565
 キウレニン..... 92
 キオシン..... 254
 菊十字ゴム絆創膏(レーヨン)..... 577
 キクワカ..... 253
 キササゲ..... 254
 キシコノン..... 551
 キシタルゴール..... 551
 キソール..... 551
 北方産兒點眼液..... 254
 ギトコーゼ..... 176
 ギトザン(注射液)..... 176
 キドニン..... 253
 キナゼリン..... 90
 キナチオザルコール..... 499
 キナヒバン..... 89
 キナビラキシシン..... 90
 キナブルトーゼ..... 54
 キナヘモグロビン..... 199
 キナポリタミン..... 402
 キナボン..... 417
 キナロール..... 90
 ギナンドール..... 196
 キニーネカルチウム..... 91
 キニーネ肝油球..... 102
 絹絆創膏..... 577
 ギネア..... 196
 ギネルゲン..... 196
 キノフェン(各種)..... 417
 キノフェンカルチウム..... 418
 キノフェニール..... 418
 キノマトン..... 91

キノミール..... 253
 ギフロソ..... 176
 キムヨドコール..... 253
 キヤザリン..... 87
 キユウイン..... 258
 キューラ..... 111
 狂犬病豫防液..... 565
 キョチトール..... 253
 強力ウリヒン..... 258
 強力オノビタミンB₁..... 359
 強力ヌトリミン..... 350
 銀エレクトロイド(軟膏)..... 134.135
 銀ワギン..... 531
 金エレクトロイド..... 135
 銀スプーマン..... 471

【カ、キ、ク】

ク

グアヤカルゼン..... 194
 グアヤコーゼ..... 194
 グアヤコチミツシン..... 502
 グアヤコール, エキホス..... 155
 グアヤコールカルシウム..... 194
 グアヤコール, 肝油球..... 102
 グアヤコール, タカローゼ..... 485
 グアヤコール, タカシツブ..... 486
 グアヤコール, パブホス..... 380
 グアヤコールビタローゼ..... 541
 グアヤコール, プルトーゼ..... 54
 グアヤコール, ヘモグロビン..... 199
 グアヤコール, ポリタミン..... 401
 グアヤハツブ..... 288
 クエラート..... 417
 枸橼酸加硫酸バリウム..... 42
 クエン酸曹達注射液..... 258.313
 クエン酸銅軟膏..... 257
 クニヂウム..... 100
 クツベルプルトーゼ..... 258
 クプレツキス..... 110

クペロン	110
グミーボンボン	195
グラヴイトール	192
グラウコサン	177
クラウデン	99
グラウノン(カルシウム)	178
グラゾール	177
グラヌゲノール	192
グラバル	192
グラビブリン	99
グラビン	177
グラベリン	192
グラボン	177
クラールギン	254
クリオゲニン	110
クリオピン	257
グリカノーゼ	186
グリカール	186
グリコゲン	186
グリコスターゼ	187
グリコナル錠	186
◇グリコラクチン	186
グリスメール	187
クリスバリウム	110
クリセミン	97
グリセロ磷酸エレキシール	136
グリセロ磷酸カルチウム	186
クリゾタン	110
グリテール pasta	188
クリプタール	109
グリホス(スベチ)	188
クリマグ	109
クリマクトーン	254
クリマセダン	254
グリミトール	195
グリオン	187
グリーンフェゾール	193
グリーマイカル	296
クルクロン	109
グルコカルチウム	178
グルコシン(カルシウム、リニゲル)	179
グルコハルン錠	179
グルゴール	195

グルコン注射液	179
グルゾン	195
グルブローム	178
タルベオール軟膏	99.100
クレオコール	257
クレオソート糖衣錠	109
クレオソート丸	109
クレオホルム	256
クレザトール	257
クレジヴアール	257
クレノイジン	256
グレノール	193
クレバリン	257
グレプチオン	177
グレミドン	193
グレラン(プロム、ザルソ)	193
クレロール	257
クロアモン	92
クローカイン	92
クロカトール	92
クロカル注射液	94
グロサール	178
クロデキシン	92
クロトミン	96
クロナトール	92
クロナール	95
クロマーシン	97
クロラドン	93
クロラミンチー	93
クロールエチール	8.93
クロールナトリウム注射液	95
クロレトーン	95
クロロフォルム 麻酔用(各種)	95.96
グワヤコールカルシウム	194

ケ

外科用ピツイトリン	397
硅酸注射液	253

珪マダ	251
ケシノール	252
ゲシユウリン	175
ケージン	251
ゲダルミン	172
ケーソナール	251
ケバルール	251
結核菌コクチゲン	255
血清(各種)	565
ゲドクゲン	173
ゲドツクス	173
ゲネグランドール	174
ゲネスチプトール	174
ゲネゾール	174
ゲネルモンエム	174
ゲヒロール	172
ゲラミン	175
ゲラチン液(各種)	173
ゲラノン	173
ケリオス	252
ケリオール	251
ゲリゾン	175
ゲルバミン	173
ゲルベ軟膏	174
ゲルマニン	175
ケレーン	251
玄華	174
◇キノボン	175
ゲンノール	174

コ

コアグレン	100
◇コアグロート	100
コアブルチン	100
コイコラクミン	103
コイテン	253
コイヒチン	252
コイフステン(コリン)	252

コイラクチン	103
コインコパー	103
コウカール	255
抗化膿菌性ヤトレン, ワクチン	555
抗壞疽血清「パストル」	576
高張チオザルコール	255
コクサンニバM. A. P. NB	256
コクチゲン(軟膏)	255
コケモゾール	255
コケモン	255
固形フォルマリン	381
ココア加硫酸バリウム	43
甲状腺實質	504
コスモール	108
コタルニンゼラチン	108
コタルモン	108
小粒ノルモザン	345
コツホ氏結核菌乳劑	517
コデナールアトロピン	101
ゴナクリン	188
ゴナドトロピン	189
ゴナモール	105
ゴニバル	189
ゴノアミオール	189
ゴノウロカール	192
ゴノウロサミン	525
ゴノウロチン	192
ゴノカフラビン	189
ゴノカルチン	189
ゴノカール	189
ゴノゲン	190
ゴノザリン(内服)	191
ゴノサール	190
ゴノサルピン	190
ゴノサン	190
ゴノスターゲン(ネオ)	191
ゴノゼスキン	191
ゴノゾールギン	191
ゴノツシン	191
ゴノポリミン	190
ゴノヤトレン	555
香腦油	256
ゴノプロカノン	60

ゴノワギノール..... 532
 ゴノントール..... 190
 コヒナゲン..... 252
 抗腹膜炎血清..... 576
 コバイバルサム膠球..... 340
 コファイトール..... 97
 コフェミナル複方錠..... 102
 コフシロツブ..... 108
 コーブスルテウム錠..... 107
 コフタギン(ネオ)..... 102
 コフミン「コメツト」..... 102
 コボイ..... 255
 コムジスモン..... 105
 コムバリモン..... 105
 ゴム絆創膏(各種)..... 577
 コムブス..... 104
 コムブラール..... 105
 コムボルモン..... 105
 「コメツト」カルチウム..... 104
 「コメツト」ヂアスターゼ..... 104
 「コメツト」パンク..... 104
 「コメツト」マルツ汁エキス..... 104
 コメニン..... 104
 コラミン「チバ」..... 106
 コーラルゲン..... 103
 コリゲン..... 106
 コリチン..... 256
 コリフィンボンボン..... 108
 コリヤトレン..... 555
 コルダミン..... 188
 コルチヂン..... 107
 コルニヂン..... 106
 コルボラルテア..... 107
 コルンエキス..... 107
 コレクトA..... 109
 コレレチン..... 96
 コロ液(製糖)..... 103
 コローゲン..... 96
 コンヴァロン..... 106
 コングリン..... 105
 コントツツシン..... 106
 コントラルギン, バスタ..... 106

サ

サイプロテイン溶液..... 505
 サイマスグランド..... 504
 サイマス錠..... 504
 サイロール..... 438
 サウリヂン..... 450
 ザオキン..... 561
 サキシール..... 451
 サキシロン..... 451
 サクナチン..... 439
 サザロン..... 450
 サダオー..... 438
 サチウロミン..... 450
 サツカローゲン..... 438
 サツキニン..... 451
 サーナー..... 445
 サナキン..... 445
 サナトーゲン..... 446
 サナビリン..... 446
 サナモール..... 445
 サナリン(ガーゼ)..... 445
 サニチューブ..... 446
 サノイヂン..... 447
 サノスチヂン..... 448
 サノスリン..... 448
 サノフタルミン..... 448
 サノラ..... 448
 サビエニン, エム..... 449
 ♪サビオール(ナトリウム, ネオ)..... 450
 サヒヨエン..... 438
 ♪サフラビン..... 438
 サボナ..... 449
 サボホルム..... 449
 サヤウリン..... 451
 サヨヂン..... 438
 サヨフラミン..... 439
 サヨプロリン..... 438
 サリカルシン(葡萄糖, ネオ)..... 440
 サリカロール..... 441
 サリチル酸カルチウム注射液..... 440

サリチール絆創膏..... 578
 サリトロピン..... 441
 サリドン..... 450
 サリプロールデキストローゼ..... 441
 サリホリン..... 441
 ザリールガン..... 445
 サルグイター..... 445
 サルカトーゼ..... 440
 ザルカフエン..... 439
 サルカル葡萄糖..... 439
 ザルソカルチコール..... 71
 サルサヂン..... 442
 ザルソイベトン..... 444
 ザルソーデカブロン..... 443
 ザルソグレラン..... 193
 ザルソバルブロン..... 443
 ザルソピラキシシ..... 444
 ザルソプロカトール..... 443
 ザルソプロカノン..... 60
 ザルソプロカルノーゼ..... 59
 ザルソプロカローゼ..... 60
 ザルソプロデキシシ..... 61
 ザルソプロベトン..... 443
 ザルソプロマトン..... 443
 サルター..... 444
 ザルチョーカール..... 441
 サルトロン..... 444
 サルバナトリツシエン..... 444
 サルヒニン..... 440
 サルフアン..... 478
 ザルプロ..... 232.439
 ザルプロール..... 439
 サルホール..... 479
 サルボニン..... 442
 ザレナール..... 440
 ザレーン..... 440
 ザロウルチン..... 442
 サロピリン..... 442
 ザロフエン..... 442
 サロメチール..... 441
 サロミン(R)..... 442
 サルアルサン(ナトリウム)..... 444
 産科用ピツイトリン..... 396

サンカール(糖液)..... 446
 サンキヂン..... 447
 三共芥子バスタ..... 447
 三共ビタミンA..... 542
 三共ビタミン膠球..... 544
 三共ビタミン錠..... 542
 三共栄養糖..... 310
 三共肝乳..... 447
 三共硝酸銀溶液..... 447
 三共薬用炭..... 83
 三共内服ワクチン..... 565
 三共副腎末..... 480
 三共燐肝油乳劑..... 447
 三共淋菌ワクチン..... 189
 三研アポモル注射液..... 25
 三研ウアバイン注射液..... 446
 三研オキシチアン汞..... 217
 三研ヨヒンベ注射液..... 557
 サンタコール..... 448
 サントルパール..... 449
 サンチイメ..... 449
 サンチール..... 449
 ♪サントニン..... 448
 ♪サントゾール..... 449
 サントペロニン..... 449
 サンピス..... 446
 サンプキン..... 445
 サンプーン..... 448
 サンボン..... 445
 サンミルヘン..... 447

シ

シウエフエリン..... 452
 四鹽化炭素「タケダ」..... 83
 四鹽化炭素球「イシカワ」..... 83
 ジオザン..... 463
 シオダン..... 463
 シクロ..... 461
 止血蠟..... 55

ジゴワール..... 481
 シーコルピン..... 99
 シーシツクリメデイ..... 453
 システマイン..... 482
 ジストニン..... 483
 シストメンチン..... 463
 シータミン..... 110
 シツカロール(pasta)..... 461
 シツコル..... 461
 シトロネマ..... 99
 シナップ..... 462
 シネコロジナ..... 481
 シービーブラノーゼ..... 87
 ジフキリン..... 482
 ジフキロール..... 482
 シーフル..... 89
 ジフロゼ..... 482
 シマトール..... 460
 シム, アイデオール..... 460
 シムフス..... 460
 シムメナリン..... 481
 志村乳酸カルチウム..... 73
 志村複方乳酸カルチウム..... 539
 下田式純肝油..... 460
 シモール..... 460
 シヤツテン..... 451
 弱ツサルギン..... 519
 ジヤボニン..... 235
 シヤンケリン..... 460
 ジヤムブル, シード..... 235
 ジュピオンパスタ(吸入劑)..... 243
 賞肝..... 461
 ジョスチン..... 242
 ショレパール..... 96
 ショーワフラビン..... 461
 純ネオタンザルサン..... 333
 重パラチノイド..... 51
 ジューソニン..... 243
 純イマーゲン..... 224
 純糖油..... 349
 純葡萄糖末..... 181
 純ベリベロール..... 46
 純マルコダーゼ..... 286

硝酸銀溶液..... 447.462
 硝酸ストリキニーネ注射液(各種)..... 475
 滋養糖(犬用)..... 236
 ショレパール..... 96
 ジョンソン亞鉛華絆創膏(ゴム)(索引絆)..... 577
 シラーレン「サンド」..... 452
 ジラン..... 562
 シリカ..... 462
 ジリナール..... 462
 シーリン..... 496
 ジルペロイド..... 462
 シロリン..... 463
 新光レバー..... 461
 ジンゼニン..... 176
 ジンタリン(R)..... 482
 ジンテナリン..... 482
 シンパレニン液..... 481
 シンピリン..... 462
 ジンファイリン..... 482
 ジンホルモン..... 481
 腎盂炎ワクチン..... 474

ス

水銀エレクトロイド(軟膏)..... 135
 水銀絆創膏..... 417
 スイミナール..... 477
 スカポール(ガム)..... 451
 スギウロン..... 477
 スキンパツチ..... 463
 スキンラム..... 463
 スクレジン..... 464
 スタロカイン..... 453
 スタロリチン..... 453
 スコボラミン注射液(各種)..... 452
 スコロイド..... 452
 スコロドール(クボチン)..... 452
 錫エレクトロイド..... 135
 鈴村氏滅菌ゼラチン液..... 173

スーセオール..... 481
 スタビゾール..... 472
 スタビダ(スタルクビタベリン)..... 538
 スタヒロン錠..... 472
 スタフキロチン..... 472
 スタフキロヤトレン..... 555
 スタブロン..... 472
 スタルクキニン..... 472
 ステプトール錠..... 476
 ステブナール(軟膏)..... 473
 ステミン..... 473
 ステムラーゼ..... 473
 ステムリン(エム. デー. ゲー)..... 473
 ステラコール..... 476
 スチルヂン..... 473
 スチロガン..... 476
 スチロラル..... 452
 ステイプチチン..... 476
 ステリール..... 472
 ストバルゾール..... 474
 ストパン錠..... 474
 ストポール錠..... 474
 ストモブゾン..... 474
 ストラクソール..... 474
 ストリキニーネ注射液(各種)..... 475
 ストリヒニン, カブホルモン..... 82
 ストルミン..... 476
 ストレブチン..... 474
 ストレプトヤトレン..... 555
 ストロファンチン(注射液)..... 475
 スロンチウラン(ネオ)..... 475
 スナップーン..... 464
 スパグリン..... 467
 スパサルチン..... 468
 スパーション..... 468
 スバスター..... 468
 スバスマルギン..... 468
 スバスマリジン..... 468
 スーパートリパ..... 480
 スパボン..... 468
 スバミドール(マイ)..... 467
 スパモリン..... 468
 スパルミン..... 467
 スビカイン..... 470
 スビカール..... 470
 スビナチン..... 470
 スピール硬膏..... 471
 スピロザール..... 470
 スピロチード..... 470
 スピロトール..... 470
 スピロビスモール..... 470
 ズブクロン..... 476
 ズブコニン..... 477
 ズブトニン..... 477
 ズブネフリン..... 477
 スプーマン..... 471
 スブラレニン..... 480
 スプレノゲン..... 471
 スフロゲール..... 477
 スブロン錠..... 471
 スベチ, グリホス..... 188
 スベチヨード..... 469
 スベルゾン(アヂノ)..... 469
 スベルマチン..... 469
 スベルミン(各種)..... 469
 スベルモレニン..... 425
 スポーツ救急函..... 471
 スポーツ絆..... 471
 スラオン..... 464
 ズルジール..... 480
 スルファニール酸..... 480
 スルファピリチン..... 478
 スルファミン(膠木)..... 477
 ズルファン(オーモト)..... 478
 スルフォイドール..... 480
 ズルフォイル..... 479
 スルフォエーラミゾール..... 478
 ズルフォキシルサルザルサン..... 479
 スルホサリチル酸(ソーダ)..... 480
 ズルホジール..... 479
 ズルホン..... 479
 スルホビール..... 478
 ズルフォヂン(レオ)..... 479
 ズルフロール..... 479
 スローンスリニメント..... 502

セ

セイコチン..... 457
 生理的食鹽水(各種)..... 95
 セイロボン..... 89
 セイロボン, オー, エス, エス 89
 セオール..... 88
 セカエルゴン..... 454
 セカコルニン..... 458
 ゼカミン..... 561
 セカルチン..... 454
 セカロイド..... 454
 セキサノール(ネオ)..... 459
 セキサミン..... 460
 セキソニン..... 460
 咳止ボンボン..... 108
 セキマイン..... 459
 セクレタミン..... 454
 ゼコマルト..... 235
 ◎ゼコラ..... 235
 ◎ゼコラミン..... 235
 セスタリン..... 459
 セストロン..... 459
 セダイノール..... 454
 セダギン..... 483
 セダコール..... 454
 セダチグアール..... 455
 セダチグアン..... 456
 セダチモン..... 455
 セダトモン..... 456
 セダポリシン..... 455
 セダルピン..... 455
 セダロン..... 455
 セダンス液(錠)..... 455
 セデス..... 456
 セドナモン..... 456
 セドノール..... 456
 セドブロール..... 456
 セドラン..... 456

セナチゾール..... 457
 セネガロン..... 457
 セパロチン..... 458
 セブソルピン..... 458
 セブチール..... 458
 セプトリン..... 458
 セプロ..... 459
 ◎セフアドール..... 88
 セモリ..... 457
 セラキシム..... 458
 セラジン..... 88
 ゼラチン注射液(各種)..... 173
 セールモン..... 457
 セレニウム..... 458
 セレプロホルモン..... 88
 セロイヂン..... 114
 センソニン..... 457
 センソール..... 457

ソ

ソイノン..... 464
 ソゴール..... 464
 蒼鉛エレクトロイド..... 135
 蒼鉛乳..... 297
 ソシオール..... 466
 創製リンゴルド液..... 363
 ソゾドール(ナトリウム)..... 466
 ソーダミント錠..... 464
 ゾナール..... 562
 ソボリン..... 466
 ソマトーゼ(液状)..... 466
 ソムナール..... 466
 ソラルソン..... 465
 ゴルガナール..... 465
 ゴールキナ..... 465
 ゴルヒン..... 465
 ゴルブチン..... 465

タ

ゾルメチン(腫瘍ヘモ)..... 465
 ゴルボヒン(カルチウム)..... 466
 ソレスチン..... 465
 ダイアース..... 113
 第一純葡萄糖..... 181
 第一糖液(カルシウム)..... 182
 大京ビタミンC注射液..... 113
 大京ビタミンA球..... 113
 「大京」トリハ(葡萄糖)..... 515
 體素..... 485
 大腸菌コクチゲン..... 255
 胎盤實質(乾燥)..... 117
 大風子油球..... 217
 ダイトカミン..... 113
 ダイモール(オイントメント)(舍利明)..... 124
 タウゲン..... 489
 タウトロン..... 490
 タウリン..... 489
 タウロ(タウロライン)..... 489
 タウロイツクス..... 490
 タウローゲン..... 489
 タウローゼ..... 490
 タウロネルピン..... 490
 タウロバスタ..... 490
 タウロミン..... 489
 タウロライン..... 490
 タウロール..... 489
 タカサーチン..... 486
 タカシツブ(ゲアヤコール)..... 486
 タカスチン..... 487
 タカチアスターゼ(強壯酒)..... 486
 タカデキスト..... 485
 タカモール(ネオ)..... 486
 タカリヂン..... 486
 タカローゼ(製剤)..... 485

チ

タクソール..... 490
 タスカ..... 489
 タゾール..... 114
 ◎タドーゲン..... 113
 脱脂麥角カッツ..... 454
 タナパン..... 487
 ダニトール..... 114
 ダムネツク..... 113
 ダモラ..... 113
 ◎タラクロール..... 488
 ダリオス..... 114
 タルギン..... 488
 タルゲシン..... 488
 ダルゲリン..... 114
 タルタリン..... 487
 タロンチル..... 488
 タンオレ..... 488
 タンカーゼ..... 487
 タンカーボン..... 487
 ダンケルン..... 114
 タンセパレー..... 488
 タンニン酸レミジン..... 423
 タンノフォルム..... 487
 丹波プロテイン銀..... 410
 タンプオニン..... 488
 タンペリン..... 487
 チアツオ液..... 120
 チアベテセリン..... 119
 チアベトン..... 119
 チアール..... 120
 チアラツクス錠..... 120
 チウカルチン..... 126
 重パラチノイド..... 51
 チウラン..... 126
 チウレチン..... 126

ヂウレチンカルチウム(製劑)..... 127
 ジー, エス, ペプトン..... 388
 チエチン(精糖)..... 89
 チエフアン..... 88
 チエロリン丸..... 88
 チオザルコール..... 499
 チオスナ..... 500
 チオコール..... 498
 チオゾコール..... 500
 チオニン..... 125
 チオノール(カルチウム)..... 499
 チオノール銀液(チオタルガン)..... 499
 チオビス..... 498
 チオブロール..... 504
 チオヘモ..... 124
 チガレーン..... 121
 チギカルフェイン..... 121
 チギカンファー..... 121
 チギタミン..... 122
 チギタリス葉(製劑)..... 121
 チギトカンファー..... 123
 チギトサン..... 123
 チギトゼ..... 123
 チギフォリン..... 121
 チギブラツーム..... 122
 チギヘルトン..... 121
 チギホナール..... 123
 チギラニド..... 122
 チギラノゲン..... 122
 チグノリン..... 98
 チクロフォルム..... 111
 チゲスチン..... 121
 チゲナルシン..... 120
 チゲノール..... 498
 チゲラキシム..... 120
 チゴキン..... 563
 チゴヂット..... 120
 チシオ..... 92
 ◆チスクレン..... 125
 チスタゲン..... 111
 チスタブリン..... 111
 チステムパー豫防液(北研)..... 126
 チストール(ネオ)..... 111

Gストロファンチン注射液..... 194
 ゼスベシン..... 130
 ゼスメン..... 126
 ゼズール..... 127
 ゼセアタール..... 125
 ゼゾービン..... 92
 ゼソメアル..... 126
 ゼヂアール..... 120
 實絆..... 578
 チトゾール(ハタ)..... 99
 チトナール..... 92
 チトナチン..... 98
 チトバリウム..... 98
 チトミロン..... 98
 チトラール..... 98
 チトリウム..... 98
 チトロナール..... 99
 チノキシール..... 563
 チノミン..... 562
 チバアルギン..... 97
 チバ, エピネフリン..... 146
 チバルブミン..... 97
 チフェラミン..... 520
 チフォール..... 502
 チフテリーフォルモワクチン..... 577
 チフテリア, アナトキシム..... 577
 チプロザール..... 125
 チボリン..... 125
 チマジン..... 563
 チミツシン(製劑)..... 502
 チミン..... 563
 チムイトリン..... 503
 チモスト錠..... 503
 チモストニン..... 503
 チモナール..... 124
 チモファイジン..... 503
 チモフオーゲン..... 503
 チーモン..... 563
 チヤホツキン..... 561
 重水..... 117
 チュサイド..... 195
 チュセブチン..... 195
 チュール..... 500

ヂョヂール..... 123
 腸チフス菌コクチゲン..... 255
 腸チフス診断液..... 520
 腸チフス内服ワクチン..... 565
 腸チフスワクチン..... 565
 ヂラウヂット注射液..... 124
 ヂラクナール..... 125
 チラーヂン..... 504
 チルク..... 562
 チレオイデクチン..... 505
 チレオイド..... 504
 チレオグラントール..... 504
 チロイヂン..... 505
 チロイド(木炭)..... 505
 チロキシム..... 505
 ◆チロザルベ..... 505
 チロレニン..... 425
 ヂンツール..... 562
 チンセダール..... 91
 チンセトン..... 91

ツ

ツエビオン..... 87
 ツエビオン¹強¹..... 88
 ツエフィロール..... 561
 ツエラーゼ..... 562
 ツエラトミン..... 561
 ツエンテール..... 561
 ツーサチン..... 518
 ツサマグ..... 519
 ツサルギン(精)..... 519
 ツシアスト..... 519
 ◆ツシドリン(シロツブ)..... 520
 ツソイン..... 519
 ツトカイン..... 520
 ツバクロジン..... 517
 ツペコール..... 517
 ツペダリン..... 518

ツベルクロストローミン(A)(T.A.C)..... 517
 ツベルクリン..... 518
 ツペロイン..... 518
 ツペローゲン..... 518
 ツペロミン..... 518
 ツメノールアムモニウム..... 518
 ツヨール..... 520
 ツルヂアスターゼ..... 516
 ツルハロビン..... 516
 ツルベリン..... 516
 ツルモン..... 516

テ

テアチロン..... 496
 テイー, エー, ビーワクチン..... 576
 テイー, オー, セツクスホルモン..... 508
 テイマール..... 124
 テヴェガン..... 118
 テオチゾール..... 497
 テオチン..... 497
 テオノール..... 492
 テオフィリン..... 497
 テオフィルリン(精製, 錠)..... 497
 テオフエラミン..... 497
 テオミナール..... 497
 テオライミン..... 497
 テカルミン..... 491
 デガロール..... 115
 デキスカール..... 118
 デキサリン(精製)..... 118
 デキスフラグイン..... 118
 デキストネオトリゾール..... 118
 デキスト, マルコ..... 118
 デキストローゼ..... 119
 デキストロブーア..... 118
 デクトーゲン..... 115
 デコイフン..... 491
 デコセプト..... 115

デコラン	115
デコルバ	115
デシチン	117
デシビウム	115
デスカロール	117
デスザルベ	117
テストルモン	494
テストグランドール	495
テストノン	495
テストフォルタン	495
テストチン	495
テストグイロン	495
テストガン	495
テストロン	495
デタグイット	117
鐵エラルソン	134
鐵エレクトロイド	134
鐵肝油	496
鐵フィチン	160
鐵ヘパン錠	496
テツロイド	496
デトキソール(ネオ)	117
テトラタン	495
テトロドトキシチン	496
テトロファン	496
テネシタミン	492
テネスミン	492
テノシン	492
デノロン	116
テピラル	498
デファイバー	115
テーベ(TB)	491
テーベスパルトゲン	467
テーベター	491
テベラン	491
テポドール	493
テミチン	491
デュオデナム末	129
デュクレイン	129
デュンキニン	129
テラウーテン	491
テラピア	498
テラポール(軟膏)	498

デリアール	116
デリカ	116
テリガン	492
照内ペプトン	388
照内末	494
照内クオリン	494
テルカイン(アトロピン、スコポラミン)	493
テルギー	493
テルキノ	494
テルヒ	493
テルビヒン	494
テルベリ	492
デルマトビン	116
デルモ	116
デルモール	116
デルモツベリン	116
デルモライツ	116
テンカル	492
傳研内服ワクチン	565
傳研ワクチン	566

ト

銅エレクトロイド(軟膏)	135
◇銅軟膏	128
トウカキニン	507
痘苗	565
トーカノン	505
トーカリングル	268
トキソイド	508
トキワ絆	578
特殊ワクチン	576
ドクトルゲン	127
トクホミン	506
トコモニン	506
トコール	506
トツミツト	508
トーテンコ	508
トニクム	507
トニロツブ	507

トネフィン	507
トバルビン	128
トミアール	506
ドミクリン	128
トミロン	500
トモサン	507
トヨカール	509
トーヨー トロンポール	509
トラアベン	510
ドライアーゼ	123
ドライインズリン	227
ドライカンチノール	129
ドライゲン	129
トラーギン	506
トラクミン	509
トラコバン	509
ドラスミン	128
トラセンチナ	510
トラヒチン	480
トラブノン	509
トランスアルガン	509
トランスポン	509
トリアノン	511
トリカ	508
トリカルチウム	511
トリカルボル	512
トリーゲン	512
ドリコノ	129
トリコボン(アトロピン、スコポラミン)	512
トリコール(製糖)	507
トリサミン	516
トリセナリン	513
トリトール	513
トリハ(蘿蔔糖)	515
トリパカール	515
トリパゾール	515
トリパノール	515
トリパフラグイン	515
トリハロミン(糖液)	512
トリビスモン	511
トリビタモン	513
トリフアール	513
トリフェリン	512

ナ

トリブシン	516
トリブタン	516
トリフラン	515
トリベルミン	506
トリボラチン	511
トリンテール	513
トルダー	506
ドルマルギン	128
ドルミン	128
トレゾリン	511
トレポール(ネオ)	511
トレラン	510
トレンダール	511
トロカイン	514
トロゲスチン	500
トロバコカイン(各製)	514
トロフオブラスチン	514
ドロブタール(サンド)	127
トロムボゲン	501
ドロン	128
トロンブリン(ネオ)	501
トロンベチン	501
トロンベリ	501
内服ゴノザリン	191
ナガナ	310
ナガ芳香酵母(エキス)	310
ナグラボン	310
ナーザル錠(三夫)	313
ナセドール	313
◇ナタゴン	313
ナトロ, アクチバルサン	313
ナヨフォン末	310
ナール	310
ナルカイン	311
ナルゲモン	311
ナルコボン(各製糖)	311, 312

ナルピン..... 311
ナルベリジン..... 311

ニ

乳酸石灰..... 78
 乳腺實質(乾燥)..... 282
 ニカン滴劑..... 342
 ニコチラミン..... 342
 ニコルミン..... 342
 ニシチン..... 343
 ニチボリン..... 342
 ニツソカイン..... 344
 ニツポール..... 343
 日本新藥グイタミンA..... 542
 ◆ニデトン..... 342
 ニドストリン..... 343
 ニトラン..... 344
 ニトログリセリン錠..... 344
 ニトロゾール..... 344
 ニプロミン..... 342
 ニプロン..... 343
 ニューキン..... 341, 343
 尿素..... 202
 ニレゾール..... 343
 ニンヒドリン..... 343

ヌ

ヌクレイン酸溶液..... 348
 ヌクレイン注射液..... 349
 ヌトリミン(ネオ強)..... 349
 ヌトロゲン(犬印滋養錠)..... 236
 ヌトロゲン(萬有)(リボ)..... 350
 ヌベルカイナール..... 349

ヌベルカイン..... 349
 ヌマール..... 349

ネ

ネウロジン..... 339
 ネヴロスタン..... 341
 ネオアクチバルサン..... 315
 ネオアーヂン..... 315
 ネオアドロン..... 314
 ネオアライデン..... 315
 ネオアルサミノール..... 315
 ネオアルゼノール..... 316
 ネオアルゼント..... 316
 ネオアンチゴノシン..... 315
 ネオアンテヒボリン..... 315
 ネオイマミコール..... 224
 ネオグイタミノール..... 545
 ネオグイタベリン..... 335
 ネオウリヒン..... 335
 ネオウワエキス..... 335
 ネオ液..... 319
 ネオエバニン..... 320
 ネオエモイン錠..... 319
 ネオエフエドノン..... 320
 ネオエラオン..... 319
 ネオエーラミゾール..... 319
 ネオオレザール..... 325
 ネオカイン..... 317
 ネオカルゴノーゲン..... 317
 ネオカルジン..... 317
 ネオカンファア..... 317
 ネオ肝精..... 322
 ネオキナヒバン..... 318
 ネオキツク..... 322
 ネオ銀サルバルサン..... 330
 ネオクチン..... 323
 ネオクライエキス..... 322
 ネオゲブルチン..... 320

ネオコーゲン..... 323
 ネオゴノスタ..... 320
 ネオコルモン..... 318
 ネオサクトール..... 332
 ◆ネオサピオール..... 329
 ネオサリカルシン..... 441
 ネオザリン..... 329
 ネオザール..... 328
 ネオザルソープロマトン..... 323
 ネオサルバルサン..... 329
 ネオジヒアルジン..... 332
 ネオジゼニン..... 335
 ネオシルヴオール..... 330
 ネオシルバール..... 330
 ネオス(各種)..... 329
 ネオスコモルヂン..... 330
 ネオスターゲン..... 332
 ネオスチバルサン..... 332
 ネオスピカール..... 331
 ネオスピラルゼン..... 331
 ネオスピロザン..... 331
 ネオセオール..... 318
 ネオセキサノール..... 459
 ネオセスキン..... 330
 ネオゼンバルサン..... 335
 ネオソゴール..... 331
 ネオゾーフオルチン..... 331
 ネオタウリン..... 333
 ネオターゼ..... 333
 ネオタカモール..... 486
 ネオタマバル..... 332
 ネオタンカーボン..... 487
 ネオタンバルサン(純ネオ)..... 332
 ネオヂトール..... 318
 ネオツベタリン..... 334
 ネオテシン(エス)..... 333
 ネオデスザルベ..... 318
 ネオデトキソール..... 117
 ネオテミヂン錠..... 333
 ネオトニシン..... 334
 ネオトリコパー..... 334
 ネオトリゴン..... 334
 ネオトリゾール..... 334

ネオトリヂン..... 334
 ネオドルム..... 318
 ネオドレポール..... 511
 ネオトロピン..... 334
 ネオトロール錠..... 485
 ネオトロンプリン..... 333
 ネオトン..... 333
 ネオニイレミン..... 325
 ネオニール錠..... 179
 ネオヌトリミン..... 350
 ネオネオアーセミン..... 324
 ネオネオクバイアルサン..... 350
 ネオネオ液..... 325
 ネオネオコーゲン..... 323
 ネオネオコルン..... 107
 ネオネオチルミン..... 324
 ネオネオナトヴアルサン..... 325
 ネオネオヒソヴアルサン..... 325
 ネオネオラツプ..... 325
 ネオネオルエサルジン..... 325
 ネオノズブリン..... 346
 ネオハツモン..... 321
 ネオバラヌトリン..... 326
 ネオバルマン..... 326
 ネオバロール..... 43
 ネオビストラン..... 316
 ネオビスローゲン..... 316
 ネオヒソリン..... 321
 ◆ネオビチロール..... 327
 ネオビタニン..... 53
 ネオヒポアポ..... 218
 ネオヒポトニン..... 220
 ネオヒポトベリ..... 212
 ネオピリン..... 327
 ネオフアトシン..... 320
 ネオフイプロ元..... 161
 ネオブシコリン..... 328
 ネオフストール..... 216
 ネオフチゾール..... 326
 ネオブノン..... 327
 ネオブルトーゼ..... 54
 ネオプロナトゾール..... 317
 ネオヘキサール..... 321

ネオベクトン..... 326
 ネオベチナール..... 385
 ネオヘサチラミン..... 208
 ネオヘモトール(ネオ)..... 320
 ネオベリスチン..... 316
 ネオベリベロール..... 351
 ネオボルニバル..... 317
 ネオボレオン..... 327
 ネオボンヂール..... 327
 ネオボンターヂン..... 317
 ネオマルオキシソ..... 284
 ネオミノアリン..... 324
 ネオミルピン..... 324
 ネオモルダイン..... 303
 ネオヨシザリン..... 322
 ネオヨヂカソボル..... 322
 ネオラピン..... 328
 ネオリムフオミン..... 323
 ネオリヨラピン..... 324
 ネオルエサルジン..... 323
 ネオレスピラチン..... 426
 ネオレチクリン..... 328
 ネオレナリン..... 328
 ネーザルバーム..... 312
 ネスボサン..... 336
 ネツスルミルタフード..... 336
 ネフラレニン..... 424
 ネフリン..... 336
 ネマキル..... 314
 ネマトール..... 314
 ネマレス..... 314
 ネモタン..... 314
 ネルヴァ錠..... 336
 ネルケガン..... 314

ノ

ノイザール..... 340
 ノイジロン..... 850

ノイチン..... 340
 ノイチン衣白檀油..... 340
 ノイチン衣肝油..... 340
 ノイチン衣コパイババルサム..... 340
 ノイトール..... 340
 ノイツエゾール..... 337
 ノイナルシン..... 337
 ノキニプロミン..... 337
 ノイバーン..... 336
 ノキピタ..... 341
 ノイフチン..... 338
 ノイフラピン..... 337
 ノイペロール..... 336
 ノイマルコニン..... 337
 ノイミトール..... 337
 ノイラギー液..... 338
 ノイラーゲン..... 338
 ノイラチステン..... 339
 ノイラベリン..... 338
 ノイラボン..... 339
 ノイラリン..... 338
 ノイラール(葡萄酒)..... 338
 ノイラルギン..... 338
 ノイラルジン..... 339
 ノイラレチチン..... 339
 ノイレン..... 339
 ノイロギシン..... 339
 ノイロジン..... 339
 ノイロピタローゼ..... 541
 ノイロピン..... 340
 ノイロヤトレン..... 555
 ノイロール..... 340
 ノイロン..... 337
 ノヴァール..... 346
 脳下垂體全腺(乾燥)..... 396
 脳下垂體前葉錠(乾燥)..... 396
 ノタテナール..... 344
 濃厚銀エレクロイド..... 134
 濃厚チミツシン..... 502
 濃縮猩紅熱血精..... 451
 ノザギー..... 345
 ノズプリン(ネオ)..... 346
 ノバプロームデキスト..... 346

ノバボン..... 347
 ノブアズロール..... 347
 ノブアルゼノピロン..... 347
 ノボアドリン..... 347
 ノボカイン..... 347
 ノボコール..... 347
 ノボノール(複方)..... 348
 ノボプロチン..... 348
 ノボホルゲン..... 348
 ノボロフォルム..... 348
 ノボラミン..... 348
 ノヨヂン..... 344
 ノルマコール..... 344
 ノルマトン..... 345
 ノルモザン(製劑)..... 345
 ノルモラクトール..... 345
 ノザルギン(ネニネ)..... 346
 ノンモルピン..... 344

ハ

バアベス..... 375
 バイオクリーム..... 412
 肺炎菌コクチゲン..... 255
 ハイスン..... 200
 微毒反應液(マイニツケー氏)..... 304
 ハイナツクス..... 218
 バイニール..... 394
 ハイルミン..... 204
 バインターハネイ..... 394
 ハウ, エス, ビー..... 546
 バウダーシヨウメル..... 404
 バウロニン..... 385
 ハオニン..... 202
 白降汞軟膏..... 200
 白色アクチゾール..... 10
 ハクチールバスター..... 200
 バグナジン..... 41

ハ克蘭..... 200
 バグノン(強)..... 41
 ハコサン..... 198
 ハシエルゴツト..... 203
 バジオボン(製劑)..... 43
 ハシタウリン..... 203
 ハシツエン..... 203
 バシロフアゴール..... 41
 バスコサイド..... 413
 バスチル(フアトシン)..... 158
 バストリジン..... 383
 バストール..... 22
 バスパート..... 383
 バズマ..... 383
 ハセスロール..... 203
 ハタスルミン..... 203
 バツシフロリン..... 383
 ハツモン..... 203
 バチリン..... 41
 麥角(カウツ, 脱脂)..... 454
 麥角滅菌越幾斯..... 147
 バテステツキス..... 384
 バトローゲン..... 384
 バナヂン..... 375
 バノス..... 377
 ババー..... 379
 ババイン..... 379
 ババトラール..... 380
 バパニン..... 379
 ババベリン..... 380
 ババヨスターゼ..... 380
 ババベール..... 380
 バパリン..... 379
 バビナール(各種)..... 384
 バビロイン..... 384
 バビロインアトロピン(スコボラミン)..... 384
 バブホス(グアヤコール)..... 380
 バブラール..... 380
 バボサン..... 532
 ハマスルホサリチル酸..... 201
 ハマセスコール..... 201
 ハマメリスウオーター..... 201
 ハヤゾール..... 204

バラオキシ安息香酸ブチル..... 382
 バラギン..... 381
 バラシノメニン..... 462
 バラチオザルコール..... 499
 バラチフス菌, コクチゲン..... 255
 バラチフス診断液..... 388
 バラチレニン..... 424
 バラトール(複方)..... 375
 バラヌトリン..... 382
 バラミヂール..... 381
 バラミード..... 381
 バラミン..... 381
 バラリバン..... 382
 ハリブマルト..... 200
 ハリプトール..... 200
 ハリプロミン..... 202
 ハリバ..... 201
 パルタゴン桿..... 383
 ハルチン..... 201
 ハルトニン..... 202
 ハルノーゲン..... 202
 ハルミン..... 202
 ハロミン..... 201
 バロール(ネオ)..... 48
 パンオピン(スコポラミン)(アトロピン)..... 377
 パンカイン(注射液)..... 42
 パンギタール(10倍強力)..... 376
 パンキナチン..... 42
 パンクストーゼ..... 376
 パンクターゼ..... 376
 パンクレア錠..... 375
 パンクレアチン(重曹錠)..... 375
 パンクローム..... 42
 パンゲヂール..... 376
 パンシード..... 378
 パンセカール..... 377
 パンセブチン..... 378
 絆創膏類..... 577
 パンゾニール..... 378
 パンチギホール..... 376
 パンヂール..... 378
 パントカイン..... 378
 パントポーン(スコポラミン)..... 379

ヒ

バンナー..... 377
 萬有エフェドリン..... 144
 萬有グルコン注射液..... 179
 バンリバー..... 376

ビイル膏..... 578
 ビオアリン..... 48
 ビオカルク..... 48
 ビオカルチン..... 48
 ビオクタニン(黄膏)..... 412
 ビオゲノール..... 412
 ビオザリン..... 50
 ビオステリン..... 50
 ビオスメール..... 49
 ビオゼニン..... 49
 ビオセノン..... 412
 ビオゼルス..... 413
 ビオトモサン..... 50
 ビオトニク..... 50
 ビオトン..... 537
 ビオトラン..... 50
 ビオバン..... 50
 ビオフエルミン..... 49
 ビオフラビン..... 66
 ビーオーユー..... 404
 ビオラキシチン..... 49
 ビオラクチン..... 537
 ビオリヂン..... 413
 ビオルゲン..... 49
 ビオレトン(ライン)..... 49
 ビカーミン..... 536
 ビカルシン..... 393
 ヒギアマ..... 217
 ヒギトール..... 218
 ビグシン..... 47
 ビクラ(糖衣錠)..... 536
 ヒサゴスリン..... 212

◇ヒシイチ亜鉛絆..... 577
 ◇ヒシイチ印, 黄軟膏..... 358
 ◇ヒシイチ印, 銅軟膏..... 128
 ◇ヒシカーボン..... 83
 ビスアルゼン..... 51
 ヒスコパール..... 212
 ビスコロゲン..... 51
 ビスコソ..... 51
 ヒスタミン..... 213
 ヒスタメントA.B..... 213
 ヒステチン..... 213
 ビスチン..... 395
 ビストーヨー..... 53
 ヒスチン..... 212
 ビストラン(ネオ)..... 52
 ビスマチン..... 52
 ビスマートイドール..... 52
 ビスマノーゲン..... 51
 ビスマラル..... 52
 ビスマーゲン..... 51
 ビスローゲン..... 51
 ビスロイヘ..... 51
 ビスワギノール..... 532
 ヒソヴアルサン..... 213
 ヒソリン..... 212
 ビゾール..... 394
 ビタカルチン..... 539
 ビタカンファー..... 539
 ビタキナルミン..... 539
 ビタグルコーゼ..... 541
 ビタゲン(カルチウム)..... 541
 ビタコリン..... 540
 ビタゴール..... 395
 ビタシミン..... 539
 ビタス..... 430
 ビタストッフ..... 546
 ビタソート..... 545
 ビタニン(ネオ)..... 52, 53
 ビタベリン..... 341
 ビタベリン(強)..... 538
 ビタミノール(ネオ)..... 545
 ビタミンC(オーモト)..... 543
 ビタミンプロカノン..... 543

ビタユンゲン..... 541
 ビタルゴール..... 544
 ビタルモン..... 544
 ビタローゼ..... 541
 ◇ビチロール(製劑)..... 397
 ビツイタリー..... 396
 ビツイトリン..... 397
 ビツグラシン(外科用)..... 395
 ビツグランドール..... 395
 ビツレニン..... 424
 ヒディン..... 216
 ビトシン..... 395
 ビバスモン..... 545
 ◇ヒドノカリン..... 217
 ヒドノール..... 217
 ヒドラルギン..... 217
 ビトリブチン..... 53
 ビトリール..... 395
 ヒドロキシチン..... 217
 ヒドロフガール..... 210
 ヒドロナール..... 217
 ビトレツシン..... 395
 ビトン..... 545
 ビナスシロツブ..... 394
 ビナーレン..... 537
 ヒニゾール..... 91
 ヒニドリル..... 91
 ヒニカルチコール..... 71
 ヒネオナール..... 90
 ヒネロン..... 90
 ビノ吸入器..... 394
 ビノザリン..... 412
 ヒノゾール..... 91
 ビバスモン..... 545
 ヒパール..... 218
 ヒブナール..... 218
 ヒーブラチン(リミット)..... 216
 ビーフル..... 533
 ビープロタミラーゼ..... 410
 ヒベラミン..... 218
 ヒポアポ(ネオ)..... 218
 ヒポカイン..... 219
 ヒポクラチン..... 211

ヒポサルシン, ロイ..... 211
 ヒポトナール..... 220
 ヒポトニン(ネオ)..... 220
 ヒポトベリー(ネオ)..... 211
 ヒポノルヂン..... 211
 ヒポファイジン..... 219
 ヒポファイジン(強)..... 219
 ヒポファイゼ..... 219
 ヒポプレシン..... 219
 ヒポホルム..... 219
 ヒポホリン..... 219
 ヒポホール..... 211
 ヒボレニン..... 424
 ヒマオール..... 210
 ヒマシ油球..... 86
 ヒマーセン..... 210
 ヒメヂン..... 210
 白檀油球..... 411, 449
 百日咳菌コクチゲン..... 255
 百日咳菌ワクチン..... 391
 百日咳混合ワクチン..... 549
 ビヨスミン..... 48
 ヒヨレゴール..... 97
 平尾グイタミンB..... 212
 ビラヴエリン..... 414
 ビラキシシン..... 414
 ビラキノン..... 413
 ビラセダート..... 66
 ビラトフアン..... 414
 ビラピタール..... 413
 ビラペロン..... 413
 ビラミドン..... 413
 ビリヂウム..... 415
 ビリバル..... 48
 ビリバン(注射液)..... 415
 ビリフォルム..... 412
 ビリワクチン(各種)..... 565
 ヒリン..... 97
 ビルヤクリーム..... 536
 ビルミン..... 393
 ビルホン..... 415
 ビレゾーン..... 414
 ビレチン..... 414

ビレトキシシン18番..... 414
 ◎ビレバリン..... 414
 ビロカルピン..... 393
 ビロズルフ..... 394
 ヒンテリン..... 211
 ビンビス..... 537

フ

フアイナロール..... 162
 ファウ, エル, デー..... 546
 ファウ, デー, ゲン..... 534
 ファゴール..... 157
 ファスターゼ..... 157
 ファスト..... 157
 ファヂン..... 167
 ファトシン..... 158
 ファニン..... 391
 フアノドルム(カルチウム)..... 391, 392
 フアベリン..... 157
 フアンタン..... 157
 フィチン(鹽)..... 393
 フィツサン(製劑)..... 162
 フィプロ元(ネオ)..... 161
 フィプロリヂン..... 161
 フィーベリン..... 161
 フィラリジン..... 161
 フィルマロン油..... 161
 フェスター..... 160
 フェチオタンクリーム..... 392
 フェトール(ゼラチン液)..... 160
 フェノールスルフォフタレイン溶液..... 392
 フェバセニン..... 158
 フェブロン..... 158
 フェミホルモン..... 158
 フェラチン(アルゼン・ヨード)..... 159
 フェラトーゼ(アルゼン・ヨード)..... 159
 フェラミン..... 158
 フェルオヴオグランドール..... 159

プエルチン..... 474
 フェルミスターゼ..... 159
 フェロ..... 160
 フェロース(次亜燐酸合利別)..... 159
 フェローゼ(アルゼン・ヨード)..... 160
 フェオスカー..... 392
 フェオステミン..... 166
 フェオリケルモン..... 165
 フェオルゲニン..... 165
 フェオルマミント..... 165
 フェオルミチール..... 166
 フェオルムゾール..... 166
 ブカワクチン..... 565
 副腎末(乾燥)..... 480
 複方アンチヘブリン錠..... 21
 複方鹽酸エメチン..... 139
 複方カルチウム合利別..... 74
 複方クレゾール..... 109
 複方ノボノール球..... 348
 複方ネオナール..... 324
 複方ブロンヂン..... 64
 複方メチレンプリュー錠..... 293
 複方沃度カルチウム..... 72
 フジコーゼン..... 167
 フジチーラン..... 168
 フジポニン..... 167
 富士リチネール..... 429
 フジレバー..... 167
 フシロツブ..... 169
 フジロール..... 168
 フスゲン..... 215
 フスコール..... 169
 フスコヂン..... 169
 フスタギン..... 216
 フスチヂン..... 216
 フストール(ネオ)..... 216
 フスパン..... 215
 フタバ稀釋液..... 169
 ブチノール..... 546
 ブチロール..... 393
 ブチン..... 546
 葡萄状球菌コクチゲン..... 255
 葡萄糖(第一純)..... 181

葡萄糖アンナカ注射液..... 119
 葡萄糖石灰注射液..... 119
 葡萄糖カルチウム注射液(各社)..... 185
 葡萄糖カンフル注射液(マルコ)..... 119
 葡萄糖注射液(各社)..... 180
 ブトラン..... 66
 ブドール..... 411
 フトルミン..... 169
 船橋新染色液..... 168
 ブノイノン..... 399
 ブノイミン(カルチウム)..... 399
 ブノキモチン..... 399
 ブペローゲン..... 411
 ブホタリス..... 65
 ブボトール..... 65
 ブボノール..... 65
 フマガソラン..... 215
 フライン..... 164
 フラヴイクロール..... 163
 フラヴイノール..... 164
 フラヴイン葡萄糖..... 163
 フラヴエイン..... 163
 フラウリン..... 166
 ブラオン..... 53
 ブラゴール..... 405
 ブラスマ..... 397
 ブラスマヒン..... 398
 ブラゾール..... 398
 ブラチコヂン..... 398
 ブラノーゼ(製劑)..... 57
 フラバ..... 163
 フラビニン..... 164
 フラビン..... 461
 フリクトール..... 166
 プリミン..... 405
 フルオギン..... 165
 プルガール..... 411
 プルザノール..... 66
 プルスチン..... 53
 プルストール..... 53
 プルトーゼ(各種)..... 54
 フルトラツクス..... 167
 プルニン..... 410

フルフルミン..... 168
 ◆アルペツト..... 410
 ブルボカブニン..... 65
 ブルマイカル..... 296
 フルメヨヂン..... 164
 プレモーゲン..... 405
 ブルモザール..... 411
 フルモニー..... 164
 ブルモン..... 411
 フレオピチン..... 164
 プレザミン..... 405
 プレソヨード..... 405
 プレタン..... 398
 プレニン..... 398
 プレノリン..... 53
 プレホルモン..... 404
 プレマトニン..... 405
 プレヤクリン..... 404
 プレロバン..... 405
 プレンバスタ..... 58
 プレンツヒン..... 58
 ブロイヂン..... 398
 ブロイニン..... 398
 ブロオサ..... 409
 ブロカイン液..... 268
 ブロカーゼ..... 60
 ブロカトール..... 60
 ブロカノン(製劑)..... 59
 ブロカール..... 59
 ブロカルノーゼ..... 59
 ブロカローゼ..... 60
 ブロギノン..... 406
 ブロクラミン..... 406
 ブロクリマン..... 407
 ブロゲジン..... 406
 ブロコース..... 61
 ブロジール..... 409
 ブロスコ注射液..... 452
 ブロスチグミン..... 409
 ブロスルフアミン..... 415
 ブロスロヂノン..... 63
 ブロセブチン..... 409
 ブロゼルミン..... 409

プロゾール..... 63
 プロソジン(複方)..... 64
 プロダクミン..... 406
 プロダチン..... 64
 プロタニン..... 64
 プロタミラーゼ(ビー)..... 410
 プロタミン亜鉛インシュリン..... 409
 プロタルゴール(各種)..... 410
 プロチン(ボンボン)..... 61
 プロテイン銀(各種)..... 410
 プロデキシン(製劑)..... 61
 プロトゾール..... 410
 ◆プロナトリン..... 36
 ◆プロバリン(製劑)..... 64
 プロピオン..... 58
 フローピン..... 167
 プロベトン(製劑)..... 64, 65
 プロベス..... 406
 プロマトン..... 61
 プロミナル..... 407
 プロミナレツテン..... 407
 プロミピン..... 63
 プロミン..... 63
 プロームイベトン..... 63
 プロームカルシウム注射液(各種)..... 62
 プロム, カルチコール..... 61
 プロム, グレラン..... 62
 プローム水素酸スコボラミン..... 452
 プローム, タカローゼ..... 485
 プロームテトラグノスト..... 63
 プロムラール..... 63
 プロラン..... 407
 プロルトン..... 407
 プロメトーン..... 62
 プロモコール..... 63
 プロモドリ..... 407
 プロモンタ..... 407
 ブロントーノ..... 408
 ブロントジル(アルブム)..... 408
 ブロンバール..... 408
 ブロンブチン..... 408
 ブロントタルピン..... 408

ベカイン(内服液)..... 44
 ヘキサE.P.B..... 209
 ヘキサウルチン..... 209
 ヘキサチン..... 210
 ヘキサトール..... 209
 ヘキサトロピン..... 209
 ヘキサノン..... 209
 ヘキサミン..... 209
 ヘキササルミン..... 209
 ヘキシノール..... 210
 ヘキシルバン..... 210
 ベギフェリン..... 534
 ベクタモール..... 385
 ヘクタリン..... 204
 ベクチラール..... 385
 ベクチン..... 386
 ベクトール..... 385
 ヘクトロール..... 205
 ベゲノトニン..... 534
 ヘサチラミン(ネオ)..... 208
 ベスチン..... 47
 ベゾルゲン..... 47
 ベタキシ..... 47
 ベタピオン..... 47
 ベヂナル(ネオ)..... 385
 ベチン..... 391
 ベツト..... 535
 ベツラ..... 391
 ヘテロゲン..... 208
 ベナルガン..... 386
 ペニオコール..... 386
 ベネルビツト..... 44
 ヘノトール..... 206
 ヘノボヂ油..... 356
 ヘノボヂ油球..... 355
 ヘパチン..... 207
 ヘパトキシ..... 208
 ヘパトーゼ(肝汁)..... 207, 208

ヘパトブツン..... 207
 ヘバミン..... 207
 ヘバリエニン..... 206
 ヘバン..... 207
 ベビー, カフシラツブ..... 41
 ベフエクチン..... 44
 ヘーフエン..... 204
 ベフシン(各種)..... 388
 ベプトン(各種)..... 388
 ベプトン注射液..... 388
 ヘブラクトン..... 208
 ペーマルコチン(スコボラミン, アトロピン)..... 399
 ヘミシン..... 198
 ヘミナル..... 206
 ヘメラロミン..... 206
 ヘモカルチン..... 198
 ヘモグロビン..... 199, 206
 ヘモスタチン..... 198
 ヘモスチル..... 206
 ヘモタイプ..... 199
 ヘモヂナル..... 198
 ヘモテスター..... 199
 ヘモテラピン..... 89
 ヘモリン..... 198
 ヘモロザール..... 198
 ベラゴニン..... 386
 ベラニン..... 387
 ベラフオリン..... 44
 ベラミン..... 534
 ベラモン..... 534
 ベランドレーン..... 389
 ベリゲート(製劑)..... 46
 ベリスタルチン..... 390
 ベリス..... 391
 ベリドール..... 386
 ベリベロール(製劑)..... 45, 46
 ベルアトミン..... 45
 ベルアプロヂル..... 389
 ベルゲナル..... 45
 ベルゾーン..... 391
 ベルツーゲン..... 386
 ベルツシン..... 390
 ヘルナル..... 208

ベルニン..... 390
 ベルノクトン..... 390
 ベルビスモール..... 389
 ベルヒドリット..... 389
 ベルヒドロール..... 389
 ベルヒドロールチンク..... 562
 ヘルピン..... 205
 ヘルボジン..... 205
 ベルボン..... 389
 ヘルミチン..... 205
 ヘルミトール..... 205
 ヘルミナール..... 205
 ベルラタン..... 390
 ベレメジン..... 389
 ベレルガール..... 44
 ベロヴエツテン..... 390
 ベロセチン..... 534
 ベロカドン..... 535
 ベロナチン..... 535
 ベロナール(ナトリウム)..... 535
 ベロニン..... 390
 ベロプロマン..... 534
 ベンゾホルム..... 45
 ベンツカルシン..... 45

ホ

ホアール..... 400
 ホイカール..... 399
 ホヴストロール..... 57
 蒨蓂草末(三夫)..... 411
 ほうれん草末(日薬)..... 411
 ホキシエ..... 56
 芳香クレゾール..... 284
 芳香クレゾール液..... 27
 ホーデン..... 213
 抱水クロラル錠..... 93
 ホーゴギブス固定縋帯..... 54

ボスカール..... 403
 ホスカルピン..... 392
 ボステヒボリン..... 403
 ボスミン..... 57
 ボテンチン..... 403
 ボーデンスマルトミルク..... 56
 ホドヂン..... 213
 ボトロージェン(強)..... 404
 ホノウエリン..... 392
 ホノカジル(注射液)..... 392
 ボノギン..... 55
 ホバレツト..... 215
 ホビエキ(保鼻液)..... 215
 ホマコイン..... 214
 ボマトン..... 402
 ボマルゾン..... 402
 ボム..... 402
 ◎ホームプラスター..... 214
 ホームメント..... 214
 ホメチン..... 214
 ホモフラヴイン..... 214
 ボラギノール..... 57
 ボリヴアレンチン..... 402
 ボリガモール..... 400
 ボリガスチン..... 400
 ボリグロン..... 400
 ボリコール..... 55
 ボリゴール液..... 402
 ボリタミン(製劑)..... 401
 ボリナール..... 400
 ボリフェルミン..... 400
 ボリーヘ..... 400
 ボルサミン..... 57
 ボリーペプトン..... 401
 ボリライツゲン..... 401
 ボルスプルバー..... 54
 ホルトン..... 166
 ホルネフリン..... 215
 ホルミヂン..... 165
 ホルミドール..... 166
 ボレオン..... 400
 ボロトピン..... 56
 ボロミン..... 56

マ

ボロトロピン..... 56
 ボロトロウワルシン錠..... 56
 ボロフェルチン..... 57
 ボロファン..... 403
 ボンジュール(製劑)..... 403
 ボンジュールブリュール糖衣錠..... 402
 ボンスリー..... 56
 ボンゾール..... 56
 ボンデルマン..... 55
 ボンピリン(キニーネ)..... 55
 ボンパフ..... 55
 ボンホリン..... 403

マイカル..... 295
 マイニツケ氏微毒反應液..... 304
 マオキス..... 283
 マキゴノール..... 281
 マキサムト..... 281
 マキナチン..... 281
 マキノコロヂウム..... 281
 マーキユロクローム(各種)..... 290
 マーキユローム絆創膏..... 291
 マーケレイ..... 291
 マキロン..... 277
 マキヨヂン..... 281
 マグアトン..... 277
 マクニン..... 277
 マグネコール..... 278
 マグネシア乳(ミルク)(各種)..... 278
 マグネシウムペルヒドロール..... 279
 ◎マグネシン..... 279
 マグネゾール(高張)..... 279
 マグブロン..... 278
 マグミニン..... 278
 マグミン..... 278
 マグラビン..... 280
 マグリン..... 280

ミ

マグローゼ..... 280
 マクロピン..... 277
 マグロール..... 280
 マーシヤル軟膏..... 523
 マーセタート..... 290
 マセダール..... 287
 マーゾニン..... 292
 マーチオレート..... 283
 麻醉用エーテル..... 8
 麻醉用クロロフォルム..... 95
 マスクリン(コムプレツキス)..... 287
 マダルモン..... 277
 マネトール..... 282
 マホン..... 280
 ママイン..... 282
 ママーゲン..... 282
 マルイシスルフアミン..... 284
 マルイシバツブ..... 283
 マルオキシール(ネイ)..... 284
 マルギトン..... 283
 マルキナール..... 283
 マルコ、肝油(キャラメル)..... 286
 マルコシツブ..... 286
 マルコニン..... 285
 マルコバン..... 285
 マルコピリン..... 285
 マルコフエン..... 285
 マルコホン..... 284
 マルコロイド..... 285
 マルシユリン..... 286
 マルゼチン..... 283
 マスクリン..... 287
 マスクリンコムプレツキス..... 287
 マルタミン..... 287
 マルツ汁エキス..... 282
 マルト肝油..... 114
 マルトゼロール..... 281
 ミアクトン..... 307

ミアルギン	307
ミオアーセミン	307
ミオエーラミゾール	307
ミオカノン	307
ミオカール	298
ミオコムピン	307
ミオサルチン	308
ミオサルバルサン	308
ミオストン	308
ミオスピロザン	308
ミオトニン	308
ミカバリウム	296
ミグサリン	307
ミクロヂン	298
ミスモン	299
ミチガール(石鹼)	299
ミツボシン	299
ミヅホニン	300
三星V.B	300
ミナボン	297
ミニグリン	298
ミニグリンリタード	298
ミネゾール	297
ミノフアーゲン	298
◇ミブソ	295
◇ミブノール	295
ミホラール錠	296
ミユスキュロヂン	306
ミラノイエン	296
ミリオナール	297
ミラール	296
ミルクオブマグネシヤ	278
ミルスアンチモン	299
◇ミルツシン	297
ミレバール	296
ミロザン	297
ミレホリン	296
ミロン, シツブ	308

ム

無鹽醬油	431
------	-----

無黄體乾燥卵巢實質	370
無菌蒸溜水	305
無菌水	305
ムクデミン	304
ムコリヂン	304
ムソリン	306
ムタノール	306
ムツカン	306
無痛カンフル注射液	79
無痛カンフル油	79
ムトゴール	306
ムナパール	306
村田氏微毒診断液	306
ムルチン	305
ムフィラン ^レ 強 ^レ	306

メ

メカニール	287
メーグル	280
メクレン(シムラ)	288
メヅラン	288
メズロール	292
メタセブチン(各種)	294
メタフラビン	293
メタボリン(強)	292
メタローザル, マンガン	293
メタルザルツマンガン	293
メチオペンタール	295
メチカール	294
メチソート	294
明治パトラー	288
メヂナール	288
メチーレンクレオソート	294
メチレン, ウバルシン	294
メチーレンブラウ	294
メチローン	295

メツトーゲン	295
滅菌エルゴチン注射液	148
滅菌鹽化カルチウム液	93
滅菌蒸溜水(各種)	305
滅菌ゼラチン液(各種)	173
滅菌ロツク氏液	269
メニスピン	288
◇メノホルン(各種)	289
メラクローム	290
メラチール	289
メラン	288
メリジン	288
メルガール	292
メルクロザール	292
メルクローム	290
◇メルクゾル	290
メルクラール	290
メルシン	292
メンソレターム	288
メントピン	289

モ

モクソール	304
モダンブール	300
モチダ式黄降汞軟膏	300
モチロン	304
モナアト	301
モナスコ	301
モナボン	301
モナール	301
モノボラミン	301
モヒアトロピン注射液	302
モーリス, アンブール入薬品	303
モリヤン	303
モルダイン(ネオ)	303
モルモ	304
モルヨドール	301
モルヒネ注射液(各種)	302

モンボニン	302
-------	-----

ヤ

薬粧女性ホルモン	556
薬粧男性ホルモン	556
薬用メチーレンブラウ	294
薬用炭	83
薬研コーソ	256
ヤギターゼ	553
ヤクリトン	553
ヤトコニン	554
ヤトリヂン	556
ヤサカ	554
ヤテミン	554
ヤトレン(各種)	554
ヤノール	553
ヤバニン	553
ヤビオール(カビイン)	553
ヤボール	235
ヤボラミア	235

ユ

ユウトン	527
ユーキ鹽	431
ユーキリン	151
ユグリーン	242
ユクローゼ	242
ユクロトール	242
ユクロミン	242
ユーコフエン	151
ユゴール	242
油状ゾルガナール	465
油状プロギノンB	406

ユートノン	153
ユニバリット	523
ユニリーゼ	243
ユベニン	244
ユベラ	243
ユベローゲン	244
ユーベン	522
ユーホザール	152
ユラセプチン	523
ユリスタミン	243
ユーロン	559
ユングホルン	243

ヨ

ヨイブラン	557
ヨーカール(舎利別)	236
ヨーカルプス	236
ヨケソ	558
ヨゴノール	241
ヨーコーフェン	558
ヨザリン	241
吉岡式カルシウム吸入器	558
ヨセジール	241
ヨードリン	236, 237
ヨダローズ	236
ヨチオン	242
ヨチカノン	239
ヨチピン	240
ヨチロイド	239
ヨデオール	239
養糖	559
ヨードオトスクレロール	368
沃度カリワギン	531
ヨードカルチウム注射液(各種)	237
ヨードカルチオヂウレ	237
ヨード肝油球 _L イシカワ _T	102
沃度蒼鉛エメチン(各社)	139
沃度水銀エレクロイド	136

ヨードワギノール	531
沃真ワギン	531
ヨードクレザール	240
ヨードスタリン	240
ヨードタカローゼ	485
ヨードヂウカルチン	126
ヨードヂウレチンカルチウム	127
ヨードチオザルコール	499
ヨードテオフエラミン	241
ヨード鐵マルツエキス	240
ヨードテトラグノスト	241
ヨードフェラチン	159
ヨードブエラトローゼ	160
ヨードフェローゼ	160
ヨードブルトローゼ	54
ヨードプロカノン	237
ヨードヘモグロビン	199
ヨドボ	241
ヨードポリタミン	402
ヨードリノゾール舎利別	240
ヨナルシン	558
ヨヒドロール	557
ヨヒンビン(製劑)	557
ヨヒンベアルカロイド	557
ヨヒンベ注射液	557
ヨメオイル	558
ヨーヨー	559
ヨルゴン	241

ラ

ライゴスチン	436
ライスオイル	429
ライツ	423
ライツミン	423
ライヒム	423
ライプー	266
ラウテリン糖衣錠	263
ラウミン	263

ラカルノール	260
ラキサチン	264
ラキサトール	264
ラキサフェン	263
ラクタゴール	260
ラクチゲン	261
ラクテスター	260
ラクトスターゼ	261
ラクトーゲン	261
ラクトバリット	261
ラクトビール	261
ラクトフェニン	261
ラクトフェルミン	261
ラクトビタン	262
ラクトミン	262
ラクトレパー	430
ラクノサン	260
ラクフォミール	260
ラザール	264
ラヂウム鹽類(附製品)	420
ラヂオインエクチオン	420
ラヂオコムプレツセ	420
ラヂオシユラム	420
ラヂオブラツセ	420
ラヂオワツセル	420
ラツール	421
ラノカール	262
ラビス	260
ラボカ	263
ラーボン	260
ラミノール	421
ラリフチン	263
ラルチゴール	263
ラロサン	262
ラロスチヂン	262
ランゲリン	262
卵巢實質(乾燥・無菌體)	370
ランドスタイナー, エム, エン	262

リ

流行性腦脊髄膜炎菌ワクチン	565
---------------	-----

流行性腦脊髄膜炎コクチゲン	565
硫酸アトロピン注射液	37
硫酸アトロピン錠	37
硫酸バリウム(各種)	42, 43
リウマチズム, フェラコゼン	428
リエナリン	266
リグカーボン	267
リグノール(ライム)	267
リグロイド	267
理研ピダス	430
理研ヴイタミン(A.B.D.)	542, 543
理研カロシン	430
理研カンフエナール	430
理研トラヒチン	430
理研マグ	430
理研無鹽醬油	431
理研ユーキ鹽	431
理研ラクトレパー	430
リコバ	421
リシタル油	430
リシボラ	432
リソウバン	578
リゾフォルム	275
リゾール	275
リチナ	429
リチーネ	429
リツトルリバービル(カーター氏)	85
リノゾール	274
リパーゼ	275
リベセボン	438
リバトレン	555
リヒテニン	266
リボヌトローゲン	350
リボヨヂン	267
リポリヂン	267
リマオン(製劑)	431
リヨラヴイン	268
リゾノール(製劑)	433
リゾノレツテン	433
リゾデキシシ	433
淋菌コクチゲン	255
淋菌ワクチン	565
リングル氏液	431

リンゴルド液(創製)..... 368
 燐酸デヒドロコデイン(各種)..... 123
 燐乳カルシウム..... 432
 リンパーク..... 431

ル

ルエスチン..... 272
 ルエヒノン..... 272
 ルエミコール..... 272
 ルステン..... 274
 ルース..... 436
 ルタミン..... 436
 ルジール..... 274
 ルテイノール..... 274
 ルテオグランドール..... 274
 ルテオレニン..... 424
 ルトレン..... 274
 ルナー..... 273
 ルピアジュール..... 436
 ルミトロピン..... 273
 ルミナール(ナトリウム)..... 273
 ルミナレツテン..... 273
 ルミホルン..... 272
 ルメノン..... 272
 ルル..... 272
 ルンゲリヂン..... 273

レ

レアラキシン..... 264
 レイメリン..... 265
 レヴイテン..... 427
 レクチドン..... 421
 レゲロート(製劑)..... 422

レコンバール..... 423
 レジストーゲン..... 425
 レスチン..... 426
 レスピラチン(B,C,ネフ)..... 426
 レスピロール..... 426
 レスモール..... 426
 レズンピス..... 266
 レゾラ..... 426
 レチクトール..... 427
 レヂタン..... 421
 レチチン..... 265
 レドキシソ..... 422
 レトラン..... 266
 レナー..... 424
 レニン臓器製劑..... 424
 レヌーホルモン..... 425
 レパー..... 264
 レバガルチン..... 264
 レパーコリン..... 265
 レパホルン..... 265
 レパーミン..... 265
 レバリツト..... 433
 レパルジン..... 425
 レフレシン(ネオ)..... 422
 レフリン..... 425
 レプローゲン..... 262
 レプロシン..... 265
 レプロール..... 265
 レベラーゲン..... 264
 ◆レボス..... 275
 レホルミン..... 422
 レミヂン(各種鹽類)..... 423
 連鎖状球菌コクチゲン..... 255
 連鎖状球菌トキシイド..... 474
 レンサロス..... 425
 連葡混合コクチゲン..... 255

ロ

ロイアルギン..... 266

ロイシオン..... 434
 ロイセドン..... 271
 ロイチール..... 427
 ロイバノン..... 428
 ロイマチン..... 427
 ロイマトール(エー. ビー)..... 428
 ロイマリン..... 427
 ロイマルギン..... 427
 ロイミン..... 427
 ロイメチール(クリーム)..... 434
 ロイモソート..... 428
 ロウジエン..... 434
 ロカレイン..... 269
 ロ氏ツベルクリン..... 517
 ローシオン..... 271
 ロダカルチン..... 428
 ローダプリン..... 429
 ロダンカルチオヂウレ..... 428
 ロダンヂウカルチン..... 429
 ロダンヂウレチンカルチウム..... 428
 ロダン, テオフェラミン..... 429
 ロヂノン(各種)..... 270
 ロヂノンザルツ..... 271
 ロヂプロミン..... 269
 ロツク氏液(各種)..... 269
 ロデアリン..... 434
 ロテオール..... 435
 ロート絆創膏..... 578
 ロートノルモザン..... 345
 ロトーン..... 435
 ロピオン..... 271
 ロベリン(各種)..... 268

ワ

ロボラ(カン)丸..... 393
 ロムナホルモン..... 435
 ロロン..... 435
 ロントザルベ..... 435
 ロントナール..... 435
 ロントヒン..... 435
 ワイス軟膏..... 548
 ワカ末..... 548
 ワカモト..... 548
 ワギトラン(紙)..... 532
 ワギノール(各種)..... 531
 ワギン(各種)..... 531
 ワクチン類(血清)..... 565
 傳研..... 566
 北研..... 567
 ①製藥..... 568
 九研..... 569
 天兒..... 570
 大阪血清..... 571
 大阪細菌..... 573
 ワクナール..... 531
 ワゴスチグミン..... 532
 ワサノ..... 533
 ワダカルシウム..... 548
 ワリコチツド..... 532



A

A

品名	製法	製造元	包装価格	醫効用量
Abaca アバカ アトロピン、安息香酸ソーダ、カフェイン、ヂエチルバルビツール酸ソーダ	新	濱島製薬	1cc { 5管 0.80 10管 1.50 50管 6.00 2cc { 5管 1.50 10管 2.80 50管 11.00	鎮痙鎮咳強心劑 1回 1-3cc. 皮注又は筋注
Abanal Tab. アバナル錠 アクリノール	新	陽光堂	錠 { 25錠 0.90 50錠 1.60 100錠 3.10 250錠 7.00 500錠 12.50 末 { 25瓦 11.50 50瓦 23.50	アメバー性疾患 細菌性腸疾患 1日 3回 1-2錠宛
Aberisatin アベリサチン ヂアセチル・オキシフェニル・イサチン	新	大正製薬	錠 { 20錠 40錠 100錠	緩下劑
Abery アベリー 米胚芽より吸着法によるビタミンB製劑		第一製薬	末 { 25瓦 0.80 100瓦 2.20 250瓦 5.00 500瓦 8.50 液 { 100瓦 1.00 500瓦 3.00 2500瓦 11.00 0.2 { 50錠 1.00 100錠 1.80 1cc { 5管 0.90 10管 1.50 50管 6.00 3cc { 5管 1.50 10管 3.00 50管 11.00 5cc { 5管 2.00 10管 3.80 50管 15.00 5cc { 5管 2.00 10管 3.80 50管 15.00	ビタミンB劑 末 1日 2瓦 液 1日 10瓦 錠 1日 9錠 注 1回 1管 (皮又は筋) 静脈用

A

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Abery-B₁ アベリービーイチ アベリー-B ₁ 1cc.= 50国際単位 1號 1cc.= 250 2號 1cc.= 500 3號 1cc.= 1000 最強力 2cc.= 2500	第一製薬	普通品 5管 0.75 10管 1.40 1cc. { 50管 5.80 100管 10.00 強力1號 5管 1.00 10管 1.80 1cc. { 50管 8.30 100管 16.00 強力2號 5管 1.60 10管 3.00 1cc. { 50管 13.50 100管 26.00 強力3號 5管 2.50 10管 4.50 1cc. { 50管 20.00 100管 38.00 最強力 2cc. 3管 4.00	ビタミンB ₁ 劑 輕症は 50-100單位 重症は 500單位 救急は 2,500單位 1日 1-2回 皮注 又は 靜注
Abery Solid アベリーソリッド 粉末アベリーに硫酸鹽を配す	全	25瓦 0.50 100瓦 1.50 末 { 250瓦 3.00 500瓦 5.00	1日 3瓦分3
Abfurin アブフリン ベンツオイル・アセチル・フェノール フタレイン	武田	10瓦 0.92 25瓦 1.75 末 { 100瓦 6.10 500瓦 21.50 0.1 { 30錠 0.50 100錠 1.30	緩下劑 1日 0.3-1.0瓦分3 頓服 1回 0.2-0.4瓦
Abilen アビレン コール酸ストロンチウム, サリチル酸ストロンチウム, フェノール フタレインヂアセタート (Agobillin 参照)	三共	60錠 2.50	膽石治療劑 2錠づ・朝夕 2回
Abiron アビロン  4'-Aminobenzoic sulfonamide p-aminobenzenesulfonamide	新 嘉寶	10瓦 3.20 25瓦 7.50 末 { 100瓦 28.00 500瓦 120.00 0.5 { 20錠 3.40 100錠 15.50 500錠 70.00	⑤スルファミン劑 1日量 1.5-3.0 (3-6錠)分3食後

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Abotest アボテスト 動物血清を加工し人間血清と凝集 反應を同一にせるもの (1-2號は器具附, 4-7號は血清のみ)	石津作 (武田)	1號(3-4)人分 1.20 2號(15-20)人分 3.90 3號(用具) 4.00 4號(15-20)人分 3.60 5號(30-40)人分 6.90 6號(45-60)人分 9.30 7號(150-200)人分 26.10	血液型判定試薬 1回に A.B. 各1滴
Abrodil アブロヂル モノヨード・メタンスルホン酸ソ ーダ 52%有機沃度含有の白色粉末	バイエル	末 { 20瓦 8.65 100瓦 34.70	腎盂造影劑 20%液 100cc. 靜注 5分より2時間の間にレ 像をふ
Abssa アツプサ ソゾヨドール酸ナトリウム製劑	三晃堂 (太田安)	液 { 10cc. 0.40 50cc. 1.50 500cc.	皮膚藥(水むし) 1日數回患部塗布
Abtoedtin アブテドリン 水銀を主劑とせる石鹼様驅虱新劑	大日本 製藥	12個小 1函 1.20 12個大 1函 2.40 大入(60回分) 3.50	頭虱, 家畜虱 毛虱, 驅除劑 1回半個乃至1個洗髪
Acarnon アカルノン 心臓アウトホルモン	明治製藥	1cc. { 10管 1.90 50管 6.80 内用 { 30底 2.20	狭心症, 喘息, 高血脈, 心悸亢 進治療劑 皮注又は筋注
Acecolin Solution アセコリン注射液 鹽化アセチルヒヨリンの水を用ひ ざる溶液	ルマツト ボアノ (東洋カル ニイ)	1cc.(0.1) 6管 6.50	血管擴張劑 1日量 1-2cc. 皮注又 は筋注
Acetonal-Kapseln アセトナール, カプセル アルゾール・トリクロル・ブチル・ サリチル酸エステル・各10%含有 の膠球 アセトナール痔坐藥	アテンス テット (日本ア テンス)	⑥膠球 { 6球 1.50 12球 2.50	子宮及附屬器炎 治療新劑 隔日又は毎日1球挿入
		痔坐藥 { 6個 1.50 12個 2.50	痔疾一般

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Acetonal-Vaginal-Salbe アセトナール, ワギナール, ザルベ 同上軟膏	アテンス テット (日本ア テンス)	軟膏 { 250瓦 5.00 500瓦 9.00	子宮附属器炎 治療剤 1回 1.5-2瓦塗布
Acetylarsan (毒物) アセチラルサン ヂエチルアミノ・オキシアセチル・ アミノフェニル・アルジナート	ローン社 (南信堂)	小児用 { 1管 0.85 2cc. { 10管 8.00 大人用 { 1管 1.10 3cc. { 10管 10.50	驅 微 剤 1-3cc. 宛3日毎に胃筋 注射
Acetylcholin "Roche" (毒物) アセチルヒヨリン _L ロシユ ₇ ヒヨリンの醋酸エステルの鹽酸鹽	ロシユ (日本薬 品洋行)	0.1 { 6管 3.00 50管 17.35 (縮水附)	血管擴張剤 1日 0.05-0.2瓦 縮水 に溶し皮下又は筋注
Acidodin "Hosaka" アシドージン _L ホサカ ₇ 純重炭酸ソーダの滅菌溶液	厚生社 (塩野義)	25cc. 5管 1.00	アシドール 治療剤 1回 25cc. 静注
Acidol アチドール ベタインヒドロクロリツド (0.5瓦は局方鹽酸4滴に相当す)	バイエル	25瓦 3.30	鹽酸代用剤 0.5瓦宛 1日 1-4回冷 水に溶して
Acidol-Pepsin アチドール, ペプシン 1錠中 { アチドール 0.05 ペプシン 0.2 乳 糖 0.25	全	(0.5) 10錠 1.44	消 化 剤 アチドールと同じ胃酸 缺如, 食欲不振, 消化 不良等に食事中 1錠内 服
Mono-Acigul (Acidol Glutamin) 單味アチゲル 鹽酸グルタミン酸 (酸味を有する 白色結晶) アチゲル錠 1錠中 { 鹽酸グルタミン酸 0.1 ペプシン 0.1	寶製薬	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 250瓦 7.50 500瓦 12.50 糖衣 { 10錠 0.60 25錠 1.50 50錠 2.40 100錠 3.90	鹽酸代用兼 食欲亢進剤 1日量 0.1-0.5分3, 毎食前15-30分 錠-1日 1-5錠

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Aciropin アチロピン 強酸性ウロトロピン製剤	東京治療 (志村)	末 { 25瓦 0.60 100瓦 2.30 250瓦 5.00 500瓦 9.00 糖衣 { 120錠 1.50 600錠 5.00	治 淋 剤 1日 1-2瓦 毎食後分服 (6-9錠)
Acoïn (毒物) アコイン ヂバラアニジル・モノバラフェ ニル・グアニチンの鹽酸鹽 ($\text{NHC}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2\text{C}-\text{NC}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5$)	ハイデン (田邊五)	末 { 1瓦 1.20 5瓦 4.50 25瓦 15.50	局所麻酔剤 0.1-1%水溶液として 浸潤麻酔に用ふ
Acricol アクリカール 100cc. 中 { 3.6ヂアミノ・10メチルアクリ ヂニウム・クロリツド 0.25瓦 サンカール 4.00瓦 葡 萄 糖 10.00瓦	三 共	5cc. { 10管 1.10 5管 0.85 10cc. { 10管 1.55 50管 7.25 20cc. { 5管 1.20 10管 2.30	殺菌消炎剤 1回 5-10-20cc. を 毎日或は隔日静注。 (淋疾, 腎盂炎, 肺炎, 扁桃腺炎, 丹毒, 猩紅熱)
Actjodin アクトヨチン 沃度酸カルシウム $\text{Ca}(\text{JO}_3)_2$ を主 成分とする淡黄色澄明中性液 (CaJ_2 換算 3%濃度)	三 星 (鳥 居)	5cc. { 5管 0.80 30管 4.00 10cc. { 5管 1.00 30管 5.00 20cc. { 5管 1.20 30管 6.00	變質強壯消炎 消 毒 剤 1回 10-20cc. 静注
A. D. (毒物) アデー ブロムヂエチルアセチル尿素 換算-1日 1.0	マルコ	末 { 10瓦 2.70 25瓦 4.50 100瓦 16.00 500瓦 76.00 0.1 { 20錠 0.70 50錠 1.60 100錠 3.00	鎮静催眠剤 催眠 1回 0.5-1瓦 鎮静 0.25-0.5瓦宛 1 日3回
Adalin (毒物) アダリン ブロムヂエチルアセチル尿素 換算-1日 1.0 $\text{C}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{BrCO} \cdot \text{NHCONH}_2$	バイエル	末 { 10瓦 2.74 25瓦 6.12 100瓦 20.16 500瓦 77.76 1肝 130.00 (0.5) 10錠 2.59 (0.1) 10錠 0.65 30錠 1.45	鎮静催眠剤 催眠は 1回 0.5-1.0 鎮静は 0.25-0.5宛 1日 3回
Adeno-Spelzon アデノスペルゾン	武 田	Spelzon 参照	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Adephin アデフィン 2%のエフェドリンと0.5%のクロ レトーン含有の一萬倍アドレナリ ン液	三共	25cc. 2.00	粘膜充血腫脹 治療劑 噴霧、又は塗布
Adhisin アドヒシン コロヂウム製劑(液體絆創膏)	小林 藥化學	液 { 100瓦 1.10 200瓦 1.75 400瓦 3.20 }	止血劑 小創傷及注射跡塗布
Adiphorin アヂホリン 樟腦硫酸基酸カルシウム (C ₁₀ H ₁₅ O ₄ S) ₂ Ca 白色結晶性粉末	塩野義	末 { 25瓦 3.00 500瓦 55.00 }	盗汗鎮靜劑 0.5 頓用又は10%液 2 -3cc. 皮注
Adiplon アヂブロン 2-(P-Aminophenylsulphon-amido) -pyridin	全	{ 25瓦 9.00 100瓦 33.00 20錠 4.00 100錠 19.00 }	スルファ ピリジン劑 大人 1日 3回 0.5-1.0 瓦(1-2錠) 小児、大人 の半量、幼児は年齢に 適す
Adlon アドロン <chem>Nc1ccc(S(=O)(=O)N)cc1</chem> P-Aminobenzenesulfonamid	日曹	末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.20 500瓦 22.00 1,000瓦 41.00 0.3瓦 { 20錠 1.00 100錠 4.20 }	スルファミン劑 1日量 1.5-3.0
Adnephrin アドネフリン 鹽酸オルトデオキシフェニルエタ ノールメチルアミン千倍液	萬有	1cc. 10管 0.80 液入 { 25cc. 1.00 100cc. 3.50 }	血管收縮止血 興奮劑 鹽酸エピレナミンに同 じ
Adogol アドゴール	日新化學	{ 40錠 0.30 80錠 0.50 }	吸着殺菌整腸劑 1回 5錠 毎食前
Adonigen アドニゲン 福壽草の有効成分製劑	バード (ホー ル) (スタ イン)	(0.25) 30錠 1.90 (2cc.) 5管 1.50 液 10cc. 1.10	強心劑 錠1日 3回 1-2錠宛 注1回 2cc. 液8-15滴
Adonol アドノール 鹽酸アドレナリン(1000倍) 3% + プロカイン 2%	東洋新藥	1cc. { 10管 0.90 50管 4.00 2cc. { 10管 1.30 50管 6.00 }	止血鎮痛麻醉藥 1回 1乃至數筒を局所 に用ふ

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ados アドース 活性植物炭素 用法—1日 1.5-3.0	藤澤	50瓦 0.90 100瓦 1.50 500瓦 6.50	止瀉、整腸 解毒劑 粒狀(1回量) 内服 0.3-0.6 灌腸 0.3-0.5% 液 20cc.-500cc. 錠 1回 3-6錠 糖衣錠 1回 6-12錠
Ados coated Tablets 糖衣アドース錠		0.1 { 100錠 0.60 500錠 2.00 1000錠 3.80 0.05 { 15錠 0.20 50錠 0.50 120錠 1.00 500錠 3.50 }	
Adrenalin Crystal アドリナリン結晶 天然副腎成分	パーク デビス (三共)	結晶 0.1瓦 7.50 液 { 15cc. 1.50 30cc. 2.80 0.5cc. { 5管 0.75 10管 1.35 1cc. { 5管 0.90 10管 1.70 50管 7.25 }	強心止血劑 外用1000倍-1500倍液 内用に1000倍液 5-30 滴 0.1-1cc. 皮注又は 筋注
Adrenalin chloride 鹽化アドリナリン溶液 (局方鹽酸エピレナミン)1000倍溶 液			
Adrenalin Inhalant アドリナリン吸入劑 3%のクロレトーンを含める芳香 無刺激性油に0.1%の鹽化アドレ ナリンを含有	全	14瓦 1.15 28瓦 2.10	鼻加答兒 扁桃腺炎 噴霧又は粘着劑として 塗布
Adrenalin Ointment アドリナリン軟膏 アドレナリン0.1%を含有する軟 膏	全	14瓦 1.90	鼻加答兒 塗布
Adrenalin Suppositories アドリナリン坐藥 0.1%の鹽化アドレナリン含有の 坐藥	全	6個 1.10 12個 1.95	肛門炎 出血性痔核 1日 1-2個挿入
Adrenalin Tablets アドリナリン錠 1錠 0.001瓦	全	20錠 2.50	1錠を1cc.の水に溶せ ば千倍液となる
Adsol アドソール 無熱吸濕體(加熱により再生可能)	理研 (白井松)	1升入罐 1.00 1斗入罐 7.50	乾燥劑 防濕用

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Adсорbin アドソルビン 非晶珪酸と抱水珪酸アルミニウム 鹽との複合物 $Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot xH_2O$ [新薬] [製剤]	三共	100瓦 0.35 500瓦 1.50 2500瓦 4.50 5000瓦 8.00 (0.1) 25錠 0.45	新吸着剤 1日量 3.0-10.0- 30.0瓦 (下痢、異状嘔吐)
AD-Tussiast アドツシアスト コレステリン製剤	藤澤	25瓦 3.70 100瓦 13.20 500瓦 60.00 錠 { 50錠 2.00 100錠 3.70 300錠 10.00 1.1cc. { 5管 1.40 10管 2.50 50管 11.00	気管枝喘息治療用 ツシアスト併用剤 用量用法 注意書参照
Aether pro, Narcosi 麻酔用エーテル 純エーテル	大日本製薬	25瓦 { 5管 2.00 20管 7.50 100瓦 { 5管 5.50 20管 20.00	麻酔剤 吸入
Aethylamin エチラミン	三星	5cc. { 6管 1.30 12管 2.50 60管 10.00 10cc. 6管 1.80	膀胱尿道炎, 手術後の尿閉, 産褥熱, 敗血症 1日 1-2回 静注
Aethylum chloratum クロールエチール [日曹]	丸善	{ 50cc. 1.65 100cc. 2.20	全身局所麻酔剤
Aethynal エチナール フリール・アクリール・パラオキシ シフエニル尿素, 類黄色粉末	塩野義	25瓦 1.90 100瓦 7.00 250瓦 16.00 500瓦 31.00 1キロ 58.00 0.2 { 100錠 2.00 500錠 9.00	結核解熱剤 1回 1.0(5錠)宛 1日 3-4回 内服
Afridol-Seife アフリドール石鹸 4%オキシメルクリン・オルトトルオール酸ナトリウム含有石鹸	バイエル	75瓦 1個 2.15	殺菌消毒石鹸 普通石鹸の如く手指の消毒又は皮膚疾患に

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Agobilin アゴビリン 胆汁酸ストロンチウム 0.088 サリチル酸ストロンチウム 0.032 フェノルフタレインチアセ タート 0.040	ゲーハ (中外新薬)	糖衣丸 40丸 5.00	膽石治療剤 朝夕2粒宛 (膽囊炎、カタル性黄疸)
Agomensin "Ciba" アゴメンチン [チバ] 卵巣黄体ホルモン (ルテアミン)製剤	チバ (バゼル)	1.1cc. { 5管 3.40 20管 10.50 0.02 { 20錠 2.35 100錠 10.00	月経催進剤 1-4cc. 1週 2-3回 皮注 1日 3回 1-3錠宛
Agürin アグリ テオプロミン醋酸ソーダ水に易溶性白色粉末 $C_7H_8N_4O_4 \cdot CH_3CO_2Na$	バイエル	25瓦 9.80	利尿剤 1日 3回 1.0瓦宛 持久服用に適す
Ahensan "Marco" マルコ阿片散 A..... 5倍用20% B..... 10倍用10% (阿片法の適用なし)	マルコ	A { 25瓦 1.20 100瓦 4.00 500瓦 19.00 B { 25瓦 0.75 100瓦 2.20 500瓦 10.00	阿片代用剤 阿片に倣ふ
Ahensan 阿片散 10%阿片純糖散	福井七	{ 25瓦 0.70 100瓦 2.70 500瓦 12.00	
Aidelmin アイデルミン	相互薬品	{ 25瓦 1.40 100瓦 5.00 225瓦 10.00 450瓦 18.00	緩下剤 1日 1-3瓦
Airol "Roche" アイロール [ロシュ] 酸化ヨード次没食子酸蒼鉛灰綠色粉末	ロシュ (日本薬品)	25瓦 2.60	創面防腐剤 外用 (5-20%) 軟膏又は撒布剤として
Akebin アケビン 木通(あけび)有効成分 水に可溶性粉末	三共	50瓦 2.15 250瓦 9.25 500瓦 16.80	利尿剤 1日 4-6瓦分3 (腎臓炎、急性肋膜炎、脚氣、浮腫)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Aktisol アクチゾール フェニル・アツオヂアミノ・ピリ デン・メタンスルホン酸曹達・フ エニルアツオアセチル・アミノオ キシナフタリン・トリスルホン酸 曹達 (Prontsil 参照)	塩野義	2.5% { 5管 2.00 10管 3.60 50管 17.00 5cc. { 5管 3.50 10管 6.30 50管 29.50 錠剤 { 20錠 2.50 0.2瓦 { 100錠 11.00 500錠 50.00	丹毒, 敗血症 産褥熱, 治療剤 1日 2-3回 1筒筋注
Aktisol-Weiss (新) 白色アクチゾール <chem>Nc1ccc(S(=O)(=O)N)cc1</chem> P-Aminobenzolsulfonamid	全	末 { 25瓦 2.50 100瓦 8.00 500瓦 30.00 1000瓦 55.00 錠 { 20錠 1.00 100錠 4.50 500錠 15.00 1000錠 25.00	(A)スルファミン剤 1日 3回 0.2-0.4瓦 (1-2錠)
Aktiweiss (新) アクチワイス スルファミンのスルホン酸ソー ダ・パラスルホンアミド・フェニ ルアミノ・メタンスルホン酸ソー ダの 8.5%	全	2cc. { 10管 1.60 50管 7.00	スルファミン剤 1日 1-2回 1管宛皮筋 注又は静注
Aktocor アクトコール 鹽酸パラオキシ・フェニルエチル アミン及其メチルエーテルより成 る	ラヂウム	1.1cc. { 5管 0.80 10管 1.40 50管 5.00 液 { 25瓦 1.20 100瓦 3.00 500瓦 11.00	強心剤 1-2cc.皮注 1日 3-5 瓦分3 (肺炎, 狭心症)
Albargin (新) アルバルギン 硝酸銀とゲラトーゼ化合物	バイエル	末 { 5瓦 1.75 25瓦 6.65	治淋剤, 消毒剤 洗滌注人0.1-0.2%液 淋疾頓挫療法には 1- 2%液
Albargol (新) アルバルゴール アルブモーゼンと銀との化合物暗 褐色顆状粉末	三共	25瓦 1.85	プロタルゴール に同じ 0.25-1%溶液外用

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Albasil (新) アルバジル <chem>CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(S(=O)(=O)N)cc1</chem> 4(4'-Aminobenzolsulfonamido)- benzolsulfondimethylamid	山之内	0.5 { 20錠 4.00 100錠 17.00 500錠 80.00 末 { 25瓦 8.00 50瓦 15.50 100瓦 30.00 500瓦 50.00 3% { 5管 4.00 20cc. { 10管 7.00 50管 32.00 5% { 5管 5.00 20cc. { 10管 9.00 50管 40.00 10% { 5管 1.80 2cc. { 10管 3.50 50管 16.50	(B)スルファミン剤 1日 1.5-3.0(3-6錠) 分3食後
Alcafen Tablets "Willow" (新) アルカフェン錠 ヲイロー バルビツール酸誘導體, アミノピ リン, フェナセチン, カフェイン	柳 韓	{ 100錠 11.35 500錠 50.70 1000錠 96.00	慢性神経痛, 頭痛, 不眠症 1日 3回 0.7-1.5錠宛
Alepsin (新) アレプシン 1錠 { フェノバルビタール 0.03 ニトログリセリン 0.0002	三共	{ 15錠 0.50 50錠 1.50 100錠 2.50 500錠 10.00	鎮痙鎮痛剤 1日 2-3錠 (頭痛, 偏頭痛, 狭心症 船酔)
Alihaemin アリヘミン サリチル酸アルミニウム及ヨード 脂に鎮痛殺菌剤を配す 液剤—外用(醫製)	全	(坐薬8個軟膏4瓦入) 1函 1.10 50個 3.00 100個 5.00 300個 12.00 軟膏 { 25瓦 1.00 100瓦 2.50 250瓦 5.00	痔疾剤 説明書参照 チユーパ (新)
Alkan-za アルカンザ 磷酸ナトリウム, 重曹, 枸橼酸, 食鹽, 硫黄製剤白色粉末	山之内 (中村瀧)	末 { 100瓦 1.00 250瓦 2.00 500瓦 3.80	煩渴制酸剤 1回 2瓦を100瓦の水に 投じ服用
Allcod アルコッド ニンニク肝油精	櫻 木	{ 50球 0.80 100球 1.50 200球 2.50 300球 3.50 500球 4.50	滋養強壯剤 毎食前 2球宛

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Allestin アルレスチン サリチル酸カルシウムカフエイン, ヨード, プロム製剤	中村瀧 (塩野義)	25cc { 12管 3.50 50管 13.00	消炎鎮痛剤 毎日又は隔日静注 (淋疾, ロイマチス, 助 膜炎, 結核)
Allisatin "Sandoz" アリサチン (サンド) 大蒜有効成分の木炭吸着剤	サンド	0.55 { 12錠 0.85 30錠 1.80 100錠 4.90	整腸剤 1日 3-6錠分3 (腸カタル, 食欲不振)
Allonal "Roche" アロナール (ロシユ) アルリル・イソプロピル・バルビ ツール酸, アミノピリン, 微苦, 淡黄色粉末	ロシユ (日本薬 品洋行)	末 12瓦 5.50 0.15 { 12錠 1.90 100錠 13.00	鎮痛鎮静催眠剤 1回 1-2錠 1日 1-4錠
Alloton アロトン 大蒜油とデオキシコラン酸との結 合体 1錠中大蒜1瓦	ホールス タイン	(糖衣) (0.1) 30錠 2.80	動脈硬化性疾患 消化器障害, 腸 疾患, 便秘 1日 3回又は4回 1回 1錠
Alophen c. c. p. アロフェン丸 アロイン, ストリヒニン末, ベラ ドンナ葉エキス, 吐根末, フェノ ルフタレイン製剤	パーク デビス (三共)	(糖衣) 100丸 2.15	緩下剤 臨臥時 1-2丸
Alpha-Beta アルファ, ベータ α及βなる2種の標準血清	山之内 (中村瀧)	3人分 1.2) 10人分 2.60	血液型判定剤 説明書参照
Alsilin アルシリン 銀被覆炭末1分と鹽化銀被覆珪酸 4分と混和せる顆粒状末 1日 1.5-3.0	武 田	顆粒 { 50瓦 0.80 250瓦 3.10 500瓦 5.50 0.15 { 10錠 0.30 20錠 0.50 50錠 1.00 100錠 1.80 300錠 4.80	吸着殺菌剤 1回 0.5-1.0瓦宛 1日 3回 毎食間 急性中毒には 1回 2- 3瓦

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Alsilin-weiss アルシリン, ワイス 鹽化銀コロイド珪酸より成る白色 粉末 1日 1.0-2.0	武 田	末 { 100瓦 0.90 500瓦 3.90 1000瓦 7.00	吸着殺菌剤 内服 1回 1-2瓦 1日 数回 外用 撒布剤とす
Alsol アルゾール 醋, 酒石酸アルミニウム	アテンス テット (日本ア テンス)	結晶 225瓦 3.50 品切	汗疹皮膚薬 外用
Alsol-Liquid アルゾール液 50%液	全	液 { 80瓦 品切 500瓦 4.20	収斂殺菌消毒剤 粘膜及創面に無刺激性
Alsol-Powder アルゾール, パウダー 醋, 酒石酸アルミニウムを主成分 とせる撒布剤	全	末 { 50瓦 0.45 100瓦 0.80 500瓦 3.20	汗疹, 濕疹 皮膚炎, 治療剤 撒布
Alsol-Cream アルゾール, クリーム 同軟膏 アルゾール含有, 體温にて軟化する 白色芳香性軟膏	全	(錫管) 18瓦 0.50	皮膚病治療及 保護剤 塗布
Althesin アルテチン 蟻酸, 鹽酸プロカイン, サリチル 酸ソーダ, 杏仁水, 石炭酸液	昭和製薬	1cc. { 10管 1.50 50管 7.00	ロイマチス 神経痛治療剤 1-2cc. 患部筋注
Aluesin アルエシン 可溶性オキシチアン汞1%にアコ イン及硼酸を配伍せしもの	萬 有	1.1cc. 20管 1.60 30cc. (瓶入) 1.60	驅微水銀剤 毎日又は隔日 0.5- 1.0cc. 筋注 (鼠咬症ウイルス病)
Alve アルベ クロルカルグアクロル・バンクレ アチン含有の煉齒磨	三 共	錫管 { 30瓦 0.45 60瓦 0.70	齒槽膿漏用齒磨
Alwajin アルワチン Smilax 屬植物有効成分, 液剤	日 本 薬品洋行	液 { 100瓦 1.35 450瓦 5.50 1キロ 8.50	腎 臓 薬 1日 3回 5-8瓦宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Amebarol アメバロール Phellodendron amrense の、アルカロイドとリゾノールとの配合體、黄色粉末	谷村	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 13.00	細菌性腸疾患治療劑 1日量 0.9—1.5瓦分3 (赤痢、腸チフス中毒性下痢)
Amebarsone (新) アメバゾン バラカルバミド・フェニル・アソニカチツド 28.85% の砒素を含有す	柳 韓	0.25瓦 { 20錠 4.80 100錠 22.00 500錠 100.00	アメーバ赤痢治療劑 1日 2回 0.25瓦宛
Ameisin (新) アマイジン 1% 蟻酸, 1% ノボカイン溶液	フタバ	1cc. { 12管 1.40 100管 9.50 獸器用 5cc. 6管 2.30	神経痛ロイマチス劑 1回 1—2cc. 筋注
Aminobal (新) アミノバル バルピタールとアミノピリンの分子結合體	日新醫學	末 { 25瓦 2.00 100瓦 7.00 500瓦 28.00	鎮痛鎮靜劑 1回 0.4—0.6瓦
Aminoformin (新) アミノフォルミン アミノ安息香酸エチル 〔漢字〕〔西字〕 内服 1日 1.0 NH ₂ ·C ₆ H ₄ ·COOC ₂ H ₅	第一製藥	末 { 10瓦 25瓦 100瓦 500瓦	局所麻酔劑 内服 1回 0.3—0.5瓦 (1日3回) 外用—撒布劑、軟膏劑、坐劑、ミとして用ふ
Amirol (新) アミロール Lシムラ ⁷	東京治療	500瓦 0.85	乳糖代用
Amitase (新) アミターゼ ビール酵母劑	キリン 麥酒株式会社	末 { 30瓦 0.50 45瓦 0.70 90瓦 1.30 500瓦 5.50 100錠 0.70 150錠 1.00 300錠 1.80	胃腸藥(脚氣) 1日 1.5—3.0瓦毎食後分服
Ammonium-benzoicum (新) 安息香酸アンモン 純安息香酸アンモニウム	日本合成藥品	{ 5瓦 12.5瓦	祛痰劑 1日 3回 0.1—0.2瓦宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Amnesin (新) アムネジン 乳酸モルヒネナルコチン 0.12 カルプアミン酸デヒドロキニーネ 0.28	ボーリッゲル (三共)	1cc. { 3管 1.85 10管 4.60	モルヒネ節約麻酔劑 1回 1.0cc. 皮注 (モルヒネ或はスコポラミンと併用無痛分娩に)
Amphotropin-Lösung アムフトロピン注射液 ヘキサメチレン・テトラミンと樟腦酸結合體40%溶液	バイエル	靜注用 50cc. 5.20 5cc. 5管 3.00	尿路防腐劑 2—3日の間隔を置いて 1回 5—40cc. 靜注
Ampoul-Filler 伏見式アンプル自動充填器	日本新藥	並製 { 2cc.用 10.00 6cc.用 10.00 特製 20cc.用 20.00	アンプル充填 1時間500—1000本のアンプルに薬液を充填し得
Amurogin (新) アムロギン 高張サリ曹	福井七	10cc. { 10管 2.60 50管 11.50	鎮痛、消炎解熱劑 毎日乃至隔日 1回 10cc. 靜注
Amyl Nitrite Ampoules (新) 亞硝酸アミール球 特殊硝子管入	パークデビス (三共)	(パークデビス) (5滴入) 12球 (品切) (三共製) (5滴入) 10球 1.50	血管擴大藥 1回 1球吸引
Amynose (新) アミノーゼ アミノ酸體カルシウムにキナ鹽基又はグアヤコール鹽を附加す	日新化學社	キナアミノーゼ { 250瓦 2.10 500瓦 3.50 グアヤコールアミノーゼ { 250瓦 2.40 500瓦 4.00	複合アミノ酸栄養新劑 1回 4—5瓦 1日 12—15瓦
Amytose アミトーゼ 可溶性澱粉 (Causalz, "Riken" Yukien 参照)	里村	500瓦 0.40	賦形藥
Anaastin (新) アナアスチン フェニルメチル・アミノプロパノール鹽酸鹽にトリクロルブチルアルコール添加劑	東洋新藥	1.1cc. { 10管 2.00 50管 9.00	喘息、百日咳治療劑 1—2cc. 皮注


A

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Anabion アナビオン <chem>CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(N)cc1</chem> (4'-Aminobenzolsulfonamido)- benzolsulfonmonomethylamid	大日本製薬	末 { 25瓦 7.00 100瓦 25.00 500瓦 120.00 0.5 { 10錠 1.70 20錠 3.00 50錠 7.00 100錠 13.00	①スルフアミン剤
Anaesthesin アネステジン パラアミノ安息香酸エチル 錠剤 —内用 1日 1.0, 外用 錠剤 <chem>CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1</chem>	バイエル	末 { 25瓦 4.71 100瓦 17.07 1000瓦 87.73	不溶性局所 麻酔剤 外用 5—20%軟膏 内服 0.3—0.5瓦 1日 2.0瓦迄
Analgesin アナルゲシン パラアミノ安息香酸エチル 錠剤 —同上	萬有	末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.50 250瓦 12.00 500瓦 23.00	不溶性局所 麻酔剤 同上
Anaptin アナプチン 2cc. 中アナプトール, ヨードカルシウム複鹽 0.1 瓦を含有す	ラヂウム	5% 2cc. { 6管 1.30 12管 2.30	止血剤 1日 1回 2cc. 皮注
Anaptol アナプトール 鹽酸コタルニン(黄色結晶性粉末) <chem>ClC1=CC=C(N)C=C1</chem> 注射液は10%滅菌液	全	末 { 1瓦 0.80 5瓦 3.70 25瓦 16.50 1.1cc. 6管 0.80	止血鎮静剤 内服 1日 0.2—0.3瓦 注射 1cc. を 1日 1—3回 皮下
Anaptol-Geratin アナプトールゼラチン液 鈴木氏滅菌ゼラチン液に1%のアナプトールを配す	武川	10cc. { 1管 0.85 5管 3.80 20cc. { 1管 1.15 5管 5.20	止血注射剤 1回 10—20cc. 静注又は皮注



品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
------	-----	------	------

Anchylor アンキロール 純四鹽化炭素 CCl ₄	内外新藥	30cc. 0.75 100cc. 1.95 450瓦 3.80 0.4 { 50球 0.60 100球 1.00	十二指腸蟲 驅除劑 大人 1回 2-4球 小人 0.2-0.6cc.
Andolin Ointment アンドリン メントール, カンフル, サリチル 酸メチル, ユーカリ油含有の軟膏	柳 幹	小罐 0.10 中罐 0.20 大罐 0.50 60瓦 1.00 500瓦 4.20	皮膚藥 外用塗布
Androstin "Ciba" アンドロスチン Lチバ 雄性生殖腺より製せる男性ホルモ ン (舉丸全有效成分) A-水溶性成分 B-脂溶性成分	チバ (パ ー セ ル)	6管 { A 3筒 4.00 B 3筒 50管 { A 25筒 28.20 B 25筒 30錠 3.80 100錠 11.50 250錠 25.00	男性ホルモン A. B. 交互 1日 1回 筋注 1日 2-3回 3-8錠分 服
Andysmen アンチスメン 硫酸アトロピン, 鹽酸コタルニン, ソムナール, 乳酸石灰製劑	塩野義	50錠 0.45 100錠 0.75 500錠 2.80 1000錠 4.40	月經痛治療劑 1日 3回, 毎回 6錠宛
Anemicure アネミキユアー 血色素に還元鐵を配す	萬有	25瓦 0.70 100瓦 2.50 500瓦 11.40 0.25 { 100錠 0.70 500錠 3.00	造血榮養劑 1日 3回 1-3瓦宛 (貧血, 病後の恢復期)
Angenen アンゲネン Flacouriaceae 科の植物より抽出せ る有効成分 (油狀質)	大日本 製藥	0.5cc. { 5管 0.90 10管 1.60 50管 7.00	神經痛ロイマチ ス治療劑 1回 0.3-0.5cc. 患部 の筋注又は壓痛點へ
Angiolymphe アンギョーリンフ	佛 國 ルウイズ (村 田 商 店)	2.5cc. 6管 20.00	結核治療劑 説明書参照



品名組成	製造元 登録元	包装価格	醫効用量
Anidrin アニドリン ピラツオロン アニリン } 誘導體	日新醫學	5cc. { 5管 30管 10cc. { 5管 20管	解熱鎮靜劑 鎮痛劑 10cc. を毎日又は隔日 1-2回 静注す
Animasa アニマザ 幼若動物の血管内膜及中膜より得 たる血管ホルモン剤	田邊元	0.3 { 30錠 2.90 100錠 8.00 500錠 38.00 末 25瓦 6.00 1cc. 6管 9.50	動脈硬化治療劑 2錠宛 (末0.6) 1日 3回 食前内服 注射一隔日又は3日毎 に 1cc. 筋注
Animatin アニマチン 蛋白質、脂肪、リポイド製劑	コメツト	10cc. { 5管 5.00 10管 9.00 50管 43.00	非特異性免疫元 馬牛共 1日 1回 1筒 (10cc.) 胃筋注 (動物用)
Animostase アニモスターゼ 膵臓エンチーム	平田藥物	末 { 25瓦 1.40 100瓦 5.20 225瓦 10.00 450瓦 18.00 0.1 { 50錠 0.50 100錠 0.95 300錠 2.80	蛋白消化劑 1回 0.1-0.2瓦 (1-2 錠) 毎食後
Anocuron アノクロン 鹽酸キニーネ尿素を主成分とし之 に二三の藥物を配す	ラヂウム	1.1cc { 5管 1.50 10管 2.80 50管 12.50	痔核注射劑 1回 0.3-0.5cc. を結 節の根部へ注射
Anoxisol アノキゾール 次亜硫酸ソーダ葡萄糖液	東洋新藥	20cc. { 10管 2.00 50管 9.00	重金属サルブ サン中毒治療劑 1回 20cc. 静注
Antacidin アンタチチン 磷酸マグネシウムアンモニウム 製劑 ヂアスターゼとの配合に適す	堂 烏 (塩野義)	末 { 250瓦 1.10 500瓦 2.00 2500瓦 8.80 50錠 0.40 100錠 0.70	制酸劑 1日量 1.5-3.0-6.0瓦 (胃酸過多、胃擴張、胃 下垂、胃弱)
Antagonin アンタゴニン 百日咳拮抗菌製劑 (原液は10倍濃度)	アルゼー ルトミイ	50cc. { 5管 2.00 10管 3.80 50管 14.00 60cc. 2.00 原液 { 120cc. 3.80 240cc. 7.20	百日咳 1回 50cc. 毎食後吸入

品名組成	製造元 登録元	包装価格	醫効用量
Antasthol 안타ストール 1cc. は甲状腺1瓦、副腎1瓦、脳下 垂體後葉 0.1瓦、1錠は甲状腺0.1 瓦、副腎 0.5瓦、脳下垂體後葉0.0 6に對應す	帝國臟器 (武田)	1cc. { 5管 1.50 10管 2.80 錠 { 50錠 0.95 100錠 1.60 300錠 4.20	喘息治療劑 1回 1cc. 皮注 1日 3回 3錠宛
Antehyporin アンテヒポリン 脳下垂體前葉抽出體	中 村 研 究 所	1cc. { 5管 1.50 10管 2.90	性上位ホルモン 生殖器發育不全 機能不全治療劑 1日 1cc. 皮注
Antereum アンテロイム ピラツオロン、鹽酸キニーネ、尿 素複鹽溶液	船 井	1cc. { 5管 1.30 10管 2.30 50管 10.00 100管 15.00 2cc. { 5管 1.80 10管 3.00 50管 12.00 100管 18.00	神経痛ロイマチス (尿意頻數)治療劑 1日 1-2回 1-2cc. 宛 筋注又は皮下深部注射
Ant. Hamorrhoid アンテ、ヘモロイド グアヤコール並に茄子科屬植物 Alkaloid	大本藥品 (坐藥)	{ 5ヶ入 0.50 10ヶ入 0.85 30ヶ入 2.20 100ヶ入 6.20 500ヶ入 28.00	痔疾痔瘻 1日 2-3回 1筒宛肛門 内挿入
Anthenin アンテニン 海人草有效成分	中央新藥 (新良貴)	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.80 500瓦 17.00 10錠 0.20 30錠 0.50 糖衣 { 100錠 1.50 500錠 6.00 5000錠 45.00	蛔蟲驅除劑 1回 1.0-1.2瓦 (8錠) 空腹時服用 1-3日間連続
Anthrasol アントラゾール 石炭テールの特殊成分と杜松テ ールとより成る黄色油狀液	クノール (三共)	25瓦 2.00	消炎止痒殺菌劑 軟膏、パスターミして 外用 10-50%
Antialgin アンチアルギン 禾本科植物有效成分製劑	齋藤藥局	5cc. { 5管 1.85 10管 3.50	神 經 痛 ロイマチス 1回 5cc. 筋注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Antiberiberin アンチベリベリン 米糖 Vitamin-B	南信堂	50瓦 1.40 末 { 225瓦 6.00 450瓦 11.00 丸 { 150丸 0.55 500丸 1.60 5000丸 14.00 エキ { 25瓦 1.00 ス { 100瓦 3.00 注 { 1cc. 6管 1.20 1cc. 50管 9.00 3cc. 3管 1.60 小児用 12錠 0.70 大人用 90錠 1.40	ビタミンB剤 1日量注 1-2管 末 3-5瓦 錠 3-5個 丸 30-40 エキス 1-2瓦
Anticalolin アンチカロリン オルトブロム・サリチル酸カルシウム剤	國産製薬(鳥居)	25cc. { 6管 1.90 12管 3.50 ネオ 25cc. 12管 4.00 家畜用 { 25cc. 12管 3.50 50cc. 12管 5.00 100cc. 6管 4.80	消炎鎮静剤 毎日又は隔日 1回 25cc. 静注
Anticonvul (新) アンチコンブル ピラツオロンのフェノール誘導體	昭和製薬	1cc. 10管 3.00	百日咳治療剤 隔日 1回 1cc. 皮注 7-8回に至る
Anti-crebtin アンチクレブチン 植物製剤	長春堂(福井七)	注 { 10管 3.00 20管 15.00 エキ { 100瓦 20.00 200瓦 35.00 450瓦 60.00 錠 { 225錠 15.00 450錠 25.00	癌治療剤 説明書参照
Anti-Eczeman アンチエクツエマン 次亜硫酸ソーダとブロム鹽水溶液	國光(塩野義)	10cc. 5管 1.00	サルブアルサン 中毒治療剤 1回 5-20cc. 静注
Anti-emesin アンチエメジン (アンエメ) 茄子科植物有効成分に鎮静, 食欲 催進剤配合	マルコ	1.1cc. { 10管 3.20 50管 15.00 100管 28.00 0.3 { 20錠 0.60 50錠 1.20 100錠 2.10	鎮吐剤 1日 1筒 皮注 2-3錠 内服
Antientin アンチエンチン ブロムヨードキニーネサリチル酸 カルチウム溶液	東洋新薬	25cc. { 10管 2.00 50管 9.00	解熱消炎剤 毎日又は隔日 1-2筒 静注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Antienuresin (新) アンチエヌレシン アルゼン・アンチピリン合成體と アコイン製剤	塩野義	1cc. 5管 1.25	夜尿症治療剤 1回 1cc. 腎筋注
Antifebrin-tablet (新) 複方アンチヘブリン錠 { アセトアニリド 0.228 重炭酸ソーダ 0.059 ブロムナトリウム 0.007 カフェイン 0.016	三共	100錠 0.60	鎮頭痛, 解熱剤 1回 1錠
Antifulgin アンチフルギン ヨードブロムサリチル酸カルチウ ムとウロトロビン配合剤	東洋新薬	20cc. { 10管 2.00 50管 9.00	消炎利尿剤 20cc. 毎日又は隔日静注
Antihusten アンチフステン パラプロベニル・フェノルビネン のメチルエステル	大日本 醫化學 (田邊五)	末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.50 500瓦 10.00 100錠 0.90 200錠 1.60 小児用 50錠 0.50	鎮咳剤 1日 3-4瓦 6回分服 (晝 3回, 夜 3回)
Antihyper (新) アンチヒーベル キニーネ, カフェイン, ウレタン	應用 醫化學	1cc. { 10管 1.40 50管 6.50 2cc. { 10管 1.60 50管 7.50 5cc. 10管 2.40	解熱, 鎮痛 消炎剤 1日 1回 2cc. を 1-3 回皮又は静注
Antihyperemin アンチヒペレミン Palonia 屬成分中特に鎮痙鎮吐作 用を有する物質を化學的に抽出す	大彦製薬 (丸善)	1.1cc. { 6管 1.50 12管 2.70	悪阻治療剤 1日 1回 1cc. 上膊皮注
Antileprol アンチレプロール 大楓子油の精製誘導體	バイエル	100瓦 16.80 (内服注射兼用)	治癩剤 内服 1日 3回 2-5瓦 錠筋注 1回 1-2cc.
Antimagromin アンチマグロミン { 硫酸マグネシウム 10% 安那加 1% 葡萄糖 10%	三菱薬品	20cc. 5管 2.00	子痙, 痙攣, 浮腫 1回 20cc. 宛静注 子痙 は 30分間隔にて 1日 3 回

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Antimonial アンチモナル 沃度アンチモンの有機錯鹽溶液	日本化學 (塩野義)	10cc. { 5管 1.30 10管 2.30 50管 10.00 20cc. { 5管 1.80 10管 3.00 50管 14.00	第四性病, 住血 蟲病, デストマ, トリパノゾーマ 1回 10-20cc. 靜注
Antimophin アンチモヒン ヂョード・フェニルカルボン酸の 石灰鹽及グルコセ溶液	コメツト	20cc. { 5管 4.00 10管 7.00	モヒ中毒治療劑 1回 20cc. 宛 1日 1-2 回 靜注
Antiplamin アンチフラミン 冬綠油, メンタ油, 揮發芥子油, カ ンフル含有の泥膏	柳 韓	泥膏 { 20瓦 0.60 60瓦 1.00 500瓦 4.50	消炎巴布劑 患部に塗布し, 油紙に て固定す
Antiphlogistine アンチフロヂスチン 粘土質礦物, グリセリン, ヨード, 硼酸, サリチル酸, 薄荷油, ガウ ルテリヤ油, ユーカリ油, を練合 せる泥膏	三 共	泥膏 { 150瓦 0.65 300瓦 1.15 450瓦 1.50 900瓦 2.70 2300瓦 5.35	巴 布 劑 布に展べて貼付 湿布代用 (扁桃腺炎, 咽喉炎, 肺 炎, 淋巴腺炎, 耳下腺 炎)
Antiserum Against Weils Disease 黃疸出血性スピロヘータ血清	北 研	10cc. { 2管 2.50 4管 4.50	ワイル氏病 治療血清 第1回 10cc. 第2回 10 cc. 第3回 20cc.
Antiskrosin アンチスクロジン 血液に含有せらる鹽類製劑	コメツト	{ 200錠 1.50 500錠 3.20 1000錠 6.00	腦溢血豫防劑 1日 3回 3-5錠 宛 食間 服用
Antistreptococcal Serum "Pasteur" バストール, 猩紅熱連鎖状球菌血 清	柳 韓	10cc. 10.00	猩紅熱豫防及 治療劑 1回 20-40cc. 注射

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Antiteben アンチテーベン オルトオキシ安息香酸グアヤコー ルカルシウムを5%葡萄糖液に溶 解せるもの 皮下用はグルコン酸石灰を含む 粉末はグアヤコール, フォルムア ルデヒド縮合體 ザルソ, アンチテーベン サリチル酸ソーダ2%を含む ブローム, アンチテーベン ブロムソーダ2%を含む ヨード, アンチテーベン ヨード0.01%を含む キニーネ, アンチテーベン キニーネ0.02%を含む	第三製藥 (小西新)	靜脈用 { 10管 3.00 20cc. { 30管 8.50 50管 13.50 皮下用 { 10管 1.50 2cc. { 50管 6.00 5cc. { 10管 2.00 50管 8.50 10cc. { 10管 2.50 50管 11.00 20cc. { 10管 3.30 50管 14.50 末 { 100瓦 2.50 250瓦 6.00 500瓦 11.00 ザルソ ブローム ヨード キニーネ } 各同價格	結核治療劑 靜注-毎日又は隔日20 cc. 皮下注-毎日又は隔日10 cc.
Antithyreoidin "Moebius" アンチチレオイヂン _L メビウス _T 甲状腺を摘出せる羊の血清	メルク (シユ ミツト)	液 10cc. 8.60 (0.05) 20錠 8.10 (0.5) 10錠 22.80 1cc. 5管 6.70	バセドー氏病 説明書参照 溶液 5cc. は錠 (0.5) 1個に對應
Antitol "Hata" アンチトル _L ハタ _T 純良なるガウルテリア油, 薄荷芥 子油, 樟腦外數種の諸成分より成 る	植 村	軟膏 { 45瓦 0.80 250瓦 1.72 500瓦 3.00	消炎鎮痛巴布劑
Antitordin アンチトルチン Graminae 及 Thallopitya 屬植物よ り得たるものを主體とせる無脂 肪性バスタ劑 [賣許]—[賣給]	三 共	軟膏 { 50瓦 0.50 100瓦 0.90 500瓦 3.00	捻挫, 打撲傷 治療劑 患部に塗布
Antitussin アンチツツシン 磷酸デヒドロコデイン 末..... 錠..... [賣許]—1日 0.03頓0.02 C ₁₇ H ₂₀ (CH ₃) ₃ NO ₃ H ₃ PO ₄	友 田	末 { 1瓦 1.60 5瓦 7.20 0.01 { 20錠 0.60 100錠 2.50	鎮咳鎮痛劑 1日 0.03-0.06 1回 0.01-0.03

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Antiurticol アンチウルチコール サリチル酸カルシウム } 複合鹽 ブロームナトリウム }	日東製薬	10cc. 10管 1.60 20cc. 10管 2.60	痒痒性疾患 毎日又は隔日 1回10-20cc. 静注
Antropin アントロピン (硫酸アトロピン } 0.0002 (安那加 } 0.03)	全	1cc. { 10管 1.20 50管 4.50	疫痢及同様中毒症鎮痙劑 4-6歳の小児には 1回 0.7-1cc. 症状により 1日 3-4回 皮注
Antuitrin アンツイトリン 脳下垂体前葉成分 (1cc.は前葉實質1.2瓦相當)	パークデピス (三共)	1cc. 6管 8.55	腦下垂体前葉製劑 所謂性上位ホルモンとして 1回 0.1-0.5cc. 皮注 (發育不全, 月經異常)
Anusol アヌゾール ヨードレゾルチンスルホン酸蒼鉛, 酸化亜鉛, ベルバルサム含有のカ、オ脂坐薬	ゲデーック (ホルス) (タイン) (塩野義)	{ 6個 4.50 (坐薬) { 10個 7.00	痔疾劑 1日 1個挿入 就床前重症は朝夕 1個宛
A-O アオー 結核菌株による多價ワクチン (免疫新劑) (有効期限6ヶ月・経過後交換) 1號……治療用 2-3號……豫防用	有馬研究所 (須美)	大人用(1.1cc.) No. 1. 5管 10.00 No. 2. 5管 11.00 小人用(0.55cc.) No. 1. 5管 5.00 No. 2. 5管 6.00 牛結核用 AOBVO 2cc. 6管 5.00	結核 (治療及豫防) 治療用1號を7-10日目に1回皮注 豫防用-2-3號を毎月1回皮注
Apellagrin アペラグリン ビリチンβカルボン酸 (ニコチン酸)	武田	{ 5瓦 末 { 25瓦 (0.02) 50錠	ベラグラ性諸疾患 1日 3回 0.03-0.1瓦 (2-5錠)宛
Apetin アペチン 酵母製劑 強力アペチン 酵母1瓦 = Vitamin-B ₁ 鹽酸鹽 0.15 底添加	全	{ 55錠 0.40 200錠 1.00 500錠 2.35 1000錠 4.50 100瓦 1.60 500瓦 5.80 1000瓦 10.00 300錠 1.60	食慾催進栄養劑 1回量 1.0-1.5瓦食前又は食後 1回 4錠食前又は食後
Apthymin アフチミン (山口氏液) N, 金アミノ酸化合物	大阪薬品實驗	0.4瓦 2.00 0.5瓦 2.50	結核治療劑 静注(説明書参照)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Apicur "Roche" アビクール (ロシュ) 蜂の刺傷の際に分泌する毒素製劑	日本ロシユ	1.2cc. 入ゴム栓附, アンプール 1瓶 4.00	蜂毒療法劑 1回 0.05cc. より漸次増量 0.5cc. に至る, 皮内注射 (ロイマチス, 神経痛)
Aplina アブリナ 乾燥林檎末	三共	50瓦 0.80	止瀉整腸劑 1回 10-30瓦 1日 3-4回内服
Apollo アポロ 鐵油製劑	フタバ	{ 小瓶 0.50 大瓶 1.00	防臭劑 1回量約10滴
Apomorphine Hydrochloride "Thilo" 鹽酸アポモルヒネ	柳韓	1cc. (0.01瓦) 12管 5.35	注射用催吐劑 1回 0.005瓦を皮注す
Apomoryhin Sol 三研アポモル注射液 0.5% 鹽酸アポモルフィンのグリセリン溶液	三菱	1cc. 5管 2.00	吐劑 1回 1-2cc. に無菌水 1-2cc. を和して皮注 (モヒ、橋、催吐劑等の中毒に)
Aposafe アポセーフ 動物内分泌腺生成物と樟科植物樹脂結合體	高橋大盛堂	{ 1.5瓦 3.00 3.0瓦 5.80 12.5瓦 23.00 25.0瓦 45.00	肺炎, チフス解熱劑 1日量 1.5瓦 毎食間分服
Apotecton アポテクトン	相互薬品	2cc. { 10管 2.80 50管 12.50	高血圧, 動脈硬化, 治療劑 毎日 1-2回 皮注
Apothesin アポセシン 桂皮酸ガンマ・エチルアミノプロピルの鹽酸鹽 (コカインと作用等し)	パークデピス (三共)	1瓦 1.05 (0.08) 20錠 3.45	局所麻醉藥 0.5-1.0-10-20% 溶液としてコカインに代用
Apyrexin アピレキシン 桂皮酸パラオキシフェニル尿素 (Elbon, Minapon, Ebasentin 参照)	大阪新薬研究所 (三共)	{ 25瓦 2.00 100瓦 7.45 250瓦 16.80 500瓦 31.20 1000瓦 58.00 1.0 { 20錠 2.00 100錠 9.25	結核解熱劑 1回 1.0瓦 1日 3-4回 食後内服

品名組成	製造元 登録商標	包装価格	醫効用量
Arabist-Powder アラビスト、パウダー コロイド性無機鹽 86.8% にイーストエキス分、アミラーゼ、マルターゼ等含有の帯黄白色粉末	イースト菌研究所	30ポンド 21.00	アラビアゴム 代用品 (乳化・賦形・媒染・整腸剤)
Arabon (㊟㊿) アラボン ブロムヂエチルアセチル尿素 (Adalin, Dum'in, Isonin 参照)	第一製薬	10瓦 1.30 25瓦 3.00 100瓦 9.50 500瓦 45.00 ㊿0.1 { 10錠 0.40 30錠 0.90 100錠 2.50	催眠鎮静剤 催眠に—1回 0.3—0.8瓦(就床前) 鎮静に—1日 2—3回 0.2—0.3瓦宛
Arantil (新) アランチル	バイエル	0.25 { 5粒 0.45 20粒 1.40	歯科口腔外科用 鎮痛剤 1日 1—3回 2粒宛
Archon-Salbe アルコン軟膏 エフエドリン、ナガイ、卵黃油を含有する軟膏	大日本製薬	軟膏 { 10瓦 0.50 25瓦 1.10 100瓦 3.20 500瓦 14.00 坐薬 { 5個 0.50 10個 0.90 50個 3.60	持疾治療剤 患部貼付
Argochrom (㊿) アルゴクローム 銀とメチレンブラウとの結合體	メルク (シユ) (ミツト)	末 { 1瓦 2.65 5瓦 7.90 10瓦 14.00 0.05瓦 { 3管 3.75 5cc. { 10管 10.90 0.1瓦 { 3管 4.95 10cc. { 10管 13.95 0.2瓦 { 3管 7.40 20cc. { 10管 21.50	収血性疾患治療剤 10—20cc. 静注 (肺炎、丹毒)
Argoelectrosol アルゴエレクトロゾール 電氣的コロイド銀溶液 (Electraigol 参照)	櫻木 (後藤) (風雲堂)	3cc. 10管 1.80 5cc. 6管 1.80 20cc. 5管 2.50 50cc. 瓶入 1.80 (食鹽水 1cc. 10管付)	肺炎、丹毒 チフス治療剤 5—10cc. 皮注又は筋注 急を要する場合は静注

品名組成	製造元 登録商標	包装価格	醫効用量
Arimalin (㊿) アリマリン A 阿部勝馬氏の新説に基づく麻薬中毒治療剤 (Veronamin-0.1%液)	有馬 (塩野義)	(A) { 6管 2.50 1cc. { 12管 4.70	阿片中毒治療剤 1回 0.6—1.0cc. 1日 1.2—2.0cc. 皮注
同 B (㊿) 同上 バルピタールを配す	全	(B) { 30錠 2.50 50錠 4.00 0.25 { 100錠 7.50	1日 10錠 1—2回 分服
同 C 同上 沃度カルシウムを配す	全	(C) { 10cc. 5管 2.50	ネオ C 1回 5—10cc. 静注
同 ネオ C 同上 キニーネを配す	全	(ネオ C) { 10cc. 5管 2.50	
アリマリン錠 (㊿) 同上 A. B. C. ネオ C の主成分を併有す	全	0.25 { 30錠 2.00 50錠 3.20 100錠 6.00	1回 2—4錠 1日 10錠 迄内服
Aristol アリストール ヂチモール、ヂョヂツト (ヨード含量46%)	バイエル	末 25瓦 9.23	殺菌消毒剤 撒布剤 (細菌と等量) 軟膏 (5%) 點眼 (10%をオリーブ油に)
Arklemine アークレミン 血管アウトホルモンとアミン鹽類 磷酸鹽類を配す	山之内 (中村瀧)	2cc. { 10管 2.50 50管 10.00	高血壓治療剤 1日 1回 1—2cc. 皮注
Arocas アロカス 芳香蓖麻子油	帝國製薬	25瓦 12本 1.50 500瓦 1.35	下 劑 1回 20—25瓦
Aromatica Sapocresol (新) 芳香クレゾール液	大日本製薬	{ 100瓦 500瓦 1斤 18斤	消毒 劑
Arsaminol (㊿㊿) アルサミノール 局方アルゼノベンゾール	三 共	{ 0.1瓦 0.2瓦 0.3瓦 0.4瓦 0.5瓦 0.6瓦	驅 微 劑 アルゼノベンゾールに 換ふ

品名	製法	製造元	包装価格	醫効用量
Arsemin アーセミン 局方アルゼノベンゾール	㊦	第一製薬	{ 0.1瓦 0.2瓦 0.3瓦 0.4瓦 0.5瓦 0.6瓦	驅 微 劑 アルゼノベンゾールに 依ふ
Arsen-Bultose アルゼンブルトーゼ			Blutose 参照	
Arsen-Ferose アルゼン, フェローゼ			Ferose 参照	
Arsen-Ferratin アルゼンフェラチン			Ferratin 参照	
Arsen-Ferratose アルゼンフェラトーゼ			Ferratose 参照	
Arsen-Polytamin アルゼンポリタミン			Polytamin 参照	
Arsimon アルジモン 5%モノメチルアルジン酸ナトリウム10%グリセロ磷酸ナトリウム液	㊦	フタバ	1cc. { 12管 1.50 100管 12.00 100錠 1.20 500錠 5.00	變質強壯劑 1回 1-2cc. を皮注又は静注
Arsoval アルソバル メチルアルジン酸ソーダ5%とグリセロ磷酸ソーダ10%液	㊦	武 田	1cc. 12管 1.50 2cc. 12管 2.30	砒素注射劑 隔日又は1週 2回 1-2cc. 静注又は皮注(貧血、衰弱諸症)
Arsozon アルソゾン メチルアルジン酸ソーダの5%溶液	㊦	全	1cc. 12管 1.50 2cc. 12管 2.30	砒 素 劑 隔日又は1週 2回 1-2cc. 宛静注又は皮注
Arterogene アルテロジエン 純ヨード, テトラチオナート硫黄製劑, 白色鹹味, 水溶性粉末		スウデスト	末 { 25瓦 4.00 90瓦 10.00 180瓦 18.00	動脈硬化治療劑 1日 3回 1回 1瓦 毎食前(説明書参照)

品名	製法	製造元	包装価格	醫効用量
Artheryon アルテリオン 無水珪酸ソーダ1%液	㊦	大日本製薬	2cc. { 10管 1.50 50管 7.00	動脈硬變 血 壓 降 下 劑 1週 2回宛静注
Artogin アルトジン 2フェニルヒノリンカルボン酸, オルトアニリドカルボン酸類白色無味無臭粉末		ボーリ ンゲル (三 共)	0.3 { 10錠 1.20 20錠 2.20	尿酸排除劑 1回 1錠宛 1日 2-4回
Artogin アルトギン サリチル酸ソーダ	㊦	日東製薬	1cc. { 10管 1.40 50管 6.50 2cc. { 10管 2.20 50管 10.00	神 經 痛 ロイマチス 皮或は筋注
Asakawa's Typhus reagentin 淺川氏腸窒扶斯診斷液 滅殺して製したる窒扶斯菌		後 藤 風 雲 堂	7-15回分 1瓶 1.00 木函入用具 7.50	腸窒扶斯診斷
Ascaris アスカリス Digenia Simplex (鵪鶉菜)有效成分		奈良傳七	末 { 20瓦 0.65 100瓦 3.00 500瓦 14.50 0.5 { 10錠 0.40 50錠 1.50 200錠 4.50 1000錠 22.00	蛔 蟲 驅 除 劑 1日 3回 0.5-1.0 (1-2錠)宛
Ascocyl アスコイル 植物より抽出せるL.アスコルビン酸のナトリウム鹽水溶液		塩野義	2cc.=0.1 2000國際單位 2cc. { 5管 3.50 10管 6.20 50管 27.00	ヴイタミンC劑 1回 2cc. 筋注又は静注
Ascoltin アスコルチン末 L-アスコルビン酸	㊦	田 邊 五 川 武 田	末 { 25瓦 3.30 100瓦 11.30	ヴイタミンC劑
Aseptia アセプタ 10%バラオキシ安息香酸メチルエステルのアルコール溶液		三 共	液 { 100cc. 1.20 500cc. 4.80	浸 煎 劑 防 腐 100cc. に對し 1-1.5cc.

品名組成	製造元 登録商標	包装価格	醫効用量
A-shipp エーシツブ カオリン, グリセリン, グアヤコール泥膏	東洋新薬	100瓦 0.35 250瓦 0.70 500瓦 1.00 2000瓦 3.00 5000瓦 7.00	消炎巴布劑 展布し 1晝夜 1-2回交換
Askaridol "Bayer" (商) アスカリドール (バイエル) 一定量の有効成分を含有するヘノボチ油 (液は50cc.中1.25瓦含有)	バイエル	0.3 { 6球 1.25 100球 15.05 液 50cc.瓶 2.20	蛔蟲十二指腸蟲驅除劑 體重1kgに付 0.015瓦空腹時に内服
Ascaridol "Sankyo" (新) 三共アスカリドール ヘノボチ油の有効成分アスカリドール	三共	6球 0.60 100球 7.00	蛔蟲十二指腸蟲驅除劑 早朝空腹時2-3球頓用30分後下劑を與ふ
Asmon (商) アスモン Solanaceae, Araliaceae, Ephedraの3植物の有効成分 注射液は鹽酸ヒヨスチアミン及びエフェドリン含有 濃度一末 1日 3瓦	順天堂 醫化學 (田邊五)	50瓦 1.20 100瓦 2.00 250瓦 4.20 500瓦 7.80 100瓦 1.20 500瓦 3.80 0.3 { 50錠 1.05 100錠 1.60 1cc.10管 2.00	喘息治療劑 粉末は 1日 2-4瓦 液 4-8瓦 注 1回 1cc. 皮注
濃厚アスモン (普通品の3倍濃度)	全	2キロ 38.00	製劑原料用 頭痛, 祛痰, 喘息, 百日咳薬として
Aspara-ex アスパラエキス アスパラカスより抽出せる苦味質, アミノ酸を Vitamin B に配す	大木	200瓦 1.50 500瓦 3.20 1000瓦 5.50	利尿強心脚氣劑 1日 20瓦 3回分服
Aspira アスピラ	白井松 (馬用)	100瓦 3.00	運動器疾患 消炎巴布劑

品名組成	製造元 登録商標	包装価格	醫効用量
アスピリン			
Aspirin "Bayer" (商) バイエル, アスピリン アセチルサリチル酸 濃度一(商) 1日 1.5	バイエル	25瓦 2.40 末 { 250瓦 21.00 500瓦 40.00 0.5 { 2錠 0.24 6錠 0.58 20錠 1.50 0.25 25錠 1.50	解熱鎮痛劑 1日 3-4回 1回 0.5瓦宛
Aspirin "Hyden" (商) ハイデン, アスピリン 粒狀結晶	ハイデン (田邊五)	25瓦 0.58 末 { 250瓦 3.20 500瓦 6.00	
Aspirin "Rhon" ローン, アスピリン 別名 Rhodin ローヂン 粒狀結晶	ローン社 (東洋製薬)	25瓦 0.33 末 { 250瓦 2.25 500瓦 4.30 (0.5) 20錠 0.45	
Aspirin "Shieno" (商) シオノ, アスピリン 粒狀結晶	塩野義	25瓦 0.45 末 { 100瓦 1.50 500瓦 6.50 1000瓦 12.00 0.5 { 5錠 0.20 20錠 0.50	
Aspirin "Yamakawa" (商) 山川アスピリン 粒狀結晶	山川製薬 (三木)	25瓦 0.50 末 { 100瓦 1.70 500瓦 7.00 0.5 { 2錠 0.15 6錠 0.35 15錠 0.65 20錠 0.90	
Aspirin "Takeda" (商) タケダ, アスピリン 粒狀結晶	武田	25瓦 0.45 末 { 100瓦 1.50 250瓦 3.25 500瓦 5.80 1キロ 10.50 0.5 { 5錠 0.20 20錠 0.50	
Aspirin "Sankyo" (商) 三共アスピリン 別名 Opopyrin オポピリン	三共	25瓦 1.30 末 { 250瓦 7.00 500瓦 13.00 0.5 { 6錠 0.30 20錠 0.85	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Aspirin "Tanabe" タナベ, アスピリン 粒状結晶	田邊	25瓦 0.10 250瓦 0.40 500瓦 0.40 2.5瓦 0.10 3錠 0.10 20錠 0.40	
Aspirin "Comet" コメット, アスピリン	コメット	25瓦 0.55 500瓦 8.00 (0.25) 20錠 0.25	
Aspirin "Maruko" マルコ, アスピリン	マルコ	25瓦 0.50 500瓦 6.00 1000瓦 11.00 10錠 0.30 20錠 0.50 100錠 2.20 500錠 10.00 1000錠 19.00	
Aspirin- "Akabako" アスピリン赤函	日本 薬品洋行	25瓦 0.38 250瓦 2.70 500瓦 5.00 20錠入 貯=付 9.70	
Aspirin- "Aobako" アスピリン青函 粒状結晶	全	25瓦 500瓦	
Aspirin "Maruishi" マルイシ, アスピリン 針状結晶	丸石	25瓦 1.00 100瓦 3.80 500瓦 15.00 マルア錠 (0.25) 20錠 0.40	解熱鎮痛剤 日 3-4回 1回 0.5瓦 錠
Aspol Oyo アスポール應用 脂肪體異種リポイド, ビラツオロ ンフェノール誘導體	應用 醫學	1cc. { 10管 3.00 50管 13.00	臟器性百日咳 治療劑 隔日に皮下1回注射す
Astah アスター 有機硫黄製劑(ミチガール含有)の 白色軟膏	丹平商會	試川 0.20 10瓦 0.35 500瓦 9.00 チューブ { 小 0.50 大 1.00	皮膚藥 日 1-2回塗布

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Asthman アストマン ヂメチル・キサンチン, ビネーン 複合體, 可溶性白色粉末	名古屋 衛生	0.25 { 10錠 0.50 25錠 1.00 85錠 3.00 150錠 5.00 350錠 10.00 末 { 25瓦 2.50 100瓦 9.00 230瓦 20.00 500瓦 35.00 1.1cc. { 5管 1.10 10管 2.00 50管 8.50	喘息治療劑 1回 0.7-1.0瓦 (3-4 錠)内服 日 1-2回 1cc. 皮下 注
Asthmolysin アストモリジン 副腎結合液及大脳下垂體ホルモン の抽出	カーデ (マルホ)	1cc. { 5管 3.40 10管 6.30 (吸入用) 10cc. 5.25 (吸入器) 1組 2.80 坐薬 10本 4.75	喘息治療劑 皮下注-1cc. 吸入-0.1cc. 坐薬は發作時又は難治 1回挿入
Asthmalin アストナリン アドレナリン及エフェドリン	金剛 (福井七)	1.1cc. { 10管 1.40 50管 6.50	氣管支喘息 新治療劑 1回 0.5-1cc. 皮下又 は筋注 日 2-3cc.
Asthomatol アストマトール 麻黄屬植物エキス製劑	鶴原	液 { 25瓦 0.50 50瓦 1.00 100瓦 1.80 250瓦 3.50 500瓦 6.00 末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.00 250瓦 4.00 500瓦 7.00 錠 { 20錠 0.50 50錠 1.00 100錠 1.80	喘息治療劑 1回 2-3瓦
Asthomatrin アストマトリン 大脳下垂體エキス, アドレナリン, パ バベリン, ノボカイン製劑	プロモン タ (ホルス ダイ)	1.1cc. { 3管 2.50 10管 7.40	喘息治療劑 1回 1cc. 皮下注
Asthphen アストフェン アドレナリンとエフェドリンの合 劑	植村	1cc. { 5管 0.80 10管 1.40 50管 6.50	氣管支喘息 1回 0.5-1.0cc. 皮下 又は筋注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Astoin アストイン サリチル酸カルシウムカフエイン アンチピリン製剤	福井七	25瓦 1.10 100瓦 8.55 末 { 250瓦 7.90 500瓦 14.50 1000瓦 25.50 0.25 { 30錠 0.60 50錠 0.85 100錠 1.50 (※) { 500錠 6.00 1000錠 11.00	鎮咳祛痰強心劑 日量 1.5-3.0瓦 頓服 0.5-1.0瓦
A-Sulin エーシユリン 膵臓ランゲルハンス氏島ホルモン	鳥居	1cc.=10單位 5cc. 1管 1.00 1cc.=20單位 5cc. 1管 1.65	糖尿病, 敗血症 治療劑
Asvita アスピタ Vitamin C	植村	1000國際單位 5管 1.40 1cc. { 10管 2.70 50管 11.50 2000國際單位 5管 2.40 2cc. { 10管 4.50 50管 20.00	ビタミンC劑
Asyphil アジフィール オキシチアン水銀 1% ホマコイン0.5%液	後藤風雲堂 (櫻木)	1cc. 12管 1.00 30cc. 瓶入 1.80	驅微劑 筋注 1-2cc.
Ataol アタオール 肺炎双球菌等の莢膜を分解する蜂 巣蛾アクロイヤグリセラ, ガレリ アメロネラの幼蟲體液より抽出せ る酵素製剤	日新醫學	小兒用 { 10管 6.00 0.5cc. { 30管 16.00 大人用 { 10管 12.00 1.0cc. { 30管 32.00	肺炎, 肺壞疽, 敗血症 5% 葡萄糖液と混和し て筋注又は皮注筋注
Ataxin アタキシン 特殊なる泡沫劑の外鹽酸ババウエ リン, 次炭酸蒼鉛及炭酸マグネシ ウム等より成る	三共	0.25 { 20錠 0.25 50錠 0.90 500錠 6.50 1000錠 11.30	胃酸過多症 治療藥 1回 1-2錠

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Atebrin アテブリン アルキルアミノ・アルキルアミノ アクリヂン誘導體 (マラリア原蟲の繁殖體に作用す)	バイエル	0.1 { 15錠 3.24 300錠 46.00 1000錠 152.00 注射用錠 0.05 { 10錠 1.40 20錠 2.10 300錠 27.30 アンプル入 (0.1) 6管 5.75 (0.3) 2管 4.79	マラリア治療劑 1日 3錠 5日間服用
Atemonin アテモニン 鹽酸プロカイン, 鹽酸ヒドロコタ ルニン, アネステジンの配合劑	植村	1cc. { 10管 1.50 50管 7.00	鎮痛麻醉劑 1回 1筒皮注 1日 2-3 回 3-5錠宛内服 (モヒ取極規則適用を 受けず)
Atempin アテンピン クロルエチル	日染 (塩野義)	{ 50cc. 1.80 100cc. 2.30 (噴射装置付)	局所及び全身 麻醉劑 局所噴霧
Atmulatin アトムラチン ロベリン (ロベリア草, アルカロ イド) の鹽酸鹽	大日本 製藥	0.3% { 5管 1.70 1cc. { 50管 16.00 1% 1cc. { 5管 4.20 50管 40.00 末 0.1瓦	呼吸麻痺救急藥 1回 1管皮注筋注 末 1回極量 0.02瓦
Atocarmin アトカルミン フェニルヒノリンカルボン酸カル シウムにヂメチルアミノフェニル ヂメチルピラツオロン結合體の類 白色粉末	日本藥品	末 { 25瓦 2.20 100瓦 7.80 250瓦 19.00 500瓦 37.50 ⑧0.2 { 30錠 1.10 100錠 3.40	神経痛, ロイ マチス治療劑 毎食後 0.3-0.5 (2- 3錠)宛
Atoirin アトイリン 蟻酸, プロカイン, 杏仁水, 硫酸 カリ, サリチル酸ソーダ製剤	明治製藥	1cc. { 10管 1.30 50管 5.20 2cc. { 10管 1.80 50管 7.20	神経痛, ロイ マチス治療劑 毎日又は隔日 1回 3-5 cc.
Atominoze アトミノゼ タンニン酸ゲラチンとゲンノショ ウコ全草粉末製劑 ⑧⑨ 1日 6瓦	東京化學 (塩野義)	末 { 25瓦 0.55 100瓦 2.00 250瓦 4.00 500瓦 7.50 0.25 { 50錠 0.60 100錠 1.00 500錠 4.50	止瀉劑 1日 數回 0.3-2.5瓦 (1-10錠)宛

品名組成	製造元 発售元	包装価格	医効用量
Atomor アトモル 1cc. { 鹽酸モルヒネ 0.01 硫酸アトロピン 0.0004	ラヂウム	1.1cc. { 6管 0.75 12管 1.20 60管 5.50	鎮痛、鎮痙劑 1回 0.5-1.0cc. 皮注
Atonin アトニン 牛腦下垂體後葉及中葉ホルモンの 20%水性エキス(1cc.中フエグトリ ン10單位含有)	帝國臓器 (武田)	0.5cc. { 3管 1.25 6管 2.30 30管 10.00 1.0cc. { 3管 2.30 6管 4.30 30管 19.00	陣痛催進 子宮出血治療劑 靜注 1回 0.2-0.5cc. 皮注筋注 1回 1cc.
Atophan アトファン フェニルヒノリンカルボン酸 (キノフェン) (Quinophen, Gitosan, Calciphan 参照)	シエーリ ング (田邊五)	末 25瓦 (0.5) 20錠	ロイマチス、神 經痛、痛風、病 氣痛、關節炎 1日 1.5-3.0瓦多量の 水、又は重曹水と共に 服用
Atophan Dragees アトファンケラチン錠 1錠中にアトファン0.1瓦	全	(ケラチン衣) 100錠 3.00	關節及筋肉 ロイマチス アトファンに倣ふ
Atophan Salbe アトファンザルベ アトファンアミルエステル・サリ チル酸フェニル及カンフル含有の 軟膏	全	錫管 { 25瓦 1.50 35瓦 1.80	神經痛治療劑 朝夕2回指頭を以て患 部塗擦
Atophanyl アトファンニール アトファンナトリウムとサリチル 酸ナトリウムの等量溶液	全	靜注用 10cc. 5管 筋注用 5cc. 5管	神經痛治療劑 靜注-1回 10cc. 宛 筋注-1回 5cc. 宛
Atoquinol "Ciba" アトキノール (チバ) フェニル・シンコニン酸・アリ エステル	チーバ (バー ゼル)	{ 20錠 1.70 100錠 7.15 軟膏(20%) チューブ 25瓦 2.25	痛風、神經痛 1日 3回 2-4錠宛 急性 4-12錠宛

品名組成	製造元 発售元	包装価格	医効用量
Atoshal アトシヤール 1號=1.2%食鹽水 2號=1.2%食鹽水加4%重曹 3號=1.2%食鹽水加1%鹽化カル シウム 4號=1.2%食鹽水加5%葡萄糖 5號=4%重曹水	同仁製藥	1號 { 3管 1.50 50cc. 5管 2.25 2號 { 3管 1.80 50cc. 5管 2.70 3號 { 3管 1.80 50cc. 5管 2.70 4號 { 3管 1.80 50cc. 5管 2.70 5號 { 3管 1.50 50cc. 5管 2.25	嘔吐下痢新劑 1日 1-2回 50cc. 靜注 す
Atoxyl アトキシール パラアミドフェニルアルジン酸ソ ーダ(獨逸局方)	三 共	末 { 5瓦 2.80 10瓦 5.20	變質砒素劑 0.02-0.2瓦 1回 極量 0.2瓦 (睡薬時、悪液質)
Atoxyn アトキシン キノフェン、葡萄糖、サリ曹	無 限 理 化 學	{ 10管 2.85 30管 8.10 50管 12.70	ロイマチス 神 經 痛 1日 1回 靜脈内注射
Atramin アトラミン ベンツオール誘導體の水銀鹽にし て白色の結晶	金城製藥	{ 4瓦 1.80 15瓦 4.70	トラホーム 治 療 劑 4%液點眼
Atromor アトロモール 1cc.中 { 鹽酸モルヒネ 0.01 硫酸アトロピン 0.00033	東洋新藥	1cc. { 10管 0.50 50管 2.20	鎮痛麻酔劑 0.5-1.0cc. 皮注
Atropin Injection 硫酸アトロピン注射液 0.05%硫酸アトロピン	フタバ	1cc. 6管 0.50	分泌制止劑 1回 0.5-1cc. 皮注 (盗汗、嘔吐、咯血、喘 息、胃潰瘍)
Atropin Tab. 硫酸アトロピン錠 1錠中硫酸アトロピン 0.0006	パーク デビス (三 共)	100錠 0.90	分泌制止劑 アトロピンに倣ふ
Atroverin アトロベリン ブロムアトロピン加ババベリン製 劑	三 共	1cc. { 5管 1.00 10管 1.80 50管 8.00	鎮痛鎮痙劑 1回 1-2cc. 皮注

品名組成	製造元 販売元	包装価格	醫効用量
Atrozon アトロゾン 粉末牛酪乳にピオスマール、滋養糖及サツカリンを配す	和光堂	錠 { 100瓦 0.70 250瓦 1.50	栄養剤 10瓦を100cc.の湯に溶し用ふ
Augen オーゲン 硝酸銀点眼剤	マルコ	0.5cc. { 10管 0.50 20管 0.95 50管 2.20	初生児点眼料 1回1筒
Aurumkin オーラムキン 金コロイド製剤	オーラム 金研究所	注入用 { 20cc. 3.50 60cc. 9.50 60cc. 1.00 内服用 { 140cc. 2.20 500cc. 7.50 塗布用 { 50瓦 1.50 110瓦 3.00 500瓦 12.00 塗擦用 { 15瓦 1.00 35瓦 2.00 150瓦 7.50 吸入用 { 200cc. 3.50 800cc. 8.00 1000cc. 14.00	淋疾(注入)剤 朝夕2回1cc.宛 胃腸薬 1日20cc. 3回分服 咽頭炎(塗布) 痔坐(軟膠) 氣管枝炎(吸入) 1筒10cc
Autocampher アウトカンファー 10%濃厚カンフル液にミオカノン及安那加(10%)を配す	萬有	1.1cc. { 5管 1.00 50管 9.00	強心剤 1日数回1-2cc.皮注又は筋注 (急性心臓衰弱、熱心症)
Autozin オートジン	村田商店	100粒入 11.00 500粒入 50.00	熱性疾患 肺炎、疫痢
Auto-Zizenin オートジゼニン 植物性粘液製剤	全	液 200瓦 1.50 (ネオジゼニン)	赤痢、大腸カタル治療剤 液一罐の湯火にかけ溶かし一罐全部を内服す 末-8瓦頓用
Avan アーバン 砒素及水銀化合物に Burseraceaeの成分を配合せる軟膏	武田	軟膏 { 3瓦 1.50 15瓦 6.50 線状 { 10本 2.00 50本 8.50	痔疾治療剤 痔は1回0.2-0.3瓦 1日1-2回 線は痔瘻孔に1日1-2回挿入

品名組成	製造元 販売元	包装価格	醫効用量
Avertin アヴェルチン トリブロムエタノール CBr ₃ -CH ₂ OH (Brotacin 同)	バイエル	固形 { 10瓦 7.62 50瓦 20.16 液状 8cc. 6.12 コンゴロート液 10cc. 1.05	直腸注入基礎麻酔剤 體重(キログ)に対し0.08-0.1瓦を3%の割合に湯湯に溶して注腸
Avihormon "Comet" アヴィホルモン _L コメット _T 肝臓、十二指腸ホルモンに _L ホウレン草 _T のホルモンを綜合せる製剤(ヒスタミン製剤)	コメット	2cc. { 5管 1.50 10管 2.80 50管 12.00	動脈硬化治療剤 毎日1管皮注
Avitan アビタン 3%醋酸テオチンソーダ液	興醫社 (福井七)	5cc. 6管 2.00	利尿剤 1回5-10cc. 靜注
Azopan アゾパン フェニル・ジアミノピリジン・パラ・アミノフェニルスルファミド・ヒノキシリン、セスキテルペンアルコール	鶴丸	病服用 { 30球 3.00 66球 6.00 800球 20.00 500球 32.00	淋疾治療剤 毎回2球宛1日3回 食間
Azotyl アゾチール 脾臓エキス、胆汁エキス、コレステリン	東洋カルニイン	2cc. 10管 6.50	傳染性疾患 肺結核 毎日又は隔日1筒皮或は筋注
追 補			
Anergen アネルゲン ヒスタミンナーゼ製剤	三誠製薬	10cc.(1/2生理單位) 20cc.(1生理單位) 強力 2cc.(1生理單位)	アレルギー性疾患
Antireprise アンチレプリーゼ 健康動物の氣管及氣管枝粘膜より抽出せるアウトホルモン	鳥居	1.1cc. { 10管 2.50 50管 11.25	百日咳治療剤 毎日又は隔日1筒(管)

A

品名組成	製造元 製法	包装價格	醫効用量
------	-----------	------	------

結核治療
脾臓ホルモ



B

B

品名組成	製造元 製法	包装價格	醫効用量
------	-----------	------	------


Baby-Cough Syrup ベビーカフシラツブ 甘味シロップ	スターン (堂島)	液 50瓦 1.00	百日咳治療劑 1日3回食間茶匙1杯宛
Bacilin Sogo バチリン Lソーゴ 糖化菌, 乳酸菌	相互藥品	25瓦 0.60 100瓦 1.80 225瓦 3.30 450瓦 6.00 1000瓦 10.50	乳酸菌製劑 1日3回0.5瓦-1瓦宛
Bacilophagol バシロファゴール 葡萄状球菌, 連鎖状球菌の外用濾過ワクチン	目黒 (塩野義)	連鎖状球菌 葡萄状球菌 各 連, 菌混合 液 { 10cc. 0.50 20cc. 1.00 500cc. 4.50 軟膏 { 10瓦 0.50 30瓦 1.00 500瓦 4.50	局所免疫治療劑 塗布, 濕布又は嚥法 (説明書参照) (膿瘍, 丹毒)
Bagnazin バグナジン { キニーネ..... 6.8% ウレタン..... 1.4% カフェイン..... 1.7% } の滅菌液	日新醫學	大人用 2.2cc. { 10管 1.00 50管 4.50 小児用 1.1cc. { 10管 0.80 50管 3.50	キニーネ注射劑 1日1-3回2cc. 宛筋注 (肺炎, マラリヤ)
Bagnon バグノン 1cc. 中 { 鹽酸キニーネ..... 0.068 カフェイン..... 0.0172 ウレタン..... 0.0142	武田	2cc. { 10管 1.60 50管 6.50 5cc. 5管 1.60 1cc.(小児用) 6管 1.00 25cc.(馬匹用) 5管 6.00	キニーネ注射劑 1回2-5cc. 宛1日1-3回筋注又は静注 馬匹用は1回25cc. 皮筋又は静注 (肺炎, マラリヤ)
Bagnon-Stark 強バグノン 2cc. 中 { 鹽酸キニーネ..... 0.5(25%) アンチピリン..... 0.5(25%)	武田	2cc. 10管 2.50	同上(急性症用) 1回2cc. 腎筋注射 (流産, 肺炎, 扁桃腺炎, 筋痛, 腰痛)

B

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Bancain バンカイン 鹽酸プロカイン	萬有	末 { 1瓦 0.45 5瓦 1.60 25瓦 7.00	可溶性局所麻酔劑 外用 0.5-2%液
Bancain Solution バンカイン注射液 バンカイン溶液 1cc.にアドレナリン千倍液 1滴を含有せしめたもの	全	(0.5%) 5cc. 10管 1.60 10cc. 10管 1.80 20cc. 5管 1.80 (1%) 1.1cc. 20管 1.40 100管 5.00 2.2cc. 20管 1.80 5cc. 10管 1.80 10cc. 10管 2.00 20cc. 5管 2.00 (2%) 1.1cc. 20管 1.60 100管 5.00 2.2cc. 20管 2.00	局所麻酔劑 皮注
<chem>NC1=CC=CC=C1C(=O)OCCN(C)C</chem> COO-CH ₂ -CH ₂ -N(C ₂ H ₅) ₂ -HCL			
Ban-Chinatin バンキナチン 粉末 1キナ煎 ¹ (1瓦=1cc.=キナ皮 1瓦)	全	末 { 100瓦 1.00 500瓦 4.00 1000瓦 7.50 液 500cc. 3.50	健胃強壯劑 本劑 1瓦(1cc.)は局方キナ皮 1瓦に相當す
Banchrome バンクローム ヂブロムオキシマーキユリ・フルオレッツセンナトリウム 強バンクローム液	全	末 { 10瓦 1.70 25瓦 3.80 100瓦 13.50 500瓦 60.00 2% 15cc. 入 0.30	殺菌消毒劑 一般創傷其他消毒用として 1-3%水溶液
Barium Sulphate (Citronen-oxyde Compound) 枸橼酸加硫酸バリウム 枸橼酸で調味せる純硫酸バリウム	全	末 { 100瓦 0.60 500瓦 2.20 1000瓦 4.00	同上
Barium sulfuricum 硫酸バリウム	大日本製藥	500瓦	造影劑

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Barium Sulphate 硫酸バリウム	三共	500瓦 1.50	レントゲン診断用
Barium Sulphate (Cocoa compound) ココア加硫酸バリウム ココアで調味せる純硫酸バリウム	後藤藤堂	末 { 100瓦 0.60 500瓦 2.20 1000瓦 4.00	レントゲン診断用 1回 100瓦粥状として内服
Barol バロール 白檀油中にオルガノゾール銀(コロイド銀)を分布せるもの	大木研究所(大木)	0.3 { 18球 1.80 36球 3.50 60球 5.50 120球 10.00	治淋劑 1日 3回 1回 2球宛毎食後直ちに
Neo-Barol ネオ, バロール 白檀油の代りにセスキテルペンアルコール(白檀油有效成分)を用いたるもの	全	ネオ 0.3 { 18球 1.50 100球 6.00 300球 16.00 500球 25.00 1000球 45.00 3千球 115.00 5千球 150.00	同上
Basiopon Injection バジオポン注射液 阿片總アルカロイドの可溶性鹽酸鹽 2%溶液	フタバ	1cc. 6管 0.85	鎮痛麻酔劑 1回 0.5cc.-1cc. 皮注
Basiopon Atropin バジオポンアトロピン 1cc. { バジオポン 0.02 硫酸アトロピン 0.0005	全	1cc. 6管 1.20	同上
Basiopon Scopolamin バジオポンスコポラミン 1cc. { バジオポン 0.03 フローム水素酸スコポラミン 0.00045 硫酸アトロピン 0.0005	全	1cc. 6管 1.40	鎮痛麻酔劑 1回 0.5-0.8cc. 皮注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Becain ベカイン フェニル・エチルアルコール製剤 C ₆ H ₅ CH ₂ CH ₂ OH	國光製藥 (塩野義)	1.0cc. 10管 1.60 5.0cc. 6管 1.60	鎮痛鎮痙劑 1回 1-5cc. 筋注
Becain for Internal ベカイン (内服用) ベンチルベンゾエート含有の膠球	全	0.3 { 30球 0.80 100球 2.80	1回 3-5 膠球内服 (月經痛, 吃逆, 百日咳, 喘息, 内服諸症)
Benzyl Benzoate ベカイン原液 ベンチルベンゾエート C ₆ H ₅ COO·CH ₂ C ₆ H ₅	全	瓶入 { 25cc. 1.50 50cc. 2.80 100cc. 5.00	1回 1.0-2.0cc. 内服
Beffectin (5) (5) (5) ベフェクチン 磷酸デヒドロコデイン 濃液 - 1日 0.03 頓 0.02 倍用 - ベフェクチン1, 乳糖1 ネオ - ベフェクチン1, 乳糖9	東洋製藥	原價 { 1瓦 1.15 末 { 5瓦 5.50 25瓦 21.00 倍用 { 5瓦 2.60 25瓦 10.80 100瓦 85.00 500瓦 208.00 ネオ { 25瓦 0.85 100瓦 2.90	鎮咳鎮痛劑 1日 0.03-0.06瓦 1回 0.01-0.03瓦 (倍用は非麻薬)
Bellafolin "Sandoz" (5) ベラフオリン Lサンド ベラドンナ葉總アルカロイド (注射液 1cc.=0.0005 内服液 1cc.=0.0005 粉末 1瓦=0.0150 錠 1個=0.00025 (Scoloid 参照))	サンド	1cc. 6管 2.20 錠 { 20錠 1.90 100錠 8.00 液 10cc. 2.20 末 { 1瓦 2.30 5瓦 9.10	鎮痙劑 注 - 1回 0.5-2.0cc. 皮注 内服 錠 1回 1-2 錠 液 1回 10-20 滴 末 1回 0.22-0.03 (胃壁, 胃酸過多, 喘息)
Bellergal "Sandoz" (5) ベレルガール Lサンド 1錠中 { ベラフオリン 0.0001 ギネルゲン 0.0003 フェノバルビタール 0.02	全	糖衣 { 25錠 2.25 100錠 7.55	自律神經疾患 治療劑 1日 2-3 錠
Benervit "Roche" ベネルビット Lロシュ Vitamin B ₁ 1cc.=500國際單位	ロシュ (日本) ロシュ	1.1cc. { 3管 2.45 6管 4.70	ビタミンB劑 1週 1-2 回 1-2 管 皮注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Benz-calcin ベンツカルシン 安息香酸カルシウム	興醫社	50瓦 1.10 末 { 100瓦 2.00 500瓦 8.00 錠 200錠 1.50	呼吸器疾患鎮咳劑 1日 1.5-3.0 瓦 3回 分服(水又は散劑)とし て
Benzoform (5) (5) ベンゾホルム アミノ安息香酸エチル 濃液内用 1日 1.0 外用(5) (5)	マルコ	10瓦 0.80 末 { 25瓦 1.50 100瓦 5.50 500瓦 23.50 1キロ 45.00	局所麻酔劑 1回 0.5-1.0 瓦
Beratomin ベルアトミン 純珪酸アルミニウム	日本合成	50瓦 0.45 末 { 100瓦 0.80 500瓦 2.90 1打 5.20 12.5打 25打	胃壁防護, 制酸劑 1日 3回 1-3 瓦 宛毎 食前 錠 - 1回 3-5 錠
ベルアト錠 ベルアトミンにロートエキス及メ ンタを配す	全	錠 { 50錠 0.45 100錠 0.80	
Bergenal (5) (5) ベルゲナール NH ₂  SO ₂ NH ₂ P-Aminobenzenesulfonamid	アルゼール ト(吉田)	皮注用 { 5管 4.00 5cc. { 25管 17.00 50管 31.00 静注用 { 5管 5.00 5cc. { 25管 21.00 50管 38.00 0.2 { 40錠 3.00 200錠 13.00	(A)スルファミン劑
Beriberol ベリベロール末 純ベリベロール(米糠より抽出し たるビタミンB) 1%にヂアスタ ーゼ10%を配す	ラヂウム	25瓦 0.70 末 { 100瓦 2.00 500瓦 7.30 2500瓦 27.30 0.5 { 50錠 0.80 100錠 1.50 500錠 5.70	ビタミンB劑 1日量 3瓦 (6錠) 3回 分服 (脚氣, 消化障碍)
ベリベロール液 純ベリベロール 0.55%液に相當 す	全	液 { 100瓦 0.80 500瓦 2.50 2500瓦 10.50	1日量 9瓦
濃厚ベリベロール液 普通液の10倍濃度	全	500瓦 22.00	1日量 0.9 瓦
注腸用ベリベロール 10cc.はベリベロール液20cc.に相當	全	10cc. { 5管 2.00 10管 3.80	1回 10cc. 注腸

品名組成	製造元 製法	包装価格	醫効用量
ベリベロール注射液 純ベリベロールの2%滅菌溶液	ラヂウム	1.1cc. { 6管 0.87 12管 1.55 50管 5.70 3cc. { 6管 1.55 12管 3.00 50管 9.80 5cc. { 5管 1.70 10管 3.20 50管 13.80	1日1回1-5cc.皮注 又は筋注
Beriberol ベリベロール静脈用注射液 生理的食鹽水に純ベリベロール 0.8%を含有	全	静注用 { 5管 1.25 10cc. { 10管 2.30 50管 10.50 20cc. { 5管 1.80 10管 3.40 50管 16.00	ビタミンB剤 1日1回10-20cc. 静注
Beriberol (Pur) 純ベリベロール 米糠より製したるビタミンB精 製品	全	純 { 1瓦 3.40 5瓦 16.50 10瓦 32.00	1日量 0.05 瓦内服又 は注射
純ベリベロール散 (十倍用)	全	散 { 10瓦 3.40 50瓦 16.50 100瓦 32.00 250瓦 58.00 500瓦 112.00	1日量 0.5 瓦
純ベリベロール錠 (0.01)	全	0.01 { 50錠 1.95 100錠 3.50	1日 3-5 錠
純ベリベロール坐薬 (0.05)	全	坐薬 { 5個 1.00 10個 1.95 50個 9.00	朝夕 2回排便後
Berigood ベリグート Vitamin-B 剤	小林 薬化学	1cc. { 5管 0.80 10管 1.35 50管 5.50 2cc. { 5管 0.85 10管 1.45 50管 6.00 3cc. { 5管 1.25 10管 2.20 50管 9.00 5cc. { 5管 1.70 10管 3.20 50管 13.20 液 { 100瓦 1.00 500瓦 4.30 丸 150粒 1.00	ビタミンB剤 注-1-20cc. 皮注 液-1日2-3瓦分服 丸-1日30粒分服

品名組成	製造元 製法	包装価格	醫効用量
硝ストベリグート ベリグート液に硝酸ストリキニ ネを配す (各1管中0.001瓦)	小林 薬化学	1cc. { 5管 0.85 10管 1.45 50管 6.00 2cc. { 5管 0.95 10管 1.60 50管 7.00 3cc. { 5管 1.45 10管 2.50 50管 10.00 5cc. { 5管 1.75 10管 3.25 50管 13.50	
Bestin ベスチン センナ薬有效成分に Iso-Valeryl- Acetylphenolphthalein ロートエキ スを配劑す	和光堂	{ 9錠 0.20 25錠 0.50	緩下劑 1回3錠就床前服用
Betabion ベタビオン Vitamin-B ₁ 製劑 (0.001-400鳩單位)	メルク (シユミツ)	(0.001) 20錠 4.10 (0.002) 3管 3.60 ベタビオン強 (0.01) 3管 11.40	ビタミンB ₁ 劑 1回1管静注又は皮注 筋注 内服 1日1-6錠 (脚氣、神經炎、神經痛、 悪性貧血)
Betaxin ベタキシン Vitamin-B ₁ 製劑 (合成品) (1cc.=400鳩單位) (Abery-B ₁ Metaborin, Ebios-B Oryzanin, Neo-Paramutrin 参照)	バイエル	1瓶 { 3管 2.24 1cc. { 15管 7.90 2瓶 { 3管 3.39 1cc. { 15管 13.67 10瓶 { 3管 8.35 1cc. { 15管 32.70 1瓶錠 { 20錠 2.30 10瓦 1.76 末 { 25瓦 3.21 100瓦 10.96	ビタミンB ₁ 1回1-2cc. 皮注 (脚氣、神經炎、神經痛、 悪性貧血)
Bezolgen ベゾルゲン 非結晶性硅酸、抱水硅酸アルミニ ウム	福井七	末 { 500瓦 1.00 1キロ 1.70 5キロ 8.00 10キロ 15.00	整腸吸着劑 1日3-20瓦
Bigin ビグシン キササゲ實より抽出せる有效成分 暗褐色微甘味液	フタバ	液 { 100cc. 1.00 250cc. 1.70 500cc. 3.00 1000cc. 5.60	利尿劑 液 1日8-12瓦

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Bijosmin ビヨスミン ビタミンBに沃度カルシウムと 尿素の複鹽 2%含有の製劑	三才商會	1cc. { 6管 1.20 60管 8.00 2cc. { 6管 1.80 60管 14.00 3cc. { 6管 2.20 60管 18.00	脚氣劑 1回 1-3cc. 皮注
Bilivactin ビリワクチン	佛國ピオ ララビー (稻畑)	(内服ワクチン参照)	
Bilival "Ingelheim" ビリバール「インゲルハイム」 レチチンと膽汁酸結合體	インゲル ハイム (友田)	50丸 1.80	膽石治療劑 1日 3回 1-4 粒宛
Bioalin バイオアリン 特殊アミノ酸にピタゲンを配した るもの(特殊タウリン製劑)	治研製藥 (高橋) 盛天堂	2cc. { 10管 3.00 50管 13.50 3cc. { 10管 3.50 50管 16.00 末 { 25瓦 3.50 100瓦 12.00 500瓦 55.00 0.1 { 60錠 2.00 180錠 5.00 300錠 6.00 調劑用 { 600錠 10.00	結核性諸疾患 治療劑 1回 3cc. 隔日又は1 週 2-3 回皮注. 靜注 末 0.5 瓦 1日分3-6 錠 2-3 回分服
Biocalc ビオカルク 正磷酸カルシウム及炭酸カルシウ ム可逆性ゲル	コロイド	末 { 10瓦 0.90 25瓦 2.00 50瓦 3.60 100瓦 6.50 250瓦 13.50 500瓦 24.00 1打 45.00 0.25 { 50錠 1.20 100錠 2.10 250錠 4.50 500錠 8.20 1000錠 15.00	カルシウム劑 1日 3回 0.25-1.0 瓦 宛. 食前に冷水にて服 用
Biocaltin "Comet" ビオカルチン「コメット」 乳酸菌, 糖化菌を配せるカルシウ ム製劑	コメット	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 225瓦 5.50 450瓦 10.00 0.2 { 200錠 1.20 500錠 2.60 1000錠 5.00	整腸, 消化劑 1日 3回 0.5-1.0 (3 -5錠)宛毎食後分服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Biocemael ビオスマール 乾燥重湯に胚芽ビタミンを配す	和光堂	100瓦 0.50 1/2打 1.20	乳兒栄養劑 5-10%液を重湯とし て使用
Biofermin ビオフィエルミン 糖化菌含有乳酸菌製劑	神戸衛生 (武田)	末 { 30瓦 0.90 150瓦 3.35 300瓦 7.40 500瓦 8.00 1000瓦 13.00 0.3 { 50錠 0.75 150錠 1.90 500錠 4.50	乳酸菌整腸劑 1日 1.0-3.0 瓦分3
Biogenin ビオゼニン 乳酸菌及蛋白消化菌(納豆菌)製劑	塩野義	末 { 25瓦 0.50 100瓦 1.50 500瓦 5.00 1000瓦 9.00 0.3 { 50錠 0.50 100錠 0.80 500錠 3.20	整腸消化劑 1回 0.3-0.9 宛毎食 後
Biolaxin ビオラキシン アセチル・イソワレリル・フェノ ルフタレインに乳酸菌を配す 【薬師】(但し下劑としてのみ)	天兒 (田邊五)	末 { 25瓦 2.00 100瓦 7.30 250瓦 15.50 500瓦 30.00 0.2 { 10錠 0.40 50錠 1.50	緩下劑 1日 0.5-1.0 瓦分3 頓服 0.3-0.5-1.0瓦
Bioleton ビオレトン 牛酪乳粉末 (Eledon 参照)	酪聯	罐 { 100瓦 0.85 250瓦 1.75 500瓦 3.00	栄養劑 8-10%溶液300-800 を分與す
Bioleton-Rein ビオレトン, ライン 純牛酪乳粉末, 穀粉, 糖類等を添 加せず	全	罐 { 100瓦 0.68 500瓦 2.75	乳兒食餌 湯に溶し用ふ (栄養障害, 下痢)
Biolgen ビオルゲン 乳酸菌製劑	小野市	末 { 25瓦 0.40 250瓦 2.00 500瓦 3.30	腸カタル, 下痢, 便秘, 消化不良 1日 1.5-2.0 瓦

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Biopan ビオパン 家畜、家禽用細菌製剤 無味無臭の粉末	神戸衛生 (武田)	末 { 500瓦 2.00 1キロ 3.50	整腸剤 飼料に混じて與ふ
Biosarin "Comet" ビオザリン _L コメツト ⁷ 5% 葡萄糖リンゲル液	コメツト	{ 100cc. 0.80 300cc. 1.00 500cc. 1.30	救急的補血剤 1回 100-500cc. 靜注
Biosterin ビオステリン 注射用ビタミンA (Vitamin A の1.5%オレーフ油液)	理研 (玉置)	原液 { 25瓦 7.50 50瓦 14.00 0.6cc. { 5管 1.20 10管 2.30	ビタミンA剤 1日1箇筋肉深部 内服1日1-3cc.
Bio-Tomosan ビオトモサン 活性珪酸アルミニウムに乳酸菌消 化菌を配せる白色粉末 (Tomosan 参照)	友田	末 { 25瓦 0.50 100瓦 1.50 500瓦 6.00 1キロ 10.00 5キロ 40.00 0.33 { 90錠 0.70 270錠 1.50 800錠 3.70 小児用錠剤 { 150錠 0.90 1200錠 4.50	乳酸菌含有 制酸吸着剤 末1回 0.5-1.5瓦1 日3-4回 錠1回 2-5錠1日3 -4回
Biotonic ビオトニク 有機性アルゼン及びマンガン鹽に 濃厚肝油エキス、純クレオソ ト、純グアヤコール、次亜磷酸ス トリキニーネ、次亜磷酸鹽を配合 す	植村 (鳥居)	液 { 250瓦 2.50 500瓦 4.50 2000瓦 12.00 4000瓦 20.00	強腦強壯栄養新剤 1日3回 4-8cc. 温湯 に稀釋して用ふ
Biotran ビオトラン ビタミンA、Dを含有する肝油 中にコロイド性正磷酸カルシウム を配せる白色軟膏	コロイド	軟膏 { 90瓦 1.30 150瓦 2.00 500瓦 5.50	外傷、凍傷 火傷、濕疹 ガーゼ又は布片に延べ て貼附す

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Bi-Palatinoids 重パラチノイド 硫酸鐵 0.06 重曹 0.05 を隔包せる 赤色特殊錠剤	オツベン ハイマー (タム ソン) (田邊五)	錠 { 50錠 144錠	補血鐵剤 1日3-6錠毎食後分 服
Bisarsen ビスアルゼン 膠質性蒼鉛及膠質砒素の複性ヒド ロゾール	丸石	2cc. { 10管 2.50 50管 11.50	驅微剤 毎日又は隔日1回 2cc. 皮注又は筋注
Biscorogen ビスコロゲン ハルブオキシ蒼鉛のコロイド溶液	日新醫學	2.2cc. { 10管 1.50 50管 7.00 瓶入 { 25cc. 1.20 100cc. 4.00	驅微剤 隔日筋注 2cc. 宛
Biskon ビスコン 珪酸アルミニウム鹽	小野市	末 { 25瓦 0.65 100瓦 2.30 500瓦 8.50 1000瓦 16.00	下痢一般 腸内異常酸酵 1日3回 1-2瓦宛
Bisleuche ビスロイヘ アミノピリン、ペロナール結合體	一新製薬	1cc. { 10管 1.50 25瓦 2.30 末 { 100瓦 8.00 500瓦 50.00	鎮痛、鎮靜剤 注射-1回 1-2cc. 皮 注又は筋注 内服-1日 0.6-1.2 分3又は 0.4-0.6 頓用
Bislogen ビスローゲン ハルブオキシ蒼鉛のコロイド性物 質	應用 醫化學	2cc. { 10管 1.90 50管 8.50 瓶入 { 25cc. 1.50 100cc. 5.00	蒼鉛驅微剤 隔日に筋注
Bismnogen ビスムノーゲン 脂肪酸複合體の蒼鉛水溶液 (金屬蒼鉛 2%含有)	シオミ (丸善)	1.1cc. { 5管 1.00 10管 1.60 50管 7.50	驅微剤 毎日又は隔日1回1管 皮注又は筋注
Bismogen ビスモーゲン ヨードグルコン酸蒼鉛水溶液 1cc. 中金屬蒼鉛 0.01g 含有	日産	1cc. { 10管 1.80 50管 8.50 2cc. { 10管 2.50 50管 12.00	水溶性蒼鉛剤 隔日 2cc. を皮下又は 筋注。小人は 1cc. (驅微剤)

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Bismural ビスマラール トリクロール・ブチル・マロン酸 蒼鉛の植物油澄明溶液 2cc.中金属 蒼鉛 0.07 瓦含有	コメツト	2cc. { 10管 2.00 50管 8.50	蒼鉛驅微劑 隔日 2cc. 筋注 12-15回を1クールミ ス
Bismuthoidol ビスマートイドール コロイド蒼鉛水質溶液	ロバン (丸善) (太田安)	2cc. 10管 5.00	驅微劑 隔日 2cc. 筋注
Bismutin ビスマチン 水溶性蒼鉛乳劑	昭和製薬	2cc. 10管 3.50	驅微劑 1回 2cc. 筋注
Bistolán (註) ビストラン 酒石酸蒼鉛カリウムナトリウムを 山茶油に浮遊せしめたるもの (1cc.中主薬 0.1)	萬有	2.5cc. 10管 1.60 25cc. 瓶入 1.20 100cc. 瓶入 4.30	驅微蒼鉛劑 1回 1.5-2.0cc. 腎筋 注
Neo-Bistolán (註) ネオ, ビストラン 5% 水酸化蒼鉛エムルヂオン	全	1.2cc. { 10管 1.10 50管 5.00 5管 0.80 2.5cc. { 10管 1.40 50管 6.30 瓶入液 { 25cc. 1.20 100cc. 4.30	驅微劑 1回 1.5-2.0cc. 腎筋 注
Bitanin ビタニン 胚芽 Vitamin-B 劑	内外新薬	末 { 25瓦 0.60 250瓦 3.60 500瓦 6.80 1000瓦 12.50 液 { 100瓦 0.80 500瓦 3.10 2500瓦 13.40 皮注用 { 5管 0.80 1cc. { 10管 1.50 50管 6.00 3cc. { 5管 1.40 10管 2.70 50管 11.00 5cc. { 5管 1.70 10管 3.10 50管 14.00 静注用 { 5管 1.70 5cc. { 10管 3.10 50管 14.00	ビタミン B 劑 末-1日 1.5-2.0瓦分3 液-1日 10-20cc. 分3

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Neo-Bitanin ネオビタニン 注射用無酒精性溶液	内外新薬	1cc. { 5管 0.80 10管 1.50 50管 6.00 3cc. { 5管 1.40 10管 2.70 50管 11.00 5cc. { 5管 1.70 10管 3.10 50管 14.00	注-1回 1 5cc. 1日 数回皮下注
Bis-Toyo (註) ビストヨー ビスマチールナトリウムタルクラ ート	東洋新薬社	2cc. { 10管 2.00 50管 9.00	水溶性 蒼鉛驅微劑 1日 2cc. を皮又は筋注
Bitryptin ビトリプチン アミノ酸トリプトファン, ヒスチ チン, 銅及蛋白質を配せる製劑	日新醫學	末 { 25瓦 1.45 50瓦 2.80 100瓦 5.40 250瓦 12.70 500瓦 24.00	造血劑 1日量 2-3 瓦
Blaon ブラオン <chem>CNc1ccc(S(=O)(=O)Nc2ccc(S(=O)(=O)N(C)C)cc2)cc1</chem> 4-(4'-Aminobenzenesulfonamido)- benzenesulfondimethylamid	日東製薬合名	末 { 25瓦 7.50 100瓦 29.00 500瓦 115.00 0.5 { 20錠 3.80 100錠 16.00 500錠 74.00	スルファミン劑
Blenolin (註) ブレノリン 三硼酸ウロトロピン (Boroverlin 参照)	三共	末 { 25瓦 0.75 100瓦 2.20 0.25 { 50錠 0.65 100錠 1.00	治淋劑 1回 0.5-1.0 瓦宛 1 日 3回内服
Blustin (註) ブルスチン 鹽酸コタルニン $C_{12}H_{14}NO_3Cl + 2H_2O$	大日本製薬	末 { 1瓦 0.40 5瓦 1.50 1.1cc. 6管 0.70 (註) (0.5) 20錠 0.60	止血劑 末 1日 0.1-0.3 瓦(3 -6錠)注 1日 1-2 回 皮下又は背筋注
Blustol (註) ブルストール コタルニンのフタル酸鹽	全	5瓦 2.50 (0.05) 20錠 1.00	止血劑 末 1日 0.15-0.3 瓦 (3-6錠)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Blutose ブルトーゼ 鐵蛋白質ナトリウムの溶液	藤 澤	液 { 250瓦 2.00 500瓦 3.20 5000瓦 30.00	補血強壯劑 1日10-20瓦を2-3 倍の水又は牛乳に混じ 3回分服
Arsen-Blutose アルゼンブルトーゼ ブルトーゼ中に砒素を有機的に結 合せしめたるものなり	全	液 { 250瓦 2.30 500瓦 3.70 5000瓦 35.00	同 上 同上
China-Blutose キナブルトーゼ ブルトーゼにキナアルカロイドを 抱合せしめたるものなり	全	液 { 250瓦 2.30 500瓦 3.70 5000瓦 35.00	健胃強壯劑 同上
Guajacol-Blutose グアヤコールブルトーゼ ブルトーゼに可溶性グアヤコール を抱合せしめたるものなり	全	液 { 250瓦 2.60 500瓦 4.30 5000瓦 41.00	呼吸器疾患治療劑 同上
Jod-Blutose ヨードブルトーゼ ブルトーゼにヨードを有機的に結 合せしめたるものなり	全	液 { 250瓦 2.30 500瓦 3.70 5000瓦 35.00	腺病質結核性體質 同上
Neo-Blutose ネオブルトーゼ 粉末ブルトーゼに骨髓成分を附加 せり	全	末 { 25瓦 0.75 100瓦 2.70 500瓦 12.00 180錠 1.00 360錠 1.80 1000錠 4.50 5000錠 21.00	造血催進劑 1日3回0.3-0.7瓦 2-4錠宛
Kupfer-Blutose クツベルブルトーゼ	全	Kの部参照	
Bogo Gipsrer band ボーゴギプス固定繃帯 特殊薬剤によりギプス末を綿紗の 両面に固く密着せしめたるもの	歌 橋	幅10cm. 長2m { 1巻 0.30 12巻 3.00 30巻 7.00 50巻 10.00	固定繃帯 温湯に浸して直ちに使用
Bolus Pulver ボルスプルバー (カオリン) 珪酸アルミニウム粉末	メルク (シユミット)	末 200瓦 0.80	胃腸炎濕疹治療劑 内服 1回10-20瓦 外用粉末の儘又は水と 混じて

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Bolycol ポリコール グアヤコールと植物アルカロイド 製劑	金城製藥	50瓦 1.20 100瓦 2.00	結核治療劑 漸増量内服(説明書 参照)
Bonderman ボンデルマン 20%のコロイド硫黄を含有する黒 色軟膏	道修藥學 研究所 (三 共)	軟膏 { 6瓦 0.30 12瓦 0.50 30瓦 1.00 100瓦 2.00 500瓦 6.00 1000瓦 10.00	皮膚藥 患部塗擦
Bone-Wax 止血臘 骨臘	英國スク ワイヤ社 (フタバ)	小瓶 25瓦 5.40 大瓶 100瓦 13.50	止血劑 出血部に壓貼
Bonogin ボノギン { 青酸酸化汞 0.1% { チアン銀カリウム 0.05% 含有のクリーム	三 共	錫管 4瓦 0.30	花柳病豫防藥 1回2瓦(約半管量)
Bonpaf ボンパフ タンニン酸アルミニウム化合物	船 井	末 { 20瓦 0.30 50瓦 0.60 100瓦 1.00 250瓦 2.20 500瓦 4.00	皮膚藥 撒布又はタンポン
Bonpyrin ボンピリン フェニルチメチルピラツオロン・ メチルアミノ・メタンスルホン酸 ナトリウム (Novalgin 参照)	武 田	末 { 25瓦 1.65 100瓦 6.00 500瓦 27.00 1キロ 52.00 0.15 { 10錠 0.40 50錠 1.60 25% { 10管 1.80 2cc. { 50管 7.50	解熱, 鎮痛劑 解熱に1日量1.0-1.5 分3 鎮痛に0.5-1.0分3 注 2-4cc. 皮注, 筋注
Bonpyrin Quinine ボンピリン, キニーネ 1瓦中 { ボンピリン 0.6 { ボンピリンキニーネ 0.4 (Novalgin-Quinine 参照)	全	末 { 25瓦 4.00 100瓦 14.00 500瓦 65.00 糖衣 { 10錠 1.50 20錠 2.70 50錠 6.00	解熱消炎劑 1日3回0.25-0.5(1 -2錠)宛

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Bonslee ボンスリー 桑科植物の有効成分に数種の角質軟化並に殺菌薬を配せる液剤	田邊五	液 { 10cc. 0.40 25cc. 0.80 100cc. 2.50 500cc. 8.00	水蟲治療劑 局部塗布
Bonsol Germicidal Soap ボンゾール 消毒石鹼 クレゾール石鹼液10%	田邊元	1打函入 2.80	消毒石鹼
Boquicier ボキシエ Capicum の果實の成分 (ホルモン分泌促進劑)	スウ デスト	50回分 1.00 (3瓦錫管入)	生殖器障碍治療劑 1回 0.06 龜頭塗擦
Borden's Malted Milk ボーデンス, マルドミルク 麥芽糖配合の粉末乳	ボ デ ン ス (堂 島)	罐 { 7オンス 1.40 15オンス 2.45 3ポンド 6.60	人乳代用
Boromin Sakuragi ボロミン 櫻木 ボロミン 錠 三硼酸ウロトロピン	櫻 木	末 { 25瓦 0.55 100瓦 2.00 250瓦 4.80 500瓦 9.00 錠 { 60錠 0.60 500錠 4.50	淋毒性, 結核性 膀胱炎, カタル 1日 1.0-4 瓦 錠剤は 1回 2-3 錠服 用
Borotopin ボロトピン 三硼酸ウロトロピン	里 村	末 { 25瓦 0.55 100瓦 2.00 500瓦 9.00 0.5 { 50錠 0.75 100錠 1.35	治淋藥 1回 0.5-1.0 瓦(1-2錠) 1日 3-4 回
Borotropin ボロトロピン 三硼酸ウロトロピン	昭和新藥	末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.50 500瓦 10.00	慢性急性腎盂炎 膀胱結核 1日 2-4 瓦
Borotro-Uvarsin ボロトロ, ウヴルシン錠 1錠中 { ウヴルシン 0.25瓦 ボロトロピン 0.25瓦	全	100錠 1.50 500錠 5.50	治淋利尿殺菌劑 1日 3回 2-3 錠宛

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Borovertin ボロフェルチン 三硼酸ウロトロピン (硼酸48.5% ウロトロピン51.5%) (Blenolin 参照)	バイエル	末 { 25瓦 3.15 100瓦 11.86 500瓦 39.50 (0.5) 20錠 1.57	尿道膀胱消毒劑 1日 1.0-4.0 瓦を数 回に分服
Borraginol ボラギノール 本邦産植物 2種の脂肪に特殊操作を施して得たる成績物にノボロフォルム 5%及びペリドール 0.5%を配す [賣評] [醫効]	武 田	軟膏 { 10瓦 0.45 25瓦 0.90 100瓦 2.60 生薬 { 5個 0.45 10個 0.75 30個 2.10 100個 5.00 クリーム { 3個 0.50 7個 1.00 16個 2.00 100個 10.00	痔疾治療劑 軟膏 2-5 瓦を 1日 2-4 回貼用 痔出血, 肛門裂傷には坐薬挿入
Borsmin ボルサミン 三硼酸ウロトロピン	大本藥品	末 { 25瓦 0.55 100瓦 1.85 500瓦 8.30	利尿防腐劑 1日 2.0-3.0 瓦
Bosmin ボスミン 鹽酸エビレナミン液 (合成品)	第一製藥	液 { 10cc. 0.55 25cc. 1.10 100cc. 4.00 250cc. 8.00 1cc. { 5管 0.60 10管 1.00	止血劑 アドレナリンに同じ
Bovstrol ボヴストロール 生肉汁にストリキニーネ及燐を配せる製劑	東 洋 カ ル ニ イ ン 商 會	10cc. 10管 6.50	神經強壯劑 毎日又は隔日に 2-3 管を牛乳又は水にて稀釋し食前内服
B-Protamylase ビー, プロタミラーゼ	武 田	Protamylase 参照	
Branose ブラノーゼ Vitamin-B 製劑	三才商會	液 { 100瓦 1.00 500瓦 2.50 2500瓦 12.00 末 { 25瓦 0.60 50瓦 1.10 100瓦 1.50 500瓦 4.50	ビタミン B 劑 液 1日 10-15 瓦 末 1日 3-5 瓦 皮下用 1回 1-5cc. 静脈用 1回 3-5cc.

品名組	製造元	包装価格	醫効用量
皮下用ブラノーゼ	三才商會	皮注用 { 6管 0.70 1cc. { 60管 6.00 2cc. { 6管 0.95 60管 8.00 3cc. { 6管 1.20 60管 10.00 5cc. { 6管 1.50 60管 12.50	1日数回 1-5cc.
静脈用ブラノーゼ 3cc.中 { 硝酸ストリキニーネ 0.0015 { ストロファンチン 0.00001	全	静注用 { 6管 1.20 3cc. { 60管 10.00 5cc. { 6管 1.50 60管 12.50	1日数回 3-5cc.
船製ブラノーゼ	全	{ 250瓦 1.00 船 { 500瓦 1.80	1日 10-30瓦
ネオ, ブラノーゼ 濃厚液状ブラノーゼ (無酒精, 甘味)	全	ネオ { 100瓦 1.00 500瓦 2.50 2500瓦 12.00	1日 3-10瓦
B ₁ . Branose B ₁ ブラノーゼ Vitamin B ₁	全	1號(0.25瓦) { 6管 0.60 1cc. { 60管 5.40 2號(0.50瓦) { 6管 1.00 1cc. { 60管 9.60	ビタミンB ₁ 劑 1日 1回 1-3-5cc. 宛 皮下, 筋肉, 静注
Bren-Pasta ブレン, パスタ 動物性, 植物性脂肪の混合基劑に 火傷毒中和消炎劑を配せる白色無 刺激性軟膏	田邊五	{ 10瓦 0.20 100瓦 1.00 500瓦 4.00 軟膏 { 1疋 7.00 5疋 30.00 18疋 95.00	火傷治療劑 布又はガーゼに延べて 貼付
Brenzchin ブレンツヒン グアヤコール 1.5% に沃度キニー ネ, サリチル酸カルシウムより成 る弱アルカリ性複鹽液 (皮下用は沃度砒素 0.0005 グアヤ コール 0.3 含有)	大東化學	静注用 { 10管 3.50 20cc. { 50管 16.00 皮注用 { 10管 2.00 1cc. { 50管 9.00	結核治療劑 静注又は皮注 1日 1筒
Brobion プロビオン ブロームラクトビオン酸カル シウム 12.4% 純葡萄糖 10.0%	應用 醫化學	5cc. { 10管 3.00 50管 5.00	神經性諸疾患 注射劑 1日 1-2 回 1cc. 静 注

品名組	製造元	包装価格	醫効用量
Brocal プロカール ブロムカルチウム液	厚生社 (塩野義)	5cc. 10管 0.65 2% { 10cc. 10管 0.90 20cc. 10管 1.30 5cc. 10管 0.75 3% { 10cc. 10管 1.00 20cc. 10管 1.50 4% { 10cc. 10管 1.10 1cc. 10管 0.45 5% { 5cc. 10管 0.90 10cc. 10管 1.20	鎮静鎮痙劑 1回 5-10cc. 静注
Brocalnose プロカールノーゼ { ブロムカルシウム 2% { 葡萄糖 10%	掛見商店	20cc. { 10管 2.80 30管 7.50 100管 22.00	止血消炎劑 10-20cc. 静注 (内科, 外科, 婦人科, 泌尿科)
ザルソ, プロカールノーゼ プロカールノーゼに 2.5% のサリ曹 含有	ザルソプロカール ノーゼ 同價格		
Brocanon プロカノン { 葡萄糖 10% { ブロムカルシウム 2% (強は Br ₂ Ca 3%)	中外新藥	20cc. { 5管 1.85 10管 3.25 50管 13.00 100管 21.50 強 { 10管 3.50 50管 14.00 100管 23.50	栄養強心鎮静劑 1回 20cc. 静注
皮下用プロカノン { 葡萄糖酸カルシウム 8.5% { ブロムカルシウム 2%	全	5cc. { 10管 1.10 50管 4.50	栄養, 強心, 解毒 消炎劑 1回 5cc. 皮注
2號プロカノン { 葡萄糖 20% { ブロムカルシウム 4%	全	10cc. 10管 2.00	
ウロトロ, プロカノン プロカノンにウロトロピン10%, 硫酸マグネシウム 0.2% を配す	全	20cc. { 5管 1.95 10管 3.50 50管 14.00	尿路疾患治療劑 1回 20cc. 静注
20%ウロトロ, プロカノン プロカノンにウロトロピン20%, 硫酸マグネシウム 0.4% を配す	全	20cc. { 10管 3.80 50管 16.00	同上

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
ゴノ, プロカノン プロカノン20cc.中淋菌ワクチンを配す 1號 淋菌ワクチン 0.5cc. 2號 〃 〃 0.7cc. 3號 〃 〃 1.0cc.	中外新薬	(1號) 10管 4.00 20cc. { 50管 16.00 100管 21.00 (2號) 10管 4.50 20cc. { 50管 18.00 100管 31.00 (3號) 10管 5.00 20cc. { 50管 20.00 100管 34.00	治 淋 劑 1回 20cc. 靜注
キナ, プロカノン プロカノンに1%の鹽規を配す	全	20cc. { 10管 3.25 50管 13.00 100管 21.50	肺 炎, 感 冒 ア ン キ ー ナ 1回 20cc. 靜注
サルソ, プロカノン プロカノンに撒曹(2.5-5.0%)を配す	全	2.5% { 10管 3.25 20cc. { 50管 13.00 100管 21.50 5% { 10管 3.50 20cc. { 50管 14.00 100管 23.50	強 心 鎮 靜 劑 1回10-40cc. 靜注
ヨード, プロカノン プロカノンにヨードカルシウム2%を配す	全	20cc. { 10管 3.25 50管 13.00 100管 21.50	變 質 解 凝 劑 同上
Brocarose プロカローゼ 10%高張葡萄糖液にブロムカルシウム2%を配伍	植 村	20cc. { 5管 1.40 10管 2.50 50管 10.00	強 心 利 尿 劑 毎日或は隔日 1筒靜注
Salso Brocarose サルソプロカローゼ プロカローゼにサリチル酸ナトリウム(2.5-5.0%)を配す	全	2.5% { 5管 1.40 20cc. { 10管 2.50 50管 10.00 5% { 5管 1.40 20cc. { 10管 2.50 50管 10.00	榮 養, 解 毒, 解 熱 劑 10-40cc. 靜注
Brocase ブローカゼ ブロムの蛋白膠質液結合體	日進化學	末 { 25瓦 0.70 250瓦 5.00 500瓦 9.00 錠 { 100錠 1.00 1000錠 8.50	鎮 靜 劑 1日 3回 0.5-1.0瓦 (2-4錠)宛
Brocatohl ブロカトール 2%ブロムカルシウム10%葡萄糖液	東洋新薬	20cc. { 10管 2.50 50管 11.00	強 心 利 尿 劑 20cc. 毎日 1回靜注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Brocin プロチン 邦産 Prunus 屬植物の有効成分 賣許—賣給	三 共	50瓦 1.00 末 { 100瓦 1.70 500瓦 6.10 0.5 { 30錠 0.40 100錠 1.05 100cc. 0.85 液 { 500cc. 2.40 1000cc. 4.30	鎮 咳 祛 痰 劑 粉末 1日 3-6瓦 液劑 1日 10-20cc. 錠 1日 6-12錠
プロチンボンボン ドロツブ	全	ボンボン 50個 0.80 20瓶 0.30 40瓶 0.50	
Brocase "Sankyo" ブローカス 三共 {ブロムカルシウム 5% 葡萄糖 10%溶液	全	20cc. { 5管 1.10 10管 2.00 50管 8.50 100管 15.50	鎮 靜, 鎮 吐, 解 毒 劑 1回10-20cc. 靜注
Brodexin ブロデキシン 葡萄糖10%ブロムカルシウム2%液	日新醫學	20cc. { 10管 2.00 50管 9.00	鎮 痙 劑 毎日 1回20cc. 靜注
Salso-Brodexin サルソブロデキシン ブロデキシンに3%サリチル酸ソーダを配す	全	20cc. { 10管 2.20 50管 10.00	鎮 痛 消 炎 劑 毎日 1回20cc. 靜注
Urotro-Brodexin ウロトロブロデキシン ブロデキシンにウロトロピン10%硫酸マグネシア0.2%を配す	全	20cc. { 10管 2.50 50管 11.00	膀 胱 カ タ ル 腎 盂 炎 1回20cc. 靜注
Bromaton ブロマトン {葡萄糖 10% ブロムカルシウム 3%	小野市	20cc. { 10管 2.00 50管 8.50	榮 養, 利 尿 鎮 靜 劑 毎日又は隔日 1回20cc. 宛靜注
Brom-calcicol ブロムカルチコール	大日本製薬	Calcicol 参照	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
ブロムカルシウム製剤			
Brom-Calcium-Solution ブロムカルシウム液 ブロムカルシウム溶液	三共	2% 10cc. 5管 0.80 4% 10cc. 5管 0.80 4% 20cc. 5管 1.00	神経衰弱, 偏頭痛 不眠症, 痙攣, 神経痛, 蕁麻疹 静注 5-40cc.
Brom-Calcium Solution ブロムカルシウム注射液「萬有」	萬有	2% { 5cc. 10管 0.80 20cc. 5管 0.80 3% { 5cc. 10管 0.80 10cc. 10管 0.95 20cc. 5管 0.80	
Brom Calcium Sol ブロムカルシウム注射液「タナベ」	田邊五	2% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.00 3% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.00 4% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.00 5% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.00	
Brom Calcium Sol 三研プロカル注射液 ブロムカルシウム溶液	三菱薬品	2% 1號 10cc. 5管 0.65 2號 20cc. 5管 0.80 3% 3號 5cc. 10管 0.75 4號 10cc. 10管 1.00 5號 20cc. 5管 0.85	
Brom-calcium-inject ブロムカルシウム注射液 ブロムカルシウム溶液	フタバ	2% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.00 3% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.00	
Brometone ブロメトーン トリブロム第三ブチルアルコール 樟腦様香氣を有する白色微稜柱狀 結晶	パーク デビス (三共)	末 { 14瓦 1.25 28瓦 2.25	有機性ブロム剤 0.1-0.3 瓦宛 1日 3 回
Brom-Grelan ブロムグレラン	柳澤 (武田)	Grelan 参照	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Bromin ブロミン {ブロームマグネシア 8% {葡萄糖 5%	昭和新薬	10cc. 10管 2.40	鎮痙, 鎮痛 鎮静劑 毎日又は隔日 10cc. 宛 皮或は筋注
Bromipin ブロミピン ブロム及胡麻油附加結合體	メルク (シユ ミツト)	油液 (33%) 50 瓦 7.20	鎮静劑 1日 1-2 回 1-2 瓦宛
Brom-Iveton ブロームイベトン		Iveton 参照	
Bromocoll ブロモコール デブロムタンニン石灰	バイエル	末 { 25瓦 4.06 500瓦 65.58	鎮静, 鎮痒劑 (内用) 0.5 宛 1日 3- 6 回 (外用) 10-20% 軟膏
Brom-Tetragnost ブロームテトラグノスト テトラブロム・フェノルフタレイ ンソーダ (Jod-Tetragnost 参照)	メルク (シユ ミツト)	5瓦 2.75 (0.5) 25球 4.90	膽囊造影劑 説明書参照
Bromural ブロムラール ブロムワレリル尿素	クノール (三共)	末 { 25瓦 4.85 100瓦 18.00 450瓦 77.80 ⑤(0.1) 40錠 1.50	鎮静催眠劑 鎮静 1回 0.2-0.3 1日 3回 催眠 1回 0.6-1.0 就床時
Bronatrin プロナトリン 生理的食鹽水に溶解せるブロムナ トリウム 5-10%液	日本新薬	5% { 1號 5cc. 1.00 2號 10cc. 1.00 3號 5cc. 1.00 10% { 4號 10cc. 1.00 5號 20cc. 1.20	痒痒症, 内出血 治療劑 1日 1回 1筒静注 (咯 血, 吐血, 子宮出血, 膀胱出血) 等に 1日 1 -2 回 5-20cc. 静注
Bros-Lodinon ブロスロチノン	武田	Lodinon 参照	
Brosol ブロゾール	日本 薬品洋行	液 { 25瓦 0.35 100瓦 1.20 220瓦 2.20 400瓦 4.00 チューブ 0.30	痒痒性皮膚疾患

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Brososin ブロソジン ブロムナトリウム 5-10%溶液	フタバ	5% 10cc. 5管 0.80 10% 10cc. 5管 1.00	療痒性, 皮膚疾患 10-20cc. 静注
Brososin-Comp 複方ブロソジン 5% ブロムナトリウム 2% クロールカルシウム	全	20cc. 5管 1.20	止痒注射剤 10-30cc. 静注
Brotacin ブロタチン トリブロムエタノール -CBr ₃ -CH ₂ OH (Avertin 参照)	藤澤	結晶 25瓦 6.50 液状アンペア入 7cc. 2.20 硝子容器入 50cc. 13.00	注腸麻酔剤 体重1斤に付 結晶-0.08-0.1瓦 液状-0.08-0.1cc.を 2.5%の割合に溜水に溶 して注腸
Brotanin ブロタニン ブロムタンニンゼラチン ブロム含量20%無臭, 無味粉末	三共	末 { 25瓦 1.20 100瓦 4.35 500瓦 18.50 (0.25) 100錠 1.55	有機性ブロム剤 1日 3-4回 0.5-1.0 錠 緩劑 1日 4.0-8.0 3 回分服
Brovarin (㉔)(㉕) ブロバリン ブロム, フレリル尿素 試験-1日 1.0-頓 0.45 解熱剤, 鎮咳剤, 鎮痛剤の作用増 強の目的には 1日量 0.3-0.6, 頓 0.3 を用ふ	日本新薬	末 { 25瓦 100瓦 500瓦	催眠鎮静剤 鎮静-1回 0.2-0.3 1日 3回 催眠-1回 0.5-1.0 就床時
ブロバリン錠 (ブロバリン 0.1)	全	0.1 { 20錠 0.50 100錠 1.80	1日 3回 2-3錠宛又 は 1回 3-9錠頓服
ブロ錠 (ブロバリン 0.3)	全	ブ { 4錠 0.20 12錠 0.60 30錠 2.20	1日 3回 1錠宛 (頭痛, 不眠, 船暈)
Broveton プロベトン { CaBr ₂2% { 葡萄糖.....10%液	フタバ	20cc. { 10管 2.50 50管 10.00	栄養, 強心, 消炎剤 1回 20cc. 静注

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Salso-Eroveton サルソ, プロベトン サリチル酸ソーダ10%含有のプロ ベトン	フタバ	20cc. { 10管 2.50 50管 10.00	ロイマチス, 神 経痛, 腰痛, 肩凝 1回 20cc. 静注
Urotro-Broveton ウロトロプロベトン ウロトロピン10%, 硫酸マグネシ ア 0.2%含有のプロベトン	全	20cc. { 10管 2.50 50管 10.00	利尿, 鎮痛剤 1回 20cc. 静注 (淋疾, 膀胱炎)
Bubonol (㉔) ブボノール ヨードフォルム, グアヤコール, オイカリブトール油合剤	三共	1.5cc. { 5管 1.00 10管 1.75	軟性下疳治療剤 1-5cc. 局所注射
Bubotol (㉔) ブボトール 吐酒石 0.2%を主成分とし, 之に 高張葡萄糖液を配す	全	20cc. { 5管 1.35 10管 2.30	第四性病治療剤 毎日又は隔日 1回 10- 20cc. 静注
Buca-Vaccin ブカワクチン 内服ワクチン	全	(ワクチン項参照)	
Bufotalis ブホタリス 蟾酥の有効成分中ブホタリンプロ ミード 2cc.中 0.4mg 含有(チエチ レンジリコール70%液に溶解す)	塩野義	1cc. { 5管 1.30 10管 2.40 50管 11.00 2cc. { 5管 2.00 10管 3.70 50管 17.00 30錠 7.50	強心利尿剤 注射-1回 2-4cc.皮 筋, 静注 内服-1回 3-5錠 1 日 3-4回 (禁忌アルカリ剤)
Bulbocapnin ブルボカプニン ブルボカプニン鹽酸鹽	メルク (シユ (ミツト)	0.1 10錠 9.70 1.1cc. 5管 10.60	慢性震顫性疾患剤 1回 1錠内服 1cc. 皮 注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Cabromin カプロミン {ブロムナトリウム 10% 鹽化カルシウム 2%溶液	一新製薬	10cc. { 6管 0.90 50管 7.00	皮膚癢痒及 内出血 毎日又隔日静注 10-20cc.
Cacatin (商) カチン サリチル酸カルシウムテオプロミ ン C ₁₄ H ₁₅ N ₄ O ₅ Ca	中村瀧	末 { 25瓦 1.10 100瓦 3.95 500瓦 16.00 0.5 { 20錠 0.70 100錠 3.20	血圧下降劑 1日 1.0(2錠) 2回分服
Cacodylin (商) カコチリン カコチール酸石灰溶液	三共	1% { 1cc. 各 2% { 12管 1.20 3% { 4% { 5% {	肺結核治療劑 各1管宛皮注漸次増%
Cacodylin "James" (商) カコチリン Lジヤメ ⁷ カコチレートナトリウムと非毒性 血清との結合せるもの	ジヤンム (スウヂスト 日本學術部)	1cc.3管 (A) 2.10 2cc.3管 (B) 2.10 3cc.3管 (C) 2.10 3cc.3管 (D) 4.00 (ABC) 10管 6.50 (D) 10管 12.00 品切レ	結核治療劑 毎日1回1管筋注又は 静注 (説明書参照)
Cadechol "Ingelheim" カデヒヨール Lインゲルハイム ⁷ デスオキシヒヨール酸とカンフル 結合劑, 28%のカンフル含有, 難 溶性白色粉末	インゲル ハイム (友田)	末 5瓦 3.90 (0.1) 20錠 1.70	強心劑 1日 3回 0.3-0.5瓦宛
Caffeino Caltium benzoicum (商) 安息香酸カルシウムカフェイン (別名—三共安カカ)	三共	末 { 25瓦 1.00 500瓦 17.00	強心利尿劑 1回 0.5-1.0瓦宛 1日 3回 (安那加に準ず)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
アシナカ注射液 Caffeino-Natrium benzoicum (商) 安息香酸ソーダカフェイン液	三共	20% 1cc. 6管 0.50	強心, 利尿劑 1-2cc. 皮注又は筋注 (極量は主薬 1回 1.0 1日 3.0錠) (肺炎, 心臓衰弱性浮 腫, 腎臓炎, 尿毒症, 悪 阻等)
Lタケダ ⁷ 安那加注射液 (商)	武田	10% { 5管 0.55 2cc. { 10管 0.95 10% 5cc. 5管 1.20 25% { 5管 0.50 1cc. { 10管 0.90 25% 2cc. 10管 1.20	
Lシオノ ⁷ 安那加注射液 (商)	塩野義	20% { 5管 0.45 1cc. { 50管 3.50 30% 1cc. 5管 0.50 20% 2cc. 5管 0.55 30% 2cc. 5管 0.60	
Lタナベ ⁷ アンナカ注射液 (商)	田邊五	20% { 5管 0.45 1cc. { 10管 0.75 50管 3.60 2cc. 5管 0.55 25% { 5管 0.48 1cc. { 10管 0.85 20管 1.60 30% 1cc. 5管 0.50	
L萬有 ⁷ 安那加注射液 (商)	萬有	10% 1cc. 6管 0.40 20% 1cc. 6管 0.40	
Lマルコ ⁷ 安那加注射液 (商)	マルコ	20% { 5管 0.50 1cc. { 10管 0.90 50管 4.00 20% { 5管 0.60 2cc. { 10管 1.10 30% { 5管 0.55 1cc. { 10管 1.00 50管 4.80 30% 2cc. 5管 0.70	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ア シ ナ カ</p> <p>カフェイン 2分</p> <p>安息香酸ソーダ 3分</p> <p>C₈H₁₀NO₂-C₆H₅COONa</p> <p>純カフェイン38%含有</p> </div>			

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
「マルイシ」安那加注射液 (10%, 20%同値)	丸石	1cc. { 5管 10管 50管 2cc. { 6管 12管 50管	
「三研」安那加注射液	三菱薬品	5% 1.1cc. 10管 0.60 10% 1.1cc. 10管 0.80 20% 1.1cc. 5管 0.50 30% 1.1cc. 5管 0.50	
「三研」無痛安那加 (Ph. 7 に調製せるもの)	全	10% 1.1cc. 10管 0.90 2.2cc. 10管 1.20 20% 1.1cc. 10管 0.90 2.2cc. 10管 1.20	
「櫻木」アンナカ注射液	櫻木	10% 1cc. { 10管 0.60 50管 2.50 20% 1cc. { 10管 0.60 50管 2.50	
Ca-Flein カーフライン フラインリミットにグルコン酸カルシウム、葡萄糖配合剤	一薬新製	10cc. { 5管 0.95 10管 1.80 50管 7.00 20cc. { 5管 1.30 10管 2.40 50管 10.00	殺菌消毒剤 1回 10cc. 或は 20cc. 静注 (淋疾, 敗血症, インフルエンザ)
Cajosalin カヨザリン サリチル酸沃度カルシウム 2%液	小澤(里村)	10cc. 5管 3.50	ロイマチス治療剤 1回 10cc. 皮注又は静注
Calben カルベン ウロトロピン、サリチル酸カルシウムカフエイン製剤	厚生社(塩野義)	10cc. { 5管 0.80 20管 2.80 30管 3.80 50管 5.50 20cc. { 5管 1.00 30管 5.00 50管 7.00	治淋剤 毎日又は隔日 10-20cc. 静注

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Calcibronat "Sandoz" カルチブロナート「サンド」 ブロム・ラクトビオン酸カルシウム	サンド	注 12.4%液 5cc. 10管 5.70 10cc. { 5管 3.30 20管 10.75 粗粉末 { 100瓦 2.70 500瓦 9.65 沸騰錠 (3.0) 10錠 2.70	神経衰弱, 偏頭痛, アレルギー疾患 注 2日毎に 10-20cc. 筋注又は静注 内服 末 1日 3-5瓦 錠 1日 1/2-1錠
Calcicol カルチコール グルコン酸カルシウム Ca(C ₆ H ₁₁ O ₇) ₂ (注射液-8.5%水溶液) Calcium "Sandoz" Calysanin Calkose Sancal Budocalin 参照	大日本製薬	2cc. { 10管 0.80 50管 3.00 5cc. { 10管 1.10 50管 4.50 10cc. { 5管 0.95 10管 1.70 50管 7.00 20cc. { 5管 1.30 10管 2.40 20管 4.50 50管 10.70 末 { 25瓦 0.60 100瓦 1.80 500瓦 7.20	カルシウム剤 1回 5-10cc. 静注又は筋注 末 1日量 1.5-2.0 3回分服 (瘰癧, 胃腸出血性疾患)
Brom Calcicol ブロム, カルチコール { ブロムカルシウム 2%液 { グルコン酸カルシウム 3%液	全	5cc. { 5管 0.60 10管 1.00 50管 4.00 10cc. { 5管 0.80 10管 1.40 50管 6.50 20cc. { 5管 1.20 10管 2.30 50管 10.00	消炎, 鎮痛, 鎮静剤 毎日又は隔日 10-20cc. 静注 (神経衰弱, 偏頭痛, アレルギー疾患)
Chinin Calcicol ヒニン, カルチコール { グルコン酸ヒニン 6% { グルコン酸カルシウム 4.5%	全	3cc. { 5管 1.00 10管 1.80 5cc. { 5管 1.30 10管 2.40 50管 11.00 10cc. { 5管 2.10 10管 4.00 50管 19.00	肺炎, 扁桃腺炎 アンギーナ 毎日又は隔日 10cc. 筋注
Saliso-Calcicol ザリソ, カルチコール { サリチル酸ソーダ 2.5%液 { グルコン酸カルシウム 6%液	全	20cc. { 5管 1.30 10管 2.20 50管 9.00	鎮痛, 解熱消炎剤 毎日又は隔日 20cc. 静注

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Calcii Jodati Sirupus "Futaba" 複方沃度カルシウム ヨードカルシウム, 2%クロールカルシウム, 5%含有のシロップ	フタバ	450瓦 1.90	強壯内服薬 1日3回3瓦宛(約5倍の水に溶解し食前1時間位の空腹時内服)
Calcio-Coramin カルチオ, コラミン	チバ	Coramin 参照	
Calciodiure (丸) カルチオヂウレ サリチル酸カルシウムテオプロミン	杏林製薬 (鳥居)	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 13.50 1000瓦 } 0.5 { 20錠 0.50 100錠 2.25 1000錠 18.00 } 0.2 { 100錠 1.00 500錠 4.50 }	利尿, 強心 血圧下降剤 1日3回1回0.5-1.0瓦
Calciphan カルチファン サリチル・フェニルヒノリン・カルボン酸カルシウム。淡黄色粉末(キノフェンの胃腸障害を除けるもの)	日本新薬	末 { 25瓦 2.50 100瓦 8.80 500瓦 40.00 } 0.5 { 20錠 1.20 100錠 5.00 }	神経痛, 痛風 ロイマチス 淋毒性関節炎 1日3回0.5-1.0(1-2錠)宛毎食後
Calcisol カルチゾール クロールナトリウム及クロールカルシウム溶液	東京化学 (塩野義)	5cc. 6管 0.80 10cc. 6管 1.00	止血剤 1回5-10cc. 静注
Calcium Benzoicum 安息香酸カルチウム 安息香酸カルシウム Ca(C ₇ H ₅ O ₂) ₂	日新商行	末 { 25瓦 0.25 100瓦 0.95 500瓦 2.70 5瓦 25.00 }	鎮咳, 強壯 解熱剤 1回0.5-1.0宛1日数回

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Calcium Lacticum (丸) 乳酸石灰 Ca(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ + 5H ₂ O	三共	末 { 25瓦 0.25 100瓦 0.60 500瓦 1.95 } 0.26 { 100錠 0.30 500錠 1.00 }	カルシウム剤 1日3回0.5-1.0瓦宛
Calcium-Lacticum (丸) 志村乳酸カルチウム	志村薬局	末 { 25瓦 0.25 100瓦 0.75 500瓦 2.90 } 錠 { 100錠 0.50 500錠 2.00 }	
Calcium-"Sandoz" (丸) カルチウム「サンド」 グルコン酸カルシウム Ca(C ₆ H ₁₁ O ₇) ₂ 注射液はグルコラクトビオン酸カルシウム13.75%溶液にしてグルコン酸カルシウムの10%液はCaCl ₂ の5%液に相当す。 (Calcicol, Calysanin, Calcose, Sancal, Budocalin 参照)	サンフ	100% { 50瓦 1.85 末 { 100瓦 3.45 500瓦 13.55 } 10% { 10管 5.70 5cc. { 150管 44.00 5管 3.30 } 10cc. { 20管 10.75 100管 35.00 } 20% { 2管 1.40 5cc. { 10管 6.45 1管 0.95 } 10cc. { 5管 3.80 20管 12.60 }	カルシウム剤 末-1日量2-3瓦 注-2-3日毎に1回5-10cc. 静注又は筋注(咯血, 胃腸出血, 渗出性疾患)
Calcium-"Sandoz"-Syrup カルチウム「サンド」シロップ 主薬30%含有シロップ	全	液 { 50瓦 0.95 100瓦 1.65 250瓦 3.45 }	カルシウム剤 1日6-9瓦
Calcium-"Sandoz"-Tablet カルチウム「サンド」 チョコレート錠 グルコラクトビオン酸カルシウム 1.5瓦を配せる美味錠剤	全	(1.5) 30錠 2.10	1日量1-2錠

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Calcium-"Sandoz"-Brause-Tablet カルチウム「サンド」 沸騰レモネード錠 1錠中 グルコラクトビオン酸カルシウム 4瓦含有	全	(4.0) 12錠 2.10	1日量 1/2—1錠 コップ一杯の水に入れ砂糖果汁等にて味を附け服む
Calcium Syrup Comp 複方カルチウム舎利別 鹽化カルシウム 4% ヨードカルシウム 1.5% 含有の舎利別	ラヂウム	450瓦 1.80	結核, 腺病質 1回 1—3 茶匙 (4—12 cc.) 1日 3回
Calc-Vitacose カルクヴィタコーゼ { 葡萄糖 10% Vitamin B ₂ B ₁ 20% サリチル酸石灰 1—3%	龜井薬品	1% { 5管 1.60 20cc. { 20管 5.75 50管 11.00 3% { 5管 1.60 20cc. { 20管 5.75 50管 11.00	栄養, 解熱 消炎劑 毎日又は隔日 1回 20 cc. 静注
Caldexan カルデキサン グルコン酸カルシウム (Calcium "Sandoz" 参照)	日新醫學	末 { 100瓦 1.70 250瓦 3.80 500瓦 7.00 8.5% { 10管 0.60 2cc. { 50管 2.50 5cc. { 10管 0.90 50管 4.00 10cc. { 10管 1.20 50管 5.00 20cc. { 10管 1.80 50管 8.00	結核性疾患 消炎劑 内服 1日 1.5—2.0 注射 1日 1回皮注筋注 静注
Calflavin カルフラヴィン { アクリチン色素 0.25% グルコン酸カルシウム 3.6% 葡萄糖 10%	全	10cc. { 10管 1.50 50管 6.50 20cc. { 10管 2.00 50管 9.00	淋毒性疾患 毎日又は隔日 10—20 cc. 可及的緩徐に静注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Calfo-Rayol カルフォレイヨール 磷酸カルシウム及ビタミンD	柳 韓	錠 { 25錠 3.75 100錠 13.10	肺結核, 尙健病 神經衰弱 1日 平均 2—3錠
Caljodin カルヨヂン 沃度, 葉綠素	石本活生	末 { 10瓦 2.00 50瓦 8.00 100瓦 14.00 250瓦 30.00 500瓦 50.00	血 壓 異 常 甲状腺機能障害 1日 3回 0.1—0.3瓦 (冷水を用ふべし)
Calkose カルコーゼ グルコン酸カルシウム (C ₆ H ₁₁ O ₇) ₂ Ca 10%液は CaCl ₂ 5%液に相当す 〔買註〕—〔買註〕 1日 1.5—2.0 (Calcium "Sandoz" 参照)	藤 澤	末 { 25瓦 0.65 50瓦 1.15 100瓦 2.00 500瓦 8.50 10% { 10管 0.70 2cc. { 50管 3.00 5cc. { 10管 1.00 50管 4.25 10cc. { 10管 1.60 50管 6.80	カルシウム劑 1日 1.5—2瓦分 3 回 5—10cc. 皮注又は筋注 2—20cc./
Calmasan カルマザン 珪酸アルミニウム 70%, 珪酸マグネシウム 30% を含む製劑	内外薬品	末 { 100瓦 0.80 500瓦 3.20 1斤 5.80	制酸, 被覆, 吸着劑 1日 3回 毎食後直ちに 1—2瓦宛 (胃酸過多, 胃痛, 胃潰瘍, 異状酸酵)
Calmol カルモル「コメット」 ヘキサメチレン・テトラミン, サリチル酸カルシウム	コメット	末 { 50瓦 1.10 100瓦 2.00 225瓦 4.30 450瓦 8.00	治 淋 劑 1日量 3.0—4.0 毎食後直ちに分服
Calmotin カルモチン ブロムワレリル尿素 〔買註〕—〔買註〕 1日 1.0瓦 頓服 0.45	武 川	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.30 500瓦 12.00 0.25 { 15錠 1.00 50錠 2.60 0.1 { 30錠 0.90 100錠 2.40	鎮 静 催 眠 劑 鎮静劑としては 1日 0.6—1.0分服 催眠劑としては 1回 0.5—0.8瓦 就床前頓服
Calori men カロリ綿 蕃椒有效成分カプサイチンを吸収せしめたる精製綿	里 村	5瓦 0.30 (1枚) 20瓦 0.70 (3枚) 60瓦 1.50 (5枚) 100瓦 2.00	消 炎 劑 皮膚上に壓抵

品名組 威	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Calship カルシツブ オリーブ油に分散せしめたるコロイドカルシウム塗布剤	石本活生	50瓦 0.50 250瓦 1.00 500瓦 1.50 1キロ 2.50	傷創治癒促進剤 其儘又はガーゼに塗布して患部へ貼付
Calthiosalz 新 カルチオサルツ グアヤコールスルホン酸カリ、サリチル酸ソーダ、グルコン酸カルシウム、葡萄糖	天 兒	10cc { 10管 1.50 50管 6.50 20cc { 10管 2.50 50管 9.00	肺結核、肋膜炎、 其他漿液膜性疾患 毎日又は隔日 10-20cc. 宛静注
Caltin カルチン 穀類種子より得たる有機性糖にカルシウムを結合せるもの	三 星 (鳥 居)	末 { 25瓦 0.70 100瓦 2.60 450瓦 11.20 (1.0) 100錠 0.80	腦神經衰弱 結核、骨軟症 1日 3瓦(3錠) 3回分服
Caltitose 新 カルチトーゼ 0.5%グルコン酸カルシウム	昭和新薬	2cc. 10管 0.80 5cc. 10管 1.30 10cc. 10管 1.90 20cc. 10管 3.60	結核性疾患 心臓衰弱 毎日又は隔日 10-20cc. 皮筋又は静注
"Cal-Vita" カルビタ ビリヂンベータカルボン酸ヂエチルアミドとロダンカルシウムとの複鹽	フ タ バ	0.4 { 10錠 0.75 20錠 1.25 100錠 4.85 末 25瓦 3.50	強心呼吸強盛剤 1日 1-2錠 1日 3回食後服用
Calysanin ㊦ カリザニン グルコン酸カルシウム (C ₆ H ₁₁ O ₇) ₂ Ca 注射液は8.5%にして、CaCl ₂ 5%液=相當す 賣許—㊦ (Calcium "Sandoz" 参照)	塩野義	2cc. { 10管 0.60 50管 2.40 5cc. { 10管 1.00 50管 4.00 10cc. { 10管 1.50 50管 6.00 末 { 25瓦 0.55 100瓦 1.80 500瓦 8.00	カルシウム剤 内服 1日 1.5-2.0 1回 5-10cc. 宛皮注 静注
Camafeton カマフェトン 精製樟腦 0.5%の食鹽水溶液 (Kamacol 参照)	鳥 居	1.2cc. 20管 1.20 2.2cc. { 12管 0.90 60管 4.00 馬匹用 2Jcc. 5管 2.00 10cc. 10管 2.50	強 心 劑 皮注 1回 1-2cc.

品名組 威	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Camdenin カンデニン 葡萄糖カンフル注射液 ①②—葡萄糖 25% ③④— " 50% ⑤⑥— " 5%	鳥 居	① 20cc. 5管 2.00 ② 50cc. 3管 2.20 ③ 20cc. 5管 2.20 ④ 50cc. 2管 2.00 ⑤ 100cc. 2管 1.40 ⑥ 250cc. 1管 1.40	栄養強心劑 静注又は筋注
Camnaphor カムナホール ^レ リミット ⁷ カンフル水溶液	一新製薬	0.1% 5cc. 10管 1.20 10cc. 10管 1.50 0.2% 2cc. 10管 0.70 2cc. 50管 3.50 0.5% 2cc. 10管 0.75 2cc. 50管 3.40 5cc. 10管 1.50 10cc. 10管 2.00	強 心 劑 1日 1-數回 皮注又静注
Campanol カンパノール エフェドリン、カンパヌラサポニン含有の甘味液劑	いわしや (松 本)	500瓦 3.00	鎮咳祛痰劑 1日 3回 1回 1.5-2.0瓦
Camperol カンペロール 0.5%の水溶カンフルにサリチル酸石灰、ヨードナトリウム及鹽化カルシウムを配す	植 村	5cc. { 6管 1.50 12管 2.70	肺炎、氣管枝炎 1回 5cc. 静注
Campton 新 カンペトン 0.5カンフル水溶液、サリチル酸、沃度クロール、各カルシウム鹽	山之内	5cc. 6管 2.50	肺炎、喘息 結核性熱 1回 5cc. 静脈注射、症状により倍量迄可なり
Campher-Hormon 新 カンファーホルモン 動物組織綜合ホルモンの樟腦生理的食鹽溶液	丸 善	1cc. { 10管 1.60 50管 6.00	強心、呼吸調整充奮劑 1回 1.0-2.0cc. 皮注

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
Camphochol カンフオコール アポコール酸と樟腦との抱合體、 無色結晶體28%の樟腦含有	リーデル ホルス タイン (瀬戸)	(0.1) 10球 2.00	心臓亢奮劑 日 3-5回 1球宛、食 後内服。 (デギタリス劑、カンフ ルの代用として連用に 適す)
Campholloid カンフオロイド カンフル NaCl C ₆ H ₁₂ O ₆	道修薬學	5cc. { 2管 1.00 6管 2.50	解熱消炎 日 1回 3.0-5.0cc. を靜注(又は皮下筋肉 内)
カンフル注射液			
Camphor Oil (Oleum Camphoratum) カンフル油 カンフルの精製オレーフ溶液	三共	10% { 5管 0.45 1cc. { 50管 2.00 100管 3.60 20% { 6管 0.45 1cc. { 50管 2.00 100管 3.60	強心、ロイマ チス、神經痛 1回 1-2cc. 皮注
㊦カンフル注射液	大日本 製薬	10% { 5管 0.21 1打 2.10 1cc. { 10管 0.40 1打 4.00 20% { 5管 0.25 1打 2.50 1cc. { 10管 0.48 1打 4.80	参 照 Carnodol. Vitacampher Camphenal Neo-Campher
㊦無痛カンフル注射液 エーテル、アルコール等の溶劑を 含有せざるカンフルオレーフ油液	全	10% { 5管 0.21 1cc. { 10管 0.40 20% { 5管 0.25 1cc. { 10管 0.48	
㊦水溶カンフル 生理的食鹽水に精製カンフルを溶 解す (0.5%) (Camafeton, Kamacol 参照)	全	2cc. { 5管 0.80 10管 1.00 50管 3.50 5cc. 5管 1.10 10cc. 5管 1.30	強 心 劑 皮注又は靜注 1回 2- 5cc.
「タナベ」カンフルオレーフ油	田邊五	10% { 5管 0.25 1cc. { 1打 2.50 50管 2.00 20% { 5管 0.35 1cc. { 1打 3.50 50管 2.80	
「フタバ」カンフルオレーフ油	フタバ	10% { 5管 0.25 1cc. { 100管 3.50 20% { 5管 0.30 1cc. { 100管 4.50	

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	医効用量
「フタバ」無痛カンフル注射液 エーテル酒精等の溶劑を含有せ ざるカンフル溶液	フタバ	10% 1cc. 6管 0.40 10% 100cc. 1瓶 3.50 20% 1cc. 6管 0.45 20% 100cc. 1瓶 3.80	
無痛カンフル油	白井松	10%及20%各 1.1cc. 5管 0.40 { 10% 50瓦 2.80 瓶 { 20% 50瓦 2.80	
「三研」カンフルオレーフ油	三菱薬品	10% { 5管 0.25 1.2cc. { 12管 0.50 20% { 5管 0.35 1.2cc. { 12管 0.70	
「三研」無痛カンフル油	全	10% { 5管 0.25 1cc. { 10管 0.45 50管 1.60 100管 3.15 20% { 5管 0.30 1cc. { 10管 0.50 50管 1.90 100管 3.35	
無痛カンフル注射液	植村	10% 1cc. 10管 0.60 20% 1cc. 10管 0.65	
Camphor Dextrose Sol. カンフル葡萄糖注射液 1 號 25%の葡萄糖 2 號 10% 〃 3 號 5% 〃 4 號 20% 〃	一新製薬	1號液 20cc. 10管 4.00 2號液 20cc. 10管 3.60 3號液 50cc. 3管 3.20 4號液 20cc. 10管 3.80	栄養強心劑 各號液共 1管 1回靜注
Camphor Inhalation カンフル吸入劑 「櫻木」 カンフル及びアクリチン色素をア ルカリ鹽水溶液に分布せしもの - (Campiron, Capremin 参照)	櫻木	500瓦 0.50	咽喉カタル 扁桃腺炎 百日咳、肺結核 日數回 50cc. 宛吸入
Camphorin カンフオリン 0.5% カンフルのクロールナトリ ウム水溶液	東洋新薬	1cc. { 10管 0.55 50管 2.20 2cc. { 10管 0.70 50管 3.50 5cc. 10管 1.20	カンフル適應症 1回 1-10cc. 靜注又 は皮注

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Camphotinin カンホトニン 樟腦誘導體 C ₁₀ H ₁₇ NO 微に樟腦 様香氣を有する難溶性粉末	塩野義	0.1 { 50錠 1.00 100錠 1.80 25瓦 1.00 末 { 100瓦 3.50 500瓦 14.00	夜尿, 盗汗 治療劑 1回量 0.6-0.9 1日 3 回内服
Camph-Oxyn 新 カンフーオキシ オキシカンファー製劑	日新醫學	1.1cc. { 10管 1.50 50管 7.00	強心劑 1回 1-2cc. 症状によ り 4-6cc. 皮注
Campiromin カンピロミン 0.5%カンフル水溶液	道修藥學	1.2cc. { 6管 0.35 12管 0.60 60管 2.50 2.2cc. { 6管 0.45 12管 0.80 60管 3.50	強心劑 1-2cc. 皮注
Campiron カンピロン吸入劑 水溶性カンフル吸入劑	全	液 { 300瓦 0.60 600瓦 1.00 1200瓦 2.00 2700瓦 3.30	肺炎, 百日咳 鎮咳劑 1回 20-50cc. 吸入
Camporisin カンボリジン カンフル濃厚水溶液とサリチル酸 鹽よりなる無刺激性液	山之内	1cc. { 6管 1.50 12管 2.80 60管 13.00	ロイマチス, 神 經痛, 肩凝, 頭痛 1cc. 局所筋注
Camprolin カンプロリン カンフルの生理的食鹽水溶液	高田製藥	0.3% { 5管 0.50 2cc. 10管 0.90 0.5% { 5管 0.50 2cc. 10管 0.90 1% { 5管 0.50 1cc. 10管 0.90 10% { 5管 0.50 1cc. 10管 0.90	強心劑 0.2-0.5% 1回 2cc. 筋注 1-10% 1回 1cc. 皮注 又は筋注
Camsterin カムステリン ①—カンフル, コレステリン, エーテル油劑 ②—同上 ストリキニーネ含有 ③—同上 鹽酸キニーネ含有	丸善	① { 5管 1.20 10管 2.00 2.2cc. { 50管 8.50 100管 11.50 ② { 5管 1.50 10管 2.80 2.2cc. { 50管 12.00 100管 20.00 ③ { 5管 1.50 10管 2.80 2.2cc. { 50管 12.00 100管 20.00	強心, 興奮 全抗毒劑 ①カンフル注射代用 ②脚氣, 遺尿症, 神經 衰弱 ③感冒, 肺炎 各 2cc. 筋注

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Camurasin カムラジン 水溶性カンフルに消炎剤を配す	丸石	2cc. { 6管 1.80 12管 2.50 50管 9.90 獸醫用 { 1C管 2.50 10cc. { 5C管 11.00	神經痛, ロイマ チス治療劑 毎日又は隔日 2cc 筋 注又は神經幹に注射
Candiolin カンチオリン 有機性磷酸石灰製劑	バイエル	チヨコレート 角型錠 (1.0) 24錠 2.52	強壯劑 1日 3回 1錠宛
Cantan カンタン ビタミンC (左旋性アスコルビ ン酸) 1cc.=1錠=0.025瓦=500 I.U. 強2cc.=0.1瓦=2000 I.U.	全	1cc. { 5管 1.65 25管 6.70 (強2cc.) { 5管 4.70 25管 20.00 (0.025) 10錠 1.50	壊血病, 腸自家 中毒治療劑 毎日 1-2cc. 筋注又は 皮注 内服 1日 3回 1錠宛
Caponol 新 カボノール	相互藥品	{ 100瓦 0.80 250瓦 1.60 500瓦 3.00	祛痰鎮咳劑 1日 3回 1-1.5瓦宛
Capisol カビゾール Capsicum のアルコール浸出液に カンフル, イヒチオール, チモー ル, カルバクロール等を配す	日生藥物 (福井七)	液 { 30cc 0.70 100cc 1.50 500cc 5.00	浸透性鎮痛消炎劑 1日 2-3回患部塗布 (ロイマチス, 關節炎, 肋膜炎)
Capremin カブレミン カンフル水溶液に Campanulaceae 植物サポニンを配す	高田製藥	液 { 100瓦 0.30 250瓦 0.60 500瓦 1.00	鎮咳吸入劑 水で3倍に稀釋して吸 入器コップ 2-3 杯吸 入す
Capsolin カプソリン 蕃椒, オレオレシン, 樟腦, テレ ピン油, カヤブテ油, クロトン油 等を主成分とする芳香軟膏	パーク デビス (三共)	チユーブ 1管 1.45	外用刺戟誘導劑 外用塗布

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Capuhormon カプホルモン (アウトホルモン製剤)	乾 卵	1.2.3.4號 各 { 5管 1.80 2cc. { 10管 3.30 50管 15.00	神経系疾患① 膵の血管硬化症② 男性々機能不全③ 女性々機能不全④ 皮注毎日又は隔日 (説明書参照)
Strychnin Capuhormon ㊟ ストリヒニン, カプホルモン (各號増強用)	全	各號 { 5管 2.70 2cc. { 10管 5.00	カプホルモンの作用を 増強せるものカプホル モンに同じ
Capyralsan ㊟ カピラルサン 特殊配合のサリ曹濃厚液	鳥 居	㊟ { 5管 1.75 10cc. { 10管 3.00 50管 12.50 ● { 10管 3.50 20cc. { 50管 15.75	神 經 痛 ロ イ マ チ ス 1日 10cc. 部注
Caracimin ㊟ カラシミン Vitamin-C	新 東方薬物	2.5% 1.1cc. { 10管 1.80 50管 8.00 5% 1.1cc. { 10管 2.95 50管 13.00 2.2cc. { 10管 5.60 50管 25.00 末 { 50瓦 1.40 250瓦 6.40 錠 { 10錠 1.50 50錠 6.50	ウイタミンC劑 毎日通常 1回皮筋注
Caranium ㊟ カラニウム	新 福井七	末 { 15瓦 1.20 30瓦 2.30 75瓦 5.30 吸入用 { 30回分 1.20 75回分 2.00	肺尖カタル 肺炎, 感冒 1日 3回 1匙宛
Carbin カルビン 香味肉汁製剤	三 共	50cc. 2.30	滋 養 劑 1回 2.0-4.0瓦

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Carbo medicinalis "Merck" 薬用炭素 Lメルク ¹ 生物學的検査を經たる強力粉末炭 素	メルク (シユ ミツト)	末 { 25瓦 1.60 50瓦 2.70 100瓦 4.45 500瓦 15.35 粒状 { 25瓦 1.45 100瓦 3.60 500瓦 13.65	下 痢 酸酵性胃腸疾患 胃アトニー 食物中毒 1乃至2食匙 1日 3回 (末, 粒共)
Carbon "Hishi" ヒシカーボン 純活性炭素	日本新薬	100瓦 2.00	尿 診 断 並 に 整 腸 劑 1回 0.3-1.0瓦
Carbon Depuratum ㊟ 三共調用炭 純植物炭	三 共	100瓦 0.65	整 腸 止 瀉 劑 1日 1-2瓦
Carbonin カーボニン 純強活性炭粉	和 光 堂	0.3 { 40錠 0.25 100錠 0.50 300錠 1.00 1000錠 2.80 粒状 { 100瓦 1.20 500瓦 5.00	整 腸 劑 1日 3回 1-2瓦 (4-7 錠) 宛
Carbon Tab. ㊟ カルボン錠 活性炭素, パラアミノ安息香酸エ チルエステル	新 大正製薬	{ 40錠 0.30 100錠 0.50 250錠 1.00 500錠 1.80 精衣 { 30錠 0.30 50錠 0.40 100錠 0.70	強 力 活 性 炭 劑
Carbosorbin カーボゾルビン 白陶土並に薬用炭末を Lタンニン ゼラチン ¹ 體にて被覆せる製剤	厚生社 (塩野義)	末 { 25瓦 0.90 100瓦 2.72	吸 着 收 斂 劑 1回 0.5-1.0
四鹽化炭素 Lタケダ ¹ ㊟㊟	武 田	液 { 30瓦 0.50 100瓦 1.50 500瓦 3.80 0.4cc. { 50球 0.60 100球 1.00	
四鹽化炭素球 Lイシカワ ¹ ㊟	丸 善 (石 川 製 藥)	0.4cc. { 50球 0.70 100球 1.30 500球 5.00	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Cardex カルデックス ペンタエリトリット・テトラニト ラート	小林 薬化学	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.60 0.1 { 100錠 1.10 50C錠 5.00	血圧下降剤 1日3回 0.1-0.3 (1-3錠)宛
Cardiazol カルチアゾール ペンタメチレンテトラゾール C ₆ H ₁₀ N ₄ (白色, 可溶性結晶粉末)	クノール (三共)	0.1 { 4錠 0.50 1C錠 2.15 5管 2.00 1cc. { 10管 3.60 0.1 { 30管 9.60 100管 27.00 5cc. 5管 6.80 内服用 (1cc.=0.1) { 10cc. 2.15 100cc. 19.55	強心剤 内服 1日数回 1回1錠 (1cc.) 注射 2-3時間 毎に1管皮注, 静注
Cardiazol-Ephedrin カルチアゾール, エフェドリン 錠1個, 滴剤 1cc. 注射 1cc. 中 { カルチアゾール 0.1 鹽酸エフェドリン 0.015	全	錠 10錠 2.20 滴剤 10cc. 2.30 1cc. 5管 2.85	気管枝喘息 治療剤 内服 1日 2-3回 1/2 -1錠 (10-20滴) 宛 注 1回 1cc. 皮注, 静 注
Cardinon カルチノン 犢の心臓ホルモン製剤 (Lacarnol 参照)	帝國臓器 (武田)	1cc. { 5管 1.30 10管 2.40 50管 11.00 (滴瓶入) 25cc. 2.70 (普通瓶入) 100cc. 9.20	狭心症, 心臓病, 胸 内苦悶, 動脈硬變 1日 1-2cc. 宛数回皮 筋, 静注 内服 1日 20-25 滴宛 数回
Carnine カルニイン 生牛肉汁 (冷製)	フユウ ムズ (東洋 カルニイン) (田邊五)	液 { 180瓦 3.00 300瓦 4.80 600瓦 8.50	補血剤 1日量 15-30瓦
Carnival カルニヴァール クレゾール硫酸カルシウム及サ ボニン含有のシロップ剤 (Kresival 参照)	大木	液 { 100cc. 1.00 500cc. 3.80	鎮咳祛痰剤 1日 5-8cc. 分3

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Carnodol カルノドール 無痛カンフル注射剤 (油溶性)	船井	10% 20% 各 1cc. { 10管 0.80 50管 3.50 100管 6.00 瓶入 { 100cc. 4.00 500cc. 16.00	強心興奮剤 1回 1cc. 皮下
カルノドール坐薬 カンフル注腸剤 (經肛強心剤)	全	大人用 { 5個 0.50 小人用 { 10個 0.90 同値 { 20個 1.70	挿入 1日 2-3個
Carter's Little Liver Pill カーター氏リットルリバーピル 一丸中 { ボドフィルム脂 0.004 精製ロカイ 0.016 吐根 0.001 蕃椒 0.0012	カ ター 社 (三共)	丸 { 40粒 0.70 140粒 1.80	純植物性下剤 3-4粒就寝時服用 翌日より1-2粒に減す
Casbis カスピス 蒼鉛オレーフ油乳劑 (1cc. 中 0.1 瓦蒼鉛含有)	バイエル	瓶 { 15cc. 3.40 100cc. 17.98 (1.5cc.) 10管 5.40	驅微剤 毎回 1.0cc. 宛筋注 (1タール15回)
カスカラ製劑			
Cascara Evaquant カスカラ, エバキユアント カスカラサグラダ皮中の無苦味有 効成分。暗褐色芳香佳味液	パー ク デ ビス (三共)	液 { 28瓦 0.60 250瓦 2.95	緩下剤 1回 10-30滴
Cascara Sagrada coated カスカラ糖衣錠 (三共製) カスカラ皮エキス製剤	三共	錠 { 100錠 0.45 500錠 1.80	緩下剤 1回 2錠 1日 3回 又は 就床前3-6錠
カスカラサグラダ糖衣錠	大日本 製薬	0.13 { 100錠 0.35 500錠 1.65 1000錠 3.15	
カスカラサグラダ糖衣錠 (赤函入)	日本薬品	0.13 { 100錠 0.38 500錠 1.75 1000錠 3.40	

品名組成	製造元	包装価格	効用用量
コメツト ¹ カスカラサグラダ糖衣錠	コメツト	ポケット型 100錠 100錠 500錠 1000錠 0.13	緩下剤 1回 6-10錠頓服 1日 3回 3-4錠宛
マルコ ¹ カスカラサグラダ糖衣錠	マルコ	50錠 0.30 100錠 0.45 500錠 1.00 1000錠 3.30 0.13	緩下剤 1回 3-6錠
Cascarin カスカリン末 カスカリン糖衣丸 カスカラサグラダ皮中の苦味成分 用法—(錠) 1回 0.25-0.75	パーク デピス (三共)	末 25瓦 0.76 100丸 1.20 500丸 5.30 0.13	緩下剤 1回 0.25瓦糖衣丸 1回 2粒
Caseosan カゼオザン 異種蛋白注射液	ハイデン (田邊五)	1cc. 10管 4.50	ロイマチス 治療剤 1-5cc. 皮注, 筋注又 は静注
Castarol カスターロール 芳香ヒマシ油 (98%)	田邊元	500瓦 1.30 處方用 25瓦 1打入 1.70	下剤 1回 25瓦
Castor Oil Capsules ヒマシ油球 柔軟膠球入ヒマシ油 (Himaol, Ricital 商標)	石川製薬	各3瓦 { 6球 0.25 100球 2.80	下剤 1回 6-10球
Cataltin カタルチン 紫葳科植物の有効成分	昭和製薬	液 500瓦 3.20 300瓦 2.20 末 500瓦 3.70	利尿剤, 腎臓病 1日 3回 3-4瓦
Catamin カタミン コロイド硫黄, 酸化亜鉛, ラノリン, クリーム	リーデル (ホルス タイン 塩野義)	チューブ { 10瓦 0.45 28瓦 0.80 55瓦 1.43	皮膚薬 患部塗布

品名組成	製造元	包装価格	効用用量
Cataroisin カタロイシン カンフル水溶液にフェノール安息 香酸ソーダを配す	道修薬学	1.2cc. { 6管 1.00 12管 1.80 60管 7.50	肩凝, 神経痛 治療剤 1cc. 筋注
Cathalax カタラックス ジアセチル・ビスパラオキシ・フ エニル・デオクソインドリン 用法—1日 0.025	三共	10% { 25瓦 1.20 末 100瓦 4.00 0.005 { 20錠 0.25 100錠 0.75	緩下剤 10%末1回 0.05-0.15 瓦 (1-3錠)
Catharin "Futaba" キヤザリン ¹ フタバ ¹ デヒドロオキシフタロフェノン (蔗糖, コーヒー調味の錠剤)	フタバ	(0.2) 20錠 0.48	緩下剤 強 1回 1-2錠 弱 1回 2-3錠
Cauretin "Limit" カウレチン ¹ リミット ¹ クロルカルシウム尿素液	一新製薬	5% 10cc. 5管 1.80 10% 10cc. 5管 2.50	尿崩症, 膀胱 強直, 夜尿症 1回 10cc. 静注
Causalz カウザルツ 林檎, 葡萄等の果實酸の鹽類にし てハロゲンを含まず (理研有機薬参照)	田邊元	末 { 70瓦 1.50 250瓦 4.80	心臓, 腎臓疾患及び之 に因する諸症に食鹽代 用として 1日 5-6瓦
C.B. Branose シービー, ブラノーゼ	三才商會	(1cc.中 Vitamin C 25mg 含有) 1cc. { 6管 1.20 60管 10.80 2cc. { 6管 2.28 60管 21.60	ビタミンB ₁ , C剤 1日 1回 1-5cc. 宛皮 下又は筋肉内注射
Cebion ツエビオン 合成 Vitamin-C (L アスコルビン 酸) (C-Tamin Ascoltin, Vitacimin, C-Ful, Ascoyl 参照)	メルク (シユ ミツト)	1cc.=0.05 (1000 I.U.) 1cc. { 10管 3.50 50管 14.80 2cc.=0.1 (2000 I.U.) 2cc. { 5管 3.50 25管 14.80 0.05 { 20錠 2.55 50錠 6.10	ビタミンC剤 1日 1-2cc. 皮, 筋, 静, 何れにても可 内服 1日 1-3錠

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Cebion "Forte" ツエビオン「強」 Vitamin-C 剤	メルク シユ ミツト	(0.5) { 3管 5.25 5cc. { 10管 16.20	ビタミンC 剤
Ceol セオール 桔梗根, 遠志, 麻黄の有効成分	東京治療	液 { 500瓦 2.40 1000瓦 3.80 末 { 100瓦 1.30 500瓦 4.50	祛痰鎮咳剤 液 1日 3回 1-1.5瓦 末 1日 3回 0.5-0.7瓦
Cephadol セフアドール グルコン酸キニーネ, ウレタン, 硝酸マグネシウム製剤	日本新薬	3cc. { 5管 1.70 10管 3.00 50管 10.00	偏頭痛, 脳膜炎, 脳溢血に因する 頭痛治療剤 1回 3cc. 静注
Cephan チエファン 一 { アミノピリン 0.025 錠 { フェナセチン 0.075 中 { プロムワレリル尿素 0.100 カフエイン 0.025	三 共	{ 10錠 0.35 100錠 2.10	頭痛, 月経痛 歯痛 剤 1回 2-4錠
Cerasin セラジン Prunus 屬植物の非サポニン 性有 効成分 (コンクは2倍濃度)	田邊五	末 { 100瓦 1.50 500瓦 5.50 液 500瓦 2.00 コンク { 100瓦 3.00 500瓦 11.00	祛痰鎮咳剤 末は 1日 2-4瓦 液は 倍量コンクは 1/2 量 淋巴腺結核には 1日末 10-15瓦
Cerebrohormon セレブロホルモン 哺乳動物の脳及脊髄組織より抽出 せるホルモン製剤	山之内 (中村瀧)	1cc. { 5管 1.50 10管 2.80	脳膜疾患, 流行 脳炎, 脊髄炎, 脳 徴 毒 毎日又は隔日 0.5-1.0 cc. 皮注
Cerolin Pillen チエロリン丸 酵母の有効成分とコレステリン, レチハン製剤	ボーリ ンゲル (三 共)	丸 100個 3.55	痛 瘡, 瘰 瘡 治 療 剤 丸 1回 1-3個 内服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
C-Ful シーフル Vitamin-C 剤	萬 有	2.5% 1.1cc. 10管 2.00 5% 2.2cc. 5管 3.50	ビタミンC 剤 1-2cc. 皮注, 静注又 は筋注
Cheiro-Pon セイロポン メタ2オキシベンゾール製剤	白井松	液 { 10瓦 0.50 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 13.50 1000瓦 25.00	水虫, 白癬, 疥癬 1日 3-4回局部塗布
Cheiropon. O.S.S. セイロポン・オー・エス・エス 砒素とゲラトローゼとの假性複合体	全	2.0cc. { 10管 2.80 50管 12.80	水虫, 陰囊疹 1日 1回 2cc. 皮注
Chemotherapin ヘモテラピン ⑤ NH ₂  SO ₂ NH ₂ P-Aminobenzolsulfonamid	同仁製薬	末 { 25瓦 2.00 100瓦 6.50 500瓦 26.00 1000瓦	④スルファミン剤 1日 3回 0.3-0.6瓦宛
Chie Ching チエチン (結精) 茄子科植物有効成分とウレアーゼ 結合体	白井松	末 { 5瓦 7.80 10瓦 15.80 25瓦 37.00 錠 { 10錠 1.30 25錠 3.00 50錠 5.50	モルヒネ, 阿片 コカイン等の 中毒緩解 1回 1-2錠重症には稀 に3錠 0.005瓦頓服注射
China-Blutose キナブルトローゼ	藤 澤	Blutose 参照	
Chinahipan キナヒパン キニーネを特殊溶媒にて可溶性と し Mannite を配合せり	植 村	1cc. { 10管 1.00 50管 4.50 2cc. { 10管 1.30 50管 5.20 5cc. 5管 1.20	解熱, 消炎剤 1回 2cc. を 1日 1-2 回皮注, 筋注, 静注
China-Polytamine キナポリタミン	武 田	Polytamin 参照	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
China-Pyraxin キナピラキシン ピラキシン, 鹽酸キニーネ, 葡萄糖製剤 (Pyraxin 参照)	新興理化学	20cc. { 5管 1.50 10管 2.60 50管 10.00	インフルエンザ, 肺炎, マラリア, ロイマチス 1日 1回 20cc. 筋注
Chinarol キナロール キニーネハルンストッフ, カフェイン	昭和新薬	3cc. 10管 3.00 1cc. 10管 1.50 (小児用)	肺炎, 流 感 扁桃腺 1日 2回 3cc. 宛皮又は筋注
Chinarol-Stark 強キナロール キニーネハルンストッフの鹽酸鹽 カフェインの10%水溶液	全	3cc. 10管 3.50	肺炎, 流 感 1回 3cc. 宛筋注
Chinaselin キナゼリン カフェイン, 鹽酸キニーネ製剤	全	1cc. { 10管 2.50 50管 12.00 2cc. { 10管 3.20 50管 15.00	流 感, 肺炎, マラリア 1回 1-2cc. 皮注
China-Thiosalcol キナチオザルコール バラチオザルコール中鹽酸キニーネ0.1%を配伍せるもの	萬有	20cc. { 5管 1.60 50管 13.00	肺炎, 流 感
Chineonal ヒネオナル ヂエチルバルピツール酸キニーネ化合物	メルク (シユミット)	末 10瓦 11.75 (0.1) 20錠 4.30 (0.2) 20錠 6.85 (0.3) 10錠 4.10	解熱, 陣痛増強剤 解熱 1日 3回 1錠宛 (0.2) 陣痛増強 1回 1-5錠(0.2)
Chineron ヒネロン エチルアポヒニン, 類白色苦味粉末 (注射液成人用10%小児用5%)	武田	10% { 6管 3.40 1.1cc. { 30管 15.80 5% { 6管 2.00 1.1cc. { 30管 9.00 末 { 5瓦 5.00 25瓦 23.50	肺炎治療剤 1晝夜に注射 1cc. 宛 5-6回皮注, 筋注 内服 1瓦を 5-6回に分服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Chinidrin ヒニドリン キニーネ, アミノピリンの結合體	コメツト	2.0cc. { 10管 2.30 50管 10.00 1.0cc. 10管 1.80	解熱, 鎮痛, 鎮痙劑 1日 1回 2.0cc. 小児 1回 0.2-0.4cc.
Chinin-Calcium "Sandoz" キニーネカルチウム「サンド」	サンド	2cc. { 3管 1.35 10管 3.95 50管 17.25 5cc. { 2管 1.20 10管 5.70 10cc. { 5管 3.30 20管 10.75	
Chinin-Calcicol ヒニンカルチコール	Calcicol 参照		
Chinisol ヒニゾール 2%硫酸液	塩野義	10cc. 5管 1.60	マラリヤ 流 感, 肺炎 1回 10cc. 筋注
Chinomaton キノマトン 鹽酸ヒドロキニーネ製剤	巖井	5% { 5管 0.85 10管 1.60 50管 6.50 10% { 5管 0.90 10管 1.70 50管 7.00	流 感, 肺炎, マラリア, 高熱疾患 1日 大人 1-3回 10% 小人 1-2回 5% 皮注, 筋注
Chinosol ヒノゾール 硫酸オルトオキシヒノリンカリウム	ヒノゾール社	末 { 10瓦 1.25 25瓦 3.00 (0.5) 10錠 0.85	防腐消毒劑 外用
Chinsedal チンセダール ヂエチルアミン, バルピタール, アミノピリン結合體	鳥居	末 { 25瓦 1.80 100瓦 6.10 500瓦 26.00 0.2 { 6錠 0.28 50錠 1.25 500錠 8.20	非アルカロイド 性鎮痛催眠劑 1回 0.4-0.6(2-3錠) 1日 3回以内
Chinseton チンセトン バルピタールとアミノピリン結合體	平田薬物	末 { 25瓦 2.20 100瓦 8.00 250瓦 16.50 500瓦 30.00	鎮痛鎮靜劑 1日量 0.5-0.6 分3頓 服量 0.3-0.4


品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Chishiho チシホ	石津作	20cc. 50管 1.50	輸血補助剤 説明書参照
Chitonal チトナル 純枸橼酸ナトリウム10%	東洋新薬	5cc. 10管 1.50 10cc. 10管 2.00 20cc. 10管 3.00	輸血及 血液注射用
Chiurenin (新) キウレニン 鹽酸キニーネ, ウレタン, カフェイン	全	小児用 { 10管 1.00 1cc. 50管 4.50 大人用 { 10管 1.30 2cc. 50管 6.00	解熱殺菌注射剤 1.0-2.0cc 筋注
Chizobin チゾービン 肝臓及脾臓有効成分製剤	吉岡 研究所	100錠 1.50	造血栄養剤 1日量 15錠 3回分服
Chloamon クロアモン クロルアンモンのゲラチン吸着體 糖衣錠	鳥居	糖衣 { 42錠 0.50 100錠 0.85 500錠 3.90 1000錠 7.50	心臓性浮腫 大人 1日 3回 6-10錠 小児 1日 3回 2-6錠宛
Chlocain (新) クローカイン テルチアリアル・トリクロールブ チルアルコール	日新化学	{ 25瓦 1.60 100瓦 5.50 500瓦 25.50	鎮靜麻痺防腐剤 内用 1回 0.2-0.5 錠 外用 2-5% 軟膏
Chlocatol クロカトール { クロールカルシウム 2% 葡萄糖 10%	東洋新薬	2)cc. { 10管 2.50 50管 11.00	強心劑 毎日 1回 1管静注
Chlodexin クロデキシン { 葡萄糖 10% クロールカルシウム 2%	日新醫學	液 { 10管 2.00 20cc. 50管 9.00	カルシウム適應症 毎日 1回 20cc. 静注
Chlonatol クロナトール 10%クロルナトリウム液	厚生社 (塩野義)	10cc { 5管 0.50 10管 0.90 30管 2.30	止血劑 3-10cc. 静注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Chlor Aethyl (新) クロールエチル (Keiene, Incisin 参照)	スバイ エール (三共)	硝子管入 { 30cc. 2.10 50cc. 2.90 100cc. 3.55 割度管入 50cc. 3.05	局所及 全身麻酔劑 局所噴霧
Chlora-Don クロラドン クロラミンを主體として其の作用 を改良せるもの	八幡屋 商店	0.5 { 12錠 0.30 100錠 2.00 300錠 5.20 末 { 50瓦 1.30 100瓦 2.20 250瓦 4.70 500瓦 8.60	殺菌消毒 含嗽吸入劑
Chloral C. P. (新) 抱水クロラール錠	パーク デビス (三共)	(0.325) 100錠 1.35	催眠鎮靜劑 1回 1-2錠
Coloramin. T. (新) クロラミン, テー バラトルオール・スルフオクロル アミンソーダ 白色結晶性粉末(有力鹽素25%) 水懸 一外用1%以下	三共	末 { 25瓦 1.05 100瓦 3.35 500瓦 14.50	消毒殺菌劑 1-2%水溶液眼科, 膠 洗滌用は 500-1000倍 生理食鹽水溶液
鹽化カルシウム製劑			
Chlor Calcium (新) (Calcium-chloratum) 鹽化カルシウム CaCl ₂ +6H ₂ O	全	粉狀 { 25瓦 0.30 500瓦 3.00	結核, 蕁麻疹, 喘息, 咯血, テ タニー, 骨軟症 内用 1日 1.0-2.0 注射 1-10%液 5-20 cc. 静注
Calcium Chloride Solution 滅菌鹽化カルシウム溶液 CaCl ₂ 溶液(%は無水として計算)	全	1% 20cc. 5管 0.60 2% { 5管 0.60 20cc. 20管 2.00 3% { 5管 0.60 20cc. 20管 2.00 5% 20cc. 5管 0.60	
「シオノ」鹽化カルシウム液	塩野義	1% 20cc. 5管 } 0.60 2% 20cc. 5管 } 3% 20cc. 5管 } 5% 20cc. 5管 } 各% 50管 5.00	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
〔タナベ〕 鹽化カルシウム	田邊五	注射用 末 { 25瓦 1.30 500瓦 9.00 1,2,3,4,5% 各 20cc. { 5管 0.50 30管 2.70	
〔萬有〕 クロールカルチウム注射液	萬有	1% { 5管 0.50 20cc. 50管 4.50 2% { 5管 0.50 20cc. 50管 4.50 3% { 5管 0.50 20cc. 50管 4.50 5% { 5管 0.50 20cc. 50管 4.50 10% 10cc. 10管 0.65	
〔フタベ〕 鹽化カルシウム注射液	フタベ	1% 20cc. 5管 0.60 2% { 5管 0.60 20cc. 50管 5.40 3% { 5管 0.60 20cc. 50管 5.40 4% 20cc. 5管 0.60 5% 20cc. 5管 0.60	
〔丸石〕 滅菌鹽化カルシウム注射液	丸石	1% 2% 3% 5% 各 20cc. { 5管 50管	
〔コメツト〕 滅菌クロールカルシウム	コメツト	1% 20cc. 5管 2% 20cc. 5管 3% 20cc. 5管 4% 20cc. 5管 5% 20cc. 5管	
粒状クロールカルチウム CaCl ₂ + 6H ₂ O	ラヂウム	粒 { 100瓦 1.00 500瓦 3.50	
細粒クロールカルチウム	全	細粒 { 100瓦 1.00 500瓦 3.50	
クロールカルチウム注射液	全	1% 2% 3% 5% 各 20cc. { 5管 0.60 30管 3.20	
Chlor Calcium (Chlocal) 〔三研〕 クロカル注射液	三菱薬品	1,2,3,4,5% 各 20cc. 5管 0.70	
〔櫻木〕 クロールカルシウム注射液	櫻木	1,2,3,5% 各 20cc. { 5管 0.70 50管 5.40 粉状 100瓦 1.00	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Chloretone クロレトーン トリクロル・テルチアリアル・ブチルアルコール (アセトンクロホルム) (CH ₃) ₂ (CCl ₃)=C-OH 白色結晶性粉末 〔三共〕 外用 1%	三共	末 { 15瓦 1.30 30瓦 2.40 (0.1) 50球 1.45	鎮痛鎮吐防腐劑 内用 1回 0.2-1.0 (悪心、胃痛、船暈) 外用 5-10%軟膏又は 撒布劑として (外傷、潰瘍面) 點眼 0.5%液
Chlor Natrium 〔三共〕 純クロールナトリウム	全	末 { 30瓦 0.42 100瓦 0.90 500瓦 2.50	
Chlor Natrium (Chlonal) 〔三研〕 クロナール NaCl 10%液	三菱薬品	10cc. { 5管 0.55 10管 1.00	咯血、子宮内出血、 衄血各種内出血 5-10cc. 靜注
〔三研〕 生理的食鹽水 NaCl 0.85%	全	300cc. 1管 0.80 500cc. 1管 1.00	出血に因する 急性貧血 心臟衰弱 虚脱 疫痢、コレラ等
〔萬有〕 生理的食鹽水	萬有	300cc. 1管 0.55 500cc. 1管 0.60	靜注
〔タナベ〕 食鹽水	田邊五	0.4% { 20cc. 5管 0.50 30cc. 5管 0.55 10% 10cc. 10管 0.75	
〔タナベ〕 生理的食鹽水 NaCl 0.85%	全	30cc. 5管 0.55 300cc. 0.75 500cc. 0.90	
〔シオノ〕 クロールナトリウム液	塩野義	10cc. { 5管 0.50 10管 0.90	
〔櫻木〕 生理的食鹽水	櫻木	100cc. 0.40 300cc. 0.80 500cc. 1.00	
Chloroform "Anschuetz" クロロホルム 〔アンシュツツ〕	バイエル	液 { 50瓦 1.87 450瓦 10.72	全身麻酔劑 吸入 1回 10-30瓦

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Chloroform for Anaesthesia 麻醉用クロロホルム H-CCl ₃	パーク デビス (三共)	30瓦 2.65	
Chloroformium Pro. narcoti 麻醉用クロロホルム	大日本 製薬	30瓦 5管 4.00	
Chlorophyll Ishimoto 「石本」葉緑素	石本活生	10瓦 2.00 50瓦 8.00 100瓦 14.00 250瓦 30.00 500瓦 50.00 1000瓦 80.00	出血性疾患 各種貧血 日 3回 0.1-0.3瓦宛
Chlotomin クロトミン アセトンクロロホルム 寛評—外用 1% (Chloretone 参照)	吉 萬	10瓦 0.70 500瓦 20.50	鎮痛鎮吐防腐劑 鎮痛に内用 1回 0.25 —1.0 外用 5-10%
Choleretin コレレチン デヒドロ・ヒヨール酸ナトリウム C ₂₀ H ₃₃ (CO) ₃ COO Na の20%溶液 (Decholan 参照)	大日本 製薬	5cc. { 3管 2.60 10管 7.00 10cc. { 3管 4.50 10管 12.00	膽石, 黄疸, ネ フローゼ, 浮腫 5-10-15cc. 毎日又 は隔日静注
Choleval シヨレバル 胆汁酸ナトリウムと膠状銀化合物 (Choregol 参照)	メルク (シユ) (ミツ)	10瓦 3.75 25瓦 8.90 100瓦 34.50 (0.1) 10cc. 3管 3.20 (0.2) 10cc. 3管 3.50 (0.25) 10錠 2.20 (0.5) 10錠 3.05 膠錠 20個 2.40	治 淋 劑 1-3%液洗滌 10cc. 靜 注
Chologen コロゲン ポドフィルリン及び甘汞製劑	ローゼン ベルグ (塩野義)	1號 100錠 } 2號 100錠 } 各 4.20 3號 100錠 }	膽石症治療劑 日 2回 1-2錠 (説明書参照)





品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Chophytol "Rosa" コフイトール「ロザ」 Artichaut (Cynara Scolymus) 葉 の液汁を浄化し、蛋白を除き力價 を一定せるもの	佛國ロザ ー化学 (東カルニイ)	5cc. 12管 6.50 (0.2) 60錠 3.30	肝臓疾患治療劑 1回 5cc. 靜注又は皮注 12-24回 内服一日 6-12錠分3
Choregol ヒヨレゴール 胆汁酸ナトリウムを保護コロイド とせるコロイド銀 (Choleval 参照)	友 田	25瓦 3.90	治淋注入劑 0.25-1.0 %の溶液尿 道注入
Chromercin (新) (新) クロマーシン ㊞ マーキユクロローム	大日本 製薬	末 { 10瓦 1.70 25瓦 3.80 100瓦 13.50	殺菌消毒劑 皮膚面-2% 創面-1-3% 洗滌-0.5-2%
Chrysemine クリセミン (液) (丸) 白花除蟲菊の有効成分ピレトリン 製劑	カルトン (東カルニイ)	(液) 10cc. 3.60 (丸) 24球 4.00	驅蟲劑 大人-3-5丸 小兒-10-40滴
Chylin ヒリン リポイド蛋白製劑	鳥 居	0.6cc. { 10管 3.00 50管 13.50 1.2cc. { 6管 3.00 50管 21.00 2.2cc. { 6管 5.20 50管 34.50	結核, ロイマチス 0.5-2.0cc. 皮注又は 筋注
Cibalbumin "Ciba" チバルブミン「チバ」 1%の動物性蛋白質水溶液, 非特異 性蛋白體療法劑	チバ (バー ゼル)	2.3cc. 10管 4.50	關節炎, ロイマ チス, 尿道 炎 2-6-10cc. 皮, 筋又 は靜注
Ciba-algin "Ciba" (新) チバアルギン「チバ」 チアルリルバルピツール酸・チメ チル・アミノフェノール・チメチ ル・ピラツオロン	全	2.3cc. 5管 3.25 0.25 { 15錠 1.45 100錠 7.15 15cc. 3.25	頭痛齒痛, X線 カーター, 船暈 日 1-3回 1錠(1cc.) 内服 注射 日 1-2回 2cc. 筋注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Cignolin チグノリン デオキシアントラノール・クリサ ロビンより作用強く刺激性弱し	バイエル	末 10瓦 5.75	皮膚薬(乾癬, 寄生性皮膚疾患) 0.5-2%溶液, 油剤, 軟膏として局所塗布
Citmillon チトミロン 酸乳	大一栄養	250瓦 1.60	母乳代用 13%溶液として乳児に與ふ
Citnatin チトナチン クエン酸ソーダ10%液	ラヂウム	5cc. 5管 0.85 10cc. 5管 1.00 20cc. 5管 1.20 50cc. 2管 1.00	輸血剤, 止血剤 血液100cc. に對し本液4cc. を加へて輸血す。止血用 10-20cc. 靜注
Citobaryum チトバリウム 香味を附せる硫酸バリウム製劑 (micabarium 参照)	メルク (シユ ミツト)	内服用 { 150瓦 2.25 2瓦 16.25 注服用 { 200瓦 2.35 2瓦 16.25	消化管造影劑 内用 1回 150瓦 注用 1回 200瓦
Citoronal チトロナール 10-20%クエン酸ソーダ 2(Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇) + 11H ₂ O 溶液	三菱薬品	10% { 10cc. 5管 1.00 20cc. 5管 1.20 20% { 10cc. 5管 0.90 10cc. 10管 1.70	止血兼 輸血補助劑 止血=2%液10cc. 靜注 輸血=血液の 1/10- 1/20を加ふ
チトロナール A 赤血球沈降反應用 3.8%液	全	チトロナール A 3.8% 1cc. 10管 0.75	
Citoral チトラール (輸血用) クエン酸ソーダ溶液(10%)	山之内 (中村瀧)	{ 2cc. 5管 1.00 5cc. 3管 1.20 10cc. 3管 1.80 20cc. 3管 2.20	輸血, 血液注射用 血液の10-20%のチトラールを混和し輸血は靜脈, 血液注射時靜注
同 (赤沈反應用) 赤血球沈降速度測定用 3.8% クエン酸ソーダ液		3.8% { 12管 0.75 1cc. 100管 5.50	0.4cc. に靜脈血1.6cc. を加へ所定の方法により測定す
Citorium チトリウム クエン酸ソーダ10%液	日新醫學	10cc. { 10管 1.50 50管 7.00	輸血, 血液注射用 輸血は靜注 血液注射時靜注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Citronal チトロナール クエン酸ソーダ	福井七	10% { 10cc. 5管 1.00 20cc. 5管 1.20 20% { 5管 0.90 10cc. 10管 1.70	輸血用止血劑 3.8% 10×10cc. 75
Citronema シトロネマ 重枸橼酸マグネシウム10%	東洋カル ニイン	ガラス瓶(顆粒) 約120瓦 5.80	中風, 高血壓 豫防及治療 大人 1日 茶匙 2-3杯 小兒 茶匙 1-2杯
Citsol チトゾール クエン酸ソーダ10%液	植村	10% { 2cc. 5管 0.70 5cc. 5管 0.90 10cc. 5管 1.00 20cc. 5管 1.10	止血劑 10-20cc. 靜注
C-Korbin シーコルビン 強=2cc. 中にL.アスコルビン酸 0.1瓦 弱=2cc. 中にL.アスコルビン酸 0.025瓦	小野市	強 2cc. { 5管 5.00 10管 9.00 50管 45.00 弱 2cc. { 5管 1.60 10管 2.90 50管 12.65	ビタミンC劑 皮注又は筋注, 靜注
Clauden クラウデン 臓器性止血劑(肺組織抽出液) (Fibrogen, Thrombogen, Thrombriu 参 照)	ルイト ポルド (武田)	10cc. { 2管 3.10 5管 6.90 2.5cc. 5管 3.70 末 0.5瓦 3瓶 3.60 0.25 { 10錠 2.35 20錠 3.80 50錠 8.30	止血劑 1回 5-10cc. 皮注, 靜注 内服 10cc. 宛 1日 1-3回
Clavipurin "Gehe" クラビプリン _L ゲーヘ ₇ 麥角總有效成分	ゲーヘ (中外 新薬)	1.1cc. 6管 2.95 内服用 10cc. 1.75 12錠 0.90	止血劑 0.5-1.0cc. 靜注 内服 1日 1.5cc. (6錠)
Clupeol クルペオール Clupea 族魚類動物タール 特異の臭氣を有する褐色軟稠體水 に不溶, 有機溶劑に可溶	三星 (鳥居 白井松)	原液 { 25瓦 0.55 100瓦 1.35 500瓦 5.25 7% { 25瓦 0.50 100瓦 1.20 軟膏 { 500瓦 4.50	皮膚薬 原液塗布又は10%軟膏

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Clupeol-Salbe 新 クルペオール軟膏 7%クルペオール 硼酸亜鉛華軟膏	三星薬品	軟膏 { 5瓦 0.15 25瓦 0.50 100瓦 1.20 500瓦 4.50	各種慢性皮膚疾患
Cnidium クニヂウム クニヂウムの宿根より得たる揮発油にセンナ葉及ミグレニンを配す	富松	0.18 { 20錠 0.30 40錠 0.50 90錠 1.00 200錠 2.00 320錠 3.00 550錠 5.00	神経衰弱, 不眠症 頭痛, 心悸亢進 1日3回 5錠宛 毎食後直ちに
Coablutin コアブルチン Pinaceae に属する植物の揮発成分と特殊含水炭素より成る	前田製薬	0.15 { 60錠 1.00 130錠 2.00 300錠 3.00 500錠 4.30 1000錠 7.70 50瓦 2.50 100瓦 5.00 顆粒 { 150瓦 7.00 500瓦 20.00	内服止血剤 1日3回 毎食後 1.5瓦 (10錠)宛
Coagrot コアグロート 特殊イオン濃度を有するコンゴロート溶液 (血液中のフィブリノーゲンを増加せしむることにより, 血液の凝固時間を著しく短縮す)	日本新薬	1% { 5管 2.00 10管 3.70 10cc. { 50管 16.00	色素性止血剤 咯血, 吐血, 子宮出血, 膀胱出血等に對して 1回 10-20cc. 静注
Coagulen "Ciba" コアグレール [チバ] 血液リポイドを含有する, 血液凝固促進物質製剤	チバ (パゼル)	3%液 { 1管 2.30 20cc. { 12管 22.50 5管 3.90 5cc. { 20管 13.50 5管 2.30 1.5cc. { 20管 7.80 末 { 2.5瓦 3.10 5.0瓦 5.60	止血剤 内服 1-3瓦 局所 1-3%液 皮注 5-20cc.
コカイン製剤			
Cocain Hydrochlor ㊦ [三共] 鹽酸コカイン	三共	1% 1cc. { 6管 0.42 50管 2.90	局所麻醉剤 1回 1-2cc. 皮注

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
㊦ 鹽酸コカイン注射液 ㊦	大日本製薬	1% 1cc. { 5管 0.26 1打 2.60 2% 1cc. { 5管 0.30 1打 3.00	
[三研] コカイン注射液 ㊦ KCl の適量を配す	三菱薬品	1% 1cc. { 5管 0.35 10管 0.70 2% 1cc. { 5管 0.40 10管 0.80	
[フタバ] 鹽酸コカイン注射液 ㊦	フタバ	2% 1cc. 5管 0.40	
Codenal Atropin ㊦ コデナル, アトロピン { 磷酸チヒドロコデイン 1% 硫酸アトロピン 0.03%	小林薬化学	1cc. { 5管 0.90 10管 1.70 50管 8.00	鎮咳剤 1日1-2回 1cc. 發作時又は就床前皮注
肝油製剤			
Takahashi's cod liver oil 高橋氏改良肝油 遊離脂肪酸に富む精製肝油	三共	500瓦 1.60	下田式純肝油参照
ビリケン印純良肝油球 ㊦	日本薬品	0.5 { 100球 0.65 200球 1.25 300球 1.90 500球 2.85	
イシカワ肝油	丸善 (石川)	液 { 100瓦 0.60 250瓦 1.20 500瓦 1.80 5肝 14.00	
イシカワ肝油球	全	大人用 { 50球 0.35 100球 0.60 0.5 { 200球 1.10 300球 1.55 500球 2.50 1000球 4.80 小児用 { 50球 0.30 100球 0.55 0.3 { 200球 1.00 300球 1.40 500球 2.15 1000球 4.10	

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
キニーネ肝油球	丸善 (石川)	大人用 { 50球 0.55 100球 1.05 200球 2.00 500球 4.00 小児用 { 50球 0.60 100球 1.00 200球 2.00 500球 4.50	
ヨード肝油球	全	大人用 { 50球 0.55 100球 1.05 200球 2.00 500球 4.50 小児用 { 50球 0.50 100球 0.95 500球 4.00	
グアヤコール肝油球	全	大人用 { 50球 0.55 100球 1.05 200球 2.00 500球 4.50 小児用 { 50球 0.50 100球 0.90 500球 4.00	
Coffeminal Compositum ㊟ コフエミナル複方錠 カフェイン、ルミナル製剤	バイエル	10錠 4.75	船暈、航空病 豫防治療剤 豫防—出発前3錠 旅中—1日3—4錠食前 分服
Cofmin "Comet" ㊟ コフミン「コメット」 桔梗、麻黄、デキストローゼ、メ ントール含有甘味製剤	コメット	液 { 50瓦 0.35 500瓦 2.00 1000瓦 3.80 末 500瓦 3.00	祛痰鎮咳剤 液 1日 3—5cc. 末 1日 1.0—3.0 3回 分服
Cohutagin コフタギン 車前草有効成分製剤	井上 一誠堂	末 { 25瓦 0.40 100瓦 1.20 500瓦 5.50 1000瓦 10.00 5疔 45.00 液 { 100瓦 0.60 500瓦 2.80 1疔 5.00	鎮咳祛痰剤 1日 1—3瓦
ネオ、コフタギン液		液 { 100錠 0.85 500瓦 1.80 1疔 3.30	

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Coicolacmin コイコラクミン 薏苡仁有効成分製剤	三共	種衣 { 100錠 1.00 250錠 2.00	疣贅除去剤 日 3回 1—4錠宛
Coilactin コイラクチン コイクス屬及二三の植物成分。乳 腺に特殊親和力を有す蛋白質を 含有す	ラヂウム	末 { 30瓦 1.80 100瓦 5.50 450瓦 22.50 (0.25) 100錠 2.00	乳汁分泌催進 日 3瓦 3回分服
Coincoba コインコパー 5%の麻酔用エーテルを含む乳劑	小林 薬化学	10cc. { 5管 1.00 10管 1.80 50管 8.00 15cc. { 5管 1.22 10管 2.15 50管 9.60	百日咳注腸剤 5—15cc. 注腸
Coli-Yatren コリヤトレン		Yatren 参照	
Collargen ㊟ コラルゲン コロイド銀	圓城商店	小葉片 { 25瓦 500瓦 軟膏 { 25瓦 0.49 250瓦 3.30 500瓦 6.43	殺菌消毒剤 外用
(Liquor) Cologol コロ液 (コロゴール) コロイド銀及炭素とプロテインの 結合體	阿久津	液 { 20cc. 0.30 50cc. 0.60 250cc. 2.50 500cc. 4.50	消炎剤 外用
コロ尿 (尿道坐薬)	全	コロ尿 { 10本 0.50 22本 1.00	淋疾に挿入
コロ球 (陰球)	全	コロ球 { 4球 0.50 10球 1.00 100球 3.00	白帯下、内膜炎に挿入
コロザー (肛門坐薬)	全	コロザー { 6個 0.60 12個 1.00 100個 3.00	痔疾各種に肛門挿入

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
ネオコロ液 尿道注入用コロ液改良剤	阿久津	20回用 1.00 50回用 2.00	淋疾に
コロ注 ネオコロ液と注入器セット	全	A 1.50 B 3.00	同
ニヨーク コロゴール尿道クリーム	全	20回分 1.20	淋疾に尿道塗布
Combs コムブス 亜鉛華, 硫黄, スルホ石炭酸, 亜鉛, 明礬及びアクリジン色素軟膏	三共	25瓦 0.80 100瓦 1.95 500瓦 7.20	火傷日焼け 豫防剤 患部塗布
Comenin コメニン トリクロールエチルウレタンとアミノピリンの分子結合体 Ⓢ(錠), 頓服0.5以下 (Compral 参照)	第一製薬	10瓦 1.20 25瓦 2.50 100瓦 9.00 500瓦 40.00 (0.15瓦) 10錠 0.40 30錠 1.00 100錠 2.50	鎮痛剤 1回 0.5-0.6 頓服 1.0-1.5瓦 1日 1-2回分服 (頭痛, 齒痛, 神経痛)
"Comet" Diastase 「コメット」チアスターゼ 純チアスターゼ (錠は重曹を配し糖衣せり)	コメット	25瓦 0.85 225瓦 6.00 450瓦 10.00 100錠 0.60 200錠 1.00 1000錠 4.50 (糖衣) 0.2	澱粉消化剤 1回 0.2-0.6瓦 (2-3錠) 1日 3回
"Comet" Calcium 「コメット」カルシウム錠 乳酸カルシウム製剤	全	200錠 0.76 500錠 1.40 1000錠 2.60 0.1	カルシウム剤 1日 3回 3-5錠宛
Comet-Pank コメットパンク 純パンクレアチン(非引濕性)	全	25瓦 225瓦 450瓦 末	蛋白消化剤 1回 0.1-0.5瓦
"Comet" Glucose 「コメット」純葡萄糖注射液	全	Glucose 参照	
"Comet" Malz-extract 「コメット」マルツエキス	全	Malt-extract 参照	

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
"Comet"-Plaster 「コメット」絆創膏	コメット	絆創膏参照	
Comphormon コムホルモン (男子用)(女子用) 男子用は睾丸, 攝護腺, 女子用は卵巣及濾胞及び内分泌各臓器の聯合ホルモン製剤	日本薬品洋行	コムホルモン } 各 コムバリモン } コムジスモン } 末 { 30瓦 3.20 100瓦 9.50 250瓦 22.50 0.2 { 60錠 2.50 180錠 7.00 2cc. { 5管 5.00 10管 9.00 50管 30.00 100管 55.00	生殖器障碍 神経衰弱 1回 2cc. 皮下 内服 1回 0.5-1.0 (2-3錠) 宛 1日 3回
Comvarimon コムバリモン 卵巣黄體中の水溶性ホルモンと前葉ホルモン製剤	日本薬品洋行	2cc. { 5管 5.00 10管 9.00 50管 30.00 100管 55.00	月経催進剤 末 1回 0.5-1.0 錠 3-6個 1日 3回 注 1回 2cc. 腎筋
Comsismon コムジスモン 卵巣黄體中のアルコール溶性ホルモンと前葉ホルモンの聯合体			月経制止剤 末 1回 0.5-1.0 錠 3-6個 1日 3回 注 1回 2cc. 腎筋注
Compral コムブラール トリクロールエチルウレタンとピラミドンの結合体 Ⓢ(錠), 頓服1回0.5以下 (C. menin 参照)	バイエル	25瓦 3.74 100瓦 14.15 500瓦 53.30 1キロ 101.00 (0.5) 10錠 1.58 (0.15) 30錠 1.20	頭痛, 耳痛, 齒痛 腰痛, 鎮痛剤 1日 2-3回 0.5-1.0 瓦宛
Conamor コナモール Natr. boro aluminum mercuri cyanat tartrat. 白色樹枝状結晶, 水に易溶	福井七	10瓦 2.50 20瓦 4.50 末	尿道注入洗滌剤 0.1-0.5%の水溶液を なし使用する
Conglin ゴングリン 邦産茄科植物抽出剤を主成分とするクリーム剤 Ⓢ(膏)	マルコ	10瓦 0.35 25瓦 0.65 50瓦 1.10 250瓦 4.50 500瓦 8.80 1キロ 13.00 クリ	凍傷剤 1日 1-2回塗布

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Contralgin-Pasta (商標) コントラルギン pasta バントカイン (2%) ソルプロール 含有の無脂肪性 pasta	バイエル	錫管 10瓦 2.95	口腔粘膜及歯齦 表面麻酔消毒剤 局所塗擦
Contsussin コンツツシン エチルエーテル杏仁油、オレーフ 油合剤	東洋新薬	1cc. { 10管 1.30 50管 6.00	百日咳治療剤 2歳以下 0.6-2cc. 3 歳以下 1-3cc. 皮注、 筋注
Convalon (商標) コンヴァロン 鈴蘭配糖體コンヴァーリン及コン ヴァラマリン製剤	友田	1.1cc. { 6管 0.75 末 25瓦 1.00	強心剤 1回 0.5-2.0cc. 皮注、静注 1日 1.5- 4.0cc.迄 内服 1日 0.5-2.0 1 日 1.5-4.5迄
Coramin "Ciba" (商標) コラミン「チバ」 ピリヂン・ベータカルボン酸・チエ ナルアミドの25%水溶液 (Coruidin, Kiosin, Nicolumin, Reformin, Vitacardin 参照)	チバ (ゼー)	1.1cc. { 5管 2.10 20管 6.85 50管 15.00 100管 26.50 内服用 { 15cc. 2.10 100cc. 10.00 救急用 500cc. 43.00 5.5cc. { 3管 2.40 12管 7.65	強心呼吸強盛剤 1回 1-3筒皮注 内服 1-2cc. 救急 5-15cc. 静注又 は筋注
Calcio-Coramin カルシオ、コラミン コラミン、2分子とロダンカルシ ウム1分子より成る白色粉末	全	0.4 { 6錠 0.80 20錠 2.10 250錠 18.00	祛痰作用顯著なる 強心呼吸強盛剤 1日 3回 1-2錠宛
Corigen コリゲン 特殊可溶性澱粉にビタミンB及 アミノ酸を配した甘味帯黄色の粉 末	武田	500瓦 0.95	栄養剤を兼たる 賦形薬 乳糖に做ふ
Cornidin (商標) コルニヂン ピリヂン・ベータカルボン酸・チ エナルアミドの25%水溶液	塩野義	25% { 5管 1.00 10管 1.90 50管 8.50 100管 16.00 1cc. { 10管 5.20 5cc. { 10管 5.20 10cc. 1.20 液 { 100cc. 8.50 500cc. 40.00	強心、呼吸中枢 興奮剤 1回 1-2cc. 皮注、筋 注、静注 液 1日 2-3回 1-2cc. 宛内服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Corn-Ex コルンエキス 米の内皮膜、胚芽及糊粉層より水 製法により製せる Vitamin-B 剤に 有機性燐燐を含有せしむ	三星 (鳥居 白井松)	液 { 100瓦 0.80 180瓦 1.40 400瓦 2.50 1キロ 5.50 末 { 50瓦 1.20 100瓦 2.30 250瓦 5.00 500瓦 9.50 錠 { 200錠 1.50 500錠 3.50	ビタミンB剤 1日量液 20-30瓦 末 6瓦、錠 24錠
Neo-neo-corn ネオ、ネオ、コルン 注射用 (無痛性) (醫家調劑専用には Mitsuboshi V.B. 参照)	全	1cc. { 6管 0.80 50管 5.00 2cc. { 6管 1.10 50管 7.00 3cc. { 6管 1.40 50管 9.00 5cc. { 6管 1.80 50管 12.00	注射 1-5cc. 皮注
Corpora Lutea コルポラルテア 流動黄体越幾斯 注射用卵巣黄体製剤	パーク デビス (三共)	1cc.=エキス 0.02 1cc. 6管 6.50	機能的月經閉止 月經過少 閉止期障害 1回 1.0cc. 皮注
Corpora Lutea Desicated 乾燥卵巣黄体露 牛及豚の黄体より製出1球は新鮮 黄体 1.95 瓦に相当 (無黄体乾燥卵巣實質 Ovarian Residue 参 照)	全	(0.352) 100個 46.30	月經障害、不妊症 1日 1回 1個
Corpus Luteum Tab. コープスルテウム錠 卵巣黄体ホルモン	マルホ	(0.3瓦) 50錠 12.00	月經痛、月經過 多、子宮出血 1日 3回 1回 1-3錠
Cortidyn (新) コルチヂン 副腎皮質の濃厚エキス (アドレナ リン不含) 1cc.=5単位 C.M.E.	ホール スタイン	1.1cc. 3管 14.70 5cc. 10管 75.50 錠 50錠 17.60	内分泌障害 アヂソン氏病 バセドウ氏病 妊娠嘔吐 毎日又は隔日 1-2cc. 筋注或は皮注アヂソン 氏病には毎日 5cc. 錠 は1日 3回 1-2錠

品名組成	製造元 送元 送元	包装価格	醫効用量
Coryfin Bonbon コリフィンボンボン コリフィン (アセチルグリコール酸メントールエステル) 含有ボンボン	バイエル	約 25個 0.50 約 75個 1.20	口腔, 咽喉疾患 鎮咳剤 1日数回 1個宛口内に溶解せしむ
Cosmol コスモール オキシチアン水銀軟膏	櫻木	10瓦 0.20 同 1打 2.00 コンパクト付 10瓦 0.40 容器入 同 1打 4.00 500瓦 5.00	花柳病豫防薬 事前事後塗布
Cotarnin Gelatin コタルニン, ゼラチン 鹽酸コタルニンとゼラチン	昭和新薬	10cc. 2管 1.50 20cc. 2管 2.00	内臓止血剤 1回 10-20cc. を体温にてこかし胸部, 肩胛間部, 臀部に注射
Cotarmon コタルモン 鹽酸ヒドロコタルニン 0.161% ノイエシン 0.8% 鹽酸プロカイン 0.5%	三星製薬	1.1cc. { 10管 1.60 50管 7.00	鎮痛, 鎮靜 鎮咳剤 1回 0.5-1.0cc. 皮注
Cough Bonbon 咳止ボンボン 植物エキス性鎮咳剤含有のボンボン	和光堂	{ 25個 0.30 70個 0.60 140個 1.00	鎮咳剤 1回 1-2錠 1日数回
Cough Syrup コフシロツブ サポニン, テルペン類, グリコシード, アルカロイド性物質の合理的複合剤	柳韓	液 { 120cc. 0.90 475cc. 1.95 1900cc. 7.20 3785cc. 13.25	鎮咳祛痰剤 1日 3回 4-8cc 宛水に稀釋して用ふ
Coughtin カウフチン 桔梗, 麻黄の有効成分	昭和新薬	液 500瓦 4.00 末 { 250瓦 2.80 500瓦 5.00	祛痰鎮咳剤 1日 3回 1-1.5瓦

品名組成	製造元 送元 送元	包装価格	醫効用量
Cow-Rect-A コレクト, エー 國産粉末牛酪乳 (新鮮牛乳に乳酸菌を純粹培養して製す) (Eledon, Edeeweiss B.M. 参照)	大榮養品	(200瓦 1.70 末 { 400瓦 3.00	乳兒栄養止瀉劑 1日 5-20瓦 5-10%液と混合して乳兒軟便消化不良
Creosote (S.C.P.) クレオソート糖衣錠	パークデビス (三共)	パークデビス製 (0.025) 500錠 2.30 (0.05) 500錠 2.75 三共製 0.025 { 100錠 0.40 500錠 1.20 0.05 { 100錠 0.45 500錠 1.65	結核治療 傳染性消化器疾患豫防剤 1日量 6-30個
Creosote Pill クレオソート丸	大日本製薬	0.05 { 100丸 0.20 500丸 0.60 1000丸 1.10 糖衣 0.025 { 100丸 0.26 500丸 0.75 1000丸 1.40	結核治療 傳染性消化器疾患豫防剤 1日 6-30丸 分服漸時増量
Crimag クリマク マグネシウムミルク	賣 六大製薬	360cc. 1.20	制酸緩下剤 1回 1-4茶匙
Cresol Compound 複方クレゾール オルト, メタ, パラの同質異性クレゾール混合體	新 柳韓	475cc. 3.30 1.900cc. 11.70 3.785cc. 22.00	殺菌消毒防腐剤 0.5-1%溶液を與ふ
Cruculon クルクロン 鬱金草の有効成分	新 武田	100瓦 2.00 500瓦 8.50	カタル性黄疸 膽囊炎 1日 5-7瓦分 3食後
Cryptal クリプタール 邦産松柏科植物揮發油90%, カワカワ樹脂5%, サリチル酸フェニル5%含有の油剤	全	液 { 25瓦 0.90 100瓦 3.35 250瓦 7.00 500瓦 13.00 0.3 { 50球 1.50 200球 4.20	治淋剤 1日液剤 1.5-2.0(5-7球)食後分服 1日量 5瓦迄増量し得

品名組成	製造元 登録商標	包装価格	医効用量
Cryogenine クリオゲニン フェニル・セミカルバチド、難 溶、微苦味、白色粉末	ルミ エル社 (鳥居)	末 { 25瓦 6.80 50瓦 13.00 (0.5) 10錠 2.75 (0.25) 10錠 1.65	解熱鎮痛剤 1日 0.5-1.5分3
Crys-barium クリスバリウム 硫酸バリウム (Micabarium 参照)	新良貴 ミカサ (商會)	{ 200瓦 0.80 500瓦 1.70 2錠 6.00 6錠 17.00	レントゲン 造影剤 注腸、内服兼用
Crysofan ㉑ クリゾファン ナトリウム・アウロチオズルファ ート	萬有	1號 0.025瓦 0.70 2號 0.050瓦 1.00 3號 0.075瓦 1.50 4號 0.100瓦 2.00 5號 0.125瓦 2.50	肺結核注射剤 1週 1回 0.025-0.125 cc. 無菌蒸留水に溶解 静注
C-Tamin シータミン Vitamin-C (左旋性アスコルビン 酸の中性ナトリウム鹽) Ph 6.8 特 殊安定を施す Ledoxon, Cantan, Cebion, Ascoltin, C-Ful, (Viton), Ascoyl (Lactovitou) 参照	日本新薬	1cc.=500単位 5管 1.20 10管 2.10 50管 9.00 2cc.=2,000単位 5管 3.50 10管 6.20 50管 27.00 (弱)	ビタミンC 剤 1日 1-2回 1-2cc.皮 注又は筋注 (壊血病、各種出血性 疾患、各種貧血、栄養 不良、デフテリア、白 日咳、糖尿病、高血圧、 結核患者のV.C補給)
Cuperon ㉑ クペロン トリクロールブチル・マロン酸銅 含有の軟膏 (Tracmin 参照)	吉萬 (塩野義)	5% 10% 各 { 25瓦 0.70 500瓦 11.50	トラホーム 治療剤 擦入
Cuprex ㉑ クプレツキス 有機銅鹽の有機溶剤溶液	メルク (シユ) (ミツト)	液 { 25cc. 1.25 50cc. 1.75 100cc. 3.05 200cc. 4.30 500cc. 8.55 1000cc. 15.50	毛髪驅蟲剤 25-50cc. 毛髪塗擦後 石鹼にて洗ふ

品名組成	製造元 登録商標	包装価格	医効用量
Cura ㉑ キューラ 胃、腸、膵臓ホルモン、酵素、ウイ タミン、グルタチオン製剤 (淡黄 色甘味粉末)	栄養化学 (鳥居)	末 { 30瓦 0.85 100瓦 2.20 250瓦 4.80 500瓦 8.00	栄養消化剤 1回 0.5瓦 1日 3回 毎 食後
Cycloform チクロフォルム パラアミノ・ベンツオイル、イソプ チルエステル	バイエル	末 { 10瓦 品 25瓦 切	難溶性局所 麻酔剤 粉末のまま又は軟膏と して
Cystagen チスタゲン アミノエチルスルホン酸とホモチ スタン製剤	順天堂 (田邊五 田邊元)	5cc. { 5管 2.50 10管 4.80	血圧低下剤 毎日又は隔日 5cc. 皮 注又は静注
Cystol チストール スルフォサリチル酸ヘキサメチレ ンテトラミンのナトリウム鹽、無 臭、白色粉末 ㉑ ㉑ 1日 1.0-1.5	武田	末 { 25瓦 1.25 100瓦 4.30 500瓦 17.80	膀胱炎、尿道炎 淋疾治療剤 1日 1.5-3.0瓦分3
Neo-Cystol ネオチストール チストールにウロトロピンを配合 せる注射剤	全	5cc. 5管 1.60 10cc. 5管 1.90 20cc. 5管 2.20	腎盂炎、膀胱炎 毎日又は隔日 5-10cc. 静注
Cystopurin チストプリン ウロトロピンと醋酸ナトリウムの 複鹽	ウール フイグ (謙信 洋行)	(1.0) 20錠 2.00	尿路防腐、利尿剤 1日 3回 1-3錠宛水に 溶し内服 (淋疾、膀胱炎)

C

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
------	------------	------	------

神経痛・ロイマチス治療剤



カルチファン



CALCIPHAN

112

D

D

品名組成	製造元 発売元	包装価格	医効用量
------	------------	------	------

Dadogen

ダドーゲン

dアラニン
 グルタミン酸
 グルタミン酸ソーダ
 硫酸マグネシア

の複鹽(針状結晶)の20%水溶液

◇
 日本新薬

20cc. { 5管 2.80
 10管 5.20
 50管 21.50

消化管運動並
 分泌促進剤
 (注射用下剤)

毎日又は隔日1回20cc.
 靜注
 (腸石、膽囊炎、カタル
 性黄疽、胃アトニー、
 膽鼓、慢、性便秘)

Daiars

ダイアース

抱水珪酸アルミニウム鹽と非晶
 質珪酸との複合物

東京治療

末 { 500瓦 1.20
 2500瓦 4.20
 5000瓦 7.50

吸着新剤

Daikyo Capsulae VitaminA

大京¹ ヴイタミンA球

肝油、炭酸クレオソート、薄荷油、
 丁香油

大京

球 { 50球入 1.10
 100球入 1.90
 300球入 4.90
 500球入 9.80
 1,000球入 18.00

滋養強壯剤

1回5球 1日3回

Daikyo Vitamin C

Injektion

大京¹ ヴイタミンC注射液

L-アスコルビン酸

全

3% { 5管 1.40
 1cc. { 10管 2.00
 50管 12.00
 5% { 5管 3.50
 2cc. { 10管 6.20
 50管 27.00

ビタミンC剤

毎日1cc. 宛靜注又は
 筋注

Daitocamin

ダイトカミン

キノフエンナトリウム、アミノピ
 リン、サリチル酸ソーダ製剤

大東化学

1cc. { 6管 1.00
 12管 1.80
 50管 6.50

ロイマチス

神経痛薬

1回1cc. 筋注

Damneck

ダムネック

無脂肪性殺菌バスタ

萬有

50瓦 器具付 3.50
 50瓦 器具無 3.00
 10瓦 男子用 0.70
 3瓦(10個入) 2.50

花柳病豫防

腔内殺菌剤

深部注入

Damola

ダモラ

安息香科植物の有効成分を主とす
 る基礎液にアルミニウム鹽其他を
 配せるクリーム製剤

武田

錫管 { 15瓦 0.65
 35瓦 1.20

腋臭塗布剤

輕症は1日1-2回、
 重症は數回

113

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Danitol ダニトール パラヂクロールベンゾール 四鹽化炭素配合體	中央化學	液 { 150瓦 0.35 300瓦 0.60 500瓦 0.00 1斗罐 22.00	家ダニ駆除剤 噴霧
Dankern ダンケルン フェニル・ヂメチル・ピラツオロ ン・メチルアミノ・メタンスルホ ン酸ナトリウム、葡萄糖、及二三 の鎮痛剤より成る液	ラヂウム	人體用 { 5管 1.90 20cc. { 10管 3.50 50管 16.00 獸醫用 (18.5%) 200cc. 瓶入 2.50	神 經 痛 ロイマチス剤 一日1回20cc. 靜注 奇犬—1回20cc. 靜注 馬匹—1回100—200cc.
Dargerin ダルゲリン 芳香科植物 Alkaloid 鹽酸鹽を主 成分とす	日 産	末 { 100瓦 1.50 500瓦 6.50	腐敗酸酵性下痢 急、慢性腸カタル 小兒消化不良症 小兒 1日 3回0.3—0.5 瓦宛 大人 1日 3回0.7—1.0 瓦宛
Darios ダリオス 鹽酸セスキテルベンヒドロクプレ イン (内服用ファイナロール)	東京新藥	(カプセル2個をアンプル1管に封入) 2球 { 3管 1.50 10管 4.50 30管 12.00	治 淋 劑 1日 2回(朝夕)アンプル中のカプセル1個宛 内服
Dazol ダゾール 特殊酸性白土乳劑	塩野義	液 { 100cc. 0.50 250cc. 0.80 500cc. 1.20 2500cc. 5.40	毒物中毒、食傷 赤痢疫痢の初期 に吸着剤として 内用10—50cc. 洗腸50—100cc.
D.C.C. Celloidin セロイヂン コロヂオン綿を無水溶剤にて處理 せるもの	大日本セルロイド (田邊五)	約 200瓦 6.50	顯微鏡的標本 固定用劑 無水酒精及び無水エー テルに溶解して使用
D.C.L. Extract of malt & cod liver oil マルト肝油「デーシーエル」 麥芽エキスに肝油を機械的に配 せる非油狀製劑	丸 善	450瓦 2.20	榮 養 劑 1回10—15瓦 水、牛乳に溶し1日數 回内服

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Decholan デコラン (原名デコリン) デヒドロヒヨール酸ナトリウム鹽 (Choleretin 参照)	リーデル (ホルス タイン)	10cc. { 3管 6.80 20管 31.00 0.25 { 20錠 2.80 200錠 20.00 末 { 10瓦 5.00 25瓦 10.50 5cc. { 3管 3.50 20管 18.00	胆汁分泌及 排泄促進劑 1日 5—8cc. 靜注 内服 1日 3回 0.5 瓦 (2錠) 宛
Decipium デシビウム 10%阿片澱粉散 (阿片法手續不用)	ラヂウム	末 { 25瓦 0.70 450瓦 9.70	鎮痛、鎮咳、止瀉劑 阿片に準ず 極量 1回 1.5 瓦 1日 5 瓦
Decorpa デコルパ 純植物性粘液を乾固せしめたるも の (チョコレート糖衣粒)	田邊元	顆粒 { 100瓦 3.90 450瓦 15.00 糖尿病用 100瓦 3.90	糖尿病の食餌療 法及脱脂食料 食前 1—2 時間 1—2 食匙 (嚥せ薬)
Deco-sept デコセプト バラオキシ安息香酸・メチルエス テル	山之内 (中村瀧)	液 { 100瓦 1.20 500瓦 4.80 1000瓦 8.60 末 { 25瓦 1.40 100瓦 500瓦 1キロ	浸煎劑、注射藥 防腐劑 主劑100cc.に對し1cc. を加ふ 末は 0.1—0.2 % 使用
Dectogen デクトーゲン 葡萄糖13%サリ曹 3%及びプロム カルシウム製劑	東京治療	20cc. { 10管 2.80 50管 12.00	強心、利尿劑 1回20cc. 靜注
Defiber デファイバー リポイド、脂肪、蛋白質を配せる 免疫體 (Omnadin 参照)	萬 有	1cc. { 10管 1.40 50管 6.00 2cc. { 10管 1.70 50管 7.00	非特異性免疫元 1—2cc. 皮注
Degalol デガロール メンタチオキシヒヨール酸	リーデル (ホルス タイン)	(0.1) 20錠 2.30 末 { 10瓦 8.50 25瓦 18.00	膽石症黃疸治療劑 1日 3回 0.2 瓦(2錠) 宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Delial デリアール ペンツイミドアゾール含有の特殊軟膏	バイエル	チューブ 25瓦 1.50	日焼防止軟膏 露出皮膚へ塗布
Delica デリカ 理研 Vitamin-B	理研 (玉置)	液 120cc. 2.00 (エキス) 100瓦 2.00	ビタミン B 剤 1日量 液—6—12cc. エキス—5—10瓦
Denolon デノロン サリチル酸鹽類及フェノール製剤	一新製薬	1cc. 10管 2.00	神経痛 ロイマチス 治療剤 毎日又は隔日 1回 1cc. 筋注
Dermatopin デルマトピン 葡萄状及連鎖状球菌含有軟膏	三共	軟膏 { 5瓦 0.35 15瓦 0.75 100瓦 2.40	外用局所免疫剤 1日 1—2 回局所塗布
Dermo デルモ 鹽酸ピロカルピンの 1%軟膏	塩野義	軟膏 { 25瓦 0.60 100瓦 2.00 500瓦 7.00	凍傷剤 1日 1—2 回塗布
Dermol "Willow" デルモール 4—ニトロ 3.5 ピスアセトメルクリ 2—クレゾール及 3價フェノールのコロチオン溶液	柳韓洋行	液 { 120cc. 2.00 250cc. 3.90 500cc. 7.30	寄生性皮膚病 治療剤 患部塗布
Dermoreiz デルモライツ	藤澤	末 { 100瓦 1.00 250瓦 2.00 500瓦 3.00	濕布剤 温湯にて染みなし貼布す
Dermotuberin デルモツベリン	大阪薬物 (光榮)	5回量(診断用) 2.50 10cc. 4.00 20cc. 7.00 30cc. 10.00 50cc. 15.00 100cc. 25.00	結核経皮免疫元 3日毎に 1回塗布す

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Descarol デスカロール オルトプロム・サリチル酸ヨード カルシウム及ナトリウム	日新醫學	25cc. { 10管 2.00 50管 9.00	消炎解熱剤 1日 1—2 回 25cc. 静注
Desicated Placenta 乾燥胎盤實質 新鮮なる牛胎盤の乾燥製剤	パーク デビス (三共)	(錠剤 0.325cc.) 100個 12.00	乳汁分泌促進剤 1日 1—2 回 1個宛
Des-Salbe デスザルベ 肝油を配したる亜鉛華軟膏	三共	錫管 { 10瓦 0.35 25瓦 0.70 100瓦 1.50 500瓦 4.00	創傷剤 外用塗布
Desitin デシチン 肝油 (ビタミン A) 含有の特殊軟膏 (Thyro-Salbe 参照)	伯林デシ アン社 (田邊元)	軟膏 { 30瓦 1.30 90瓦 3.20 500瓦 13.00 12.5瓦 錫管 (打) 7.00	濕疹、火傷、外傷 潰瘍、治療剤 患部塗布
Detavit デタヴィット 魚油を含まざる Vitamin A, D, 製剤	バイエル メルク (シユ) (ミツト)	液 125cc. 3.10	ビタミン A, D 剤 大人 1日 2—3 匙 (添付) 小人 1日 1/2—1 匙 (全身強壯、罹患豫防剤)
Detoxol デトキソール 10%次亜硫酸ソーダ液	萬有	10cc. 5管 1.00 20cc. { 5管 1.20 50管 8.00	重金属中毒治療剤 1日 1回 5—20cc. 静注、又は 20—30cc. 内服
ネオデトキソール 5%次亜硫酸ソーダ液に 5%葡萄糖を配す	全	20cc. { 5管 1.00 50管 8.00	サルプルスン溶解液及中毒治療剤 中毒治療には 1回 20cc. 静注
Deuterium Oxyd 重水 (D ₂ O) 氷點 3.8° 沸點 101.41°	ノルクス ヒドロ (日本ア) (テンス)	液 { 5瓦 10瓦 25瓦	水酸基、アミノ基の測定 互變異性の研究 新陳代謝の研究用

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Devegan ㊦ デヴェガン 4オキシ・3アセチル・アミノフェ ニルアルジン酸 (Tocomonin 参照)	バイエル	0.25 { 15錠 3.15 30錠 5.75 150錠 22.99	白帯下治療剤 1日1-3回 1-2錠 宛置深部へ挿入
Dexalin Oyo デキサリン應用 10%純葡萄糖 3%純サリチル酸カルシウム	應用 醫化學	20cc. { 10管 3.00 50管 14.00	消炎鎮痛栄養剤 毎日又は隔日 1日 1回 20cc. 静注
Dexflavin デキスフラヴィン 3.6ジアミノ・10メチルアクリヂ ニウム・クロリッド葡萄糖液	日新醫學	10cc. { 10管 1.70 50管 7.00 20cc. { 10管 2.80 50管 11.00	殺菌強心剤 毎日又は隔日 10cc. 1 - 2回静注
Dexkal ㊦ デキスカール サリチル酸, ヨードブロームのカ ルシウム複合鹽	日東製薬	20cc. { 10管 2.80 50管 13.00	消炎, 吸收, 解熱 毎日 1回又は隔日 1回 20cc. 宛注射
Dext "Maruko" デキスト _L マルコ _T マルコ葡萄糖注射液	マルコ	5% 5cc. 5管 0.70 10% 5cc. 5管 0.80 20% 10cc. 5管 1.00 25% 20cc. 5管 1.70 50% 20cc. 5管 1.80	栄養強心剤 静注
Dext-Neotrisol デキスト, ネオトリゾール 0.5% 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. 3. 6. アクリヂニウム・クロリッド 10%葡萄糖	應用 醫化學	5cc. { 10管 1.50 50管 7.00 10cc. { 10管 2.50 50管 9.00	強力殺菌消毒剤 毎日又は隔日 1回 5- 10cc. 宛静注
Dextropur デキストロプーア 玉蜀黍より製せる純葡萄糖	コーンブ ロダクツ (谷村) (岩城)	500瓦 1.40	栄養剤 経口的 (5-10瓦) 注腸 (5-6%液)

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Dextrose デキストローゼ 葡萄糖注射液	都志見	5% { 20cc. 5管 0.80 50cc. 3管 1.20 100cc. 2管 1.20 300cc. 1管 1.80 500cc. 1管 1.50 10% { 10cc. 5管 0.80 20cc. 5管 1.20 50cc. 3管 1.50 100cc. 2管 1.50 2% { 10cc. 5管 0.90 20cc. 5管 1.40 50cc. 3管 1.80 50% { 20cc. 5管 1.80 50cc. 3管 2.70	栄養強心 利尿, 解毒剤 5%は皮下, 高張は静 注す
Dextrose annaka ㊦ 葡萄糖アンナカ注射液 (デキ安) 10%葡萄糖に安息香酸ナトリウム カフェイン 2%を配す	マルコ	10cc. 5管 1.80 20cc. 5管 2.50	強心利尿剤 毎回 10-20cc. 静注
Dextrose Calcium 葡萄糖石灰注射液 (デキカル) 10%葡萄糖液に鹽化石灰 2%を溶 解す	全	10cc. { 5管 1.10 5管 1.40 20cc. { 30管 7.00 60管 12.50	栄養利尿剤 10-20cc. 静注
Dextrose Camphor 葡萄糖カンフル注射液 (デキカン) 生理食鹽水中に葡萄糖10%カンフ ル 0.2%を溶解す	全	1cc. 10管 1.20 10cc. 5管 1.50 20cc. 5管 2.00	栄養利尿剤 10-20cc. 静注
Diabeteserin ㊦ チアベテセリン 磷酸マグネシウム及エゼリンアト ロビン製剤 (1號=アトロピン不含)	ナツ テレル (塩野義)	1號 50錠 2.60 2號 50錠 2.60	糖尿病治療剤 1日 3回 4錠宛
Diabeton ㊦ チアベトン ビタミンC及B, インシュリン 様物質を含有せる植物粉末製剤	日本薬品 洋行	末 { 30瓦 1.10 100瓦 3.45 250瓦 8.20 500瓦 15.50 0.3 { 100錠 1.20 300錠 3.40 500錠 5.30	糖尿病治療剤 1日 3回 1瓦 (3-4 錠) 宛空腹時内服

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Dial "Ciba" (製) チアール _L チバ ₇ チアルリルバルピツール酸 (CH ₂ =CH-CH ₂) ₂ =C= (CO-NH) ₂ CO	チバ (バーゼル)	0.1 { 12錠 1.75 100錠 8.10 250錠 16.10 末 { 5瓦 3.90 10瓦 6.95 2.3cc. 5管 3.55	催眠鎮静剤 催眠剤として1回0.1 -0.2(1-2錠) 鎮静剤として1日1- 2回0.05-0.1 注-筋肉1管 (極量1日0.5瓦)
Dialax Tablet チアラックス錠 オキシメチルアントラキノナン ニン酸配糖体	柳 韓	錠 { 100錠 0.80 500錠 3.65 1000錠 6.10	健胃制酸剤 1日3回4-6錠宛
Diazo Reagenz チアツオ液 A液0.5%亜硝酸ソーダ液 B液ズルフアニール C液10%アンモニア水	東京化学 (塩野義)	3回分 1箱 0.90 6回分 1箱 1.50	チフスの尿診断薬 説明書参照
Dicodid (製) チコチツト ヒドロコデイノンの重酒石酸鹽 (Fukodal 参照)	クノール (三共)	(0.005) 20錠 品切	鎮痛, 鎮咳剤 1日2-3回1錠宛
Didial "Ciba" (製) チチアール _L チバ ₇ チアルリルバルピツール 1錠 { 酸 0.1 エチルモルヒネ 0.025	チバ (バーゼル)	12錠 2.90 100錠 14.85	催眠麻酔剤 1回1錠 (極量1日3錠)
Digelaxin チゲラキシン 海人草, サントニン及緩下剤配合 剤	塩野義	50錠 1.50 100錠 2.50	蛔蟲驅除剤 午前10時 6錠 午後10時 6錠宛
Digenarsin チゲナルシン オルトプロムサリチル酸カルシウ ム液	マルコ	25cc. { 12管 3.50 60管 18.00	鎮痛消炎剤 1日25cc. 靜注

品名組成	製造元 発售元	包装価格	醫効用量
Digestin チゲスチン アスペルギルス菌フェルメント. 類白色, 無晶形, 芳香佳味粉末. 酸性アルカリ性の媒体中にも消 化力を發揮す	四 城 (藤 澤)	末 { 25瓦 1.45 250瓦 12.00 500瓦 22.50 0.1 { 20錠 0.30 100錠 0.80 500錠 3.40 1000錠 6.70	蛋白, 澱粉質 消化剤 末1日3回0.1-0.3 瓦(1-3錠)宛
Digalen (製) チガレーン チギタリス葉總有效成分 (1cc.=1錠=標準葉0.1瓦)	ロシユ (日 本) (ロシユ)	液 { 15cc. 1.15 100cc. 4.40 1.1cc. { 6管 1.80 50管 11.25 糖衣 { 25錠 1.80 100錠 5.65	強 心 劑 内服1回1-2cc.(1 -2錠)皮注1回1cc.
Digicalfein (製) チギカルフェイン チギタミン, 安息香酸カルシウム 製剤	塩野義	末 { 25瓦 1.70 100瓦 5.50	強心利尿剤 1日3回0.5-1.0瓦 宛
Digicampher (製) チギカンファー チギタリス葉の有効成分	日東製薬	1cc. { 10管 1.50 50管 6.50	強心利尿剤 1日1回1cc.皮又は 筋肉注
Digifolin "Ciba" (製) チギフォリン _L チバ ₇ チギタリス葉中の總有效グリコシ -ド (液1cc.=1錠=標準葉0.1瓦) (チギタリス葉極量1回0.2瓦1日 1.0瓦)	チバ (バーゼル)	液 { 15cc. 1.25 100cc. 3.90 500cc. 18.00 0.1 { 25錠 2.10 100錠 6.90 1.1cc. { 5管 2.10 20管 6.80 50管 14.50	強心利尿剤 内服1日2-3cc.(2- 3錠) 注射1回1-2cc.皮注
Digiherton (製) チギヘルトン チギタリス總有效成分 (液1cc.=末0.1瓦=標準葉0.1瓦) (末の濃度注意)	田邊五	1cc. { 10管 1.30 50管 4.00 液 { 100cc. 2.20 250cc. 4.60 500cc. 7.50 末 { 25瓦 4.00 100瓦 15.00 250瓦 36.00 500瓦 70.00	強心利尿剤 注射-1回1cc.1日 3-5回(皮, 筋, 靜) 内服-1日0.1-0.3 瓦(1-3cc.)分服 1日0.5瓦(5cc.)迄

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Digilanogen チギラノゲン デギタリスラナータより抽出せる 有効成分 (注 2cc.=液 1cc.=結晶グリコシド 0.5mg 含有)	藤澤	2.0cc. { 5管 1.30 10管 2.20 50管 9.50 15cc. 1.80 液 { 50cc. 4.50 100cc. 8.00 500cc. 30.00	強心利尿劑 内用 1日 2-3 回 1回 0.8-1.0cc. 注射 1日 2回 1回 1筒 静注又は筋注
Digilanid "Sandoz" チギラニド「サンド」 デギタリスラナータの有効成分	サンド	筋注用 { 3管 1.45 2cc. { 6管 2.70 静注用 { 2管 2.30 4cc. { 6管 4.25 錠 20錠 1.95 液 10cc. 2.35	強心利尿劑 静注 1日 1回 4cc. 宛 筋注 1日 2回 2cc. 宛 内服 1日 3回 1錠 (15 滴宛)
Digipuratum チギブラツーム デギタリス葉のグリコシード	クノール (三共)	末 5瓦 3.45	強心利尿劑 1日量 0.2-0.3 瓦
Digitalis Concisa 割截チギタリス葉 局方チギタリス葉割截(粉)末	三共	割截—25瓦 1.00 粉末—25瓦 1.10	チギタリス葉に 準ず 1日 0.2-0.5 瓦 (極 量 1回 0.2 1日 1.0瓦)
Digitalis Cut 「カット」チギタリス葉 チギタリス錠 デギタリス葉を割截したるもの (1瓦 1管 フォツケ単位6)	藤澤	カット { 25瓦 0.55 瓶入 { 500瓦 7.00 アンブル入 { 1瓦 6管 0.65 { 5瓦 5管 1.30 (0.1)20錠 5本 0.65	
Digitamin チギタミン デギタリス葉總有効成分 (液 1cc.=末 1瓦=標準葉0.1瓦)	塩野義	1cc. { 5管 0.80 10管 1.40 50管 5.50 15cc. 0.60 液 { 50cc. 1.60 100cc. 2.70 250cc. 5.80 500cc. 9.20 末 { 25瓦 0.80 100瓦 2.30 250瓦 6.00 500瓦 11.00	強心利尿劑 注射—1回 1cc. 皮注 又は静注(1日 3cc.迄) 内服—液 1日 1.5-3.0 cc. (1日 6cc. 迄) 末 1日 1.5-3.0 瓦(1 日 6瓦迄)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Digitocampher チギトカンファー デギタリス葉有効成分に安那加を 配せる製剤	模範薬品	1cc. { 10管 2.00 50管 8.00	強心利尿劑 1回 1-2cc. 皮注
Digitosan チギトサン デギタリス葉有効成分	日新醫學	1cc. { 10管 1.10 50管 4.20 液 { 25瓦 0.70 100瓦 2.40 500瓦 8.00 末 { 25瓦 0.80 100瓦 2.50 500瓦 9.50	強心利尿劑 末及び液 1回 0.3-1.0 瓦 1日 3回
Digitose チギトゼ デギタリス葉有効成分	東洋 新薬社	1cc. { 10管 1.00 50管 4.50 瓶入 50cc. 1.50	強心利尿劑 大人 1回 1cc. 皮注 極量 1回 2cc. 1日 4cc.
Dikifonal チキホナール デギタリス有効成分、葡萄糖、安 那加、カンフル	應用 醫化學	1cc. { 10管 1.20 50管 5.00 2cc. { 10管 2.00 50管 8.00 5cc. 10管 3.50	強心劑 1日 1回 1-2cc. 皮注 又は筋注
Dihydrocodeinum phosphoricum 「ツル印」磷酸チドロコデイン 「三共」磷酸チドロコデイン 「三共」磷酸チドロコデイン散	田邊五 三共	純末 { 25瓦 500瓦 純末 { 1瓦 1.45 5瓦 6.50 25瓦 25.00 100瓦 70.00 2倍用 { 10瓦 6.50 50瓦 26.00 100瓦 48.00 500瓦 230.00	鎮痛、鎮咳劑 1日 0.03-0.06 1回 0.01-0.03 倍用に純末の 2倍量を用ふ
Dijodyl チヨヂール リチンステアロール酸チヨヂット (沃度46%含有)	リーデル (ホルス タイン)	末 25瓦 9.20 (0.3) 20錠 2.80	有機性ヨード 變質劑 1日 3回食後 0.5-1.0 瓦 (1-2錠) 宛

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Dilaudid チラウチツト注射液 鹽酸デヒドロモルヒノン	クノール (三共)	(1.1cc.0.002) 4管 1.65	モルヒネ代用 1回 1cc. 皮下(敏感なるものには減量)
Dimarl デイマール 蛋白質, 脂肪, リポイドを含有する全免疫體	東京治療	10管 1.40 50管 6.00 100管 11.00 2cc. { 10管 2.20 50管 10.00 100管 18.00	非特異性免疫元 隔日に 2cc. 皮下又は筋注(用時強く振盪)
Dimol ダイモール ヂメチロ・メトオキシ・フェノール C ₆ H ₂ (CH ₃) ₂ (OCH ₃)OH ①-腸用 ②-胃腸用	エントリウオーカール (鳥居)	①②共 { 10錠 0.60 20錠 1.20 50錠 2.40 末 { 25瓦 3.60 500瓦 60.00	胃腸カタル 疫痢, 自家中毒 異状酸酵 毎食前 2-3錠 (0.4-0.8瓦)
ダイモール, オイントメント 5% ダイモール軟膏	全	軟膏 { 5瓦 0.36 10瓦 0.60 28瓦 1.55	皮膚薬 外用塗擦
ダイモール舍利別	全	シロップ { 25瓦 1.80 100瓦 6.60 450瓦 24.00	小児 1回 3-6瓦 1日 4-5回
Dimonal チモナール	浅川新良貴 (東京醫藥)	坐薬 { 5個 0.45 10個 0.80 30個 2.10 100個 6.50 軟膏 { 10瓦 0.55 25瓦 1.20 100瓦 3.80 300瓦 10.00	瘧疾治療劑 坐薬は朝夕臨臥時の3回 軟膏は1日2-4回綿にて貼付
Diohaemo チオヘモ ヨード, ヴイタミン誘導體アネステジン, ベリドール, カンフル製劑	山之内 (中村瀧)	坐薬 { 6個 0.55 12個 0.90 30個 2.10 100個 6.30 軟膏 { 10瓦 0.55 25瓦 1.20 100瓦 3.80 250瓦 8.50	瘧疾治療劑 坐薬 1日 1-2個挿入 軟膏 1日 2-3回 2-4瓦患部貼付

品名組成	製造元 発売元	包装価格	醫効用量
Dionin チオニン 鹽酸エチルモルヒネ	メルク (ミユミツト)	末 { 1瓦 5瓦 10瓦 25瓦 0.05 { 5管 1cc. { 10管 100管	麻醉鎮痛劑 1日 2-3回 0.01-0.05 頓服
Diposal ヂプロザール サリチル酸サリチルエステル (Susalon 參照)	ボーリ ンゲル (三共)	末 { 25瓦 2.50 100瓦 8.70 (0.5) 20錠 1.90	ロイマチス 神-經-痛 1回 0.5-1.0 (1日 6瓦まで)
Dipolin ヂポリン (獨乙名 Selvorol) グルコヘキシツト・クエン酸カルシウム (含量 8.5%)	バイエル	末 { 50瓦 3.33 100瓦 6.48	發育障害, 喘息, レントゲン宿醉 藥物疹, 妊婦の 石灰代謝障害 1日 2-3回茶匙山盛一杯宛
Diraknal チラクナール 卵黄中の油性成分, 特殊テール, 肝油, ステブナール, アナルゲシン, ロートエキス製劑	萬有	軟膏 { 10瓦 0.50 100瓦 3.50 500瓦 16.00 坐薬 { 5個 0.50 30個 2.40 100個 7.50	瘧疾治療劑 軟膏は 2-4瓦をリン トに展べ坐薬は 1個宛 朝夕 2回挿入
Discren チスクレン アクリチン誘導體及び睡蓮科植物有效成分水溶液	日本新藥	2cc. { 5管 2.00 50管 17.00	粘膜病的分泌 抑制劑 毎日又は隔日 2cc. 皮 注 (中耳炎, 急性鼻炎, 蓄膿症)
Disseptal チセプタール <chem>NC1=CC=C(S(=O)(=O)NC2=CC=C(S(=O)(=O)NC3=CC=C(C)C3)C2)C=C1</chem> 4(4'-Aminobenzolsulfonamido)-benzolsulfondimethylamid	中外新藥	0.5 { 20錠 3.50 100錠 15.00 末 { 25瓦 7.00 100瓦 25.00 500瓦 110.00 1% { 5管 2.50 20cc. { 10管 4.00 50管 18.00 100管 34.00 2% { 5管 3.50 20cc. { 10管 6.00 50管 28.00 100管 51.00	③スルファミン劑

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Dismen "Willow" (新) チスメン「ウィロー」 鹽酸エフェドリン, アセトフェネチジン	柳 韓	100錠 6.25	調經鎮痛劑 1回 2錠
Disomeal (商標方) チソメアル ナトリウム・モノメチルアルゼン Na ₂ CH ₃ ASO ₃ +5H ₂ O (As 27.37%)	圓 城 (塩野義)	末 { 5瓦 1.30 25瓦 6.00	肺結核, 貧血, 微毒 1日 3回 0.02 瓦宛内服又は4%液 1cc.皮注 (極量1回 0.2 1日0.6)
Distemper Virus-Vaccine (新) チステムバー豫防液「北研」 チステムバー犬の病毒含有臓器より製す (帯綠色弱濁濁液)	北 研	2cc. { 2管(1號) 2.00 5管(2號) 4.00	チステムバーの豫防治療 1回 2-6cc. 肩部皮下注
Diucalcin (商) ヂウカルチン サリチル酸カルシウムテオプロミン (Diuretin-Calcium 参照) 用法— 1日 1.0	田 邊 五	末 { 25瓦 1.30 100瓦 4.80 500瓦 19.00 0.2 { 100錠 1.30 500錠 6.00	利尿高血圧治療劑 1回 0.5-1.0 瓦宛 1日 3回
Jod-Diucalcin (商) ヨードヂウカルチン { ヂウカルチン 9分 ヨードカリ 1分	全	末 { 25瓦 1.30 100瓦 4.80 500瓦 19.00 0.2 { 100錠 1.30 500錠 6.00	動脈硬化治療劑 1回 0.6 (3錠)宛毎食後
Diuran (新) ヂウラン クロル水銀オキシプロピルテオプロミンの 5%水溶液	塩 野 義		有機水銀利尿驅微劑 3-4 日の間隔を以て 1回 0.5cc. より始め 1-2cc. を靜注又は腹腔内注射
Diuretin (商) ヂウレチン サリチル酸テオプロミンソーダ, 白色無臭の粉末 用法— 1日 1.0	クノール (三 共)	25瓦 1.44	腎臓性利尿劑 1日 1.5-3.0 瓦分3 (極量 1回1.0 1日3.0)

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Diuretin-Calcium (商) ヂウレチンカルチウム サリチル酸カルシウムテオプロミン { テオプロミン 約48% サリチル酸 約38% カルシウム 約11% 用法— 1日 1.0	クノール (三 共)	末 { 25瓦 3.00 100瓦 10.00 450瓦 32.60 0.5 { 20錠 1.85 200錠 14.75 0.2 60錠 2.30	利尿, 高血圧治療劑 利尿に 1日 1.5-5.0 分3 長期療法に1日1.5-3.0 分3
沃度ヂウレチンカルチウム (商) (特定名 Jodical ヨーデイカル) { ヂウレチンカルシウム 9分 ヨードカリ 1分	全	末 { 25瓦 3.30 100瓦 11.20 450瓦 42.90 (0.6) 20錠 2.30	利尿, 高血圧治療劑 1日 3回 0.6 (1錠)宛 毎食後
ロダンヂウレチンカルチウム (商) (特定名 Rhodical ローデイカル) { ヂウレチンカルシウム 5分 ロダンカリ 1分	全	末 { 25瓦 3.30 100瓦 11.20 450瓦 42.90 (0.6) 20錠 2.30	血圧下降劑 1日 3回 0.6 (1錠)宛 食後漸時減量
Diuretin Calcium (商) ヂウレチン石灰「ライワキ」	岩 城	末 { 25瓦 1.00 100瓦 3.50 500瓦 15.00	利尿, 強心血圧下降劑 1日量 1.5-3.0 瓦毎 食後分服
Dizur (商) ヂズール <chem>NH2C6H4SO2NH2</chem> P-Aminobenzolsulfonamid	應用化學	末 { 10瓦 5.80 20瓦 8.50 100瓦 32.00 20錠 3.80 100錠 17.50	スルファミン劑 1日 1.5-3 瓦 (3-6 錠) 毎食後 3回分服
Dokutorugen (新) ドクトルゲン	村田商店	20錠 2.50	蓄膿症 耳鼻, 諸腦疾患
Doloptal "Sandoz" (商) ドロプダール「サンド」 イツブチル・アリル・バルピツール酸 (0.05) チメチル・アミノ・フエナツオン (0.125) チメチルキサチン (0.025)	サンド (塩野義)	0.2 { 10錠 1.05 100錠 7.80 10瓦 3.55	鎮痛劑 1回 1-2 錠 1日 6錠迄

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Domiklin ドミクリン  (4'-Aminobenzenesulfonamido)- benzolsulfondimethylamid	日新醫學	25瓦 7.00 50瓦 13.00 100瓦 25.00 500瓦 115.00 0.5 { 20錠 3.00 100錠 13.50 500錠 60.00	⑤スルファミン剤
Donanko 銅軟膏 10%クエン酸銅軟膏	日本新薬	10% 25瓦 0.75	眼科用 トラホーム、結膜炎に 挿入
Dopalpin ドバルピン ババベリンとホマトロピンの配合 製剤	友田	1.1cc { 10管 2.30 50管 10.50 25瓦 2.70 4%末 { 100瓦 10.30 500瓦 48.00 (0.02) 50錠 3.00	鎮痙鎮痛剤 0.5-1.0cc. 皮注 1日 3回 1.0-2.0 瓦分3 0.5-1.0 瓦頓用 (1- 2錠)
Dormalgin ドルマルギン イソブチル・ブロムプロベニール マロニル尿素、とアミノピリンの 結合體	リーデル (ホルス タイン)	0.1 { 10錠 0.80 20錠 1.30 3瓦 2.35 末 { 10瓦 6.30 25瓦 13.60 2cc. 5管 3.20	鎮痛剤 1回量 0.2 瓦 (2錠) 内服 1/2-1 筒皮注又は筋注
Dormin ドルミン ブロムヂエチルアセチル尿素 (Adalin Arabon, Isomin 参照)	塩野義	25瓦 3.20 100瓦 10.00 500瓦 45.00 0.1 { 10錠 0.50 25錠 1.15 50錠 2.00	催眠剤 1回 0.3-0.5 瓦頓用
Doron ドロン バルピタル鹽類、アミノピリン、 鹽酸エフェドリン	東方藥物	1cc. 10管 1.80 20錠 1.50 100錠 7.00 500錠 32.00 1000錠 60.00	麻薬中毒新治療剤 注射 1回 1/2-1 筒皮注 錠剤 1回 1錠内服 1日 數回
Drasmin ドラズミン サントニン酸ナトリウム水溶液	塩野義	(5%) 1cc. 5管 1.00 (10%) 1cc. 5管 1.60	蛔蟲驅除剤 1日 1回 1cc. 宛 2日 間連続注射

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Dreibase ドライアーゼ リパーゼ、ウレアーゼ、ヂアスタ ーゼ結合體	白井松	25瓦 0.95 50瓦 1.80 100瓦 3.45 250瓦 8.00 500瓦 15.50 0.1 { 50錠 0.95 100錠 1.80 300錠 5.20 500錠 8.20	脂肪蛋白消化剤 末 1日 0.3-0.5 錠 1日 3回毎回 1-2 錠
Dreigen ドライゲン 特殊脂肪體及ビタミン A, D, E を含有する非蛋白、油性刺戟療法 剤	福井七 相斗五 南	0.5cc. { 10管 2.70 20管 4.80 50管 10.60	非蛋白刺戟療法剤 1回 0.5cc. 皮注又は 筋注 (婦人科疾患)
Dry-Cantanol ドライ、カンチノール 禾本科植物の有効成分をカンフェ ノール中に溶解せしめたるもの	浅川	25瓦 1.50 100瓦 5.00 500瓦 20.00	丹毒治療剤 外用塗布
Ducreyne デュクレイン 軟性下疳菌ワクチン	三共	1cc. { 5管 1.20 10管 2.00 10cc. 1.80	軟性下疳性横痃 診断及治療 診断には 0.1cc. 皮注 治療には 3-4 隔日に 1回 0.3-2.0 筒注又 は皮注
Dunn-Chinin "Sanken" デュンキニン (三研) 1cc.中 { キニーネ 0.0680 カフェイン 0.0172 ウレタン 0.0142	三菱薬品	小児用 1cc. 6管 0.80 1號 2cc. 10管 1.40 2號 5cc. 5管 1.40 3號 2cc. 50管 6.20	流感、扁桃腺炎、 不明の高熱 1日 1-3 回皮注又は 筋注
Duodenum Powd デュオデナム末 十二指腸體	マルホ	28瓦 4.80	膽汁、膵液、腸液 缺乏、消化不良 1日 3回 1回 0.05- 0.2 瓦食前服用
Durikono-A ドリコノ アミノ酸ビタミン含有の舍利別	講談社 代理部	250cc. 1.20 徳用瓶 2.00	滋養強壯剤 1日 3回 10-20cc. 宛

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ebaca エバカ 無脂肪性基剤の銀杏形膠球	櫻木	{ 6粒 1.80 50粒 12.00	白帶下 頸管カタル 挿挿入
Ebios エビオス 麥酒酵母を原料とするビタミン B複合體	大日本 麥酒 (田邊五) (田邊元)	末 { 100瓦 1.70 500瓦 6.00 1斤 10.50 0.25 { 30C錠 1.60 1000錠 4.80	栄養, 消化, 食慾 催進劑 1日 3回 1-1.5瓦 (4 -6錠) 宛毎食後
Ebios lös. エビオス注射液 Vitamin B ₁ 及び B ₂ 複合體	全	1cc.=300國際單位 1cc. { 10管 4.50 50管 20.00 2cc.=600國際單位 2cc. { 10管 8.50 50管 38.00 5cc.=1500國際單位 5cc. { 5管 8.50 10管 15.00	ビタミンB劑 1回 2cc. 皮注 (脚氣, 神經炎, 神經 痛, 惡性貧血)
エビオス結晶液 Vitamin B ₁ 溶液 (Betaxin, Ben. erbit, Metabolin, Abery- B ₁ Orizamin, Neo-Paranutrin 参照)	全	B ₁ 0.2瓦=100單位 5管 1.25 2cc. { 10管 2.35 50管 10.00 B ₁ 1.0瓦=500單位 5管 3.20 2cc. { 10管 5.80 50管 26.50	ビタミンB ₁ 劑 1回 2cc. 皮注
Ebios-B₁ エビオス B ₁ ビタミン B ₁ を多量に含む ビタミン B 複合體	全	末 { 1瓦中 B ₁ 300Iu 25瓦 3.20 1錠中 B ₁ 30Iu 250錠 3.50	脚氣, 多發性神 經炎, 肋膜炎 1日 1-2 瓦 (錠劑は 10-20錠) アルカリ劑 との併用は避けられた し
Eczin "Riken" エクシン ビタミン D 及紫外線照射脂油 を主體とする亞鉛華軟膏	理研 (玉置)	錫管 20瓦 0.50	皮膚藥 塗擦又は貼付 (説明書参照)
Edera エデラ 動物の膵臓肝臓及甲状腺等の内分 泌腺の複合製劑, 褐色, 苦味, 引 濕性粉末 廣用一(廣編)	三共	末 { 25瓦 2.70 100瓦 9.00 500瓦 40.00 (0.1) 100錠 2.00	食慾亢進劑 1日 0.6-0.8 瓦分3 毎食前

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Edona エドナ デーデルライン氏陰桿菌に乳酸桿 菌及球菌を加へグリコーゲン, 酸 性燐酸加里を配せる錠劑	玉置	10錠 0.50 80錠 1.20	白帶下治療劑 就床時 1錠挿入 (Flala 参照)
Ehramisol エーラミゾール アルゼノベンゾール (Neo-Ehramisol 参照)	萬有	1錠 0.1瓦 0.40 2錠 0.2瓦 0.75 3錠 0.3瓦 1.05 4錠 0.4瓦 1.30 5錠 0.5瓦 1.55 6錠 0.6瓦 1.80	驅微劑
Eiyogen "Limit" エイヨーゲン リミット マグネシウム鹽類に制酸緩下劑を 配せる白色粉末	一新製藥	末 { 5瓦 0.20 10瓦 0.30 50瓦 1.00 100瓦 1.80 200瓦 3.00	緩下劑 就床前茶匙 3-4 杯を 一杯のグラスの水に投 下して服用
Ekijin エキチン カンフル水溶液	東洋 新藥社	5% { 10管 0.80 1cc. { 50管 3.50 10% { 10管 1.00 1cc. { 50管 4.50	濃厚カンフル 1回 1cc. 宛皮注又は 筋注
Ekilysin エキリジン 動物體より特殊の化學的操作の下 に其の主成分を抽出せる帶黄白色 の粉末	田邊五	末 { 25瓦 1.20 50瓦 2.20 100瓦 4.00 250瓦 9.00 500瓦 16.00	吸着殺菌, 疫痢 治療劑 早期頓服 1.0-3.0 二, 三歳 1.0-1.5 三, 四歳 1.5-2.0
Ekiriton エキリトン (疫痢頓) 脾臓, 肝臓抽出成分に解毒, 消炎 作用を有する藥物及びビタミン 劑を添加せる製劑	玉置 (橋本) 藥物	3.3cc. { 5管 4.40 10管 8.60 50管 42.00	疫痢, 赤痢 急性腸カタル 1日 1-2 回皮注, 筋注 1回 6.6cc. 小兒 3.3cc.
Ekunin エクイニン	日本藥品 洋行	{ 8瓦 8.00 25瓦 20.00 21錠 2.80 6管 1.50 100管 22.00	臟器製 脚氣治療劑

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Elarson エラルソン クロールアルジンペーヘノール酸 ストロンチウム鹽 (1錠中砒素 0.5 瓩)	バイエル	60錠 3.15	有機性砒素強壯劑 1日 2錠 1日 3-5 回 食後 (貧血、萎黃病、神經衰弱、 バセドー氏病、マラリア、皮膚疾患)
Eisen Elarson 鐵エラルソン 還元鐵含有のエラルソン (1錠中砒素 0.5 瓩, 鐵 30 瓩)	全	(0.5) 60錠 3.15	エラルソンに準ず
Elbon "Ciba" エルボン (チバ) チンナモミル・バラオキシ・フェ ニル尿素 (Minapon Apyrexin Febasenin 德國) [商標]	チバ (バーゼル)	1.0 { 20錠 3.30 100錠 14.00 25瓩 3.60 末 { 250瓩 27.00 1000瓩 85.00	結核性解熱劑 1日 2-3 回 1-2 瓩 (1-2錠) 宛
Elcan エル肝 肝油、葉綠素、鐵、コロイド性磷 酸カルシウム	石本活生	錠 { 36錠 1.00 80錠 3.00 250錠 5.00 1000錠 15.00 3000錠 50.00	能動性肝油錠 1日 2-6 錠 隨時服用
Eldoform エルドホルム 醱母蛋白とタンニン酸結合體 Vitamin B 含有無臭殆んど無味灰 色粉末	バイエル	末 { 25瓩 2.50 250瓩 22.65	止瀉劑、腸炎、綠便 結核性下痢 1日 2-3 回 0.5-1.0 瓩宛
Eleclloid Silver 銀エレクロイド 電氣製コロイド銀 0.025 % 溶液	國光製藥 (塩野義)	(靜皮筋兼用) 5cc. { 6管 1.80 50管 13.00 (皮膚専用) 2cc. { 5管 1.20 50管 10.00	炎症性疾患 細菌、原蟲に基く 疾患(肺炎、丹毒) 1.0-5.0cc. 筋、皮、 靜注
Eleclloid Silver. Konz. 濃厚銀エレクロイド 3% の濃度を有する純コロイド銀 溶液	全	瓶入 { 50cc. 1.80 500cc. 16.00	強力殺菌消毒劑 疫癘、チフス、淋疾 カルブアンケン 注入、洗滌タンポン

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ointment of Eleclloid Silver 銀エレクロイド軟膏 コロイド銀軟膏	國光製藥 (塩野義)	軟膏 { 25瓩 0.55 500瓩 9.00	皮膚、筋肉、各炎症 肉腫、創傷 塗擦又は貼付
Eleclloid-Gold 金エレクロイド 微毒診断用として最も鋭敏の稱あ るラング氏反應用藥品	全	5cc. { 0管 1.60 50管 12.00 2cc. { 5管 1.20 50管 10.00	微毒診断及び 結核治療 診断はラング氏法によ る。治療は筋、皮、筋注
Eleclloid Copper 銅エレクロイド 電氣製コロイド銅液	全 (靜皮筋兼用)	5cc. { 6管 1.60 50管 12.00 (皮膚専用) 2cc. { 5管 1.20 50管 10.00	結核疾患治療劑 1.0-2.0cc. を肩胛深 部注射
Ointment of Eleclloid Copper 銅エレクロイド軟膏 コロイド銅軟膏	全	軟膏 { 25瓩 0.80 500瓩 13.50	悪性腫瘍塗擦劑 塗擦又は貼付す
Eleclloid Sulphur 硫黃エレクロイド コロイド硫黃溶液	全	液 { 25cc. 0.35 100cc. 1.00 500cc. 4.00 軟膏、パスター 各 { 25瓩 0.50 500瓩 7.00	疥癬、濕疹 塗布
Eleclloid Tin 錫エレクロイド 電氣製コロイド錫液	全	5cc. 6管 1.60	アクネ菌病治療劑 5.0cc. 筋内注射
Eleclloid Bismuth 蒼鉛エレクロイド 蒼鉛コロイド水溶液	全 (靜皮筋兼用)	5cc. { 0管 1.60 50管 12.00 (皮膚専用) 2cc. { 5管 1.20 50管 10.00	驅微劑 1日 1-5cc. 毎日又は 隔日
Eleclloid Mercury 水銀エレクロイド 電氣製コロイド水銀液	全 (靜皮筋兼用)	5cc. 6管 1.60 (皮膚専用) 2cc. { 5管 1.20 50管 10.00	驅微劑 1日 1-5cc. 主として 筋内注射

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Ointment of Eleclloid Mercury 水銀エレクロイド軟膏 コロイド水銀軟膏	國光製薬 (塩野義)	軟膏 { 25瓦 0.80 500瓦 13.00 }	驅微塗擦劑 塗擦
Eleclloid Mer. Jodide. ㉑ 沃度水銀エレクロイド 沃度及水銀コロイド	全	5cc. 6瓦 1.60	驅微劑 1-2cc. 筋注
Eleclloid-Iron 鐵エレクロイド 電氣製コロイド鐵溶液	全	注射用 5cc. 6管 1.60 内服用 瓶入 50cc. 1.60	強壯劑 筋注 5.0cc. 内服 1回 2.0cc.
Electrargen "Willow" エレクトラルゲン 電氣性コロイド銀溶液	柳 韓	5cc. { 6管 2.95 25管 11.30 }	丹毒, 肺炎 敗血症, 膿腫 1回 2-10cc. 筋注 弱筋
Electrargol エレクトラルゴール 電氣コロイド銀 (Eleclloid Silver Argoelectrosol 参照)	クラン (シーベ ルヘグナー)	5cc. { 6管 50管 100管 }	肺炎, 丹毒, 敗血症 其他, 細菌原蟲に 基く炎症性疾患 1日 5-30cc. 筋注
Eledon エレドン 粉末牛酪乳 (Cow-Rect-A, Bioleton 参照)	ネツスル (乾 卵)	250瓦 2.80	榮養劑 母乳代用 16-100 溶液
Elixir Glycerophosphate Calcium and Sodium グリセロ磷酸エリキシール 30cc. 中グリセロ磷酸ナトリウム 0.52 グリセロ磷酸カルシウム 0.26 含 有の舍利別	パーク デビス (三 共)	250cc. 2.95 500cc. 5.45	神經強壯劑 1回 4-8cc. 1日 3回
Elityran エリチーラン 標準ホルモン量含有の甲状腺製劑 (1錠-10海狼單位)	バイエル	(0.025) 30錠 3.30 1% 2cc. 10管 6.55	肥胖症治療劑 1日 3回 1-2 錠宛内 服

品名組成	製造元	包装価格	医効用量
Elyta エリタ 鹽酸キニーネ及グリセリン含有の 柔軟ゲラチン膠球にして膠の自護 清淨作用を發揮せしむ 挿入後異物感無し	日本新薬	柔軟球 { 10球 1.00 50球 4.00 }	白帶下, 頸管カ タル治療劑 就床前ゴムの包皮を除去し 1個挿入
Elzopan ㉑ エルゾパン オルトヨード及びオルトプロムの ベンツオエゾイレ・フェニルチメ チルピラツオロンとアセチルアン トラニルゾイレの製劑	日本 薬品洋行	5瓦 1.10 10瓦 1.95 25瓦 4.60 100瓦 17.50 0.1 { 25錠 0.65 50錠 1.20 }	鎮咳劑 1日 1.5-2.0 瓦 (味に百日咳)
Emblol ㉑ エムブロール Vitamin B complex, 肝臓ホルモ ン	東京治療	注射用 1.2cc. { 10管 1.30 50管 5.50 100管 8.50 2.2cc. { 10管 1.60 50管 7.80 100管 13.00 3.5cc. { 10管 2.50 50管 10.00 100管 13.00 5cc. { 10管 3.30 50管 12.50 100管 22.00 静脈注射 5cc. { 10管 2.50 50管 8.50 10cc. { 10管 4.50 50管 16.00 末 { 50瓦 1.00 100瓦 1.50 500瓦 6.50 液 { 100cc. 0.80 500cc. 2.75 1000cc. 4.50 2500cc. 10.00 錠 100錠 1.20	ビタミンB劑 粉末 1日 3回 1-1.5 瓦宛 液劑 1日 3回 3-7 瓦 錠劑 1日 3回 2-4 錠 注射-筋内又は皮下注

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
Emblol B ₁ エムプロール B ₁ Vitamin B ₁	東京治療	1號(0.25瓦)	ビタミンB ₁ 劑
		10管 1.20	
		50管 6.00	
		100管 11.00	
		2號(0.5瓦)	
		10管 2.60	
50管 10.50			
100管 20.00			
3號(1.0瓦)			
10管 4.00			
50管 17.00			
100管 32.00			
4號(2.0瓦)			
10管 3.50			
50管 16.50			
100管 30.00			
5號(3.0瓦)			
5管 5.50			
10管 10.00			
6號(5.0瓦)			
5管 7.50			
10管 14.00			
Embrymin エムブリミン ヒスチジン, アルギニン, リシン, ロイシン等の総合的カルシウム鹽	岩城	25瓦 0.60	食欲促進兼利尿劑 1日 0.5—2.0瓦 (2—12錠) 分3 食鹽代用としては 1日 10瓦迄
		末 100瓦 1.80	
		500瓦 7.80	
		(0.25) 100錠 0.70	
Embyol エンビオール 純精米胚芽を脱脂し成分中の澱粉 を糖化し細末となせるもの エンビオ (米胚芽)	丹澤化學 (福井七)	50瓦 1.80	脚氣劑 1日 3回 3—5 瓦宛
		末 100瓦 2.50	
		250瓦 3.65	
		500瓦 6.50	
		(0.25) 100錠 1.00	
		小(1箇月分) 1.00	
大 2.00			
Emetine Hydrochloricum ㊟ 鹽酸エメチン 1cc. 中鹽酸エメチン 0.02 瓦	パーク デピス (三共)	1cc. 6管 5.00	アメーバ赤痢 肝臓チストマ 腸結核 1日 1回 1cc. 皮注又は 静注
		結晶㊟ 1瓦 品切	
鹽酸エメチン液「フタバ」 4% 鹽酸エメチン溶液	フタバ	1.1cc. 5管	㊟ Emetin Hyd. Cl. C ₂₀ H ₄₀ N ₂ O ₄ 2HCl 白色, 結晶性, 水に易 溶無臭, 苦味, 極量 1 回 (皮注) 0.05

イメチン製劑

品名組成	製造元 製薬元	包装価格	醫効用量
鹽酸エメチン注射液「萬有」 ㊟	萬有	4% 1cc. { 5管 1.10 50管 9.05	
鹽酸エメチン注射液「タナベ」 ㊟	田邊五	4% 1cc. { 5管 1.10 50管 9.30	
鹽酸エメチン液「三研」 ㊟	三菱藥品 (福井七)	2% 1cc. 5管 1.10 4% 1cc. { 5管 1.10 50管 9.50	
鹽酸エメチン液「シオノ」 ㊟	塩野義	1瓦 3.00	
Emetin "Takeda" タケダ複方鹽酸エメチン注射液 鹽酸エメチン 3%, 鹽酸ツエフア エリン 1%を含有す	武田	1cc. 5管 1.10	アメーバ赤痢 1回 1cc. 皮注又は静 注
鹽酸エメチン注射液 鹽酸エメチン 4%溶液	塩野義	4% 1cc. { 5管 1.10 50管 9.50 4% 50cc. 8.80	アメーバ赤痢 1cc. 皮注又は静注
Emetin Bismuth Jodide ㊟ 沃度蒼鉛エメチン丸 エメチンの沃度蒼鉛鹽のケラチン 衣丸	三共	(0.015) 48個 2.30	アメーバ赤痢 1回 4粒 1日 3回
Emetin Bis, Jod. ㊟ 沃度蒼鉛エメチン エメチンの沃度蒼鉛鹽	全	末 { 1瓦 3.20 25瓦 70.00	アメーバ赤痢 1日量 0.1—0.15 内服
沃度蒼鉛エメチン エメチンの沃度蒼鉛鹽	フタバ	1瓦 品切	
沃度蒼鉛エメチン エメチンの沃度蒼鉛鹽	塩野義	1瓦 品切	
Emetin Hydrochlorid ㊟㊟ 鹽酸エメチン 吐根中のエメチン鹽酸鹽	全	㊟ 1瓦 3.00 ㊟ 1cc. { 5管 1.10 50管 9.50 50cc. 8.80	アメーバ赤痢 肺チストマ治療劑 末は 0.01—0.03 瓦を 2%液となし毎日又は 2—3 日毎に 1—3 回 皮注又は静注 注射液は 1—3 日毎に 1回皮注又は静注


品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Emetine Hydrochloride ㊦ Amp "Willow" 鹽酸エメチン注射液「ウィロー」 吐根の有効成分	柳 韓	1% { 6管 2.55 1cc. { 12管 4.80	アメバー赤痢 肺ヂストマ 毎日或は隔日1回1cc. 皮注
Emol エモール ブロムの有機化合物を主成分とする注射液	順天堂 醫化學 (川邊五)	2cc. { 5管 2.00 12管 3.50 50管 14.00 30錠 0.70 60錠 1.30 250錠 4.00 小児用 { 5管 1.60 1cc. { 12管 2.75	鎮吐劑 1回2cc. 宛皮注 内服1日3回2-3 錠宛 (如飯後服, 胃液, 船暈, 吃逆)
Emon エモン トリアセチル・ビスオキシ・フェニ ルイサチン	小林 藥化學	純粉末 5瓦 2.70 10倍散 25瓦 1.58 50倍散 { 25瓦 0.50 100瓦 1.72 0.005 { 20錠 0.22 50錠 0.43 100錠 0.79 500錠 3.58 1000錠 6.72	緩下劑 純粉末 1回 0.005-0.015 10倍散 1回 0.05-0.15 50倍散 1回 0.25-0.8 錠 1回 1-3錠
Enarmon エナルモン (尿性) 男性ホルモン製劑 (テストホルモ ン) (b.U.=鷄冠單位...ケラール氏)	帝國機器 (武田)	0.5cc.=15 b. U. 5管 6.70 0.5cc. { 10管 13.00 30管 36.50 1錠 5 b. U. 20錠 3.50 50錠 8.50 100錠 16.00	男性ホルモン 注射-毎日又は隔日1 回15-30單位 (0.5- 1.0cc.) 筋注 内服-1日3-6錠
Enasin エナジン リポイド, 蛋白, 脂肪を含有する 全免疫體 (Omnadin, Erstin, Omnin, Multin, Stimin 参照)	川邊五 川邊元	1cc. { 10管 1.40 50管 6.00 2cc. { 10管 2.20 50管 10.00	非特異性免疫元 毎日又は隔日2cc. 皮 注又は筋注

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Endojodin エンドヨチン (舊名ヨチサン) ヘキサメチル・ジアミノ・イソブ ロパノールチヨチツド溶液 (ヨードの窒素結合體)	バイエル	2.0cc. 10管 5.25	無痛沃度注射劑 毎日1-2cc. 皮注, 筋 注又は筋注 (動脈硬化, 癩瘡, 喘息)
Enex エネツクス 副腎皮質ホルモン製劑 (Interenin 参照)	川邊五	1cc. { 5管 3.00 30管 15.00	惡阻治療劑 1日1-2回1cc. 皮 注又は筋注
Enfusin エンフシン 朝鮮産延胡索有效成分	三 共	1% 1cc. { 5管 1.35 10管 2.20	神經痛治療劑 1回 0.5-1cc. 局所皮 注
Enocal エノカール 無色澄明液にして注射後肺臓毛細 管に達して初めて膠質性第三磷酸 カルシウムを發生す	東京新藥 研究所	10cc. { 5管 1.20 10管 2.00 20cc. { 5管 1.60 10管 3.00 末 { 100瓦 2.50 500瓦 11.00	カルシウム適應症 毎日20-40cc. 筋注又 は皮注 (結核性肋膜炎, 丹毒, 骨結核)
Enosan-A ㊦ エノサン A 液狀乳酸菌製劑	榎 本	液 { 100cc. 1.00 200cc. 1.80 400cc. 3.20	整腸消化劑 1日3回1回5-10cc. 食前
Enspamol ㊦ エンスパモール 1cc.中 { 硫酸アトロピン 0.0002 安那加 0.03	三 共	1cc. { 5管 0.60 10管 1.00 50管 3.50	鎮痙強心劑 4-6歳児 1回 0.7- 1.0cc 1日 3-4回皮 注 (小児の全身痙攣, 痙攣 痙症状に對して)
Enspan ㊦ エンスパン 1cc.中 { 硫酸アトロピン 0.0002 安那加 0.03	大本藥品	1.1cc. { 10管 0.90 50管 3.50	鎮痙強心劑 4-6歳 1日 3回 0.7- 1.0cc皮注
Enterol エンテロール Subtilis 菌屬株を主體とせる拮抗 菌製劑	アルゼー ルトミー	末 { 28瓦 0.50 100瓦 1.20 250瓦 2.80 500瓦 5.00 0.3 { 50錠 0.70 200錠 2.50	整腸劑 1日 1.5-3.0瓦分3 (6-9錠)

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Enteronon エンテロノン 乳酸菌製劑 (糖化菌含有)	日本 藥品洋行	末 { 25瓦 0.35 100瓦 1.00 225瓦 1.90 450瓦 3.50	整腸消化劑 1日 1.0-3.0 瓦分3
Enteropathin エンテロパチン 珪酸と珪酸アルミニウム鹽及び乳 酸菌, ヴイタミンB製劑	全	末 { 200瓦 0.60 500瓦 1.20	吸着整腸劑 1回 1.0-5.0 瓦
Entero-Vioform エンテロ, ヴイオフォルム	Vitamin-B 参照		
Entra (5) エントラ (舊名エントラスチン) 白陶土グリセリン, ウインターグ リーン油泥膏 (Antiphlogistin, Exihos 参照)	田邊五	膏 { 100瓦 0.50 250瓦 1.00 500瓦 1.70 2キロ 5.40 5キロ 11.00	巴布劑 患部に約1分位の厚さ に塗布
Enzeima エンツアイマ 純正酵母製劑 (Wakamoto, Ebios 参照)	エンツア イマ製藥	末 { 25瓦 0.48 100瓦 1.60 250瓦 3.30 500瓦 5.70 0.25 { 70錠 0.45 150錠 0.80 360錠 1.60 900錠 3.60	食慾亢進劑 1回 1-1.5 (4-6錠) 毎食後又は食前
エフェドリン製劑			
Ephednaline (5) 三研 ¹ エフェドナリン 1cc. 中 { 鹽酸エフェドリン 0.03 アドレナリン 0.0003 クロレトーン 0.05	三菱藥品	1cc. { 5管 0.80 10管 1.40	喘息, 百日咳 1回 0.5-1.0cc. 皮注 又は筋注
Ephednon (5) エフェドノン { 鹽酸エフェドリン 4% 硫酸アトロピン 0.03% パントボン 0.5%	小林 藥化學	1.1cc. { 5管 1.05 10管 1.90 50管 8.50	鎮咳劑 1日 1-2 回皮注 (百日咳, 喘息)

品名組成	製造元	包装價格	醫効用量
Ephedralin "Merck" (5) エフェドラリン ¹ メルク ¹ エフェドニン, パラネフリンの合 劑	メルク (シユ ミツト)	1cc. 6管 2.55	喘息治療劑 1回 1cc. 皮注
Ephedrin "Nagai" (5) エフェドリン ¹ ナガイ ¹ 麻黄アルカロイド鹽酸鹽 フェニル・メチルアミノプロパノ ール鹽酸鹽, 微苦味白色結晶性粉 末 用法一内用 1日 0.05 點眼 0.3%	大日本 製藥	末 { 1瓦 1.20 5瓦 4.50 25瓦 19.60 5管 0.80 4% 1cc. { 10管 1.40 50管 6.00 (0.025) (5) 10錠 0.70 20錠 1.10 50錠 2.70 100錠 5.00 500錠 23.50 病院用 1000錠 33.00 (10倍用) 末 { 25瓦 2.50 100瓦 7.90	喘息百日咳 鎮咳劑 末 1回 0.025-0.05 注 1回 1cc. 錠 1回 1-2 個 點眼 0.3-0.5% 液
三共 ¹ エフェドリン (5)	三共	純末 { 1瓦 0.90 5瓦 3.50 25瓦 16.20 (10倍用) 末 { 25瓦 1.85 100瓦 6.90 (0.025) (5) 10錠 0.50 20錠 0.75 50錠 1.50 100錠 2.65 500錠 11.50 1000錠 21.50 5% 1cc. { 5管 0.75 10管 1.15	

左旋性エフェドリン(天然) プソイド, エフェドリン (左旋性アドレナリン天然)



1-Phenyl-methylamino-propanol M.P. 216°-217° d,l-Phenyl-methylamino-propanol M.P. 186°-188° l-Orthodioxo-phenylethanol-methylamin

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ephedrin 「萬有」エフェドリン	萬有	1瓦 1.25 末 { 5瓦 4.50 25瓦 19.80 10倍散 末 { 25瓦 2.50 100瓦 7.90 10錠 0.70 20錠 1.10 0.025 { 50錠 2.40 100錠 4.30 500錠 19.00 5% 1cc. { 5管 0.80 10管 1.40 瓶入 25cc. 2.00	
「マルイシ」エフェドリン	丸石	1cc. { 5管 0.75 10管 1.32 1瓦 1.45 結晶 { 5瓦 4.50 25瓦 22.00 10倍散 { 25瓦 2.50 100瓦 8.20 10錠 0.65 20錠 1.00 0.025 { 50錠 2.40 100錠 4.50 500錠 17.50	
「マルコ」エフェドリン	マルコ	末 { 1瓦 5瓦 10瓦 25瓦 50瓦 10倍散 { 100瓦 500瓦 4% 1cc. { 10管 1.05 50管 5.00 0.025 { 10錠 0.65 20錠 1.00 50錠 2.50 100錠 4.50	
「シオノ」エフェドリン	塩野義	10倍散 { 25瓦 2.40 100瓦 7.80 4% 1cc. { 5管 0.80 50管 6.00 10錠 0.60 20錠 1.00 0.025 { 50錠 2.30 100錠 4.40 500錠 20.00	

品名組成	製造元	包装価格	醫効用量
Ephedrin "Merck" エフェドリン「メルク」	メルク (シユ) (ミツト)	純末 { 1瓦 1.20 5瓦 3.40 10瓦 5.30 25瓦 13.50 0.05 { 5管 2.25 10管 3.90 100管 35.20 0.05 { 10錠 1.60 20錠 2.20 200錠 17.30	
Ephedrine Hydrochloride "Willow" 塩酸エフェドリン「ウィロー」	柳 韓	末 5瓦 6.00 カプセル (0.025瓦) { 40個 10.70 100個 24.00 1cc. { 6管 1.20 3% { 12管 2.25	鎮咳、解熱、喘息 1日 2-3回 0.025-0.05 錠
Ephetol エフェトール 粉末は麻黄全アルカロイド抽出體にしてエフェドリン約 5%其他のアルカロイド約 5%を含有 注射液はエフェドリン 4%とベプトンの混合溶液	いりしや	末 { 25瓦 2.20 100瓦 7.40 1.1cc { 5管 1.20 10管 2.20	喘息、百日咳 治療劑 末 1日量 1.0 注 1日 1-2回 1cc. 宛皮注
Ephetin エフェチン 桔梗根及麻黄の有効成分	東洋 新薬社	500瓦 2.00	鎮咳祛痰劑 1回量 1.0-2.0 瓦
Ephetonin "Merck" エフェトニン「メルク」 人工フェニルメチル・アミノプロパノール (ラセミ體) (dl-ブソイドエフェドリン)	メルク (シユ) (ミツト)	純末 { 1瓦 2.40 5瓦 9.50 10瓦 18.50 25瓦 44.65 0.05 { 5管 1.30 10管 2.50 0.05 20錠 2.20 軟膏 10瓦 1.70	エフェドリン 代用藥 1回量 0.05
Ephetonal "Merck" エフェトナール「メルク」 パラアミド・フェニルメチル・アミノプロパノール	全	0.05 { 10錠 1.90 20錠 3.35 3管 1.75 1cc. { 5管 2.80 10管 5.05 100管 42.55	エフェドリン 代用藥 エフェドリンに同一に 用ふ