

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十九

諸血門

吐血衄血

附

明 周王朱楠 撰



廿

夫口鼻之中俱出血者由因勞熱而成是以血者本屬
於心經脈流行不暫停滯一闕不利百病俱生或有憂
悸之所因或有卒驚之所致此皆食飽過度飲酒勞傷

壅滯積蓄於心胃熱毒薰蒸於肝肺藏腑既蘊邪熱則
血流散上行故令吐血而致鼻衄也

方

天門冬湯

出醫方大成

治思慮傷心吐衄不止

遠志

去心甘草水煮

白芍藥

天門冬

去心

黃芪

去蘆

藕節

阿膠

蛤粉炒

沒藥

當歸

去蘆

生地黄

各一兩

人參

甘

草

炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分法滓溫

服不拘時

刺薊散

出聖惠方

治吐血衄及大小便下血不止

刺薊

白芍藥

白朮

人參

去蘆頭

生乾地黄

鹿角膠

搗碎炒令黃色各一兩

芎藭

桂心

黃芩

各半兩

右為散不計時候以生地黄汁調下二錢

竹茹散

出聖惠方

此吐血衄血此為內損或勞傷所致

青竹茹

白芍藥

芎藭

桂心

當歸

各一兩

生

乾地黄

三兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時候
溫服

伏龍肝湯

出千金方

治五臟熱結吐血衄血嘔血

伏龍肝

雞子一枚

生竹茹

升

芍藥

當歸

黃芩

芍

藟

甘草

各二兩

生地黄

右以咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下藥取三
升分作三服一方有桂心

人參散

人參 黑豆 燈心 淡竹茹 放棒行 扁栢

腦 茅根 紫萍

右等分以咀同煎服或為細末以紅酒調下

地黄散

一名生地黄 飲出千金方

治口鼻皆出血血上行胃心氣急

及大便秘血

生地黄

八兩

蒲黃

升

地骨皮

五兩

黃芩

去黑心

芍藥

生

竹茹

各三兩

右以咀以水八升煮取三升七分溫三服

當歸湯

出聖惠方

治衄血吐血不止心胃疼痛

當歸 乾薑 芍藥 阿膠

各二兩

黃芩

三兩

右以咀以水六升煮取二升分三服一方為散以生

地黄汁調三錢

扁栢散 治男子血旋

汭街草 梔子葉 地竹 扁栢

右等分先將蒜薑水研淺鍾飲之令睡隨後將四件

用水二碗煎至淺碗服

黃芩芍藥湯

出醫方大成

治虛家不能飲食衄血吐血

一方治鼻衄

黃芩 白芍藥 甘草

各等分

右以咀以水二盞煎一盞服一方加生薑黃耆

鬱金散

出聖惠方

治吐血衄血不止

鬱金 木香 飛羅麩 黃蘗

各一兩

甘草

一兩半炙赤微判

右為散以生地黄汁一大盞旋拌藥後焙令乾又拌

之地黃汁盡為度再搗細為散不計時候煎青竹茹

湯調下二錢

藕汁散 出聖惠方 治吐血衄血不止

生藕汁 生地黄汁 各三合 大薊汁 三合 生蜜 半匙

右和令勻每服一小盞細細令呷之不拘時候一方有牛蒡根無大薊根

蒲黃飲 治吐血鼻衄不止

糯米 炒 蒲黃 青黛 白麩 各一兩

右為末水調五錢服

麥門冬飲子 出聖惠方 治吐血衄血至一斗不止者宜服

生麥門冬汁 五合 生刺薊汁 五合 生地黄汁 五合

右相和於銀鍋中略煖過每服一小盞調伏龍肝末一錢服

茅蘇湯 出直指方 治吐血衄血

茅花 三錢 紫蘇莖葉 二錢

右判為呔咀以新汲水一碗煎至七分去滓乘熱調

生蒲黃二錢漸漸服仍以蒜兩顆煨熟搗扁貼敷兩

脚中心少頃自覺胸中有蒜氣其血立止若下部出

血可以煨蒜敷手心尤佳

白芍藥散出肘後方治咯血衄血

白芍藥一斤犀角末一分

右為末新汲水服一錢以血止為度

雞子白丸出聖惠方治吐血衄血

雞子白三箇好香墨二兩

右擣蜜為末以雞子白和丸如梧桐子大不計時候以生地黄汁下十九

蛤粉散出百一選方治吐血兼治衄血

右用蛤粉白膠香等分以好松烟墨汁調服

胡黃連散 治吐血衄血

生地黄 胡黃連各等分

右為末用猪膽汁為丸如梧桐子大每服五十九臨

卧煎茅花湯送下

茅花湯出百一選方治吐血衄血

用茅花不計多少煎湯服

治吐血衄血不止

用乾石榴皮末吹鼻立止

蘿蔔飲

一名萊菔飲
出楊氏家藏

治諸血熱吐血衄血

用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生
蘿蔔只用蘿子一分微炒紫蘇葉莖半分剉散用煎
亦効一方用蘿蔔汁入鼻中

治吐血鼻紅

用生薑一分搗絞汁並壯健丈夫便一升乘熱頓飲

瘥

治吐血鼻衄

用茅香花煎湯服方

又方

用陳紅米泔水一鍾溫服

三豆湯

出朱氏
集驗方

治飲酒太過衄血吐血起則無事睡則

甚服諸藥不效服此而愈

烏豆 赤小豆 菘豆

右各等分渾水服

瀉心湯

一各三黃湯
出澹寮方

治心氣不定吐血衄血

大黃

三兩

黃連

黃芩

各一兩

右咬咀以水三升煮取一升頃服之宜食前通口服亦能治霍亂之疾神效加生地黃青水煎四服大便秘利便愈或曰心氣不足可更瀉乎仲景曰若心氣獨不足不當有衄血也必邪熱因心不足以容之故吐血衄也以苦泄其熱則以苦補其心蓋兩全之有是

證者無不取效量虛實與之

治吐血衄血

出危方

用山梔子燒灰穀醋調服一方用梔子甘草每服三錢煎五分溫服

黃芩散

出聖惠方

治吐血衄血或發或止皆心臟積熱所致

宜服

用黃芩一兩去心中黑腐為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時和滓溫服

察衄血一月者肘得方去暴驚所為出聖
以救羊血熱飲之即瘥一方新羊血慎勿刺羊取血
神道不祐當無差也

鼻衄 附論

夫脾移熱於肝則為驚衄脾土也肝木也木本剋土今
脾熱為土氣翻盛逆往乘木是木之虛不能制土故受
脾之移熱也肝之神為魂而藏血虛熱則魂神不定故
驚也凡血與氣內榮臟腑外循經絡相通而行於身周

而復始血性得寒則凝澀熱則流散而氣者肺之所主
也肺開竅於鼻熱乘於血則氣亦熱也血氣俱熱血隨
氣發出於鼻為衄也診其寸口脈微芤者衄血脈微若
寒為衄血也寸口脈微弱尺脈澀兼弱而弱為無血必
厥其人微嘔夫當眩不眩而及頭痛痛則為實下虛上
實必衄也肝脈不和為衄脈陰陽錯而浮必衄血脈細
而數及在上法當吐而不吐其面頰上小赤眼中白膚
上目有細赤脈如髮直趣至黑腫子者當衄病人面無

色寒熱脈沉絀者衄也發從春夏為太陽衄從秋至冬為陽明衄連日不止者其尺脈必動動則睛上浮白白上浮黃若目睛明慧而僅衄血未止脈滑小弱者生實大者死衄血而脈小滑者生大躁者死鼻衄脈沉細者生浮大而牢者死養生方云思慮則傷心心傷則吐血衄血也孫思邈曰鼻頭衄者亡血設令微赤非正者死病人色白昏亡血也凡時行衄不宜斷之如一二升以上恐多者即以龍骨末吹之即愈以至九竅血俱出者

謂之大衄膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出血汗者謂之衄衄治法各有方

方

剋效方

出聖濟總錄

治鼻衄

甘草炙桑耳焙各三分枳殼去穢大黃剋炒麥門冬去心

槐實炒各一兩半白芷雞蘇葉百合黃耆剋

白前連翹

檳榔各一兩薑黃二兩

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八

分去滓溫服

雞蘇丸

出如宜方

治肺熱腦中鬱熱衄血兼治血淋吐血口

臭等證

方見本門諸失血類

治鼻衄及暴下血

出本草

右煮白茅針服之成白花者功用亦同針即茅筍也

治衄血

出本草

用車前葉生研水解飲之甚善

治鼻衄

出本草

以椰子皮煮汁服之

伏龍肝湯

出千金方

治鼻衄

伏龍肝

半兩

芎藭

一分

細辛

去苗葉半兩

白芷

藥 甘草

炙對吳茱萸湯浸一宿與大豆同炒去豆各一兩

右麤搗篩每服三錢酒一盞煎至七八分入生地黃

汁一合更煎一二沸去滓溫服日三一方酒水同煎

門冬飲子

一名人參飲出試效方

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短

少衄血吐血

人參五分 黃耆二錢 五味子五箇 芍藥一錢 甘草一錢 紫苑一錢
半一方 當歸身 麥門冬 不用

右吹咀分作二服每服水一觥八分煎一觥去粗稍熱服食後一方無紫苑

比金丸 治邪熱上攻鼻衄煩悶

鬱金雪水煮令透 白茯苓去黑皮 白石英 紫石英

水銀各一分 甘草生剉一分 龍腦研半錢 黑鉛半錢與水銀銅鍋炒

右除沙子外搗研為末用黃牛膽汁和丸如彈子大

每服一九煎甘草湯放冷磨下

伏龍肝散 治五臟熱結鼻衄心胸煩悶

伏龍肝 當歸 赤芍藥 黃芩各二兩 犀角屑

刺薊各一兩 生乾地黄三兩

右為散每服五錢水一大盞入青竹茹一雞子大煎至五分去滓溫服

加味理中湯 治飲酒過多及痰灸燻熱食動血發為

鼻衄

人參 白朮 甘草炙 乾薑炮 乾葛 川芎各等分

右為散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

蒲黃散 治鼻衄

蒲黃 栝子仁研 當歸切焙 阿膠炙 椶櫚燒存性 亂

髮灰研各一錢

右搗研為散每服二錢生藕節自然汁調下如肺損吐血用地黃自然汁調下腸風下血用糯根皮煎湯調下婦人帶下艾湯調下

生地黄湯 治上熱衄血

生地黄洗酥 阿膠炒酥 川芎 北梗 蒲黃 甘

草生各半兩

右剉碎每服三錢水煎熟入生薑汁二匙溫服

麥門冬散 治鼻衄

生地黄三錢 生麥門冬三錢 生薑一錢 白朮 蒲黃各二錢

白蜜合一

右搗細以井水二大碗煎七分分兩服

止血散 治氣虛發衄無比神效方

黃芪六錢 赤茯苓 白芍藥 當歸 生地黄各三錢

阿膠各三錢

右為末每服二錢煎黃耆湯下為剉散亦可

生地黄湯 治鼻衄

生地黄八兩 黃芩一兩 阿膠 甘草各二兩 柏葉把

右以水七升煮至三升去滓內膠煎取二升半分三服

睡黃散 治鼻衄

芡實一兩半 雄黃研 馬牙硝 甘草生剉各半兩 牛黃一研

右為散每服二錢用猪膽汁與新汲水調下相次便睡微有汗出為效如時氣黃發舌脹咽喉腫及熱極者如前法斟酌多少服之

黃連散 治大人小兒熱氣盛熱乘於血血隨氣散溢於鼻者謂之鼻衄血得寒則凝澁結聚得熱則流散

妄行

黃連 黃栢 栢葉 甘草 各等分

右為末每服二錢水一盞豉二十粒煎五分溫服

涼血地黄湯 治勞中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切

丹毒

生地黄 赤芍藥 當歸 川芎 各等分

右以咀水煎去滓量大小加減鼻衄加蒲黃生瘡加

黃芩丹毒加防風

川芎三黃散 治實衄血

大黃 濕紙裏蒸 川芎 黃連 淨 黃芩 等分

右為末每服二錢井水調服食後

三奇散 治衄血不止

亂髮灰 一錢 人中白 半錢 麝香 一字

右為細末鼻內嚙少許立止一方不用麝香以髮灰

人中白為末湯調服立止

龍麝散 治鼻衄

伏龍肝半兩麝香一錢羊脛炭皮拍碎炒令通赤一兩

右細研如粉每服二錢冷水調下或研小蘗汁調下亦得

明膠散 治肺積熱極衄血吐血一名伏龍肝散方見本門

肺臟壅熱吐血類

傳効衄方以竈下黃土吹斷又取井底青泥封面上數易之

又方

生地黄三兩研取汁生薑半兩研取汁阿膠半兩杵碎炒令黃燥為末

右以生薑地黃汁入阿膠末和勻於銀器內煖過漸漸服之兼治吐血

又方出聖惠方

豉二合艾葉如雞子大鹿角膠二兩杵碎炒黃燥

右右以水二大盞煎取一盞二分分為三服徐徐服

地金湯出聖濟總錄治鼻衄

生乾黃黃焙生乾藕節各二兩

金匱要略

卷一百八十九

右細剉如麻豆每服三錢水一盞煎至六分去滓食後卧卧温服

玉塵散 出聖濟總錄 治肺癰鼻衄

白麩 若葉灰 各三錢

右研令勻分為三服食後并花水調下

刺薊湯 出經驗良方 治鼻衄

大薊根 一兩 相思子 半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓放冷服

地龍散 出肘後方 治鼻衄及膈下盛熱

乾地黄 龍腦薄荷 各等分

右為細末冷水調下

又方 出危氏方

槐花 烏賊魚骨 各等分

右半生半炒為末入鼻

又驗方 出肘後方

以白茅新生腹中裹白胎長五六寸者取一握五升

欽定四庫全書

普濟方

七

水煮取一服又芍藥末吹鼻中

又方出千金方治鼻衄

以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中一方冷水麩漿調服

又方出千金方

以亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益之吹以血斷止并水服方寸匕日甚者日夜二已困不識人者服亦佳一方用好墨入點法醋并水調下

又方出千金方

取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止一方於五月五日修同上

又方出千金方

又濕布薄胸止

又方出千金方

又溽酢和土塗陰囊上乾易之

又方出千金方

以韭根蔥根取汁滴鼻中着一棗大內鼻少時更著
兩三度瘥蔥白搗汁亦得

白芨散 一名世寶散
出三因方

治鼻衄立效嘔血咯血肺損或食

飽負重得者服之愈

用白芨不拘多少為末冷水調用紙花貼鼻竅中效
一方用雪水調如無以新汲水調自兩眉際傳至鼻
上以編子緊繫頭摺紙繫令緊時蘸冷水挹藥上飲
項即止去藥

又方 出千金方

用黃膠即阿膠盪令軟貼鼻竅中鼻頭至頂及髮際
三寸止一方鎔膠糊鼻帛貼額上仍未雄黃綿裹內
下部舉身熱衄

畫粉方 出瑞竹堂方 治鼻衄血出不止一二服除根

用白土即畫匠所用畫粉極細研每服五錢新汲水
調服止

治鼻衄 出經驗良方 治大人小兒鼻衄乃血熱不循經而壅

從鼻出也血隨其方氣而肺主氣外屬鼻故出血也
以春冬衄者用生地黄研取汁加蒲黃少許砂糖并
花水調和浸服之愈秋夏衄者用車前草研取汁同
生薑汁蜜并花水和飲之即愈先用淳塞兩鼻四時
衄者生蘿蔔搗汁同生薑汁蜜和井水調飲之良四
時皆可用蘿蔔汁仰頭滴入鼻中即止

又方 出經驗良方

用伏龍肝不以多少為末以荊芥汁調下即止

又方

用雞脚草接水喫以淳塞鼻

又方 出經驗良方

用白藥煎剉碎燒灰存性大紅棗剉碎燒灰存性二
味為糯米飲湯溫服一方煎湯洗鼻頻縮藥入鼻

又方 出經驗良方

以青黛為丸用肥棗開劈去核入青黛在內濕紙包
慢火煨一餉待冷細嚼新汲水吞下

治鼻中出血

用茅屋上青苔曰屋油以新汲水研一盞浮滓與服其血立止

枇杷葉方

用枇杷葉去毛焙乾為末用茶調下一二錢日三亦

治鼻赤

治鼻齟血

以左臂血用紙撚點血左眼右亦如之

又方

以好麻紙撚絛鼻中頃之打嚏即愈此方甚奇有人一夕常衄盈盆百藥不效用此遂愈

治衄血

以燈盞數枚以百沸湯煮逐枚漉出乘熱安頂上冷即易之又蒲黃二錢先用新汲水調下老人不用次用米腦細研以熟馬糞汁調上件腦子用鵝毛羽掃入鼻中立止馬糞熟即有汁冷無汁又赤芍藥末冷

水調服又五倍子一兩為末新綿燒灰等分米飲調下
下譙知閣患病用此而愈

搗鼻方 治鼻衄

用駝糞不以多少用新藏餅一箇打開底入糞在內
燒成灰取出研細用麝香少許研勻隨衄血鼻搗之
一方無麝香為乾末搗鼻中

防已散 治鼻衄

用防已三兩三搗羅為散每服二錢新汲水調下老

兒酒調一錢服更用熱湯調少許鼻中嗅氣佳亦用
糯米飲調下

烏沙散 一名香黑汁 治鼻衄

用細烟香墨二兩為細散每服一錢臘茶清調下或
濃磨以蔥白蘸塞鼻中或點入鼻內亦可一方取汁
磨墨滴鼻中

吹鼻方 治鼻衄吐血

用栢葉石榴花為細末每用少許吹鼻中亦用花片

塞於鼻中止

貼背膏 治鼻衄

用京三稜大者一枚以濕紙裹於慢火中煨熟乘熱搥碎搗為細末醋煮麩糊調貼背第五椎上

貼鼻方 治鼻衄

用鹿角膠不計多少以沸湯浸軟貼鼻拗上更以麩麩調令稀稠得所若左竅出血則塗右邊右竅出血則塗左邊

劄耳方 治鼻衄

用延胡索為末以綿裹劄耳內左衄劄右右衄劄左左右俱衄則兩耳俱劄

葱白汁 治鼻衄

用葱白一握搗絞取汁投酒少許點兩點入鼻差

衄血方

用川鬱金木井水調下亦治吐血

又方

用槐花半生半炒末入鼻

一方治鼻衄

以鯉魚鱗炒成灰研為末冷調下一二錢一用頭髮燒灰嚙入鼻內先口嚙水即止

治鼻衄方

本草

用鉛白霜為末取新汲水調二字

治鼻衄出血不止心悶欲絕

用乾薑削令頭尖微煨塞鼻中

又方

用麻鞋鞵底燒灰吹鼻孔中立效亦治鼻塞

止鼻衄

本草

用香薷乾末以水服之

治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗

以新汲水磨黃藥子一碗勿令絕稀頓服立瘥

又方

用藕節取汁服之或滴入鼻中

又方

用故屏風紙燒灰細研溫酒調下一錢立止

又方

用貝母二兩炮黃搗羅為末以漿水調二錢服良久

再服

又方

用穀精草為末以熱麪湯調下二錢

治鼻大衄有效

右用貫衆根為末調服一錢七止鼻血有效

治鼻衄

右用刀刮指甲末吸入鼻內即止

治卒鼻衄 出聖惠方

右取水一罐鑽底小小孔令射病人頂上名音門以新汲水四五罐即止音門立頂後宛中淋不過一兩

罐即止

又方 出肘後方

右水和粉一升如粥飲之立瘥

又方 出千金方

右綿裹白馬矢赤馬矢亦好塞鼻又新馬矢悉可用甚者飲汁一二升無新者水浸乾者用新尿汁灌鼻中亦效一方用赤馬通

又方 出肘後方

右苦酒漬綿塞鼻

又方 出肘後方

右左孔衄縛右足小指右孔亦如之兩孔衄皆縛

又方 出聖惠方

療人少小亟鼻衄小勞輒止及大人小兒鼻

衄血犯着便出者用桑耳不計多少炒令焦搗下每衄發輒以杏仁大塞鼻數度即可斷

又方 出聖惠方

右以鹽半兩炒碾為末分為二服以冷水調下未止更服

又方 出聖惠方

右以槲葉搗絞取汁每服一小盞頓服即止

又方 出聖惠方

右以胡粉炒令光黑以醋調一錢服之即止

又方生地黃湯 出千金方 治鼻衄昏迷不省昔有婦人經血

半年不行因見地黃汁飲數盃後即通利是知地黃

治血甚驗

又生地黃三五斤取汁使患者生喫吸汁三斤許又

以其滓塞鼻須臾血止服汁尤佳一方用一兩細剉

於銀石器中以酒一中盞煎三沸去滓頓服其血立

止一方煮服之忌酒炙且服粳米朱氏集驗方云昔

汝州牧因驗屍有保正趙溫不詣屍所問之即云衄

血以數斗昏困欲絕遂使之扶掖以來鼻血如簷溜

平日所記治衄數方即合藥治之血勢皆衝出謂治

血莫如地黃遣人尋生地黃得十餘斤不暇取汁因

使之生喫漸及三四斤又以其滓塞鼻須臾血定後

子婦吐血有醫者教取生地黃自然汁煮飲之日服

數升三日而愈昔有一婢病經血半年不通見釜中

飲汁以為弃去可惜輒飲數杯隨即通利地黄活血

其功如此地黄但用新布拭之淨搗汁勿用水洗

立効散一名龍骨散治鼻中衄血及咯吐血不止

用龍骨一兩搗碎以水一大盞煎至半盞溫溫盡服

一方用五色者煨研細末吹一缸豆許鼻中立止

又方出聖惠方

用生葛根搗取汁每服一小盞三服即止

又方

用垣衣搗絞取汁每服一小盞頻服

吹鼻散出聖惠方治鼻卒血

用釜底墨細研以少許吹鼻中即止

塞鼻散出聖惠方治鼻衄

用蝟皮一枚燒灰細研每服半錢綿裹內鼻中數易

之一方燒末吹鼻中

又方出聖惠方

用蒼耳莖葉搗絞取汁每服一小盞頻服

又方出千金方

飲小薊汁良一方用根生搗汁飲

止鼻紅水出肘後方

右調決明子貼腦心

黃耆芍藥湯出談效方治衄血多歲面黃眼澁多眵手麻木

黃耆三兩炙甘草三兩升麻一兩葛根半兩羌活半兩芍藥一兩

右吹咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓溫服之十

五服而愈六脈細弦而瀋按之空虛其色必白而兼不澤脫血也也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精氣

七蒸方出朱氏集驗方治鼻衄

鹿茸七兩分七處蒸酸棗仁半兩去殼石蓮肉半兩去心白茯苓一兩

兔絲子一兩淨洗肉蓯蓉一兩益智仁一兩去殼北茴香半兩青鹽

白拌

右將鹿茸切片半分作七味用碗七隻各蒸一味以

好酒一升每處用藥一味同侵一宿連碗排飯上蒸
飯熟取出為度和勻焙乾為末以山藥十兩煮糊為
丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十九至一百丸棗
湯下

獨聖散

出朱氏
集驗方

治鼻衄

用鏡面草又名螺屬草水洗搗爛入酒濾去滓取汁
服

枯骨丸

出指
南方

治吐血衄血

烏賊魚骨 蔞茹等分
右為細末雀卵和丸小豆大每服五丸鮑魚汁下

阿膠散

出指
南方

治陰虛衄血

黃耆 白朮 桔梗 甘草 山藥 阿膠各等分
右為麤末每服五錢水二盞取一盞去滓服

煎金散

出指
南方

治鼻衄

右煎金花連莖葉不以多少陰乾用濃煎汁溫服立
效

治衄血四方 出十便良方

一喫生蔥四五莖淬赤大頭一箇於醋中時時啜之
一滴水於硬地上磨大蒜作泥膏隨左右貼脚心立
止仍以冷水便洗令淨

一緊紙實塞耳中此方取法於酒注也

一搗諸葛菜或水蘇或蘿菔菜取汁喫一盞

治鼻衄 出本草

用粟米粉水煮服之

鼻衄方 出本草

以桔梗為末水服方寸匕日四五亦治吐下血

治鼻洪 出本草

以白茅香花塞鼻中

治鼻衄 出本草

以珊瑚末吹鼻中

止衄 出本草

用草麻葉油塗炙熱熨顙上

治鼻衄 出本草

以金瘡小草葉按碎付之又風化石灰杵為丸日乾
臨時刮敷山根上

治鼻衄 出本草

右取壁錢蠱汁點鼻中乃壁結網蜘蛛如錢圓者是
也

又方 出旅善備要方 治鼻衄

右取青蒿塞鼻中即止

治鼻紅吐血淋疾 出本草

右以船底苔并炙甘草豉汁濃煎湯旋呷

治鼻衄出血數升不知人事

右石榴花與栢葉等分為末吹鼻中

鼻血不止 附論

夫榮氣之行常與衛氣相隨則氣與血未嘗相離肝藏
血肺主氣榮衛和平則氣血順治若人腑臟有熱乘血
氣血性得熱流溢妄行而肺開竅於鼻故其發於鼻衄

鼻衄不止者臟虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木不能克土肝藏血其神魂悸故為衄血之病

方

雞蘇飲 出聖濟總錄

治衄血不止

雞蘇

白茯苓

去黑皮

射干

各一兩半

白芷

桔梗

天

門冬

去心焙

當歸

切焙

大黃

剉炒

甘草

炙各一兩

桂

去麋皮半兩

右吹咀每服二錢以水一盞生薑三片煎取六分去

淳空腹溫服

紫參湯 出聖濟總錄

治鼻衄不止

紫參

蒲黃

生地黄

各二兩

黃芩

去黑心

赤茯苓

去黑

赤芍藥

當歸

焙各一兩

甘草

炙一兩半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入阿膠二片炙令燥同煎至七分去滓溫服不拘時候

刺薊湯 出聖濟總錄

治鼻衄不止

刺薊

黃芩

剉炒

赤芍藥

各三分

大黃

剉炒

蒲黃

二兩

側柏

葉四生乾地黄焙甘草炙各五兩

右為籠末搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服逐急以新汲水調下

刺薊散出聖惠方治鼻衄血出經日不止

刺薊 苦參 黃連去梔子仁 生乾地黄 川

大黃剉碎側柏葉各一兩

右為散每服五錢水一大盞入青竹茹半雞子大煎至五分去滓溫溫頻服

茜根散出聖惠方治鼻衄日夜不止面無顏色昏悶

生乾地黄半兩赤芍藥三分柏葉一兩阿膠半兩枰碎當

歸半兩赤茯苓三分

右為細散每服煎黃者湯調下二錢

蒲槐散出聖濟總錄治鼻衄不止

蒲黃 槐花各半兩防己 人參各一分

右搗研為散每服一錢新汲水調下食後服

子芩散出聖惠方治鼻衄不止

子芩一兩 蒲黃 伏龍肝 青竹茹各三分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓入生藕汁一合攪勻溫服

地黄丸出千金方 治鼻出血不止

乾地黄 梔子 甘草等分

右治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻有風熱者以蔥汁和丸如梧桐子大五丸

麝香散出醫方大成 治鼻衄不止

白礬枯過另研半兩 麝香另研半字 白龍骨粘舌另研碎半兩

右令勻每用一字先令冷水淨洗拭去鼻內血淡然後吹藥於鼻中以軟止濕過蘸藥鼻內尤妙

麝香散出聖濟總錄 治鼻血不止

麝香二錢 滑石木 人中白各半兩

右同研為散每服二錢熱酒調下一方有銀珠無滑石每用少許鼻搐之立効

厚朴丸出聖濟總錄 治鼻衄不止

厚朴去蘆皮 瓦礫并沙 糞堆土瓜苗心

右等分搗羅為末蜜為丸如雞頭大每服三丸蔥一握細切麩一匙鹽半錢同炒黃沸湯點下

天竺黃散出聖濟總錄 治鼻衄不止

天竺黃 芎藭各一兩 防已半兩

右搗研為散每服一錢新汲水調下肺損吐血者用藥二錢七生麩一錢七水調下並食後服

千針散出聖濟總錄 治鼻衄不止

刺薊 木賊各一分 白麩一錢

右為散每服一錢研青蒿心七枚新水調下併二服

五苓散出如宜方 治夏月伏暑鼻衄不止

澤瀉二兩半 肉桂一兩 白朮 猪苓 赤茯苓各一兩半

右為末同百草霜末茅根煎湯下

又方出聖惠方

生地黄汁一升 白蜜半兩 蒲黃二兩

右相和微煖過每服一小盞頻服上

三汁飲 出聖 惠方 治鼻中血出不斷心欲悶絕

刺薊汁 合二 生地黄汁 合一 生薑汁 合半

右調和令勻徐徐飲之仍將滓塞鼻中

生葛散 出濟 生方 治鼻衄不止

生葛根 小薊根 各半 斤

右洗淨搗取汁每服一盞盪溫服不拘時候

又方 出朱氏 集驗方 治鼻衄不止

生蒲黃 二錢 清黛 半錢

右用生藕汁作一服調下一方用井花水調下

又方 出海上 名方

黃藥子 蒲黃

右等分為細末每服二錢新汲水調下

玉粉散 出聖 惠方 治鼻衄日夜不止頭痛心煩

石膏 研 牡蠣 旁研令極細 如粉各一兩

右研勻為散每服二錢新汲水調下候血滴間斷時

再以水調藥如稀糊滴內

雞蘇散

出聖濟
總錄

治鼻衄不止

雞蘇

二兩
去八兩

防風

右為散每服二錢溫水調下更以雞蘇葉於新水內
揉軟內鼻竅即止

二花散

出聖濟
總錄

治衄血不止

酸石榴花

一分

黃蜀葵花

一分

右為散每服一錢水一盞煎至六分不拘時候溫服

車前散

出聖濟
總錄

治鼻衄不止欲死

車前子

末

牛耳中垢

等分

右和成挺子塞鼻中立止

柳枝散

出聖濟
總錄

治鼻衄不止

人參

一分

寒食楊柳枝

門傍揀
者是也

右為散每服一錢新汲水調下併二服

參蓮散

出聖濟
總錄

治鼻衄不止

人參

一錢

蓮子心

一錢

右為散每服一錢新汲水調下

通神散

一名伏龍肝散

治衄血不止心神悶亂頭旋欲倒

出聖惠方

亂髮燒灰

伏龍肝等分

右研為散每服三錢新汲水調下

蝸牛散

出聖濟總錄

治血熱衝肺血衄不止

蝸牛

煇乾一分

烏賊魚骨

半錢

右搗研為散含水一口搗一字入鼻內

吹鼻散

出聖濟總錄

治鼻衄血不止

茅花

十莖

亂髮一小團

右燒為末研勻每以少許吹鼻內

又方

出聖惠方

羊脛炭皮

二兩搗碎醋伴燒通赤

故紙

三十張多年者燒灰

右研細為散以新汲水調下三錢

龍骨散

出聖惠方

治鼻衄不止眩冒欲死吹鼻

龍骨

半兩

亂髮

一雞子大燒為灰

右研如粉以少許吹入鼻中立止

小梳散

出朱氏集驗方

治鼻衄不止昏悶欲死

右山梔子不拘多少燒為細末每用少許吹入鼻中
立止一方用竹刀破作兩邊一邊用濕紙裏煨令熟
一邊生用同研為末酒調服一方曾服燒煉藥方致
鼻血者生用煎湯解之蔡手涯云同官無錫監酒趙
庇兄衄血甚已死入殮血向未止一道人過其門聞
其家哭詢問其由道人云是曾服丹或燒煉藥子有
藥用之即活囊間出藥半錢七吹入鼻中立良久得
活

菜菔飲

出危氏方

治鼻衄不止

右用蘿菔不拘多少搗取自然汁每服一盞入鹽少
許冷服不拘時候或滴汁少許入鼻中亦用藕汁亦
可一方無灰酒服

扎指方

出濟生方

治鼻衄不止

右用線緊扎中指中節如左鼻出血扎左手中指中
節右鼻出血扎右手中指中節兩鼻出血左右俱扎
之

治鼻衄不止

右骨石白帶青色者為末和米飲服之又白茅花無花以根煎湯噉蘇合香丸雞蘇丸男女皆可服

又方

出海上方

用蘆花燒灰吹少許入鼻內即止

栗灰散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

右用宣和大栗子七枚逐一微利破連皮燒存性碗蓋候冷入麝香少許同研每服二錢溫水調下

黃藥散

出肘後方

治鼻衄不止

右黃藥子一兩為散每服二錢煎阿膠湯調下良久以新汲水調生麩一匙投之

法紙散

出聖濟總錄

治鼻衄血出不止

右病人衄血時以紙按血候滴滿紙將紙燈上燒作灰每一張作一服新汲水調下不得令病人知

燈心散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

右用燈心一兩焙搗羅為散入丹砂一錢研服服二

錢用米飲調服下

當歸散

出聖濟
總錄

治鼻衄不止

右用當歸切焙搗羅為散每服一錢米飲調下

大蒜貼足方

一名一金散
出肘後方

治鼻衄不止諸藥不效

右用大蒜一枚去皮研細攤作餅子如錢大厚一寸許若左竅出血貼於左脚心下綿繫定右竅即貼右脚心兩竅俱出即俱貼之血止即以溫水洗脚心令去蒜氣一方以摩手心亦可

治鼻衄不止

出聖濟
總錄

右用玄明粉以冷熱水調臨卧服二錢

又方

出聖
惠方

右楮葉搗絞取汁一二升漸漸溫飲之即止如未止再服

治鼻衄不止欲絕者

出經驗
良方

右以茅花無以根每服大大把細剉水兩碗煎濃至一碗分二服一方用黃茅根為末用米泔水調服下

又方

出本草

右萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷

治鼻衄不止胸中痞悶

出聖惠方

右以生水蘓即雞蘇五合香豉二合合杵研槎如棗

核大內鼻

獨聖散

出肘後方

治鼻衄不止服藥不應

右用糯米微炒黃為末每服二錢新汲水調下

治鼻血出不止

出肘後方

右以醋和糊粉半棗許服

治鼻衄久不止

出聖濟總錄

右以定州白瓷細搗研為末每抄一剗耳許入鼻內立止

治鼻衄連日夜不止眩冒欲死灌鼻方

出聖惠方

右用青箱草不限多少細剉搗絞取汁一兩合合少灌入鼻中即止一方用子

又方 出聖惠方

用生薑研汁滴入鼻中立止

治鼻衄屢醫不止 出聖惠方

右用粟殼五兩燒灰研為末每服二錢以粥飲調下

神白散 出楊氏家藏方 治鼻衄不止

蛤粉 一兩研羅 槐花 半兩炒合

右研令極勻細每服一錢新汲水調下小兒只用半

錢兼治便血不止不拘時候

寸金散 出衛生寶鑑 治鼻衄不止

石州黃藥子 半兩 土馬騮 牆上有者是 甘草 生合一分

右為細末每服二錢新汲水調下未止再服立止

治鼻衄不止或素有熱而暴作諸藥無驗 出誠効方

以白紙一張作八牒或十牒於極冷水內濕紙置頂

中熱煎斗耐至一重或二重紙乾立止

治鼻衄出血數升不知人事

用生茅根取汁每服一合立止

又方

用艾灰吹鼻中

治鼻衄不止

但服洗心散立效

治鼻衄不止

用龍鱗薜荔研水飲之大薜荔亦可

普濟方卷一百八十九

總校官候補知府 臣 葉佩蓀

校對官檢討 臣 李鼎元

謄錄監生 臣 張鵬程