

瘡腫總說
十九卷

外科精要十九卷

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫學教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提舉余

賜山

校正

瘡腫科

總說

人之身血氣周流則平若冷熱不調喜怒不常飲食不節稍有壅聚則隨所發見癰疽屬寒易治疽疔瘰癧屬熱發屬臟腑發於腦背項上最為難治徑一寸二寸為癰三寸五寸腫圓赤為癰八寸為疽癰疽瘰癧各不同其色亦異有

圖見之凡初覺響聚結熱疼痛腫赤痕癩闊硬或見或不見治之如拯溺救焚不可緩也若按而后痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而復者有膿按之強而不復者無膿炊赤腫高者為實軟恰慢冷腫者為虛初作宜宣熱按毒外以洗滌角傳以飲其痕癩是大要法也已潰則排膿止痛朝夕亦洗滌以舒其毒氣膿盡則生肌傳加次第施治不可愴惶失序亦不可拘一酌量輕重形證逆順寒則溫之熱則清之虛則補之實則吐之道以針石灼以艾炷破毒攻堅以平為期其有五善證者飲食如常一善實熱而小便澀二善肌肉好惡分明三善用藥如所科四善外無雜證五善七惡證者溺而帶大小便滑一惡內未潰

德說
十九卷

黑而陷二惡已潰青腐為危三惡發背透膜四惡未潰肉先潰面青五惡發癢六惡發吐七惡所謂五善見三必瘡七惡見四必危外證形候不治者亦五缺益平滿背脊平滿掌心平滿脚心平滿臍頭凸出逆證者有五大痛痛不止一逆聲細色脫二逆服藥嘔吐三逆睛細白大四逆肩脾全身轉不得五逆難治者亦有六證兩臉紅似坏桑心病深得之久全不腫起亦不覺痛乃臟腑受病深病處硬如牛領之皮又如石榴之狀用藥三五日不軟者病深病人無時喜笑迺神氣脫病深口小內閣常出青白膿汁不疼痛內壞病深病處貼膏藥後出鮮血黑血間雜血痞深又云初發疽時一粒如麻豆本身軀便發熱生疽處肉

亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此爲外發雖大若益梳如用藥有理則全活必矣初發疽時不拘大小身軀無熱自覺癢忘生疽處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後肉紫色黑此爲內發未作之先臍臍已潰爛則不治矣復有心腎肺癰腸癰附骨疽蝨心癰者乃心經有熱或好飲酒或嗜熱物積聚成熱久而不散熏發於皮膚之外氣血不流凝滯而生疽曰原道頰陰而實可治宜用托裏活血之劑攻出外來腫高不陷可保無虞若陷入裏亦不可恃如不飲食急須扶脾能食瘡已破穿見肉膜亦未爲害但要洗滌淨潔以生肉藥搽四畔自然而愈腎癰入與內腎相對皆由腎氣衰敗

而成突起皮赤者易安陷入皮黑者難差如精神清爽顏色紅潤飲食不減多起少卧此爲善也顏色黑黃飲食全減斯爲可憂惟須詳審速療肺癰乃將理失宜勞傷氣血風寒之氣乘間而入內舍於肺及挾邪熱其氣結聚或作寒熱脈數而實是也腸癰乃榮衛相年氣爲敗濁小腹如腫大小便或澁或復汗出或復寒熱是也若腹皮急按之需身無熱乃陰冷所成小腹堅痞按之痛身有熱乃結熱所成脈數膿已成不可下脈遲緊膿未成或下瘀血而愈附骨疽痛深按之無益著骨而生膿水腐潰碎骨出盡方愈治之宜熱去毒又當溫腎未可專用涼劑更在針灸其病務詳淺深刺拔其根則易愈不爾則順脈流走偏躄

洪腫卒致不救惜哉至於所患之時猶或多於外證未潰
已前發渴乃臍腑佳燥刺下乃引飲無度已潰而渴則膿
血去多津液中乾或復腸胃暴虛遂成下痢射虛受寒則
嗽聲不息氣逆挾執則痰盛於胸執毒不泄爲二便秘結
毒氣迫心爲嘔噦驚悸陰陽交爭血氣不和寒執併作臍
腑傷敗便血迸出毒氣攻外煩燥異常惟須大方科藥同
治可也至於諸瘡當舉其六畧丁瘡含毒毒氣瘡頭黑
硬如釘四畔帶赤如火癩根突起痛癢異常隨變焦黑未
幾腫大而光轉爲濕爛深孔透肌如大穿針之狀外澄心
驚頭疼拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間赤黑點
點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡服其斃可立而

子九卷
德說
之問凡入少小以來動輒蓄怒或憂思鬱恐抑鬱不伸透
致結核日積月累風熱毒氣聚焉於是腫濕開瘡起伏無
已其則牽連腋下延蔓心胃外證寒熱往來或痛或不痛
治之須用斑猫地膽使其根從小便中出或如粉片或如
塊血或如爛肉皆其驗也治瘰不早則無及矣漏瘡之由
多發於項腋陰僻肛門之間治之失時即生寒熱及癰疽
諸發隨所在處皆有宿膿敗肉朽骨傳蓄其間皆爲之漏
治法溫散風冷收水生肌用壅塞之藥必得痊平惟須戒
房事耳癰疹爲病風熱在表天時炎暄而燥氣乘之則爲
赤疹天時寒涼冷氣折之則爲白疹治之須疎風行氣氣

行則消矣其有疥癬等瘡各自不同浸淫不已皆由脾肺風熱或心腎父虛所致熱則平血解毒冷則清心溫腎又何患其不瘳矣

五發形圖

腫赤高起或長或大


發癰



此疾或在婦人乳傍上為血宮積滯氣壅血澁而成也內有膿血其病易治內有白膿其病難治

腫赤堅硬

發疽



此疾初發之時毒氣在皮作熱堅硬節疼痛處漫不化昏沉不省人事破後疽出血如蚕多口出膿汁七日之后急用藥有鮮血難治

內闊大色不交


發癌



此疾初發之時不寒不熱腫處疼痛紫黑色不破裏面壞爛二十以前者積熱所生四十以後者皆血氣衰也須早為治十可全一二也

四辟生平卷黑硬

癩 發



此疾初發之時疼痛二十已后四十以前者皆積傷之毒入胃壅塞而成四十以后六十以前者乃血閉不能行壅熱積血得之如出清水汁難治

疔 發



此疾發時渾身壯熱手足不遂增寒頭痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重五臟煩悶是其候若出米泔滓者難治

秘傳十方

一切瘡疔不問發有發背作贅疼痛並宜服此即便消其效如神是名前鋒正將

荆芥

薄荷

山蜈蚣

老公鬚

天花粉

菇美

菇片

敗荷心

川白芷

猪牙皂角

切赤芍藥已上各等分

淮烏

紅內消

甘草

右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調效若

服經日未見效恐是涼藥澁血可加當歸羌活如熱重

雜黃酒調乳癰如當草根研汁調其餘候只用酒下不

飲麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

凡用內消先用此藥退潮止瀉解熱是名引兵先鋒以升
麻葛根湯表散後服此

木通

瞿麥

荊芥

薄荷

白芷

天花粉

甘草

赤芍藥

麥門冬去心

生乾地黃

山梔子

車前子

連翹各等分

右劉散每服二錢燈心生地黃煎熱潮如淡竹葉煎溫

服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌活

敷藥諸般疽發腫赤痛不可忍未成角散已成角破用至

瘡口合而止是名四面楚歌

京芥和根

和根

赤芍藥

大柏皮

土當歸

山大黃

土白芷

天南星

赤小豆

商陸乾即中檢根

即片子

白及

赤斂

白斂

草烏

寒水石各等分

右為末生地黃自然汁調角四畔或苦毒根汁腫用商

陸根研汁未潰則滿鞋塗上或有尖起處則剪出瘡口

洗方 諸般已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去故肉

生新肉洗淨乾再用角貼搽藥一日一次名水師晶明

大柏皮

澤蘭

菴草

荊芥

赤芍藥

山大黃

土白芷

土當歸

獨活各等分

右劉鹿散用水一斗入葱白大板橘葉同煎重洗如已

爛入猪蹄下膝骨骨肉煎可免乾痛淨洗為度

白丁香圓

草烏尖

硃砂

白丁香 聖者

右為末酸醋調點將破者令速潰但有急則無如刀為快蟻針一法亦妙見后

內護浴癰發已成未成服內消三五日不效或年四十以上氣血衰弱成者速潰未成者速散服至瘡口合而止內能固濟去舊生新是名固聖元帥又名加味奇散

當歸酒浸

桂心 不見火 人參

十五号

香白芷

防風 去蘆

桔梗

厚朴 去粗皮 姜汁炒

甘草 炙文

乳香 別研

沒藥 另研

亦前八味各等分同為末每服二錢酒調日三服病重而止不飲者麥門冬天心煎湯或木香湯

治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此潰後服至愈而止是名護聖都尉

防風 去蘆

厚朴 製同上 羌活

白芷

黃耆 炙

川芎

甘草

柳桂

當歸

各半兩 各參或人參 煎或

右為末每服二錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後更服

為佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙方見前

生肉 神異膏

陰癰疽壞爛及諸瘻發毒

雄黃 五斤

滑石 搗爛

右為末洗后搽瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗後破爛者用此貼之

瘡後膏 治一切瘡發臭爛不可近末破則貼破已破則生肉杖瘡丁瘡皆用之

班猫肆拾 柳根肆拾 木驚子共茵 乳香

沒藥 麝香少許 松脂三錢

右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹五兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪及勻入瓷器中收了后用神妙

黃丹散

黃丹炒 白礬枯 龍骨 寒水石

乳香 木香不見火 黃連 黃芩

檳榔 膩粉各三水 腦子少許

右為末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾却搽其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則又譽作

通治

重發散 治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒利下熱退為度大人小兒四季皆可服之

柴背車螯一效 益泥固 炭火服 輕粉

甘草各二水 大黃五水 黃芩 漏蘆去頭

瓜根各半刀

右為末每服二錢薄奇湯下速利酒亦可

單煮大黃湯 治同上氣血衰者不可用

大黃 甘草

右劉散每服三錢水一盞半煎空心服利下熱毒

五香散 升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽

之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人
頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沉香 乳香

藿香 各等分

右劉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

五香連翹湯 治一切惡核癰癤疽惡腫等病

青木香 即如土木香 沉香 薰木香 即乳香

丁香 麝香 升麻 桑寄生

獨活 連翹 射干 木通 各二兩

大黃 蒸三兩

右劉散每服四大錢水二盞煎一盞空心熱服半日以

上未利再服利下惡物為度未生肉前服不妨以折去

熱毒之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故缺之

知者自當量入

平補散 利後不止手足冷此藥補之溫脾正氣

白朮 甘草 白薑 陳皮 各二兩

茯苓 木香 各一兩 肉豆蔻 二箇煨

右為末服前藥後則可服益湯調二錢日三四服利止

通治 卷九

手足溫食進却住服

加味十全湯 治老人虛極瘡疾臨愈宜服

黃耆

生乾地黄 當歸並用

川芎

人參

白茯苓

粉草

白芍藥

桂心 不見火

烏藥

白木米泔浸

陳皮

北五味子 微炒已上各伍分

右劉散每用一兩水一椀薑五片北棗一枚同煎分作

二服滓可曬乾再為末服

真方不換金正氣散 治昶瘡未安之間偏身寒熱或先寒

后熱先熱後寒或連日作或間月作必先嘔痰而後寒熱

大汗出然後止服此祛寒邪正脾氣痰飲自消寒熱不

蒼朮

米泔浸半日炒令黃

大厚朴

紫黑色者去粗皮切

粉草

炙一兩 真橘紅水洗淨去白刃半已上律

半夏

湯洗七次

藿香葉

人參

去蘆

木香

去蘆

白茯苓

去皮各一分

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎八分入鹽少許溫服不拘時候

回春散

治一切癰疽發背抉理瘡疔癰癤毒並治之

明阿膠

剉碎粉炒如絲子出火毒一刃

真橘皮

半兩

粉草

一兩

右劉散分作三服水一盞煎候溫病在上食后服病在

下空心服累效

忍冬酒 治癰疽發背初發時便當服此柴問疽發何處婦

入乳癰若鄉村或貧乏無得藥材者虔心服之大有神效

忍冬藤

任兩錢
不犯鐵

大甘草節一兩

右各生用水二椀慢火煎一椀入無交酒一大椀再煎十數沸去滓分三次溫服如無生者用乾者終力淺更生取棗一把搗爛入餅子酒少許生餅酒允佳調和稀稠得所傳瘡四面中心大留一口泄毒

通明白礬 治癰疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛護內膜駢解諸毒

自然內消

通明白礬生用三兩

右為末以黃蠟一兩二錢溶汁就爐上入礬拌如殺手圓如梧桐子大每服十五圓熱水或冷酒下常服之漏

外髮交和雞內金末炒塞

癰疽初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吃嘔喘嗽以至泄瀉急用頻服托裏逐出毒氣自內發起丹外又能消已發未發皆可服之神效

真京豆粉心一兩

明乳香半兩必用新葉或舊葉
成差蓋火氣難參研

右為末每服二錢新熱水調下或生甘草煎湯調食後少時細呷常要藥味在胃膈間則毒氣不能攻心或瘡已沉晦用當歸一錢辣桂二錢煎湯調下仍以加味不換金正氣散為佐小兒豆瘡陷入亦能救之癰癧及心嘔悶亦用

五寶湯 治腎水枯竭運用不上致令口中乾燥舌上堅

硬或如鷄內金

北五味子

綿黃耆去蘆條參

麥門冬去心各兩半

粉草半兩

右劉散每服半兩水盞半煎不以時溫服日夜五七次

神白膏貼五發未破

南星

大黃

草烏

白飲各半兩

蚌粉

大柏皮略一 小赤豆一合

右為末取色蕉頭研取油調角四畔如乳香沒藥尤妙

乳香膏止痛

木鱉字細削當歸各一兩

柳枝二八寸丁劉之

同以清油四兩慢火煎令黑色次用后

乳香

沒藥各半兩

白膠香

明爭者婦必同研細入由煎化更綿子懸之

右再事治之煉藥銑銑令極淨再傾前藥油蠟在內候

溫入黃丹壹兩半以兩柳枝攪極得所再上火煎不住

手攪候油沸起住攪注在水中成珠不散為度秋冬飲

軟春夏欲堅傾在水中出火毒搜成劑收之

白膠香治瘡疽黑陷者用針刀開瘡內追毒丹使之潰然

後去敗肉排膿隨瘡治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆去油研似泥

白丁香

輕粉各一朱

雄黃 黃丹各二朱

右件研和加白麩三錢滴水為圓如麥狀針破瘡內之

覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可

治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之

六神膏 治五發癰疽一切惡疾軟癰年深日遠已成膿未成膿貼之即效蛇虎蝎犬刀斧所傷並可內服外貼發背先以溫葱湯水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼仍用水下血氣不通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽喉閉纏喉風並歸裏令化一切風赤眼貼太陽穴後用山柘子湯下打撲傷損貼藥仍以橘皮湯下腰膝痛貼之鹽湯下唾血桑白皮湯下諸漏先以塩湯洗若諸瘡癰普重大小以紙攤藥貼之逐每服一粒旋圓如櫻桃大以蛤粉為衣其藥可收十年不壞愈久愈烈神效

玄參

川白芷

川當歸去尾 官桂去輪皮

赤芍藥

大黃

生乾地黃各乙司

右劉如大豆大用清油二斤浸春五百冬三款七冬十日

濾去滓油熬得所次下黃丹一斤滴油入水中不散為至

普應膏 治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癰子牙腫打撲接骨

閃肋刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火漆瘡疥癬貼之即愈又治婦人吹乳以藥圓如梧桐子大新汲水下二十圓

肺癰腸癰亦可為圓吞服溫酒米飲或此梗甘草煎湯皆可不可犯重手及火焙

上等黃丹捌分 研極細

白膠香

明沒藥

滴乳香並別 大當歸

川白芷

杏仁去皮尖

大黃

草烏

川烏

赤芍藥

檳榔

生乾地黄 土芎

滴青 別研入

亂髮摩洗

已上各一升

右除乳香沒藥外將磁石銼盛香油一斤浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色再入葱白亂髮愈少時用生絹帛濾去滓留下一兩藥油復將所濾油於慢火上熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不住手攪候有微煙起提起藥銼將柳條點滴在水而上凝結成珠不散方成膏如不成珠再熬直待成膏提起藥銼攪無煙出却入乳香沒藥白膠末攪勻傾出磁器內將元留下沒藥銼一併收拾器內用新汲水一日一換將藥器坐放水內三日

出火毒方可用之如膏藥硬約量加黃蠟清油入膏內

攪勻得所按滑石難於火煨須耐煩者火緊慢火溫則藥中火發不特失藥性又燒傷製藥人面日

白膏治癰疽發背身腫內外腫瘡陰疔下諸惡瘡及頭

項腫腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止疼生肌

累有神驗若丁腫先用銀篦或鹿角針於丁瘡中間及四

畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大擦入孔中却以此

膏貼之如瘡壞爛至其難以藥貼則將皂角二三片煎油

調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈

大巴豆去殼

木賊去殼

黃丹詳兩研細

真清油拾兩 槐柳嫩枝各半寸長

右依前法煎熬成膏貼用

金

治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡瘡風濕筋寒諸病

當歸尾

川白芷

杏仁去皮尖玄參

猪牙皂角去皮弦

章烏生剉用白膠香明者

連翹葉葱 胞者拾根

滴青明者 乳香

沒藥別研為末 黃蠟明者 乙兩 男子亂髮洗淨按如

右用清油半斤將七味依前法熬濾却入膠香滴青攪

勻下黃蠟又攪無煙方下乳香沒藥

貼膏法如瘡有膿血不淨痴癩閉礙須用藥水洗淨拭乾

候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出流用紙指從

側畔出一日一換黃水膿血止兩日二日一換貼至愈

蠟針正法治癰癤不問老少初發腫作齊寬稍大便以紙

一片令水浸捨瘡上視其上二點先乾者即是正頂先

以大筆管一管安於正頂上却用大馬蟻一以本草各

安其中頻以公水灌之馬蟻當吮其正穴膿血出毒散

是效如毒大蟻小須用三四條方見功效若吮著正穴

蟻必死用水救活其瘡即愈畧試奇效乃去毒之一端

也血不止以藕節止泥止之白茅花亦效

信毒餅

治諸般惡瘡因針開口後又閉合生膿脹痛不

可忍用此捻成小麥子大入放瘡中永不閉膿水自出瘡

自乾好

極好信石牒雄黃

雌黃

大朱砂各乙方

輕粉少許

右研為細末糯米糊圓如麥子大若瘡口閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之

因疔毒丹 清心解毒散劑

大朱砂

雄黃各五分

生麝香乙分

生犀角

琥珀別研細

黑角沉香各五分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓燈心薄荷湯下

雜證乾葛散 治發背作湯

黃芩

朴消各五分

乾葛乙兩

右剉散每服三錢用枇杷葉去背上白毛淨洗同煎不

拘時服

蘇子降氣湯 細炒香附湯

各見大方料諸氣類

以上諸藥升降散毒理脾和氣凡諸發臨愈皆可投數服

服癰疽緣氣凝血滯氣聞香則行初發亦宜縮砂香附湯

六湯 諸發愈後宜服

黃耆

陸兩灸甘草壹兩

右剉散每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎空心服

味圓 老人氣血衰弱發背作湯不止宜服方見大方科虛損類

香散 治疔後氣弱不食方見大方科脾胃類

香圓 治發背及一切疔瘡潰爛痛不可忍者

當歸

川芎

交趾桂

川香芷

直豨莶豆粉各五錢

羌活

獨活

五靈脂

乳香別研

沒藥別研

白膠香 伍錢

右爲末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓用薄荷湯嚥下
手足諸般損痛不能起者加大草烏一味用木瓜鹽湯
細嚼下

聖濟圓 治氣虛血弱老人疝發後四肢倦怠無力或燥渴
好飲水不止者

黑附子

壹箇以錢煨鹽水浸

白茯苓

伍錢川練子壹兩天

茴香

炒兩

破故紙

壹兩炒

熟地黃

淨洗切酒炒壹兩

交趾桂

伍錢去雜皮

大當歸

壹兩去尾

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心鹽湯或
鹽酒下如覺脾虛食減亦用參苓白朮散兼服

聖濟散 凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲止乃止
後七日勿洗手此後有一切腫及癩瘡惡注腫瘡摩之
隨手即消

乳癰

瓜蒌散 如不愈者並依前方治之

瓜蒌

明乳香

石爲末每服二錢溫酒調下熱者加石膏末少許

又方

草烏 柴箇

小赤豆

柴箇拒霜葉壹兩陰乾

右爲末并花水調塗角四畔黃頂用煎敷藥亦妙

又方 仙人掌草一握小酒糟一塊生薑一大塊搗攪入桂

乳癰
十九卷

未少許炒酒服留滓養腫處即止更不成瘡

火炆草

皂角刺

川山甲

黃蜂窠

右各燒存性爲末入輕粉生清油調勻傳瘡上

又方

赤小豆一升酒研爛去滓溫酒服留滓傳患處

又方

蔓京子搗爛炒酒服滓貼患處

又方

乳勞癰爛見心者猫兒腹下毛甘鍋內煨存性爲末

乾摻或清油調入輕粉少許

吹乳結實疼痛陳皮一两甘草一錢水二椀煎一椀分二

次服次用荆芥羌活獨活煎湯熏之溫則洗之安

又方

酒三椀加連翹三錢黃瓜萎仁三十粒雜損每服四

錢水一盞半前食後溫服方見小方科

又方

皂角刺燒灰蛤粉明乳香少許爲末熱酒下揉散可

妳頭裂取秋后冷露茄子花裂開者陰乾燒存性灰水調

傳未秋時但裂開者亦可用

灸法

癰疽 腫堅硬不破名曰石癰當上灸百壯

諸癰疽毒開闕不止疼楚殊甚以灸炷四枚圍著所作

處同時下火各灸七壯多至十一壯佳

大蒜頭橫切如錢貼其中心頸小艾炷灸之五壯而上

若形狀稍大以黃裨紙蘸酒敷貼認先乾處爲筋脚於

先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止

棗子煎服此二方見大方料疏等

桔梗去蘆 貝母去心 大當歸酒浸 瓜蒌仁

枳殼去穰炒 蒼朮仁微炒 桑白皮炒 甘草節

防己各一兩皮 百合蒸半日 黃耆一兩半 正地骨皮去

知母 杏仁 北五味子 甜葶藶各半

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不以時溫服

咳不活加百藥煎熱加黃芩大便不利加煨大黃少許

小便澁甚加不通車前子前煩燥加白茅根咳而疼甚

加人參白芷

甜葶藶子二刀半開 百合炒 白附子

北五味子 甘草節 羅參 款冬花

百藥煎略 大朱砂五枚 紫苑去木

右為末每服二錢燈心湯調下

牡丹散 治肺癰胸乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭

川升麻 苦梗 薏苡仁 地榆

黃芩 赤芍藥 牡丹皮 生甘草各等分

右劉散每一兩水一升半煎五合溫溫日三服

補肺散 治肺癰已吐出膿血以此潤護

真鍾乳粉一兩 白滑石二兩

右為末每服三錢米飲調下

理膈膏 治肺癰正作咳唾不利胸膈迫塞

呵子去核 百藥煎 五味子 微炒條參 去毒

炭冬花藥 杏仁 知母 貝母

甜薑藤子 紫苑 百合 甘草 節各五

右為末用白茅根淨洗秤三斤研取自然汁入礞石器

中熬成膏更添入好蜜二兩再熬勻候冷調和煎藥為

圓如梧桐子大溫水吞下

加味敗毒散 治上膈壅熱而成肺癰兼感風寒重者加

黃芩瓜蒌仁薄荷當歸川白芷半夏烏梅桑白皮每料

各五錢生薑生地黃燈心白茅根煎熱其加大黃

內護脾散 理肺癰吐膿後宜服脾膿補肺

嫩黃耆二兩 川白芷 北五味子炒人參各一兩

右為不煉蜜團如小指頭大偃仰入口噙化旋旋嚥下

食后服臨卧服

青華湯

薏苡仁 瓜辨仁 桃仁 去皮尖各一兩

右坐散每服四大水二盞先以薈葉一握煎取一盞

去滓入蒸煎六分食後服或吐膿血勿怪

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香 木香 明乳香 丁香

藿香葉 酪半 白朮 羅參 白茯苓

薏苡仁 山藥 扁豆 桔梗

縮砂 白豆蔻 粉草 蓮肉 各一兩

右為末蘇藍湯調空心服棗湯亦可有汗加浮麥煎

蘇藍湯 治一切內外癰瘡依和劑方修合煎北梗并草湯

吞服服畢便就枕有執者善應寬亦可圓服湯引同上

加味丁可散 治肺癰已散不咳不疼服此去舊生新內能

固濟方見前

肺癰 證始萌易治膿成難治診其脉數而實已成微而瀉

漸愈面色白嘔膿而止者自愈有膿而嘔及面色赤吐

膿如糯米粥者不治男子以氣為主得之十救二三婦

女以血為主得之十全七八歷試屢驗

灸法 治肺癰正作吐膿血不已肺膈灸二七壯在二椎下

三椎上各去脊一寸半及灸臆譚二穴二七壯其

有膊內蒸第六椎兩傍三寸抱肘取之

腸癰

散 治脉數身無熱腹無積聚按之濡此為腸癰又積

陰冷所成宜服

薏苡仁式兩 附子半切 黃芩兩乙分

右剉散每服四錢水一盞半煎空心服小便利為效

疔湯 治腸癰小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時

發熱自汗出復惡寒其脉邊緊者膿未成可下之當有血

洪數者膿已成不可下

大黃 蒸

桃仁去皮尖 牡丹皮乙分 瓜蒌子叁分

芒消式分

右劉散作一服水三盞前八分去滓入芒消再煎沸頭
服不拘時候未效用敗毒散方見大方科傷寒類

意交湯 治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澀
婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服就有
差之亦無害

薏苡仁 伍兩 牡丹皮 桃仁 各叁兩 瓜瓣仁 四兩

右劉散每服四錢水一盞半煎不拘時服

爛肉膏 治腸癰內疔方見前

附骨丸

附骨膏 治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡孔出

大蝦蟇 乙枚 亂髮 配子 猪脂油 四兩

右以猪脂油煎前項藥渣去滓凝好膏貼之凡貼先以
桑白皮与豆煎湯淋洗拭乾蝦龍骨為粉揆瘡口四畔
令易收斂却用貼之

焦鯽魚 治附骨疽未破已破或膿出不盡者

右用黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令腹滿用線縛定用
水一盞銅石器中煮水盡乾焦為末用猪油調傅已破
者乾搽少痛勿搽

赤木圓 治附骨頭膿汁淋漓久而不瘳已破未破皆可用

赤木 乙斤 煎去油用川椒

破故紙 炒 川練子 劉炒 茯苓

土茴香

川白芷

桃仁 天皮 各乙兩

右爲末老人加黑附子煉蜜圓梧桐子大每服五十圓
溫酒或鹽湯吞下

便毒

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

辣桂

川大黃

白芍藥

澤瀉

牽牛 炒取末 桃仁 去皮炒 各二分 甘草 半分

右劉散每服三錢水一盞半生薑五片煎食前日二服
先小便快熱從小便出后六便利皆是稠毒

五香連翹湯

治便毒腫結因敗精搏血留聚而成立效

復元便氣散

便毒初發用此

穿山甲

酒浸炙

天花粉 酒浸

白芷

當歸

甘草

舶上茴香 炒

白牽牛 炒

延胡索 炒 去南木香 略 乙 青木香 半兩

右爲末每服二錢溫酒調食前服不飲南木香煎湯服

五葉散

疎利小便以泄敗精葱二根煎湯調下

方見大方 科瀉暑類

四順備急散

治便毒熱證大便不通

方見不劫 科積聚類

木香流氣散

治便毒躄虛氣閉大便不通加大黃少許煎

食前服

方見大方科瀉聚類

護聖解毒方

治便毒已消內托可常服

方見前

傳瘰治毒潰時用白及沒藥乳香血竭爲末搽效

又方治便腫痛

便毒
九卷

雄黃

乳香各半

黃柏乙分

右為未分作兩服以新水調傳自平

癰疽毒法

用細草或軟篾隨所患左右手量中指自手掌盡處橫
丈量起通三節至指蓋則住不量指爪縱斷却將此草
於手腕橫紋量起引草向臂當中草盡處即是穴文疔
如麥大灸二三壯腫散痛止即安

偏癰

秘方 治偏癰俗名癰疽然作未作之時即之即愈

猪牙皂角七片夾火煨黃色去皮弦地上出火毒研如
末用酒調服

三九即散

午莠子

破故紙

黑牽牛

大黃切各

右等分為末酒調下

又方 治便毒初發

以生薑一大塊米醋一合置羅醋磨取干步峰泥敷輿
作處即效干步峰即人家行步
上有高燥者是

癰疹

青肌散 治風寒暑濕外搏肌膚發為癰疹遍身搔痒或赤

或白口舌咽乾或作寒熱敗毒散一兩半加大麻薄荷各

三錢蟾退二七箇去足翼分作六服每服水一盞半生薑

三片煎湯服取效方見大方
傷寒陽證辨

癰疹
十九卷

加味羌活散 治風寒暑濕外搏肌膚發為癰疹通鼻壯熱
偏軀搔痒隨臟氣虛實或赤或白心神悶亂口舌咽乾

羌活

前胡各乙兩 參

桔梗

甘草炙

枳殼炒

川芎

天麻

茯苓各半兩

蟬蛻去頭足 薄荷各壹分

右剉散每服二大錢水一盞半生薑三片煎不以時服

加味烏荆圓

治癰疹上攻頭面赤腫搔痒搔之皮便脫落

作癢作痒而痛滂液走注有如虫行

川烏

湯洗浸三五次
去皮小炮乾

荆芥穗各半 薄荷各五片

杜當歸

洗浸三日焙乾 乙斤

右為末好醋煮米泔糊圓梧桐子大每五十九溫酒下

暈嘔散

因浴出腰風冷偏身癢疹搔之隨手腫突及眩

白木乙兩

神麩式兩

甘草乙分

右為末每服二分米飲調下一方以土朱研炒冷酒調下二分不飲以茶調下

消風散

治癢疹痒痒神效方見風科
熱證類

朱調散

治風熱癢疹方見大方
科頭病類

胡麻散

治風氣挾熱癢疹痒痒

胡麻子五兩

苦參

荆芥穗

何首烏各式

葳靈仙

防風

石菖蒲

牛蒡子炒

菊花

蔓京子

蒺藜

炒去刺

甘草各半

癰疹
十九卷

右為末每服二升食後薄奇湯或好茶清下
治徧身癢疹疼痛成瘡

白蠶蚕一两炒黃色為末分四抄酒調服

傳藥

明礬朴消為末井水調雞羽掃傳

又方

赤小豆京芥穗臙為末雞子清調薄傳

洗方

蚕沙以新水煎密室溫洗

諸瘡

熟塗

治徧身生瘡膿血腫極痛且痒

乾葛

赤芍藥

升麻各乙兩 粉草五分

加天麻

蟬蛻

右劉散與人參敗毒散合和生薑薄奇生地黃寒則

不拘時候大效

敗毒散 寒則 諸類

治心肺積熱腎臟風毒及於皮膚時生疥癩癢
痒難忍時出黃水及大風手足壞爛眉毛脫落一切風疾

玄參

荆芥穗各四 苦參 半斤

大川烏

宜連各乙兩

真牛黃 式分

右為末水糊圓梧桐子大每服三十圓熱水或茶清下
一方加麻黃防風皂角末為膏入煉熟蜜為圓妙

黃清

方見風科通治類

天衣

治風毒入胃及心腎經絡攻注百節疼痛頭目虛

腫痰涎不利下注腰脚弱緩生瘡婦人血風男子癩風乃

風濕脚氣攻注皮膚癢痒癢瘡偏正頭風

川烏頭

洗交刺去皮

草烏頭

水浸三日洗去皮各三日

荆芥穗

四兩乾薄荷

杜芎歸

水浸三日切

右為末醋糊圓如梧桐子大茶清下三十圓

酒洗黃連

治同上一粉飲下三十圓

黃連治惡瘡生背脇頭腦四肢要害處連進一二服得

利即效未利再服方見大方科精熱類

當歸治心血凝滯內蘊風熱發於皮膚遍身瘡疥或腫

或痺或膿水浸淫或發赤瘡痞腐

當歸

去

川芎

生地黄

白芍藥

防風

荆芥穗

何首烏

黃耆

甘草

治諸惡瘡紅赤痛癢不定心煩口乾及婦人血風

紅班圓點開爛成瘡痒痛流黃水汁

連翹

赤芍藥

當歸

京芥

防風

牛蒡子

川芎

梔子

黃芩

瞿麥

木通

生乾地黄

瓜根

麥門冬

粉草

各等分

右剉散每服四錢水一盞半燈心二十莖煎不以時服

赤小豆

治少年氣血俱熱遂生瘡疥亦為腫滿或煩或

渴小便不利

赤小豆

當歸

商陸

連翹仁

赤芍藥

漢防已

木猪苓

去皮

桑白皮

澤瀉各半兩

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時候溫服熱甚者加犀角二錢半

理氣散

治飲酒後偏身痒如風瘡抓至血出其痒止後痛

單蛇去頭足翼

薄苜蓿一兩

右為末每服二錢小酒調服不拘時候立效

盧證四生散

治上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡

下注陰濕四肢癢痒搗躰生瘡及婦人血風瘡

黃芩圓

治腎臟風虛下注腰脚生瘡行步艱難方見大方

知貝四物湯

治一切惡瘡

川芎

當歸

地黃

甘草

芍藥各等分 防風

荊芥

鳳尾草加

右劉散每服三大錢水一盞半煎服經驗

五香連翹湯

治風氣風癢瘡除升麻大黃獨活木通乳香

五味忌食冷物服後小水必通方見前

五苓散 加瞿麥大退治同上此方得之艱用之取效

敷藥 合掌散治偏身生瘡百藥不效

檳榔伍个

硫黃五斤生者

膩粉半斤

右和勻每服一錢安於手心內油調夜卧時塗外腎不

得洗手但擦手令乾可也一二日瘡即愈
通治多年惡瘡不瘥爛棉馬齒竟傳之亦治反花瘡其形

如花開之狀燒灰以猪脂塗傳 又方雞腸草研細取
汁拂其瘡必潰蓋之或為末猪脂調傳極效

赤小豆方

治善惡瘡疥或赤腫無不愈者

右用赤小豆七七粒為末傳之愈或以水調傳瘡及四
傍赤腫處落則再傳又方剉散每服二錢水一盞煎服
仍用新汲水調藥傳緣赤豆粉粘物既乾難揭則用芋
根為末和之便不粘此法尤佳

殺虫方

鷄楨榔兩黃連

川山甲 十个 射香 半分

右為末用臈茶末調塗三五日后用葱湯洗

惡瘡方

白膠用赤色者

明白礬 三分 黃色黃丹

右為末先煖過酸漿水洗拭乾用清油調傳

又方

貝母為末入雄黃少許諺上

葛蒲末治遍身執毒瘡痛而不痒手足尤甚粘著衣被夜
不得睡多取葛蒲為末布於帟上使病者恣卧其間仍以
衣被覆之五七日瘡愈疹瘡爛用艾醯亦可

惡瘡方

治一切瘡

鬱金

黃連

黃柏

梔子仁

葵花 各等分

右為末冷水調成膏貼瘡痛處神效

瘡方

治一切惡瘡醫所不識者

水銀

甘草

黃蘗

黃連

松脂黃明者 膩粉

蜂窠

以酒洗者壁上者

右取水銀放在掌心以唾擦為泥入堯器中用清油和勻生繪瀝如稀錫先以溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無名瘡或痛或痒并有黃水者塗之愈治疥尤妙

漏

治一切瘡疥但相對而生者便是不問乾濕

目近年深用之立效

藜蘂皮二月真輕粉十貼好蚌粉壹升通明雄黃餅

水粉壹兩

右為末用大鯽魚一个入香油煎候熟去魚淨冷

搽瘡未效可加信石末少許研杏仁十粒近陰處勿用

拔毒

水銀淨研細臘猪脂膏雞鵝身擦上立效

消腫

治腫滿後作瘡或發水疱成瘡是脾土崩壞及

一切瘡用清油調傅濕則用糝立愈 方見大方相脾胃類

黃骨

治一切瘡疔

清油三兩煎巴豆二十粒微黑去巴入黃蠟一兩化訖

研雄黃硫黃各一錢溫入成膏淨洗抹傅二三神效

亦瘡後瘡亦用

神異膏

治一切瘡疥

全蝎

去毒

皂角

去毒

巴豆

去毒

蛇牀子

清油壹兩

黃蠟

輕粉

雄黃

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化

開取出冷處入雄黃蛇床末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗后以藥擦瘡疥上神效

爭肌散

治一切惡瘡

雄黃

海蝶蛸

大柏皮

宣連

水粉

輕粉

蚌粉

杏人

右為末用真清油調傳

又方

治大風离楓木子曉存性為末加真輕粉香油調傳

出梅膏

治諸瘡弩肉如蛇出數寸用硫黃細研於肉上薄

傳即便縮諸瘡中新弩出肉以為梅肉蜜和捻作餅子

如錢厚以貼瘡上

苦棗膏

治大人小兒瘡禿及惡瘡

苦練皮燒灰以猪脂調傳

身面微腫多食魚蝦發風熱物得之

馬齒莧四兩研爛入青黛一两再研勻塗上立有神效

仍服八正散日三服方見大方科積熱類

洗方

苦參湯

苦參

蛇床子

白礬

荆芥穗

右等分用空煎放溫洗

驅風散

紅椒

開口者

連根葱頭

茶筒

右同煮水淨洗用縮衣氈乾即愈

指縫搔痒成瘡有竅出血不止多年莫補猶殘乾燒灰傳

之即安

火氣入瘡黃柏皮為末慘之立愈薄苛煎塗亦可方規類

漆毒成瘡磨鐵漕中泥塗之即愈又方蟹黃塗之效

癰瘡神降散治走皮癰用桑寄生一小把本根桑根取皮

一握白芷黃連煎湯溫和以帛蘸洗候露出盡拭乾傳之

滿尺皂角去核炒

麻竹大擇燒存性

厚黃柏

鷹爪黃連

瓜穉葉乾

白芷

右等分為末清油調傳神效慎勿喫醋

凍瘡以茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

又方治足上凍爛生瘡黃丹為末用猪鬃調傳

又面瘡用貝母為末小葶筒灌其瘡口數日成痂而愈

白癩瘡每旦瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄黃

圓三四服即安方見風科執照類

車阻瘡

綠礬半兩 蘆薈壹錢半 鹿茸壹字

右研如粉以絹袋盛藥納指於袋中線孔定瘡為度

月餘瘡

胡粉炒微黃 白礬各

黃丹煨

黃連淨

輕粉各貳錢 胭脂壹錢 麝香少許

右為末先以溫漿水入盥洗拭后搽藥乾則用清油調

順頭瘡先用本人小便燒紙錘令紅投於小便中方與洗

磨皮皆去然後以帛拭乾用滴青五文細研用油煎三箇以盞燒成油調滴青塗之三日效

頭上風屑極痒用藜蘆根不拘多少為末先洗頭須避風候稍乾時用藥終定須安藥入髮至皮方可緊縛兩夜

腎臟風癢瘡十方

活血驅風散

治肝腎虛為風毒所入濕痒生瘡

當歸 去尾

川芎

白芷

華陰細辛

白朮 去土

桃仁 浸去皮

白芍藥

半夏 洗

五靈脂

甘草 各參錢

蒼朮 炒

杜仲 去粗皮

辣桂

天麻

薏苡仁

橘紅

檳榔

厚朴 去籠皮 枳殼 各兩錢

在劉散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎去滓入乳香末少許以佐心氣使心腎相交挾熱去桂乳香加黑豆煎服

青木香圓

疎導腎經風水腎虛挾邪浮腫多用安腎圓少

小牛黃圓

治腎虛挾熱陰囊痒痛多瘡方見前

烏荆圓

治肝腎風癢方見風科通治類

神圓

治外腎濕痒方見風科歷節風類

不憂金正氣圓

疎導脾腎濕氣方見大方科時疫類

葶物腫爛淫汗方大腹皮一升苦參荆芥各二兩煎湯溫洗拭乾以津液塗潤次用油髮燒存性入白及末少許傳

逐日煎湯密室洗換或加乳香末仍服蠟藥圓以髮灰末
米飲調吞下方見前

腎臟風發瘡疥

雞心檀榔合在內用濕布裹熨 全蝎陸明硫黃

右為末入輕粉半錢麝香少許青黛末半錢於磁器內
收每用少許清油調抹兩掌換外腎女以兩掌換兩乳
各腫至醒次日又用經驗

又方天紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏人研膏擦手如
上法亦效

外腎疔瘡用抱雞卵殼鷹爪黃連輕粉各等分為末煎過
清油調塗來自附子白芷五倍子煎水洗

陰囊瘡

巨粉壹分

蛭蚓貳分

右用水研塗上乾又傳之

陰囊上瘡

甘草煎湯溫洗却用脂茶末就傳貼

陰頭生瘡

右用溪螺殼溪港中螺舊者為妙甘鍋中煨過為末先
以鹽水洗五七次后以痔藥傳之

妬精瘡

右用大田螺兩箇和殼煨過存性為末入輕粉搽所患
處即可安

又方 治羊少陽道興起當泄不泄不泄強泄脹漸燉皮初
如針眼大畏疼不敢洗刮日又攻入皮肉連至潰爛一
二寸許用荆芥黃柏皮馬鞭草甘草生葱煎湯洗去膿
層更何子燒灰入麝香少許乾搽患處初斷房事數月
臨睡喫冷水兩三口勿令陽道興起脹斷瘡壓實堅石
即安矣

神效 治妬積瘡膿汁淋漓臭爛

黃連 款冬花各等分

右爲末以地骨皮煎水子煎湯用軟帛氈乾津調塗塗
之最忌不得用生湯洗諸瘡皆然

神效 治妬積瘡

綠豆粉 軟滑石 壹兩研

右爲末和勻以綿撲子蘸撲仍以膩粉佐之

蛇纏瘡用雄黃爲末醋調塗仍用酒服是爲蛇傷及蜂螫

蜈蚣毒虫頭犬所傷皆可用 又方用鏡面草入鹽

痲子痒痛方

新汲井水椰青蒿汁調蛤粉傳之雪水尤妙

洗方 治諸瘡

黃相箇陳荆芥葱白各香煎水溫溫淋洗

瘡瘡

胡粉散 治一切癬神效

胡粉壹分

砒霜壹分

大章烏壹箇 硫黃壹分 生用 硃黃壹分 硃研

蝎梢菜枚

斑猫壹箇

麝香少許

右為末以羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

烏頭

立烏頭一斤刮洗去皮令極淨攤乾用清油四兩鹽四

兩同藥入鍋內炒令深黃色傾出刺油只留鹽并藥再

炒無色煙出為度取一椀劈破心內如米一點白者

恰好白多者為度羅為末醋糊圓如梧桐子大每服

烏豆者

三十圓空溫酒下然草烏性差熱難製表五七日間以

通身牛皮

草烏去皮尖何音烏

白芷

常挑一匙生酒調下

又方 雌黃末入輕粉猪脂調抹

斑猫 凡三兩次就燒為灰存性

石用紅棗湯泡剥去皮核與藥同研爛先以手扒

破癬後搽藥不可犯好肉恐有毒

昨葉荷草 壹兩 乾 枯礬壹錢 雄黃 半錢

右為末以羊蹄菜根先蘸醋搗爛上令痒破即以藥末

乘濕塗傳不過三兩次而愈

更服局方何首烏散

八月八日日出時令病人正當東向足長跪平舉兩
手... 邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩次俱
下各一壯若七壯十日愈

膝瘡

金虎丹 治足面生瘡下連大指上延外踝膝骨每發

日復然每服一圓新汲水下臍膈有所下即愈

天雄炮去皮補膏兩 白礬枯迥 天南星湯洗

天竺黃研 膩粉研 牛黃研 雄黃研

生龍腦研 金珀陸拾伍片為核

右為末煉蜜搜和每一兩半作十圓金箔為衣

花蕊石散方詳類 復元通氣散方見前

追風獨活散方見周科通治類

右各一貼合和酒調空心服

治瘡生於脚脗各下疔瘡俗謂之袴口瘡或因物打
撲而成者其瘡口狹皮內極闊皮薄如竹膜極痒痛終日
黃水流延蔓而生甚者數年不愈又易於染過他人患此
者須忌房室則易愈內外膝瘡皆治之

韭菜地上地龍糞乾為末入輕粉清油調傅白天血亦可

治脚肚上生瘡初則如粟漸大爪搔不已成片包脚
相交黃水出痒不可忍久成癩疾最難愈

百藥煎研細津唾調逐運塗傳自外而入先以貫衆煎湯淋洗后用藥

又方

石榴皮煎取濃汁稍冷拂瘡上冷如冰雪即成

又方

用鱈魚數條黃色者尤妙打死先用清油塗其腹

下置瘡上盤屈令扁帛子繫定食頃竟瘡痛不可忍然後取鱈魚看腹下有針眼大窠子皆虫也如未及再以此數條依上再縛虫去尽却用死人脚脛骨燒灰清油調傳或以骨灰一兩入好茶末二錢同調亦可

又方

亦可治打撲脚脛上成瘡此最難愈

檳榔半兩

龍骨壹分

輕粉半分

乾猪屎

半兩

右為末先以甘草鹽湯淨洗瘡口軟綿拭乾清油調傳

一日一換五日定差思無鱗魚也鮓熱

又方

治冷腫瘡鹿角灰髮灰乳香為末清油調傳

又方

治足上生瘡臭穢潰爛漏籃子一枝燒為末入膩粉少許井水調塗效

檳榔散

治全上

全蝎菜个

班猫十四个

巴豆十四粒

先用清油兩半慢火煎先入全蝎次班猫次巴豆隨下

檳榔見巴黑色方入黃蠟一兩候溶去藥滓不用只用

蠟油入后藥 黃蘗皮炙

蛇床子研 雄黃研

硫黃研生者

黃丹火飛

海螵蛸炙

白膠香

黃連

杏仁

輕粉

清油香油

豫唐 卷九

右為末同入清油中調傳瘡上立效

單方 治膿瘡成田累月不乾

上好砂糖先用鹽湯淋洗后綿帛拭乾以津唾塗却以此傳上二日愈神效

粉麩散 治外膿瘡臭爛數十年不愈者

生圭壹箇

鳥若打死去衣取殼粉一盞多醋及為雙仍破令白爛及存性用一盞地上出火膏

右為末入輕粉麩香拌勻臨用并以葱水洗乾方用藥

牡礪散 收斂瘡口令乾

牡礪壹塊

用破草生包薄入火內煨去小疾今取出研

右隨用時旋入枯飛過白礬少許拌和傳瘡口上

秘方 治脚胫骨上作瘡久爛黑或發孔或臭穢不可近用

蜈蚣十數條小竹筴穿定毛上焙乾為末真清油調

畫時取效

秘方 隔壁膏用多年老杉木即燒灰真清油調箬葉盛隔貼在瘡上以絹帛繫定不數貼而愈

生藥 用海桐皮石榴皮等分煎湯淋洗令淨然後用熏藥

重藥 用牛蒡子半兩研為末入帛熬子內燒熏之然後

手足裂腫

白及膏 治斷跟靴用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內熬

候油沸頭髮溶爛入川白芷白及松脂末出火攤冷以瓦器收貯不容灰入每用百沸湯泡洗較裂令軟拭乾

傳其上即安或加少水粉

秘方 五倍子為末用牛骨髓填縫內即愈

又方 手足皸裂者夏不愈者

生薑汁

紅糟

鹽

猪膏臘月者佳

右同研爛沙熱擦入縫內一時雖痛少頃皮軟縫合仍

再用之即安

治久行脚心腫痛 蚯蚓糞塗腫處高闊起脚一夕即愈

又方行路脚跟腫痛 草烏并遂各等分為末新汲水調

傅露出脚爪甲

黃蠟膏 治冬月手足拆裂

清油半兩盡內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候滾入光

粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火止

烘乾用藥紙貼之

傳 治遠行脚腫用之可行千里輕便甚妙

防風

北細辛

草烏各等分

右為末摻鞋底內如著草鞋即以水微濕過然後摻藥

漏瘡

醫 治癰疽發背癩癰漏瘡惡瘡腐肉內膜驅解諸毒自

然內消神妙方見前

溫散 溫散漏瘡凡冷

藿香葉

厚朴去麩皮 半夏麩

橘皮

蒼朮炒

細辛

川芎

白芷各一分

辣桂

川白薑主

甘草各半分

右劉散每服三杯水 薑棗子煎服

猪腎酒 通行瀉瘡惡水自大腸出

黑牽牛碾細去皮取末一分入猪腎中以錢扎青日藥包慢火煨熟細嚼溫鹽酒下

食治方 治瀉瘡肛門周匝有孔十數諸藥不效用熟大肉

離濃藍汁空心食之不食犬肉驢肉代之七日自安

桂竹圓 治氣瀉冷瀉諸瘡

桂心

附子

袍裂米醋中浸再炮
俾三五次去皮尖

厚朴

去麁皮
姜汁炒

甘草

白朮

各一刃
木香一分

乳香

別研

右為末煉蜜圓梧桐子大空腹米飲下三五十圓

雲母膏 治瀉瘡效

穿山甲

浸壹宿去肉
用壹伯片

真蚌

粉同法煨香熟起包
米去粉及甲為末

右入乳香末一錢鹿射香半錢夾和雲母膏十五貼為圓

梧桐子大每服三十圓溫酒下仍以鹿角膠調鹽酒服

神授散見大方科廣蘇頌

安腎圓

真圓

二藥多服調養

方並見大方
科虛損

代赭石

治疔变为瘰癧血不止

代赭石

煨醋
研

磁石

煨米醋數沸
離去文研

白礬

牡蠣灰

龍骨研

蝟皮

炙焦

皂莢刺燒

猪後蹄垂甲

燒
各存性

赤石脂

川椒焙

木賊焙

蜂房

各等分

在為末神翅糊圓如小豆大每服五十圓食前艾弄生

姜煎湯下漏血處以熟艾標和血竭塞日三換

雄黃 治積年冷漏黃水不止

雄黃

硫黃 研細各一分 頭髮

黃蠟 各半兩

右用清油二兩煎熟頭髮漆盡去滓次入雄黃硫黃碎片黃蠟慢火上用枝頻攪為膏攤生絹貼用藥先以赤甘草頭煎湯洗或露蜂房白芷煎湯常洗常貼

黑靈散 漏瘡通用

露蜂房 二分

牡礪粉

黃丹

硫黃 各一分 研細

右同炒令煙盡為末入髮灰一分麝射必許拌和傳患處麝射能引藥透透亦殺虫

又捷效方

用信石新瓦上火煨過為末以津液潤紙擦子

漏瘡

治痔漏瘡不可忍

血竭

牡礪灰

髮灰 各等分

右為末入麝香少許自以津唾調傳如更痛研杏仁膏調藥傳之

洗漏瘡方

漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨每用白芷

及露蜂房煎湯洗或大腹皮苦參湯洗洗畢候水出拭乾用向東石榴皮晒為末乾摻

艾谷漏瘡

用活鱸魚五六條擲地以竹針貫之覆瘡良久

當有虫出如線復之使盡用檳榔黃連末傳明白以乾艾作湯投白礬三二錢洗不一月全愈

瘰癧

白花蛇散 治九漏瘰癧發於項腋之間增寒發熱或痛或不痛

白花蛇酒浸軟去皮骨焙乾碎一二兩 生犀角鎔半 青皮半兩
黑牽牛半兩半生半炒

右為末每服一錢入膩粉半錢研勻五更糯米飲調下
已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌
發風壅熱物如已成瘡一月可效用之神靈

四聖散 治瘰癧用花蛇散取轉後用此補之求去根本

海藻洗 石決明煅 羌活 瞿麥穗各等分

右為末每服一錢米湯調下日二服下清水盡為妙

立效

荆芥穗 僵蚕各五分 班猫二十八個去頭翅足用糯米炒
黑牽牛五分

為末皂角末熬膏為圓棗豆大臨睡時先用米飲調
活石末一分服半夜時再一服五更初却用溫酒吞二
七丸服訖如小便无惡物行次日早再進一服又不行
第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服
更以燈心湯調琥珀末一分服之以小便內利去惡毒
是其應也

史超圖 治瘰癧結核或破未破者

薄荷新者一斤裂取汁 皂角一挺水浸去皮

瘰癧 九卷

卷上二味
卷內製成膏散

青皮

陳皮各二兩

連翹 半兩

黑牽牛 半炒

皂角子

慢火炮去皮取半
搗羅為末各兩半

右為末用前膏為丸梧桐子大煎連翹湯食畢三十九

三耶膏 治瘰癧

丁香 五十个

斑蝥 十个

麝射香 一八分
另研

右為末用鹽豉伍十粒湯浸爛如泥和藥令勻丸如棗
豆大每服五七丸食前溫酒送下日三服至五七日外
齋小便淋瀝是效即加服或便下如青筋膜之狀晨病
之根忌濕麪毒食

必膠圓 治瘰癧不以年深日近及腦後兩邊有小結核連

復數發固兼發瘰癧內有塊

魚肝油 一个 去腸肚并子入猪黃 一粒 剪子大 研碎 以金

蝦 一个 將鹽末半兩 施于 五个 皂角 二根 去皮 酥炙

五个 去皮 塗上 燒黃 明膠 三寸 皂角 二根 去皮 酥炙

右為末別用皂角二根 搯去皮 搯碎 以水三搯 搯汁 去毒

黃精 羊肉 四兩 爛軟 入 輕粉 五匣 男子 乳汁 半兩 同研

成膏和藥末九如蠶豆大 朱砂 為衣 溫酒 侵晨 十九日

一服 至晚 下肉 疔瘡 疔子 若項 有五 固則 以五 服藥 取之

視其所生 多少 以為 服數 既可 更進 數服 如熱 毒瘡 即

未有 頭頂 者亦 用消 散一 方加 巴豆 三七 粒燒 存性 入

瘰癧 十九 卷

早蓮子圓 治少長 臃氣 不平 憂怒 驚恐 諸氣 抑鬱 結聚 瘰
癧 滿 田 項 腋 及 外 傷 風 寒 燥 濕 飲 食 百 毒 結 成 諸 漏 發 作
寒 熱 遍 于 項 腋 無 問 久 近 悉 驗

旱蓮子

運翹子

戴靈仙

何首烏

蔓荆子

三棱

能溫席
畏惡燥

赤芍藥

已上各
二兩

南木香

二兩
不見火

大皂角

三棱刮去皮酥
炙无則用羊脂

右為末米糊圓梧桐子大茶清下二十九至五十九日
二服小兒量与之食後服

破毒

雄黃圓

治瘰癧久你不愈寒熱性來項筋李急已破

未破皆可服之立見逐下惡物自小便中來

通明雄黃

懸塊大朱砂各三分

水銀二分

班猫

二十八個去足并用糯米炒黃

右先以班猫為末續以雄黃朱砂另研為末再入水銀
細研合和用鷄子清和糯米稠糊為丸黍豆大每服三

七九米飲或溫酒下如惡物未見半朝再一服

已驗方

治瘰癧已作者

烏雞子

菜枝班猫四十九個去頭翅足

右每鷄子一個去頂用筋撻勻入班猫七粒以帚糊盪
於飯上蒸熟取開去班猫食鷄子每食一個煎生料五
積散嚙下服不過四五已破者生肌未破者消散

海菜圓

治瘰癧生於頭項上交接名蛇盤歷宜早治之

海藻菜

蒸筒麥炒
去殼

白蠟蚕

抄斷絲

右為末取白梅肉泡湯為圓梧桐子大每服六七十丸
臨卧米飲送下其毒當自大便泄去忌豆心雞羊酒麪

日五六服

治瘰癧久年不愈者

不蛀皂角子一百枚用米醋一升研砂二分同煮醋尽
炒令酥看數瘰子多少如生一个服一枚生十个服十
枚細嚼米湯下酒浸煮服亦可

五厘散 治瘰癧神效已破未破皆可服

連翹 赤芍藥 川芎 當歸

甘草 炙 滑石 研各 黃芩 三分 白牽牛 生取

土蜂房 蜜水洗飯上蒸 地膽 去頭翹足和米炒

川烏尖 柴箇 日乾各二分半 黃為反料二分

右為末每服一大錢濃煎木通湯調下臨卧服毒氣從
小便中出澁痛不妨如粉片塊血爛肉是也如未効

或衝上麻悶不能強制翳葱白一寸茶清下以解之如
小便澁燈心煎湯調五苓散服瘡處用好膏藥貼若瘡
癰疽用此宣導惡毒本方去黃芩不用

皂角散

不蛀皂角不以多少每三十條作一束以棕櫚裹之縛
定於淘缸內浸一月取出却於長流水內再浸一月死
水不能浣洗不可用去棕櫚曬乾不得焙楊羅為末每
一兩入射香半錢全蝎七箇研細拌勻每服一二錢溫
酒或湯飲調下一兩服愈

粉托裏散 治瘰癧攻心嘔吐發出其毒方見前

蝸牛散

治瘰癧神效方見前

蝸牛散

治瘰癧已潰未潰皆可貼

蝸牛

不拘多少以竹索串尾上晒乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用帛花量病大小貼之
一法以帶殼蝸牛七箇生取肉入丁香七粒於七殼內
燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

燒灰散

大田螺并殼肉燒存性灰破者乾貼未破者清油調傳

傳方

白芷煎湯泡荆芥候溫軟帛蘸洗拭乾好膏藥

貼膿汁惡肉出盡用後藥傳

半夏

南星

血竭壹分

輕粉少許

石為末以津唾調傳一方用五倍子海螵蛸搗末雷在
五靈脂麝香為末乾用清油調搽濕則乾疹

天傳方

治瘰癧初作未破作寒熱

木鱉子二箇草烏半兩以米醋磨入搗爛葱白連根蚘
蚓糞少許調勻傳瘰癧上以紙條貼令通氣孔尤妙

瘰癧

血竭壹分

麝子

燒灰

尸香少許

右灰研津唾調傳

灸法

以手仰置肩上微舉肘取之肘骨尖上是穴隨患處左
即灸左右即灸右艾炷如小筋頭大

瘰癧
十九卷

再灸之前不過三次永無恙如患四五年者如或用藥
壓不愈夜時着灸申時即落所感稍深若三作即三灸
平安又法只以蒜片貼有癰上七壯一易蒜多灸取效

癰瘰

南星膏

治皮膚頭面上瘡癰大者如拳小者如粟或軟或

硬不疼不痛宜服以可取用

右用大南星一枚細研稠糝用米醋五七滴為膏如無
生者用乾者為末醋調如膏先將小針刺痛處令氣透
却以藥膏攤紙上象癰大小貼之

治小癰方

先用甘草煎膏筆蘸糝糝癰傍四圍乾后復糝凡

三次後以藥

九戟

元花

甘遂

石為末米醋調別筆糝傳其中不得近着甘草處次日
縮小又以甘草膏糝小暈三次中間仍用大戟元花甘
遂如前法自然焦縮凡骨癰肉癰膿癰血癰石癰皆不
可決惟脂癰決去其脂粉則愈全區六種癰瘰肉癰尤不
可治治則殺人

癰瘰

治同上 方見前

癰瘰

兼去鼠竅痔真奇療也

元花根淨洗帶湯不得犯鐵器於木石器中搗取汁用
線一條浸半日或一宿以線繫癰經宿即落如未落不
換線不過兩次自落后以龍骨訶子末傅瘡口即合繫
鼠竅痔依上法累用文效如無根只用花炮濃水浸線

黃丹末 治鼻瘡癩子及面上雀兒斑

黃丹

硃砂

巴豆 去油

餘藥 各酌錢

右為末入生礬石灰末一已雞子清調勻酒渣用鵝翎刷上雀兒斑竹針刺破挑塗點之纔覺痛及微腫可法

丁瘡

秘方治丁瘡

防風

細辛

甘草節

白殭蚕

青皮

黃連

羌活

獨活

蠟退

赤芍藥 各半兩分

右坐微之服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑一两同搗爛熱酒利服后用酒水各半盞生薑二片煎服病

根瘋後再入人黃少許煎服下一兩湯湯去餘毒更用

白梅倉耳子研爛貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之甚若不疾然有効驗速累試之

秘方治魚臍丁瘡

絲瓜葉 即覆刺葉

連鬚葱

韭菜

右同入石鉢內搗爛如泥以酒和服查貼腋下如病在左手貼左腋下右手貼右腋在左足貼左膝右足貼右膝如在中則貼心臍並用布帛包住俟肉下紅絲處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛

倒倒則難救矣

酒煎散治丁瘡

了瘡 九卷

赤烏柏根

水柳根

水楊梅根

芎頭根

紅內消

香白芷各等分

右多為對散酒煎旋入通明雄黃研爛同服如瀉時瘡勢畧退時只喫此藥若不瀉再服通利藥

通利藥

里玄牛兩乙巴豆拾兩箇大黃五分生用

右為末米糊圓如棗豆大初服七圓次伍圓第三服五圓如瀉不止喫白米粥及冷水洗五心如一服即瀉住服量入虛實與服如人盛服前二藥通再服后藥人十分實者

大通藥

芫花

巴豆

大黃

荆芥 枳殼 等分

右對散白水煎一沸便瀉過空心服可留藥滓再煎放若要瀉住再服一服便住

連翹散 瀉後用此

連翹

當歸尾

羌活

獨活

防風

赤芍藥

小赤豆 各伍

大黃 各分

木香

羌活

羌活

薄荷

紅內消

杜白芷

升麻

甘草

忍冬草 絡三

若潮不退加黃芩 梔子仁 絡三 朴消 如

右為末酒調服不拘時候薄奇湯亦可喘加入參大病

三四服愈如煩嘔甘草半兩豆粉一兩為末酸豨水下

如割瘡去了疔子止血用毛鉄甲為末傳

角瘡口方

霜梅拾箇 大黃伍分

右為塊子用石灰炒過去石灰入黃丹三錢為末乾糝瘡口

蟬蛻散 治丁瘡最有功效用蟬蛻殭蚕為末酸醋調塗四

畔留瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡

蟾蜍膏 治丁瘡取蟾酥以白麪黃丹搜作劑圓如麥顆狀用指甲爬動瘡上插入重者針破患者以一粒內之仍以水沉膏貼之取蟾酥法用癩蛇蟻於肩稜上以手按出酥於油紙上或桑葉上用新瓦盞下然後插在背陰

處經宿則自乾白於鵝翎筒內盛之

水沉膏 白及末半錢水盞內沉下澄去水却於皮紙上攤

開貼瘡上

灸法 掌後橫文後五指男左女右灸七壯即瘡屢效

簽刺瘡

單方 治竹草簽刺瘡以象牙屑傳之立出

又方 爵白梅傳之立出

敷藥 治竹草刺瘡發腫作疼緣傷時不曾出血蓋被惡毒氣注痛不止夜卧不安初破時其瘡紫赤黑色較時起三五重皮是也

綠尼 半兩小便流熱放

丹參 貳錢半

簽刺瘡
上元卷

麝香 乙字 馬兜鈴根 乙錢半

右為末漿水洗淨瘡口上敷 立效

湯火瘡

傳方 劉寄奴不以多少為末先以糯米漿雜羽掃傷處然後糝藥並不痛亦無痕大凡湯者急以醋調茶鹽末塗之護肉不壞然後用別藥傳之至妙

又方

黃連

黃柏

輕粉各等分 朴消少許

右為末入清油用合子合住飯上蒸調塗立愈

湯火燒細研山梔子濃調雞子清鵝毛輕拂去冷如

反方 則柏葉燒灰存性為末雞子清調傳如乾再上

黃柏散 治湯火傷

雞子殼

黃柏樹皮

朴消

大黃

寒水石

右等分為末白水調塗極効

至聖書

右用雞子黃於銀石器內熬自然油調好粉傳之

近効方 山枕杷柴取皮焙乾為末生蜜雞子清調傳

四黃散 治湯發火燒熱瘡疥痛

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

白皮 各等分

右為末水調成膏以雞翎時刷

（終藥）治白火多生火斑瘡有汁

黃柏皮薄荷葉為末搽之即安

項瘦

破結散治五瘦堅硬不可移名石瘦皮色不變名肉瘦筋絡露結名筋瘦赤脈交絡名血瘦隨憂愁消長名氣瘦五瘦此不可妄決破破則膿血崩潰多致天枉服此十日知

二十日愈

海藻洗

龍腦草

海蛤

通草

昆布洗

礬石枯

松蘿各叁分 麥麩四兩

半夏

海帶各二分

右為末每服方寸匕酒調日三服忌鷄魚猪肉豆辛生

乘及諸毒物

（灸法）治諸瘦灸大空穴三七壯又灸有髑左右相當穴七

穴男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯穴在

有端兩骨間陷者宛上中掌臂取之

又灸兩耳后髮際共百壯

外科精要十九卷終

項瘦
十九卷終