

新刊西學集成

醫學集成卷之七

後學 義烏 傅滋 續註

○諸氣五十八

脈法

沉為氣沉氣極則伏潛弱難治沉滑兼痿飲沉而無力為氣

此治病調氣

丹溪云周流一身以為生者氣也苟內無所傷外無所損何病之有今冷氣滯氣逆氣皆是肺受大邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成劇病局方

類用辛香燥熱之劑以火濟火咎悻誰執

經云諸痛皆因於氣百病皆生於氣怒則氣上喜則氣

緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收足古惠古則

氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同也子按

和云天地之氣常則安變則病而况人稟天地之氣

五運迭侵於外七情交戰於中是以聖人畜氣如持

至宝痛人致彼而反傷太如此軒岐所以論諸痛皆

因於氣百病皆生於氣弟有九氣不同之說無本一

也則所觸而為九怒喜悲寒火驚思勞也蓋怒氣逆

木乘脾故甚唾血及癆泄故氣逆上矣怒則陽氣逆上而肝

刺故氣緩矣悲則心氣急肺布葉辛而上焦不通榮

衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精劫上則上焦閉

不行故氣收矣是則膝理開榮衛通汗大泄故氣泄

矣驚則心無倚神無所歸慮無所定故氣亂矣

則喘息汗出在外皆越故氣耗矣思則心有所存神
 有所歸正氣流而不行故氣結矣抑嘗考其為病之
 詳變化多端如怒氣所至為嘔血為食泄為驚厥為
 薄厥為陽厥為胃膈脅痛食則氣逆而不下為喘滑
 頰心為消痺為肥氣為日暴育耳暴閉筋緩於外
 為離直喜氣所致為笑不休為毛革焦為肉病為陽
 氣不收其則為在悲氣所至為陰縮為筋牽為肌痺
 為脉痿男為數洩女為血崩為酸鼻牛頻為目昏為
 少氣不能報息為泣則臂麻恐氣所至為破胸脫肉
 為骨痠痿厥為暴下清水為面熱膚急為陰痿為俱
 而眩顛驚氣所至為潮涎為目衰為口吐為疑隔為
 不省人事僵仆父則為瘳痺勞氣所至為噎噎病為
 喘促為救血為腰痛骨痿為肺鳴為高骨壞為陰痿
 為喘血為宜目視為耳閉男為少精女為不月衰甚
 甚則積上乎若壞節泪上乎不可上思氣所至為不
 眠為嗜卧為昏瞶為中痞三焦閉塞為咽嗝不利為
 瞻痺嘔苦為筋痿為白淫為得後與氣快然如衰為
 不嗜食寒氣所至為上下所出水液澄滋清冷下利
 青白云云是氣所至為喘嘔吐酸暴注下迫云篇
 又稽之內經治法但以五行相勝之理互相為治如

怒傷肝上屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木太過
 則肝亦自病喜傷心土屬火喜則氣并於心而肺金
 受邪大太過則心亦自病悲傷肺土屬金悲則氣并
 於肺而肝木受邪金太過則肺亦自病恐傷腎土屬
 水恐則氣并於腎而心火受邪水太過則腎亦自病
 思傷脾土屬土思則氣并於脾而腎水受邪土太過
 則脾亦自病憂傷肝木屬木憂則氣并於肝而脾土
 太過則陰亦自病足傷氣土屬陰寒勝熱則陽受邪寒
 太過則陽亦自病凡此數者更相為治故悲可以治
 怒以治思以治恐以治喜以治憂以治怒以治思以
 治思以治恐以治喜以治憂以治怒以治思以治思
 亡此之言奪之凡此五者必詭詐誦性無所不至然
 後可以動人耳目易人規听若宵中無才器之人亦
 不能以此治也足可以治寒上可以治熱逸可以治
 勞習可以治驚經曰驚者平之夫驚以其忽然而遇
 之也使習見習聞則不驚矣如丹溪先生治一女子
 許婚後夫經商二年不歸因不食因臥如痴他無所
 病但向裏床坐此思想氣結也藥難治得喜可解
 不然令其怒懼之大怒而哭之三時許令解之幾

一曰... 而果... 然病... 不... 本... 益... 脾... 主... 思... 上... 遇... 則... 脾... 氣... 結... 矣... 又...
 食... 怒... 傷... 肝... 木... 曰... 能... 克... 土... 木... 氣... 中... 發... 而... 冲... 開... 脾... 氣... 矣... 又...
 如... 子... 和... 治... 一... 婦... 人... 之... 思... 而... 不... 眠... 令... 胸... 其... 怒... 婦... 果... 怒... 是...
 之... 因... 睡... 捷... 於... 影... 響... 惟... 勞... 而... 氣... 耗... 恐... 而... 氣... 奪... 者... 為... 難... 治...
 喜... 者... 火... 病... 百... 脉... 舒... 和... 故... 也... 又... 聞... 誰... 先... 生... 治... 喜... 勞... 之... 甚...
 而... 病... 者... 誰... 勿... 其... 疎... 為... 之... 失... 聲... 伴... 曰... 吾... 取... 索... 去... 數... 日... 更...
 不... 未... 病... 者... 悲... 泣... 後... 而... 愈... 矣... 素... 問... 云... 俱... 勝... 喜... 可... 謂... 得... 矣...
 開... 者... 也... 凡... 此... 上... 類... 內... 經... 自... 有... 治... 法... 庸... 工... 癸... 而... 不... 行... 亦...
 已... 久... 矣... 幸... 河... 間... 子... 和... 州... 漢... 嚴... 先... 生... 出... 而... 其... 理... 始... 明... 後...
 之... 幸... 者... 宜...
 知... 所... 從... 事...

氣無補法世俗之言也以其為病痞悶塞似難於補

不思正氣盈者不能運行邪滯者而不出所以為病

經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟或氣怯不用

補法氣何由行。氣為陽無寒之理上升之氣覺惡

醫... 經... 卷... 之... 七...
 三

寒者亢則害承乃制也。氣有餘便是火冷生氣者

高陽生之謬言也自兌冷氣自下而上者非真冷也

蓋上升之氣自肝而出中挾相火自下而出其熱為

甚火極似水陽亢陰微也河間論氣為陽而生

之化神狂氣亂而病熱矣又云五志過極皆為火也

而其治法袖得言外之意凡見喜怒悲恐思之益皆

以平心火為主至於勞者傷於動上便屬陽驚者駭

於心上便屬火一者必以平心火為主俗醫不達此

者遂以寒氣鬱用香附蒼朮撫芎。調氣用水香然

味辛氣能上升如氣鬱而不達固宜用之若陰火冲

上而用之則及助火邪矣故必用黃柏知母而少用

水香佐之。氣從左邊起者肝火也。氣刺痛皆屬

火當降火藥中加枳殼。破滯氣用枳殼。上能損
至高之氣二三服即止。恐傷真氣。上實者可服。實
熱在內相火上冲有如氣滯用知母黃柏芩連。陰
虛氣滯用四物以補血。因事氣鬱不舒伸而痛者
木香調達之。憂而痰氣香附半兩瓜蒌一兩具母
山查各三錢半夏一兩。稟受素壯而氣刺痛用枳
殼烏藥。因死血而痛者桃仁紅花歸頭。解五臟
結氣益火陰經血用梔子炒黑為末入湯同煎飲之
甚効

河間云婦人性執故氣疾為多宜正氣天香湯先導之

子和治一婦人勞苦太過大便結燥噴逆上氣時喝上
然有音嘔嘔鮮血以解毒湯加木香漢防已煎服時
時吸之復以木香檳榔丸泄其逆氣一月而安

附方

正氣天香湯

香附八錢 陳皮 烏藥

紫蘇錢各三 乾姜

甘草錢各 右剉水姜煎

治氣六合湯

四物湯加木香檳榔

木香檳榔丸

木香 檳榔 青皮

陳皮 黃栢

義水煨 枳殼 黃連

香附各等分 牽牛頭末

大黃各加二倍 川歸一兩入 右為末

水丸

木香順氣湯

治濁氣在上

升麻

柴胡

各一分

木香

草豆蔻

煨

蒼朮

各三分

厚朴

四分

青皮

陳皮

益志

茯苓

澤瀉

乾生姜

半夏

吳茱萸

各二分

川歸

五分

右剉水煎

升陽順氣湯

治七情所傷及勞役飲食不節滿悶

短氣

升麻

柴胡

陳皮

川歸

草豆蔻

各一錢

半夏

人參

各二錢

黃芪

四錢

甘草

黃栢

各五分

神曲

煨

半

右剉姜水煎

恐則氣

下者宜服此

四磨湯 治七情所感上氣喘急妨悶不食

人參 檳榔 沉香 烏藥

右件各濃磨水和煎三五沸溫服

蘇合香丸 沉香 射香 阿子

丁香 青木香 安息香 香附 藜蘆

白木 白檀各三兩 薰陸香 蘇合油 龍腦各一兩

朱砂 烏犀角各一兩 右末用安息膏并蜜丸桐子大

湯下四丸

木香化滯湯 治因憂氣食溫麵結於中脘腹皮底

微痛心下痞滿不食 方見二十九

流氣飲子

治五臟不和三焦氣壅心胸痞悶腹滿

膨脹有背攻痛嘔吐氣喘痰盛浮腫

木香二錢半

檳榔

青皮

半夏

茯苓

桔梗

枳殼

當歸

芍藥

防風

川芎

紫蘇

枳實

黃芪

烏藥

大腹皮

甘草

陳皮

七錢半

右劉姜棗水煎服

疎氣丸

大黃

二錢半

枳殼

一錢

冬七日春秋五日夏

三日

蘿蔔子

二錢

黑丑末

四錢

滴水丸

清膈丸

治溫熱氣滯

黃芩

黃連

各半

香附

半

蒼朮

右新取瓜

葵梓爛和九小豆大溫水下

○疝癰五十九

經云疝癰者陰器連小腹急痛也

脈法

寸口弦緊為寒疝

弦則衛氣不行氣不行則惡寒緊則不欲食

寸口遲緩

遲為寒緩為氣上寒相搏轉筋而痛

沉緊豁大為疝弦急搏皆疝視在

何部而知其藏心脈微滑為心疝肝脈滑為癰疝腎

脈滑之瘰癧大急沉為腎疝肝脈大急沉為肝疝心

脈搏急為心疝肺脈沉搏為肺疝脾脈緊為脾疝寸

弦而緊弦緊相搏為寒疝跌陽虛遲為寒疝

丹溪云 疝氣畢九連小腹以痛也 有痛在畢九者痛在
五樞穴邊者皆足厥陰之經也 或無形無聲或有形
如瓜有聲如哇自素問而下皆以為寒蓋寒主收引
經絡得寒則引而不行所以作痛然亦踢水浸水終
身不病此者無熱在內故也 大抵此病始於濕熱在
經過而至久又得寒氣外束下得踈散所以作痛若
只作寒論恐為未備或白厥陰經濕熱何由而致予
曰大勞則火起於筋醉飽則火於胃房勞則火起於
腎大怒則火起於肝火積之久母能令子虛濕氣便
盛濁液凝聚併入血隊流於厥陰 屬肝為將軍

下之小兒有此因父精法故不治。以氣與氣症大
同小異狀如仰瓦則入小腹行立則出入囊中
逐氣疏經之劑下之。痛亦因地氣平濕江淮
生其狀腫如升斗不痺不痛宜去濕之藥下之。專

主肝經與腎經絕無相干

或曰肝經與沖任督所會

傷於熱則縱使不收傷木性急速火性暴而痛暴
矣前人論症甚多或曰旁光或曰腎余或曰小腸氣
其十皆歸於肝經也

病不可下。亦宜灸大敦穴

在足大趾指甲後一非
大聚毛間灸三壯

因痰飲食積流入厥陰聚而成核。因痰結其本經

。因虛而感或內火外寒鬱之。挾虛者用參水為

君佐以踈導藥

又云按之不痛者屬虛加桂支姜汁
服之大熱虛而得者亦不可以虛而

醫補必先游其所
蓋濕熱因寒鬱而發劫藥用挽

子以降濕熱為頭以破塞鬱二味皆下焦之藥而烏
頭為梔子所引其性急不容胃中停留也。定疝痛
用海石香附為末姜汁調下亦治心痛。諸疝定痛
速効枳十山梔棠蘗菜萸各炒濕盛加荔枝炒丸服
一云長流水。食積與瘀血成痛者梔子挑仁山查
下一二錢。枳實菜萸為末順流水入姜汁作湯下。一本有苗香附子
陽明受濕熱傳入大腸惡寒發熱小腹連毛際結核
悶痛不可忍用山梔挑仁枳核炒山查等分入姜汁
煎服

瀕有四

一云不痛者是癩皮三因論腸癩因房室過勞氣虛因
雲冷腸澀管系不液滲入額中上下難治。氣癩因
七情藏氣下墜陰癩腫脹急痛易治。水癩濕氣得
之則腫脹其陰易治。卯癩因勞役坐馬致卵核腫
脹或偏有大小上下無常此難治也。外
有婦人陰門挺出亦名癩病但治不同耳

癩非痛斷房事與葷味不可用藥，癩不痛者蒼水

神曲白芷山查川芎枳子半夏

水腎 或曰因腎虛寒冷凝治其間脹大作痛頑痺結

硬宜溫散利逐之

丹溪治一人舊有疝積後因山行飢甚遇橘芋食之即

右丸腫大寒熱先服平胃劑一二貼次早神思氣至

下焦嘔逆覺積動復吐後和胃氣疎通經絡而愈

一入虛損潮熱腎偏墜小腸氣四物加小茴香吳茱
萸胡芩芎各五分枳子青皮紫蘇漸愈

涌伯仁

治一婦病寒致疝自臍下上心背脹攻痛而腸

尤甚嘔吐煩悶不進飲食脈二手沉結不調曰此由
寒在下焦急攻之與灸章門氣海中脘服玄胡桂檉
佐以懷木諸香茯苓青皮等十日一服溫利藥丸聚
而散之也

一老人病臍腹疝絞音痛鑿以溫中散寒無驗視之脈
兩尺搏腎而沉曰此大寒由外入也寒喜中下故為
疝治宜在下加沉降之劑引入下焦數服愈

一人病氣則臍下築_レ漸至心下嘔涌痛憊手足清
喉中澀_レ而瘁眉本凌疼目不欲視頭不欲舉神昏
欲睡而不寐惡食氣畢丸控飲小便數而久年未三
十疋瘖尤甚人劣_レ不自持脉沉弦而濇曰是得憂
鬱憤怒寒濕風雨乘之為肝疝也禹在厥陰故當脉
所過處皆病焉厥陰肝也張從正云諸疝皆傷肝經
且肝欲急以辛散之遂取吳茱萸佐以姜桂及治氣
引藥兼以筋練等丸每日一溫利之三月安

秘方

治諸疝

枳實

治痛

山梔茱萸橘子山查肉桃仁

煎血

川烏劫

君卒散

治寒疝入腹心腹卒痛小腸膀胱氣絞痛

冷重如石自汗

山拖

五十枚燒

附子炮一枚

以烏頭每服二錢酒煎

神應散

治諸疝心腹絞痛不忍能散氣開鬱

玄胡索

胡椒

或加

右每二錢酒下

牡丹丸

治寒疝心腹刺痛及血

川烏

炮去

牡丹皮

四

桃仁

去

桂

青皮

蜜丸酒

桃仁湯

治癰疽

桃仁

茱萸

桂枝

葵藜

青皮

茯苓

檳榔

木香

海藻

祝穀

三稜

莪朮

隨意加減

天羅筋燒灰治疔

應痛丸

治敗精惡物不出結成疔痛不忍

阿魏

二兩醋和蒸麥面煨熟

檳榔

大者括空乳香滿盛將刮未用蒸麥而拌作餅

煨右末入硃砂

一錢赤芍藥

一錢麩糊丸

如梧桐子

大盞酒下

雄黃散

治陰腫如

雄黃

一兩 礬 二兩

甘草

半兩 煎洗

治疔

蒼朮

香附

各鹽炒

又黃栢

酒炒

玄胡索

青皮

益智

桃仁

已上

茴香

佐

戊子

鹽炒

甘草茂

右剉水煎服後一痛過則不再作矣

五葉湯

枇杷葉 野紫蘇葉

板葉

蒼耳葉

水晶葡萄葉

右煎水洗

添氣神方

甚至上冲如有物築心藏欲死手足冷者

二三服除根

硫黃

中溶化即服

陳皮

等分

荔枝核

為末炒焦黃

等分為末飯丸桐子大每服四

五丸酒下疼立止甚者用六丸不可多也

橘核散

桃仁

橘核

梔子

川烏

吳茱萸

右水煎

積疝方

山查兩

茴香炒

此胡三

牧丹皮

右末酒糊丸如桐子大盐湯下五十九

木腎

雄黃楮樹葉為末酒糊丸桐子大盐酒下五

十九

又方

枸杞子 南星

半夏

黃栢炒

蒼木

益炒

山查

白芷

神曲

滑石

昆布

吳茱萸

右末酒糊丸益湯下七十九

茴香練實丸

治陰疝痛及小腸氣

川練炒

茴香炒

山茱萸

石茱萸

青皮

陳皮

羌花醋炒

馬蘭花等分

右醋糊丸梧桐子大

酒下每服三十九

川苦練散

治小腸氣

川練子

一兩用巴豆十五粒破後同炒黃去巴豆

木香

茴香

益炒各一兩

右末空心酒下二錢

治小腸氣腎核作痛

蒼朮

陳皮

川練子

各三錢

紫蘇

二錢

葱

五根一方有甘草五分

陰囊腫脹大小便不通

白丑

二兩

白朮

桑白皮

木通

陳皮

各半兩

右為末空心姜湯下

每服二錢

熨法

白鹽半斤炒極熱包熨痛處或白泥一握置臍

上用熨斗熨之或以艾灼之皆可

灸法 大敦氣海章門中腕歸來等穴 取法見前

偏墜木腎腫火 蘭門二穴 在陰莖根兩旁各開三寸是穴針一寸半灸二七壯

痺 音閉 六十

冊溪痺入痛風中茲以痺為偏門而諸痺分於其下

麻木 痺 痛風 肢節痛 臂痛

轉筋 孿急 痙強

脉法 沉瀯或微瀯而緊又大而瀯或急皆痺右寸沉

而遲瀯為痺左寸結不流利為血痺右關脉舉按皆無力而瀯為肉閉左關弦緊而數浮沉有力為筋痺遲為寒數為熱濡為濕滑為痰為虛

卅溪云因風寒濕三氣合而成之寒氣勝者為痛痺則

陰受之故濕氣勝者為着痺濕則肌肉筋風氣勝者

為行痺風則陽受之故○病作於陰雨及三九月大

陽寒水用事之時麻水不仁或仁或不仁或痛或不

痛或筋屈而不伸或引而不縮寒即虫行熱即從緩

不洎亂也皮痺不已而成肉痺上不已而成脉痺

脉痺不已而成筋痺上不已而成骨痺上而不已

內含其合難治矣

痺論云風寒濕三氣乘虛而客於五臟所致客於心則

煩心上氣噎乾恐噫厥脹客於肺使人煩滿喘而吐

客於肝多飲數溲小腹痛如懷姙夜卧則驚客於脾
四肢解隨發咳嘔沫上為大塞客於腎善脹尻以代
踵脊以代頭客於腸數飲而小便不得中氣喘爭時
發衄泄夫大腸乃傳導為沖和之氣三氣客之而和
氣閉矣水道不通故糟粕不化則喘爭而衄泄也若
客於胞小腹膀胱按之內痛若沃以湯小便澁上為
清涕夫三氣客於胞中其氣不能化出故胞滿而水
道不通隨經出於鼻竅客於血脉隨脉流通上下升
降一身謂之周痺

華佗論

痺乃四時不正之氣感於臟腑有氣血肉筋骨

之分氣痺者愁思喜怒過則氣結於上久而不消則
傷肺生氣咳邪氣勝於上則胸腹痺而不能注於下
則腰脚重而不能行貫於舌而不言遺於腸而不瀉
壅則痛流則麻右寸通而沉滿者是血痺者飲酒過
多懷熱太甚或寒熱折於經絡或濕犯於榮衛因而
血搏漸成枯削失血之證左寸脈絀而不流利是也
肉痺者飲食不節肥美之為肉不榮膚不澤則文理
踈三氣入之則四肢緩而不收持右關脈舉按之無
力而虛也筋痺者由怒無時行步奔急濡邪傷肝
肝失其氣容熱客之流久筋會使筋急而不舒左關

脉弦急而數浮沉皆有力是也骨痺者乃腎氣傷於
腎氣內消則不能閉禁邪氣妄入故也

脉木

丹溪云脉木是氣虛木是濕痰死血又云十指麻是胃
中有痰又云風濕

熱下陷入血分陰中陽道氣不行故
谷目則渾身麻亦由痰在血分者

戴人

以苦劑滿寒痰以與淡劑

白木 除溫 茯苓養水 桂 伐水 姜附寒勝加之

東坦

治一婦脉木六脉俱中得弦洪緩相合按之無弦

在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾
身麻木晝減夜甚開目則漸退久則止俱而不換身

猝重咳熱煩燥氣促喘余無所苦色赤脈相應然曰陽
病瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脈皆屬於
目又云開目則陽道行陽氣遍布周身閉目則陽道
閉而不行如晝夜之分知陽衰而陰旺也且麻木為
風皆以為然細按之亦有區別耳又坐亦有麻木喻
如繩縛之人釋之覺麻作而不敢動良久自已以此
驗之非風邪乃氣不行也治當補肺氣則已如經脈
中陰火垂其陰分動於中而麻木當蕪去其陰火
則愈矣癸者秋涼在外在上而作也宜以濕劑實
其皮毛身重筋緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當

升陽助氣益血而瀉陰火與溫通行經脈補其陰陽
則已矣遂以補氣升陽和中湯服之愈

老人病身軀熱麻肢膝無力飲食有汗善笑善飢痰
涎不利舌強難言聲啞脈左寸洪大有力此邪客於
經絡之中二臂外有熱癢問其故對以燃香所致予
曰病皆由此也蓋手之三陽從手表上行於頭加以
火邪陽併於陽勢盡熾焉故邪熱妄行流散於周身
而為熱麻經云胃熱則虫動^上則蕪泉開故涎下
熱傷元氣而為沉重無力飲食入胃慄悍之氣不循
常度故多汗心火盛則喜笑脾胃熱則消是善飢肺

金裏則聾聵仲景云微數之脈真不可交君奉養以膏梁之味無故而加以火熯之毒熱傷經絡而致治以清神補氣湯不旬日而愈

一人五月間兩手指麻之怠惰嗜慾卧此熱傷元氣也以補中益氣湯減白朮陳皮川歸加芍藥五味遂安

一人年四十餘面目十指俱麻乃氣虛也以補中益氣湯加木香附子麥門羌活防風烏藥服之愈

一人四肢麻木乃氣虛也四君子加天麻麥門黃芪川歸大劑服之愈

附方

附子湯

治風寒濕痺

人參

附子

炮天皮齊

桂枝

白芍藥

甘草

茯苓

各三錢

白朮

一兩

行痺加桂枝湯痛痺加附子姜

茯苓胞痺加四苓腸痺加平胃茱萸草豆蔻

五痺湯

治風寒濕痺肌膚手足緩弱頑麻不仁

有海桐皮川歸芍藥

姜黃

羌活

白朮

防已

各一兩

白草

半兩

水煎

麻木方

人參

黃芪

助陽

川歸

行陰

甘草

去

黃柏

白朮

蒼朮

茯苓

去

升麻

羌活

芍藥

燄加二陳

忍冬膏

治五痺拘挛

氣補氣湯

黃栢知母

為君味苦寒為之助壯筋骨乃腎欲堅急

各以

黃芪主乾姜

獨製

五味

止汗補肺不足臣

炙甘草常歸

潤和血燥

升麻柴胡

行火陽也明經右對自地升天也

水煎取清汁服

補氣湯

治皮膚麻木

黃芪

陳皮

甘草

各一兩

澤舍

芍藥

各半水煎

補氣升陽和中湯

治閉目則麻木

黃芪

半兩

佛耳草

人參

三錢

白朮

川歸

二錢 草豆蔻

蒼朮

半一錢

甘草

生 升麻

段國良集卷七

柴胡

黃柏

茯苓

澤瀉

芍藥

三錢

水煎

中和補氣湯

治合目則麻木四肢無力痿弱醋

心目昏頭眩

羌活 七分

獨滑

川歸

黃柏 三分

黃連

麻黃

柴胡

神曲

木香

草豆仁 各二分

人參

白朮

猪苓

澤舍 各

甘草

升麻 各五分

黃芪

蒼朮

陳皮 各二分

芍藥 三錢

右作二服水煎

痒

痒乃血不榮於肌腠四物加黃芩煎調淨萍末

一法用防風通聖散

又論見燥門

痛風

州溪云四肢百節走痛是也屬風熱濕與血虛因血受熱已自沸騰或再涉冷受濕取涼熱血得寒污濁凝澁不得運行故痛夜則痛甚行於陰也治以辛熱流散寒濕開發腠理則血行氣和而愈然有數種治法亦異

因濕痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非為附氣壯不能行故用為引經若以為主治非惟無益而有殺人之毒宜行氣流溫舒風導滯補新血降陽升陰浴有先後須分腫與不腫可也不可食肉上為陽

大能助火素火盛者因水少不能制若食厚味下有
道溺上有痞悶雖魚麵醬醋酒皆斷之先以二陳加
酒浸白芍藥少佐黃連以瀉心火

治法

蒼木南星白芷川芎當歸酒芍在上加羌活滑桂枝

便威靈仙在下加牛膝防己木通黃柏又云四物湯

陳皮茯苓甘草白芷草龍胆在上一屈膝在下為溫加藥同俱二倍桂枝倍無枯梗氣虛加參朮意夜痰加

南里血虛加芎歸佐以桃仁紅花

俗人用草藥以取速效如石絲為君過山龍等佐之
皆性熱而燥不能養陰却能燥溫病之殘者溫痰得

燥而開熱血得熱而行故亦暫効若病深而血少者則愈初愈靈而病愈深矣

痰用二陳湯加酒苓悉滑蒼朮 亦在掌鼻

溫用蒼朮白朮之類佐以竹瀝及下氣藥 又云有溫

走病或測所痛過法集即發者當作溫病治之

風者小續命湯按驗

血虛用芍藥之類佐以桃仁紅花

○瘦人多是血虛與熱脈必澁宜當歸紅花桃仁牛膝

積柳等同用

○肥人是溫痰流注經絡 痰必滑

通里... 七... 示

下部有濕腫痛

白芷

草龍膽

黃柏

知母

固是捷法若肥人宜蒼白木南星滑石茯苓之類

苓之類

薄桂味淡能橫行手臂令他藥至痛處成靈仙治上

林痛風虛弱勿用引云白萎黃能引至手臂尤妙

上中下痛

黃柏

蒼朮

糾反

南星

各一兩

神曲

炒

台芎

各一兩

防已

白芷

桃仁

各半兩

威靈仙

酒洗

桂枝

微行

薤白

各三錢

草龍膽

五分

紅花

一錢半

右為末曲糊丸食前下每服一百丸

血氣兩虛有痰濁陰火痛風

人參

山藥

海石

四星

各一兩

白朮

熟地

黃柏

炒黑

龜版

酒炙各二兩

乾姜

燒灰

瑣陽

半兩

右為末酒

糊丸服

糊丸服

三妙散

治筋骨疼痛因濕者

黃柏

酒炒

蒼朮

片浸炒

右為末沸湯入姜汁調服二味皆雄壯之

氣表實氣實加酒少許佐之有氣加氣藥血虛加補

血藥痛甚者加姜汁服

潛行散

黃芩

酒浸炒

右末湯調服

一方治痛風

黃躑躅

即羊躑躅

振一把糯米

一盞黑豆半盞酒水各一椀徐下服之大吐大瀉一

服便能行動

附方

定痛丸

治風濕一切痛

乳香

沒藥

地龍

去上

木鱉子

去殼

金星草

五靈脂

分

右末蜜丸彈子火酒下一丸

定痛黑丸子

杏仁

黃蠟

半兩

江子

宿砂

一个各研

右三件灯上燒存性加乳香火炒溶

蠟丸黍米大服十丸

定注疼痛

靈仙

川芎

七錢

桃仁

炒

川歸

蒼朮

桂枝

各一錢

生桃仁

七錢

甘草

三分

芩五片水煎至半入童便竹瀝各一盞再煎熱服忌

鷄濕麵猪肉

治痛風

赤芍藥

一兩半

青皮

木鱗各一

靈仙

二兩

紫威

台芎

各兩

防風

半兩

甘草

三錢

右水煎服

因刺後脚軟百節疼痛是久刺亡陰故也以大刺川婦

補陰降火自愈不可作風治反燥其陰

因飲酒濕痰痛風

黃柏

三

靈仙

兩錢各十兩

蒼朮

羌活

甘草

各三

陳皮

芍藥

各一

右為末姜湯下一錢

控涎丹

治一身及兩脇疔痛

甘遂製

大戟製

批仁加酒

真白芥子

此等分

右為末糊丸桐子大羹湯下七八丸加至十九

痰帶濕熱者先以舟車丸或導水丸下後以

逐痛散

乳香

末藥

桃仁

紅花甘草

香附

當歸

地龍

去上酒以

牛膝

羌活

五靈脂

酒淘或加酒本酒煎

右為末酒下二錢

龍虎丹

治走注疼痛或麻木不遂或半身痛

草烏

蒼朮

白芷

各一兩為粗末併碎熱酒過入信藥

乳香

沒藥

各二錢另研

當歸

牛膝各半

右為末酒糊丸彈子大酒下一丸

八珍丸

治痛風走注脚疾

乳香

改藥

赤赭石

川山甲

生三錢

羌活

草烏

生各半兩

川烏

生不去皮尖一兩

全蝎

炒汁一介

右末醋糊

丸桐子大酒下十一丸

四妙散

治痛風走注

威靈仙

酒浸半兩

蒼耳

半一錢

羚羊角

灰三錢

白芥子

錢右末姜一

片搗汁入湯調服

養積省腿腫

龜版

酒炙

酒糊丸四物加陳皮

甘草湯下

痛有常處赤腫灼熱或壯熱此欲成風毒宜收毒散

風濕走注痛

粟殼 一兩 陳皮 虎骨

乳香

沒藥

甘草

各二錢半

右剉水煎

飛靈丸

草烏

酒浸一宿去皮晒干研

二蚕沙

酒浸晒干

木鱉子

兩半

全蝎

地龍

射香

錢

右為末酒

糊丸土朱為衣至二十九骨痛自然同五錢醋煨

脚跟痛

有血熱有痰四物知母黃柏牛膝之類

肢節痛

肢節腫痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動於經絡

之中濕熱流注肢節之間而無已也用麻黃去節為

藥各一錢防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮靈仙片
枳實桔梗葛根川芎各五分甘草歸須升麻各二分
下焦加炒柏婦人加紅花腫多加槿柳大腹皮澤瀉
更調沒藥定痛尤妙。肢節痛須用羌活防風去風
濕亦宜用之。肥人多是風濕與痰飲流注經絡而痛
宜南星半夏瘦人多是血虛與熱口乾加防風羌活酒
芍瘦人或性急躁而痛發熱是血熱口物加酒炒芍
栝蒌湯者用栝蒌溫發本南星煎行氣以木香枳殼檳
榔湯為本與芎歸地仁紅花大黃微利之倦怠無
力而痛用參朮南星半夏之類

辟月痛

凡臂有冷痛是上焦温熱橫行經絡用半夏白朮南星香附甘草酒芍滑各一錢陳皮茯苓各半錢靈仙三錢桑木五分姜水煎服

認勞散

治提挈傷筋而痛

人參

黃芪

甘草

川歸

芍藥

熟地黃

阿膠 寺分

白姜黃

此火引用

或加五味烏藥桂姜棗煎服

血不榮筋而痛

四物加黃芪滑姜黃甘草

茯苓丸

治臂痛

半夏 二兩

茯苓 一兩

枳殼 半兩

風化硝

三錢

右末麵糊丸姜湯下三十九

筋

真血熱四物湯加酒芍紅花

按河間云轉反次也熱氣燥燥於筋則挛瘳而痛火
主煩灼燥動故也或以為客於筋者誤也蓋寒雖主
於收引然止為厥逆禁固屈伸不便安得為轉筋也
所謂轉者動也湯動陰靜熱証明矣夫轉筋者多因
熱其霍亂吐瀉所致脾胃土真則肝木自甚而熱燥
于筋故也大吐瀉則為熱凡霍亂轉筋而不渴者未
之有也或不因吐瀉但外胃干寒而脈理閉密陽氣
鬱結拂熱內作熱燥于肝然也故諸轉筋因以湯清
之而使勝理開泄陽氣行散
即愈故世俗反疑為寒也

等急

舟溪治一人因濕氣右手疼痛事二陳加金毛狗

脊杜仲川芎升麻。又一入濕氣脚事身不直用

醫歸抽痛湯加杜仲黃柏川芎白朮甘草

一人背偃僕足棄成廢疾脉沉弦而潛與煨腎散

子內煨食之逐末入指腰上吐下瀉過一月又行一次凡三四貼

即愈

項瘕強

○丹溪治一人項瘕強動則微痛脉弦而數尖右為甚

作痰熱客太陽經治之以二陳黃芩羌活紅花煎服

即愈

○東垣治一人時冬忽有風氣暴至六脉弦甚按之洪

大有力其證手拳急大便秘澀面赤熱此風寒始至

於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搖而掣痺
乃風淫末疾而寒在外也內經曰寒則筋挛正謂此
也素飲酒內有尖熱乘於腸胃之間故大便秘澀而
面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風
寒之邪用桂枝二錢甘草一錢以却其寒邪而緩其
急縮黃柏二錢苦寒滑以瀉實潤燥急救腎水升麻
葛根各一錢以升陽氣行手陽明之經不令遏絕桂
枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以甘草專補
脾氣使不受不風寒之邪而退木邪專益肺金也佐
以人參補氣當歸和血潤燥依一貼水煎服令緩房

中摩搥其手足安、

卅溪治一老人、性急作勞、二腿痛甚、此兼虛證、宜溫補、以四物加桃仁、陳皮、牛膝、生甘草煎入姜汁調、儻行散、熱服三四十貼而安、

○一婦性急、味厚、痛風拘挛、數月、此痰與氣、當和血、踈氣、導痰、以儻行散入生甘草、牛膝、枳殼、通草、陳皮、桃仁、姜汁煎服、半年而安、

○一少年患痢、用瀉藥取効、致痛風叫號、此惡血入經絡也、血受溫熱、凝濁、所以未盡、留滯、隊道、久則必成偏枯、與四物湯加桃仁、紅花、牛膝、黃芩、陳皮、生甘草

煎入生姜研潛行散入少酒飲之數十貼又刺委中

出黑血三合而安

上二入五所謂病有
致灌而治法少異也

○一人貧勞秋深渾身發熱手足皆疼如燬晝輕夜重

服風藥愈痛氣逆不効脉滿而按右甚於左飲食如

常形瘦蓋大痛而瘦非病也用蒼木酒拍各一錢半

生附一片生甘草三分酥黃五分桃仁九介煎入姜

汁令辣熱服四貼去附加牛膝一錢六貼後氣喘定

痛畧減意其血虛多服麻黃湯亞被發動而上奔當

補血鎮墜以酸收之用四物加芍人參二錢五味十

二粒倍芍藥二貼喘定三日後脉減大半滿如前仍

痛以四物加牛膝參朮桃仁陳皮并草檳榔空姜五
十貼而安後因負重複痛食少前藥加黃芪三分二
十貼安

○一人患背胛縫一線痛起上髀骨至胸前側脇而止
晝夜不住脈數重取左豁大於右意其背胛小腸經
胸脇膈經也必思慮傷心七歲未痛而小腸膈先病
故痛從背胛起反憲不徹決乃歸之膈故痛至胸脇
乃小腸火乘膈木子來乘母是為實邪果因謀事不
遂用人參四分木通二分煎湯為使吞龍膽丸數服
而安

○一壯年味厚多怒秋間脾振左右發痛一點延及膝
疴痛處惡寒晝靜夜劇口或渴脯或瘡鑿以補血及
風藥至春痛甚食減形瘦膝腫如梳脉弦大實數寸
瀉甚痛大作飲食積滯在太陰湯明治之以炒拍一
兩生甘草梢生犀角屑鹽炒蒼朮各三錢川芎二錢
陳皮牛膝木通芍藥各半兩過熟加黃芩二錢為末
每三錢與姜汁同研細煎令帶熱食前服之日夜四
次半月後腫減病輕去犀角加牛膝春夏用葉秋冬
用根葉汁尤妙氣厥隔身毛各五錢如前服又半月
腫減食增不惡寒惟脚痿弱去蒼朮芩夏加炒拍中

年人加生地冬加桂葉更病痿

痿六十一

出六

浮而大

浮為虛大為熱

滑而大

滑為痰大為雲

洪而緩

洪為熱緩為

為

丹溪云內經謂諸痿生於肺熱又謂治痿獨取陽明足

肺金躰燥居上而主氣畏火者也脾土性濕居中而

主四肢畏木者也火性炎上若嗜欲無節則水失所

養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣性剛急肺

受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而

傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用

而諸痿作矣。濕南方則肺金清而東方不實何脾傷
之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故
陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣。治痿之法無
出於此。雖然天產作陽厚味發熱凡病痿者若不淡
薄食味必不能保其全安也。

有溫熱有痰溫一云有血虛氣弱死血食積妨碍不得

降者有溫熱傷筋不能束骨董按經論有筋脈骨肉

肉留致瘦血大經空虛起於心病則振紐如折不

提掣名曰脈痿有思慮元方入房太甚宗筋弛緩熱

入於肝病則筋急而枯名曰筋痿有由濕地以水

為土濕生於脾病則筋乾而渴此肉不仁名曰肉痿

風濕者不...

...

下等也

肺也又曰心氣熱生痿故肝氣熱生筋也故宗筋聚脾氣熱生肉痿故痺而不仁腎氣熱生身事者宜詳審之

因腎水不能勝心火上上燥肺金六葉皆焦皮毛

虛弱急而薄者則生痿躄皆好色之故

內經論風論痿各有篇且源流不同治法迥異局方

以治風之藥通治諸痿何其謬哉夫風因外感痿屬內傷風主發散痿

宜補養其大不同可不辨引

治候 取於陽明陽明者胃脈也五臟六腑之海主潤

宗筋上主束骨而利機關也故陽明虛而然也。

專主養肺氣養血清金

東垣取黃柏為君黃芪為佐以治諸痰無一定之方有

溫多熱多者有溫熱相半者有挾風者臨病製方其

善於治痰者乎又云此寒濕火善寒濕溫熱四君子補陽明之虛宜清暑益氣湯之類

○溫熱東垣律步九加燥溫降火之藥苓栢蒼木○

溫痰二陳加蒼木白木黃芩黃栢之類入竹瀝姜汁

○血虛四物加黃栢蒼木下補陰九○氣虛四君子

加蒼木黃栢黃芩○黃蘗蒼木治痰要藥也○虎潛

丸補腎丸治痰方見虛損門

字云痰因肺熱相傳四臟其脉以浮而大今人便作

寒濕脚氣治之驟用燥藥針艾湯蒸痰弱轉甚此證

與治聖不同風寒溫痺猶可蒸湯燂炙惟痿屬熱而成不可作寒治宜黃連解毒加當歸等劑

朱

治一人形肥味厚多憂怒脉常沉澁病痰氣鬱用燥熱香竄之藥至夏足弱氣上冲食減此熱鬱而脾虛痰厥雖形肥脉沉未當死但藥并火吐難治且與竹瀝下白朮膏各二斤氣降食進又一條見惡熱門

李

治一壯年病脚膝痿弱臍下尻腎皆冷陰汗禿臭精滑不固或以鹿茸丸治不効求治脉沉數而有力即以滋腎丸製之以寒因熱用引入下焦適其病所總命門相火之勝再服而愈

滑伯仁治一婦誤服姜桂等藥後火燔燬致消穀善飢
日數不飯猶不飽終日端坐如常人弟目昏不能視
足弱不能履膝膝田軟肌肉虛肥脉大而虛濡曰痿
證也長夏過服熱藥所致蓋夏溫令當權剛劑太過
火溫俱甚肺熱葉焦故二足痿弱而不為用也遂以
東垣滋熱成痿法治之而愈

附方

茯苓滲濕湯 東垣治六七月濕令大行子能令母實是

熱旺也溫熱大勝必刑庚火腸以天令言之則清燥
之氣絕矣古人之法夏月以救熱傷天真元氣燥金

君父溫熱之邪是絕寒水生化之源，絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動矣

黃芪半一錢 陳皮 白朮 澤合各五分 人參

白茯苓 升麻各二分 炙甘草 麥門冬 歸身

生地黃 神曲 猪苓各二分 芫胡 黃連

蒼木錢各一 五味九粒 右劉每服五錢水煎

中和補氣湯 治痿方見痺門

健步丸 治膝中無力及神不得腰背腿脚沉重

羌活 柴胡 滑石炒 甘草炙 瓜蒌根洗酒

桂各五分 防風 澤瀉各三分 防已酒洗 川烏

苦參

各一錢

右末酒糊丸愈風湯下七十丸

清肝丸

治前陰有汗如小二脚痿弱

黃芪

七分

甘草

五分

升麻

猪苓

四分

人參

葛根

三分

茯苓

芫胡

菴滑

歸身

連翹

炒栢

洋滿

蒼木

神曲

知母

防風

陳皮

右剉水煎服

手足痿弱無力

芍藥

以

栢

兩

炒各一

蒼木

一兩二錢

香附

半兩

右為細末粥丸服

治痠痛

桂枝

半兩

靈仙

酒栢

各一錢

蒼木

滑石

二兩

川芎

羌活

甘草

水煎

脉法

腎脉浮而盛為風洪而實為眩熱而濡為虛

丹溪云耳聾屬熱少陽厥陰熱多有氣閉者亦是為熱

氣閉者耳不鳴按諸書論聾症不一有氣聾熱聾陰

痰而聾者盡十二經脉上絡於耳其陰諸經皆有交

并則氣逆而厥之氣搏入於耳是為聾必無眩

運况耳為宗脉之所附若陰虛而風邪乘之經氣去

而不宣謂之風聾必兼頭痛如變悸力疲腎虛積上

而問之然者為勞聾必兼虛夫耳在左此好色腎虛有

之有痰火上升鬱於耳中而鳴有熱氣乘虛隨脉入

耳結為膿汁謂之膿耳或耳有痒風熱搏之結硬

成核塞耳亦令暴聾為聾耳大抵耳屬火少陰之經

腎之寄竅也腎氣通於耳所主者精氣充足則耳

聰而聽若勞傷氣血清脫腎虛致耳聾矣治之之法

固者散之熱者涼之腎虛者補而養之痰
火者清而降之各隨其宜不可不察也

宜開痰散風熱通聖散袞爽丸之類○大病後與陰

虛火動而聾者宜降火以四物為主○耳鳴宜當歸

尤會丸○飲酒入宜木香檳榔丸○耳聾用草麻子

四十九粒裹肉十枚入人乳搗膏石上晒乾丸如桐

子大綿裹塞耳中又方雄鼠膽汁滴入耳中妙仍開

痰散風熱○耳痛以茱萸烏尖大黃為末齋湯泉穴

又方以白礬枯青箬煨灰吹入左妙○薄耳膿出桑

螵蛸一个炙射香二分為末搽之或染坯松凡次之

雜著云耳鳴證或鳴甚如蟬或左或右或時聞塞世人

多作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此證但審其平昔所飲酒厚味上焦亦有痰火只作清痰降火治之大抵此證多因先有痰火在上又感惱怒而得怒則氣壅少陽之火客於耳也若腎虛而鳴者其鳴不甚人必多怒當見勞怯等證

附方

耳中膿出

枯礬 胭脂 射香

少許

為末綿拭送入耳

內愈

風毒耳痛

全蠍 一兩 生薑 二兩 切作四塊同炒去

姜為末湯點

虫入耳 香油灌入或駝牛乳鷄冠血皆妙

蔓荆子散

治上熱耳出膿汁

甘草 升麻 木通 赤芍 桑皮炒

麥門 生地 前胡 甘菊 赤茯苓

蔓荆子 水煎服

耳熱出汁 右膏防風消天花粉為末搽之

因鬱而奔者通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次石入

諸藥用酒炒

因酒过而鳴者 火劑加枳殼芫胡大黃甘菊南星

枯梗青皮荆芥不効用四物効

凉膈散加酒炒大黃上芥酒浸防風荆芥羌活滑服膠多

射少溫加枯礬

流氣飲加菖蒲生薑治奔皆當調氣

地黃丸

治勞損而奔

川歸

川芎

芍藥

熟地

辣桂

羌縵子

川椒炒

故紙炒

白蒺藜

胡芦巴

杜仲各炒

白芷

石菖蒲各三錢

磁石

火煨醋燂七次三次

蜜丸桐子大酒

下五十九丸

益腎散

治腎虛耳聾

磁石煨

巴戟去心

川椒

凡各一兩

沉香

石菖蒲

各半兩

右末

每二錢用

酒

送下

猪膏

一枚

細切和

以

勃白

少

盐并

桑温

紙

包

煨

空

心細嚼

酒送下

耳鳴

生烏

煎

石菖蒲

分

為末

綿裹

塞耳中

月二度

即止

耳鳴

蒸

川椒

石菖蒲

松脂

各三錢

山查肉

兩半

右末

溶蠟

九棗核

大塞之

耳出膿

左骨

枯礬

赤小豆

黃丹

烏賊魚

胭脂

為末

搽之

又方

石膏

枯礬

黃丹

真蚌粉

尤骨 寺分 射 少許 為末搽之

聘耳 風熱搏之津液結鞞成核塞耳

地尤 耳草霜 生猪脂 以菊汁和捏如糞核

綿裹入耳令潤即挑出

黍粘子湯 治耳癢痛 昆布 蘇木

生甘草 蒲黃 草尤 各一分 連翹

生地 歸梢 黃芩 黃連 甘草 各三

訖胡 黃芪 各三分 桔梗 三分 桃仁 三枚 紅花 少許

右作一服水煎

○月病六十三

丹溪云

屬風血少

目得血而能視

神勞

目者神之主

腎虛

日者腎之竅

按東垣云十二經脈三百六十五絡其清陽氣上散於目而為精其氣走於耳而為所若因心煩事冗飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛則百脈佛騰血脈逆行邪害空竅猶天明而日月不照也夫五藏六府之精氣皆稟受於脾上注於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸於日矣心者君火也主人之神宜靜而安相火化行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞沒運動轉乃妄行以因於氣所并而損血脈故諸病生焉經云目得血而能視直氣盛則精盛血氣衰則精弱上則精虛上則火動上則精寒方實家方實則肝邪盛而視物不真矣所以視植物為動物者有之視動物為植物者有之然血有太過不及皆能為痛太過則目壅塞而發痛不及則無血養而枯痛目之銳眦少陽經也血少氣多目之上網太陽經也血多氣少目之下網陽明經也血氣俱多惟足厥陰連於目系而已血太過者發表以散之血少神勞腎以作痛治之上風熱者發表以散之血少神勞腎

虛者補血滋陰以調之寒者快之虛者補之辛以散
之涼以清之汗之吐之隨其病而藥之無不愈也

瞳子散大皆辛熱之為也辛主散熱乘之當除風熱
涼血益血以收耗散之氣芩連苦寒除邪氣之盛為
君歸身熟地黃養血涼血為臣五味酸寒休浮收瞳
散地骨皮天門冬瀉熱補氣用滋陰地黃丸妙

久病目昏暗熟地歸根為君羌活防風甘菊佐之

暴發赤腫防風黃芩為君以瀉火黃連為佐以養血

羌活柴胡升麻白芷甘菊為使白睛紅 白巨翳少

許

血氣壅痛口吻加草充膽防已防風羌活

實熱上冲而痛黃連瀉火當歸補血心煩加梔子
秘加大黃

肥人風熱上壅目痛防風羌活荆芥酒芥以散濕熱
瘦人是血少煎熱用養血藥少加風藥川歸酒生地

黃參川芎防風荆芥菊花

勞役飲食不節內障昏暗蔓荆子湯

蔓荆子 入參

黃芪

甘菊

黃柏

芍藥

又用四物湯加酒炒本連栢尋藥

河間云在腑為表當除風散熱在臟為裡當養血安神

如暴失明昏澁翳膜胨淚班入眼暴散皆表也風熱

宜表散以去之如昏弱不欲視物內障是黑花瞳散
久病皆裡也血少神勞腎虛也宜養補水安神

王節齋云眼痛赤腫古方用藥內外不同在內湯散用
苦寒辛涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼
之藥以散其邪故點藥莫要於水片而水片大辛熱
以其辛性急故借以拔出火邪而散其熱氣古方用
燒酒洗眼或用乾姜末生姜汁點眼者皆此意也蓋
火眼是火邪上攻於目故內治用苦寒之藥治其本
也然火邪既容於目從內出外若外用寒涼以阻逆
之則鬱火內攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼用

熱湯是火抑則發因而散之從內法也世人不知求
片為劫藥而誤認為寒常用點眼遂致積熱入目而
昏暗障翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治寒
涼而妄將冷水冷物冷藥搥洗當致昏瞎者有之

⑤

治一壯年忽早起視物不見就睡片時畧見而不
明食減倦甚脉緩大虛則散而無力意其受溫所致
詢之果目溫地半月遂以白朮黃芪茯苓陳皮為臣
附子為使十餘貼愈

一老人目忽盲他無所苦予以大虛治之急煎人參
膏一斤服二日不信一鑿用青礞石藥予曰今夜死

矣果然

一人形實好熱酒目有脉滿此熱酒所傷胃氣汚濁
但死其中而然也以蘇木作湯調人參末服二日鼻
及二手皆紫黑予曰滯血行矣以四物加蘇木桃仁
紅花陳皮煎調人參末服數日愈

①

治一人病二目視物皆例植藥治不効曰視一物
為二視直為曲古人嘗言之矣視物倒植誠所未喻
也願聞其因彼曰因大醉甚吐睡達曙遂病脉之左
關浮促餘部皆平必吐時上焦及覆到倒其膽肝故
視物皆倒植此不内外因而致內傷者也法當復吐

以正其膽腑遂以梨芋瓜蒂等俾平且湧之濟愈

(季)

治一人因多食猪肉煎餅同蒜醋食之後復飲酒

大醉卧於暖亢豎日二瞳子大於黃精視物無的實
以小為大行步踏空百治不効曰經云五臟六腑之
精皆上注於目而為之精上之窠為眼骨之精為瞳
子又云筋骨氣血之精而為脉并為系上屬於腦又
瞳子黑眼法於陰今瞳子散大者由食辛熱物太甚
故也所謂辛主散熱則助火乘於腦中其精故散精
散則視物亦散也夫精明者所以視萬物者也今視
物不真則精衰矣蓋火之與氣勢不兩立經曰壯火

食氣手少陰足厥陰所主風熱連目系邪之中名從
其類故循此道而來攻頭目腫悶而瞳子散大皆血
虛陰弱故也當除熱涼血益血以收托散之氣則病
愈矣以滋陰地黃丸經云熱淫所勝平以鹹寒佐以
苦辛以酸收之以黃連黃芩大苦寒除邪氣之盛為
君當歸身辛溫生熟地黃苦甘寒養血涼血為臣五
味辛寒休輕浮上收瞳子之散大人參其草也骨皮
天門冬根殼苦甘寒瀉熱補氣為佐柴胡引用為使
○一人目翳暴生從下而起其色綠腫痛不可忍曰
翳從下而上痛從陽明來也綠非五色之正色此腎

肺合而為病乃以墨調臧粉合之却與翳色相目肺
腎為病無疑矣瀉肺腎之邪入陽明之藥為使既効
而復作其所從來之經與翳色各具因長曰諸脉者
皆為於目脉病則目從之此必經絡不調故目病未
已也問之果如所言治之疾遂不作

附方

眼痛 生地黃酒浸拌過眼上用草商星乾姜桂枝為
末醋調塗二足心時用牛膝膏洗目

倒睫奉毛者二目緊卷皮縮之所致也蓋以復熱致陰
氣外行當去內熱并火邪眼皮緩則眼倒睫立出翳

膜亦退用手法板出內臉向外以三梭針出血以左
手爪甲迎其針鋒立愈

赤暗

目非歲久赤爛者是

用三梭針刺目眶外以瀉濕熱

能遠視不能近視陽氣不足陰氣有餘乃氣虛而血盛

也血盛者陰火有餘氣虛者氣弱也宜定志丸

能近視不能遠視陽氣有餘陰氣不足乃血虛氣盛血

虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣其氣穀氣

之滅也宜地芝丸

地芝丸

生地黃

天門冬

各四兩

批穀炒

耳菊

炒各二兩

右為末煉蜜丸茶酒任下一百丸

定志丸

白茯苓

人參

遠志

黃芩

右為末蜜丸桐子大朱砂為衣飲下三十九

滋陰地黃丸

熟地黃

生地黃

地骨皮

天門冬

炙甘草

批殼

地骨皮

人參

黃連

五味

歸身

黃芩

蜜丸服

神仙退雲丸

治

一切翳障內外障翳無睛癢刻

川歸

川芎

木賊

犀角

枳實

黃連

蟬退

薄荷

瓜蒌根

甘菊

蛇退

密蒙花

荆芥

地骨皮

白羨梨

乾地黃

右蜜為丸飲下婦人當歸湯下

有氣木香湯下

選睛丸

川芎

白痰梨

炒

羌活

吳茱萸

甘草

防風

木賊

白木

青箱子

地系子

兩

後人加

甘菊

楮實

川歸

各二

右為末蜜丸彈子大每服爵一丸白湯下

羊肝丸

治一切日病不問障翳

黃連

一兩

白乳羊肝

一並夫服

甘菊

防風

茵荷

荊芥

羌活

川芎

川歸

各二

右為末羊肝研丸水下

爛翳

黃泥燒灰以燉羊點之須臾火痛以百餘

草刮去之

眼捷

木鱉子 一分 去殼 為末 綿裹 鼻中 庄安

右一夜自分

瀉青丸

治風熱暴發腫攻 方見火門

清神益氣湯

東西 治因脾胃虛損黃証之人 設眼瀉

肝散致目效

茯苓 升麻 陳皮

生甘草 芍藥

白朮 各二分 五味 麥門

洋瀉 蒼朮

防風 各三分 黃柏 青皮 各一分

人參

生薑 五分 右剉水煎

救苦湯

治赤腫苦痛

杜枝 連翅 紅花 細辛 歸身

甘草 各五分 蒼朮 草龍膽 各七分 羌活

黃芩 麻黃 柴胡 防風 藥木

黃連 黃芩 生地 知母 各一錢 芍藥 二錢

右水煎服

此散 治眼眶澀爛因風而作用氣藥燥之

芫胡 羌活 防風 生地 赤芍藥

甘草 桔梗 荆芥 右剉水煎

因血熱內障 四物加酒炒連柏等藥

血弱陰水少陽火旺瘡子散及損腎花者滋陰地黃丸

防風飲子

治倒睫

黃芪

甘草

人參

各一錢

葛根

防風

細辛

蔓荊

各五分

當歸

半

右作一服水煎食後服之

滋陰腎氣丸

即六味地黃丸加生地黃胡川歸五味蜜

滋陰補陰丸

丸已一二方滋陰藥也

點藥

治赤眼風熱壅痛風治諸翳障

煇甘石

煇如鴨頭色以好醋少滴之多

珍珠

另研

辰砂

乳香

另研

沒藥

各一錢

鵬砂

二錢

熊膽

無即止

膽藥

輕粉

各二分

片腦

射香

各一分

礞末

收點

治久近赤白障膜

冰片半分 珍珠三分 瑪瑙一分

琥珀一分 辰砂

鵬砂各一分 炒甘石燒過二錢半

為末點之

赤眼

同綠

黃連

艾葉

右以黃連

銅綠為末水調成熬攤磁釜內却將搗軟為末燒艾

炮黑釜內藥乾用沸湯泡澄清以銀簪點之

風眼癢痛有淚

銅青一錢 風化硝一錢 半防風

黃連各一錢 飛礬一分 為沸湯泡澄清點之

口病六十四

脾熱則口乾

肝熱則口酸 心熱則口苦 肺熱則口淡也 三黃丸

治口甘。膽熱口苦。謀慮不決。口苦柴胡湯加麥門冬。酸棗仁。地骨皮。遠志。服涼藥不愈者。此酒之過度。勞役不睡。舌上光滑而無皮。或因憂思損傷中氣。虛火泛上。無制用。理中湯甚。若小附子。或官桂。噉之。一方王白。實熱主。瘡涼。搗散。并粘湯。口瘡用西亦未貼之。瓜漿水。徐之。飲之。如無以皮燒灰。噉之。又方。細辛黃柏。炒為末。搽取涎。又方。黃連酒。煮服。又方。燭。醋。明砂。合。又方。南星末。醋調。付湧泉穴。又方。五倍。一兩。黃柏。蜜炙。滑石各半兩。銅綠末。搽之。

赤口瘡

粘礬沒藥乳香銅綠末付

白口瘡 雄黃乳香沒藥一錢輕粉五分已豆去油

為末搽之

一小兒口瘡不下食服以狐惑治之必死後以饜湯於

脚上浸半日頓寬以黃柏蜜丸萎垂炒為末付立効

唇緊燥裂生瘡 青皮燒灰猪脂調付夜卧頭端

付亦可

口糜 野薔薇根煎湯漱之良 一本白薔薇

上焦熱壅口舌生瘡如聖湯并桔湯加芩膠以杏花散

附方

黑參丸

治口舌生瘡久不愈

天門冬 麥門冬 黑參等分 石為末煉蜜丸如彈

子火含化津咽

柳花散

治口舌生瘡

玄胡索一 黃柏

黃連

各半

蜜陀僧

二錢青黛

右為末貼口內有津

即咽

飲酒人口糜

導赤散

五苓散

瀉黃散

治脾熱口臭

心上方並見大門

神芎水

治食肉多口臭

蘭香葉

霍香亦可

歸身

霍香

木香各一錢

升麻二錢

生地酒洗

生甘草

各三

黃連

炒

砂仁

各半

蒸餅丸棗豆大湯下

滿口生瘡或腫毒重舌

蒲荷

甘草

荆芥

半兩 青黛

百藥煎

玄明粉

另明砂

半

右為細末每服一二字點瘡止

驗方

治口瘡或蜈蚣虎蝮入喉中者皆治

枯礬

黃州

蝻虫

戎灰

五倍

穿山甲

輕粉

火許

射香

黃柏

硫黃

雄黃

車糞龜

明砂

膽礬

等分

細末付之

擦口牙關難開

霜梅蘸白礬姜蚕末擦之又方

白礬荆芥等分為末擦大牙根自涎自開又方留星

腦子為末以指蘸姜汁搵藥於大牙根上擦之立効

狐惑

上唇有瘡曰惑虫蝕其臟因腹內熱腸胃虛

虫行求食瀉心湯方見火門

下唇有瘡曰狐虫蝕其肛黃芩湯洗之

驗方

治噤口風牙關不開

雄黃炒鹽

川枳各一錢獨子皂子一枚燒灰為末吹大牙根上

立愈

○咽候六十五

丹溪云

喉痺

痺不仁之義俗作閉猶閉塞也

多屬痰熱

喉舌之疾多屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火

之微甚故也微而輕者可以緩治甚而急者惟用針

攻刺血最為上策子和云燕氣上行持於喉之兩旁

為單兩為双也此乳蛾差小者名閉喉結於舌下

復生一小舌子名曰子舌脹舌結於舌中古謂之腫

名曰木舌脹熱結於咽喉腫連於外且麻且痺腫而

大者名纏喉風喉痺暴發暴死者名曰走馬喉痺其

各雖殊火則一也夫手少食君火心主之脈手少陽

相火三焦之脈二火皆主其源并絡於喉氣熱則內

結上甚則腫脹甚則閉上甚則不通而死矣至

如盜干痛咽頰腫舌本強皆君火之為也惟候痺急

連屬則火也經云甚者從之云龍火以火逐之故

古人療喉痺等證用井枯湯等治之世醫不達此者

妄云人寒之刺或至冷草藥服之并於其氣而不效

者吾見多矣其出血之法最為緊要但人畏針委曲

必

下

利

又

有

必

下

利

又

有

能咽多因飲食交辛熱或腹恒吐各傷致嘔
之所為也口已上之候溢頰相以而治實不同可不
或審

治法微者以酸更之甚者以辛散之痰結吐之甚而急
者砭出血之入火以涼治之龍火以火逐之涼劑熱
熱服是也

喉痺重者宜用吐法或桐油或燈油脚以鵝翎探吐之
輕者用新取園中李實根噲之更研水付項上

草有蠶實根即馬蘭草根治疾率此云園中李實根
也街議又疑蠶實非馬蘭今必試驗之方知其是
否也

或用射干逆流水吐之
皂角亦可或萎香研末
服亦可或生又汁皆可也

經喉風屬痰熱又宜探吐又方遠志去心為末調付瑱
上又方或燈心草燒灰吹入喉中或馬鹿麝白麝末
吹喉中吐痰

咽喉痛 荆芥當歸桔梗甘草溫漱服宜刺少商出血

喉乾燥痛 四物加桔梗荆芥知柏熟加苓枳殼

喉瘡并痛 屬虛火遊行無制用人參黃柏熟荆芥

實熱 黃連荆芥薄荷硝石蜜姜汁丸嚥化

虛火 人參竹瀝血虛四物竹瀝又方倒指刺枳
入少酒研滴入喉中又方燈籠草為末酒調付喉間

張

治一男子纏候風表裏皆作藥不能下予以涼藥灌入鼻中下十餘行外以拔毒散付陽起石燒赤與伏龍肝等分為末新水調搗百遍三日熱始退腫消一貴婦喉痺蓋龍火也須用涼劑而不可冷服為龍宜以火逐之入火者烹飪之火是也乃使燦於烈是中登於高堂之上令侍婢携火炒坐藥銚於上使藥常微熱不至大沸適口時上呷之百餘次龍火自散此法以熱行寒不為熱病扞格故也

咽與喉會厭與舌同在一門而用各異喉以候氣故通于天咽以嚥食故通于地會厭管乎其上以可開闔

掩其厭則食下不掩其喉必錯必舌抵上齶則會厭
能閉其咽矣四相上交為用缺一則飲食廢而死矣

附方

咽痛狀咽嚥物腫則不能吞 乾則不能熱 或嘔吐

客傷 或受啖辛熱 皆致咽系乾枯之所為也

喉痛狀喉聲音出藏熱則腫其發暴或心虛熱

懸癘在上膈俗咳而聲嘶喉破也

喉痺心腹腰脇痛者多難治

方 朴硝牙硝末入青魚膽中待乾吹入喉中痰出

即愈

王是散

治風熱痺及纏喉風

扑硝

半兩

朋砂

半兩

腦子

三錢

葵香

一錢

右為細末吹入

神效散

治熱腫語聲不出

草蘇

生去皮另研各一兩

荆芥

另研

右末蜜丸彈子大嚼化

雄黃解毒散

治纏喉風及喉痺倒仆失聲牙

閑緊急

雄黃

飛

麝香

各一錢

巴豆

十四粒

去皮油

右醋糊丸筭豆大茶清下丸吐利即止

龍火拔毒散

治纏喉急證先針出血後付之

陽起石各一子 伏龍肝各一子 新水掃之一日百餘次

一方

烏梅肉包膽丸綿裹含之

又方

白瑞香花根研水灌之

喉痺 馬蘭羊葉入香油些少杵汁點喉中就退

三因玉鑰匙

治風熱喉痺及纏喉風

煨石膏一兩 朋砂半兩 腦子一字 白萋蚕一錢

右研以竹管吹半錢許入喉中立愈加雄黃二錢名

金鑰匙

牛旁子散

治風熱上攻咽喉窒塞或腫痛生瘡

牛旁子

玄參

升麻

桔梗

犀角屑

木通

黃芩

甘草等分

右剉水煎每服四錢

奪命散

枯礬

三錢

銅綠

半錢

右末吹喉中

舌病六十六

心脉系舌本

脾脉絡系舌旁

肝脉絡系舌本

因風寒所中則舌卷縮而不言

七情所鬱則舌腫滿不得息

肝壅則血上湧

心熱則裂而瘡

脾熱則滑而胎

脾閉則白胎如雪

脾熱則舌強

舌卷囊縮厥陰絕也不治

舌無故出血如線

槐花炒為末慘之

附方

金沸草散 見傷風門

治風寒傷心脾寒熱齒浮舌腫

升麻柴胡湯

治心脾虛熱上攻舌生瘡舌本強二

頰腫痛

升麻 芍藥 梔子

水通

大青

黃芩 一兩 石膏 二兩 鉅胡

右水煎服

舌腫硬

銅空墨醋蘆汁

白胎語澁

蒲葇汁白蜜姜片搗之

子和治一婦人木舌脹其舌滿口諸藥罔效令以絛針

攻之三七度腫減三日方平血出盈斗

⑤

治一人病瘡

不寒亦言也

之右關浮滑餘部皆平曰右

關為解絡胃挾舌本蓋風口廉泉得之醉卧當風而

成瘡遂以荆瀝化至寶丹服之遂愈

⑥

治一婦人產子舌出不能收令以朱砂末付其舌

乃令作產子狀以二文襪之乃於壁外替累盛蓋置

