

明 天 1
813
卷 1

問氏
杏庵

廣益本艸大成卷之十二

洛下

法橋

木部堂山田
氏圖書之記
問本為竹一抱子

東台書院藏本

黃藥



苦寒。瀉腎膀胱伏火。治小便不通。下血下痢。女子漏下。赤白帶下。目熱赤痛。目淚。消渴。黃疸。

口舌瘡。諸瘡。△原始藥。巨也。此樹高。巨。其皮黃色。故名。俗名ノ
黃栢。一作。○瀉腎膀胱伏火。此黃藥。要能下。夫氣味厚。沉。降
陰劑。方。故。入。足。少陰。腎。足。太陽。膀胱。下。焦。水部。伏火。瀉。入。要
劑。入。益。腎家。火。二。兩。義。ア。リ。一。兩。治。ア。リ。苦寒。與。辛温。也。以。苦寒。所
治。者。ハ。火氣。下。焦。二。疢。伏。水部。陽根。不。衰。火。根。實。熾。ノ。症。ナ。リ。黃藥
知母。等。ノ。苦寒。降。沈。ノ。所。主。也。以。辛温。所。治。者。ハ。火氣。下。焦。二。動。ス。ト
雖。凡。水部。ノ。陽根。衰。微。ニ。火。根。虛。寒。ノ。症。也。肉桂。附子。等。ノ。辛温。補
陽。ノ。所。主。也。若。此。治。法。ヲ。誤。テ。虛。火。ニ。苦寒。ヲ。用。ヒ。實。火。ニ。辛温。ヲ。用。ル。

同書

其害ヲ致スト甚シ或問黃蘗ハ瀉火ノ要劑ナリ古人何ゾ謂補腎水
不足乎曰黃蘗ハ滋潤ノ劑ニ非ズ所以補陰者ハ腎惡燥相火下
焦ニ動則腎藏ノ水精爲之燥熱ス黃蘗瀉火則水陰自安直陰
ヲ不補ト雖凡劑人則陰ヲ補ノ義ヲ存ス且元素曰苦厚微辛上以
辛潤之ノ義ナキニモ非ス又問古人謂黃蘗無知母猶水母之無取
也何ゾ曰水母ニ目ナシ蝦ニ從テ遊夫黃蘗ハ雖入至陰未至腎
家水底其木皮タル故ナリ且火ハ炎上天下火一旺則上肺金ニ炎ス水
源ニ乘ス黃蘗ハ入腎膀胱ノニ不能清肺火知母ハ上肺熱ヲ清シ下
腎家水底ニ至テ相火ヲ瀉ス時珍曰黃蘗能制膀胱命門陰中之火
知母能清肺金滋腎水之化源上黃蘗ハ從知母火ヲ肺ヨリ降テ水底
至テ相火ノ煎熬ヲ瀉則上肺金ノ炎熱上テ水源清テ下邪火ノ水底ニ
動ス者ヲ制シ上下子母俱ニ安キコトヲ致ス故ニ古人知母黃蘗ヲ合同

火動ヲ治スノ要劑トス又問然則黃蘗知母ノ兩藥必ス合用スレヤ曰
不然相火水底ニ動レ肺ニ炎上ス者ハ實ニ知母ト合用スレ相火水
面ニ動レ未至煎熬未受人炎者ノ如ク惟黃蘗ノ所治知母ト合用ス不
及也大明謂治男子陰痿ハ前陰ハ宗筋ノ會也肝腎ノ熱ニ因テ筋
緩テ陰痿ス者用之若其下焦虛寒ニ屬ス者ハ不宜用桂附ノ所主
也元素謂堅腎壯骨髓療下焦虛李杲謂殺腎水上瀉火則腎陰自
堅固又骨髓モ亦壯ナレ直ニ陰ヲ補ニ非ズ劑火助陰ノ義ナリ太
明曰洗肝上黃蘗ハ足ノ厥陰肝經ノ劑ニ非スト雖凡肝木與腎水子母
其氣ヲ通シ俱ニ相火ノ藏ナリ黃蘗ハ腎火ヲ瀉スガ故ニ肝火モ亦目ヲ
消退ス洗心清ノ義也小便不通元素謂利下竅黃蘗ハ雖入膀胱
淡滲通利ノ劑ニ非ス然レニ何ゾ治小便不通乎蓋火邪下焦腎膀胱
ノ血分ニ伏シ水道爲之不利及小便黃澀者ハ酒洗ノ黃蘗ヲ用テ

下焦ノ伏火ヲ瀉スレハ水道自通利ス故ニ東垣謂_レ治衝脉氣逆不渴
而小便不通上衝脉ハ腎脉ト合_テ下焦ニ起_リ十二經ノ血海_ニ衝腎
火逆者ハ熱邪爲_レ在血分熱邪在血分則不渴在氣分則渴邪熱伏
肺中氣分水源不清故小便不通_ノ渴者ハ澤瀉猪苓_ヲ淡參_ヲ劑_ラ
用_ニ邪熱伏衝腎血分故ニ不渴小便不通者ハ黃蘗知母陰中_ヲ陰
劑_ヲ以_テス且黃蘗ハ下焦ノ濕_ヲ去_ル義アリト雖_モ此_モ亦直_ニ小便_ヲ
通_メ去_レ濕除腫_ニ非_ズ黃蘗ノ味苦_ハ燥濕_ニ其寒性_ハ熱_ヲ制_ス故_ニ下
焦ノ濕熱_ヲ去_テ下部ノ腫_及痛_ハ痔瘡_ヲ治_ス下血腎熱_ノ動_ニ因_リ或_ハ
下焦ノ濕熱_ニ因_テ者用_之血痢_此モ亦腎熱_及下焦ノ濕熱_ニ因_テ者用_之
獨血痢_ノニ_テハ_ハ諸痢腎熱_ニ屬_ス者皆用_之女子漏下赤白帶下
女人不時經血漏下_及赤白帶下_ノ症多_ハ下焦ノ火動_及濕熱_ニ因_リ
也目熱赤痛目淚_目肝_ノ瘵_ノ精血_ノ會_ス所也腎肝熱邪衝眼熱

痛淚出者ハ黃蘗_ヲ用_テ若命門ノ陽氣不足_ニ虛熱_ニ因_テ眼淚出_且
赤熱_ノ不明_者ハ黃蘗_ノ苦寒_ヲ用_{コト}勿_レ溫陽_ノ劑_主之_{消渴}因_胃
火者_{アリ}因_腎火者_{アリ}腎火_ノ者_ハ黃蘗_主之_{胃火}ノ者_ハ雖_モ兼_腎
火_佐之_{大抵}多_渴ノ_{不止}者_ハ屬_肺爲_上消_多食_ノ飢_者ハ屬_胃爲_中
消_不渴_ノ小便_多利_ノ數_者ハ屬_腎爲_下消_亦号_消腎_又強_中ノ_症
了_陽事_妄起_強ノ_不弱_精氣_自泄_亦知_母黃_柏ノ_所主_也凡_消渴_ノ
症_上中_下肺_胃腎_ノ別_{アリ}ト雖_モ不_兼腎_火者_ハ希_有苟_モ下_陰虛
_ヲ上_中焦_ノ火_邪何_ニ從_テ生_セン_或ハ生_ス雖_モ此_モ亦_直ニ_治易_也
而_ハ黃_疸去_濕熱_カ故_テ黃_疸ノ_症中_焦ノ_濕熱_ニ因_テ下_焦ノ_濕熱_ニ因_テ
下_焦ノ_濕熱_ニ因_テ身_躰黃_色下_部黃_腫小便_黃者_ハ尤_ニ黃_蘗所_治
也口_舌瘡_腎經_上テ_挾舌_本故_ニ腎_熱衝_上ノ_口舌_生瘡_者用_之或_ハ
炒_末蜜_調塗_且因_腎熱_陰虛_陰戶_瘡ヲ_生者_及諸_瘡腫_痛腎_熱屬

者用之。或末小兒之頭瘡。傳諸痿足痿。在冬端了。ト雖在總。膏家ノ濕熱。屬入。故ニ黃蘗ハ諸痿癰癩ノ必用要藥也。古人足痿ノ腰無力者。黃蘗湯ノ中ニ黃蘗ヲ加用ノ治入足膝氣力ヲ生スルニ泉。瀝出カ如ト。然レ在命門ノ陽氣虛衰ノ足膝痿冷ノ者。リ桂附所主。黃蘗等ニ不宜也。或問別錄謂療驚氣在皮間。肌膚熱赤。藏器曰。治蟲瘡。ハ何ノ。曰。小兒驚熱在皮間。發熱赤。ハ此腎火ノ遊行也。故黃蘗爲所治。又治蟲瘡。ト黃蘗ハ解濕熱且味苦。濕熱去テ蟲ノ隱ハ所ナク。味苦ハ蟲ノ所畏也。總概 腎家ノ伏火ノ濕熱ヲ去ル故ニ治勞熱。使藥 得知母降肺火能寫腎熱得蒼朮骨蒸陰虛火動要劑也。除濕熱得細辛治口舌瘡得黃芩山梔黃連解。命門真元ノ陽不足ノ虛火ニ用ベカク陰虛ノ命門ノ邪火實盛ノ者用之。尺脈洪大按之有力三焦火毒。

毒

使藥

總概

者ニ非バ勿用。命門ノ邪火實盛ノ者ト雖在。胃氣不足ノ穀食不進者ハ勿用。腎火實盛ニ胃氣健ニ能食者用之。胃氣不足シ及ヒ命門ノ真陽虛衰ノ大便瀉シ易ク。或ハ小便頻數ノ者ハ禁用。老入小兒産後。安ニ用コト勿レ。黃蘗ハ苦寒降沈ノ劑ナリ。久服過服。元コト勿レ。真陽ヲ損胃氣ヲ傷リ。反テ陰ヲ傷。葉氏醫學統旨。四物湯加黃蘗。知母。久服傷胃。不能生陰ノ戒アリ。陽氣下降者禁用。凡用黃蘗者。丹溪謂虛火可補。宜用實火。可瀉。宜用。義ヲ辨スルヲ主トセヨ。畏惡 乾漆 伏硫黃 附方 大福 九洩

畏惡

附方

腎火諸病。黃蘗鹽酒ニ浸炒。褐色爲末。梧子大ニ丸。血虛ニ四物湯氣。虛ニ四君子湯ニ下。丹溪方。小兒臍生。血不合者。黃蘗末塗之。出子母必錄。火毒瘡。人冬月向火。火氣内ニ入テ。兩股瘡ヲ生シ。汁出テ不止者。黃蘗ノ末ヲ塗。立愈。出醫說。小兒顛腫者。黃蘗末。水ニ調テ

足心二趾

修治

肉厚ク色黄丸者ヲ良トス。鹿皮ヲ刮去對テ炒テ

出普濟方。○酒ニ浸シ炒用テ治上。○塩水ニ浸シ炒用テ治下。○

蜜水ニ浸シ炙用テ治中。○今人黄蘗ヲ用テ多ク炙テ使誤也。

炒之稱過テ絶テ要トス。若命門不足ノ虛火ヲ治ス者桂附

等ノ温陽ノ劑ヲ用ニ於テ黄蘗ヲ反佐シテ欲共炒黒ク煎テ用ユ

檀相黄蘗葉花樹ノ小根ナリ。苦寒。○治心腹百病安魂醒脾不飢。久服

輕身延年通神。長生神仙去萬病爲散飲服方寸匕。蓋一枚有驗。



苦微辛温。○治腹痛宿食。霍乱。嘔吐。瀉痢。泄瀉。下氣。殺腸蟲。△此木質朴ヲ皮厚レ故ニ号

○脾胃ニ入テ中焦ノ冷寒湿ヲ去。結積ヲ疎散レ。胃土ノ大過ヲ平ル。要劑ナリ。是以テ平胃散ニ以此爲君藥。厚朴ハ本中焦ノ瀉劑ナリ。世

人此ガ性ノ温ナルヲ以テ補トスル者ハ誤ナリ。治腹痛此厚朴ノ要能也。

或寒痛或食滯痛俱ニ用之。胃氣不足ノ虛痛ニ用ユ。勿レ宿食苦

酸辛ハ散レ。温ハ滯ノ食飲ノ宿滯ヲ化ス。尤冷物ノ積滯ヲ消ス。膨脹中

焦ノ實積ニ因テ胸腹膨脹ヲ主治ス。夫厚朴ハ苦辛温胃土ノ太過ヲ

平ル者ナリ。脾胃ノ積滯實滿ノ症ニ非バ勿用。故ニ好古曰泄實滿ト

成無己曰泄腹滿ト。李杲曰散湿滿ト。元素曰雖除腹脹若虛弱人

宜斟酌用之。誤服散入元氣ト。丹溪謂瀉胃中之湿。平胃中之太過

以致於中和ト。厚朴ノ功能ヲ盡ス者ナリ。霍乱嘔吐温胃消積滯氣ヲ

下ガ故ナリ。屬胃虛者ハ勿用。大明曰治反胃ト。按ニ反胃ハ中焦ノ虚冷

タルヲ以テ云然。厚朴ノ苦瀉胃氣反胃ノ症或ハ少用テ温胃胃ヲ

行スト雖用過用スルコト勿レ。恐久重テ胃氣ノ虚ヲ致シトテ瀉劑去

寒湿消積滯ガ故ナリ。消痰下氣消湿痰冷痰。蓋中焦ハ痰ノ官也。何如

トナレ脾胃土六湿化ヲ主ル諸痰ノ生スル湿ニ非ト云コトナレ厚朴苦辛
温中焦ノ湿冷ヲ疎散則痰自消退此ガ氣ヲ下ス者ハ其苦味ヲ以
ノ故ナリ別錄ニ治煩滿上好古曰治喘欬ト云痰ヲ消シ氣ヲ下スノ功也
殺腸蟲苦ハ蟲ノ所畏濕ハ蟲ノ所隱也厚朴ノ苦温濕ヲ去則腸虫不
能生○或問別錄ニ厚腸胃トハ何ノヤ曰厚朴ノ温腸胃濕ヲ去積滯ヲ
消則腸胃自厚コトヲ致ス補ノ義ニ非ズ又問本經ニ謂ル治中風傷
寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌トハ何ノヤ曰厚朴ノ苦中ノ辛温ヲ以テ
風寒ヲ祛苦味ハ能氣ヲ下ガ故ニ治中風傷寒頭痛寒熱ト云歟
治血痺死肌トハ苦辛温能去濕發結滯ニ從歟治驚悸トハ痰ヲ消シ
氣ヲ下ガ故歟然レトモ驚悸ハ心虛ニ屬ス厚朴ノ入脾胃者非所
關其中風傷寒寒熱頭痛血痺死肌モ亦此ガ要能ニ非ズ標能ノ
微也夫別錄曰益氣去留熱大明曰健脾胃轉筋冷熱氣瀉膀胱

及五藏一切氣婦人產前後腹藏不安明耳目調關節甄權曰治積
年冷氣腹内雷鳴虛吼去結水破宿血止汗酸水主病人虛而尿白
ノ諸説ヲ案ニ其義ニ可與不河アリテ盡ク信用シ難キ者也厚朴ハ
中焦ノ瀉劑ナリ何ゾ氣ヲ益シヤ厚朴ノ性全温タリ何ゾ去留熱乎或
陳皮蒼木等ト合同中焦ノ湿ヲ去則助氣ノ義アリト雖モ直ニ氣ヲ
益シ非ズ惟氣ヲ順ズルニ丹溪曰若氣實人誤服參芪藥多補氣脹
悶或作喘宜厚朴瀉之ト此本益氣ノ劑ニ非コト知スヘシ或ハ食滯ニ
因テ熱ヲ留ル者ハ用之消食滯則留熱自去ト雖モ此モ亦厚朴直ニ
留熱ヲ去シ非ズ食滯ヲ消ガ故ニ大明健脾胃ハ消胃滯湿ヲ去ガ故
也亦補ノ義ニ非ズ治轉筋者ハ胃ヲ温メ冷ヲ去ガ故ナリ冷熱氣ハ
中焦冷熱氣ノ不和ヲ云瀉膀胱及五藏一切氣婦人產前後腹藏
不安トハ未詳案スルニ謂レ一切氣トハ此ガ苦温ヲ以テ故歟苦ハ氣ヲ

疎シ。温ハ氣ヲ行セバ也。然レモ厚朴ハ開鬱順氣ノ劑ニ非ズ。惟下氣ノ
藥ノ三。腹藏不安トハ婦人産前産後ハ。食飲中焦ニ滯易シ。故ニ食滯
ニ因テ腹藏不安者。用之滯ヲ消スルノ義歟。然レ元素曰孕婦忌之
ト。産後ハ氣血脱レ胃氣怯レ實ニ産前後腹藏不安者。必ス果シ用此
乎。明耳目ノ説モ亦不通中焦ヲ疎シ氣ヲ下ガ故歟。未詳トス。調關
節トハ温胃去湿ガ故歟。然レ凡關節ハ属腎。厚朴ハ脾胃ニ入ル。必レモ此
關ル所ニ非ズ。甄權ガ謂積年冷氣トハ温胃ガ故ナリ。然レモ厚朴ノ苦温
總テ中焦新舊ノ冷寒ヲ去。獨積年ノ冷氣ニ不止。腹内雷鳴トハ温
胃中焦ノ滯ヲ和スバ也。虚吼トハ轉矢氣ヲ云。胃滯ヲ消ガ故ナリ。去
結水トハ冷水ノ中焦ニ結滯スルヲ云。水腫トハ非ズ。然レモ胃實ノ水腫兼
腹腫者ハ用之。温胃消胃積去湿冷コトアリ。破宿血トハ未詳。中焦ノ
滯血ヲ指テ云歟。梅師ガ方婦人經水不通者。厚朴三兩炙。水ニ

升煎。一分。二服。空心飲。不過三四劑。神。加桃仁。紅花。案ニ經
閉ノ症數因アリ。厚朴ヲ用所ノ症ハ中焦ノ氣結積滯ニ因者也。厚朴ハ
中焦爲氣ノ劑トス。本血分ノ藥ニ非ズ。中氣結積ノ經閉ニ用ク。然レ
或ハ桃仁。紅花ヲ加テ血ヲ破コトヲ致ス。甄權以厚朴爲破宿血者ハ。
此ヲ孕婦ニ忌及。經閉ヲ通スルニ從テ云乎。孕婦ニ忌者モ亦此ガ直ニ
血ヲ破ルニ非ズ。温胃ヲ以テ也。胃氣ハ胎養ノ根蒂ナレバ也。豈獨用之
破宿血ノ功アラシヤ。止吐酸水トハ温胃胃滯ヲ消ガ故ナリ。主病人虚
而尿白トハ經ニ良方ニ。心脾不調。腎氣白濁用。厚朴。姜汁炙。一兩。白
茯苓。一錢。水酒各一椀。煎。一椀。温服。ト此心陽健ナラス。脾湿旺シ。湿
濁下焦ニ流テ。小便白濁ノ者。用之。温中。湿ヲ去ノ義ナリ。然レモ甄權何
病人虚而ト云ヤ。此虚ノ字指心陽乎。指胃氣乎。指腎氣乎。未詳。厚
朴治白濁者ハ。去脾湿温中ガ故ナリ。虚ノ義アルコトナレ。凡本州各藥

主治ノ諸條。一定ノ義アリ。不_レ一定者アリ。學者妄ニ主治ノ諸條ニ所
述ノ言ヲ以テ。盡ク信_ス。皆其要能多_クト致_ス。反テ害_ヲ加_ルノ端ナ_リ。

總槩

厚朴ハ胃ノ實滯ヲ平_ゲ。湿冷ヲ去_ク。中ヲ温_メ。食及_テ痰ヲ消_ス。氣ヲ
下_レ。腹脹瀉痢ヲ治_ス。ノ要劑ナ_リ。或問。治_スノ劑中ニ用_之。
者ハ何_ゾヤ。曰。發散ノ爲_ニ非_ス。凡_ソ瘧疾多_クハ中焦ノ積滯ヲ兼_テ用_之。
鍊_ス。胃氣行_易シテ。邪氣容_地ナ_レ。且_ツ瘧モ亦痰ヲ主_{トス}。厚朴痰ヲ
消_ス。也。章宜_カ曰。除_ス。不_レ發_之。發_爲裏_之表_藥也。益_シ。苦辛温_胃ニ
入_テ以_テ。又問。山嵐ノ障_氣ヲ辟_ル者_コレヲ用_ルハ何_ノヤ。曰。山嵐不正ノ
障_氣ハ原_濕濁_ノ氣_喜テ脾胃ヲ犯_ス。
用_之。胃ヲ温_メ。湿ヲ排_ル。義_ニ取_而已_ス。
蒼木泄_濕滿_同。栝_榔木香黃連滑石陳皮甘草白芍治_ス。痢疾初_發同。
白木人參白芍茯苓消_胃虛_腹脹_佐生_姜。陳皮藿香縮_砂半夏止_胃。

使藥

乾姜ヲ使_{トス}。同_枳實
大黃泄_實滿_同。陳皮

寒吐逆

毒

孕婦ハ禁用_○厚朴ハ瀉_胃泄_氣胃氣不足者勿_レ用_○
及_テ痰_阻。若_シ人小兒ノ中氣不_レ壯者ハ斟酌_スベシ_○久服過_レ服則_テ

脫_元氣_○胃熱ノ者ハ勿_レ用_○

畏惡

忌_ス豆。若_シ同_食ス_ル動_氣。
澤瀉消_石寒_水石_○惡

附方

男女氣_脹心悶_{飲食}不下_{冷熱}相_攻久患_{不愈}者

修治

皮厚色
紫ニシテ

厚朴姜汁ニ浸_炙焦_ノ爲_末。陳米飲_調服_出斗門方

苦_辛中_ニ帶_辛者_良皮薄_ク色_白味_惟苦_ノ不_レ帶_辛者_ハ不_レ堪_用也。

粗皮ヲ刮_去。剉_テ姜汁ニ浸_シ透_シ炒_焦テ用_ユ。炒_{コト}不足_及姜汁ニ
不_レ浸_則損_口舌_○厚朴一斤 百六十 錢目

多少皆_レ此_度ヲ以_テス。楊氏_カ漢語_鈔及_テ順_類聚_鈔ニ厚朴_ホク_木
上_故ニ本_邦相_繼ニ從_之ホク_ノ木_ノ皮_ヲ以_テ厚朴_トス_察ス_ルニ本_綱ニ

所_述ノ厚朴樹ノ花形及_テ皮質俱_ニ和_ニ謂_ルホウ_ノ木_ト不_レ同_今議_ニ

云本邦ニ所謂ノ夢窟木也。夢窟ニ兩種アリ。一種ハ閩中記ニ所載
加條也。其葉ヲ採テ犀角象牙等ヲ摩テ光ヲ出ス者ナリ。和ニ呼テ
雌夢窟トス。一種ハ皮厚ク鱗ダチ。皺テ鹿ニ和ニ呼テ雄夢窟トス。厚
朴是也。雌夢窟ノ皮ハ雄夢窟ノ厚ニ不及用之。厚朴トス。樹皮花
形本綱ニ述ル所ト不異。且ボウノ木ノ皮ハ強テ不厚。厚朴ノ名ヲ得
ベキ者ニ非ル也。古今繼誤改知者希ナリ。漢スヘレトス。如此想間存
在リ。不可不詳。

杜仲



其微辛小温。治腰膝痛脚疼。陰下癢。湿小便
餘。歷堅筋骨。益精氣。潤肝燥。補肝經風虛。△昔

杜仲名ト云者。服此得效ヨリ始ル。因テ各トス。章宜カ説ニ杜從上
仲從中。即中土義。其色喝ラシトノ如シ。此土克水ノ象アリ。此制腎邪
防湿上害者トス。此從各義雖辨。主治土克水説未是者乎。○杜

仲ハ足少陰腎經ニ入テ潤精強腎志温下。兼テ足厥陰肝經ニ入テ潤
肝燥肝主筋腎主骨。腰膝ハ筋骨府會ノ處ナリ。故ニ杜仲ヲ用テ肝腎
ヲ潤シ筋骨ヲ堅。則腰膝痛脚疼及脚軟ヲ治ス。尤腰膝冷痛者ニ宜シ。
陰下癢。湿陰囊癢ノ湿ル者。下焦ノ虚冷トス。用之潤陰温下。小便餘
瀝モ亦腎部ノ虚冷メレバ也。堅筋骨益精氣潤肝燥。此杜仲ノ要能
也。他ノ諸ノ主治ハ皆此ヨリシテ致ス所ノ者ナリ。潤腎肝養筋骨温下
焦ノ功ニ不過補肝經風虛。此好古ガ發明也。古方ニ腎ヲ滋コトヲ知ル
肝燥ヲ潤シ義ハ不知所ナリ。風虚トハ肝ハ東方風木ノ藏ナリ。肝氣虚則
自風燥ノ化病ヲ生スルヲ云也。杜仲ハ肝燥ヲ潤則風化自退ヲ以テリ。○
案云ニ時珍カ曰。能入肝而補腎。子能令母實也。トハ未是。何如トナリ。時
珍カ説ノ如シナルトキハ。杜仲ハ入肝ヲ本トシテ。腎ヲ補ヲ標トス者也。杜
仲皮ハ粘滑ニシテ折之有絲。豈此潤腎ヲ以テ潤腎ノ義ナレトセンヤ。

腎肝ニ入テ兩蔵ノ潤ス者トスヘシ獨肝ニ
而已入テ肝ヨリ腎ヲ養トスベカラズ
總槩 杜仲、肝腎ヲ潤シ筋
骨ヲ堅メ治腰膝脚

疼痛脊寧強直
及軟弱要藥也
使藥 同牛膝、枸杞、續斷、地黃、五味、兔絲子、白
膠、黃蘗、山藥、治腎虛腰痛及脚軟無力

毒 腎熱ノ者ハ勿用、或ハ
黃蘗、知母ト合用ス
畏惡 玄參、蛇
蛻ヲ惡
附方 腰痛風冷傷腎
者杜仲一味炒

黃ヲ酒ニ浸コト十日ノ炙乾シ爲末、毎日温酒ニテ服ス出、二因方婦人
頻墮胎者或ハ三四箇月ニ墮胎ノ者ハ兩朔ノ前ニ於テコレヲ服ス杜
仲ハ兩糯米煎湯ニ浸透シ炒テ絲ヲ去積斷ニ兩酒ニ浸シ焙乾シ爲末

山藥五六兩爲末作糊、梧子ノ大ニ丸、每服五十九空心ニ米飲ニテ
下ス出簡便方○別後方ハ杜仲一味
焙爲末、棗肉ニテ爲丸糯米飲ニテ下ス
修治 皮ヲ去剉或薑汁浸

或加塩酒ニ浸テ炒コト絲ノ竭テス○腰痛ノ者ハ必塩酒炒ヲ用
○本邦ノ人或ハサ木ヲ以テ爲杜仲者ハ誤也

乾 辛鹹苦温○削年深堅結之積滯破日久凝結
之瘀血去腸胃蠅蟲ハ漆ハ本作漆木中ノ汁
漆 水滴テ下ノ形ニ象ル用藥者ハ黑漆ノ乾ヲ使フ故ニ此名アリ○漆
性急烈ニシテ年久キ積滯ノ堅ヲ削去テ痞塊ヲ治シ日久キ瘀血ノ凝
滯ヲ破テ女人ノ癥瘕經閉腰痛心痛ヲ治ス腸胃ノ蠅蟲ヲ殺テ傳
尸勞蟲蟲心痛ヲ治ス其氣下降シテ産後ノ血運ヲ治ム本經ニ續筋
骨填髓腦ハ漆性ノ堅クシテ粘ラ以テ治風寒濕痺除風療效驗



トハ其辛温解散スルヲ以テ然レ此等ハ乾漆ノ要能ニハ非ズ
概 乾漆ハ下降シテ破瘀
血殺蟲ノ要劑ナリ
使藥 半夏ヲ
使ス
毒 血虛ノ者ハ輕シク
用テ勿レ蓋乾漆

總

獨瘀血ヲ消スノニナラズ新血モ亦破レバ也。章宜曰血見乾漆即化
爲水其損新血可知○生漆ハ毒烈レ服之損腸胃若其毒ニ中ル者

飲鐵漿黃蘆汁并豆湯喫解愈○生漆瘡者ハ杉木湯

紫補湯蟹湯ニテ浴セヨ○凡人漆室者蜀椒塗口鼻免生漆瘡

漆子ヲ畏
畏惡

油噴ヲ忌
附方
婦人産後乾漆ヲ燒テ烟ヲ聞エ血運ヲ免ル
若乾漆ナケレバ陳舊ノ黒漆器ヲ燒テ聞エ血

漆器ハ本銀ノ
愚察
今ノ小方脉以生漆指灸穴灸艾ニ代ル者
古今ノ醫書ニ遂ニ此義アルコトナレ有ドモ余

毒アリ不可用
味見歟別後方ニ下部生瘡生漆塗之ノ説アルノニ察スル小兒ハ灸

紋ノ熱ニ不耐故ニ漆ヲ指テ其穴處ラシメ漆瘡ヲ生シメ膿ヲ致シ癩

結ヲ去ト欲スル者歟此蓋山谷ノ野人希求於

醫者ノ始チラシ醫ノ眞法ニ非ズ知道者敢勿用
修治
漆桶ノ
中ニ自

然ニ乾堅キ者良狀蜂房ノ如ク孔々アリ黒漆宜用朱漆ハ不可用

使フニ打碎テ炒テ烟ノ盡ラ度トス烟ヲ盡カバ腸胃ヲ損ス○濕漆ハ

煎ジ草ス○或ハ燒テ存性用ル者アリ○清ヨリ渡ス所ノ者多ハ桐油

ヲ雜ス勿入藥○本邦北國ノ山中ヨリ多ク乾漆ノ出ス藥店ニ所用

ノ者ハ皆是ナリ然ドモ此眞ノ乾漆ニ非ズ其山中ノ黒石柔ニ碎易ク

土人火中ニ雜テ炭ニ代即チ本州ニ謂レ石炭也誤テ用之爲乾漆者

不少噴スレトス**漆葉**殺勞虫暴乾レ研末ノ日ニ用酒服一錢**漆子**

治下血**漆花**治小兒解癩腹脹

苦酸寒○導熱結下行通水道治心腹暴痛諸

亦殺蟲△棟ノ實也黃色ヲ小鈴ノ如シ故ニタラ○

金鈴子ハ小腸膀胱ノ結熱及心包ノ相火ヲ引テ下行ス故ニ結熱因

テ水道不通者ヲ利シ熱厥ニ因テ心腹暴ニ痛ヲ治ス疝痛ヲ治スルモ



亦引結熱下分故也。此ガ味苦ノ能蟲ヲ殺シ。蟲痔。疥癬。毒蟲。腹内長
蟲ヲ治ス。本經ニ治傷寒。大熱煩狂。ハ。金鈴子ハ足陽明經ニ入ル。傷寒ノ
熱。陽明ニ入ル者煩狂在ス。故ニ用之。其結熱ヲ瀉スルノミ。又下焦ノ結熱ニ
因テ。下血膏淋ヲ致ス者ニ用ユ。○金鈴子ハ小腸膀胱胃及心包ノ結
熱ヲ涼下シ。熱厥ノ心腹暴
痛ヲ治シ。殺腸蟲ノ要劑也。

使藥

茴香ヲ使テ酒ヲ得テ良。益寒肉熱用ノ義ナリ。

毒

虚寒ノ者○脾胃
不足ノ者勿用

畏惡

金鈴子ヲ使ニ用肉。不使核。核ヲ
用ハ不使肉。核肉合用ルコトヲ忌

附方

熱毒下血。金鈴子炒黃爲末。蜜

修治

用肉酒ニ拌セ蒸ニ皮軟ニ
ナリタル時。皮ヲ刮去。肉ヲ

用ユ。或ハ少炒コトアリ。核ヲ用ハ。槌碎テ水ニ煮ルコト一時許。晒乾用。
或ハ炒コトアリ。凡肉核俱ニ合用ルコト勿レ。○和産ハ肉少シ。清ヨリ來

者肉厚ノ良。苦棟皮同根。苦微寒。○治。蛇蟲瘡。蟲刺。大腸。諸酒和

塗。疥癬甚良。治熱毒瘡。風疹。惡瘡。疥癬。小兒壯熱。○棟皮。棟根。俱ニ

追。蛇蟲ノ要劑ナリ。故ニ小兒家ニ多用之。○棟ニ雌雄アリ。根赤ク子

無キ者ハ雄ナリ。毒有テ入ヲ殺ス。不可用。根白ク子多キ者ハ雌也。用

藥皮根。俱ニ鹿皮ヲ刮去テ。少シ焙用ユ。根ハ東方ニ向者ヲ良トス。

治。蛇蟲。棟根。皮。每一兩。糯米五十粒。同濃煎ジテ。上十五日ノ間ニ服ス。

先雞肉及餅少許ヲ啖テ頓ニ服藥。若服後ニ多ク瀉出ハ。令粥ヲ食テ

止。不瀉熱。粥ヲ食テ下ス。石茱萸。棟ノ花落子也。服藥ニ不用外

科ニ使之。棟花。熱瘡ニ焙末ノ摻之。鋪席下。殺蚤虱。棟葉。治疝氣

陰囊痛。發ル時ニ煎酒飲。

角 槐



苦酸鹹寒。○涼熱清。頭目。治五痔。腸風。瀉血。陰
瘡。濕痒。催生。殺蟲。△槐角。槐實也。槐ハ懷也。

歸也。古ハ訟ヲ槐樹ノ下ニ聽。人ヲ懷來セシメ。情ヲレテ實ニ歸セシム。故ニ此名アリ。○槐角ハ潤肝燥涼大腸。散一切結清一切火涼血熱ノ要劑也。故ニ治火瘡熱腫口齒風熱心間煩熱風熱眩倒目淚日熱頭熱大熱難產瘵因下熱致五痔腸風瀉血陰囊陰戶濕痒瘡者。此ガ治元所皆熱ヲ涼レ結ヲ散スニアリ。

使藥

景天ヲ使ス

毒

孕婦ニ禁ル。陽虛及血

尤血熱ノ下血ヲ療スル要劑也

附方

槐角丸 治糞前糞後下血脫肛諸痔瘡槐氣不足者勿用
 角 去梗炒 地榆當歸 酒防風黃芩枳殼 炒
 各半 爲末酒糊丸梧子大米飲下出局方目熱昏槐

爲末酒糊丸梧子大米飲下出局方目熱昏槐
 角黃連 各二 爲末蜜丸梧子大水下出聖濟總錄

修治

銅鏈ヲ以テ打

破醋ニ浸ク一宿之蒸炒テ用ユ○子ノ一粒與五粒連ル者ハ毒アリ勿用
 用ニ一粒ニ粒連ル者ヲ良トス 槐花 苦涼 ○涼陽明厥陰血熱及大腸

熱治下血吐血小便血血衄崩血赤白下痢帶下五痔眼赤去藏蟲
 除皮膚風熱炒香嚼治失音喉痺○涼血熱治一切出血要劑也○
 胃虛虛寒ノ者用コト勿レ○花未開ノ時采テ陰乾ヲ炒用ユ陳久ノ者ヲ良トス今本邦ノ醫新花ヲ用ユ案云ニ普濟方治藏毒下血新
 槐花炒研酒服三錢ト云トキハ新花ヲ用ユモ可ナリ 槐葉 苦平○煎
 湯治小兒驚癇壯熱疥癬及下腫難產癩疹牙齒風痛痔疾瘵霍亂
 煩熱槐葉桑葉 各一 炙甘草 分煎服 槐葉ヲ采陰乾ヲ剉用 槐枝
 氣味同葉○煎湯洗瘡亦陰囊濕痒痔核煮汁釀酒療大風痿痺痛
 枝ヲ燒テ汁ヲ出シ塗癬瘡燥焦ヲ指牙虫燒灰沐頭長髮治赤目風眼
 崩漏傳信方治痔瘡出血槐枝濃煎湯先洗以艾灸七壯以知爲度
 子母秘錄孕婦日月未足胎動欲產者取槐枝向東令孕婦手把之
 卽易產○槐樹ノ大枝ヲ斬テ再嫩葉ヲ生スル枝ヲ用テ洗陰瘡濕痒

六向北日ヲ不受枝ヲ用ニ槐木皮根白皮（苦平）煎湯漱喉痺口齒
 風腫痛牙蟲血治中風皮膚不仁下血煎汁洗男子陰囊腫痛婦人
 陰門痒痛五痔一切惡瘡煎膏治湯火瘡爛瘡止痛長肉（木皮根
 皮俱ニ粗皮ヲ去テ白皮ヲ用ユ槐膠苦寒（治一切風熱瘰癧涎抽
 槲口瘻四收頑痺周身如蟲行破傷風口眼喎斜腰背強直煨熟綿
 裏塞耳治風熱耳聾（槐樹ノ膠ナリ或ハ丸トシ或ハ散トシ或ハ煎ビテ諸
 藥ニ和雜ノ用ユ

合（甘平）和血消腫止痛續筋骨長肌肉明目煎
 歡（實塗癰腫治折傷跌撲研末酒服一錢）此樹



葉至夜合木皮安五藏和心志令人歡樂無憂故名（合歡屬土補
 陰ノ功甚捷レ筋骨折傷及筋痺
 修治
 夜合樹ノ皮ナリ粗皮ヲ去
 剉（妙用）花枝俱濃煎
 汁拭口中并洗治小兒臍風撮口

秦（苦酸寒）療目疾治風寒濕痺熱痢婦人帶下
 皮（小兒驚癇）秦本作枏此木小ヲ為高故名（



秦皮ハ青色（シ）入肝胆兩經涼熱故ニ療目疾蓋目ハ肝竅トス肝
 胆ハ木ニ屬ノ相火ノ藏府風熱ノ氣ナリ是以目疾多クハ肝經ノ風
 熱ニ因目中之青翳白膜目赤腫痛熱淚晴瘡ヲ治スニ秦皮ヲ以ス
 此モ亦肝胆ノ風熱ニ屬ス方故ナリ或問秦皮ハ苦寒ノ劑當除熱尙
 治風寒濕痺乎曰風寒濕ハ病因也痺ハ病證也夫痺病タル風寒
 濕ノ三邪交合テ經絡ヲ閉澁レ血氣凝滯（筋脈急縮）為痺痛
 其經絡ノ閉澁血氣ノ凝滯スルニキハ爵熱アリテ筋脈燥縮ス故ニ其
 病因ハ風寒濕ト雖在既ニ痺痛縮急ヲ發スニ於テハ開爵ノ熱燥ヲ
 主トス秦皮ノ苦寒涼壅熱酸味ハ潤燥則筋脈通利ノ縮痛愈又治

熱痢帶下。秦皮ハ沈テ陰也。涼下熱カ故ニ熱痢及屬熱帶下。崩血ヲ治ス。治小兒驚癇。亦解肝胆熱。平木。沈也。故ニ別錄曰。治小兒癩身熱。通用ノ義ニ非ズ。身熱ノ一字ヲ主トシテ用之。○別錄。療男子少精。又曰。久服皮膚光澤。肥大有子。ト恐ハ不是。蓋秦皮ノ氣寒。味苦酸。性收瀉ス。其酸收瀉ヲ以。益少精有子ノ說アリト雖。或ハ酸温。酸微寒。或酸甘。或甘温。其微寒等ノ者。有補益ノ功ヲ致スヘシ。秦皮ハ本經ニ微寒ト雖。別錄ニ爲大寒。此苦酸大寒ヲ以テ。何ゾ益精ノ義アランヤ。此ヲ久服スベケンヤ。且冷人有子ノ義アランヤ。秦皮ノ苦酸大寒ヲ久服共。其下焦偏ニ如秋冬。收殺令失。春温生發氣何ハ有子ノ義アランヤ。惟因熱精不堅者。因熱肌膚不光澤者。因熱無子者。ハ或ハ少ク用スキノミ。本艸言盡ク信ジ難シ。學者一隅ニ執スルコト勿レ。

總緊

秦皮清肝胆風熱熱眼崩痢及小兒癩熱

ヲ療スルノ要劑ナリ

使藥

大戟ヲ使トス

毒

虚眼ノ症。○脾胃不足ノ者。○中下焦有冷者。皆勿用。

畏惡

苦瓠。防落。吳茱萸ヲ惡

附方

赤眼生翳。秦皮一兩。水一升半。煮七合。澄清温洗。于左。滑石。黃連。等分。二加。出外臺秘要。

修治

外皮ヲ刮去。用之。○浸水。碧色。塗紙。青色ノ者。眞也。本綱。忌火ノ言ナシ。和法。忌火ノ義。然カ不ヤ。

皂莢



辛鹹温。○通九竅。療腹脹。治咽喉腫。喉痺。消風疹。同蒼朮。燒烟辟瘟疫邪氣。薰久痢。脫肛。破堅癥。

散腫痛。殺蟲。墮胎。○莢ノ皂色ナルノ以テ号ク。○皂莢ハ肺大腸ノ金部ニ入テ。厥陰肝木ノ病ヲ平ク。藥性浮テ疎散。通利ス。上下ノ竅ヲ開利シ。通節ヲ通シ。壅滯ヲ疎導シ。風ヲ散シ。痰ヲ逐シ。腫毒ヲ消ス。故ニ一切ノ咽口舌ノ腫痛ノ諸症ヲ療シ。牙痛。頭痛。中風口噤。口喎。癰病。

喘息咳嗽ヲ治ス。此利上竅通壅滯逐風痰力故也。腹脹腹痛久痢
 脱肛下血墜癥ヲ治ス者ハ利下竅壅滯ヲ通スル也。上吐逆不通
 且二便不通ヲ各關格皂莢治之者モ亦利上下竅也。治霍亂轉筋
 者ハ通關節也。治便毒腫痛陰囊腫疼婦人乳腫疥癩者ハ腫ヲ散シ
 消毒導滯殺

總藥

上下竅之通シ風痰ノ壅滯ヲ逐治

使藥

柏實ヲ浮婦ハ禁用○陰虛ノ類中鐵ヲ忌惡麥門冬畏空青人參
 使ス風者ハ勿用辛温恐燥之 **畏惡**

苦 **附方** 自製皂莢末吹鼻中出外一方水瀉卒死者一宿向
 可法紙裹皂莢末納肛門女子納前後陰須臾出水治

出外 **修治** 不睡者ヲ擇キ水ニ浸スト一宿シ銅刀ニテ粗皮ヲ刮
 秘要 去蠶ヲ塗反復ノ多透テ子ト蔓トヲ去用ユ○圓ク

厚ク肥短ク皮薄ク肉多キ者良和産ニ此種多シ細ク瘦尖ニ牙ノ
 如丸者ヲ猪牙皂莢或ハ牙皂ト号ス清ヨリ來者ニ牙皂多シ風痰
 壅滯閉竅者ハ宜用牙皂其銳利ノ象ヲ以テ也他ノ通用ハ圓厚肥
 短ノ者ヲ宜上ス○方書ニ謂皂角ハ即皂莢也皂角子ハ皂莢子也
皂莢子 辛温○疎道五藏風熱壅滯利肺氣治胸痰吞酸和血潤通
 大便燥結瘰癧癰腫毒瘡癩腰脚風痛下痢裏急後重不止牙疳痛
 婦人難産○皂角子ハ滑ニ燥結ヲ潤通シ肺大腸ノ氣ヲ利ス大便
 閉ノ要劑也孕婦ハ勿用○堅滯者良者熟ノ外ノ黒皮一片ト内ノ
 實ナ者トヲ去テ銅刀ニテ割晒シ使ス或ハ焙丸内ノ實ナ者ハ消腎勿
 雜入皂角子核燒テ存性用利大便 **皂莢刺** 治諸瘡腫未潰癩風
 乳癰惡瘡楊梅瘡胞衣不下殺蟲○皂莢刺ハ能諸藥ヲ引テ上行シ
 治上焦去血中風熱壅滯ヲ利シ蠱ヲ殺ス皂莢ノ功ト同ノ刺ハ惟銳

利ヲ能病ノル所ニ達シ瘡腫ノ未潰者ヲ能潰ルニ神效アリ已潰者ハ勿用多用ハ落髮○銅刀ニ割テ或ハ燒テ刺ノ末微許ヲ燒去テ用ユ○今藥店ニ皂角利ト呼者即チ皂莢刺也子與刺音相近故ニ皂莢子。皂莢刺ノ相混ゼントラ恐テ以刺易利呼者トシ歟

訶子



原形

訶子ハ俗語ナリ。本名只訶梨勒蓋梵語也○訶子苦能降酸瀉能殺滯故ニ降火下氣收斂滯止ノ功ヲ致ス故ニ瀉痢嘔吐欬嗽喘息下血胎漏崩帶ヲ止瀉ス夫瀉ヲ治ス者其寒熱ヲ調へ中焦ヲ和シ滯ヲ消シ水穀分利ノ愈スヲ以テ法トス若夫法ノ如テ治ハタメ不愈者ハ用之止瀉其痢ヲ治スル者ハ其寒熱ヲ調へ中焦ヲ和シ滯ヲ消シ積ヲ疎導ノ愈スヲ以テ法トス若其消化推下スル者ハ不愈者ハ

用之止瀉其治嘔吐者ハ其寒熱ヲ調へ中焦ヲ和シ升降ヲ利シ腸胃ヲ順シ愈スヲ以テ法トス若其法ノ如シテモ不止者ハ用之止瀉其瀉瀉欬喘息者ハ外邪ノ有無ヲ察シ邪アレバ驅散シ痰ヲ消シ氣ヲ順シ或ハ瀉或ハ涼或ハ瀉或ハ補テ愈スヲ以テ法トス若其法ノ如ク不愈者ハ用之止瀉其下血崩血帶下ノ如キモ亦皆先其本因ヲ治シ不愈者用之止瀉其若瀉瀉欬喘嘔吐下血等先其本因ノ邪ヲ去ス始ヨリ用之早キトキハ反テ止邪増病害ヲ致スコト甚レ凡ソ訶子ヲ用テ止瀉スル於テハ脉證ヲ詳察シ其時ヲ候待テ施セ輕碎ニ勿用漏胎ノ如キハ此例ニ非ズ此症ノ急ナル者補血養胎ノ劑ト合シ速ニ用之唐本艸治冷氣心腹脹滿下食大明謂ル化食開胃調中霍亂心腹虛痛奔豚腎積各也ト訶子苦溫寬中溫中下氣力故ナリ大明謂治五臟婦人胎動脹悶氣喘除煩下氣下胎瀉方故也甄權謂破

胸膈結氣通利津液蕭炳力謂下宿物ハ皆誤ナリ蓋訶子ハ收澁劑ナリ何ゾ破胸膈結氣ノ義アラシヤ惟氣ヲ下ノ訶子ハ腸胃ヲ澁ス何ゾ下宿物ノ義アラシヤ若夫宿食ヲ下ス者多ク古人何ゾ瀉劑ノ始ニ忌之ノ説アラシヤ蕭ガ説尤ニ誤ナリ甄權ガ謂通利津液ノ言モ亦未適細訶子ノ苦酸澁ハ當收津液何ゾ通利ノ義アラシヤ且甄曰止水道ト通利津液ト云テ亦止水道ハ自相矛盾ナリ或問訶子消痰下氣寬中降火ハ何ヤ曰古今ノ相傳ニ波射國ニ大魚アリ若死テ水中ニ略トキ凝滑ニ船通コト不能時ニ舟工訶子ノ煎湯ヲ投入ニ凝化氷船行ト是ヲ以テ訶子ノ痰ヲ消スコトヲ知スベシ氣ヲ下ス者ハ此ガ味苦ニ由寬中者ハ性ノ温ニ從火ヲ降ス者ハ苦酸ノ味厚ヲ以テ也然トモ性温ナリ相火衝上ノ者ハ不可用惟此ガ火ヲ降ス者ハ其收澁ノ餘ヨリ致ス知母ノ降火ノ類ニ非ズ

總

緊

收澁大腸澀止瀉劑收寧肺氣止澁欬嗽消化痰涎要劑也

使藥

同入參補肺同白朮益脾同五味子烏梅

斂肺同陳皮厚朴下氣

毒

痢病未行消導推下始○泄瀉未得水穀分利消化始俱勿用○欬嗽初發邪未去病未入者不

驟用○肺有實熱者○氣虛者○喘欬因火衝者皆勿用

附方

下痢瘡先以米泔水洗或以荊芥黃柏甘草馬鞭蔥白煎

湯洗後太訶子燒灰入麝香少許搽之並爛一丁者用此神效也出夷望志惠入痢肛門急痛或產婦陰門痛訶子末和臘燒烟薰之

或煎湯薰洗大明方

修治

六稜ニ黒色肉厚キ者良麩粉ヲ水ニ和シテ訶子ヲ裏俾レ透テ麩ヲ去核ヲ去テ肉ヲ取剉焙

用○或ハ酒ニ浸蒸コトナリ○若用核去肉核止欬嗽痢疾爲末調白蜜注目去風眼赤痛葉下氣消痰止瀉及瀉劑煎服功同訶子

没石子



烏髭髮治痿△本各八没食子波斯人每食代其故名今人傳訛テ

没石子或ハ無食子トス○腸胃ヲ温メ精血ヲ助ケ氣道ヲ和ス大腸

虚冷ハ大便滑ヲ難禁及瀉痢久レテ大腸虚滑ニテ難止ヲ止セ

訶子ト相似ク然レテ訶子ハ偏ニ止瀉ス此ハ精血ヲ補ヒ氣ヲ和シ

能温腸胃止瀉ノ功訶子ヨリモ緩和ナリトス大腸虚

冷ノ滑瀉ヲ治スニ宜トス然レドモ獨用ヒ過用ルハ宜カズ

者ハ勿用○腸胃熱

實ノ者モ亦不宜用

飯丸小豆大每食前

米飲下出普濟方

苦温○治赤白痢益血固精温中和氣止大腸

虚冷瀉痢不止治小兒疳積陰瘡陰汗生肌肉

烏髭髮治痿△本各八没食子波斯人每食代其故名今人傳訛テ

没石子或ハ無食子トス○腸胃ヲ温メ精血ヲ助ケ氣道ヲ和ス大腸

虚冷ハ大便滑ヲ難禁及瀉痢久レテ大腸虚滑ニテ難止ヲ止セ

訶子ト相似ク然レテ訶子ハ偏ニ止瀉ス此ハ精血ヲ補ヒ氣ヲ和シ

能温腸胃止瀉ノ功訶子ヨリモ緩和ナリトス大腸虚

冷ノ滑瀉ヲ治スニ宜トス然レドモ獨用ヒ過用ルハ宜カズ

者ハ勿用○腸胃熱

實ノ者モ亦不宜用

飯丸小豆大每食前

米飲下出普濟方

畏惡

銅鐵ヲ忌ム火

附方

血痢不止没

修治

蟲食テ孔ヲ成者良顆小二細紋ノ者佳砂盆ニ入レ以石研碎隔紙焙用ユ

銅鐵并ニ火ヲ忌ム

榆白皮

其平滑利○利數通大小便治五淋腫滿喘嗽不眠滑

利ニ下降ス胃大腸膀胱ノ二經ニ入通小便濕熱ヲ滲シ水腫ヲ治シ

利淋症大便ヲ通レテ除腸胃熱邪腹滿ヲ治ス喘息效嗽不眠ヲ治ス

者ハ一便ヲ通之氣ヲ下シ熱ヲ導ガ故ナリ榆皮ノ性惟滑ニ竅ヲ利

而巳彼滑胎通月經消癰腫傳癰瘡モ亦皆滑利ヨリレテ致ス

者ナリ時珍曰利數滲濕熱行津液ハ尤レ此ガ要能ヲ盡セリ

脾胃寒虛者○小便過多者○大便滑泄者俱勿用○陽氣下陷者

不宜用○孕婦尤禁用○久服多服則洩真氣本經ニ久服輕身不

飢ノ説ヲ信用スガト

勿 類頌曰多食不損 入者恐非 附方

附方

下灰胎 榆白皮煮汁服一升出子母 秘錄 小兒禿瘡榆白皮末調醋塗虫

出テ愈出

愚案

榆白皮性平ト云ト雖凡愚案ズルニ平ニ非ズ微涼ナル者ナリ。療腸胃邪熱氣治胸膈滲濕熱洩

癰腫ト時珍曰胃寒而虛者勿服等ノ諸説

修治

粗皮ヲ刮リ去焙用ユ○水ニ

入。其此ヲ平ナル者トセシカ。微涼ナルコト明ケシ浸コト勿レ濕ハ損性。利小便消水腫治石淋○榆葉ハ其白皮ト功ヲ同ス此モ亦滑ニシ小便ヲ利スル者ナリ○采テ暴乾ノ爲未淡塩水ニ拌テ或ハ炙リ或ハ腫乾シ用ユ酸棗仁ト等分爲末蜜ニテ丸シ服胆虛勞

熱不眠。榆花治小兒疳熱小便不利。榆莢仁微辛平○助肺殺虫下氣余人能食令人能眠消心腹間惡氣治卒心痛未塗諸瘡治帶下

○陳致ノ者ヲ用テ可也



蕪 辛温 殺蟲消食積治癥癖小兒疳瀉冷痢散 皮膚骨節中如虫行治心腹積冷氣痛婦人子

官虛冷下血痔漏惡瘡疥癬△蕪六穢也蕪八瘍也此ガ氣ノ臭キコト

傷敗ノ穢物ノ如レ故ニ号○蕪莢仁ノ功ハ腸胃ニ下走テ蟲ヲ殺レ食

積ヲ消スルニ在ノ三寸白蟲髓癥瘕小兒ノ疳蟲一切ノ蟲症ヲ療スルノ

要劑ナリ。夫嗜酒者血與酒凝積久則酒髓瘕ト成常ニ氣ノ滯鬱ス

者滯氣與血凝テ久則氣髓瘕ト成。虛勞癯冷ノ者瘀血與痰雜凝

コト久則血髓瘕ト成。蟲ノ狀大則如蠶小則如錢。搖頭掉尾如

蟲行。上侵咽下蝕。一陰或隱脇背或胸腹爲痛爲縮急惟蕪莢ヲ用テ

治スニ在ノ三兼テ用。煖胃益血理中劑治小兒疳瀉冷痢難止者殺

蟲且辛温煖腸胃故也。或ハ訶子豆蔻ト合用ス。豬脂ト同ク搗テ塗熱

瘡爲末和蜜塗濕瘡散皮膚骨節如虫行者ハ此風痰ノ動トス。蕪莢

辛温散之。治心腹積冷氣痛。婦人子宮虛冷者モ亦辛温破冷積煖

腸胃下焦也。治下血者ハ通例ニ非ズ。或ハ腸胃ノ冷ニ因テ血ヲ不收

下。或ハ蟲積ニ因テ下者用之。他ハ此ガ主治ニ非ズ。痔漏惡瘡疥癬虫
アルニ属スル者。用之。治スルニ宜シ。危氏ガ得效方。治蟲牙痛。蕪荑仁納蛙
孔中。安縫中甚效ト。此蕪荑ハ獨腹内ノ蟲

使藥

同。肉豆蔻。胡黃連。蘆薈。使

ノニテラス。上下内外一切ノ蟲ヲ殺スニ宜トス
君子。青黛。五穀蟲。雷丸。檳榔。陳皮。小兒。疳熱。瀉痢。及ニ泥土ヲ食フヲ好ムヲ治ス
毒 多服久服スハ發熱心痛ヲ致ス。○熱症無蟲積者ハ

附方

脾胃有蟲者。食即腹痛。面黃無色。蕪荑仁。兩
畏麩粉。炒黃爲末。不時米飲下。出千金方。

修治

礮炙。ラ膠。大丸者佳。小丸者ハ不堪用。去皮用仁。麩粉ニ拌。炒シテ
黃色ニシテ去麩。用ス。此藥小兒ノ疳症。及ニ蟲ヲ殺シ用。他ニ於テ使テ下希也

蘇木方



其鹹微辛酸涼。○和血破血。治產後血脹。血運。
婦人血氣心腹痛。月經不調。血癖。赤白痢。消癰。

腫。撲跌。瘀血。痛。瘰。瘻。疔。口。瘰。△蘇方。國ト云。島アリテ其地ニ此木ヲ
生ス。故ニ名ク○蘇方木。ハ三陰ノ經。血分ノ藥也。少ク用。則。血ヲ和シ。多ク
用。則。血ヲ破ル。所。治。ノ。諸。症。皆。瘀。血。ヲ。破。ル。ニ。在。リ。三。陰。後。瘀。血。ニ。因。テ
致。脹。滿。者。名。血。脹。產。後。ニ。惡。血。衝。逆。シ。テ。暈。逆。昏。倒。口。瘰。者。血。運。不
名。ク。產。後。ニ。瘀。血。下。竭。ス。或ハ氣。鬱。怒。等。ニ。因。テ。惡。血。衝。上。シ。テ。心。腹
卒ニ痛者。ヲ。名。血。氣。痛。婦人ノ月經不調者。ハ。多。ハ。瘀。血。ニ。屬。ス。婦人瘀
血。ニ。因。テ。腹。ニ。塊。癥。アル者。名。血。癖。以上ハ皆。是。レ。瘀。血。ニ。因。ル。蘇。方。木。宜
治。之。赤。白。痢。及。ニ。癰。腫。撲。跌。痛。ヲ。治。ス。膿。ヲ。排。シ。痛。ヲ。止。ル。功。モ。亦。破。瘀
血。ガ。故。ナリ。失。音。口。瘰。ヲ。治。ス。ル。者。ハ。此。ガ。味。微。辛。與。性。涼。ヲ。以。テ。風。熱
ヲ。散。散。故。ニ。防。風。ト。合。用。中。風。ノ。邪。三。陰。ノ。血。分。ニ。在。テ。口。瘰。不。語。者
ヲ。治。ス。又。婦人ノ瘀。血。ニ
總槩 蘇方木ハ破瘀血ノ要劑也。宿血ノ
外。他ニ於テ功アルコトナシ。陳藏器曰。

霍乱吐逆及人常嘔吐用水煎服ノ説アリ雖凡愚案スルニ此通例ノ
 義ニ非ズ彼瘀血壅滯中焦霍乱嘔吐ノ者ハ用之其他ノ霍乱吐逆
 者ハ不
使藥 同防風治中風口噤不語或乳香末方寸匕以酒
 煎蘇方木調服中風口噤不語立吐惡物瘥

毒

孕婦ハ斟酌スレシ○不兼瘀血
 血虛者○胃氣虛冷者勿用

修治

粗皮并ニ節ヲ去中心
 フ用子細ニ剉使○本

邦ノ製ニ忌火ト雖凡本綱ニ蒸饑アリ雖凡忌火ノ説ナリ南方州木
 狀云藕方樹類槐黃花黒子出丸真煎汁忌鉄器則色黯ト從此雖
 如忌鉄本綱修治ノ條ニ忌鉄ノ説ナリ

巴豆



瘡女子月閉去惡肉除膿血殺蟲魚消腫毒△此物巴蜀ノ地ヨリ出

テ形^{ナシ}菽^豆短ノ如シ故ニ名ク○巴豆ハ辛苦熱雄剛猛烈ノ氣性ヲ稟テ
 堅ヲ破リ壅ヲ通ス病屬凝積壅塞氣血未衰胃氣全者ニ非ハ勿
 用之瘰癧結聚堅積痰飲留癖ヲ破ル者ハ皆是破堅ノ功也藏府
 間ニ寒冷ヲ積積スル者ヲ治スルハ辛苦熱退寒且破堅ヲ以テリ治水腫
 者モ亦辛苦熱勝寒水陰邪ノ凝滯壅塞ヲ破通スルカ故ナリ然元例
 シテ水腫必用ノ劑トスルコト勿レ水凝寒積テ滯結ノ深固丸ニ於テ
 用之破ルニ然ト雖トモ亦胃氣未全者ハ斟酌スレシ惟宜用實腫
 不宜用虛腫注泄痢トハ深義ノ存スルコトアリ泄瀉痢疾ノ症宿積
 冷滯ノ深固ナル者或ハ用テ破之利之或ハ瀉痢久ノ有形ノ宿積積
 去ト雖凡冷滯腸胃ニ凝積ノ瀉痢不止者モ亦或ハ用之止之好古曰
 可以通腸可以止瀉ハ是ナリ有形ノ宿積腸胃ニ壅凝スル者用テ通
 利スル寒冷腸胃ニ結積ノ瀉下スル者用テ止レ實ニ通止ノ兩功病

因テコレアリ。王太僕カ謂ル太寒疑内久利。唐泄愈而復發。綿履歲手
者。法當以熱下之。則寒去利止。是也。世ニ巴豆ノ破積通腸ノ義ヲ
知テ。此ガ止利ノ理アルコトヲ知ル者。深ク此道ヲ得ル者。海藏時珍
ノ二氏ノ三。然レバ巴豆ハ猛烈雄剛。破堅刮積ノ劑タリ。久瀉ノ症。多ク
胃氣ノ傷敗ニ因ル。粗工妄用テ止ムト欲セバ。恐クハ害ヲ取ルコト甚シカラシ
コトヲ驚痛。心腹痛。疝氣ヲ治スル者モ。亦常例ニ非ズ。蓋巴豆ハ能痰積
瘀血ヲ消破シ。閉塞ヲ通利シ。壅滯ヲ解散シ。寒積ヲ燬破ス。故ニ驚痛
症。痰與血心數ニ壅積者。心腹痛ノ症。或ハ痰滯。或ハ血結。或ハ寒積ニ
因者。亦氣ノ症。寒積血凝者。皆巴豆ヲ用テ療之。然レバ此皆其滯積
堅結ノ邪深ク病甚ク。胃氣未傷者ヲ治ス。尋常ノ表ニ非ズ。耳聾喉
痺。牙痛。或ハ中風。口噤ヲ治スル者。公氣血ノ凝積。痰飲ノ留滯ヲ消
破ス。カ故テリ。然レトモ喉痺。牙痛。口噤ノ症。偏ニ熱ニ因者ハ。斟酌シ

或ハ痲熱ノ者ハ。用之。切ス。トアリト雖。凡常法ニ非ズ。耳聾久キ者
用テ效アリ。痿痺。痿弱。與麻痺。痰滯。瘀血。寒積。二因テ病久ク不愈。藥
効ヲ得難キ者。用之。積滯。痰積。血積。食積。凝滯。塊聚。瘰癧。不愈
者。用之。然トモ痰癧ノ症。多ハ胃氣ノ全カラサルニ因ル。況ヤ久瘥。於テ多
胃氣ノ虛ニ因者ナリ。積滯ト雖。凡巴豆ノ劑。不宜用。女子月閉
破瘀血。カ故テリ。虛人ハ不宜用。去惡肉。除膿血。怪症方。一切ノ惡肉ヲ
腐シ。一切ノ瘡毒ヲ解シ。陳膿血ヲ推新肉血ヲ生ス。巴豆仁炒焦シ。研テ
膏トシ。痛處惡肉ノ上ニ塗ル。或ハ乳香。末少許ヲ加ト。此亦凝積ヲ破
洩。瘀血ノ力ナリ。殺蟲。腹蟲。疥癬。癩蟲。牙蟲。一切ノ毒蟲ヲ殺ス。此蓋
巴豆ハ辛熱有毒ノ物タリ。其辛熱殺蟲散毒。以毒攻毒ノ義ナリ。故ニ
除鬼毒。蠱毒。功アリ。消腫。治下腫。惡瘡。腫。巴豆三。十粒。麻油。三。煎。黑シ。
去。巴豆。以油調。硫黃。輕粉。末。頻ニ塗テ。效アルノ義。普濟方ニ見エタリ。

總概

巴豆ハ痰積血積食積寒積等一切ノ凝滯結積ノ堅ヲ破
 右ノ積滯不消ト云コトナレ世ニ巴豆ハ推泄ノ劑ノミトスル者其甚也
 大黃ト同ク攻破ノ劑タリ大黃ノ性ハ寒ニシテ熱ニ属スルノ結ヲ破リ巴
 豆ノ性ハ熱ニ属スルノ積結ヲ破ル實ニ巴豆與大黃破滯劑堅ノ
 功ヲ同ク多ク寒熱ノ性ヲ異ニス且巴豆ノ猛烈雄剛ハ勝大黃者ナリ

使

藥

使ト 芫花ヲ

毒

孕婦ハ禁服別錄曰爛胎ト藥性論曰落胎ト
 産前ニ不可用コト見ズレ○丹溪曰胃中無寒積
 者勿用○癸卯柔脆ノ質○産後小兒老人一切虚症羸瘦ノ者○
 胃氣不全者○真陰ノ不足○陰血枯燥ノ者ハ皆禁用○熱ニ属ス
 者ハ斟酌スレ○久用多用ヲ禁ズ○章宜曰巴豆瀉五臟滌六府幾
 煎腸胃ト性ノ雄猛ナルコトヲ知スレ○脹滿ノ症或ハ大黃巴豆ノ

藥ヲ以テ攻下スコトアリト雖ドモ此皆實滿ノ者暫ク用テ治急ノ權

道ノ三法属覇非王道是ヲ以テ若下之過則土衰木愈乘之脹

加急ヲ致レ止巴豆ノ辛熱上下トヲ以テ真陰ヲ損ヒ藏府ヲ

爛ス故ニ實滿ノ者ト雖凡過用スコトヲ恐ムレ○巴豆ハ柄属實

篤者暫ク用テ攻之ノ劑也上工ノ術

トス下工ノ敢テ安ニ用テキ劑ハ非ズ

水惡翼洲

反牽牛

洗去出聖惠方錢瘡巴豆仁紅連油并泥

生絹包擦日一二三次三日痊愈經驗方

心下膜破ヲ去テ炒黒シ紙ニ裹打テ去油用之○一傳三板截木

ヲ以テ輕ク打バ皮殼破裂ス其皮殼ヲ捨テ仁ヲ取用テ煉藥研

附方

中風口喎巴豆十枚去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心暖湯一盞手心盛則須臾止

修治

堅者良腐テ藥
 虛ノ者不堪用

畏惡

畏大黃黃連蘆薈
 抵筭藜蘆薑豉冷

以テラコシ碎タギニ。雞卵紙ケイランシニ裹ツクニ上下ニ板イタヲ夾ササニ。重キオモシ石イシヲ置ツケハ。則
 油出デラ紙ニ染シル紙ヲ換カテ復タ如此コトス。ゴト數遍スニシテ。油アノ紙ニ不シ塗
 ラ度トノ用ユ。此レラ巴豆ハ霜ト号ク或ハ心膜ココロ皮カヲ去ク水ニ煮クゴト一沸ヒメ
 水ヲ換テ煮クゴト五度ト前法ノ如ク油ヲ去モ可ナリ。或ハ穀ヲ用ル者アリ
 油ヲ用ル者アリ。生ミノ用ル者アリ。數クラ水ニ調ヘ巴豆ヲ包テ燒ク者アリ。醃ニ
 煮ルコトアリ。燒テ存性用ル者アリ。○小ニ黃ナル者ラ巴豆ト名ク三稜ト黑キ
 者ラ豆ト号ク。俱ニ並ニ用ユ。○巴豆不去心作瀉膜ヲ不去胃ヲ傷ル
 生テ者ハ毒有テ猛也。炒熟則性緩能吐能下能止能行ス。浸シ
 沈香水能升能降大黃ト同ス。反テ濕人コト緩シ。○菴巴豆ノ毒中
 者ハ公氷黃連汁大五汁ヲ服解ス。○之オ曰得欠良故ニ巴豆ハ
 炒熟テ用ゴト欲ス。○九ノ巴豆ノ丸劑ハ蠟ヲ以テ裹テ行ベレ。此ラ
 蠟實蠟丸ト号ク蓋巴豆ハ毒有テ猛烈ノ劑ナリ。此ラ直ニ服スレバ速ニ

胃氣ヲ傷ルコトヲ恐ル。故ニ蠟實ノ行則納胃其氣ノ雄猛ヲ發スゴト
 不速ノ蠟ノ溶化スルニ從テ。漸ニ藥性發レテ病ヲ攻胃ヲ傷ノ害ヲ
 免ルヲ以テ也。○剛子巴豆ノ兩頭尖ル者ヲ号ク藥勢尤猛ナリ。妄用
 コトナカレ。巴豆油治中風痰厥氣厥中惡喉痺一切急病牙關閉
 ○中風或氣腦或惡毒ノ異氣ニ因テ。卒ニ牙關閉急テ人事ヲ不知
 知者。及ヒ喉痺甚ク息ヲ不通者。巴豆ヲ研爛。紙ニ包打テ油ヲ
 染拭テ紙條ト作シ火ヲ點テ吹油烟ヲ鼻中ニ薰フ。或ハ其熱烟紙條ヲ
 喉内ニ刺入則涎或ハ惡血ヲ吐出。即時ニ甦ル。或ハ故無ン舌上
 ヨリ血ヲ出ス者。舌ノ上下ヲ熏ハ自止。巴豆殺消積滯冷瀉痢脫肛
 ○殺性尤烈。輕シク用ゴト勿レ。凡バ豆有毒猛烈ノ劑病ニ適シ少ク
 暫用則神効アリ。若シ其症ニ非ズ誤リ用則人ヲ殺ス。夫レ藥ハ皆毒ヲ
 存ス。故ニ毒藥ノ稱アリ。是ヲ以テ參芪ノ等ト雖凡誤リ用則害ヲ致ス。

况ヤ巴豆太黃等ノ剛劑ニ於テヲヤ安ニ輕シク施スコト勿シ

大風子



辛熱○治大風癰疥楊梅諸瘡攻毒殺虫○木風子ハ治瘡殺蟲切毒ノ功アリト雖凡其辛熱

ヲ以テハ津ヲ燥シ血ヲ傷ルタトヒ病ニ適ノ用コト云モ服之病愈ルノ後眼ノ明ヲ失コトアリ惟用テ外ニ塗ベシ大風ノ他服藥ニ不宜用治大風ノ功尤大ナリ故ニ号木風子普濟方ニ木風子油兩苦參末兩少酒ヲ入糊ニモ梧子大ニ丸ス每服五十九空心ニ温酒ニ下ス仍以苦參煎湯洗之大風諸癩ヲ治スト云
附方 癰 疥 不痊者大風子樟腦水銀油胡桃搗テ如泥ニテ擦ハ有驗出本艸匯
修治 久クノ黃ニ油ヅク者ハ用ニ不堪新ク白者良殼ヲ去仁ヲ取テ紙ニ包テ油ヲ去用ニ大風子取油之法大風子二斤白

中ニ浸シ鍋ニ蓋シ密テ湯氣ヲ泄スコト勿レ不武不緩中道ノ火ヲ以テ湯煎ニシ流中ノ大風子黑色ニ膏ノ如クナルヲ度トス此ヲ号テ大風油トス諸藥ニ和シ用ス

桑白皮



其辛苦寒○瀉肺熱去肺中水氣下氣消痰治喘嗽水腫煩渴唾血吐血衄血崩中胸腹滿脹

勞熱癰癩利大小腸散血縫金瘡治小兒天疔驚癇脾胃下食殺藏蟲ハ桑ハ神木也其葉蠶ノ所食以葉爲貴桑ハ葉ノ形ニ象ハ故ニ木トシ加桑作字○肺ハ西方白色ノ金藏輕ク浮テ居上ニ桑根皮白色ニ輕軟ナリ故ニ手ノ太陰肺ニ入テ肺熱ヲ瀉シ肺中ノ水氣ヲ去ル此桑白皮ノ要能ナリ或問桑白皮去肺中水治水腫則猪澤等ノ功ニ相類スル者歟曰不然猪苓澤瀉等ハ淡滲通水ノ劑タリ桑白皮ハ直ニ通水ノ劑ニ非ズ蓋シ肺金ハ生水ノ源タリ且水ハ從氣行桑白

皮肺熱ヲ瀉レ氣ヲ下ス。金清ク氣降則水流自通利ス。故時珍曰。利大小腸ト。此獨水道ヲ利スルニ不止。肺熱ヲ瀉レ。氣ヲ下ストキハ大腸モ亦通利スル也。消痰湿痰熱痰。肺中ニ爵スル者ヲ消ス。冷痰者ハ不宜喘嗽。此モ亦桑白皮ノ要功ナリ。痰與熱爵肺喘嗽ヲ發シ。或ハ水氣肺中ニ衝上爵塞ノ喘嗽スル者用之。要トス。然レモ肺氣虚羸ノ者。及肺寒ニ属ノ熱火ナキ者ハ勿用。或問桑白皮ノ性寒スリ。實ニ肺ノ寒氣ニ不宜。然レモ本經補虚益氣ト。甄權曰。補不足ト。吾子何ゾ肺虚ノ喘嗽ニ不宜トスルヤ。曰。元羅天益曰。其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所以補正也。若肺虚而小便利者不宜用ト。章宜曰。古稱補氣者非若參芪之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信爲補劑而肺虚亦用之。大失桑皮之面目矣。桑白皮ハ瀉肺ノ劑ナリ。故ニ錄之。瀉白散用之爲主。古人補虚ト云者ハ。肺ハ金藏惡熱火。若金肺熱ノ爲ニ傷レ。者用之。肺熱ヲ瀉則金肺清ク。肺氣ヲ助ノ義アルヲ以テナリ。此瀉ヨリノ補ノ義アリ。直ニ正ク補ニ非ズ。本經ニ治五勞六極者モ。亦陰不足スルバ。陽有餘シ。陽有餘スル熱狂ハ肺ニ乘シ。火狂ノ元氣疲東垣曰火與元氣不離並ノ義也ノ症ヲ云。桑白皮ノ寒瀉肺熱則有餘陽火退キテ元氣ノ害ヲ免ニ取ノ。直ニ勞極ヲ補ノ理ハ非ズ。水腫桑白皮水源ヲ清シテ氣ヲ下シ。水道ヲ利スルガ故ナリ。且愚按ニ此桑根ノ皮ヲ刮取テ粗皮ヲ刮去テ裏ノ白膜ヲ用則人ノ皮裏分肉ノ間ニ行テ氣水ヲ利スルノ功アルキ者歟。然レ其性寒ナルトキハ冷ニ所属ノ水症ハ不宜。水腫ノ症肺ニ水アリ。伏熱アリテ喘嗽。小便不利者ノ主劑トス。

煩渴肺熱ヲ瀉スルガ故ナリ。唾血吐血衄血此皆肺熱ニ因者ヲ消ス。然レトモ肺氣虚羸ノ者ハ用コト勿レ。崩中ハ婦人月經不時大ニ崩漏ヲ云。胸腹滿脹肺ニ熱アリ。且ツ氣逆ニテ喘シ。水道利セス。胸滿腹脹者ヲ治

勞熱羸瘦勞症熱之羸瘦之者。兩辨アリ。元氣虛乏之然者此寒劑ヲ用ガタシ。勞熱在肺。肺氣逆鬱シテ表達ス。ト不能。羸瘦スル者。用之肺熱ヲ瀉シ。且此ガ苦モ。下氣辛散。則肺氣表ニ行テ治之。世ニ桑白皮ノ味甘ヲ以テ元氣ヲ助ト爲。脾肺虛極。要内脱ノ羸瘦勞熱スルニ用テ害ヲ致ス者アリ。詳テ施之。利大小腸。肺與大腸表裏タリ。肺ニ熱アリ。及肺氣下行。其ノ大便不利。小便難利者。俱用之。散血桑白皮ハ手ノ太陰ノ氣藥ナリ。何ゾ散血乎。蓋血ハ氣ニ從テ行。桑白皮ノ甘辛苦ハ。肺氣ヲ利ス。且肺中ノ伏鬱ノ熱ヲ清ス。肺氣行。伏熱清。則血ノ壅滯逆塞ノ者。自散行ス。レカレドモ散血ハ此ガ要能ニ非ズ。惟桑白皮膏ニ煎ジテ墜馬ノ損傷。金瘡。石癰。不作膿等ニ塗テ。能血ヲ散ノ功ヲ見ス。縫金瘡。金瘡。腸出者。腸ヲ納シ。桑白皮ヲ打ヒモ。揉柔ニシ。細ク線ニ纏テ瘡口ヲ縫。雞ノ生血ノ熱ナラ塗ハ全愈。小兒天吊

驚癩。天吊。天釣也。身ヲ縮ス。クメテ搖擗シ。目直視上視シ。魚ノ釣ニ懸ルガ如キヲ云。天吊驚癩ノ症。氣痰逆上。熱伏肺然者。用之。開胃下食。此甘辛ヲ以テ開胃下食。故ニ霍亂吐瀉ヲ治スルノ功アリ。殺藏蟲。苦辛ノ味ヲ以テリ。然トモ其キコト厚シ。寸白藏蟲ヲ去ノ功アリト雖トモ。單ニ用テ其效アルコト少シ。加藥ノ用ベシ。或問。章宜曰。因風寒而嗽者。不宜用ト。然トモ今ヤ。風寒ニ感傷ノ嗽者。發散ノ劑ニ合同シテ效アルコト不少ハ何ゾヤ。曰。章宜ガ説ハ。風寒感肺寒在肺嗽者。戒ム。今感冒ノ嗽ニ用之。效アル者ハ。風寒外ヲ閉テ。鬱熱逆肺嗽者。用之。瀉肺熱。消痰下氣。且此ガ辛味ヲ以テハ少シク散發ノ氣ヲ兼テ效アルノミ。

總概
瀉肺熱。消肺中熱。痰逐肺中。水氣下。

使藥
續斷。桂心。麻子ヲ使トス。

毒
肺寒ノ者。○肺氣ノ虛極。小便不利。水腫ノ要劑也。

スル者○小便多利ノ者皆用コト勿レ○凡ツ肺中ニ熱ナキ者ハ妄ニ用ル
 コー勿レ若肺氣ノ虚ト雖トモ熱アリ痰アル者ハ補中ニ少用テ佐トス
畏惡 鐵鉞ヲ忌○桑根ノ土上ニ
附方 消渴尿多キ者桑根
 見レ出ル者ハ勿用有毒殺人
 ノ地ニ入コト三尺ノ

者ヲ取テ。白皮ヲ剥ハク黃黑色ニ炙リヒキ對テ水ニ濃煮テ。意ニ
 任セテ飲ム。亦少シ米ヲ入テ煮ヨ塩ヲ用コト勿レ。出肘后左
修治 刀

ヲ以テ桑根ノ土ニ入者ヲ掘取ル。土上ニ見レ出ル者ハ人ヲ殺ス東ニ指
 タル嫩根ヲ良トス。其根ノ土氣ヲ洗ヒ淨レテ。日ニ晒シ乾キ極テ後。銅
 カヲ以テ其根ノ皮ヲ剥取テ。粗薄皮ヲ刮去裏ノ白皮ヲ用テ對テ
 使テ貯之。惟根皮ヲ剥置製ノ久則其功少シ○今人根ヲ掘取
 ノ時。即チ皮ヲ剥テ洗ガ故ニ其根皮ノ汁涎流去テ。藥カラ失フ。根ヲ
 掘テ未皮ヲ剥ズノ洗ヒ淨ク晒シ乾シ後皮ヲ剥トキハ其汁涎ヲ不失

藥力全トス。數カ曰。皮中涎勿去之ト。藥力尤皮中ノ汁ニ在バナリ

白皮中ノ汁。桑根ノ生者ノ白皮ヲ以テ。搗テ汁ヲ取。小兒ノ口瘡。金瘡
 ニ塗血及痛燥ヲ止。或ハ桑白皮ノ生者ヲ以テ。金瘡折傷ヲ裹バ甚
 效アリ。或ハ蟲毒ニ塗。或ハ桑ノ根枝燒テ其汁ヲ塗テ。大風疥瘡ヲ
 治シ。眉髮ヲ生ス。桑椹。其微涼○涼血補陰。止渴生精。瀉小腸熱。烏
 者尤良。利關節。血氣治。痛利水。氣消腫脹。晒乾貯宜。食飢歲○桑椹
 白黒アリ。烏者良。暴乾レ爲末。蜜ニテ丸。服ス。汁ニ搗テ飲。ハ酒毒ヲ
 解ス。酒ニ作テ腫脹ヲ治ス。○脾胃虚ビテ大便滑ク者。不宜食○小
 兒多食ハ冷心寒。桑葉。苦甘寒。大明。日家。汁塗。蟲毒煎服。除脚
 氣利。大小腸通關節。下氣止霍亂吐下腹痛煎膏服。治久風疥。血勞
 熱。效嗽。經霜不落。桑葉煎湯洗風眼。下淚。明目。服止渴洗髮長○桑
 葉爲末。捲紙燒テ烟ヲ赤眼澁痛ニ熏フ。采垂露葉焙研テ末。空心ニ

飲服之止遍身盜汗煮湯洗麻木痛風嫩葉煎酒治中風掃爛塗
 撲損桑枝苦平○利關節除諸痺痛治四肢拘攣脚氣軟軟作鈎鈎
 中風口喎桑木灸法 諸瘡久不潰不愈者乾桑木枝細切片藥作
 小把燃火吹消點灸患處惡肉柔動為度枝毒止痛內服補花藥也

廣益本艸大成卷之十二

廣益本艸大成卷之十三

洛下 法橋 岡本為竹一抱子 撰

枳實



苦酸辛寒○破結實積堅消痰癖痞滿食積瘕
 血除胸脇痛傷寒結胸上氣喘欬逐停水止泄

瘋△時珍曰枳乃木名從只諸聲枳實枳殼上世未分魏晉以來始
 分實殼用枳實與枳殼本一木之子也其功用ヲ異ニス青皮與陳
 皮義如大陳實殼功似同剛柔緩急異アリ章宜曰破積有
 雷厲風行之勢瀉痰有衝墻倒壁之威下枳實破結實積堅消痰癖
 如此故氣血弱者恐服多用胸中至高肺氣ヲ損入惟肺氣
 實結堅積者用之破之或問好古枳實主下枳殼主高枳實主血枳
 殼主氣何也曰俗枳子小者ヲ實上大者ヲ殼トスル誤也秋採者

ヲ積實トシ冬採者ヲ枳殼トス故ニ枳實ハ氣性全ヲ烈シ枳殼ハ老テ
 氣性不烈シ枳實氣性全ヲ以テ下ヲ主トシ枳殼氣性老タルヲ以テ高
 ヲ主トス且枳實枳殼ハ俱ニ破氣劑ト雖凡枳實氣性烈ヲ以テ有形
 血ヲ破ニ至有形ハ破難無形氣ハ破易枳殼氣性老不烈故不及破
 有形獨破氣積ニ然凡枳實亦破上破氣枳殼亦破下破血必シモ
 上下氣血ニ分配スルノ勿レ仲景胸痺痞滿ノ上焦ヲ治スルニ枳實ヲ
 用ニ古方痢疾秘結ノ下焦ヲ治スルニ枳殼ヲ用ニ此枳實ハ獨治下
 枳殼獨治高ニ止ル知ル枳實氣性全烈ノ以テ腸胃結積ヲ破
 三宜枳殼老氣性不烈ヲ以テ胸膈結積ヲ破ニ宜ニ惟枳實ハ破
 一烈ク枳殼ハ破一稍緩ヲ以テ主治ヲ辨ス上下氣血ノ分ナレル痞
 滿心下痞急胸滿腹脹者用之其氣血ノ結積ヲ破若其偏肺氣ノ
 結積ニ因テ胸膈痞痛者桔梗ト合ニ枳殼ニ宜ニ心下痞滿ノ肺氣史

脾血結積ニ因者白朮ト合ニ枳實ニ宜ニ東垣曰枳實去脾積血
 脾無積血則心下不痞矣食積枳實ハ脾胃一經ニ入テ破堅積積
 故能食積ヲ消ス瘀血脾經ノ瘀血ヲ破東垣曰湯古用去脾經積血
 上愚按ニ此方破瘀血者獨脾胃間ニアルニ諸經瘀血ヲ破ハ非ス
 胸脇痛中焦壅塞結積ノ肝氣鬱下逆ノ胸脇滿痛者用之中焦
 結積ヲ破則肝爵舒逆氣下テ愈傷寒結胸心下緊滿脹テ癰堅如
 石者結胸ト號此傷寒邪熱中焦ニ結積者也枳實苦寒破之主劑多
 上氣喘欬逆氣上胸中ニ結積心下痞滿ノ喘息欬者用之然凡
 氣實結積ノ候アルニ非ハ灸用一勿喘欬症兼虛者多逐停水胸腹
 間ニ邪水ヲ停積ノ胸滿腹脹息迫等ヲ患者用之其停積ヲ逐ニ或
 問然則枳實ハ通水劑ナリ曰不然枳實惟破結積劑ナリ積氣積血
 積痰積食積熱積水一切結積ニ於テ無不破故ニ水ノ溢テ腫脹者

上雖凡其水氣之凝結積實者二非久用止泄痢枳實八止瀉劑二非之
 止泄痢者何也蓋枳實能腸胃之積結ヲ破故腸胃之積結二因テ
 泄痢者用之其滯積ヲ破則不止自止此積結ノ實胃氣ノ健者ノ
 治也○或問李經長肌肉益氣ト何ヤ曰此脾胃ヲ補テ肌肉之長
 元氣ヲ益ノ義二非ス凡積結在腸胃則穀氣不能長肌膚ノ肉瘦者
 了り用枳實其積結ヲ破則穀氣運ニ充肉也其益氣ト人瀉邪者所
 以助正義也若積滯壅結ノ且止氣虛者人參白朮姜棗ノ類ト合用
 ス又曰元素謂去胃中濕熱ト何ヤ曰枳實苦寒ヲ以テ濕熱ヲ去ト
 雖凡此亦尋常ノ義二非ス濕熱ノ腸
 胃二結積凝結者用之破除スルニ
 其功尤腸胃ニ在治積實
 脹滿積熱結胸要劑也

總槩

枳實ハ氣血熱痰食水
 一切ノ積結堅滯ヲ破

使藥

厚朴ト合ノ腸胃積結ヲ破込硝
 大黃ト合ノ腸胃積熱ヲ破下蒼

毒

胃氣不足者禁服○老人小兒婦人產前
 ハ斟酌スベト○枳實ハ破積結剛劑也安

木ト合ノ腸胃濕熱
 ノ結積ヲ破除ス
 二久服過
 服スル勿

附方

積痢脫肛枳實石上磨平炙用煎
 瘰亦更瀝肛門縮則止出千金方
 愚按 潔古製枳

木丸治脾胃蓋白朮二枳實一ヲ用其立方本旨ヲ按二積結在胃
 中焦コレガ爲ニ不強者一兩ノ枳實ヲ用テ消化ス然凡枳實其積
 ヲ消耳ニ不能助胃反胃ヲ損フヲ恐故ニ白朮二兩ヲ用テ補中枳
 實ノ燥ヲ防古人處方詳一見今以此等深義ニ未達疝滿腹脹
 症ヲ見ハ安ニ枳實等剛劑ヲ用テ殺人者不少也夫疝滿腹脹症積
 結氣實者ハ實ニ宜用之若其積結アリ上雖凡真氣虛疲者或素ヨ
 リ脾胃虛弱ニ中氣之運不和故積結壅滯ノ痞脹者補中益氣ノ
 品ニ非ハ不能治之内經謂塞因塞用義也補中則升降通之益氣則

積結過之痞脹即消退。醫其虛實ヲ辨せ。例ノ安ニ枳實等剛劑ヲ用テ其虛ヲ攻則痞脹加盛也。遂ニ參朮補氣劑、雖在難效危症ヲ致ス。

修治

水ニ浸柔核藥ヲ除去テ切片曬乾再火濕テ麩ニ護之戒之。擣炒ヲ麩焦ニ至テ麩ヲ排去テ碎用。今人水浸核

穢ヲ去テ剉不晒即麩ニ炒炒ニ麩ヲ不能用者ハ誤也。○秋採者ヲ枳實トシ冬採者ヲ枳殼トス。俗ニ小者ヲ枳實トシ大者ヲ枳殼トスルハ誤也。○枳實ハ陳久者ヲ良トス。新者氣味甚烈ノ不是也。○枳實ハ色黒者ヲ良トス。綠色者ハ真ニ非ズ。枸櫞也勿用。○韓彦日近時難得枳實人多植枸櫞干籬落間收其實割乾以之相藥ト。今本邦ニモ亦作籬カラスチト呼此スナキ枸櫞也。藥店ニ此實ヲ採テ小枳實ト號真枳實ニ雜並ス。宜擇去真枳實ハ香ノ不臭枸櫞ハ臭ノ不香故呼テ臭枳トス不堪用者也。

枳殼

苦酸辛微寒。○除胸膈痰滯留結氣消胸痞脹滿腸脹癥癖。氣逐水治欬嗽嘔逆水腫宣膈泄痢裏急後重通大小腸治關節風痛皮膚痒痛麻木背膊悶倦諸氣痛腸風痔疾。○枳實枳殼俱一樹實也。所採以前後別號カチ異ニス。彼青皮與橘皮一樹子ニ所採以前後其功ノ不同義ノ如シ。前ノ枳實條ニ如辨實殼俱ニ破積結

下氣消痰劑ニ。枳實ハ烈ク枳殼ハ緩蓋殼ハ實ノ老者其氣散ノ性不猛也。實ニ對スル其行稍遲トス。大嫩者ハ其氣實ノ重シ故ニ枳實其功ヲ專腸胃老者ハ其氣緩之輕シ故ニ枳殼ハ其功胸膈肺氣皮膚關節ノ間ニ及ブ。然用枳實ハ腸胃ノ三枳殼ハ胸膈ニ止ニ非ズ。惟其功專者ヲ舉ニ云トス。枳實ハ腸胃枳殼ハ胸膈劑トスル也。詳ニ前ノ枳實條ニ見タリ胸膈痰滯留結氣枳殼ハ能胸痰ヲ除胸中肺氣ノ結ヲ破故ニ元素日多用損胸中至高之氣胸痞脹滿腸脹此亦前ノ枳實ノ

治スル所^ノ同^ニ但^{シテ}胸痞腹脹腸脹症其積結^ノ重者ハ枳實ヲ用^フ積結^ノ輕者ハ枳殼ヲ用^フ且^{シテ}枳實ハ氣血^ノ兩積ヲ兼破^ル枳殼ハ血積ヲ破^ルニ至^ス故^ニ痞脹症胸膈^ノ滿重^ノ氣積^ニ屬者ハ枳殼ニ宜^ハ心下^ノ臍腹^ノ滿重^ノ血積ヲ兼者ハ枳實ヲ主^{トス}然^レ凡^レ肺氣胃氣^ノ不健者ハ實殼俱^ニ斟酌ス^ヘ〔癥瘕〕癥瘕^ハ氣血^ノ積結也此亦實殼俱^ニ主^ニ惟^{シテ}其積結^ノ輕^ニ與^テ重積^{アル}所^ノ胸^ノ與^テ腹^ノ部位^ニ從^テ實殼ヲ分^カ用^フ下^ノ氣逐^ル水治^ル欬嘔逆^ノ水腫^ノ噎膈^ノ枳實ハ足^ニ陽明胃足^ニ太陰脾經^ニ行^ク枳殼ハ手^ノ太陰肺^ノ手陽明大腸經^ノ氣分^ノ藥也^ニ能^ク胸膈^ノ結氣ヲ下^テ治^ル欬嘔嘔吐^反胃^{噎膈}霍亂^皆此^ノ至^高ノ結氣ヲ下^テ故^也逐^ル水治^ル水腫者^前ノ積實^逐水^治水腫^義同^レ然^レ凡^レ枳實ハ能^ク水氣^ノ凝積ヲ破^ル者也枳殼ハ胸中^ニ至高^ノ氣ヲ利^テ逐^ル水^故水氣^ノ凝結者ハ枳實ニ宜^ハ水氣^ノ胸中^ニ逆結者ハ枳殼ニ宜^ハ或^ハ問^ク香附^{桔梗}能^ク下^ル氣^{枳殼}下^ル氣^同

カ否^ヤ曰^ク不同^也香附ハ逆^ノ氣ヲ散^下ス桔梗ハ能^ク升^テ濁^ノ氣ヲ下^ス枳殼ハ胸膈^ノ結氣ヲ破^ル下^ニ泄痢^重急^後重^治泄痢^者モ亦^前ノ枳實^義同^レ夫^重急^後重^者ニ^焦氣^壅結^ノ不利^故也枳殼ハ能^ク胸中^ノ氣^ノ結ヲ利^ス肺^ハ氣^ノ注^大腸^ノ本^{タリ}肺^ノ氣^利ス^レニ^焦氣^利ス^レ大腸^ノ氣^和ノ^後重^自除^是以^テ痢病^裏急^後重^者ノ^主劑^トス^河間^謂治^血便^膿自^愈利^氣後^重自^愈是^也通^大小^腸前^ノ枳實^條ト^義相^同大^柴枳實^與枳殼^其功^相同^但勢^ノ烈^下不^烈ト^別ノ^三且^實ハ^腸胃^ヲ利^スル^ニ宜^殼ハ^胸膈^ヲ利^スル^ニ宜^トス^此ヲ^以テ^實殼^ノ治^ヲ辨^論ス^ヘ〔治關節風痛皮膚痺痛麻木〕枳殼^苦ヤ^疎酸^ヤ深^ニ透^辛ヤ^散ス^故二^風熱^濕熱^ノ關節^ニ壅^滯ノ^疼痛^者ヲ^通利^ス又^枳殼^ハ手^ノ太^陰肺^經氣^分藥^ニ兼^テ足^陽明^胃經^ニ入^肺ハ^皮膚^ヲ主^胃ハ^肌肉^ヲ主^故皮^肉ノ^風熱^壅滯^ノ痺^痛麻木^ヲ致^者ヲ^治ス^然凡^レ此^等ハ^枳殼^要

能ニ非ス背膊悶倦氣壅上背膊悶痛倦急者用之其壅逆氣ヲ
 行ス諸氣痛氣滯ニ因テ諸痛ヲ致者用之尤胸中氣痛背痛肩痛
 ヲ治ス腸風痔疾枳殼手太陰肺藥肺與大腸表裏タリ枳殼利肺
 氣清肺熱則大腸肝門自清利ノ腸風痔疾愈然正虛寒者ハ不宜
 用

總藥

枳殼ハ胸中至高ノ氣ヲ下シ又大腸ヲ利レ能上
 中焦ノ氣結ヲ破氣結痰壅ヲ利スルノ要劑ナリ

使

藥

桔梗ト合テ消胸痞白朮ヲ佐ト安胎甘州ト同
 瘦胎黃連ト合テ治痔肉桂ト同テ治右脇痛

毒

氣虛者禁

用○胎前產後勿安用○氣血怯弱者
 ハ斟酌スヘシ○久服過服則損肺氣

附方

順氣止痢枳殼二
 錢甘草六錢為末每

用沸湯服一錢出嬰童百問○若導
 脚氣上方用木瓜湯服出直指方

愚按

枳實枳殼大槩其功同
 但枳實ハ烈ク枳殼

ハ輕ニ故ニ虛中ノ結積ヲ兼者補中ニ攻ヲ兼テ治セント欲者ハ枳
 殼ヲ佐トノ行之二宜ノ實ヤ殼ヤ惟結積ノ輕重ニ從テ用之苟結積
 アルニ非ハ勿用之古方瘦胎飲一方アリテ難産ノ主藥トシ枳殼
 兩ヲ以ス此蓋氣分ノ結積壅滯ノ不行故ニ胎産不安者ヲ療ス
 今ハ其虛實ヲ辨スルヲナクニ用之及テ害ヲ致者アリ夫婦人胎
 産道ハ全氣血ノ培養ニ從ニ枳殼ハ破氣劑也氣ノ壅滯實積ニ
 非ハ安施用則正氣破テ血モ亦損シ氣血疲不足養胎加産難ノ
 患ヲ致ス或問參蘇飲敗毒散ニ枳殼ヲ用者ハ何ヤ曰此三亦行氣
 下氣用取肺ハ主皮毛風寒邪客皮毛則胸中肺氣コガ爲ニ壅結ス
 故ニ欬痰ヲ致シ胸背痞急ス枳殼ヲ用テ其壅結ヲ行則欬痰消
 シ胸背通緩ス且胸肺氣行則紫蘇羌活等ノ發散劑モ亦能解表
 功ヲ盛ニス蓋裏氣不行則表氣モ亦解ガタリ枳殼ノ裏氣ヲ行ハ即

表ヲ解スルノ助

修治

製法、枳實ト同シ陳久者ヲ良トス。水ニ浸柔穢核ヲ去テ切片晒乾復少蒸テ麩ニ拌炒黒メ。

枳殼者多甚誤也。殼殼音相近勿誤。

山



苦寒。○瀉火退熱清血治面赤。赤癩紫癩目赤熱痛心煩懊懣不得眠黃疸淋疾消渴厥心痛。

厥頭痛諸血症勞熱疝氣瘰癧折傷湯火瘡。○山梔色赤黃殼輕ノ空也。故殼ハ肺ニ入。

仁ハ心ニ入且殼仁俱ニ中焦ニ入。血分ニ行是以肺熱心熱胃熱血熱ヲ清ス。且經絡及大小腸曲屈熱ヲ清蓋山梔子ヲ碎捻則黃色添手洗

之黃色皮理ニ透達ノ去ラ致難。此透達氣ヲ以テ。經絡及大小腸ノ曲屈隱伏ノ火熱ヲ除丹溪謂濕痞塊中火邪トハ透達ニ氣アルヲ以テ

リ。又曰其性屈曲下行能降火從小便中泄去トハ山梔子直ニ小便ヲ利スルニ非ト雖也。梔子能肺熱ヲ清則氣化ノ膀胱津液通ス蓋金肺

ハ水ノ源氣ノ母ニ膀胱ノ水ハ氣ニ化セラレテ通利故也。或濟下ノ血熱血滯ニ因テ小便不利者用之通利ス。治面赤赤癩紫癩目赤熱痛者ハ

皆血熱ヲ清故也。酒釀鼻ハ屬血熱梔子能治之。心煩懊懣不得眠者ハ肺心ノ熱タレ也。酸棗仁ノ治不眠ト不同彼ハ胆虛ヲ主トス此ハ心

熱ヲ主トス。詳ニ辨スベシ。黃疸脾胃ノ濕熱ニ屬ス濕熱如生薑花梔子苦寒中焦濕熱ヲ去テ小便ヲ利也。淋疾清肺熱氣化ノ小便ヲ利也。

然凡熱ニ屬セサル者ハ勿用。冷淋症禁用。消渴肺心胃及大小腸熱ヲ除テニ焦火ヲ瀉也。厥心痛厥頭痛熱厥心肺部痛レ肺心熱厥

頭痛者用之熱厥ヲ涼下ス。諸血症血得寒止得熱妄行ス。因血熱吐血衄血下血血痢血淋等者皆用之。然凡實熱ノ血症ニ非ハ勿用。

又用テ久ク勿レ。血症用之久則寒傷血反テ瘀血愈アリ。勞熱勞症ノ初血熱ノ其虛未太者用之清血熱降火既勞極上成テ虚太者ハ雖熱苦寒劑輕用テ勿レ。而氣清血熱行結氣故也。蓋厄子獨瀉火清血熱耳ニ非ス。味苦ヲ以テ氣分ノ結縛ヲ行解ス。此ガ小便ヲ利スルモ氣ヲ行ヲ兼テ也。瘡腫諸瘡腫ハ屬火及血熱也。然瘡腫未潰者用テ清熱既潰テ瘡口未斂者ハ勿用。古人謂既潰之後毫厘寒藥不可用是也。折傷跌僕一切腫痛厄子對浸水白麪同拌塗甚效。出集簡方湯火瘡厄子末雞子清ニ和シ濃塗出救急。此皆除熱清血功ヨリ致者ナリ。

總槩 厄子ハ苦寒。心肺胃及大小腸經經曲屈隱伏ノ熱ヲ去ル血熱ヲ涼ニ良トス。且苦勝濕寒勝熱主除濕熱。血症ト雖厄實熱者ニ非ハ勿用。陽氣虚冷者胃寒毒疔不宜用。久服過服則凝血損陽詳ニレテ用之。

附方

酒毒下血若山厄子仁焙末新汲水服一錢出
聖惠方血不止厄子煨灰吹鼻出易簡方

修治

七稜 九稜

者希ナリト雖厄藥ニ用ニ此ヲ宜トス。赤色ヲ新不腐不黑不舊者ヲ用テ頭尾ヲ切去。剉テ能燥透上焦中焦瘡ニハ殼俱ニ用テ下焦劑ニハ去殼用仁洗テ黃水一片ヲ去炒血病ニ炒黑ス心胸中熱ニ七仁ヲ生テ用テ肌表ニ殼ヲ生テ用。大抵通用ニ殼仁俱ニ剉テ炒透ス。或甘艸水ニ浸一宿焙テアリ。家園者ハ不宜。山野自然生者ヲ良トス。今藥店ニ藥山厄子者ハ舊腐テ色不善ヲ用。色善者ハ漆物ニ用新ノ色赤尤善コレヲ求テ用藥紅花ノ如モ藥物ニハ惡花ヲ用漆物ニ善花ヲ用。自擇取テ藥家ニ任ルテ勿レ。經人思ニ藥物ニハ不善ヲ用テ他ノ無用ノ物ニ善ヲ以スルテ多シ。嘆スベレトス。

山茱萸



酸鹹辛溫○補腎氣滋精興陽事煖腰膝止小便
多利逐寒濕痺止月水不定出汗治疝瘕鼻塞耳

鳴耳聾明目△宗爽曰未審何緣命此名也○山茱萸味酸入肝

臟入腎肝腎ヲ温補ス仲景八味丸用之者亦下焦ヲ温補センコトヲ

欲也且酸ハ收澁ノ不泄者也故此酸温ヲ以ハ補陽助精血精滑ニ

妄ニ泄及婦人月水亂泄者老人虛人小便安利ノ不節者皆用之

止一ハ其酸味收澁功ヲ以ナリ興陽事煖腰膝逐寒濕痺者ハ肝腎ヲ温

補ノ筋骨ヲ温養レ藥性温能勝寒濕也○而氣ハ寒濕ヲ肝腎ニ屬

即尤山茱萸ノ所治也○癥瘕ハ血氣ノ結聚タル何ソ此酸收澁ヲ以テ治

之乎蓋山茱萸ハ酸鹹ニ少辛性全温ナリ此酸鹹ヲ以テ陰分ニ入

其辛温ヲ以テ血結ヲ劫開ス然レ癥瘕症獨山茱萸ノ主治スル所非

ス破結積癥一合用スベシ鼻塞耳鳴耳聾ハ下焦虛冷ノ陽氣ノ升達

セザルガ故也○山茱萸ヲ用テ温補肝腎則陽氣自升達セ七竅通利也

山茱萸ノ主治スル所萬端ト雖レ惟肝腎ヲ温補スルニ止レ然レ此

出汗者ハ何ヤ蓋發散ニ非ス凡汗ハ津ニ生スト雖レ陽温ニ化セテ

出者也若肝腎ノ氣虛下焦ノ陽氣温氣力ナク汗出ザル者ハ用

之補下陽則皮膚津汗ヲ温蒸シ汗出ルコト明目下焦ノ温

陽補精故也虚寒ノ眼疾ニ用之實熱ノ眼病ニハ用テ勿

ク使トス人乳蒸熟地黃人參麥門牛膝

煎藥ト同ノ精氣不足ノ頭腦骨痛ヲ治ス

之黃蘗

ト合同ス

取肉斤破故紙酒浸焙牛當歸四兩麝香一錢爲末煉蜜丸梧子六枚

臨臥鹽酒下益元陽固元陰壯元神延年續嗣至藥也出扶壽方

畏惡

山茱萸去核用核ハ反テ腎精ヲ滑泄ス○桔梗防風防己ヲ惡ム

附方

神還丹山茱萸酒浸

使藥

實

毒

腎膀胱結熱者ハ勿用若不得已用

修

治 藥店ニ實山茱萸者未去核者也此ヲ求テ其新味善ヲ擇リ
 枝ヲ去リ酒ニ浸柔テ核ヲ去リ劉緩火ニ炒乾用少モ核ヲ雜用
 勿レ藥店ニ去核者アリ此山茱萸ノ舊ノ味ヲ失タルヲ梅醋ニ味
 ツクル者也必勿用

郁李仁



辛甘苦酸平○下氣利小便治水腫臍下急痛
 破血潤燥治大腸氣滯秘結破癖消食得酒去

膽結治目張不瞋者研和龍腦點赤眼△此カ花實香郁ニ樹ハ如
 季故號○郁李仁ハ降下下氣利水要劑也故水腫腹大面目四肢
 浮腫ヲ治シ關格不通ヲ療ノ効劑ナリ臍下急痛メ水道不通者或
 腰臍間ニ膿熱ヲ結者俱ニ用之導泄ス此カ辛苦味ヲ以テ結血ヲ破
 テ治ス癰癤氣結又其甘潤苦泄ヲ以テ大腸氣滯テ大便燥澀ノ不通
 者ヲ治ス且辛平開苦ハ疎テ消食ノ功アリ凡郁李仁足大陰脾經氣

分擊ニ下氣ヲ要トス利小便亦下氣ヨリ致者也又足陽明胃
 手陽明大腸ノ結氣ヲ利ス故ニ大小便不通症結氣ニ屬者用之得酒
 去胆結ト此味酸ノ胆肝ニ入ト雖ハ酸收ヲ以テ速ニ結氣ヲ去ニ難シ
 故得酒能結ヲ解下速也夫目系ハ胆肝ニ連若人驚恐ノ氣結胆橫
 不下故ニ目張不得瞋者郁李仁酒者飲テ醉シム覺ニ及テ愈者ハ
 隨酒速ニ結去胆橫下テ目能瞋ス此錢氏傳也酒性雄猛胆モ亦雄
 猛氣府多ノ同類求テ酒ハ入胆郁李得酒入胆トモ亦速也此古人使
 藥詳一見レ由テ愚按ニ以郁李仁欲破結氣者ハ此ヲ酒製スニ可エラン

毒

津液澀者○大便滑利小便多利者勿用○郁李甘潤雖
 下利ニ過則津液衰燥ス此惟急則用テ治標義也下多山

附方

腫滿息急不得臥者郁李仁合 搗末和
 修治 本綱
 製法

飛存 意

以湯浸桑皮ヲ去取仁去尖及雙仁者ヲ除生蜜二浸一宿ノ除
乾カキ研カキ如膏用ト本州准二日晒乾ト此義可也愚按二欲破結氣
者生蜜浸晒乾復酒浸潤テ用シ○本邦人其儘炒テ中仁ヲ用打テ
如巴豆去油使此製法何書ニ存スルヤ未審トス

五加皮



辛苦温○順氣化痰行血養精神肝腎堅筋骨
明目去風寒濕逐瘀血治疝氣腹痛痿痺陰痿

囊濕小便餘瀝カキ女人陰痒腰脊痛脚足疼痺四肢痿弱中風骨痺△
此樹五葉交加者根皮ヲ以テ良トス故號○肝腎二經藥ナリ陽氣ヲ
順ニ痰結ヲ化シ精血ヲ行ス肝藏血腎藏精肝亦發生陽氣ヲ出腎
亦元陽ノ氣ヲ生ス凡肝腎ヲ補ニ於テ兩辨ヲ存ス直ニ精血ヲ益テ
補者アル肝腎ノ陽氣ヲ温テ其精血ヲ補者アリ地黃芍藥ノ如ハ益
精血補肝腎以加皮補肝腎者直ニ精血ヲ補ニハ非ス肝腎ノ陽氣ヲ

温養ノ精血ヲ補益ス譬氷ノ解テ潤満ガ如ク痰結ヲ化スルノ義亦倣
之或問然則氣ヲ補ト不云何順スト云ヤ日本經益氣ト云ト雖思
按ニ甘温辛甘温者ハ實ニ氣ヲ補益スレ此ガ氣味辛苦温也以温養
氣以辛苦行氣強補ト云ヘカラス故惟順ト云順字中ニ於テ行ト補ト
ノ義ヲ存ス堅筋骨肝主筋腎主骨故也明目目ハ肝藏ニ精血ノ
注處也然凡精血中得温陽氣化目能物ヲ視故五加皮ノ精血ヲ温
潤スルヲ以テ明目義アリ去風寒濕辛温ヲ以テ風寒濕ノ經絡筋
骨間ニ結滯者ヲ驅逐逐瘀血瘀血ノ經絡筋骨ニ在者ハ破除シ
皮肌ニ在者ハ破散スカキ血氣寒濕ヲ温散シ氣血行故也腹痛或瘀血
或結氣或寒濕ニ痛ヲ治ス痿痺補精血温下焦逐寒温行瘀血
故也陰痿囊濕小便餘瀝女人陰痒下焦虚冷ノ氣血不順則男莖
痿弱陰囊濕熱小便餘瀝女人陰戸中痒ヲ致ス故五加皮温下順

氣血則愈。腰脊痛。腰脊八腎主之。或寒濕。或瘀血滯。腰脊或或氣虛冷。痛者俱用之。脚足疼痛。去風寒濕。逐瘀血。故也。大抵脚足病多屬寒濕。五加皮辛溫。去寒濕。故二脚足病之治。主之。四肢緩弱。溫潤精血。行氣血。堅筋骨。故也。中風骨變。五加皮辛溫。逐筋骨寒。行血氣。故中風四肢骨節。攣急。治之。或問五加皮補精血。逐風寒。濕功。皆筋骨二在。肌表二於。八功。ナキ者。歟。曰辛溫能行肌膚。故甄權曰。主多年瘀血在皮膚。且能肌表風寒濕。固結。散之。然此肝腎劑。多。肝腎八主筋骨。故其功筋骨二專。ナリ。又肌膚二於。モ其功ナキ。ニハ。

總彙 溫補肝腎。養精血。堅筋骨。逐風寒。濕固結。要劑也。故本非不。經謂治小兒二歲不能行。別錄謂補虛羸。久服輕身。神效。大雖若過情。亦此。

使藥 遠志。治使上入。酒。得。良。牛膝。木瓜。黃蘗。麥門。生地。菖蒲。石斛。虎膠。骨。山藥。功。ナリ。ト。ハ。云。ヘ。カ。ス。

上同。濕熱。痿痺。腰以下不能動者。治之。續斷。杜仲。牛膝。山茱巴戟。破故紙。上同。腎虛。寒濕。客。腰痛者。治之。

畏惡 女參。蛇。皮。之。惡。

附方 五加皮酒。五加皮以水煎。汁和。糯米。作酒。時時飲之。或加遠志。頭也。或五加皮煮酒飲。亦良。治風濕。痿痺。壯筋骨。順氣。化痰。補精。髓。延年。益。老。凡風病。飲酒。雖。生。痰。火。惟。此。五加皮酒。八數。五。之。飲。凡。無。害。有。益。三。請。浸。藥。酒。子。リ。ト。雖。凡。惟。五加皮。與。酒。能。相。合。且。味。亦。甘。美。者。ナリ。

修治 五葉。四葉者。根。ヲ。取。テ。皮。ヲ。剝。米。泔。ニ。土。氣。ヲ。洗。麤。皮。ヲ。コ。ソ。ゲ。去。テ。剝。少。焙。用。或。酒。洗。燈。葉。作。蔬。食。去。皮。膚。風。濕。

地骨皮 甘淡苦寒。去下焦肝腎虛熱。降肺中伏火。治骨蒸消渴。在表無定風邪。吐血傳尸。齒血。金瘡。

△此枸杞根皮也。其根長。地下。行。故。地。骨。名。アリ。地。骨。皮。ハ。性。寒。



地骨皮

本草綱目

十一

肝腎二入テ熱ヲ瀉ト雖其氣味甘淡ニシテ戰ニ苦寒ナラス故肝腎虛熱ヲ去ニ宜トス世人肝腎熱症ヲ見ハ黃柏知母ヲ用テ地骨皮ノ虛熱ヲ去ニ殊功アリヲ知者ナシ黃柏知母ハ單ニ苦寒ノ實火者用テ瀉スベシ虛熱者ニ至ハ地骨皮ノ甘淡苦寒ニ非ハ治之ノ害アリ時珍深此ニ達シ地骨皮ノ去虛熱妙ルヲ論セリ降肺中伏火トハ此下焦肝腎虛熱升テ肺中ニ伏者ヲ云肺ハ氣ヲ主肺中伏火アリテ且上焦元氣不全者本連等ノ苦寒ヲ用則火ヲ瀉ト雖反テ其不足ヲ損地骨皮ノ甘淡苦寒ヲ用テ治之火ヲ降テ其元氣ヲ伐ノ害ヲ免骨蒸勞症腎虛ノ熱熱骨髓如蒸者用之有汗骨蒸尤宜蒸瀉ヲ主トスルカ故也且骨蒸ノニナラス肝腎虛ノ肌熱者モ亦其ノ消瀉去肝腎熱降肺火故也

在表無定風邪無定トハ不定所云肝東方風木藏タル肝熱旺ナルハ風自内ニ生ノ行表外感ノ風邪ニ非ス地骨皮ヲ

用テ肝熱ヲ瀉則火退テ風自息者也吐血肝腎虛熱肺中伏火ヲ去血熱ヲ涼故也傳尸此能肝腎虛熱ヲ去故ニ勞瘵傳尸病ヲ治

齒血齒縫ヨリ血ヲ出者地骨皮ヲ煎ノ嗽或蟲牙ニ醋煎ノ嗽金瘡治金瘡外科ニ用テ神效アリ男子下疳ニ未ノ搽婦人陰腫ニ煎ノ湯其外諸瘡疔惡瘡ヲ治スル外科ニ用ユ○按ニ本州益精氣トハ地骨皮ハ腎虛熱ヲ去熱退則精安ヲ以ナリ堅筋骨トハ肝腎虛熱ヲ去則筋骨自安ニ取ノ三

總槩 去肝腎虛熱降肺中伏火治勞熱骨蒸消渴要劑也且因肝腎虛熱致腰痛赤目小便血口舌

使藥 青蒿ヲ佐トシ退熱ニ功アリ

毒 肝腎虛寒者勿用○雖去虛熱脾肺元氣大不足者補氣劑ト

合用 **附方** 地仙散骨蒸勞熱一切虛煩大病後煩熱ヲ治地骨皮 二防風 一甘草炙 半每貼五錢 生姜五片 水煎服 出清

生 **修治** 米泔水ニテ土氣ヲ洗去心皮ヲ剝取甘草煎湯ニ浸一宿
方 劉焯乾テ用○本邦人或云鉄器ヲ忌上本州ニ此言ナ
シ然カ否ヤ

枸杞子

甘潤平○補精潤肺助氣堅筋骨補虛勞興陽事治消渴
益乾效嗽明目制火輕身耐老△枸杞二樹ノ名也此
木形枸杞二樹象アリ故名○枸杞子ハ甘潤性平也故不能瀉熱火
止能腎精ヲ補氣ヲ助肺ヲ潤テ虛羸ヲ補ノ要劑也時珍曰此乃
平補之藥也藥性不寒不熱平補ノ良劑多或問吾子謂不能瀉熱
火ト然ニ何制火ト云ヤ曰不能退熱トハ時珍言也制火トハ章宜說
也枸杞ハ不寒不熱平補劑タレ雖不能瀉熱火此能補精則水生
ノ制火ノ義ナレト云ヤ王氷謂盛水主制
陽光効是ニナリ章宜實ニ此理ヲ得タリ

使藥

地黄五味麥門地骨
皮青蒿鼈甲牛膝

上同ノ虛勞内熱或寒熱者ヲ治天門百部枇杷葉ヲ加テ陰
虛肺熱ノ咳嗽ヲ治若脾胃弱者山藥蓮肉車前茯苓ト同

方

枸杞酒生枸杞子五搗碎絹袋盛好酒一斗中ニ浸密封勿泄
氣二七日服勿醉補虛去勞熱長肌肉益顏色肥健人治肝虛

下 淚出外
臺秘要

修治

紅潤圓ノ微長味甘粒小二核少者良枝梗ヲ去洗淨
ノ酒ニ浸一宿ノ搗爛ノ用粒大二色黧者不潔用

○和産枸杞子多ハ粒大味苦此止利大小腸除心熱不可用補劑

枸杞葉

苦甘涼○去上焦心肺客熱除胸煩去皮
膚骨節間風熱消熱毒散瘡腫明目止渴

蔓荆子



苦辛温○治頭目痛利關節療濕痺筋骨痠痛
堅齒長髮治乳癰△古刑杖ニ以荆故字从刑其

蔓蔓生ス故名○陽明胃厥陰肝風熱ヲ散ス能上行ノ頭目風熱ヲ逐

頭痛連目腦鳴目眩。目赤痛。目昏皆風熱二屬者ヲ治。關節風熱ヲ逐テ筋骨拘攣ヲ治。散肝風療癩癧風熱客陽明經。牙齒動搖腫痛ヲ治。蔓荊子。熊脂等分醋調塗髮長黑。乳癰初起蔓荊子煨末酒服。一七渣傳蔓荊子八上行ノ頭目風熱ヲ散スルノ要劑ナリ。

毒

頭目痛ト雖厄不因風邪屬血虛有災者勿用。○胃虛者服之主痰疾。

畏惡

烏頭石 膏ヲ惡

修治

毒ヲ去 布袋ニ

入テ揉テ白膜ヲ去。打破用或蒂膜ヲ去テ酒浸蒸テアリ。

茯苓



甘淡平。○利小便除濕益脾胃導氣治水腫淋瀝痰飲泄瀉腹脹煩滿。效逆嘔逆消渴。解腸逆。

鎮心下結痛好睡者長陰益氣安胎。△茯苓舊作伏靈松ノ神靈氣伏結ノ成故號。○茯苓性浮テ升陽也。其功降テ下陰也。此陽中陰手太陰肺足太陽膀胱氣分藥也。味甘淡。ニ水道ヲ利ス。內經曰飲入胃遊溢精氣上輸於肺通調水道下輸膀胱。上飲水入胃即膀胱

ニ行ニ非ズ。胃ヨリ出テ輸肺肺ヨリ下テ流膀胱故茯苓ノ浮升ニ從テ水精輸肺其淡滲ニ從テ水氣降膀胱小便ヲ利スルノ功アリ。或問茯苓ハ利小便要劑也。然ニ何東垣好古謂小便多能止之上スルヤ。曰東垣好古謂多トハ頻數義也。凡小便多利症虛實ニ辨アリ。肺ニ實熱盛ニ膀胱氣化コガ爲ニ不和ノ小便頻多者ハ茯苓ノ淡滲ヲ以テ肺熱ヲ導肺氣ヲ利シ。水道ヲ通ノ小便調彼肺虛心虛及清湯瀉虛ノ小便多利者ハ甘溫補氣升陽劑ヲ用。茯苓等ノ淡滲藥ノ治スル所ニ非ズ。又問茯苓利小便則津液ヲ燥ト。元素謂益燥然元素東垣亦謂生津液丹溪謂陰虛者不宜用。義皆相反スルニ似ハ何ヤ。曰茯苓利小便除濕則實ニ此燥劑陰虛者ニ難用。然生津液ト云所以者ハ益肺金ハ氣ノ母水ノ源也。茯苓淡滲ト雖厄其性浮テ上行シ。

肺氣ヲ利ス。氣化ノ津液行故本經治口焦舌乾養了。生津液大行
 津液意也。除濕益脾胃。此亦茯苓之要能也。茯苓甘淡能滲濕脾
 胃屬土惡濕用之除濕則脾胃氣自全。得益土堅則濕泥不土
 聚則濕泥生入故二補脾胃六君子湯等二用之除濕去則參朮補氣
 ノ力盛也。然二東垣補中益氣湯ニ不用之何ヤ。夫益氣湯ハ胃氣不
 足。清陽下陷症ヲ治ス故升麻柴胡ノ升提ヲ以ス。此ニ茯苓淡滲
 降下ヲ用則其升提ヲサメタケシヲ恐レ三導氣淡滲降下ノ導氣水
 腫淋瀝痰飲泄瀉腹脹利小便故水腫及小便淋瀝ヲ治除濕故
 痰飲ヲ治ス。利小便則穀道堅ノ泄瀉止。治腹脹者亦利小便除濕
 也。煩滿欬逆嘔逆茯苓澤升テ降則胸膈利。逆氣下行。治煩滿欬
 逆嘔逆且煩滿欬逆嘔逆屬痰濕者尤宜之。別錄曰。調劑房甄權曰
 開胃李杲曰導氣上煩滿欬逆嘔逆ヲ治スベキヲ知ベシ消渴中焦濕

熱ヲ本トシ消渴者用之。胸膈逆氣心下結痛此皆利小便導氣故逆
 降上氣利愈。好睡者濕在脾胃中氣倦故三睡者用之。長陰好古云
 伏腎邪上茯苓利小便瀉陰邪去邪則正自長不ノ義也。然直補陰
 者ト覺ベカラス。元素曰多服則損人。胃丹溪曰陰虛者恐未宜上
 惟陰邪ノ爲ニ正陰不長者用テ邪ヲ瀉之長正ノ義。問仲景八味丸ハ
 補陰兼補陽者也。何茯苓ヲ用ヤ。曰此腎膀胱ノ陰邪ヲ伐テ正陰ヲ助
 瀉陰助陽義也。夫腎真陽真陰俱不足則陰邪自下焦ニ留ス。因此真
 陰真陽彌不足。故茯苓澤瀉ヲ用テ瀉陰邪。真陰陽ヲ補助トス。
 陰邪上邪水之云。丹溪曰八味丸用之者去胸中久陳積垢爲搬運
 之功。爾上益氣茯苓益心脾氣者也。益茯苓瀉陰邪除濕者也。陰邪
 去則心陽氣伸濕去則脾氣行故益心脾氣功アリ。直此カ補ニ非ス。
 然元素曰淡爲陽之天。是以氣虛大ニ膠理疎ニ汗自出カ如ニ至

ハ勿用之蓋茯苓甘ト雖后淡滲也。淡滲ハ氣ヲ泄シメ疑久且膜理汗空
 之疎利ス故元素曰汗多人服之亦損元氣天人爲其淡而滲トハ是也
 東垣謂茯苓甘ハ以助陽好古曰雖利小便而不走氣ト此兩説ハ其
 甘味アルヲ以テ平ト雖后茯苓甘ヤ淡ノ性トス故彼猪苓澤瀉等ノ滲
 泄ノ如キ非ト雖后其淡ヲ以テ遂ニハ氣ヲ泄シムニ惟氣虛ノ甚者ハ
 斟酌スヘシ或問吾子ガ言ノ如クハ補氣ハ君子湯ニ何ゾ茯苓アルヤ
 曰六君子湯ハ中焦ノ補劑也用之去脾濕且茯苓ハ氣泄ノ義ナキニ
 非ト雖后此ヲ人參白朮甘草ノ補氣補中劑ニ合同則茯苓惟脾濕
 ラ去耳ニハ氣泄ノ力ヲ致シ不能也凡瀉藥ト雖后補藥群聚中ニ合
 ハ其瀉力ヲ恣ニスル不能補藥ト雖后瀉藥群聚中ニ合ハ補力ヲ致
 難故藥ニ定性アリト雖后衆藥ニ合ハ其本性ヲ盡シ不能且氣性功
 力爲他藥奪テ已ガ本性力ヲ變スルコトヲ學者必一隅ニ拘泥スル

勿レ安胎能氣ヲ導痰ヲ去ガ故ニ此
 切アリト雖后茯苓ノ要能ニハ非ス

總要

利小便除濕健脾導氣
 要劑也人參白朮ト合

補中氣甘草ト
 合メ不致燥

使藥

馬腹ヲ使トス白朮ト合ノ能燥脾濕中氣
 甘艸防風芍藥紫石英麥門冬ト合ノ五藏ヲ

療毒

多用則損人目ノ小便多利者ハ汗多者皆勿用ノ陽氣
 瀉ノ升麻柴胡ノ升提ニ宜者ハ禁用ノ陰虛燥潤者ハ斟酌

スレ畏惡

茯苓ノ赤筋ヲ用テ勿レ誤服積蠱子蠱瘡皆目ヲレム白銀
 ヲ惡ト牡蠣地榆雄黃秦艽龜甲ヲ畏メ醋及一切酸物ヲ忌

附方

龍液膏堅實白茯苓去皮焙研清酒流浸浮者ハ茯苓筋
 也去之復焙乾瓷瓶内ニ入好蜜二和勻銅釜内ニ重湯ニ蒸

炭煮一日取出收之空心白湯下二三七解

愚按

茯苓ハ木道ヲ通
 利不雖后猪苓

煩躁渴一切下部疾皆可除出積善堂方

澤瀉等ノ性功上不同猪澤等ハ直ニ下焦水部ヲ通要劑也茯苓ハ性升
功降入故ニ水ヲ上肺ヨリ逐テ膀胱ヲ利入内經謂遊溢精氣上輸于
胞通調水道下輸膀胱之功也

修治

白色ニ堅實者良多細取テ
片碎ニ於ニ乾透サスノ時故腐

學者猪澤功ト混同スル勿レ
テ赤色ヲ帶不堪用製法去皮赤筋ヲ除割テ水浸ニ浮者ハ茯苓節
也去之沉者ノミヲ用テ日ニ乾焙使不夫筋損入且○茯苓ニ抱蕨根

者リ此蕨地ヨリ細取者也此亦茯苓ナリ其地今ハ松林ナレト雖用
上古松林ニリテ人伐枯テ松餘氣地下ニ結テ今日此ヲ得者ナリ或

誤テ謂茯苓ハ獨松氣ノミナス蕨根亦結ニ成ト甚非ナリ

赤茯苓

甘淡平○通水道除濕滲熱破氣結血結治水腫泄瀉淋
病積癥○茯苓赤白俱通水其功大際不異惟白者利水

導氣氣性緩和也故補中劑ニモ兼用赤者通水破氣血結滯氣性

疾速也故ニ水道通利ノ五苓散ニ赤茯苓ヲ用補中四六君子ニ白

茯苓ヲ佐トス○弘景曰茯苓白色者補赤色者利元素曰茯苓赤

瀉白補ト然用白茯苓ト雖用直補益劑ト致難赤者ニ對則補ト云

ベキニ赤茯苓ハ通水氣血ノ結ヲ破瀉濕熱ノ三他於テ其功ノ長不

ルナレ○上古ニ赤白ノ別ナレ中古以來

分別ノ用彼芍藥分赤白養ノ類ナリ

勿用○補中劑兼用欲除濕者白茯苓ニ宜赤茯苓ハ反テ補劑ノ

害トナレ○泄瀉水穀分利ニ於ハ赤茯苓ニ宜白者ハ功力ニ不足ア

リ○他ハ皆白茯苓

畏惡

白茯苓
ト相同

附方

治痔漏神方赤茯苓去皮
沒藥各二破故紙四石臼

搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日ノ蒸熟曬乾爲末

酒糊丸梧子大每服酒用二十九漸至五十九出集驗方

愚按

白茯苓與赤茯苓氣味性功相同惟白茯苓性功八緩和也赤茯苓性功八疾也白茯苓所治功能疾ヲラシク欲セハ赤茯苓ヲ用ニ脾胃ノ助トナスニ於八獨

修治 白茯苓ヲ製ト同皮及筋ヲ去剉水ニ浮者ヲ除焙使藥店ニ白茯苓ノ腐テ赤色ニ變者ヲ以テ赤茯苓トス氣性ヲ失テ不堪入藥宜擇用

茯神

甘平○定心志治眩運健忘止驚悸怔忡多患辟不祥治心下滿痛○茯神モ茯苓ト一種也茯苓ハ松ノ津氣ノ溢者下結テ成者也茯神ハ松ノ津氣ノ厚者下テ松根ヲ抱テ凝結者也此其根ヲ抱則依附ノ義アリ故心志魂體ノ浮亂者ヲ定收セシムルニ所治功皆因定神魂也神魂定收則何眩運健忘驚悸怔忡ノ患ヲ且治心下滿痛者モ心志ノ浮テ不定故ニ胸氣亂テ然ラ療ス又開心益氣養精神補虛乏ノ義アルモ皆心志ヲ安スルニ因テナリ或問

定心志ニハ茯神利水道ニハ茯苓ニ止マ曰茯苓モ亦微ハ心氣ヲ定ベシ茯神モ亦微ハ水道ヲ利スキ也故甄權曰茯神人虛而小腸不利者加而用之上然凡此カ要能トスルニ

畏惡 茯苓ト同

附方 朱雀

於ハ茯苓ハ利水茯神ハ定心劑スシ

氣不定恍惚健忘ヲ治ス茯神ニ沉香牛末

修治 茯苓ノ抱木者煉蜜丸赤豆大食後人參湯服出白一選方也抱松根者良

廠及他木ヲ抱者ハ不可白皮堅實ヲ良トス皮上所抱木一ヲ去テ剉水浮者ヲ除焙使神木此茯神所抱木也風寒冷濕在經脉筋骨攣痛牽縮者ヲ治シ中風偏枯口面喎斜不語心驚健忘ヲ療ス○神木ニ乳香二錢石器研末每服二錢木瓜酒下名松節散治風毒攣痛

脚氣難起者神木一名八黃松節○神木ハ鐵器ヲ忌石器ニ碎用畏惡茯苓上同

茯苓皮

治水腫。膚脹開水道。開腠理。○即茯苓皮也。故能皮膚
走之。膚表ノ水ヲ逐ニ宜シ。○上古赤白及茯苓神木茯苓
皮ヲ不別中古以來別テ功用ヲ異ニス。茯苓八別錄ニ始テ出之

猪苓



味甘平。○利小便。除濕。治水腫。腹滿。淋病。白濁。
帶下。脚氣。口渴。懊惱。開腠理。△其地黑。猪屎ノ

如。此木ノ餘氣土底ニ零落ノ成者。故名。苓ハ零ノ義也。○猪苓ハ腎
膀胱ニ入テ利小便。要劑也。主治皆通小便。除濕。ヨリ致ス。口渴懊惱ヲ
治者。通水則氣下熱泄力故也。小便淋瀝ノ腹滿痛。及婦人妊娠小便
澀腫者。猪苓。或子。治スルニ宜シ。或問時珍。謂猪苓。淡滲氣升。而又能
降。故能開腠理。利小便。與茯苓同功。但人補藥。不如茯苓也。上。然吾
子前謂茯苓。水ヲ肺ヨリ逐テ輸膀胱。猪苓。直ニ通水道。不同。上。恐
誤。似ニ似ル。請詳辨之。曰。諸淡滲通水劑ハ皆一升テ降ニ因ナリ。然上

茯苓ハ升ヲ性トメ降ヲ功トス。猪苓澤瀉ハ升ヲ性也。降ヲ功也。是以

茯苓ハ利水功緩和也。猪苓ハ通水勢疾ナリ。故直通膀胱。上云猪苓ハ

黑實。膀胱水底ニ連ル邪水ヲ逐ベシ。澤瀉ハ水面浮溢ノ邪水ヲ

去ベシ。八味丸ニ茯苓。澤瀉ヲ用。猪苓ヲ所以不用者モ亦此水裏

ニ連ル水底ノ邪水ヲ逐ラ恐テ也。蓋猪苓ヲ用テ水底ノ邪水ヲ逐

則反テ眞水ノ不足ヲ恐。故惟澤瀉ヲ用。テ水面ノ浮濁邪水一片ヲ

逐ル。大抵邪水ノ胸中ニ滯者。茯苓。小腹ニ滯者。猪苓。澤瀉ノ主

治スル所ナリ。本州ニ與茯苓同功ト云者ハ一物惟利水ヲ以テナリ。其利

水功ノ輕重ナク。等ト云ハ非ス。故入補藥不

如。茯苓ト。此猪苓ノ利水ヲノ烈ヲ見ベシ。

澤瀉ヲ佐トシ。陽分ノ水腫ヲ治ス。白芍。生地。桑寄生。桑白皮。

茯苓。琥珀。石斛。薏苡仁。肉桂ヲ佐トシ。陰分ノ水腫ヲ治ス。

使藥

白芍。白茯苓。人參。陳皮。白朮。

毒

陰虛

燥潤者勿用、小便多利者○陽氣虛者○腎弱者○無濕證者忌用○久服多服則損腎陰昏耳目

畏惡 鐵器

附方

本神二附方アリト雖凡皆單服劑常
人ノ施ヘキニ非ズ故今畧シテ不述

修治

皮黑肉白ノ眞者良鐵器忌

テ銅刀ヲ以テ粗皮ヲ去米泔ニ浸フ一宿ノ剉晒乾用磨者ハ擇去
ベレ或蒸晒テ用テ了リト雖凡利水劑ニ通用スルハ皆生ラ使時珍曰猪
苓取其行濕生用更佳

竹葉



甘寒○涼心胃熱治胸中痰熱煩悶逆上氣
吐血嘔吐消渴熱在中風失音不語驚悸驚癩

頭痛頭旋△竹ハ其形ヲ象シ字ニ作○竹葉ハ足陽明胃手少陰心
手太陰肺ノ熱ヲ涼肺氣ノ逆上ヲ降ス蓋竹ノ枝葉ヲ生スル中半以上
ニ在テ中半以下ハ生スル希也故ニ用人上焦及中焦ニ於テ功アリ

且竹葉ノ生スル下垂テ不舉故ニ逆氣ヲ降ノ功アリ治欬逆吐血嘔
吐消渴熱狂者モ皆胃熱ヲ涼胸中心肺ノ熱痰ヲ清シ逆氣ヲ降ガ
故也中風失音不語ハ熱痰鬱胸中者タリ故用之胸中ノ熱痰ヲ
除也小兒驚風大人癲癩ハ痰熱閉心竅症也驚悸ハ痰熱鬱胸中
却心氣故也皆用之胸中ノ痰熱ヲ涼治頭痛頭旋者ハ此モ亦痰
熱ノ逆厥ニ屬スルノ症ヲ療ス或問元素曰益元氣緩脾トハ何ヤ曰竹
葉ハ涼熱劑ト雖凡苦寒者ニ非ズ味甘ノ寒トス苦寒者ハ元氣ヲ損
易レ竹葉性寒ニ雖涼熱味甘故ニ強テ元氣ヲ損ノ害ナキヲ以テ益
元氣ト云益トハ惟不損義也補益ノ理アルニ非ズ且緩脾トハ竹葉ノ
甘寒涼胃熱緩脾急義也又問然則內傷氣虛熱症盡用ベキ者歟曰
甘ハ陰陽俱ニ補ベシ然凡虛甚者ノ如ハ此性寒ナル恐ハ陽氣
ヲ害スル義ナクニ非ズ學者味甘ニ抱テ妄ニ過用スルヲ勿レ

總

槩

胸中心肺ノ煩熱痰熱及胃熱ヲ除逆氣ヲ降ス。陰虛熱邪胸中ニ鬱者ヲ涼ニ尤モ宜トス

毒

心肝氣虛甚者○胃

虛ノ世利者俱勿用○

修治

淡竹ノ生葉ヲ取テ拭淨シ頭尾ノ尖ヲ切去其儘用○竹類甚多其

久服過用ハ斟酌スベシ
箏ノ味甘淡者ヲ良トス淡竹箏ノ味甘淡也竹葉竹茹竹瀝ニ用皆

淡竹ヲ以スベシ苦竹ハ味燥辣ニ不宜用藥○本編艸部ニ淡竹葉

ト名者アリ利小便治喉痺功ニ方書ニ淡竹葉トアルニ於テ直ニ

竹葉ヲ云者アリ草部ノ淡竹葉ヲ云者アリ其公方劑ノ治功ニ從テ

辨之誤ヲ勿

竹茹

甘微寒○治嘔吐血崩血腫血衄血肺痿五痔腫傷寒勞復小兒癩熱婦人胎動○竹茹功大槩竹葉ト同ノ以異也

陽明胃熱ヲ解火ヲ降肌熱ヲ除壅熱ヲ通シ血熱ヲ涼ス蓋竹

茹ハ生竹ノ外青皮一片ヲ去テ次ノ第二層ノ青膜皮ヲ用則此中

尖ヲ守人身ニ於ハ肌肉分血脉流行位タリ故胃熱肌熱血熱ヲ涼

ス且竹皮ヲ剝ニ安シ瀝著セス故ニ能熱邪ノ壅滯ヲ利ス治嘔吐

者ハ解胃熱也治吐血崩血衄血者ハ涼血熱降火也治肺痿咳嗽

五痔腫腸者ハ利壅熱亦降火也傷寒餘熱未除ニ男女交合ノ男

子ハ陰囊腫股痛身寒熱婦人ハ熱衝胸手足搐搦拘急者此勞復

症タリ治之者血熱胃熱ヲ解故也治小兒癩熱者モ屬陽明熱症

ヲ療ス收胎動者ハ涼血熱也又陽明ノ壅熱ニ因テ狂症ヲ致者ヲ

治ス大抵竹葉ハ涼上焦竹茹ハ涼中焦各其氣位ニ從餘ハ做之知ベシ

毒 胃虛胃寒者○胃熱ナキ者皆勿用 **修治**

淡竹ノ生者ヲ切取節ヲ除テ外ノ青皮一片ヲ薄コソケ去テ又ノ

薄青膜一片コソケ用第二層ノ白黃肉ハ勿用淡竹根除煩熱解

丹石毒發熱渴者服消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇同菓煎湯
洗婦人產後子宮下脫

竹瀝

甘滑寒○除陰虛熱燥治風痰在胸中及經絡四肢皮裏膜
外者止煩悶消渴癲在治中風失音不語風痙傷寒勞復胎
產金瘡口禁血虛自汗欬嗽肺痿○竹瀝ハ即竹ノ液汁味甘氣性
寒滑也故陰虛熱燥ヲ治スルノ要劑トス且此津汁流利滑通ス故ニ
空竅間隙ニ走テ痰熱ヲ逐又此竹ノ皮裏膜肉ノ間ヨリ瀝出ノ液
タルヲ以テ人ノ經絡四肢皮裏膜外ニ達メ其風痰ノ壅塞ヲ宜通ス
風痰ト外來ノ風ニハ非ス陰虛ノ燥熱レ燥熱自風ヲ生レ痰ヲ致者ヲ
云竹瀝甘寒滑除陰虛燥熱故ニ此風痰ヲ治メ類中風家要藥ト又
手太陰肺經ニ入胸中ノ痰熱煩悶消渴ヲ治ス癲與在此亦風痰ノ
胸部ニ壅ヲ以テリ又陰虛ノ燥燥ヨリ熱ヲ生レ熱ヨリ風痰ヲ生メ失

音不語者用之其燥熱ヲ清レ壅ヲ流則風自退又婦人產後及金瘡
家血虛燥熱ノ風痰ヲ生レ口噤身直手足反張者尤宜之或胎動或
胎中胸煩者亦用之丹溪曰產後不礙胎前不損子ト血虛燥熱
者ハ産前産後ヲ不忌ノ用然凡久服過服ハ毒積スヘ風痙症多ハ血
虛ノ燥熱レ自風痰ヲ生スレ因傷寒餘熱未解形ヲ動レ腎ヲ勞病
復生者ハ勞復症トス此モ亦陰虛燥熱ニ屬ス血虛ノ自汗者ハ熱
乘陰者ナリ欬嗽久不止顔面痿黃名肺痿此亦陰虛ノ燥熱痰前
中症ナリ以上諸症皆陰虛燥熱レ熱痰鬱胸中及經筋者也竹瀝ハ
陰虛ノ燥熱熱痰ヲ涼レ胸中及經筋ノ間隙ニ達メ熱痰ノ爵瘥ヲ
除ノ要劑也丹溪曰陰虛之病無不用之又曰竹瀝味甘性緩能除
陰虛之有大熱者雷斅曰久渴心煩宜投竹瀝時珍曰竹瀝性寒而
滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

以宣通痰在經絡四肢者。屈曲而搜剔滌藏府之煩熱。又曰竹瀝即竹液。猶人身之血也。以上數者。皆此竹瀝之要能也。學者從之。引之。其主治。辨之。丹溪曰。竹瀝滑痰。非助以姜汁。不能行。蓋竹瀝性滑。之痰。流。雖。味。甘。甘。味。者。八。難。運。故。姜。汁。之。辛。溫。以。之。此。甘。滑。之。開。通。走。行。也。且。竹。瀝。性。寒。也。姜。汁。之。溫。性。以。之。制。之。反。佐。因。用。之。養。之。存。之。或。問。竹。瀝。性。寒。也。虛。症。之。於。八。不。宜。用。者。歟。曰。竹。瀝。之。製。之。法。火。以。之。炙。取。故。大。寒。之。不。宜。且。姜。汁。之。辛。溫。以。之。反。佐。則。單。之。寒。之。純。之。不。宜。此。之。味。甘。與。性。滑。以。之。以。之。八。虛。熱。之。治。之。宜。之。得。之。性。寒。之。拘。之。深。恐。之。勿。尤。陰。虛。熱。之。涼。之。宜。然。之。氣。虛。胃。虛。者。八。對。酌。之。安。之。輕。用。之。勿。之。寒。本。氣。虛。不。助。者。也。

使藥 姜汁ヲ得サレバ

毒 痰濕痰食積痰者皆勿用○熱ナキハ禁用○久服過用

不 宜 修治 淡竹ノ生者ヲ切去節或四或兩ニ劈開磚ヲ兩左右ニ立

ヲ磁器ニ承入テ用大低竹瀝一盃ニ生姜汁一匕ヲ加テ法上ス此蒙筌ノ度也○竹瀝ヲ用ニ餘藥ヲ煎ノ服之時ニ至テ調入用

荊瀝 甘平○去心悶煩熱頭風頭眩目眩心頭澹澹欲吐卒失音止消渴治小兒心熱驚癇除風熱導痰涎開經絡行血氣解

熱劑命人不睡△荊字義ハ蔓荊條ニ見タリ○此荊ヲ炙タル瀝汁其功ハ大低竹瀝ト同此亦姜汁ヲ佐トシ能行不凝滯或問竹瀝荊瀝ニ汁功ヲ同ノ別ナキ者歟曰ニ汗俱胸中熱ヲ除風痰ヲ去ノ要劑ト雖在。各其用ヲ別ニス。丹溪曰。氣虛不能食者。用竹瀝。氣實能食者。用荊瀝。延年秘錄曰。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝。愚按。荊實別錄。苦溫。時珍曰。辛溫。壯荊葉別錄。苦寒。壯荊根別錄。甘平。時珍

本草綱目卷之二十一 竹瀝 荊瀝

曰苦微辛温苦能降辛温能散降則化痰散則祛風故風痰之病宜
之牡荊莖ノ氣味未記荊瀝時珍曰氣平味甘化痰去風爲妙藥上
由テ考ニ荊瀝氣味甘ノ微苦辛寒者也竹瀝ハ甘滑ニ寒者也蓋
牡荊ノ實葉根ノ氣味上荊ノ瀝汁所治功トヲ以テ通考スバ甘ノ微
苦辛寒者也此微苦辛味ヲ兼ニ非ハ去風功ヲ致シ不能彼除風熱
開經絡行血氣者辛ハ散苦ハ推ヲ兼也然則荊瀝ハ散推ノ義ヲ含
テ治心胃煩熱風熱風痰者也竹瀝ハ甘淡滑寒ニテ治心胃煩熱風
痰者也故丹溪謂氣虛不能食者用竹瀝上荊瀝ニ散推義ヲ含テ
其氣虛ヲ重虚セシメテ思テ也氣實能食者用荊瀝上荊瀝ハ散
推義ヲ含則氣實者ニ非ハ不宜用之示セリ氣虛與氣實俱胃ヲ主
ト云不能食者ハ胃虚熱能食者胃實熱タレ也又涼熱功竹瀝ヲ勝
ト去風功荊瀝ヲ勝トス涼熱功ハ反テ竹瀝ニ不及延年秘錄熱多

用竹瀝寒多用荊瀝上荊熱功ハ竹瀝ヲ勝トス荊瀝ノ劣ニ云荊瀝
甘辛苦寒劑タリ何寒ヲ温ノ理アラシヤ秘錄云寒ハ熱ノ少ヲ指者
乎或謂秘錄謂寒ハ舊風字ナルベシ寒ハ傳瀉誤ト此亦可也或問
荊瀝ハ風痰熱ノ妙藥トス此六淫ノ風邪客症歟曰不然熱火ニ因
テ藏府中ヨリ所生風也曰然ハ前ノ竹瀝ニ所謂同者乎曰同ノ少
異アリ竹瀝所治風熱風痰ハ熱燥ハ勝テ風ハ輕レ故竹瀝ノ甘淡滑寒ニ
風愈荊瀝所治風熱風痰ハ風ハ勝テ熱燥ハ輕レ故甘苦辛寒ノ荊
瀝ヲ用テ風ヲ散レ痰ヲ推熱ヲ解入吾子謂荊瀝ニ散推義ヲ含トハ
恐ハ新說ニ似タリ詳ニ其據ヲ示ハ可ナラシ曰外臺秘要赤白下痢五
六年者荊瀝每日服五合肘后方治目中卒痛燒荊木取黃汁點之
深師方治濕癩瘡癬荊木燒取汁日塗之ト此等治皆甘寒取ヲ致
シ不能苦辛散推義アルヲ以テ癩熱ヲ開熱痛ヲ利レ腫瘡ヲ散ス

學者深察之詳ニ考

テ愚言ヲ詳ニ勿レ

使藥

姜汁ヲ得テ
其功ヲ盛ニス

毒

氣虛不能食者○
胃虛者○中風無

熱者ハ

畏惡

石膏

附方

喉痺喉瘡腫ニ荊瀝細細嚙之出千金
真此心胃ノ熱及風痰ノ實ニ屬者ニ用ノ

法也通

修治

荊瀝ヲ取ノ法ハ竹瀝ノ製ト同シ新ニ生牡荊ヲ採一尺
餘ニ截テ磚ヲ兩左右ニ並立テ荊ヲ架以火灸之兩

切ロヨリ瀝汁ヲ磁器ニ承盛或ハ荊木ヲ二四寸長ニ截束テ瓶ノ中ニ

入又ハ一ノ瓶ヲ以テ口ヲ合同ノ糠火ノ中ニ煨シ燒バ汁瀝テ瓶ノ中ニ下

タス此亦妙法也凡荊瀝一椀ヲ用バ姜汁一七ヲ加テ可也○諸家

本州ニ牡荊ヲ説ク亂雜ノ不正圖經説ヲ得タリトス圖經曰牡荊俗名

黃荊是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如蓖麻更疎瘦花紅作穗實細

而黃如麻子大或云即小荊也

天竹黃

甘寒○治小兒驚風天中風痰癰失音不語癰疾△南
海ノ天竹ノ内ニ所生ノ如黄土者ナリ故名○天竹黃ハ心

經ヲ涼心氣ヲ鎮風熱ヲ去痰癰ヲ豁テ小兒驚風癰熱ノ要藥ト

他ニ於テ用フ希也竹黃ハ大竹ノ津氣結聚テ成其氣味勿用大藥

竹瀝ト同氣性和緩ニテ小兒家ニ宜小兒驚風與大人癰癩症治相

同俱心熱ニ屬シ心氣不鎮風痰心胸ニ壅塞者也故竹黃主之天

弔ハ天鈞也小兒壯熱ノ眼ヲ翻手足搐掣手ノ魚ノ鈞ニ上カ如シ此亦

痰熱ノ心胸ニ壅者也故竹黃治之又小兒心氣痰熱ニ劫シテ客

忤者ヲ治ス章宜日除小

毒

驚癇症無熱者勿用○
久用ハ寒中ノ害アリ

附方

治小兒驚

熱天竹黃

雄黃牽牛末

研勻麩糊

修治

其儘用○清ヨリ
來者多ハ偽者也

丸粟米大每服五丸薄荷湯下錢乙方

厚始曰今人多燒諸骨及蛤蚧等雜之ト云類也或本邦藥店ニ竹
外ノ節間ニ所粘著黃粉ヲ甜聚テ竹黃トス此亦誤也大竹ノ内ニ
竹津自然ニ結成ノ黃土ノ如ク竹内ニ著テ片ヲ成者ヲ以テ肥
ス碧色者ハ中品黒色者ハ下品不堪用也

廣益本州大成卷之十三終

