

醫方類聚卷之八

五藏門 五

聖惠方 二

治脾實瀉脾諸方



夫脾實則生熱熱則陽氣盛陽氣盛則心胃
煩悶脣口乾焦身熱頰疼體重不能轉側語
聲沉而心急咽喉痛而不利舌本腫強口內
生瘡腹脇脹滿不得安卧夢見歌樂四肢怠
墮診其脉緊實者是脾實之候

治脾實胃中滿悶腹脇壅脹身熱頰疼咽喉不利宜服瀉脾大黃散方

川大黃微炒兩剉赤茯苓三分○聖濟總錄去黑皮枳殼

半兩麩炒甘草一分炙黃芩一分○總錄去黑心陳

橘皮半兩湯浸麥門冬○一兩去心半夏兩

湯洗七徧去前胡半兩去

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分○總錄入生薑煎至六分○總錄七分

去滓不計時候溫服

治脾貫熱頭痛胃滿腹脇壅滯不思飲食宜

服瀉脾赤茯苓散方

赤茯苓三分○聖濟總錄去黑皮旋復花半兩川大黃兩

剉碎石膏一兩○桑根白皮三分赤芍藥

微炒枳殼三分麩炒前胡半兩去甘草半兩炙微

赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分○總錄入生薑煎至六分○總錄七分

去滓不計時候溫服

治脾藏壅實口内生瘡食少心煩宜服瀉脾升麻散方

川升麻一兩羚羊角屑一兩茯苓一兩聖濟

黃連一兩柴胡一兩黃芩三錢去木

門冬一兩去心焙大青三分甘草半兩炙

右件藥細剉和勻每服三錢以水一中盞

煎至六分總錄去滓食後溫服忌炙煨熱

麵

治脾實熱頭痛脇滿煩悶或渴唇口乾燥宜

服石膏散方

石膏一兩聖濟總錄麥門冬一兩半去心柴胡

一兩犀角屑一兩菰蘆根一兩地骨皮一兩葛根

半兩總錄甘草半兩炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服三錢水一中盞入

竹葉二七片煎至六分總錄去滓入蜜半

合生地黃汁一合總錄攪令勻食後分溫

二服總錄更煎兩沸食後溫服

治脾氣實四肢不利頭重目疼腹脇妨悶心

膈壅滯少思飲食宜服前胡散方

前胡一兩去蘆頭大腹皮三分到○聖赤芍藥

半兩赤茯苓錄去黑皮桔梗半兩去蘆頭○

羊角屑兩半旋復花兩半枳殼半兩去蘆頭甘草

半兩炙赤○錄無

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半分棗三枚總錄生薑一枚棗大煎至

六分總錄七分去滓不計時候溫服

治脾氣實心腹壅滯四肢疼悶兩脇脹滿大

小便不利宜服羚羊角丸方○聖濟總錄治

暈暈口甘內熱中滿

羚羊角屑一兩○枳殼一兩麩炒川大黃

一兩木通一兩大麻人一兩赤茯苓半兩

微炒檳榔一兩○桑根白皮一兩前胡半兩

去蘆頭

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三二百杵

為丸如梧桐子大每食前總錄不以溫水

下二十九

治脾藏壅實心胃煩悶唇口乾燥渴水不止
宜服麥門冬煎方○聖濟總錄治脾痺內熱
煩渴

生麥門冬汁半升生地黃汁半升蜜半斤○總

菰蘆根二兩地骨皮一兩黃耆一兩葳蕤一兩知

母一兩寒水石二兩○總犀角屑一兩川升麻

兩甘草半兩○總石膏二兩○總淡竹葉一兩

○總錄切

右件藥菰蘆根等擣篩為散先以水七升

煎取三升濾去滓入麥門冬汁等三味內

鍋中慢火熬如稀餈以瓷合盛不計時候

溫服一合總錄每服一匙溫湯化下不拘時

治脾氣不足諸方

夫脾受水穀之精化為氣血養於藏腑充於

肌膚若其氣不榮則不能與胃行其津液周

養身形致體重懈墮四肢不舉腹脇虛脹胃

滿咽乾不能嗜食縱食欲嘔水穀不化洩利

腸鳴則是脾氣不足之候也

治脾氣不足腹脇脹滿四肢無力少思飲食
宜服黃耆散方

黃耆剉一兩附子一兩炮裂去皮臍訶黎勒一兩半

人參一兩白朮一兩五味子兩半白茯苓兩

丁香半兩枳實半兩麩炒

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍

熱服忌生冷油膩濕麵

治脾氣不足心腹脹滿不欲飲食若食則氣

滯體重四肢無力宜服白朮散方

白朮兩一訶黎勒二兩煨用皮丁香三分人參一分

頭草三分黃耆三分附子三分沉香三分

白茯苓三分葶澄茄兩一麥蘖三分橘皮三分

木香三分枳實半兩甘草一分

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時

候溫服忌生冷油膩濕麵

候溫服忌生冷油膩濕麵

治脾氣不足心腹脹痛喜噫吞酸食則欲嘔
四肢少力宜服厚朴散方

厚朴一兩去龜皮塗生肉桂一兩去當歸

半兩到人參半兩去丁香半兩白朮半兩白豆

蔻半兩去皮吳茱萸一分湯浸七訶梨勒煨用

皮高良薑半兩陳橘皮半兩湯浸去

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入
生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時
候溫服忌生冷油膩濕麵粘食

治脾氣不足四肢不和腹脇脹滿或時下利

飲食難消宜服訶梨勒散方

訶梨勒三分煨人參一兩去當歸三分到

白朮三分乾薑半兩炮桂心三分草薹三分薤三分

甘草半兩炙厚朴一兩半去龜皮塗吳茱

萸半兩湯浸七陳橘皮三分湯浸

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服之

治脾氣不足體重胃滿腹脇虛脹食少無力

水穀不消或時自利宜服白荳蔻丸方

白荳蔻一兩去皮訶梨勒二兩煨用皮黃耆一兩剉沉

香附子一兩去皮炮裂白木一兩人參一兩去

肉桂一兩半去麤皮木香一兩枳實一兩炒微黃厚朴二

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗細羅為末以酒煮麵糊和丸如

梧桐子大每服以溫酒下三十九空心及

晚食前服忌生冷油膩黏食

治脾藏中風諸方

夫脾氣虛弱肌肉不實則腠理開疎風邪乘

虛入於足太陰之經則令身體怠惰多汗惡

風舌本強直言語謇澀口面喎僻肌膚不仁

腹脹心煩翁翁發熱神思如醉手足不能動

播診其脉浮緩者是脾中風之候也

治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胃膈煩悶

智意恍惚身體沉重宜服防風散方

防風三分去麻黃三分去人參三分去芎

藟三分去附子三分去炮裂桂心三分羚羊角三分

黃耆三分 赤茯苓三分 酸棗人三分 白朮三分
獨活三分 甘草半兩 桑根白皮三分
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治脾藏中風語音沉濁舌強不能轉身重拘

急四肢不舉宜服麻黃散方

麻黃一兩 石膏一兩 赤茯苓三分 獨活三分
秦艽三分 細辛三分 芎藭三分 防風三分

去蘆 桂心三分 乾薑半兩 炮 白朮三分 人參三分
去蘆 漢防已三分 附子三分 炮 裂 杏仁湯浸
去皮尖 雙人 甘草半兩 炙
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治脾藏中風胃膈痰涎言語不利翕翕發熱

智意昏濁宜服獨活背方

獨活一兩 扶神三分 防風三分 去 羚羊角屑三分
附子三分 炮 裂 人參三分 去 前胡三分 去

沙參三分去蘆頭 旋復花三分 黃耆三分 半夏三分
湯洗七甘草半兩炙 偏去滑微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治脾藏中風語澀四肢難舉智意不安心膈
煩熱頭目昏悶宜服赤茯苓散方

赤茯苓三分 犀角屑三分 羌活三分 麥門冬三分
蔓荆子三分 石膏二兩 甘菊花三分 人參三分 蘆頭三分

黃耆三分 防風三分 羚羊角屑三分 遠志三分

三分 前胡三分 蘆頭去 枳殼三分 炒三分 甘草半兩
去心 炙微 赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治脾藏中風四肢不舉心胃痰滯言語蹇澀
頭痛煩熱咽喉不利宜服羚羊角散方

羚羊角屑兩 茯神兩 羌活兩 薏苡人兩

參一兩去蘆頭 麥門冬一兩去心 旋復花一兩 前胡一兩
去蘆頭半兩炙 甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治脾藏中風肉熱肌痺淫淫如蟲行或膝埋開汗大洩皮膚肉色不澤唇鼻黃色宜服細辛散方

細辛一兩 枳實半兩 防風一兩 石膏二兩
白朮一兩 麻黃二兩 附子一兩 桂心一兩
根二兩 去皮 炙裂

兩甘草半兩 微赤判

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌生冷油膩黏滑猪鷄肉

治脾藏中風心腹煩壅頭面微腫冷汗出宜服七聖散方

天麻一兩 枳殼一兩 芎藭半兩 白蒺藜半兩
微炒去刺 川大黃半兩 地骨皮半兩 薏苡人三分
右件藥搗細羅為散不計時候用溫水調

下二錢忌生冷油膩猪鷄肉

治脾藏中風口面偏斜語澀虛煩手臂腰脚

不遂宜服羚羊角丸方

羚羊角屑三分漢防已三分白芍藥三分檳榔兩半

人參半兩去去白茯苓三分薏苡人兩獨活三分

芎藭兩桂心兩附子一兩炮裂防風三分

頭栢子人兩酸棗人三分當歸半兩剉熟熟

乾地黄兩麥門冬三分焙法杏仁三分湯浸雙

人麩炒
微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒
下三十九忌猪鷄肉黏滑物

治脾藏中風身體怠墮四肢緩弱惡風頭疼
舌本強直言語謇澀皮膚頑痺宜服天麻丸

方

天麻兩獨活兩人參二分去去防風二分去去

附子一兩炮裂裂桂心一兩麻黃一兩去去細辛

三當歸三分剉剉白朮三分羚羊角屑三分薏苡

人三分 乾嗽三分 牛膝三分 芎藭三分 茯神三分

牛黃一分 天南星三分 朱砂半兩 龍

腦一分 烏蛇肉一兩 麝香一分 白殭

蠶三分 微炒 麝香一分 白殭

右件藥擣細羅為末入研了藥更同研令

勻鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每

服以溫酒下十九加至十五丸不計時候

服

治脾藏風壅多涎諸方

夫脾受水穀之精化為氣血以養藏腑溉灌
身形若其氣虛弱則氣血不榮肌肉踈洩風
邪乘之於經絡致陰陽不和中膈壅滯痰飲
積聚伏留脾間故令多涎也

治脾藏風壅氣滯多涎胃膈滿悶不下飲食
宜服前胡散方

前胡一兩 去半 夏半兩 湯洗枳殼 炒微

去旋復花 兩赤茯苓 兩甘草 兩大腹

皮一兩 桔梗一兩 去麥門冬 去心

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服忌生冷油膩濕麵飴糖

治脾藏風壅多涎心胃不利頭目昏重旋復
花散方

旋復花半兩細辛半兩前胡三分去蘆頭赤茯苓兩

半夏七兩湯洗去滑犀角屑兩防風半兩去蘆頭枳

殼半兩麩炒去麩檳榔兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服忌生冷油膩黏食飴糠

治脾藏風壅痰滯睡即多涎頭目胃膈不利
宜服半夏散方

半夏半兩湯洗去滑旋覆花兩防風三分去蘆頭赤

茯苓三分前胡三分去去桑根白皮三分麥門

冬三分枳實半兩麩炒甘草半兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治脾藏風壅心膈痰滯多吐稠涎不能下食
宜服赤茯苓散方

赤茯苓

三分

旋覆花

三分

枳殼

一兩麩炒

三分甘草

半兩炙

蔓荆子

三分

桔梗

三子去

羊角屑

三分

白蒺藜

三分微

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分量至六分去滓以計時候溫

服

治脾藏風壅語澀多涎宜服牛黃丸方

牛黃

一分

白附子

一兩裂

天竹黃

一兩細研

一兩犀角屑

三分

鈆霜

半兩細研

右件藥擣羅為末都研令勻鍊蜜和擣白

餘杵丸如梧桐子大每用不計時候以竹

瀝下七丸

治脾藏風壅胃膈氣滯痰涎煩悶神思昏濁

宜服前胡丸方

前胡

一兩去

蘆頭

旋復花

半兩

檳榔

一兩

川大黃

一兩

類聚

十一

頁八

五

牛蒡子一兩 皂莢三分去皮塗酥炙令焦黃去子 殼一兩 赤茯苓一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以荆芥薄荷

湯下二十九

治脾藏風壅咽喉內涎唾如膠心胃妨悶語

聲不利宜服壞涎丸方

白礬燒灰半兩 天竹黃半兩 半夏一兩湯浸七遍去滑涎炒

金薄五十片 朱砂一兩細研過 皂莢子人

右件藥以半夏及皂莢子人搗羅為末與

諸藥同研令勻用爛粟米飴和為丸如棗

豆大每服不計時候以生薑湯下七丸

治脾胃冷熱氣不和諸方

夫脾與胃合為受載之府化穀精氣漑灌身

形二氣調平則四肢安暢若藏腑虛弱飲食

不消陰陽交爭冷熱相搏故令脾胃不和也

治脾胃冷熱氣不和胃中滿悶不能下食四

肢少力宜服草薢散方

草薺

三分去皮

赤茯苓

三分

甘草

半兩炙

人參

三分

半兩去

白朮

半兩

陳橘皮

半兩

去白

一分

桂心

三分

枳殼

三分

麩炒

半夏

七分

去滑

一分

厚朴

三分

去鹿

皮塗

生薑汁

炙

令香熟

右件藥

搗篩

為散

每服

三錢

以水

一中盞

入生薑

半分

棗三枚

煎至

六分

去滓

不計

時候

稍熱

服忌

生冷

油膩

飴糖

治脾胃

冷熱

氣不

和胃

膈滿

悶四

肢無

力痰

逆不

思飲

食藿

香散

方

霍香

半兩

訶梨勒

半兩

煨人參

三分

去

陳橘

皮

三分

湯浸

半夏

半兩

湯浸

赤茯苓

三分

肉

桂

三分

白朮

三分

草薺

一分

積實

半兩

麩炒

微高

良薑

三分

甘草

半兩

炙

厚朴

一分

去

生薑

汁炙

令香熟

右件藥

搗篩

為散

每服

三錢

以水

一中盞

入生薑

半分

棗三枚

煎至

六分

去滓

不計

時候

稍熱

服忌

生冷

油膩

飴糖

治脾胃

冷熱

氣不

和心

腹虛

脹痰

逆少

思飲

食四肢無力宜服丁香散

丁香半兩人參三分去頭赤茯苓三分白朮半兩甘

草一分炙木瓜三分草荳蔻二分去皮乾薑半兩炮裂

剉訶梨勒三分煨茅香花三分

右件藥搗細羅為散不計時候以薑棗湯

調下一錢忌生冷油膩濕麵

治脾胃冷熱氣不和胃膈氣滯不下飲食宜

服大腹皮散方

大腹皮半兩檳榔半兩訶梨勒三分煨桑根

白皮半兩陳橘皮三分湯浸赤茯苓三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治脾胃冷熱氣不和腹脇脹悶少思飲食宜

服白朮散方

白朮一兩草荳蔻一兩去皮檳榔一兩甘草半兩炙

桂心三分桔梗一兩去頭人參一兩去頭前胡三分

去蘆訶梨勒一兩煨赤茯苓三分枳實半兩炒

卷之八
十一

散

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治脾胃冷熱氣不和胃膈腹脇脹滿不能飲食宜服桔梗丸方

桔梗一兩去白朮一兩檳榔兩甘草半兩炙
杜心三分乾薑一分炮人參半兩去前胡三分
去蘆麥藥三分炒陳橘皮一兩湯浸厚朴頭

二兩去蘆炙塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十九

治脾胃冷熱氣不和心腹疴痛脇肋氣滯不

思飲食四肢少力宜服神麴丸方

神麴一兩微炒乾薑半兩炮檳榔兩甘草兩

半兩炙陳橘皮半兩湯浸桂心兩附子兩

微赤剉炮裂去人參三分去當歸三分剉

皮臍右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

頁八
九

如梧桐子大不計時候以生薑橘皮湯下
二十丸

治脾胃冷熱氣不和胃膈不利三焦閉塞宜
服人參丸方

人參一兩去蘆頭 赤茯苓一兩 桂心一兩 乾薑半兩

剉 訶梨勒一兩用皮 川大黃一兩剉微炒 細辛半兩

枳殼一兩微黃去瓢 赤芍藥一兩 檳榔一兩 甘草半兩

赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大不計時候以生薑湯下二十
丸忌生冷油膩濕麵

治脾胃冷熱氣不和心腹痛不欲飲食宜服

訶梨勒丸方

訶梨勒三分用皮 白朮半兩 木香三分 甘草半兩

剉 陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙 乾薑半兩剉 芎藭二分

當歸三分剉微炒 縮紗半兩去皮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大不計時候以薑棗湯下三十

九

治脾胃冷熱氣不和心腹疴痛嘔逆不欲飲食四肢少力宜服白荳蔻丸方

白荳蔻三分黃耆半兩赤茯苓半兩乾薑半兩

炮裂桂心兩半白朮兩半當歸半兩半夏兩半

湯洗七人參三分去附子去皮臍裂陳橘

皮去白湯浸甘草半兩炙微亦到

左右藥搗羅為末煮棗肉和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯

下二十九忌生冷油膩飴糖

治脾氣虛腹脹滿諸方

夫人藏腑不和脾胃虛弱陽氣衰於外陰氣

積於內風冷之氣搏於脾胃之間伏留而不

散則食飲不消故令腹脹滿也

治脾氣虛腹脇脹滿喫食難消面色萎黃四

肢少力宜服厚朴散方

厚朴二兩去麤皮塗生丁香半兩木香半兩

子一兩炮裂白朮一兩當歸一兩到人參一兩

卷之八

三十一

去蘆頭訶梨勒一兩煨乾薑三分炮白茯苓

一兩桂心兩甘草半兩炙陳橘皮一兩湯浸

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食

前稍熱服忌生冷油膩濕麵黏滑等物

治脾氣虛心腹脹滿大腸不調少思飲食四

肢無力宜服陳橘皮散方

陳橘皮一兩半湯浸胡椒半兩桂心三分附子

一兩炮裂高良薑一兩甘草半兩炙厚朴去皮

薑汁炙令香熟訶梨勒一兩煨

右件藥搗細羅為散食前以清粥飲調下

一錢忌生冷油膩

治脾氣虛腹脇脹滿四肢不和面色青黃不

納飲食宜服草薹薏散方

草薹一兩薏一兩陳橘皮二兩湯浸桂心一分

子一兩炮裂白朮一兩乾薑一兩炮木香半

甘草半兩炙厚朴二兩去麤皮塗生

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

頁八

三三

蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾氣虛心腹脹滿不思飲食體重無力宜服人參散方

人參一兩去蘆頭丁香半兩白朮一兩草薺去皮

枳實半兩微黃木香半兩甘草一分炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服忌生冷油膩濕麵

治脾氣虛滯心腹脹悶四肢煩疼少思飲食

宜服益智子散方

益智子一兩去皮沉香三分赤茯苓三分枳殼半兩

微黃白朮三分檳榔三分紫蘇子三分陳橘皮

一兩湯浸木香半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治脾氣虛心腹脹滿不能食檳榔散方

檳榔三分白朮一兩草薺半兩訶梨勒一兩

皮丁香分一人參一兩去蘆頭厚朴一兩去龜皮
令香桂心兩半陳橘皮三分湯浸去白瓢培

右件藥搗細羅爲散不計時候以清粥飲調下一錢忌生冷油膩

治脾氣虛心腹脹滿胃膈不利少思飲食宜服此方、

蘿蔔子揀了好者五兩炒令熟搗細羅取末一兩餘者有油別爛搗如膏

沉香分一白木分一草荳蔻一分去皮

右件藥搗細羅爲散入前蘿蔔子末及別

入白砂糖一錢半同研令勻每服一錢抄在口內細嚼後以米飲下其蘿蔔子膏別入草荳蔻末一分白砂糖三分拌令勻每取半棗大亦細嚼米飲下並不計時候服治脾胃氣虛冷水穀不化諸方

夫人藏腑充實脾胃和平則能摧伏水穀而無積滯也若藏腑不足爲邪冷之氣所乘雖然飲食脾胃虛弱不能消磨故冷水穀不化也

治脾胃氣虛積有冷氣食不消化面色萎黃

四肢無力或時吐逆宜服丁香散方

丁香半兩 半夏半兩 柴胡三分 陳橘皮一分 白蘆根一分 乾木一分
七分 去滑 人參三分 去蘆頭 甘草一分
 瓜一分 厚朴二兩 薑汁二兩 炙令香熟 塗生 白荳蔻三分 去皮
 訶梨勒一兩 煨 附子一兩 炮裂 高良薑三分
 剉 用皮

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中
 盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服忌生冷油膩濕麵飴糖

治脾胃虛冷水穀不化心腹疼痛四肢無力

少思飲食宜服吳茱萸散方

吳茱萸半兩 湯浸七分 當歸三分 剉 乾薑三分
 炮裂 厚朴二兩 薑汁二兩 炙令香熟 塗生 桂心半兩 枳實半兩
 剉 參三分 去蘆頭 甘草半兩 炙 麥蘖一分
 炒 微 黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
 入棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服之

治脾胃虛冷食即欲嘔心腹脹悶水穀不消

四肢無力宜服葦澄茄散方

葦澄茄兩半 木香兩半 白荳蔻半兩 白朮兩半 檳榔兩半 草荳蔻半兩 訶梨勒皮兩半 肉荳蔻兩半

去枳殼微黃去麩炒 白茯苓兩半 乾薑炮裂桂 穀積微黃去麩炒

心三分 丁香兩半 陳橘皮白朮微炒 甘草兩半

炙微厚朴生薑汁炙令香熟 赤剉厚朴生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前

稍熱服

治脾胃虛冷食不消化腹脇氣脹不思飲食

四肢少力宜服人參散方

人參一兩 去附子一兩 炮裂神麴少許 白朮三分 麥蘖一兩 炒吳茱萸半兩 易浸七分

厚朴生薑汁炙令香熟 乾薑裂剉炮陳橘 皮一月半湯浸 甘草一分 炙草荳蔻去皮

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

類聚

三

入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

服

治脾胃虛冷氣宿食不消與物無味四肢少力宜服丁香散方

丁香兩半桂心三分白荳蔻一兩乾薑半兩

陳橘皮一兩湯浸去白麥蘖三分甘草半兩

厚朴二兩薑汁炙令香熟白木三分

右件藥搗羅雜為散每服三錢以水一中

盞入棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

治脾胃氣虛冷水穀不化腹脇脹滿或時寒

極四肢逆冷宜服白朮丸方

白朮一兩吳茱萸三分湯浸七訶梨勒一兩

皮附子一兩炮去皮人參半兩去蘆頭桔梗半兩

頭桂心三分乾薑半兩炮細辛華菱一兩

草一分炙微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大食前以粥飲下三十丸忌生

冷油膩濕麵

治脾胃氣虛冷水穀不化食即腹脹胃膈不

利宜服厚朴丸方

厚朴三兩去麤皮塗生陳橘皮二兩湯浸

草荳蔻去皮白朮一兩縮紗訶梨勒二兩

煨用皮桂心一兩乾薑一兩炮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大食前以粥飲下三十丸

治脾胃氣虛冷腹脇氣脹不思飲食四肢無力

力睡恒不足宜服神麴丸方

神麴二兩炒胡椒一兩陳橘皮二兩湯厚

朴薑汁二兩去麤皮塗生桂心一兩訶梨勒二兩

皮乾薑一兩炮白朮一兩附子一兩炮炙甘

草半兩炙當歸三分白荳蔻一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以粥飲下三十丸

忌生冷油膩濕麵

治脾胃氣虛弱不能飲食諸方

夫脾者藏也胃者腑也脾胃二氣以為表裏

胃為水穀之海主受盛水穀也脾主磨而消

類聚

二十八

之則能嗜食今脾胃俱虛弱故不能飲食也
治脾胃氣虛弱不能飲食即妨悶四肢少
力疼痛宜服紅荳蔻散方

紅荳蔻 三分 白朮 三分 桂心 三分 ○聖濟

厚朴 二兩 薑汁 炙令香熟 人參 一兩 去麤皮 陳橘

皮 去白 煎湯浸 訶梨勒 用皮 煨 黃耆 三分 當

歸 三分 剉 微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚 總錄棗二枚 擘破 煎至六分

去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩濕麵
治脾胃氣虛不思飲食精神悲悸上氣頓絕
身心昏昧口舌乾焦四肢無力宜服木香散

方

木香 一兩 人參 一兩 去麤頭 白茯苓 一兩 當歸 一兩

炒 白芍藥 兩 桂心 兩 麥門冬 一兩 遠志 一分

去 五味子 兩 京三稜 炮剉 白朮 一兩 訶梨勒

心 五兩 煨 厚朴 薑汁 炙令香熟 陳橘皮 一

湯浸去 白 煎湯

類聚

二十九

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不
計時候溫服忌生冷油膩

治脾胃氣虛弱不能喫食或時痰逆四肢不
和宜服厚朴散方

厚朴二兩去麤皮塗生人參一兩去桂心
薑汁炙令香熟
白朮一兩湯浸甘草半兩炙
陳橘皮一兩湯浸半夏三分湯洗丁香半兩紅豆蔻半兩
滑石七分去滑石去皮

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服忌生冷油膩飴糖草薑

治脾胃氣虛弱不能飲食背心常冷四肢不
和宜服人參散方

人參一兩去白朮一兩厚朴一兩去麤皮
香高良薑一兩川烏頭一兩炮裂桂心一兩
熟地黃一兩去皮臍

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞
入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱
服

治脾胃氣虛弱不能食食飲即吐心腹時痛
宜服沉香散方

沉香半兩人參半兩去兩陳橘皮半兩湯浸紅
荳蔻三分白木兩桂心兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服
治脾胃氣虛弱嘔逆不能飲食宜服草荳蔻

擦刀方

草荳蔻二枚高良薑半兩生薑汁半合

右件藥前二味細判和勻以水一中盞煮

取二合并生薑汁溲白麵四兩為擦刀以

羊肉臠汁內煮令熟空腹食之

治脾胃氣虛弱不能飲食宜服生薑煎方

生薑半斤研白蜜十兩人參末四兩

右件藥用銀鍋子內都攪令勻以慢火熬
成煎每服不計時候以熱粥飲調下一茶

匙

治脾胃氣虛弱不能飲食肌膚瘦瘁面色萎黃宜服白朮丸方

白朮二兩神麴二兩微炒令黃○人參一兩

頭乾薑三分炮陳橘皮一兩湯去白○總錄二兩

葦芩一兩

右件藥搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大不計時候以粥飲下三十丸

治脾實熱咽喉不利諸方

夫脾胃之氣候於脣口通於咽喉連於舌本

咽喉者水穀之道路神氣之往來若脾氣壅實則上膈生熱故令頭痛心煩口舌乾燥咽喉不利也

治脾實熱舌本強咽喉不利體重不能行步

宜服柴胡散方

柴胡一兩赤茯苓三分玄參三分大青一兩龍膽

三分去苗杏人三分湯浸去皮尖川芎兩

絡石二兩川升麻一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一升盞

煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煨熱麵

治脾實熱咽乾頭痛心神煩渴射干散方

射干兩一石膏兩二大青分三葳蕤分三赤茯苓分三

川升麻分三黃芩分三獨活兩半甘草兩半微赤到絡

石分三杏人兩半雙兩半湯浸去皮尖微黃煎

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入竹葉二七片生地黄一分生薑半分煎

至六分去滓不計時候溫服忌炙煨熱麵

治脾實熱喉中腫痛熱塞不通升麻散方

川升麻兩一射干兩一羚羊角兩半木通兩半

赤藥兩半絡石分三甘草兩半微赤到川大黃兩一

微炒到碎川芒消兩一黃芩分三

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生地黄一分煎至六分去滓不計時候

溫服

治脾實熱咽喉乾頭痛心煩四肢壅悶宜服

枳殼散方

枳殼一兩 微黃去瓢 石膏二兩 子芩兩半 柴胡一兩 去苗

玄參兩一 赤茯苓兩半 川升麻三分 射干三分 羚羊

角屑兩半 甘草兩半 微赤剉 麥門冬三分 去心

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候

溫服

治脾實熱舌本強唇口腫咽喉窄塞心神煩

熱宜服犀角散方

犀角屑三分 獨活三分 黃芩兩一 川升麻兩一 馬牙

消兩一 玄參兩一 射干兩一 甘草兩半 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓入淡竹瀝半合更煎一兩

沸不計時候溫服

治脾實熱唇腫心煩咽喉不利體熱煩疼宜

服地骨皮散方

地骨皮三分 麥門冬一分 去心 柴胡一分 去苗 川升

麻兩一 赤芍藥三分 甘草一分 微赤剉 射干兩一 石膏

兩二 龍膽三分 去頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水一斗
煎至五分去滓入牛蒡汁一合更煎一兩
沸食後溫服

治脾藏實熱咽喉不利口舌乾燥宜服犀角
丸方

犀角屑一兩牛蒡子兩半射干兩半川升麻三分麥

門冬一兩焙兩訶梨勒皮兩半木通兩半黃藥兩半

馬牙消兩半龍腦一錢甘草兩半炙兩微赤剉

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜

和為丸如梧桐子大每服以竹葉湯下二
十丸食後服忌生果炙煨熱麵

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食諸方

夫脾與胃為表裏胃者脾之腑脾者胃之藏
候於肌肉主於水穀水穀之精化為氣血以
為榮衛養於藏腑也若脾胃虛弱受於邪氣
則氣逆腹脹水穀不消故令嘔吐也

治脾胃氣虛弱胃中滿悶氣促嘔吐不能下
食宜服白茯苓散方

類聚方
三十五

白茯苓一兩 陳橘皮去白 一兩 湯浸人參一兩 去

白木三分 五味子三分 草薹半兩 夏三分 湯洗

去滑 甘草一分 炙 微赤 剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分 棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治脾胃氣虛弱嘔吐不能食四肢少力心腹

妨悶宜服白朮散方

白朮一兩 人參三分 去蘆頭 枳殼半兩 麩炒桂心

三分 陳橘皮半兩 湯浸厚朴二兩 去麤皮 塗

熟訶梨勒一兩 煨 白荳蔻一兩 去皮

右件藥搗麤羅為散每服三錢水一中盞

入生薑半分 棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治脾胃氣虛弱嘔吐不下食四肢無力宜服

此方

白茯苓一兩 陳橘皮去白 一兩 湯浸人參一兩 去

白朮一兩 五味子一兩 厚朴二兩 去麤皮 塗生

類聚方

三十六

黃耆剉一兩 桂心兩一 甘草一分炙 半夏三分湯洗

七徧去滑

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾胃氣虛弱不能飲食食即嘔吐四肢羸瘦少力宜服此薤白湯方

薤白十斤 粳米合半 大棗四枚 陳橘皮三分湯浸

枳實四枚炒微黃 生薑一分 豉四十九粒

右件藥細剉都以水一大盞半煎至八分去滓不計時候稍熱分為三服

治脾胃氣虛弱藏腑積冷嘔吐宿食四肢少力面無顏色宜服草薤薤散方

草薤薤二兩 半夏半兩 湯洗七徧 肉桂三分去

人參三分 木香半兩 前胡一兩 高良薑一分

白茯苓一兩 附子一兩 炮裂陳橘皮

湯浸去厚朴 薑汁炙令香熟 白朮一分 甘草一分

草一分炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治脾胃氣虛弱食即嘔吐人參飲子方

人參一兩去頭 甘草一分炙 陳橘皮一兩湯浸去白
蘆頭十四 生薑兩半 薤白十四

右件藥細剉以水二大盞煎取一盞二分
去滓不計時候稍熱分為三服

治脾胃氣虛弱見食嘔吐半夏散方

半夏半兩湯洗 紅薤三分 茅香花三分 人參一分

陳橘皮一兩湯浸 白朮一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治脾胃氣虛弱不思飲食胃中氣滿四肢不
和食即嘔吐宜服葶澄茄散方

葶澄茄三分 白薤三分 丁香三分 沉香兩半 木香兩半 高良薑兩半 桂心兩半 白朮兩半 人參三分

去蘆 陳橘皮一兩湯浸 乾薑半兩炮 半夏
 頭半兩湯洗 厚朴三分去蘆皮塗生 訶梨勒
七分偏去滑 用皮三分煨

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
 蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不
 計時候溫服

治脾胃虛弱胃膈氣滯吐逆不能下食宜服

白荳蔻丸方

白荳蔻一兩 乾薑一兩半夏 一兩半湯洗
去皮 炮裂七偏 滑微

炒桂心三分 白朮三分 細辛三分 木香一兩 訶梨勒
 一兩半枳實一兩 麩一兩 煨用皮炒微黃
 右件藥搗細羅為末以酒煮麵糊和丸如
 梧桐子大每服二十九不計時候用後方

厚朴湯下

厚朴湯方

厚朴四兩 薑汁炙令香熟 人參四兩 去蘆頭 陳橘
 皮二兩 湯浸 甘草一兩 炙

右件藥搗羅為散每服三錢用煎成小麥

汁一中盞入生薑半分煎至六分去滓下
前丸藥

治脾胃氣虛弱食即嘔吐四肢不和心腹妨

悶宜服丁香丸方

丁香半兩訶梨勒一兩煨附子一兩炮裂藿

香兩半草薢一兩華菱三兩陳橘皮一兩湯

煎人參一兩去白茯苓三兩桂心三兩白朮一兩

甘草一分炙高良薑一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十
丸

治脾胃氣虛弱腑藏積冷或時嘔吐不能飲

食宜服華菱丸方

華菱一兩胡椒一兩檳榔一兩訶梨勒二兩煨白

茯苓一兩肉桂一兩去人參一兩去乾薑一兩

炮裂陳橘皮二兩湯浸

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以生薑湯下二十

九忌生冷

治脾藏冷氣攻心腹疼痛諸方

夫藏腑氣虛脾胃衰弱陽氣不足陰氣有餘
邪冷之氣內搏於足太陰之經伏留而不去
脾積冷氣乘之於心正氣與邪氣交爭上下
相擊故令心腹疼痛也

治脾藏冷氣攻心腹疼痛或脇下氣聚不散
面色萎黃手足常冷不欲飲食宜服京三稜
散方

京三稜炮一兩剉白朮一兩半青橘皮湯浸

去白木香半兩芎藭三分枳殼三分麩炒檳榔

剉人參七兩去附子一兩炮裂乾薑三分

剉甘草半兩炙當歸三分剉厚朴一兩去塗

生薑汁炙吳茱萸半兩湯浸七

令香熟吳茱萸偏焙乾微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍

熱服

嘔逆四肢虛乏宜服肉荳蔻散方

肉荳蔻三枚白朮兩半木香兩半夏半洗七遍

去丁香青橘皮兩白瓢湯浸蓬莪茂附

子半兩炮裂芎藭兩甘草一分炙當歸三

炒微桂心兩乾薑兩炮裂厚朴皮塗生薑

汁炙香熟令

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治脾藏冷氣攻心腹疼痛不可忍宜服木香

散方

木香兩桃人三分湯浸去皮尖吳茱萸三

湯浸七遍青橘皮一兩湯浸焙檳榔三桂心

一蓬莪茂兩當歸一兩乾薑三分炮

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下一錢

治脾藏冷氣攻心腹疼痛不可忍宜服吳茱

萸散方

吳茱萸半兩湯浸七高良薑半兩桂心三分

厚朴二兩去麤皮塗生當歸半兩木香兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾藏冷氣攻心腹疼痛或吐清水不思飲

食宜服木香散方

木香半兩人參三分去麤頭芎藭三分青橘皮一兩

去白白朮三分肉桂一兩附子一兩炮裂

當歸三分厚朴二兩去麤皮塗生草薹

薤五枚高良薑一兩吳茱萸半兩湯浸七

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾藏冷氣攻心腹疼痛宿食不消及腹脇

脹悶不思飲食宜服紅荳蔻散方

紅荳蔻一兩木香半兩當歸三分剉桂心

高良薑一兩芎藭三分訶梨勒半兩櫻草薹

薤六枚附子一兩炮裂陳橘皮去白瓢焙

白朮兩半神麴三分微炒令黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚同煎至六分去滓不計時候稍熱服

治脾藏久積虛冷氣攻心腹脹痛胃氣不和見食即嘔面色萎黃四肢無力宜服阿魏丸方

阿魏麩裏煨麩熟為度檳榔 青橘皮湯浸去白瓢焙胡椒 丁香 藜蘆 白荳蔻去皮桂心 人

參去蘆頭附子炮裂去皮臍乾薑炮裂蓬莪茂

梨訶勒煨用皮已麝香一分細研

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十九

治脾藏久積冷氣攻心腹疼痛面色青黃四肢無力不思飲食宜服藜蘆丸方

藜蘆三分木香兩半桂心兩半白茯苓三分檳榔兩附子一兩炮裂去皮臍胡椒三分厚朴二兩塗生薑汁炙

令香當歸三分對乾薑半兩炮裂剉訶梨勒一

熟用人參一兩去皮蘆頭

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候粥飲下三十

丸

治脾藏虛冷心腹有積滯氣發歇疼痛心膈

不利兩脇脹滿不能飲食宜服礪砂煎丸方

礪砂二兩白色不夾石者阿魏一分神

麴一兩別搗羅為訶梨勒一兩丁香半兩華

末○總錄陳麴用皮

芡半兩附子半兩炮裂青橘皮半兩湯洗白

芥子半兩藜香子半兩○檳榔半兩○總錄

兩右件藥訶梨勒已下搗細羅為末以好酒

一升先煎礪砂次入阿魏同煎五七沸後

以絲濾過再煎之後下神麴末攪令調慢

火熬成膏拌和諸藥末入臼搗三二百杵

為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九

食前以生薑湯下溫酒下亦得

食前以生薑湯下溫酒下亦得

治脾藏積冷氣攻心腹疼痛不能飲食四肢無力宜服訶梨勒丸方

訶梨勒 二兩 煨人參 一兩 去蘆頭 桂心 兩 乾薑 半兩

炮裂 白茯苓 一兩 厚朴 一兩 去龜皮塗生

陳橘皮 半兩 白蘆根 浸木香 半兩 肉荳蔻 三枚 胡

椒 兩 京三稜 炮兩 附子 一兩 炮裂 桔梗 兩

去蘆頭 當歸 一兩 微炒 檳榔 兩

右件藥搗羅爲散鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十九

治脾藏冷氣及夙有積塊時攻心腹疼痛嘔

逆不思飲食四肢羸瘦宜服京三稜丸方

京三稜 炮一兩 鼈甲 一兩 塗醋炙 木香 兩 半川

大黃 半兩 剉當歸 半兩 剉白朮 半兩 厚朴 兩

去龜皮塗生薑 赤芍藥 兩 乾薑 半兩 炮裂

菜萸 半兩 湯浸七 陳橘皮 一兩 湯浸 訶梨

勒 三分 煨防葵 兩 桂心 兩 檳榔 兩 附子 兩

炮裂去皮臍

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以生薑橘皮
湯下三十丸

治脾藏冷氣腹內虛鳴諸方

夫人藏腑不和脾胃虛弱不能消於水穀則
腹脹虛鳴也此皆陽氣不足陰氣有餘邪冷
之氣伏留在藏流走往來不散故令腹內虛
鳴也

治脾藏冷氣胃膈不利腹內虛鳴少思飲食

宜服赤茯苓散方

赤茯苓三分白朮三分桔梗三分去蘆頭檳榔半兩

茱萸一分湯浸七木香兩沉香兩當歸兩

剉微枳實一分炒微黃

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前
稍熱服忌生冷油膩

治脾藏久積冷氣流走腹內虛鳴兩脇脹滿
少思飲食宜服桔梗散方

桔梗一兩去白朮一兩丹參一兩去白荳蔻

三分附子三分炮裂高良薑三分木香三分

沉香三分檳榔三分訶梨勒一兩半陳橘皮兩半

湯浸去白

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治脾藏冷氣壅滯脹悶腹內鳴轉不思飲食

宜服白朮丸方

白朮三兩生薑二兩同搗桂心兩半檳榔一兩

高良薑一兩木香半兩人參一兩去阿魏一分

麩裏煨令吳茱萸半兩湯浸七陳橘皮三分

湯浸去

右件藥搗羅為末煎醋浸饑餅和搗一二

百杵丸如梧桐子大每服食前以生薑橘

皮湯嚼下十丸

治脾藏冷氣積滯醋心嘔逆宿食不消腹藏

虛鳴時時疼痛宜服吳茱萸丸方

吳茱萸半兩湯浸七神麩一分陳橘皮

二兩湯浸去白瓢焙白朮一人參一兩去桂心一兩熟
 乾地黄一兩乾薑半兩炮裂剉訶梨勒一兩爆用皮
 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
 如梧桐子大每服食前以粥飲下二十九
 忌生冷

治脾藏冷氣腹內虛鳴胃膈氣滯不能飲食
 雖食不消又頻嘔逆宜服訶梨勒丸方

訶梨勒一兩半爆用皮吳茱萸半兩湯浸微炒白朮
 一兩桂心三分人參一兩去赤茯苓一兩桔梗半兩

去蘆頭陳橘皮一兩湯浸紅苳蔻一兩去皮乾薑
 半兩炮厚朴一兩去蘆皮塗生

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
 如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下
 二十九

治脾藏冷氣腹內虛鳴內寒外熱宿食不消
 大便乍祕乍洩腑藏不調少思飲食宜服厚
 朴丸方

厚朴一兩半去蘆皮塗白朮半兩乾薑半兩
 生薑汁炙令香熟白朮兩乾薑炮裂

劉桔梗一兩去蘆頭當歸一兩剉微炒檳榔兩半陳橘

皮半兩湯浸去白瓢焙甘草半兩炙剉訶梨勒一兩煨用皮

白茯苓兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以粥飲下二十九

忌生冷油膩

治脾胃壅熱嘔噦諸方

夫脾氣壅實胃中有熱則陽氣盛陽氣盛則

胃膈煩滿痰飲積聚則成嘔噦此皆委力强

盛之人肌膚充滿脾胃之中久多積熱致上

膈不利故令嘔噦也

治脾胃氣壅痰滯嘔噦見食即吐宜服枇杷

葉散方

枇杷葉一兩拭去毛炙微黃木通半兩前胡半兩去

人參一兩去蘆頭麥門冬一兩去心麻人兩半陳橘皮

半兩湯浸去白瓢焙犀角屑兩半赤茯苓三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治脾胃壅熱嘔噦煩渴不下食宜服陳橘皮

散方

陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙羚羊角屑兩半麥門冬兩二

去人參一兩去蘆頭去紫蘇莖葉兩一澤瀉兩半

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

又方陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙人參一兩去蘆頭去葛根兩一

蘆根一兩麥門冬一兩去心枇杷葉半兩拭去毛微炙

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候分

溫二服

治脾胃積熱胃膈煩壅嘔噦不下食宜服蘆

根飲子方

蘆根二兩麥門冬三兩去心人參一兩去蘆頭去黃耆

一兩陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙淡竹茹兩一

右件藥細剉和勻每服一兩以水一大盞

半入生薑半兩煎至一盞去滓入蜜一茶匙生地黃汁半合更煎一兩沸不計時候分温三服

治脾胃壅熱嘔噦不下食縱食良久即吐宜服麥門冬散方

麥門冬二兩去心神赤茯苓一兩半夏一兩湯洗七人參一兩去蘆頭陳橘皮半兩易浸去全去殼一茅根二兩到甘草半兩兩半去剝赤一杷一葉一兩拭去前胡半兩去蘆頭○到炙微黃前胡萬全方○

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治脾胃壅熱嘔噦煩渴不止宜服茅香散方

茅香花三分蘆根一兩麥門冬三分赤茯苓三分甘草半兩炙枇杷葉三分拭去分微赤到炙微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分竹茹一分粳米五十粒煎至六分去滓不計時候温服

治脾胃壅熱嘔噦不能下食心神煩亂宜服
蘆根散方

蘆根二兩去蘆頭 人參一兩去蘆頭 甘草半兩炙 麥門

冬去心 茯神一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓入生地黃汁
半合更煎一兩沸不計時候溫服

治脾胃壅熱氣滿不能食縱食嘔噦宜服人
參飲子方

人參一兩去蘆頭 前胡一兩去蘆頭 生薑半兩 粟米半合

薤白七莖半 豉半兩

右件藥細剉和勻都以水二大盞煎至一
盞二分去滓不計時候分溫三服

治脾胃壅熱嘔噦不下食心膈煩躁宜服此
方

糯米半合水淘生研 菘豆半合水淘生研 生薑三分研 蜜

一新汲水五合

右件藥相和研濾取汁入蜜調令勻不計

時候分爲三服

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦諸方

夫脾胃者水穀之精化爲氣血氣血充盛榮衛通流潤養身形榮於肌肉也若藏腑不足脾胃虛傷不能飲食則令氣血減少肌體羸瘦也

治脾胃氣久虛四肢無力腑藏虛損不欲飲食日加羸瘦體虛顛掉宜服草荳蔻散方

草荳蔻 半兩 去皮 青橘皮 半兩 湯浸 人參 一兩 去蘆

頭 桂心 兩 附子 三分 泡裂 白茯苓 三分 白朮

兩 當歸 半兩 剉 枳實 半兩 麩炒 厚朴 一兩 半

塗生薑汁 芎藭 半兩 柴胡 半兩 桔梗 半兩 去蘆頭

炙令香熟 白芍藥 兩 黃耆 半兩 剉

右件藥擣篩爲散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服忌生冷油膩濕麵猪犬肉

治脾胃氣虛弱不思飲食肌體羸瘦四肢無力宜服思食補益人參散方

人參一兩去蘆頭 白朮一兩 陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙 五

味子一兩 黃耆一兩 附子一兩炮裂去皮臍 木香兩

甘草一分炙 桂心兩半

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治脾胃氣久虛腹脇脹滿肌體羸瘦少力次

小便不調或加氣促喫食減少宜服訶梨勒

散方

訶梨勒三分 煨木香三分 鼈甲三分 龜甲三分 黃耆去 黃芩去

川大黃三分 微炒當歸三分 微炒牛膝三分 去苗桔

梗三分 去肉桂三分 去白芍藥三分 白朮三分

枳殼三分 微炒乾薑半兩 炮桃人半兩 湯

尖雙 人參一兩 湯浸甘草一分 炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前溫服忌

生冷油膩牛犬肉葷菜

治脾胃氣久弱肌體羸瘦或加勞氣大腸不

調有時痰逆不思飲食四肢少力宜服人參散方

人參一兩去蘆頭柴胡一兩半去苗白茯苓一兩厚朴

二兩去麤皮塗生白木一兩桔梗一兩去蘆頭陳

薑汁炙令香熟橘皮二兩湯浸五味子一兩黃耆一兩當歸

一兩到半夏七偏去滑桂心三分檳榔兩甘

草半兩到微赤到右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦四肢少力或時咳逆不思飲食宜服丁香散方

丁香三分高良薑三分厚朴二兩去麤皮塗

熟草荳蔻三分白木三分人參三分去蘆頭黃耆

三分白茯苓三分肉桂三分去附子裂三分炮

臍訶梨勒三分煨陳橘皮三分去白煎一分炙

半兩湯洗枳殼半兩麩炒甘草一分炙

七偏去滑右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

治脾胃氣虛弱令人身重不欲飲食四肢少力肌體羸宜服黃耆散方

黃耆三分甘草半兩炙桂心兩白朮兩一熟

乾地黄兩一人參一兩去厚朴二兩去薑汁炙

令香白茯苓當歸一兩到附子一兩炮

臍陳橘皮去白煎湯浸乾薑三裂到炮

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服忌生冷油膩犬肉

治脾胃氣久弱不思飲食肌體羸瘦少力腹

脇疼痛面色萎黃宜服白朮丸方

白朮兩一檳榔三分訶梨勒三分煨枳殼三分

微黃木香附子一兩炮裂白芷半兩肉荳

蔻三分桂心三分丁香半兩當歸一兩到乾薑

半兩炮縮沙去皮黃耆一兩人參半兩去

白茯苓兩一厚朴二兩去薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三
十丸忌生冷油膩濕麵

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦不思飲食四肢少
力宜服補益黃耆丸方

黃耆三分 白茯苓三分 桂心半兩 山茱萸三分
木三分 麥門冬半兩 焙去 當歸半兩 剉五 朱子
兩石斛 三分 去人參 三分 去附子 三分
兩陳橘皮 半兩 湯熟乾 地黃三分 牛膝三分
臍去 白瓢 焙熟乾 地黃三分 牛膝三分

去薯蕷三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯下
三十丸忌生冷油膩牛犬肉

治脾胃氣虛弱肌體羸瘦不能飲食食不消
化宜服附子丸方

附子一兩 炮裂 桂心三分 厚朴二兩 去生薑 汁皮
令香 甘草一分 炙當歸 三分 剉小麥 麩二
熟炒 川椒半兩 去目 及開
令黃 炒口 微炒 出汗

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯下二十九忌生冷油膩犬肉

治脾藏虛令洩痢諸方

夫脾胃及大腸虛弱則邪冷之氣之食飲留滯不消而成痢也脾主消於水穀胃為水穀之海今脾胃虛內積冷氣流於大腸大腸為傳道之府化物出焉今藏虛故令洩痢也

治脾藏虛冷不思飲食腹內疴痛大腸洩痢水穀不化宜服厚朴散方

厚朴二兩去麤皮塗生人參半兩去當歸

三分剉乾薑半兩炮白朮半兩乾木瓜三分高

良薑半兩訶梨勒三分煨桂心三分木香半兩

陳橘皮半兩湯浸附子一兩炮裂

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

服忌生冷油膩

治脾藏虛冷大腸洩痢腹內疼痛四肢不和少思飲食宜服木香散方

木香一兩肉荳蔻一兩去殼人參一兩去蘆頭附子二兩

炮裂去當歸二分剉乾薑一分炮甘草半

皮臍去吳茱萸半兩湯浸七陳橘皮二兩湯

炙剉赤剉二兩厚朴二兩去蘆皮塗生

煎剉蒼術二兩厚朴二兩去蘆皮塗生

右件藥搗碎羅為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

之

治脾藏虛冷喫食減少大腸洩痢腹痛四肢

乏力宜服白朮散方

白朮一兩乾薑半兩炮裂剉桂心半兩人參半兩去

厚朴二兩薑汁炙香熟生陳橘皮一兩湯浸去白瓜倍

附子二兩去皮臍裂縮紗一兩去皮草荳蔻一兩當

歸一兩剉訶梨勒一兩煨

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入棗三枚煎至六分去滓食前熱服

治脾藏虛冷大腸洩痢腹痛食不消化阿膠

散方

阿膠一兩擣碎艾葉一兩乾薑三分炮赤

石脂三分當歸一兩厚朴二兩生薑汁炙令香

熟桂心兩芎藭兩附子一兩炮裂

右件藥擣細羅為散每服食前以熱粥飲

調下二錢忌生冷油膩濕麵

治脾藏虛冷大腸洩痢食不消化腹內疼痛

手足多冷面色青黃宜服訶梨勒散方

訶梨勒一兩微煨用皮附子一兩炮裂去皮臍乾薑半兩炮裂

龍骨一兩吳茱萸半兩易浸七當歸一兩

剉微炒過右件藥擣細羅為散每服食前以熱粥飲

調下二錢

治脾藏虛冷大腸洩痢腹內疼痛四肢羸瘦

少力或渴不思飲食宜服厚朴散方

厚朴二兩薑汁炙令香熟生蒼朮一兩訶梨勒

皮用當歸三分剉乾薑半兩炮裂木香兩縮

沙一兩赤石脂一兩附子一兩炮裂去皮臍

件藥搗細羅為散每服食前以茶飲
調下二錢

治脾藏虛冷大腸洩痢腹痛水穀不化面色

青黃少思飲食宜服木香丸方

木香兩半附子一兩炮裂赤石脂一兩吳茱萸

半兩湯浸七縮沙一兩訶梨勒一兩煨高

良薑三陳橘皮一兩湯浸當歸三分剉

荳蔻三分白朮一兩厚朴一兩塗生薑汁炙令

香

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服食前以熱粥飲下三十
丸忌生冷油膩

治脾藏虛冷食即嘔逆穀食不化或多洩痢

宜服厚朴丸方

厚朴四兩薑汁炙令香熟乾薑二兩炮人參

一兩半吳茱萸一兩湯浸陳橘皮二兩

去蘆頭白朮二兩夏一兩湯洗當歸半兩

微桔梗一兩去甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗羅爲末以酒煮麵糊和丸如梧
桐子大每服以薑棗湯下三十九不計時
候服之

治胃虛冷諸方

夫胃合於脾足陽明是表經也爲水穀之海
凡五味五穀入口則胃實而腸虛食下則腸
實而胃虛故六腑實而不滿五藏滿而不實
若藏氣不足調之於胃胃虛則生寒寒則苦
飢心腹恒痛兩脇虛脹咽喉不利食飲不下

面目浮腫浙浙惡風目中急足脛寒不得安
卧則是胃虛冷之候也

治胃虛冷浙浙惡寒目中急痛耳鳴脛寒不
得卧心腹多冷氣身體無澤補胃黃耆散方

黃耆一兩 防風一兩 去頭 栝子人兩 細辛兩

桂心兩 陳橘皮一兩 湯浸 人參一兩 去蘆

藟一兩 吳茱萸一分 湯浸七 甘草一分 炙

右件藥搗篩爲散每服五錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前

温服忌生冷油膩

治胃中虛冷胃膈腹脇脹滿四肢不利人參

散方

人參五分去蘆頭白朮兩赤茯苓半黃耆半兩

東橋皮去白兩湯去訶梨勒一兩煨附子三分

炮裂去木香兩桔梗半兩去蘆頭大腹皮半兩

甘草一分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前温服

治胃中虛冷肌肉不榮身體枯燥骨節皆痛

宜服熟乾地黄散方

熟乾地黄兩白茯苓三分當歸三分剉麥門

冬三分去乾薑半兩炮川椒一分去目及

去吳茱萸一分湯浸七桂心三分甘草半兩炙微

赤人參一兩去蘆頭五味子三分木香三分

右件藥搗細羅為散每服食前以温酒調

下二錢忌生冷

治胃中虛冷氣攻腹脇妨悶食久不消宜服

厚朴散方

厚朴二兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟肉荳蔻三分去殼木香三分湯訶梨勒一兩煨檳榔三分陳橘皮三分湯分去白鄭焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

治胃中虛冷氣上奔胃中憤悶腹中疝痛吐利宿水宜服人參丸方

人參半兩去蘆頭桂心半兩乾薑半兩炮白茯苓

半兩陳橘皮半兩湯浸去白訶梨勒一兩半煨用

全方厚朴一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟白朮半兩木香

半兩加丁香半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗一百杵丸如梧桐子大每服食煎以粥飲下三十九

治胃實熱諸方

夫胃實則熱熱則恒渴引水頭痛如瘧唇口皆乾喜噦或生乳癰及缺盆腋下脾腹脹身

熱心懸消穀喜飢溺色黃者則是胃實熱之候也

治胃實熱苦頭痛汗不出狀如溫瘧唇口皆乾或生乳癰及缺盆腋下腫名曰胃實宜服瀉熱梔子散方

梔子人兩 赤芍藥兩 犀角屑兩 赤茯苓兩

黃芩兩 射干兩 川大黃兩 碎微炒

右件藥搗篩為散每服半兩以水一大盞煎至六分去滓入生地黃汁一合蜜一大

匙攪令勻更煎一兩沸食後分溫二服忌炙煨熱麵

治胃實熱苦頭痛汗不出口中乾燥子芩散方

子芩三分 赤茯苓兩 甘草半兩 炙兩 柴胡去苗

葛根半兩 麻黃根節去 石膏三分 五加皮兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食後溫服忌炙煨熱麵

治胃實熱常渴引飲水宜服洩熱蘆根散方

蘆根一兩 赤茯苓三分 菰蘆根一兩 麥門冬一兩

去心 知母半兩 甘草半兩炙 微赤到

右件藥搗篩為散每服錢三以水一中盞

入小麥五十粒竹葉二七片生地黃一分

生薑半分煎至六分去滓食後放溫服之

治胃實熱多渴心煩黃連丸方

黃連一兩 菰蘆根一兩 麥門冬一兩半 知母一分

去心 茯苓三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

梧桐子大食後以粥飲下三十丸或牛乳

汁下亦得忌炙煨熱麵○聖濟總錄治胃

實熱氣盛消穀善飢頭目昏痛衄血煩渴

黃連去鬚 栝樓根 麥門冬去心 知母焙 茯苓

去木各 右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐

子大每服三十丸溫熟水下不拘時

治胃實熱嘔逆不下食宜服犀角散方○聖

濟總錄治胃實熱嘔噦吐逆不食頭痛煩渴

犀角屑三分○總錄枇杷葉一兩拭去毛炙微黃葛根

三分到○總錄麥門冬一兩去心

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分總錄水一盞去

滓才用時候溫服

治胃中實熱吐逆不受飲食心神煩渴宜服

此方

生薑半兩研糯米半合淘蜜一合

右件藥相和入新汲水一中盞分為二服

治肺虛補肺諸方

夫肺為華蓋覆於諸藏若肺虛則生寒寒則

陰氣盛陰氣盛則聲嘶語言用力顫掉緩弱

少氣不足咽中乾無津液虛寒乏氣恐怖不

樂欬嗽及喘鼻有清涕皮毛焦枯診其脉沉

緩此是肺虛之候也

治肺氣虛惡寒欬嗽鼻有清涕喘息氣微四

肢少力宜服補肺白石英散方

白石英一兩細研五味子一兩麥門冬三分去心乾

薑半兩炮裂到白茯苓一兩附子一兩炮裂甘草

半兩炙到桂心一兩阿膠一兩擣碎人參一兩

微赤到陳橘皮一兩湯浸

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫

服忌生冷油膩等

治肺藏氣虛胷中短氣欬嗽聲微四肢少力

宜服此補肺阿魏散方

阿魏一兩擣碎薯蕷一兩人參一兩去五味

子一兩麥門冬一兩焙乾薑裂半兩炮杏人分

湯浸去皮尖雙白木一桂心分

右件藥擣細羅為散每服不計時候以粥

飲調下一錢

治肺藏氣虛無力手脚顫掉喫食減少宜服

補肺黃耆散方

黃耆一兩人參一兩去茯神一麥門冬一

去白朮三分五味子一兩桂心一兩熟乾地黄一兩

陳橘皮一兩湯浸當歸三分剉甘草半兩

赤白芍藥三分 牛膝三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治肺藏氣虛欬嗽少力言語聲嘶喫食全少

日漸羸瘦宜服補肺人參散方

人參一兩 去頭 紫苑半兩 洗鹿角膠 一兩 碎炒

黃耆者 一兩 桂心一兩 紫蘇莖葉 三分 白朮一分

五味子半兩 熟乾地黃一兩 杏人皮 半兩 湯浸去

炒微乾薑半兩 炮

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治肺藏氣虛傷冷欬嗽怯寒無力不思飲食

宜服補肺杏人散方

杏人一兩 湯浸去皮 尖桂心 一兩 厚朴二兩 去麤

皮塗生薑汁人參 一兩 去頭 訶梨勒一兩 煨

炙令香熟 白朮三分 甘草半兩 炙乾薑 三分 炮 陳橘皮

一兩 湯浸附子 一兩 炮裂 白茯苓一兩

去白麩焙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
蓋入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫
服

治肺藏氣虛失聲胃中痛喘息鳴宜服補肺
鍾乳丸方

鍾乳粉一兩 麥門冬三分 去心焙 桂心一兩 五味子
一兩 桑根白皮半兩 白石英一兩 細研 人參
一兩 去蘆薑半兩 炮陳橘皮一兩 湯浸薯
蘆一兩 去蘆半兩 裂到 白茯苓三分
黃三分

右件藥搗羅為末用棗肉和丸如梧桐子
大每服不計時候以粥飲下三十丸

治肺實瀉肺諸方

夫肺實則生熱熱則陽氣盛陽氣盛則胃膈
煩滿口赤鼻張飲水無度上氣欬逆咽中不
利體背生瘡尻陰股膝踠脛足皆痛診其脉
滑實者是肺實之候也

治肺藏氣實心胃壅悶欬嗽煩喘大腸不利
宜服瀉肺大麻人散方

大麻人兩 桑根白皮三分剉 檳榔兩 天門冬

三分赤茯苓三分 枳殼三分 微黃去瓢 漢防已二分

甘草半炙 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服忌炙煨熱麵大蒜

治肺藏氣實上膈痰滯不下飲食宜服瀉肺

散方

枳殼三分 微黃去瓢 旋復花半兩 川芒消兩 前胡

三分去川大黃一兩 剉碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治肺藏氣實心胃煩壅欬嗽喘促大腸氣滯

宜服瀉肺大黃煎方

川大黃二兩 剉碎微炒 生地黄汁三合 杏仁一兩 湯

尖雙人枳殼一兩 微黃去瓢 牛蒡根汁二合 郁李

生研人枳殼一兩 微黃去瓢 牛蒡根汁二合 郁李

右件藥搗細羅爲散用蜜四兩酥二兩入前二味汁同於銀鍋子內入諸藥末攪令勻慢火煎令成膏收於瓷合內每服不計時候以清粥飲調下一茶匙

治肺藏氣實心胃壅悶喘促欬嗽面目浮腫宜服瀉肺丸方

馬兜零一兩款冬花半兩甜葶藶三分隔紙赤茯苓一兩杏仁一兩湯浸去皮尖漢防已三分甘草半兩炙陳橘皮三分湯浸去白蘄焙桑根白皮微赤每

一兩皂莢四挺不艸者去黑皮塗酥炙微黃煨去子右件藥擣羅爲末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下三十丸

治肺藏氣實胃膈壅滯大腸不利宜服牽牛子丸方

牽牛子一分馬牙消一兩鍊雞臍脰半兩陰甜葶藶半兩隔紙杏仁半兩湯浸去皮乾黃黃

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服不計時候以溫酒下三十丸

治肺藏氣實心胃壅悶欬嗽喘促大腸氣滯
蒸麩丸方

甜葶藶

三分隔紙炒令紫色杏仁三七枚湯浸去皮尖

牽牛子

一兩微炒漢防已一兩陳橘皮半兩湯浸去白

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服不計時候煎桑根白皮湯下二十九

又方川大黃

一兩剉碎微炒五味子一兩車前子一兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以溫水下三
十九

治肺氣不足諸方

夫藏腑之精氣皆上注於肺肺主於氣氣爲
衛流行於諸陽之經榮華於皮毛若其氣不
足則胃滿短氣咽中閉塞欬逆涕唾寒從背
起口中如含霜雪語言失聲皮毛萎萃皆肺
氣不足之候也

治肺氣不足煩滿喘嗽氣逆上衛唾血或自
 驚恐皮毛自起或嘔逆歌笑心煩不定耳中
 虛鳴或如風雨面色常白宜服白石英散方
 白石英一兩細研如粉鍾乳粉一兩款冬花二兩心
 二天門冬一兩去心桑根白皮一兩紫苑一兩
 兩苗人參一兩半去蘆頭五味子二兩白茯苓一兩
 土苗右件藥搗篩為散每服三錢以水一升
 入生薑半分棗三枚糯米五十粒煎至六
 分去滓不計時候溫服

治肺氣不足胃中短氣欬嗽惡寒白朮散方
 白朮三分紫苑半兩洗去苗土乾薑半兩炮裂人參三分
 去蘆頭熟乾地黄三分桂心一兩五味子三分甘草
 半兩炙黃明膠三分炒令黃燥白茯苓三分
 右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
 入棗三枚糯米五十粒煎至六分去滓不
 計時候溫服

治肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞寒從背
 起口中如含霜雪言訥失聲甚者吐血宜服

紫苑散方

紫苑一兩洗 五味子一兩 欬冬花一兩 桂心一兩

麥門冬二兩 桑根白皮二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚粳米五十粒煎至六
分去滓不計時候溫服

治肺氣不足心胃煩滿喘促欬嗽五味子散
方

五味子一兩 白石英一兩 鍾乳粉一兩 桂心一兩

一兩桑根白皮一兩 陳橘皮一兩 杏仁一兩

人三十枚 雙人 麩炒 微黃紫苑三分 洗紫蘇子一分

一兩麥門冬一兩 微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚 米五十粒煎至六
分去滓不計時候溫服

治肺氣虛損不足氣乏胃中煩悶宜服此方

陳橘皮二兩 湯浸 麻黃二兩 去根節

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入小麥五十粒煎至六分去滓不計時候
溫服

治肺藏中風諸方

夫肺中風者由腠理開踈氣血虛弱風邪
侵攻於藏腑也肺主於氣氣為衛衛為陽陽
氣行於表榮華於皮膚若衛氣虛少風邪相
搏則胃滿短氣冒悶汗出噓吸顫掉語聲嘶
寒身體沉重四肢萎弱其脉浮數者是肺藏
中風之候也

治肺藏中風氣攻背痛項強皮毛焦枯頭疼
鼻塞四肢不利徧身瘙痒宜服防風散方

- 防風 三分去蘆頭 人參 三分去蘆頭 赤茯苓 三分 杏仁 三分
- 三分湯浸去皮尖 貝母 三分微黃 前胡 三分
- 雙人參 三分湯浸去皮尖 芎藭 三分 木香 三分 天麻 三分
- 頭半夏 七分湯洗 芎藭 三分 木香 三分 天麻 三分
- 羌活 三分 桂心 三分 甘菊花 三分 細辛 三分 附子 三分
- 炮裂去 皮臍 麻黃 三分去根節 藁本 三分 桑根白皮 三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分薄荷二七葉煎至六分去滓
不計時候溫服忌熱麵鷄猪魚等

治肺藏中風項強頭旋曾滿短氣噎乾噓吸
顛掉語聲嘶四肢緩弱宜服芎藭散方

芎藭兩防風三分去獨活三分桂心三分前胡

三分去細辛兩五味子三分黃耆半兩甘菊

花兩附子三分包裂麻黃根一兩去杏人三分

湯浸去皮人參三分去扶神三分山茱

黃兩甘草微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服忌生冷毒滑油膩

治肺藏中風冷頭疼項強背痛鼻乾心悶語

聲不出胃中少氣四肢無力疼痛宜服獨活

散方

獨活兩細辛兩附子一兩包裂甘菊花一

麻黃根節兩去木通剉一兩五味子一兩赤茯苓

一兩紫苑去苗土桂心一兩白朮一兩芎藭一兩杏

人一兩湯浸去皮尖桑根白皮剉甘草一兩

一兩炙
微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治肺藏中風項強頭旋皮中如蟲行腹脇脹

滿語聲不出四肢頑痺大腸不利宜服白痰

藜散方

白痰藜三分微羌活三分沙參三分去丹參

三分麻黃二分去白朮三分羚羊角屑三分細辛

三分草薺剉五分五加皮三分五味子三分生乾地

黃三分赤茯苓三分杏仁雙三分易浸去皮尖菖

蒲三分枳殼微三分麩炒郁李人皮三分湯浸去

附子三分炮裂桂心三分木通剉三分檳榔分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服忌生冷毒滑魚肉

治肺藏中風項強皮毛焦痒口乾心煩頭目不利四肢無力疼痛宜服犀角散方

犀角屑 天竹黃細研 人參去蘆頭 卷栢

赤箭 藁本 羌活 防風去蘆頭 芎藭

桂心 獨活 五加皮 黃耆剉 甘菊花

麻黃去根節 赤芍藥 細辛 當歸剉微

枳殼麩炒微黃去瓤 天門冬去心焙 蒼耳子 甘草

炙微赤剉已 牛黃半分細研入 麝香半分細研入

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻

每服不計時候以荆芥薄荷湯調下一錢

治肺藏中風心胃氣促項背強硬皮膚不仁

麻黃散方

麻黃三分去根節 附子三分炮裂去皮臍 天麻三分 白花

蛇肉三分炒微黃 防風三分去蘆頭 細辛三分 芎藭

三分菖蒲三分 荆芥三分 桑根白皮三分剉 白蒺藜

炒去刺微 杏仁三分湯浸去皮尖 牛黃一分細研

麝香一分細研

右件藥搗細羅為散每服不計時候

酒調下一錢

治肺藏中風項強背痛四肢緩弱言語不出

胃悶咽乾手足顛掉心宵短氣目眩頭旋皮

膚頑痺牛黃丸方

牛黃半兩細研赤箭兩半羌活兩半細辛兩半桂心兩半

當歸微炒甘菊花兩半防風兩半蘆頭去天雄兩

炮去麻黃半兩去蔓荊子兩半白朮兩半杏仁兩

皮臍兩湯浸去皮尖草薺兩茯神兩山茱兩

雙人麩炒微黃兩草薺兩到兩茯神兩山茱兩

莫兩羚羊角屑兩半芎藭兩半犀角屑兩半五加兩

皮兩半五味子兩半阿膠半兩擣碎人參去兩

頭楓香兩半天南星炮裂白附子炮裂龍腦

一分麝香一分
細研

右件藥擣羅為末入研了藥更研令勻鍊

蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以荆芥湯下十五丸

治肺藏風毒皮膚生瘡瘙痒諸方

夫肺主於表榮於皮毛若熱毒結伏在於藏

腑積蓄日久不能宣通則攻於表也或觸冒

風冷腠理開踈風邪客於肌肉真氣散失邪

氣與衛氣並行風熱相搏流走皮膚之間則

生瘡而多痒也

治肺風皮膚癢痒搔之成瘡心神虛煩頭目不利宜服牛黃散方

牛黃細研犀角屑 杏人湯浸去皮尖雙防

風頭蘆細辛 天竹黃細研茯神 白鮮皮

川大黃微炒羌活 子芩 麥門冬去心

白僵蠶微炒檳榔 羚羊角屑 甘草炙微

已上各麝香一分

右件藥搗細羅為散入牛黃麝香更研令

勻每服不計時候以荆芥湯調下一錢忌熱麵鷄猪魚蒜等物

治肺藏風毒攻皮膚生瘡腫疼痛心神煩熱 羚羊角散方

羚羊角屑 赤茯苓 防風去蘆 麥門冬

去心犀角屑 白蒺藜微炒 苦參剉 秦艽

去苗子芩 升麻 地骨皮 牛蒡子微炒 桑

根白皮剉 枳殼麩炒 黃耆剉 柴胡去川

大黃剉碎 玄參 梔子人 甘草炙微赤

類聚

各半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫漿水調下一錢忌鷄猪毒滑物

治肺藏風毒皮膚生瘡欲似大風者宜服五參散方

人參一兩去 沙參一兩去 玄參半兩 苦參一兩
 丹參一兩 赤箭一兩 烏蛇三兩酒浸去 白蒺藜一兩
 甘草半兩炙微赤剉已上 桑根白皮一兩
 地骨皮一兩 槐白皮一兩

右件桑根白皮等四味並細剉用生薑汁煮三二十沸取出焙乾擣細羅為散與前九味藥末相和令勻每服不計時候以溫酒調下一錢

治肺藏風毒壅滯皮膚及面上瘡疱或如麻豆苦痒搔之即赤痛或破為瘡楓香散方

楓香 景天花 薺苳 貝母煨令微黃 甘草
 天麻 防風去蘆 細辛 牡荊子
 羌活 川升麻 藁本 白鮮

類聚

八十一

皮 荷葉洗去苗土 紫苑洗去苗土 石膏研細 枳實麩炒

已上各半兩

右件藥搗細羅為散不計時候溫漿水調下一錢

治肺藏風毒徧身生瘡或生白癩或生斑點

及皮膚皴裂宜服白花蛇散方

白花蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃 天麻一兩 槐子一兩微炒 羌活一兩 防風一兩 蘆頭一兩去 晚蠶沙一兩微炒 蔓荊子一兩 白鮮皮一兩 葳靈仙一兩 枳殼一兩麩炒 甘草一兩

半兩炙微赤剉

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下一錢

治肺藏風毒鼻塞面痒生瘡獨活散方

獨活一兩 蔓荊子一兩 人參一兩去 黃芩三分 參三分 秦艽三分去苗 沙參三分去 枳殼三分微炒 羚羊角一分 犀角一分 白鮮皮三分 防風三分 蘆頭一分 甘草一分 菊花三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

漿水調下一錢

治肺藏風毒壅熱鼻塞乾躁大腸祕澀宜服
枳實散方

枳實

一兩 麩炒令黃

川大黃

一兩 半剉微炒

川朴

半一兩

李人

一兩 半湯浸去皮尖微炒

芎藭

三分

牛蒡子

三分 微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以蜜

水調下一錢

肺藏風毒皮膚生瘡胗宜服玄參丸方

玄參

三分

羚羊角屑

三分

木香

三分

羌活

三分

白鮮

皮

三分

沙參

一分

零陵香

三分

檳榔

三分

人參

頭

三分

赤茯苓

三分

黃耆

三分

白芷

三分

馬牙

消

三分

龍腦

一分

麝香

一分

鉛霜

一分

右件藥搗羅為末入龍腦等同研令勻鍊

蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以薄荷湯嚼下十丸

肺藏風毒皮膚徧生瘡疱頸領生結核宜

服犀角丸方

犀角屑

半兩

連翹

三分

麥門冬

三分

心焙

去

子芩

半兩

川升麻三分地骨皮一分防風三分去蘆頭一分秦艽一分

去川大黃半兩到微炒梔子人兩半漏蘆一分烏蛇

二兩酒浸去皮骨炙微黃牛蒡子三分微炒苦參一分枳殼

三分麩炒白蒺藜一分微黃去蘆頭一分刺

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫漿水下二十

丸

治肺藏風毒皮膚瘡癬心神煩燥體熱宜服

烏蛇丸方

烏蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃秦艽三分去苗犀角屑一兩川

升麻三分子芩三分牛蒡子三分微炒枳殼一分微炒

去防風三分蘆頭一分去川大黃一分兩到微炒苦參三分到

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫漿水下二十

丸

治肺藏風毒皮膚瘙癢瘡疥癰疹宜服白花

蛇丸方

白花蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃人參一兩去蘆頭一分玄參一兩

沙參一兩去 丹參一兩 苦參一兩 枳殼半兩
 微黃黃芩 防風半兩 漏蘆半兩 白疾梨半兩
 去蘆黃芩 防風半兩 漏蘆半兩 白疾梨半兩
 炒去刺川 大黃半兩 秦艽半兩 白鮮皮半兩
 兩甘草半兩 微赤到

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三三百杵丸
 如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十九

治積年肺藏風毒徧身生瘡大腸壅滯心神
 煩躁宜服皂莢煎

皂莢二斤 不艸肥好者用一斤生搗碎以水一斛浸一宿揉取汁 黎十

枚生薄荷一斤 生荆芥一斤

已上三味人在皂莢水內同揉洗令極爛

以生絹絞取汁

前皂莢一斤 刮去黑皮以酥二兩 再塗慢火炙令黃焦酥盡為度 防風

去蘆葳靈仙 獨活 羌活 甘菊花上已

兩各二

右件藥搗羅為末以一半入在前藥汁內
 於銀鍋中慢火熬看稀稠得所入後一半

藥同浸為丸如梧桐子大每服不計時候
以溫漿水下二十九

治肺藏風毒皮膚結硬及遍身癢痒生瘡大
腸不利宜服大麻人丸方

大麻人二兩別研如膏防風一兩去蘆頭枳殼一兩麩

去去旋復花一兩川一兩大黃三兩到木香一兩檳榔

兩一兩升麻一兩杏人一兩湯浸去皮尖

右件藥擣羅為末以不虫皂莢二十挺碎
摻用水四升揉取汁慢火煎成膏入前藥

末和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不
計時候以溫水下三十九

治肺藏風毒皮膚赤痒生瘡腫疼痛宜服五

參丸方

人參半兩去蘆頭丹參一兩玄參一兩沙參一兩去

苦參一兩茯神三分秦艽三分白附子三分

枳殼三分羌活三分川三分大黃二兩到烏

蛇二兩骨二兩炙微黃細辛三分白鮮皮三分防風三分

去蘆頭

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大不計時候以溫漿水下三十
丸

治肺藏風毒攻皮膚生瘡黃連丸方

黃連去鬚川大黃剉碎苦參剉防風去蘆頭枳

殼蘇土微蘇土川升麻 牛蒡子微炒木通剉秦

芩去苗黃芩已上各一兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大不計時候以溫漿水下二十

丸

治肺藏風毒外攻皮膚瘙痒生瘡宜服此方

天麻一兩蟬殼一兩皂莢一兩去皮塗酥炙令黃焦去子

右件藥搗羅爲末用精白羊肉爛研和丸
如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下

二十九

治肺藏風毒皮膚生瘡疥宜服此方

牡荊子三兩防風三兩去蘆頭皂莢一十挺去皮

去桑螵蛸二兩微炒

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下
二十九

治肺藏傷風冷多涕諸方

夫藏腑虛弱氣血不足則風冷之氣傷於肺
也肺主氣氣之所行循環經絡若氣虛則外
邪所侵真氣與邪氣相搏故令欬逆惡寒語
聲散失目眩頭旋鼻多涕也

治肺藏外傷風寒頭目不利多涕宜服桂心

散方

桂心三分白朮三分厚朴一兩去麤皮塗生人

參三分去蘆頭陳橘皮一兩湯浸半夏半兩湯

去附子三分炮裂赤茯苓三分五味子三分麻

黃三分去根節乾薑半兩炮杏仁半兩湯浸去

炒微細辛兩甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩爲散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服忌生冷猪魚油膩等

治肺藏外傷風冷時有效嗽頭目不利多涕

宜服細辛散方

細辛三分 芎藭兩半 乾薑半兩 炮 杏仁半兩 易

尖雙入 楚赤 茯苓三分 白朮三分 附子三分 去皮

炒微黃 桂心兩半 前胡半兩 去 甘草半兩 炙 陳橘

皮一兩 湯浸 厚朴一兩 去麤皮 塗生 薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服忌生冷濕麵油膩

治肺藏傷風冷頭目昏重常多清涕少思飲

食白朮散方

白朮兩半 人參一兩 去 肉桂半兩 去 桔梗兩半

去蘆 厚朴一兩 半 去 麤皮 塗 細辛兩半 甘草

頭兩 炙 陳橘皮一兩 湯浸 杏仁三分 易 浸

散赤割 人參炒 散黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治肺藏因傷風冷痰嗽不止心膈煩滿或時

嘔逆鼻中多涕前胡散方

前胡一兩去蘆頭桔梗半兩去蘆頭半夏半兩湯洗

白木三分人參二分去蘆頭枳殼三分麩炒桂心

一甘草半兩赤剉陳橘皮一兩湯浸細辛半兩

枇杷葉半兩拭去毛炙微黃厚朴一兩半去蘆皮塗

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治肺藏傷風冷欬嗽頭痛不可忍及多涕厚

朴散方

厚朴一兩半去蘆皮前胡一兩去蘆頭桂心

一石膏一兩芍藥一兩貝母一兩煨甘草一分

炙微杏人三分湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治肺藏傷風冷欬嗽多涕心膈痰逆不欲飲

食宜服人參散方

人參三分去 蘆頭半 半夏半兩湯洗 乾薑半兩炮
白茯苓兩半 白朮兩半 甘草半兩炙 五味子半兩
肉桂半兩去 陳橘皮一兩湯浸 黃耆半兩
訶梨勒三分 用皮一分

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治肺藏傷風冷鼻中多涕四肢疼痛不思飲

長當歸散方

當歸半兩剉 人參三分去 桂心三分 乾薑半兩
炮裂白朮 兩半 白茯苓兩半 甘草半兩炙 芍藥兩半
剉陳橘皮 一兩湯浸 細辛兩半 白芍藥兩半
右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞
入薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治肺氣頭面四肢浮腫諸方

去肺者內生於氣外應皮毛若肺氣不足邪

氣所攻則經絡否澀藏腑壅滯胃膈痰飲結聚不消欬逆面虛心腹脹滿邪氣與衛氣相搏流溢皮膚遂令浮腫狀如水氣也

治肺氣面目浮腫欬嗽煩熱心腹壅滯胃滿氣宜服和 **李人散方**

郁 一人 一兩 湯浸去 漢防已 一兩 赤茯苓 一兩

貝母 一兩 商陸 一兩 杏仁 一兩 湯浸去皮

黃 熟 葶 苈 一兩 桑根白皮 一兩 橘皮 一兩

湯 去 大 香 一兩 檳榔 一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一升入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服忌生冷鷄魚大蒜

治肺氣壅盛攻頭面四肢浮腫胃膈痰逆不下食宜服澤漆散方

澤漆 一兩 羌活 三分 杏仁 一兩 湯浸去皮尖旋

復花 三分 貝母 一兩 煨 半夏 一兩 湯洗 猪苓

黑皮 去 前胡 三分 去 大腹皮 三分 漢防已

一兩 桑根白皮 三分 甜葶蘆 一兩 隔紙 陳橘

皮一兩湯浸
去白瓢焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候溫服

治肺氣攻注偏身虛腫按之沒指心腹氣滯

大小便澀狀如水氣宜服赤茯苓散方

赤茯苓兩漢防己兩川大黃一兩半剉
碎微炒檳榔三分

柴胡一兩紫蘇莖葉三分甜葶藶三分

桑根白皮一兩陳橘皮一兩湯浸
去白瓢焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治肺氣攻四肢腫滿疼痛宜服陳橘皮散方

陳橘皮一兩湯浸
去白瓢焙射干三分漢防己一兩赤茯苓一兩

大腹皮一兩澤瀉三分澤漆兩桑根白皮三分

皮三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入黑豆五十粒煎至六分去滓食前溫服

治肺氣壅滯關膈不通四肢浮腫喘息促急

坐卧不得大腹皮散方

大腹皮三分 漢防已兩半 桑根白皮三分 木

通三分 赤茯苓兩 郁李人皮一兩湯浸去甜

葶藶炒一兩半隔紙 澤漆三分 桂心兩 白台分

陳橘皮去一兩湯浸

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治肺氣欬嗽喘急妨悶面目浮腫馬兜零散

方

馬兜零兩 桑根白皮一兩 漢防已兩半 甘草

半兩炙 半夏三分湯洗 甜葶藶半兩湯紙

百合三分 天門冬三分去心 赤茯苓三分

右件藥搗籠羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治肺氣喘促煩熱面目浮腫大腸不利宜服

葶藶丸方

甜葶藶 一兩隔紙炒令紫色 杏仁 一兩湯浸去皮尖

馬兜零 一兩 漢防已 一兩 郁李人 一兩湯浸去

皂莢 無神者入小便浸二宿後去黑皮雞

子黃 五枚瀉紙上焙乾為末

右件藥搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子

大每服不計時候以生薑湯下二十九

治肺藏氣壅面目四肢浮腫喘促欬嗽胃膈

滿悶煩熱漢防已丸方

漢防已 一兩 商陸 一兩 麻黃 一兩去 赤茯苓 一兩

桑根白皮 一兩 甜葶藶 一兩隔紙炒令紫色 蛤蚧 一對

頭尾全者塗酥炙微黃 杏仁 一兩湯浸去皮尖

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

二十九粥飲下亦得

治肺氣欬嗽頭面虛腫大便祕澀宜服此方

甜葶藶 二兩以水淨淘洗過日曬乾却用

出又 煎乾 漢防已 一兩 桑根白皮 三兩 郁李人 二兩

湯浸去皮尖微炒

右件藥搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子
 大每服不計時候以粥飲下二十九
 又方甘遂半兩煨川大黃半兩剉甜葶藶半兩
隔紙炒前胡三分去巴豆一分去皮心研
令紫色右件藥搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵丸
 如菉豆大每服空心以粥飲下三丸

治肺氣喘急諸方

夫肺為四藏之上蓋通行諸藏之精氣氣則
 為陽流行藏腑宣發腠理而氣者皆肺之所

主也若肺虛邪氣所乘則壅脹壅脹則肺癰
 不利不利則氣道澁故肺氣逆而喘急也
 治肺氣喘急時嗽坐卧不得喉中鳴心胷滿
 悶宜服馬兜零散方

馬兜零三分桑根白皮三分漢防已半兩麻黃
 三分去白茯苓一兩柴胡三分白前半兩大腹
 根節陳橘皮一兩湯浸桔梗三分蘆頭去五
 皮剉味子半兩甘草一分炙紫苑半兩洗杏人十五
 枚湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服忌炙煨熱麵

治肺氣喘急不思飲食大腹皮散方

大腹皮剉 赤茯苓 枳殼麩炒微黃去瓢 桔梗去蘆

頭人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白瓢焙 半夏湯洗七

川大黃剉碎微炒 杏仁湯浸去皮尖雙 訶梨勒

皮 桂心正上各半兩 甘草一分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治肺氣壅滯欬嗽發即氣喘妨悶紫蘇散方

紫蘇莖葉一兩 猪苓一兩去黑皮 陳橘皮一兩湯浸去白

瓢和皮子 馬兜零七顆細剉 桑根白皮一兩剉○

碎揀去麩 麥門冬一兩去心 大腹皮剉 赤茯苓

一鹿皮 枳殼微黃去瓢

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治肺氣喘急腹脇疼痛麻黃散方

麻黃二兩去根赤茯苓一兩桂心一兩桔梗半兩去頭杏仁四十九枚湯浸去皮甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服聖濟總錄同

治肺氣喘急下焦虛傷宜服阿膠膏方

阿膠三兩搗碎炒白羊腎三對去筋著頂二兩搗末薤白一握切黃牛酥四兩杏仁三兩湯尖雙人麩炒羊腎脂四兩熬微黃研如膏

右件藥相和於瓷瓶內貯之蒸半日令藥成膏每服不計時候以煖酒調下一茶匙

治肺氣喘急欬嗽桔梗散方

桔梗一兩去蘆頭桑根白皮三分甘草半兩炙阿黎勒皮三分花桑葉半兩貝母半兩煨

右件藥搗細羅為散每服不計時候以糯米粥飲調下一錢

治肺氣喘急不得眠卧頭不著枕無問晝夜長倚物坐唯食稀粥服此藥其氣急當日便

減更經三五日卧穩頭著枕小便通心腹氣散二十日外平復如故兼治十種水病無不愈者朴消丸方

川朴消二兩川芒消二兩消石一兩已上三味同研

令犀角屑一兩椒目二兩微少過已上二味儔羅為末葇蓉

子一兩水淘去浮者水煮令其甘甜葶一兩乾却炒令黑色○聖濟總錄半兩

麝一兩湯紙炒令紫○聖濟總錄半兩杏人二兩湯浸去皮尖雙入麩炒微

黃已上三味同儔如膏○總錄二兩台件藥都研各研總錄令勻以棗肉和搗三五

百杵丸如梧桐子大每服不計時候以棗湯下十五丸

治肺氣定喘嗽牛黃丸方

牛黃半兩細研人參一兩去赤茯苓兩蛤蚧一對

頭尾全者塗訶梨勒三分煨杏人三分湯酥炙令微黃用皮尖雙入麩甘草半兩炙炒微黃微赤剉

右件藥搗羅為末入牛黃更研令勻鍊蜜

蠟同和丸如雞頭實大不計時候含一丸

燕津

治肺氣喘急坐卧不得宜服漢防已丸方

漢防已一兩 乾薑半兩 炮甜葶藶三分 隔紙

猪牙皂莢一兩 去黑皮塗酥

右件藥搗羅為末以棗肉和擣一二百杵

丸如梧桐子大每服不計時候煎桑根白

皮湯下十九

治多年肺氣累療不差心膈煩熱喘促宜服

此方

砒霜一兩 以熟絹裏用大蘿蔔一枚開一

竅可容此霜又用蘿蔔塞却以線纏

繫內鑿中以水入澄心五黍煮半日 五味

子半兩 金薄五片 黃藥半兩 銀薄五片 棗

豆粉一兩 蜜一兩 僧半兩 膩粉一錢

右件藥同研令勻煮棗肉和丸如梧桐子

大以沙糖溫水研化一丸食後服之

治久患肺氣喘急痰壅悶亂宜服葶藶丸方

甜葶藶一兩 隔紙炒令微黃 擣末 杏

人一兩 湯浸去皮尖雙二兩 棗五合 搗取

汁 成膏

右件藥都研令勻以皂莢膏和丸如梧桐子大每服不計時候以桑根白皮湯下二十九

治肺氣喘急睡臥不安猪脰酒方

猪脰三具大棗五枚

右二味以無灰酒五升浸經三日每服不

計時候溫服一小盞兼治經季嗽病

醫方類聚卷之八