

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所由生又當辯其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病證異則又各有主方各有主藥千變萬化之中實有一定不移之法即或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐人外臺千金不過襲集古方未能原本內經精通病變然病名尙能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰陽氣血寒熱瀉瀉諸庸籠統之談其一病之主方主藥茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則雜亂無統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至於近世則惟記通治方之數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動輒誤人余深憫焉茲書之所由作也本內經以探其源次難經及金匱傷寒論以求其治其有未備者則取六朝唐人之方以廣其法自宋以後諸家及諸單方異說擇其義有可推試多獲效焉附焉庶幾古學治病之法尙可復覩使學者其所持循不至徬徨無措至於推求原本仍當取內經金匱等全書潛心體認而後世之書亦當窮其流派揆其精華摘其謬誤而後此書之精意自能融會貫通而心有實獲則變化在我矣

乾隆二十九年四月潤溪徐靈胎書於吳山之半松書屋

一每病先錄病原首內經次金匱傷寒次病源千金外臺宋以後亦間有採者前人已言之論則後者不錄若一病之中爲病不一則詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祇載方名并治法註云見某病門以便翻閱

一專治一病爲主方如一方而所治之病甚多者則爲通治之方先立通治方一卷以俟隨證揀用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以爲準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味卽另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味卽自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之秘傳而其理不可解則有效有害皆未可知一藥不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如胎骨之類一藥不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一藥不錄至於大藥重劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一藥不錄學務窮經志切師古不尙奇功祇求實效此書之志如是而已

一 凡事最忌耳食孔子所要道聽而塗說也如治淨火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之痹症非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脈遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱爲標出此外不止一端學者所當痛省

一 通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所關豈可輕以誣人此集潮本窮流箇括明備人人易踐病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

蘭臺鏡執總目

卷一

通治方

卷二

風

虛勞

卷三

傷寒

霍亂 附轉筋

卷四

濕

癩狂癩

卷五

喘

噎膈嘔吐 附輿格

卷六

積聚癥瘕

卷七

疫癘鬼注

痺歷節

消證 附強中

百合

痿

渴

痰飲

鼓脹水腫

泄瀉

蟲 附狐惑

痿

感冒

癰閉利淋

痰喘

咳嗽 附肺脹

肺痿 附肺癰

諸痛 頭心胃腰腹

厥

寒熱

痢

疝

諸血

脚氣 附轉筋

諸疸 附黃汗

情志臥夢

五癩病耳目鼻口齒

雜病

卷八

婦人

小兒

目錄

小建中湯

八味地黃丸

竹葉石膏湯

七味白朮散

保元湯

虎潛丸

七寶美髯丹

羊肉粥方

黑地黃丸

威喜丸

亡血脫血方

四物湯

柴胡四物湯

服牛乳方

盜汗方

二腎散

二陳湯

黃耆建中湯

資生腎氣丸

脾約丸

六君子湯

生脈飲

資生丸

無比山藥丸

三才丸

元精丹

靈砂

當歸補血湯

十全大補湯

鬼絲子丸

生地黃煎

止汗紅粉

逍遙散

枳朮丸

大建中湯

六味地黃丸

四君子湯

獨參湯

歸脾湯

龜鹿二仙膠

還少丹

天王補心丹

青州白丸

二神丸

益血潤腸丸

八珍湯

菴蓉鬼絲子丸

阿伽陀藥

當歸六黃湯

平胃散

瀉黃散

炙甘草湯

當歸生薑羊肉湯

五味異功散

參附湯

補中益氣湯

三才封髓丹

羊腎丸

秘方補心丸

指迷茯苓丸

導赤散

芎藭膠艾湯

人參養榮湯

餌朮方

玉屏風散

麥門冬湯

五苓散

保和丸

加減思食丸

霍香正氣散

三黃湯

龍膽瀉肝湯

大順散

礞石滾痰丸

蘇合香丸

解毒萬病丹

越鞠湯丸

天水散

涼膈散

甘露飲

十精丸

黑錫丹

噲玉膏

四磨飲

二氣丹

四物二連湯

清心蓮子飲

成煉鍾乳粉

龍腦雞蘇丸

大活絡丹

妙香丸

瀉白散

左金丹

瀉熱梔子煎

玉霜圓

至寶丹

紫雪

吳江靈胎渾溪著

通治方 雖云通治亦當細切病情不得籠統施用也

小建中湯 金匱 虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢酸痛手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝 三兩 去皮 甘草 三兩 大棗 十二枚 芍藥 六兩 生薑 三兩 膠飴 一升 右六味以水七升煮取

三升去渣納膠飴更上微火消解溫服一升日三服 此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反醫誤用害人甚多此咽乾口燥乃津液少非有火也

黃耆建中湯 同上 虛勞裏急諸不足者主之 於小建中湯內加黃耆一兩半餘依前法

大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹墮急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪口

乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤痛不能久立

黃耆 當歸 桂心 芍藥 人參 甘草 各一錢 半夏 炮 黑附子 炮各二錢中

右藥每服五錢加薑三片棗二枚煎服 此非金匱大建中湯金匱方入腹痛門桂枝去皮即桂心非近時所用之肉桂心也 此方兼治下焦虛寒之證不但建立中宮

炙甘草湯 傷寒論一名復脈湯 治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草 四兩 桂枝 生薑 各三兩 麥門冬 半斤 麻仁 阿膠 人參 各二兩 大棗 三十枚

生地黃 一斤 右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去渣納膠消盡溫服一升日三服 此治血脈空竭方用酒

所以和血脈凡脈見結悸者雖行動如常亦不出百日必死者復危急不能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黃丸 崔氏 虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者此名

轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黃 八兩九蒸 為度搗膏 乾山藥 山黃肉 各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉 各三兩 桂枝 附子 各一兩

右八味為末煉蜜丸如桐大酒下十五丸日再服 此方亦治脚氣乃驅邪水以益正水之法也 此方專利小便水去而陰不傷扶陽而火不升製方之妙固非一端但近入以此一方治天下之病則又

大失此方之義也

資生腎氣丸 治肺腎虛腰痛脚輕小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蟲證 於前八味丸

加車前子牛膝各一兩餘依前法

六味地黃丸錢氏 治腎陰不足發熱作渴小便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽乾舌痛齒牙不固腰膝

腿痿軟自汗便血諸血失音水泛為痰血虛發熱等證於前方去肉桂附子餘依前法此方錢氏專治小兒

當歸生薑羊肉湯金匱 治產後腹中疼痛並治腹中寒疝虛勞不足

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤 右以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多加生薑成一斤

痛多而嘔者加陳皮二兩白朮一兩如加生薑等者亦加水五升煮取三升二合服之精不足者補之以味此方是也

竹葉石膏湯傷寒論 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

竹葉二把 石膏一斤碎 半夏半斤洗 人參三兩 甘草二兩炙 麥門冬一升 粳米半升 右七味以

水一斗煮取六升去渣納粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服集驗載此方加生薑治嘔最佳 此治三陽餘熱未盡 凡大病之後必有留熱總宜清解後人俱概用

峻補以留其邪則元氣不能驟復愈者愈虛矣 亦治傷暑發渴脉虛暑病有虛熱者宜之若吐逆昏亂之證則大誤矣

脾約丸金匱即麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

麻仁五兩 大黃一斤 厚朴 薑炒 枳實 麩炒 芍藥 炒各五兩 杏仁 五兩 右為末蜜丸梧子大臨睡

用白湯送下二十丸大便利即止此潤腸之主方

四君子湯 治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱者若內傷虛熱或飲食難化須加炮薑

人參 白朮 茯苓 甘草 各二錢 右加薑棗水煎服此補脾之主方

五味異功散錢氏 調理脾胃 於四君子湯加陳皮一錢為末每服二錢白湯調服

七味白朮散 治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰者及治酒積嘔噦 於四君子湯加薑香半兩葛根

一兩木香二錢半為末每服二錢白湯調下

六君子湯 治氣虛有痰脾虛鼓脹 卽前方加陳皮半夏餘依煎法更加藿香砂仁為香砂六君子湯

獨參湯 治元氣大虛昏厥脈微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參 分兩隨證 右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減 此一時急救之法服後卽當隨證用藥

參附湯 治陰陽血氣暴脫證

人參 一兩 **附子** 四錢 右加薑棗水煎服 此亦急救之方 本方去人參加黃耆名者附湯

保元湯

黃耆 三錢 **人參** 二錢 **甘草** 一錢 **肉桂** 春夏二三分 秋冬六七分 右四味水煎服 氣血虛寒者用之純虛寒之虛證亦用此乃宋以後之方故肉桂止用二三

分以爲氣分引藥乃厚桂非桂枝也

生脈飲 治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

人參 五錢 **麥門冬** 五錢 **五味子** 各三錢 右三味水煎服 此方傷暑之後存其津液庸醫卽以之治暑病誤甚觀方下治汗故復加五味子近人不論何病每用此方收住邪氣殺人無算 此卽於復脈湯內取參麥二味以止

歸脾湯 治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參 龍眼肉 黃耆 各二錢半 **甘草** 五分 **白朮** 各二錢 **茯苓** 二錢半 **木香** 五分 **當歸**

酸棗仁 炒研 遠志 各一錢 右加薑三片水煎服 補脾有二法一補心以生脾血一補腎以壯脾氣此方乃心脾同治之法補後天以生血卽所謂調經

補中益氣湯 治陰虛內熱頭痛口渴渴表熱自汗不任風寒脈洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無氣以動動則氣高而喘

黃耆 炙 人參 雲朮 各一錢五分 **甘草** 炙一錢 **陳皮** 五分 **當歸** 一錢 **升麻** 柴胡 各五分

右八味加生薑三片大棗二枚水煎溫服 東垣之方一概以升提中氣為主如果中氣下陷者最爲合度若氣高而喘則非升柴所宜學者不可誤用也

虎潛丸丹 治腎陰不足筋骨痿不能步履

龜板 黃栢 各四兩 知母 熟地 各三兩 牛膝 三兩半 鎖陽 虎骨 當歸 各一兩

芍藥 一兩半 陳皮 七錢半 冬月加熟薑 五錢 右為末煮湯 羊肉搗為丸 桐子大 淡鹽湯下 有明文此方最為

合度後人以溫補治萎則相反矣 萎證 又有屬疾風屬外邪者此方又非所宜

資生丸 治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃饑能使飽飽能使饑神妙難述

人參 三兩 茯苓 二兩 雲朮 三兩 山藥 二兩 薏仁 一兩半 蓮肉 二兩 芡實 一兩半 甘草 一兩

陳皮 麥蘗 神麴 各二兩 砂仁 一兩半 白豆蔻 八錢 桔梗 藿香 各一兩 川黃連 四錢

白扁豆 山查 各一兩半 右十八味為細末煉蜜丸彈子大每服二丸米飲下 此方治懷孕氣阻用兼消兼 補之法意亦可取今人不論

何因為總治脾胃之藥則失製方之義也 藥味太雜全無法度姑存之以備一格

龜鹿二仙膠 大補精髓益氣養神

鹿角 十斤 龜板 五斤 以上二味另熬膏 枸杞子 三十兩 人參 十五兩 右用鉛罈如法熬膠初服

酒化一錢五分漸加至三錢空心下 精不足者補之以味而龜鹿又 能通督任填補之法此為最穩

三才封髓丹 除心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天冬 熟地 人參 各五錢 黃栢 三兩 砂仁 一兩 甘草 七錢 右為末麪糊丸桐子大

每服五十丸用薤蓉半兩切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下 此補陰氣之方虛人 老人調結者為宜

七寶美髯丹 補腎氣烏鬚髮延年益壽

何首烏 赤白雌雄 牛膝 八兩以何首烏先用米泔水浸一日夜以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆鋪飯中一層却鋪何首烏一層每 各一斤 鋪豆一層却鋪牛膝一層重重相間上鋪豆覆之以豆熟為度去豆曬乾次日如前用生豆蒸如法蒸七次去

豆破故紙 半斤酒洗淨用黑芝麻 當歸 半斤去頭 白茯苓 半斤用人乳拌 赤茯苓 半斤黑牛乳 瑤絲子 半斤酒浸一宿洗 同炒無聲為度去芝麻 尾酒洗 浸透曬乾蒸 瑤絲子 曬乾蒸曬三次

枸杞子 半斤去 右共為末蜜丸龍眼大每日空心吞二三十丸酒或米湯皆可下製法不可見載此補腎

食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行

熟地酒浸 赤石脂 巴戟去心 茯苓 牛膝酒浸 山茱萸肉 澤瀉各三兩 乾山藥二兩

五味子六兩 肉蓯蓉配浸四兩 兔絲子 杜仲炒各三兩 右藥煉蜜丸桐子大每服二十丸至三十丸食前溫

酒或米飲下服七日後令人身健體潤面光音響為驗此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪此收攝腎氣之方最為穩妥

還少丹楊氏 大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等證

山藥 牛膝 遠志 山萸肉 茯苓 五味子 楮實子 巴戟酒浸去心

肉蓯蓉酒浸一宿 石菖蒲 杜仲薑汁酒同并炒 茴香各一兩 枸杞子 熟地各二兩 右共為細末煉蜜同煮肉

為丸桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服此交通心腎之方

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地 杜仲 兔絲子另研石斛 黃耆 續斷 肉桂 牛膝 磁石煨研淨

沈香 五加皮 山藥炒各一兩 右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每服七

十丸空心鹽湯送下此降納腎氣之方

羊肉粥方養老書 治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨

羊肉二斤 黃耆一兩生用 人參二兩 白茯苓一兩 大棗五枚 粳米三合加生薑少許尤佳入核桃去雜氣亦可 右先以

肉去脂皮取精膂肉留四兩細切餘一斤十二兩以水五大盞並黃耆等煎取汁三盞去滓入米煮粥臨熟

下切肉更煮入五味調和空心服之此古入服食之方也

三才丸古 治脾肺虛欬嗽

人參 天門冬 地黃各等分 右為末煉蜜丸空心服此方與嗽證非宜必上下純虛而不嗽者可用

天王補心丹

藏道

治心血不足神志不甯津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡證

人參

白茯苓

元參

桔梗

遠志各五錢

當歸

五味子

麥冬

天冬

丹參

酸棗仁各一兩生地四兩

柏子仁一兩

右為末煉蜜丸如椒目大白湯下

秘方補心丸 治心虛手振

當歸一兩半 川芎

粉甘草各一兩

生地二兩半

遠志二兩半 棗仁炒

柏子仁去油各三兩

人參 膽星

礞砂另研各五錢

金箔二十片

麝香一錢

琥珀三錢

茯苓七錢

石菖蒲六錢

右為末餅糊丸菴豆大礞砂

為衣每服七八十丸吐津嚥下或薑湯送下 此心神恍惚而有痰者宜之

黑地黃丸 治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補腎益胃之劑也

蒼朮一斤油浸

熟地一斤

五味子半斤

乾薑秋冬一兩夏五錢春七錢

右為末棗肉丸桐子大食前米飲服百丸治

血虛久痔甚妙 按此治脫血脾寒之聖藥乾薑當泡淡炒黑用

元精丹 北方黑氣入通於腎開竅於二陰藏精於腎味鹹其類水其病在骨此藥主之

血餘自己髮及父子一本者及小壯男女髮揀去黃白色者用灰湯洗二三次以大皂角四兩槌碎煮水洗淨務期無油氣為佳將髮扯斷曬乾每洗髮一斤取用椒四兩揀去梗核於大鍋內髮一層椒一層和勻以中鍋蓋蓋固澆勿令泄氣桑柴火慢煮三升香即退火待冷取出約重四兩有餘於無風處研為細末

何首烏製法如前七寶美髯丹法取淨末一斤

黑芝麻九蒸九晒取淨末八兩

女真實四兩破故紙炒取淨末四兩

製各

八兩旱蓮草

桑甚各取淨汁熬膏各四兩

槐角子入牛膽肉百日四兩

一斤入石臼杵千餘下為丸梧子大每服六十丸空心用何首烏釀酒二三杯送下日三服 諸品皆色黑之藥專補腎血此治藥也

脫處之神方也

青州白丸方局 治一切風及小兒驚風婦人血風大人頭風

南星 三兩

白附子 二兩

半夏 七兩

川烏半兩各生用

右為細末放磁器中日曬夜露春五夏三秋一

冬十以糯米煮粥丸薑湯下風證溫酒下驚風薄荷湯下
此四味宜水研取漿澄粉曬七日
去水作丸 此治風痰之要藥也

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移

茯苓二兩 半夏一兩 枳殼半兩炒 風化硝二錢半 右為末薑汁和丸桐子大每服三十丸薑湯下

按方極和平而義精效速
方內半夏宜生研澄粉用

威喜丸 治飲食積滯蟲瘕脹滿久痢久瘧沉冷積寒

廣木香 肉豆蔻 乾薑 巴豆 甘草霜 百草霜 右前四味為末
錢各四 錢半 錢半 二十粒去皮 四十粒去皮 五錢加蜜 亦可

入百草霜同研後入杏仁巴豆霜研黃臘一兩五錢酒煮一時許酒將蠟入麻油七錢鎔化拌藥研勻乘熱

丸如燕豆大每服二三十丸
用黃蠟之蠟最精凡治積新病宜急下久病
宜緩下此方治久患寒積之證乃緩下法也

靈砂 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽和五臟助元氣

水銀一斤 硫黃四兩 右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟燄即以醋灑候研細入水火鼎醋調赤

石脂封口鐵線孔縛曬乾膠泥固濟用炭二十斤煨如鼎子烈筆蘸赤石脂類抹其處火盡為度經宿取出

研為細末糯米糊為丸如麻子大每服三丸空心聚湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至五七丸
此
墜之藥若用黑錫
丹則此方可不備

二神丸 治腰痛腎虛全不進食

破故紙 四兩炒 肉豆蔻 二兩生 右為末用大棗四十枚生薑四兩同煎糜爛去薑棗核皮研膏入藥末丸鹽

湯下
此治腎家有
寒濕之方 本方加五味子吳茱萸各二兩為四神丸

導赤散 治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作癢熱淋不利

生地 木通 甘草梢各等分 右三味水煎服
此瀉心火從
小腸中出也

亡血脫血方 治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者

生地黃十斤 右一味搗以酒一斗絞取汁令極盡去渣微火煎減半納白蜜五升粟膏一升以攪之勿止令可丸酒服如雞子一丸日三久服不已老而更少萬病除愈千金又以此二味加阿膠且草作煎服亦可用

當歸補血湯

治男婦血虛似白虎證肌熱面赤煩渴引飲脈來洪大而虛重按則微

當歸 二錢

黃耆 一兩

右二味水煎服 此補血之方

益血潤腸丸

治津液亡大腸秘老人虛人皆可服並祛風養血

熟地 六兩

杏仁 炒

麻仁 各三兩以上 三味俱搗膏和殼

當歸

橘紅 淨各二兩五錢

阿膠 肉蓯蓉 各一兩半

蘇子

荆芥 各一兩

右為末以前三味膏同杵千餘下仍加蜜丸桐子大每服五六十丸空心白湯下 此降約丸之變法

芎當膠艾湯

婦人有漏下者有半產後因續下血不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

芎藭

阿膠

甘草 各二兩

艾葉

當歸 各三兩

芍藥 四兩

乾地黃 六兩

湯主之

五升清酒三升合煮取三升去渣納膠令消盡溫服一升日三服不瘥更作

四物湯

治一切血熱血虛血燥諸證

當歸

熟地 各三錢

川芎 一錢

白芍 二錢

酒炒 右四味水煎服 此血藥之主方

鳳珍湯

治心肺虛損氣血兩虛 卽四君子湯合四物湯餘依上法

十全大補湯

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力 卽八珍加桂心陳皮

人參養榮湯

治肺肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉

人參養榮湯

治肺肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉

人參

白朮

茯苓

甘草

黃耆

陳皮

當歸各一錢

熟地七分半

白芍一錢半

桂心一錢

速志五分

五味子七分半

右十二味加薑三片大棗二枚

此即十全大補湯去川芎加五味遺志黃耆以

生心 血

柴胡四物湯

治日久虛勞微有寒熱脈沉而數

川芎

當歸

白芍

熟地

各一錢半 當用生地

柴胡一錢

人參

黃耆

甘草

半夏各三錢

右爲末水煎服

柴胡加入補藥俱不相合獨此爲宜柴胡疏通少陽調和榮衛非專於散風也

兔絲子丸

劑

治腎氣虛損五勞七傷脚膝酸疼面目黧黑目眩耳鳴心衝氣短時有盜汗小便數滑

兔絲子

鹿茸

酥炙 去毛

澤瀉

石龍芮

去土淨再 用水洗

桂枝

附子各一兩

石斛

熟地

茯苓

牛膝酒浸焙山黃肉

續斷

防風

杜仲

肉從蓉酒浸焙補骨脂

畢澄茄

巴戟

沉香

茴香

炒各七 錢五分

五味子

川芎

桑螵蛸酒浸炒覆盆子各五錢

右爲細末酒煮麩糊爲丸桐子大每服三十丸溫酒下或鹽湯下

此等方不過陰陽兼補之法泛而無統近時補劑盡如此然能多而不雜尙屬可取

從蓉兔絲子 此方不寒不熱助陰生子

肉從蓉一兩

三錢 覆盆子

蛇床子

川芎

當歸

兔絲子

各一兩 二錢

白芍一兩

牡蠣鹽水燻

烏鯽魚骨各八錢

防風各六錢

艾葉三錢

條苓五錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三四十

丸鹽下早晚皆可服

此乃婦人溫經之主方也

餌朮方

千金

生朮削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山糧得飲水神祕之勿傳

眞於朮尤佳此 服食之方也

服牛乳方

千金

能補虛破氣

牛乳三升

羸擻

半兩末 之綿裹

右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日三七日除一切氣

生地黃煎外 主補虛損填骨髓長肌肉去客熱

生地汁五升 聚膏六合 白蜜七合 酒一升 牛酥四合 生薑汁二合 紫蘇子一升以酒一升絞取汁

鹿角膠四兩 右煎地黃等六味汁三分減一納蜜調入膠末候煎成以器盛之酒和服

隔加陀藥千金 主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方此等即所謂海上奇方如紫金錠之類其所治之證皆與本草不相合而確有神驗真不可思議也

紫檀用蘇木亦可 小棗一名山石櫛 茜草 鬱金 胡椒各五兩 右為末水和納白更搗一萬杵丸好

陰乾用 諸咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下桐子大一丸旦服之諸面腫心悶因風起者煮防風湯服一

丸諸四骨酸疼或寒或熱麻黃湯一丸諸腫下部有瘡吞一丸又煮艾槐白皮湯研一丸瀦下部諸卒死冷

水服二丸諸被壓擣當心帶一丸又水研一丸三服諸被蛇及惡獸等毒以麝香如相思子研藥一丸服並

以紫檜磨汁和藥塗患處諸被鬼撓亂失心顛狂艾汁下如無青艾乾艾取汁亦可并隨身帶一丸諸傳尸

水水磨雄黃下諸消渴朴硝湯下諸淋水服二丸諸疔腫元參湯下諸卒胸膈熱苦竹葉湯下諸難產以蒜

蔣二七水煮服一丸薑黃亦得諸熱瘡大黃取汁服又以大黃和藥調塗諸吐血若因熱吐者服之並瘕因

冷吐者葛蒲汁下諸鼻中血刺刺汁下並研瀦鼻諸噎病括婁汁下諸赤白帶下以丹皮刺蕪根各二分煮

服後補法 以地榆桑螵蛸一云桑耳各二分水一升煮取一升分作二服取汁一合研藥一二丸服之諸藥

毒惡忤碎服惡瘧恆山湯下瘟疫時氣元參湯下諸諸蠶疔濕及心風心驚戰悸多忘恍惚嘔吐黃疸失音

風癩臍下絞痛霍亂吐痢小兒驚啼產後血結並宜服之

玉屏風散得效 治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜

防風 黃耆 白朮各等分或加炒糯米 右為細末酒調服 此能固表使風邪不易入加牡蠣名白朮散

盜汗方外

麻黃根 牡蠣各三錢 黃耆 人參各三兩 龍骨 枸杞根 白皮各四兩 大棗七枚

右以水六升煮取二升五合分六服

止汗紅粉

麻黃根 牡蠣各一兩赤石脂 龍骨各五錢 右爲末以絹袋盛貯如撲粉用之

當歸六黃湯 治陰虛有火盜汗發熱

當歸 生地 熟地 黃芩 黃連 黃柏等分 黃耆加倍 右水煎服止

汗方內佩可加膠參大棗

麥門冬湯_{三因} 治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慄悍滑疾過開卽出經氣失道邪氣內著故有是證

麥冬 生蘆根 竹茹 白朮各五錢 甘草 茯苓各二兩 人參 陳皮

威涎_{各三兩} 右九味每服四錢薑五片陳米一撮煎熱服不論冬夏頭汗自出謂之漏風俗名紫籠頭

二腎散 治積塊進飲食

橘紅一片 甘草四兩 鹽五錢 右以水煮爛曬乾爲末淡鹽湯下有塊加薑黃半兩同煎藥煮氣滯加

香附二兩氣虛加沉香半兩另入噤口痢加蓮肉二兩

逍遙散_局 治肝家血虛火旺頭痛目眩頰赤口苦倦怠煩渴抑鬱不樂兩肋作痛寒熱小腹重墜婦人經水

不調脈弦大而虛

芍藥酒炒 當歸 白朮炒 茯苓 甘草 柴胡各二錢 本方加丹皮梔子卽加味

逍遙散加煨薑三片薄荷少許煎服 此疎達肝脾之方

平胃散_{東垣} 治濕淫於內脾胃不能剋制有積飲痞膈中滿者

蒼朮_{五斤米泔浸七日} 陳皮 去白 厚朴_{各三斤} 甘草_{三十兩炙} 右爲末每服二錢薑湯下日三服或水煎每服五錢

如小便赤澀加茯苓澤瀉米穀不化飲食傷多加枳殼胃中氣不快心下痞氣加枳殼木香心下痞悶腹脹

者加厚朴甘草減半遇夏加炒黃芩遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉如有痰涎加半夏陳皮咳嗽飲食減少脈細加當歸黃耆脈洪大緩加黃芩黃連大便秘加芒硝三錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下本方加皂礬即皂礬平胃丸消食積最捷

五苓散金匱 治瘦人臍下有悸吐涎沫而顛眩此水也此方主之此乃散方近入用以作湯往往詳效

澤瀉一兩一分猪苓去皮 白朮 茯苓各三分 桂二分去皮 右五味為末白飲服方寸匕日三服多

飲煖水汗出愈傷寒論以此方治太陽表裏未清之證所謂裏者經與府也故此方為利膀胱水道之主藥

二陳湯局方 治肥盛之人濕痰為患喘嗽脹滿 右四味加薑三片水煎服

半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白甘草一錢 右四味加薑三片水煎服

枳朮丸 治痞積消食強胃金匱名橫朮湯治心中堅大如盤 枳實一兩 白朮二兩 右用荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十九丸加水香砂仁即香砂枳朮丸方本金匱

瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口噴煩渴 古製其法成丸 右四味同蜜酒炒為末每一錢煎服其妙在蜜酒炒

藿香七錢 山梔一兩 甘草二兩 防風四兩 右四味同蜜酒炒為末每一錢煎服

保和丸丹 治食積酒積 山查二兩 半夏姜製 橘紅 神麴 麥芽 茯苓各一兩連翹 萊菔子炒

黃連各半兩 右為末水丸加白朮二兩名大安丸此治脾胃濕火氣阻之方

加減思食丸治脾胃俱虛水穀不化胸膈痞悶腹脇時脹食減嗜臥口苦無味虛羸少氣胸中有寒飲食不下

反胃惡心及病後心虛不勝穀氣食不服常並宜服之

神麴炒黃 麥芽炒黃各 烏梅四兩 乾木瓜半兩 白茯苓 甘草錢各二 右為末蜜丸櫻桃大

神麴炒黃 麥芽炒黃各 烏梅四兩 乾木瓜半兩 白茯苓 甘草錢各二 右為末蜜丸櫻桃大

神麴炒黃 麥芽炒黃各 烏梅四兩 乾木瓜半兩 白茯苓 甘草錢各二 右為末蜜丸櫻桃大

神麴炒黃 麥芽炒黃各 烏梅四兩 乾木瓜半兩 白茯苓 甘草錢各二 右為末蜜丸櫻桃大

每服一丸細嚼白湯送下如渴時含化一丸

此收納胃氣之方用烏梅木瓜甚巧

越隸湯丸

治一切濕痰食火氣血諸鬱

香附

蒼朮

撫芎各二兩

神麴

山梔仁各二兩

右以水煎服或作丸蒸豆大每服百丸

白滾湯下

四磨飲

治七情傷感上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸空心溫服

溫汁使藥

存留胸中不即下達亦古方之法也

妙香丸

治時疾傷寒解五毒治潮熱及小兒驚癇百病

巴豆

三百十五粒去殼心腹炒熟

牛黃

龍腦

膩粉

麝香

辰砂

金箔

右合研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉勻為丸每兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走躁熱

口乾面赤大小便不通大黃炙甘草湯下一丸毒痢下血黃連湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶毒氣毒風

痰伏痞吐逆等證並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小兒百病驚癇急

慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下菴豆大二丸諸積食積煩赤煩躁睡臥不甯驚哭瀉痢並用金銀薄

荷湯下更量歲數加減如男婦因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘燥眼赤潮發經七八日至半月

日未安醫所不明證候脈息交亂者可服一丸或分作三丸亦可並用龍腦膩粉米飲調下一服取轉下一

切惡毒涎並藥丸瀉下如要藥即行用針刺一孔冷水浸少時服之其效更速

凡用蠟丸之藥既不可化開服則三分一丸之大丸不能下嚥宜作一分

霍香正氣散

治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾

厚朴

陳皮

桔梗

半夏各二兩

甘草一兩

大腹皮

白芷

茯苓

蘇葉各三兩 藿香三兩

右十味加薑棗水煎熱服 此方可治時疫

天水散 河間一名益元散 散一名六一散

治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動煩渴欲飲腸胃枯涸者又能備生下乳積

聚水薑裏急後重暑注下迫者宜之

桂府滑石 六兩 水飛 甘草 一兩 辰砂 三錢

右為細末新汲水一碗調服三錢 滑利清涼通達水道而不傷陰所以為佳

二氣丹 加 治內虛裏寒胸腹滿痛泄利無度嘔吐自汗小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰凝霍亂轉

筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

肉桂 硫黃 細研各二錢半 乾薑 泡 礞砂 另研為衣 各二錢 黑附子 製五錢

右為末麩糊丸桐子大每服三十九艾

湯或鹽湯下 此治下焦無陽積寒犯腎之證

瀉白散 錢 治肺熱咳嗽

桑皮炒 地骨皮各一兩 甘草 五錢 右為末每服一二錢入粳米百粒水煎 此方能治肺中之飲

三黃湯 本事方 治三魚實熱一切有餘火症大便秘結者

黃芩 大黃 黃連 各等分 右三味水煎服

涼膈散 局 治心火上盛中焦燥實煩燥口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘諸風痰癱發斑發狂

及小兒驚風痘瘡黑陷 連翹 四兩 大黃 酒浸 芒硝 甘草 各二兩 黃芩 酒炒 薄荷 梔子 各一兩 右為末每服

三錢加竹葉生蜜煎 此湯中上二焦之火即調胃承氣加疎風清火之品也

四物二連湯 或元 治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱

當歸 白芍 生地 各一兩 川芎 七分 黃連 炒五分 胡黃連 三分 右六味水煎服 血中有黃熱此方主

之

左金丸 治肝藏火實左脅作痛

黃連 六兩

吳茱萸 一兩

右為末作丸

吳萸仲秋用以治嘔逆吐瀉等症腸痛亦與此為害也兩屬皆屬於肝此方亦不專治左脇

龍膽瀉肝湯 方

治脅痛口苦耳聾耳腫筋癢陰濕熱癢陰腫白濁瘦血

龍膽 三分

黃芩 炒

梔子 酒炒

澤瀉 一錢

木通

車前子 各五分

當歸 二分炒 酒洗 柴胡 一錢

甘草

生地 酒炒各三分

右十味水煎服 此瀉中上焦之火純用苦味

甘露飲 方

治丈夫小兒胃中客熱牙宣齒爛目垂欲閉饑不欲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘡疹已發未發又療脾胃濕熱醉飽房勞黃疸腹滿或時身熱並宜服之

枇杷葉

熟地

天冬

枳殼

茵陳

生地

麥冬

石斛

甘草 炙

黃芩 各等分

右為末每二錢水一盞煎七分去渣食後臨臥溫服本方去麥冬加犀角名

加減甘露飲

此乃以散作飲者

清心蓮子飲 方

治心虛有熱小便赤澀

黃芩

麥門冬 去心

地骨皮

甘草 炙

車前子 各半兩

石蓮肉 去心

白茯苓 去皮 黃耆 薑炙

人參 各七錢半

右剉散每三錢另用麥冬十粒水煎八分水中沉冷空心服發熱加柴胡薄荷 亦以散作飲者

瀉熱梔子煎 方

治瞻府實熱精神不守

梔子 二十枚

竹茹 一兩

香豉 六合

大青

橘 各二兩

赤蜜 三合

右六味以水六升煮取一升

七合去渣下蜜再微煎二三沸分再服

大順散 方

治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草 三十斤

乾薑

杏仁 去皮尖

肉桂 去粗皮 各四斤

右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑

同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度篩淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩躁非

蘭 臺 軌 鏡 卷一 通治方

花水調下不拘時沸湯調亦得此治暑天內傷冷飲之證非治暑也又甘草多於諸藥八倍亦非法此等病百不得一偶用之耳而製

錄此以證其非

十精丸又名保真丸元初紀用經

束絲子人精長陰發精 甘菊花月精二味 五加皮草精益肌 栝子仁木精明目通 白朮日精長 人參藥精鎮心養驚 石斛精

治筋骨如金 鹿茸血精止腰痛 肉蓯蓉地精破癰消食 巴戟天精治精冷益智紫色者 右十味等分隨四季各加分兩為

末煉蜜丸如桐子大空心溫酒或鹽湯下二十五粒至三十粒忌牛肉生葱此世所謂丹藥也溫平補益

成煉鍾乳粉千金 主五勞七傷炊逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補

虛療脚弱冷疼下焦傷竭強陰久服延年益壽令人有子

鍾乳不拘多少 右取韶州鍾乳顏色明淨光澤者不拘多少置鍾乳於金銀器中即以大鑊著水沉金銀器

於鑊中煮之常令如魚眼沸水即添薄乳三日三夜粗厚管者七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮

滿十日最佳出金銀器中更著清水更煮經半日許即出之水色清不變則止即於磁鉢中用玉錘著水研

之每日著水攪令勻勿使著錘鉢勿使纖塵入內研覺乾潤即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上

粗者沉在下復繞鉢四邊研之狀若乳汁研指上如書中白魚膩即成澄取曝乾每服秤半兩分為三服

用溫酒調下空腹服更量病輕重加減服之亦可和為丸服之此鎮心強腎之聖藥唐人最重之

玉霜圓局 治真氣虛憊下焦傷竭膈腹弦急腰脚疼痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精二便滑

數肌陽痿久服續骨聯筋秘精堅髓安魂定魄輕身壯陽

白龍骨一斤細搗羅研水飛三次晒乾用 牡蠣火煨 紫稍花如無以水賊 牛膝酒浸炙 磁石七次紫巴戟者 澤瀉酒浸一

石斛豆一斗煮一伏時以夾袋盛曬乾 肉蓯蓉去皮酒浸一宿 茴香微炒 肉桂去皮各三兩 束絲子酒浸一伏時 鹿茸半兩酒浸一伏 韭子微炒 天雄十兩酒浸七日漏一地坑以炭燒赤速去火令淨以醋二升沃於坑候乾棄藥投天雄在內以盆合土攤之經宿後取出去皮醃 右為細末煉酒蜜各半和丸如桐子大每服三十九空

心晚食前溫酒下按此藥醞精納氣腎中陽虛者最宜亦丹藥也

礞石滾痰丸養生主論 治實熱者痰之峻劑虛寒者不可用

黃芩 大黃酒蒸各八兩 礞石一兩醞消痰過 沉香五錢 右四味為細末水丸川椒大量人大小用之溫

水一口送過咽即仰臥合藥徐徐而下半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動作飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣從上也少頃藥力至而漸逐惡物入腹下腸如響應

下結痰之主方

黑錫丹局方 治脾元久冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣兩脅膨脹重陰陽氣不升降五種水

氣脚氣上攻或卒暴中風痰潮上膈等症

沉香 附子 胡蘆巴 肉桂各半兩 茴香 破故紙 肉豆蔻 金鈴子

木香各一兩 黑錫 硫黃與黑錫結砂子各三兩 右為末同研酒煮麩糊為丸桐子大陰乾以布袋擦令光瑩每

服四十丸薑湯下此藥納上越之陽氣為醫家必備之要藥按黑錫成砂最難加水銀少許為妙

龍腦雞蘇丸局方 治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志

不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩

薄荷一斤 生地另為末六兩 黃芩 新蒲黃炒 麥冬 阿膠炒 人參為末 木通

銀柴胡各二兩水通沸湯浸一日夜絞汁 甘草一兩半 黃連一兩 右為末好蜜二斤先煮一二沸然後下生地末不住

手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火緊膏成然後加藥末和丸豌豆大每服二十丸白湯下此方與法精妙虛勞

虛煩梔子湯下肺熱黃芩湯下心熱悸動恍惚人參湯下衄血吐血麥冬湯下肝熱防風湯下腎熱黃柏湯

下以上並食後臨臥服治五淋及婦人漏下車前湯下痰嗽者生薑湯下莖中痛者蒲黃滑石水一鍾調下

氣逆橘皮湯下室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下按生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤妙此方能治血中之熱骨蒸病最宜惟薄荷太多宜減十分之九想製方之人所用薄荷乃他處之薄

荷非蘇州之鼠龍腦也鼠龍腦芳烈透腦發洩太過反有所害故醫者不可不知藥也

至寶丹

治中惡氣絕中風不語中諸物毒熱疫癘躁氣端吐逆難產悶亂死胎不下以上並用童便一合

生薑自然汁三五滴和溫化下三丸至五丸神效又治肝肺積熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩口乾不眠傷寒狂語並治之

生烏犀屑

生玳瑁屑

琥珀屑

硃砂研飛

雄黃研細各一兩

龍腦

麝香研各一分

牛黃五錢

安息香

一兩半為末酒研飛淨一兩熬膏用水安息尤妙

銀箔金箔各五十片

細研為衣

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯

煮凝成後入諸藥中和投成劑丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又治小兒諸癩急驚心熱卒中客忤不得眠煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人參湯下本事方中多人參南星天竺黃安神定魂必備之方真神丹也

蘇合香丸

瘴傳屍骨蒸殭肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣瘴癘赤白暴利痰血月閉疫癘丁腫

驚癩小兒吐乳大人狐狸等疾

蘇合香油

五錢入安

安息香一兩另為末用無灰香內

丁香

青木香

白檀香

沉香

藁撥

香附子

詞子煨取肉

烏犀屑

硃砂水飛各一兩

薰陸香

片膳麝研各五錢麝香七錢半

右為細末

入安息香煉蜜和劑圓如芡實大每四丸空心用沸湯化下溫酒下亦得此辟邪驅穢之聖方惟冰鬱太多宜減大半

瓊玉膏

治虛勞乾欬

生地黃

四斤若取鮮生

白芨茯苓十二兩

白蜜二斤

人參六六有知沉香血理粉各一錢半

右以地黃汁同蜜熬沸用絹濾過將參

茯苓細末入前汁和勻以磁瓶用綿紙十數層加箬葉封瓶口入砂鍋內以長流水沒瓶頸桑柴火煮三晝

夜取出換紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日湯調服此方別本製法各殊此為血證第一方按乾進生地四斤須三十斤方可配諸藥故修合之法當隨時隨地通也

大活絡丹

治一切中風癱瘓痿痺痰拘蹇掣疼痛癱疽流注跌撲損傷小兒驚癩婦人停經

白花蛇 烏梢蛇 威靈仙 兩頭尖俱酒浸草烏 天麻 全蝎去毒 首烏黑豆水浸

龜板 麻黃 貫仲 炙草 羌活 官桂 藿香 烏藥

黃連 熟地 大黃 木香 沈香以上各二兩 細辛 赤芍 沒藥去油另研

丁香 乳香去油另研 天南星製 青皮 骨碎補 白芷以上各一兩 防風二兩半 安息香酒熬

黑附子製 黃芩蒸 茯苓 香附酒浸焙 元參 白朮以上各一兩 松脂各五錢 牛黃另研

虎脛骨炙 當歸各一兩半 血竭另研七錢 地龍炙 犀角 麝香另研

片腦另研各一分 人參三兩 右共五十味為末蜜丸如桂核圓大金箔為衣陳酒送下頑痰惡風熱毒痰血入於經絡非此方不能透達凡

紫雪 療脚氣口中生瘡狂易叫走痺疫毒癘卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾疔痛及解諸熱毒藥邪熱卒

黃等證并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一百兩 寒水石 磁石 石膏 滑行各三斤 以上並搗碎用水一斛煮至四斗去渣

入下藥 羚羊角屑 犀角屑 青木香 沈香各五斤 丁香一兩 元參 升麻各一斤

甘草八兩 以上入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下藥 朴硝十斤 硝石四斤 二味入前藥

汁中微火上煎柳木篋攪不住手候有七升投在水盆中半日欲凝入下藥 麝香當門子一兩二錢半

硃砂三兩 上藥入前藥中攪調令勻磁器收藏藥成霜雪紫色水調下按二硝太多常用十分之一則藥力方厚丁香用二兩余所合者皆然方中黃金百

兩以飛金一萬其代之尤妙 擊火毒火穿經入臟無藥可治此能消解其效如神

解毒萬病丹一名紫 治一切藥毒瘋子鼠莽惡菌疫死牛馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴癘纏喉風痺黃疽

赤眼瘡癩熱毒上攻或目溢溺水打撲傷損癰疽發背魚臍瘡腫百蟲蛇犬所傷男子婦人癩邪狂走鬼胎

鬼氣並宜服之

山茨菰

去皮洗淨

川文蛤

一名五倍子 洗刮內擘二兩

千金子

去殼用紙包裹換紙研數十次去盡油無油成霜二兩

麝香

細研盡三錢

紅芽大戟

洗焙一兩

右各研細末和勻以糯米粥為劑每料分作四十顆於端午七夕重陽合如欲急用辰日亦得於木臼中杵數百下不得令婦人孝服人不具手足人及雞犬類見之

此秘藥中之第一方也 用藥之奇不可思議或入加珠砂雄黃各五錢尤效

酒風

頸風摩散

近效朮附湯

蒸半身不遂方

又方

卒不得語方

稀莖丸

銀液丹

黃耆桂枝五物湯

舒筋飲

虎骨四筋丸

思仙續斷圓以上

尸厥方

大黃鹽蟲丸

骨蒸方

秦朮鱉甲散

人參蛤蚧散

候氏黑散

越婢湯

地黃煎

治風謔方

開心肥健方

中風不語方

控涎丹

癩風方以上

桂枝芍藥知母湯

拔痺膏

加減四筋丸

尸厥方

白薇湯以上

治夢洩精方

救急療瘦疾方

秦朮扶羸湯

金鎖固精丸

風引湯

小續命湯

三黃湯

口眼喎僻方

一切風虛方

地黃飲子

瀝痰散

痺證方

烏頭湯

史國公酒方以上痺

煨腎丸

赤圓

桂枝加龍骨牡蠣湯

羌活補髓丸

口乾方

十味煎

金鎖丹

防己地黃湯

錄驗續命湯

風痺方

又方

竹瀝湯

稀莖散

勝金丸

寒痺熨法

獨活寄生湯

金剛丸

續骨丹

茯苓甘草湯

薯蕷丸

肘後續肝散

傳屍勞方

百花煎

金鎖正元丹

犀角紫河車丸以上
虛勞

黃連圓治湯方

文蛤散

桑根湯

消渴方

神效散

茯神湯

猪腎薺苳湯以上
消症

風

靈素

素問風論黃帝問曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲癘風或爲偏枯或爲風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其說岐伯對曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人悞慄而不能食名曰寒熱風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥其人肥則風氣不得外泄則爲熱中而目黃人瘦則外泄而寒則爲寒中而泣出風氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤腫而有瘍衛風有所凝而不行故其肉有不仁也癘者有榮氣熱腑其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢潰風寒客於脈而不去名曰癘風或名寒熱以春甲乙傷於風者爲肝風以夏丙丁傷於風者爲心風以季夏戊己傷於邪者爲痺風以秋庚辛中於邪者爲肺風以冬壬癸中於邪者爲腎風風中五臟六腑之俞亦爲臟腑之風各入其門戶所中則爲偏風風氣循風府而上則爲腦風風入係頭則爲目風眼寒飲酒中風則爲漏風入房汗出中風則爲內風新沐中風則爲首風久風入中則爲腸風飧泄外在膝理則爲泄風故風者百病之長也至其變化乃爲他病也肺風之狀多汗惡風色餅然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼噓乾善怒時憎女子診目下其色青脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃腎風之狀多汗惡風面龐然浮腫脊痛不能立立其色照隱曲不利診在臑上其色黑胃風之狀頸多汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則臄脹食寒則泄診形瘦而腹大首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可

以出納至其風日則病少愈漏風之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴不能勞事泄風之狀多汗汗出泄衣上口口中乾上澀其風不能勞事身體盡痛則寒諸風病狀各殊其多汗惡風同傷風長風傷風自汗凡七情六淫之

病必有現症能辨症斷不至誤治也 平人氣象論面腫曰風

風厥勞風 評熱病論岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥氣逆甚即名風厥 帝曰願卒

聞之岐伯曰巨陽生氣故先受邪少陰與其為表裏也得熱則上從之從之則厥也必少陰之氣上乃能厥 帝曰治之奈何

岐伯曰表裏刺之飲之服湯帝曰勞風為病何如岐伯曰勞風法在肺下其為病也使人強上冥視睡出若涕

惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬

出青黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也此等病最當證認若認以為肺癰肺癰則失之遠矣蓋肺癰乃肺生癰肺癰乃肺癰論此

即風寒入肺痰涎凝結也

酒風 病能論帝曰有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名曰酒風

偏枯 生氣通天論汗出偏沮使人偏枯

痺 靈樞熱病痺之為病身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也

金匱

夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脈微而數中風使然 寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛

寒虛相搏邪在皮膚浮為血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急病在緩處故外治必變其緩者 正氣引邪喝

僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎此辨證之要訣 寸

口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身癢而癢疹心氣不足邪氣入

中則胸滿而短氣

傷寒論

脈浮而大浮爲風虛大爲氣強風氣相搏必成癰疹身體爲癢癢者名泄風久風爲癩癩

病源

風癘 風邪之氣若先發於陰病發於五臟者其狀奄忽不知人囁裏噫噫然有聲舌強不能言發汗身軟者可治眼下及鼻人中左右上白者可治黑赤吐沫者不可治汗不出體直者七日死

口噤 諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入頰頰夾於口諸陽爲風寒所客則筋急故口噤不開也證其脈遲者生

舌強 脾脈絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脈係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

賊風 冬至之日有疾風從南方來名曰賊風其傷人也但痛不可按抑轉動傷風冷則骨解深痛按之乃應

骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物熨痛處卽小寬時有汗久不去重遇冷氣相搏結成瘰癧及偏枯遇風熱相搏乃變附骨疽也 附骨疽亦由風冷所致

風癘 口噤不開背強而直如發癰之狀其重者耳中策策痛卒然身體瘳直者死也由風邪傷於太陽經復

遇寒濕則發瘳也 此與病後瘳證之瘳不同

角弓反張 風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也

柔風 血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚皴在於陰則腹裏急柔風之狀四肢不能收裏急不能仰

不仁 由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣不宣流其狀搔之皮膚如隔衣是也

風驚悸 由心氣不足心府爲風邪所乘則驚不自安悸動不定其狀目精不轉而不得呼

刺風 由體虛膚腠開爲風所侵如刃鋒所刺也

蠱風 由體虛受風其風在於皮膚淫淫躍躍若蠶若刺一身盡痛侵傷氣血其動作如蠱毒也

鬚眉墮落 皆由風濕冷得之邪客於經絡與血氣相干使榮衛不和故面色敗皮膚傷鼻柱壞鬚眉墮落 此乃風也

惡風 風病有四百四種總不出五種黃風青風赤風白風黑風人身有八萬尸蟲若無八萬尸蟲人身不成不立復有諸惡橫病諸風害人所謂五種風生五種蟲能害於人

口喝 養生方云夜臥當耳勿得有孔風入耳中喜食口喝 口喝見金匱此又是一病當內服藥而外提出風邪

外臺

風猥退 四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰脚緩弱由分肉流於血脉久成風水之病

痺曳 肢體弛緩不收攝也人以胃氣養肌肉經脈胃氣衰損則經脈虛而筋肉懈惰故風邪搏於筋而使痺

曳也

風毒發 眼疼脚腫中指疼連肘邊率心裏悶肋膈少氣喘氣欲絕不能食

風方

酒風 藥問 治身熱懈惰汗出如浴惡風少氣

澤瀉

朮各十分 藥銜五分 合以三搗搗為後飯 藥銜即護衛一名婦心草南人呼為吳風草味苦平微寒主治風濕三指為一搗約二三錢飯後藥先為後飯 按國術

雖即鹿脚草為後飯服在飯後非飯前也凡古方須將神農本草細參藥性乃能深知其義

侯氏黑散 金匱 治大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花四十分 白朮十分 細辛 茯苓 牡蠣各三分 桔梗八分 防風十分 人參

礬石各三分 黃芩五分 當歸 乾薑 芎藭 桂枝各三分 右十四味杵為散酒服方

寸匕日一服初服二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷服六十日止即藥積在腹中不下也熱食即

下矣冷食自能助藥力 馬腹空虛則邪易留此境滿空腹便邪氣不能容

風引湯 金匱 除熱蠲癩 巢氏云脚氣宜風引湯

大黃 乾薑 龍骨各四兩 桂枝三兩 甘草 牡蠣各二兩 寒水石 滑石

赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各六兩 右十二味杵粗篩以韋囊盛之取三指撮并花水三

升煮三沸溫服一升 此乃歲時之熱非草木之品所能散故以金石重藥清其裏

防己地黃湯 金匱 治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮

防己一分 桂枝 防風各二分 甘草一分 右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤咬

咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服 此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也此等法最宜細玩凡風勝則燥又風能發火故治風藥中無純用燥熱之理

頭風摩散 金匱 大附子一枚 鹽等分 右二味爲散沐了以方寸匕已摩痰上令藥力行

越婢湯 金匱 風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大汗者主之

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 甘草二兩 大棗十五枚 右五味以水六升先煮麻黃去上沫納

諸藥煮取三升分溫三服惡風加附子一枚本方加白朮四兩即越婢加朮湯 越婢寒散之方也治風熱在表之證

小續命湯 千金 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能言奄奄忽忽神精悶亂諸風服之皆驗

麻黃 防己 人參 黃芩 桂心 芍藥 甘草 川芎

杏仁各二兩 防風一兩半 附子一枚 生薑五兩 右十二味咬咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫

納諸藥取三升分三服不瘥更合三四劑隨入風輕重虛實脚弱服之亦瘥恍惚者加茯神遠志骨節疼痛

有熱者去附子倍芍藥外臺加白朮一兩石膏當歸各二兩無防己 續命爲中風之主方因証加減變化由人而總不能會此以立法後人不知此義人自爲說流弊無窮而

中風一證達十不愈一矣人參附桂何嘗不用必實見其有寒象而後可加然尤宜於西北人若東南人則當詳審勿輕試

錄驗續命湯 治中風痲身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾薑 甘草各三兩 川芎

杏仁四十枚 右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁

勿當風并治但伏不得臥咳逆上氣面目浮腫 虛而感風則成瘧此治瘧證之主方

近效亦附湯 治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣

白朮二兩 附子一枚牛泡去皮 甘草一兩炙 右三味剉每五錢匕薑五片棗一枚水盪半煎七分去滓溫服

此治中風後屬虛之證 按古今錄驗近效二種乃唐以前之方書今全本未見外臺中引二書之方極多金匱要略宋人校書者往往以本集中載方太少故亦採取二書并千金外臺之方擇其精要者附一二方於每病之後而方首亦必不覆其所本之書古人之不苟如此令人見其方載千金匱中即以爲仲景所定之方誤矣須知之

地黃煎 干金 治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食方

生地黃汁 枸杞根汁 各二兩 生薑汁 酥 各三升 荆瀝 竹瀝 各五升 天門冬

人參各八兩 茯苓六兩 大黃 梔子各四兩 右十一味搗篩五物爲散先煎地黃等汁成膏納散

攪勻每服一匕日再漸加至三七覺利減風行必燥古人治風必用潤藥乃真訣也今人反以剛燥辛熱之品治之是益其疾也

三黃湯 干金 治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃五分 獨活四分 細辛 黃耆各二分 黃芩三分 右五味以水六升煮取二升分溫三服

一服小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣逆加入參三分悸加牡蠣三分渴加括囊根三

分先有寒加附子一枚此方專以驅風爲治

風痺方 干金 治手足不遂彊直 伏龍肝五升爲末冷水八升攪取汁飲之能盡爲善

治半身不遂方 干金 蠶沙兩石熟蒸分作直袋三枚熱盛一袋著患處如冷換熱者數易之瘥後須羊肚鱸

粳米葱白薑椒豉等爛煮熱吃日食一具十日止按此法與痺證亦良

治風懿方 竹瀝一升 治半身不遂手足拘急身冷強直不語或狂言角弓反張或食或不食或大小便不利

治風懿之法與治風痺之法不相違

口眼喎僻方 干金 治中風面目相引偏僻牙車急舌不轉

牡蠣 礬石 燒 附子泡去皮 伏龍肝等分 右四味搗篩爲散以三歲雄雞血和藥敷上預候

看勿令太過偏右塗左偏左塗右正則洗去之 又方大皂莢五兩去皮子搗篩以三年大醋和塗皴處

又方千金 治風著人面引口偏著耳牙車急舌不得轉

生地黃汁 竹瀝各一升 獨活三兩切 右三味合煎取一升頓服之即愈驅風舒經活血

開心肥健方千金

人參五兩 大猪肪八枚 右二味搗人參為散猪肪煎取凝每服以人參一分猪肪十分以酒半升和

服之一百日骨髓充盈日記千言身體潤澤去熱風冷風心頭等風月服二升半即有大效此方治老人及風燥者最宜

一切風虛方千金

杏仁九升去尖及兩仁勝乾 右一味搗為末以水九升研瀝如作粥法緩火煎令如麻浮上匙取和羹粥酒內一匙

服之每食即服不限多少服七日後大汗出二十日後汗止慎風冷猪魚雞蒜大醋一劑後諸風減差春夏

恐酸少作服之秋九月後煎之此法神妙可深祕之此即作杏酪之法服食最宜

竹瀝湯外臺 治諸中風

竹瀝二升 生薑根一升按亦當用汁 生薑汁三合 右三味分三服日三此通經絡之法

卒不得語方外臺 以苦酒煮芥子薄頸一周以衣包之一日一夕乃解蹇

中風不語方寶鑑 取龜尿點舌 取龜尿法置龜於新荷葉上以猪髮鼻內戮之立出

地黃飲子宣明 治中風舌瘖不能言足廢不能行此少陰氣厥不至名曰風痺急當溫之

熟地 山茱萸 五味子 菴蓉酒浸 石斛 麥冬 石菖蒲 遠志

茯苓 桂心 附子炮 巴戟去心等分 薄荷七葉 右十三味每服三錢生薑五片棗一枚

煎服 風氣甚而有火多痰者忌服 此治少陰氣厥之方所謂類中風也故全屬補腎之藥唐醫

稀涎散局方 治中風牙關緊急并治單蛾雙蛾

江子仁六散 牙皂三錢 明礬一兩 右先化開礬入二味待礬枯爲末每用三分吹入喉中 此急救喉

稀菴丸 本事 治口眼喎斜偏風失音不語時時吐涎久服并眼目清明髭鬚烏黑筋骨強健

稀菴 五月中取葉及嫩枝洗九蒸九曬微焙爲末煉蜜丸桐子大溫酒或米飲下三四十九丸 余按取稀菴

末爲丸尤有力此緩治之劑非一時救病之法

控涎丹 三因方

甘遂 大戟 白芥子 等分 右爲末煮糊丸桐子大曬乾臥時淡薑湯或熱湯下五七丸至

十丸 此乃下痰之方入實證實者用之

滌痰散 嚴氏 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星薑製 半夏 各二錢 枳實 茯苓 各二錢 橘紅 一錢半 石菖蒲 人參 各一錢 竹茹 七分

甘草五分 右九味加薑五片水煎服 此治心經之痰

勝金丹 本事 治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷半兩 豬牙皂角 二兩鎚碎水一升二味一處浸取汁研成膏 瓜蒂末一兩 藜蘆二兩 硃砂 五錢許研 右將硃砂末二

分與二味研勻用膏子搜和丸如龍眼大以硃砂一分爲衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐爲度得吐即醒

不醒者不治 實見其痰在上膈則可用否則提氣上升反成厥冒等疾

銀液丹 局方 治諸風痰涎纏結心膈滿悶頭痛目運面熱心忪痰唾稠黏精神昏憤及風涎潮播並宜服之

天南星 三分爲末 硃砂 半兩研飛 鐵粉 水銀 各三兩 膩粉 一兩研 黑鉛 煉十遍 三兩與水銀結砂爲水 右研

勻麩糊丸梧桐子大每服二丸同薄荷蜜湯下生薑湯亦可微爲度食後服如治風癩不計時候服用 此鎮壓

亦不可少 前方提之使出此方鎮之便下隨宜施治全在辨證之確

鸚風方 治眉落鼻壞編體生癩 出神仙感遇傳

角刺一二升 大黃九劑

右為末再煎大黃湯服方寸匕旬日即愈

青州白圓局方見
通治

痺歷節

靈素

靈周痺論黃帝曰願聞眾痺岐伯對曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也帝曰善願聞周痺何如岐伯對曰周痺者在於血脈之中隨脈以上隨脈以下不能左右各當其所帝曰善此痛安在何因而有名岐伯對曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂也經中無痰字 沫即痰也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故曰周痺

深痺 九鍼十二原篇八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間為深痺

風痺 壽夭剛柔篇病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病者命曰風痺二病之殊 聞言而定

寒痺 壽夭剛柔篇寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁

素問痺論帝問痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕

氣勝者為著痺也凡痺之客五臟者客五臟痺氣入 內而生內證矣肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脈不通煩則心下鼓暴上氣而

喘隘乾善噫厥氣上則恐肝痺者夜臥則驚多飲數小便上為引如懷腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾痺

者四肢解墮發咳嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄胞痺者少腹膀胱按之內痛若

沃以湯澁於小便上為清涕陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思

痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾諸痺不已亦益內也其風氣勝者其

人易已也帝曰痺其時有死者有疼久者有易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其

留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其食飲居處爲其病本也帝曰榮衛之氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也故循脈上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脈也故循皮膚之中分肉之間熏於膏膜散於胸腹逆其氣則病從其氣則愈不與風寒濕氣合故不爲痺帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澹經絡時疎故不通皮膚不榮故爲不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故爲痺熱其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也帝曰夫痺之爲病不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則蟲逢熱則縱

陰痺 至真要大論陰痺者按之不得腰脊頭頂痛時眩大便難陰氣不用饑不欲食咳唾則有血心如懸病本於腎

筋肌骨痺 長刺節論病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺病在肌膚肌膚盡痛名曰肌痺病在骨骨重不可舉骨髓酸痛寒氣至名曰骨痺

肉苛 逆調論帝曰人之肉苛者雖近於衣絮猶尚苛也是爲何疾岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

金匱

問曰血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之但以脈自微澹在寸口關上小緊宜針引陽氣令脈和緊去則愈 寸口脈沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即爲腎弱即爲肝汗出入水中如水傷心歷節痛黃汗出故曰歷節 少陰脈浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏即

疼痛如掣 盛人脈滿小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致 味酸則傷筋筋傷則緩
名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷
絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便為歷節也

痺歷節方

痺歷方 靈龜 治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤鉤之即以生桑炭置之坎中高下以

坐等以膏熨急類且飲美酒噉炙肉不飲酒者自強也為之三拊而已 馬膏馬脂也其性味甘平柔潤能養筋治痺故可以膏其急者白酒辣性味辛溫能通經路行血脈故可以塗其緩者桑之性平能利關節除風寒濕痺諸瘡故以桑鉤之者鉤正其口也復以生桑炭置之地坎之中高下以坐等者欲其淺深適中便於坐而得其暖也然後以前膏熨其急類且飲之美酒噉之炙肉皆助血舒筋之法也雖不善飲亦自強之三拊而已言再三摳摩其急處則病亦已矣筋骨之病再在龜殼古治多用外治今人不能知矣

寒痺熨法 靈樞 用醇酒二十升蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四種皆咬咀漬酒中用綿絮一斤細白布

四丈并納酒中置馬矢燼中 馬矢燼中者燼馬屎而燥之也 蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾後復漬以盡其汁

每漬必晬 晬周也 其日乃出乾并用滓與綿絮複布為複巾 重布為中如今之交袋所以盛貯綿絮藥滓也 長六七尺為六七巾則用生桑

炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所 寒痺所刺則知先已刺過然後熨之若不刺而徒熨恐藥性不易入則刺法亦當考明 寒復炙巾以熨之三十遍

而止汗出以巾拭身亦三十遍而止

黃耆桂枝五物湯 金匱 治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀

黃耆 芍藥 桂枝各三兩 生薑六兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升溫服七合

日三服一方有人參 此即桂枝湯以黃耆易甘草乃備虛榮弱之方固備即以讀聲

桂枝芍藥知母湯 金匱 治肢節疼痛身體羸羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂枝四兩 芍藥三兩 甘草 麻黃 附子 炮各二兩 生薑 白朮 各五兩 知母四兩

右九味以水七升煮取一升溫服七合日三服 此為陽虛之證

烏頭湯 金匱 治關節疼痛不可屈伸

麻黃 芍藥 黃耆 甘草各三兩 烏頭三枚咬咀以蠶二升

取一升去滓納蜜煎中更煎之服七合不知更服之其隨法精妙可師風寒入節非此不能通達屬經

右五味咬咀四味水三升煮

獨活寄生湯 千金 治風寒濕痺偏枯脚氣

獨活三兩 桑寄生 秦艽 細辛 歸身 生地 白芍 川芎

桂心 茯苓 杜仲 牛膝 人參

為粗末每服四錢煎服此驅風通治之方

舒筋飲 治臂痛不能舉由氣血凝滯經絡不能行所致非風非濕腰以下食前服腰以上食後服

片薑黃二錢如無以我丸代之 赤芍 當歸 海桐皮去粗皮 白朮各一錢五分 羌活 炙甘草各一錢

右七味加薑片煎服磨沖沉香汁少許

拔痺膏 用生半夏為末同廣膠等分先薑汁將膏烱調入半夏塗

史國公酒方 聖惠 治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂痿痺不仁

當歸酒洗 虎脛骨酒浸一日焙乾醋炙 羌活 鼈甲炙 草薢 防風 秦艽 牛膝

松節 晚蠶沙二兩 枸杞子五兩 茄根八兩煮 右為粗末絹袋盛浸無灰酒一斗十日取飲

半身不遂外治方 大活絡丹 指迷茯苓丸俱見通治

痿

素問

素問痿論黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脈肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿也心氣熱而下脈厥而上上則下脈虛則生

脈痿極折擊經縱而不任地也肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則脛急而

渴肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿帝曰何以得之岐伯曰肺者臟之長也為

心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴則肺熱葉焦故曰五臟因肺熱葉焦發為痿瘓此之謂也

於肺後入治痿而用燥熱之藥俱謬 惡衰太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數洩血也故本病曰大經空虛發為肌

痺傳為脈痿思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫故下經曰筋痿者生於

肝使內也有漸於濕以水為事若有所留居處相濕肌肉滯漬痺而不仁發為肉痿故下經曰肉痿者得之濕

地也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不勝火則骨枯而髓虛

故足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也黃帝曰何以別之岐伯曰肺熱者色白而毛散心熱者

色赤而絡溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉蠕動腎熱者色黑而齒槁帝曰如夫子言可矣論言治痿

者獨取陽明何也岐伯曰陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脈者經脈之海也主

滲灌鬻谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街氣街一名鬻鬻是陽明經穴在毛際兩旁鼠蹊上一寸動脈處而陽明為之長皆屬於帶脈

而絡於督脈故陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用也帝曰治之奈何岐伯曰各補其榮諸經所瀦為榮而通其俞

諸經所謂其虛實和其順逆筋脈骨肉各以其時受月則病已矣時受月王冰注謂病所生氣通天論濕熱不壞大筋

短小筋弛長綱短為拘弛長為痿

難經

五損損於骨骨痿不能起於床

痿方

金剛丸 保命 治腎損骨痿不能起於床

草薢 杜仲炒去絲 菴蓉 酒浸等分

右為末酒煮腰子搗丸如桐子大每服五七十丸溫酒下

虎骨四筋丸局方 治脚痿

宣木瓜 天麻 萆薢 牛膝各焙乾一斤 附子 虎骨各一兩酥炙 右以上各如法修製先將

前四味用無灰酒浸春秋各五日夏三冬十日取出焙乾入附子虎骨共研為末用浸藥酒打麪糊丸梧子

大每服五十丸食前鹽湯下

加減四筋丸三因 治腎肝虛熱淫於內致筋骨痠弱足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力

內菴蓉酒浸 牛膝酒浸 木瓜乾 鹿茸酥炙 熟地 五味子酒浸 兔絲子酒浸酒浸各等分 右為末煉

蜜丸桐子大每服五十丸溫酒米飲下一方不用五味有杜仲

煨腎丸保命 治腎肝虛及脾損穀不化

牛膝 萆薢 杜仲炒去絲 白茯苓 防風 兔絲子酒浸 菴蓉酒浸 葫蘆巴

破故紙等分 桂枝減半 右為末將猪腰子製如食法搗爛蜜丸如桐子大每服五七十丸溫酒送下又

治腰痛不起亦治腎虛

續骨丹本專 治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

天麻酒浸 白附子 牛膝 木鱉子各半兩 羌活半兩 烏頭一錢泡 地龍去土一分 乳香

沒藥各二兩 硃砂一錢 右以生南星末一兩無灰酒炙糊丸雞頭大硃砂為衣此加味活絡丹也舒筋最宜

思仙續斷圓本專 治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此補五臟

內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老

思仙朮 生地各五兩 五加皮 防風 米仁 羌活 川斷 牛膝各三兩

寧靜四兩 右為細末好酒三升化青鹽三兩用大木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木瓜成膏忤丸如桐子

大每服三四十丸空心食前溫酒鹽湯下膏少和酒可也 此方治下傷風濕脚風亦效 內經汁瀉之去濁取易以湯明為諸筋總會也而用藥則補腎為多以腎為筋骨之總司也從長

虎潛丸丹溪

大活絡丹

以上二書俱見通治

厥

靈素

靈龜狂篇厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脈大小皆瀋厥之象如此者則不知人矣

素厥論黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥之為

熱也必起於足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱

也帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰

氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也 解精微論厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣

并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則厥也厥則無不因陽氣在上若不能通陰納陽而用辛熱滋膩之藥貽害無窮 調經論血之與

氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死 陽明脈解論厥逆連藏則死連經則生

瘡俳煎厥 素脈解篇內奪而厥則為瘡俳此腎虛也少陰不至者厥也肝氣當治而未得故善怒善怒者名

曰煎厥 劉河間地黃引子專治瘡俳 生氣通天論陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥 此當治肝脾之逆

薄厥 素生氣通天論陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥 此當治血逆

陽明厥 素陽明脈解論陽明厥則喘而惋惋則惡人

少陰厥 素脈要精微論脈俱沉細數者少陰厥也

風厥 素評熱論汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥 此當治風

尸厥 素繆刺論五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸名曰尸厥

難經

督之為病春強而厥

金匱

問曰寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也師曰昏曰青身冷為入臟即死如身和汗自出為入腑即愈卒厥之症頗似中風一或誤治死不旋踵

傷寒論

寸口諸微亡陽諸瀉亡血諸弱發熱諸緊為寔諸乘寒者則為厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾瀉不通口急不能言戰而慄也 少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥 少陽厥陰俱病耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死此為寒厥

諸四逆厥者不可下之虛家亦然以下所論諸條皆指傷寒症手足逆冷而言非氣逆不知人之厥也 傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚勝必愈 傷寒一二日至四五日而厥者必發熱

前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤此為熱厥 凡厥者陰陽氣不相順接便為厥此致厥之由 厥者手足逆冷是也此厥之象 傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為臈厥

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩滿其後必便血熱入 病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也 傷寒發熱下利厥逆躁不臥者死 傷寒發熱下利至甚厥不止者死 傷寒五六日不結胸腹滿脈虛復厥者不可下此為亡

血下之死 傷寒脈促手足厥逆者可灸之 下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死最等之厥

下利後脈絕手足厥冷啐時脈還手足溫者生脈不還者死 病人手足厥冷脈乍結以客氣在胸中心中滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之傷寒論中厥症者係有熱有虛有其有熱互乘其變不一遺痛其非非來之正病也尤不可不潛心體察凡一病其變隨不同如此何可執一說以人命為兒戲耶

厥方

尸厥方 素問 以竹管吹其兩耳鬢鬢刺其左角之髮方一寸燔治飲以美酒燔治燒為末也

走圓金匱 寒氣厥逆主之

茯苓 半夏各四兩洗烏頭二兩細辛一兩子金右六味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食

酒飲下三丸日再夜一服不知稍增之以知為度真朱即硃砂

茯苓甘草湯傷寒 傷寒厥而心下悸者宜先治水當服此湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓二兩 桂枝二兩 生草一兩炙 生薑二兩 右四味水四升煮取二升分溫三服

尸厥方 金匱 治尸厥脈動而無氣氣閉不通故靜而死也草蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下

白薇湯本事 人平居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口瘡不能言或微知人或惡聞

人聲但如眩冒移時方寤此由出汗過多血少氣併於陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還

陰陽復通移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服

白薇 當歸各一兩 人參 甘草各一錢 右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

此竊最多而婦科皆不知無不誤治

四逆湯傷寒 下利厥逆而惡寒者主之大汗若大下利而冷厥者亦主之方見傷寒

通脈四逆湯傷寒 下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之方見通治 附加減法如面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩 嘔者加生薑二兩 咽痛者去芍藥加桔梗一兩 利止脈不出者去桔梗

加入參一兩

當歸四逆湯傷寒 手足厥冷脈細欲絕者主之方見傷寒 以上三方皆治寒極之厥與熱厥正相反須辨之

瓜蒂散 白虎湯此治熱厥二方俱見傷寒 烏梅丸此治蟲厥見蟲門 蘇合香丸此治氣厥四磨飲 至寶丹以上三方俱見通治

虛勞

金匱

夫男子平人脈大為勞極虛亦為勞 男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也 男子脈虛沉弦

無寒熱短氣裏急小便利面赤白時目瞑兼衄少腹滿此為勞使之然 勞之為病其脈浮大手足煩春夏

劇秋冬瘕陰寒精自出酸削不能行 男子脈浮弱而濇為無子精氣清冷 男子平人脈虛弱細微者喜盜

汗也 人年五六十其病脈大者痺俠背行若腸鳴馬刀俠瘦者皆為勞得之 脈沉小遲名脫氣其人疾行

則喘渴手足逆寒腹滿甚則溲泄食不消化也 脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相

搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精 古人所謂虛勞皆是純虛無陽之證與近日之陰虛火旺吐血咳嗽者正相反誤治必斃近日吐血咳嗽之病乃是血證有似虛勞其實非虛勞也

病源

夫虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰瘦勞六極者一曰氣極

二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰肌極六曰精極七傷者一曰陰寒二曰陰萎三曰陰急四曰精連連五日

精少陰下濕六曰精清七曰小便苦數臨事不卒

五蒸一骨蒸根在腎二脈蒸根在心三皮蒸根在肺四肉蒸根在脾五內蒸亦名血蒸必外寒而內熱把手附

骨而內熱甚在五臟六腑 又有二十三蒸各有證名

肺勞者短氣面腫鼻不聞香臭 肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明 心勞者忽忽

喜忘大便苦難或時鳴漚口內生瘡 脾勞者舌苦直不能咽唾 腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而

有餘瀝羣內痛陰濕羣生瘡小腹滿急 此乃五臟之勞

虛勞方

桂枝加龍骨牡蠣湯 金匱 失精家少腹弦急陰頭寒目眩 一作頭眩 髮落脈極虛芤遲為清羸亡血失精脈得諸

芤動微緊男子失精女子夢交此湯王之

桂枝二兩 芍藥 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 龍骨 牡蠣各三兩 右七味煎水

七升煮取三升分溫三服 脈極虛孔遲乃虛寒之證故用桂枝及建中等湯若嗽血而脈數者乃陰之證與此相反誤用必斃

薯蕷丸 金匱 虛勞諸不足風氣百疾主之

薯蕷三十分 當歸 桂枝 麴 乾地黄 豆黃卷 各十分 甘草 二十分 人參 十分

芍藥 芎藭 白朮 麥門冬 各六分 柴胡 桔梗 茯苓 各五分 阿膠 七分

杏仁 六分 乾薑 三分 白斂 二分 防風 六分 大棗 百枚 右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空

腹酒服一丸一百丸為劑

大黃虜蟲丸 金匱 五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾

血肌膚甲錯兩目暗黑此丸主之

大黃十分 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩 乾地黄十兩 蟅蟲一升

乾漆一兩 蠱蟲一升 水蛭百枚 蜜蟲半升 右十二味為末煉蜜為丸小豆大酒飲服五丸日三

服血乾則納而不散非草木之品所能下必用食血之蟲以化之此力專治瘧血成勞之證瘵不除則正氣永無復理故去病即所以補虛也

治夢洩精方 千金

韭子一升 右為末酒服方寸匕日三服立效

羌活補髓丸 千金 療髓虛腦痛不安臆腑中寒

羌活 川芎 當歸各三兩 桂心二兩 人參四兩 酥一升 大麻仁 二升

棗肉 一斤 牛髓 羊髓各一升 右十味先篩前五味為散後用棗肉麻仁打勻再下二髓及酥重

湯煮之為丸桐子大酒服三十丸日再服

肘後癩肝散 金匱 治冷勞又主鬼疰一門相染

獼肝一具炙乾末之 右水服方七日三服

骨蒸方千金 療虛熱骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息兩鼻孔張日四服

龍膽

黃連

括囊各一兩

梔子二十七枚擘

芒硝半兩

青楸子

苦參

大黃

黃芩

芍藥各半兩

右十一味搗篩為末煉蜜和丸如梧子大飲服十九日二服以知為度此為純寒之劑實熱者宜

者宜之

救急療瘧疾方外臺

炙甘草三兩

右一味小便煮服用小便得此方亦治咽痛

口乾方外臺

療脾熱脇痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂

石膏碎綿裹

生地汁

赤蜜各一升

淡竹葉五升切

右四味水一斗二升先煮竹葉取七升去滓煮石

膏取一升五合去滓納地黃汁煮二三沸下蜜煎三升細服

傳扁勞方外臺

獼肝一具破乾炙

鱉甲一枚炙

野狸頭一枚炙

紫菀四分

漢防己一兩牛

蜀漆洗

麥冬

甘草各一兩

右藥搗篩已成煉羊腎脂二分合蜜一分烱令和丸桐子大每服十九丸加至十五丸日再其藥合和分一

分懸門額上一分著頭邊一分繫臂上先服頭邊次服臂上次服門上大驗

秦朮龍甲散 實鹽 治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣粗困倦盜汗

鱉甲

柴胡

地骨皮各一兩

秦朮

知母

當歸各五錢

右為末每半兩入烏梅一

枚青蒿五葉同煎臨臥空心溫服

秦朮扶羸湯直指

治肺痿骨蒸勞嗽聲啞自汗體倦

鱉甲

秦朮

當歸

人參各一錢半

柴胡二錢

地骨皮

紫菀

半夏

甘草各一錢 右九味加薑煎服

十味煎外壺 治凡病在胸膈上者宜飽服而在夜肺既居上則病在上宜服丸夜宜合桑白皮汁等服

桑白皮一升 地骨皮三升 二味以水七升煮取三升去渣澄清 生地汁五升 麥冬汁二升

生薑汁一升 竹瀝 生葛根汁各三升 白蜜一升 牛酥三合 大棗一升 右十味先煮

生地以下葛根以上和煎減半則內桑皮等和煎之三分減一則內酥蜜聚等藥攪之勿停手如稠飴狀每

服胡桃大一枚哈之滋潤肺經此為第一薑汁宜用少許

百花煎類方奇要 治吐血咳嗽補肺

生地汁 藕汁 黃牛乳各一升 胡桃十枚 黃明膠炙煉末半兩阿膠尤佳

大棗二十一枚煮去皮核研爛 清酒一升 秦朮牛兩末秦朮味太苦當用濃荷或蘇子汁宜減去大半 杏仁三兩研細

漫火養成入磁器服一匙米飲調下日三方內薑汁太多宜減去大半 右藥煎減半入好蜜四兩

人參蛤蚧散雙鑑 治二三年間肺逆喘嗽咯吐膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃 杏仁五兩 甘草炙三兩 人參 茯苓 貝母 知母

桑白皮各二兩 右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

金鎖固精丸 治夢遺滑精

芡實 蓮鬚 葵藜各二兩酥炙 龍骨一兩酥炙 牡蠣煨四兩 右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下

金鎖丹本事方 治夢泄遺精關鎖不固

茴香 葫蘆巴 破故紙炒 白龍骨各一兩 木香一兩五錢 胡桃三十個研青 羊腎三對切開用鹽燻炙熱搗膏

右為末和二膏研勻酒浸煮熟丸桐子大每服三五丸鹽湯下

金鎖正元丹局方 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節酸疼精神昏困手足多冷心忪盜汗飲食減少小

便滑數遺精白濁

五倍子 茯苓各八兩 補骨脂十兩 紫巴戟去心 葫蘆巴炒 菴蓉洗淨各一斤 硃砂別研 龍骨各三兩

右為細末入研令勻酒糊為丸如桐子大每服十五丸至二十丸空心食前溫酒或鹽湯下

犀角紫河車丸寶鑑 治傳尸勞三月必平復其餘症即消服神效

紫河車一具米泔浸一宿洗淨焙乾 鱉甲酥炙 桔梗 胡黃連 白芍 敗鼓皮心醋炙

大黃 貝母 龍膽草 黃蘗子 知母各二錢半 芒硝 犀角各 硃砂各二錢研

右為末蜜丸桐子大硃砂為衣空心溫酒服二十丸如膈熱食後服重病不過一料

小建中湯金匱 黃耆建中湯同 炙甘草湯金匱 附方 大建中湯 八味地黃丸同上 人參養榮湯方 瓊玉膏

生地黃煎外臺 四物二連湯元戎 以上九方俱見通治

消證附強 靈素

靈師傳篇胃中熱則消穀令人懸心饑善 素氣厥論心移寒於肺肺消肺消者飲一洩二死不治 陽陰別

論二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息賁死不治 氣厥論心移熱于師傳為腸

消

金匱

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱饑而不欲食食即吐就下之不肯止此證不可誤認就厥

病源

夫消渴者渴不止小便多是也其病變多發癰疽此坐熱氣留于經絡血氣壅滯故成癰膿 內消病者不渴而小便多是也利多不得潤養五臟衰則生諸病由腎盛之時恣意快情致使虛耗故不渴而小便多也

強中病者莖長興盛不痿精液自出由少服五石熱住於腎中下焦虛少壯之時血氣尙豐能制於五石及至
年衰血氣減少腎虛不復能制津液若精液竭則諸病生矣

消證方

文蛤散金匱 渴欲飲水不止者主之 傷寒論治心煩肉上粟起意欲飲水反不渴者

文蛤五兩 上一味杵爲散以沸湯五合和服方寸匕 欲飲而不渴乃胸中有水而口乾也

消渴方千金

栝蘘根 生薑 麥冬 蘆根切各二升 茅根切三升 右五味咬咀以水一斗煮取三升分三

服此清胃之主方

茯神湯千金 洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴者

茯神二兩 栝蘘根五兩 生麥冬五兩 萎蕤四兩 知母四兩 生地黃六兩 小麥二升 大棗二十枚

淡竹葉切三升 右九味以水三斗煮小麥竹葉取九升去渣下藥煮取四升分四服不問早晚但渴即進

治渴患熱者

黃連圓治渴方千金

黃連一斤 生地黃一斤 右二味絞地黃汁浸黃連出曝燥復內汁中合汁盡乾搗末蜜丸桐子大服

二十九日三食前後無拘亦可爲散酒服方寸匕 此治胃中有伏火之方製法神妙 本事方用冬瓜汁收入黃連內爲丸即以冬瓜汁煎大麥仁湯下亦仿此義則知多吃苦瓜亦妙也

桑根湯千金 主日飲一石水方

桑根白皮切五升入地三尺者長冬令黃黑 右一味水煮以味濃爲度適寒溫任性飲戒食鹽

神效散本事 治渴疾飲不止

白淨石 蛤粉 蟬蛻各等分 右細末用鯽魚膽七個調三錢服不拘時候神效

猪腎薺苳湯 千金

強中之病莖長興盛不交精液自出消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服

猪腎一具

大豆一升

薺苳三兩

人參

石膏各三兩

茯神

磁石綿裹

知母

葛根

黃芩

甘草

括蠶根各二兩

以水二升原缺

合一劑病勢漸歇即止

腎氣丸 見通治

白虎人參湯乾裂方 見虛勞

目錄

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

桂枝加芍藥湯

大青龍湯

桂枝加桂湯

小柴胡湯

大柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆散

四逆湯

四逆加入參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加豬膽汁湯

當歸四逆湯

理中丸及湯

附子瀉心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃黃連瀉心湯

白通湯

白通加豬膽汁方

豬膚湯

甘草湯

甘桔湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

旋覆代赭湯

苦酒湯

枳實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒裨散

豬膽導法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方

竹皮湯

療食勞方

治結胸灸法

鵝石散

鱉甲散

升麻鱉甲湯

升麻鱉甲去雄黃蜀椒方

梔子仁湯

還陽湯

萎蕤湯

白虎加蒼朮湯

黑膏以上傷寒

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括萇牡蠣散

參蘇飲以上感冒

凝雪湯

理中丸

廣濟高良薑湯

括萇桂枝湯

茯苓戎鹽湯

胞轉方

治石淋方

八正散

豬肚丸

百合滑石散以上百合

四時加減柴胡方

大黃湯

霍亂轉筋入腹

霍亂轉筋入腹方

麻黃加獨活防風湯以上

豬苓湯

療小便難方

治熱淋方

家韭子丸

縮泉丸

九味羌活湯

天行熱病方

蘇身法以上寒熱

又方

棗黃湯

括萇瞿麥圓

治諸種淋方

石葦散

四汁飲

治小便失禁方

治尿淋以上癰閉利淋

敗毒散

苦參湯

五苓散

又方

灸法以上霍亂

滑石白魚散

石葦散

蘇蜜煎

牛膝膏

夜多小便方

傷寒

素問

素論論篇帝曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者，何也？岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病。熱雖盛，不死，其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其故。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強。二日，陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱，目疼而鼻乾，不得臥也。三日，少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於臟者，故可汗而已。四日，太陰受之，太陰脈布胃中，絡於噎，故腹滿而噎。乾五日，少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日，厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病，榮衛不行，五臟不通，則死矣。陰脈皆連五臟，故曰入臟，非風寒直入臟中也。其不兩感於寒者，七日，巨陽病衰，頭痛少愈。八日，陽明病衰，身熱少愈。九日，少陽病衰，耳聾微聞。十日，太陰病衰，腹減如故，則思飲食。十一日，少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而噤。十二日，厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其臟脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。水熱穴論帝曰：人傷於寒而傳為熱，何也？岐伯曰：夫寒甚則生熱也。

兩感 素論論篇帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿。二日則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱不欲食，譫言。三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥水漿不入。不知人。六日死。帝曰：五臟已傷，六腑不通，榮衛不行，如是之後三日乃死，何也？岐伯曰：陽明者，十二經脈之長也。其血氣盛，故不知人。三日其氣盡，故死。兩感則表裏同病。

溫病暑病 素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止陰陽交 素評熱病論帝問曰有病溫有汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病為何岐伯曰病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

遺證 素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈陰陽俱盛而緊瀉熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沉之散瀉溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而不下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之而愈

者身熱汗閉燥火內結津液乾枯陰風欲竭也此以有邪處為虛邪處為盛

陽虛陰盛者身傷而汗自出寒氣在內而未出也陽盛陰虛

傷寒論六經脈證

太陽病脈浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受病也其脈上連風府故頭項痛腰脊痠 發熱汗出惡風脈緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒 發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊惡寒未離太陽陽明病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱長

者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能臥 陽明外證身熱汗自出不惡寒反惡熱也邪氣已離太陽

故不惡寒陽明脈大以上皆陽明之經病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明此三條皆傳斷之證太陽陽明者脾約是也 少陽陽明者

發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也 陽明之為病胃家實也此正陽明陽明居中土也萬物所歸無所復傳

始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也 尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽中風

兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽頭痛發熱與太陽同而脈之弦細獨

異三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗內熱已極傷寒六七日無大熱外熱輕則內熱重其人燥煩者此為陽去入

陰也若熱輕而不煩躁則病欲退矣傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛 尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於嗑故腹

滿而嗑乾 傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰同一太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉細乃太陰病脈浮緩乃太陰本脈也自利不渴者屬太陰以臟

有寒故也當溫之宜服四逆輩少陰自利而渴熱入下焦也此自利而不渴寒入中焦也

少陰之為病脈微細但欲寐也微氣行於陽則寤行於陰則寐少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也

尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止 尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮 厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

傷寒傳足不傳手經脈此本關節處最為明晰

足太陽脈起於目內眥從頤下後項連風府行身之後終於足其外證頭疼項強腰痛骨節痛惡心發熱惡

寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤 小便不利者當利自利者不可利利之引熱入膀胱其人如狂不

可下下之爲結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌穴故其證目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌 若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便祕腹滿此正陽明胃腑病也宜下之

足少陽脈起於目銳眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨證加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰 脈弦數者是本經證

足太陰爲三陰經首其脈始於足大指上行至腹絡於喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪入脾也嘔吐脾氣不和也自利挾熱下利也咽乾脾脈連喉也頭不疼陰脈至頸而還也身微熱手足溫表邪解而傳入裏也身目俱黃標病宜平熱腹滿硬痛渴而喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當分寒熱施治足少陰脈始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心膈行身之後也其病手足冷乍溫身不熱者標病二便不通舌乾口燥者本病此經本熱而標寒也宜急下以存腎水雖自利此是飲湯水所致不可疑爲寒也初病大熱至此變爲厥冷者是熱深厥亦深也急下之至陰又難拘定法因分直中者寒證傳經者熱證大抵六經中惟此難辨有直中眞陰者有夾陰中寒者有夾陰傷寒者有虛陽伏陰者有陰極發躁者有漏底傷寒者前二證身不熱厥冷全似少陰傳經而冷者後四證身熱面赤又全似陽大要口燥舌乾渴而譫語大便實者傳經熱證也足冷嘔吐瀉痢不渴或惡寒腹痛者直中眞寒證也

足厥陰脈始於足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇與督脈會於巔頂行身之側也其證煩懣瘧瘧滑渴舌捲譫語大便不通而頭疼手足冷乍溫者此是陽經傳來熱邪本病宜急下若發熱惡寒狀如瘧疾此是熱邪在經傳病宜和解若不嘔便清當有大汗至而自愈 頭疼者以督脈會於巔頂故也 大抵熱深厥亦深

則舌捲囊縮肝主筋也陰寒冷極亦捲縮須以口渴不渴足冷不冷脈沉實沉細別之厥陰屬熱者甚多使人皆指為極寒概用溫藥誤人無算誠誤傷寒論自知

傷寒六經治法方諸方精義俱詳余所著傷寒類方中不更贅

桂枝湯俱本傷寒論治太陽中風頭疼發熱汗出惡風

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩炙生薑三兩大枣十二枚右五味咬咀以水七升微火煮取三升

去滓適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身熱微似有汗者益佳不可令如水流瀉病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小促其

間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至

二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物此服外感風寒之藥服法俱當如此

麻黃湯 治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩炙杏仁七十個湯右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸

藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須嚔粥餘如桂枝法將息

桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢

桂枝一兩十六芍藥酒洗生薑切甘草炙麻黃各一兩大枣四枚杏仁二十四個湯浸去皮尖及兩仁者右七

味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈

桂枝加葛根湯 治太陽病項背強八九反汗出惡風

葛根四兩芍藥 甘草各二兩生薑三兩切大枣十二枚桂枝三兩右六味以水一斗先煮葛

根減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須嚔粥餘如桂枝法本方無麻黃若加麻黃則為葛根湯矣陳無已

本說

葛根湯 治太陽病項強無汗惡風者又治太陽陽明合病自下利者

葛根四兩 麻黃^{三兩 去節} 桂枝^{二兩 去皮} 芍藥二兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗^{十二枚} 右七味咬咀

以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須噉粥餘如桂枝法將息及禁忌

葛根黃芩黃連湯 治太陽證誤下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根半斤 甘草^{二兩} 黃芩各二兩 黃連三兩 右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升去渣分溫再服

桂枝加芍藥湯 治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也此主之大實痛者加大黃一兩即桂枝加大黃湯

桂枝三兩 芍藥^{六兩 酒洗} 甘草二兩 生薑三兩 大棗^{十二枚} 右五味咬咀以水七升微火煮取三升去渣適寒溫服一升

大青龍湯 治太陽中風脈浮緊惡寒發熱身疼不汗出而煩躁者

麻黃^{六兩 去節} 桂枝^{二兩 去皮} 甘草二兩 杏仁^{四十枚 去皮尖} 生薑三兩 大棗^{十二枚} 石膏^{如雞子 大碎} 右七味以水

九升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

桂枝加桂湯 治燒針令其汗針處被寒核起微赤必發奔豚灸其核上各一壯與此湯 即桂枝湯加桂二兩

小柴胡湯 治少陽中風往來寒熱胸脇苦滿心煩喜嘔腹脹心悸頭汗出舌上胎白及婦人熱入血室等證

柴胡半斤 黃芩 人參 甘草各三兩 半夏半升 生薑三兩 大棗^{十二枚} 右七味一斗

二升煮取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服 若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實一枚 若渴者去半夏加人參合前成四兩半括薑根四兩 若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩 若脇下痞去大

黃芩各三兩 黃連三兩 右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升去渣分溫再服

此即桂枝湯加芍藥一倍即另成一方面而以之治太陰證分兩輕重之所關如此 太陰病必腹滿

此風寒兩傷之方 按載大青龍何以不載小青龍蓋小青龍治傷寒不解心下有水氣之證非傷寒正方也

此風寒兩傷之方 按載大青龍何以不載小青龍蓋小青龍治傷寒不解心下有水氣之證非傷寒正方也

此風寒兩傷之方 按載大青龍何以不載小青龍蓋小青龍治傷寒不解心下有水氣之證非傷寒正方也

此風寒兩傷之方 按載大青龍何以不載小青龍蓋小青龍治傷寒不解心下有水氣之證非傷寒正方也

竇加牡蠣四兩 若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩 若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫

覆取微汗愈 若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩此方加減法須細審

大柴胡湯 治傷寒十餘日柴胡證仍在嘔而心下急心中痞硬而痢熱結在裏往來寒熱等證

柴胡半斤 黃芩 芍藥各三兩 半夏半升洗 生薑五兩切 枳實四枚炙 大棗十二枚 大黃二兩

右八味以水一斗二升煮取六升去渣再煎溫服一升日三服

大承氣湯 治傷寒十餘日吐下後不解哺時發潮熱獨語如見鬼狀尋衣摸牀胃中有燥屎也此下之

大黃四兩 厚朴半斤去皮 枳實五枚炙 芒硝三合 右四味以水一斗先煮二物取五升去渣納大黃煮

取二升去渣納芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服胃中非存燥屎之故此言胃中者指足腸明言即所謂胃中實是也乃腸胃之總名

小承氣湯 治汗多微發熱不惡寒或小便數而大便鞭識語者與此湯微和胃氣

大黃三兩 厚朴二兩去皮 枳實三枚炙 右三味以水四升煮取一升二合去渣分溫二服初服湯當更衣

不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯 治胃氣不和惡寒但熱腹微滿而煩與此湯

大黃四兩去皮 甘草二兩炙 芒硝半斤 右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去渣納芒硝更上

火微煮令沸少少溫服不惡寒乃外邪已盡方可下此仲景之要法

桃核承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝解外

外解已但小腹急結此主之

桃仁五十個 桂枝二兩去皮 大黃四兩 芒硝 甘草二兩各 右五味以水七升煮取二升半去渣納

芒硝更上火微沸下火先令溫服五合日三服當微利

抵當湯 治傷寒六七日少腹硬小便自利其人如狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭

各三十個
去翅足 桃仁 三十個
去皮尖

大黃 三兩
酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去渣溫服一升不

下再服

抵當丸

治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥

水蛭 二十個

蟲蟲二十個

桃仁 二十個
去皮尖

大黃 三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

平時當下血若不下者更服

大陷胸湯

治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內陷心下有鞭舌上燥渴小有潮熱心上至少腹痛不可近

大黃 六兩
去皮

芒硝一升

甘遂二錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去渣納芒硝煮一兩沸納甘

遂末溫服一升得快利止後服

結胸乃水飲為患傷難論
云此為水結故用甘遂

大陷胸丸

治病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早

故也

大黃半斤

葶藶子

芒硝

杏仁 去皮尖
黑各半升

右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散取

如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

小陷胸湯

治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連一兩

半夏半升洗

栝蘆實 大者
一個

右三味以水六升先煮栝蘆取三升去渣納諸藥煮取二升去

渣分溫三服

白虎湯

治脈滑而厥裏有熱也 又治三陽合病腹滿身重譫語遺尿自汗出者

知母六兩

石膏一斤碎

甘草二兩

粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去渣置服一升日三

服 陽極於內強散則路
遠故從小便去之

麻黃附子細辛湯

治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃去節 細辛各二兩 附子一枚炮去皮破八片 右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納藥煮取三升去

淨溫服一升日三服

四逆散 治少陰傳經熱邪四逆或欬或悸或小便利或腹中痛或泄痢下重者

甘草炙 枳實破水漬炙乾 柴胡 芍藥各十分 右四味搗篩白飲和服方寸匕日三服 欬者加五

味子乾薑各五分并主下痢 悸者加桂枝五分 小便利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一枚炮

令拆 泄痢下重者先以五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升半分溫再服

熱邪入深乃見四逆誤認為寒貽害匪細 薤白能治下重以能洩大腸之氣也

四逆湯 治脈沉體痛溫欲吐下利清穀手足厥冷內寒外熱脈微欲絕等證

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片 右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人

可大附子一枚乾薑三兩 四逆湯不可輕用一症不具即當細審必諸症皆全方可決用無疑

四逆加入參湯 治痢後亡血 本方加入參

通脈四逆湯 治下痢清穀脈絕汗出而厥 本方加乾薑一倍

通脈四逆加豬膽汁湯 治汗出而厥脈絕拘急 本方加豬膽汁

當歸四逆湯 治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因爾腸鳴者

當歸 桂枝 芍藥各三兩 細辛二兩 大棗二十枚 甘草 通草各二兩 右七味以水

八升煮取三升去渣溫服一升日三服 此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主

理中丸及湯 治霍亂頭痛發熱身疼痛寒多不用水者理中湯若大病瘵後喜睡久不了了胃上有寒者用

人參 甘草炙 白朮 乾薑各三兩 右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和

一丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升渣溫服一升日三服四蠶乃溫下焦中焦之法理中爲溫上焦中焦之法各有部位也

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出
大黃二兩 黃連 黃芩各一兩 附子一枚炮去皮破別煮取汁 右四味切二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去

渣納附子汁分溫再服治上焦用生藥放漬而不煎附子能回陽止汗

梔子鼓湯 治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

梔子十四枚擘 香鼓四合綿裹 右二味以水四升先煮梔子得二升半納鼓煮取一升半去渣分爲二服溫進

一服得吐者止後服邪在至高之分以此吐之所謂在上者因而越之也此吐方之最和平者

真武湯 治太陽汗出不解仍發熱心悸頭眩身瞤動振振欲倒地者 又治少陰至四五日小便不利四肢

沉重疼痛自下痢此爲有水氣

茯苓 芍藥 生薑各三兩切 白朮二兩 附子一枚炮去皮破八片 右五味以水八升煮取三升去渣溫

服七合日三服此治水瀉之正方 若欬者加五味半升細辛乾薑各一兩 若小便利者去茯苓 若下痢去芍藥

加乾薑二兩 若嘔者去附子加生薑足前成半斤

大黃黃連瀉心湯 治傷寒脈浮緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃二兩 黃連一兩 右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去渣分溫再服凡治下焦之福劑當多服以熱爲主 治上焦之瀉劑當不煎以生爲

主 此亦治至高之熱邪故亦用生藥

白通湯 治少陰下痢

葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚生用去皮破八片 右三味以水三升煮取一升去渣分溫再服此爲寒痢

白通加豬膽汁方 治服白通湯利不止汗出而厥逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生 卽白

通湯煎成納人尿五合猪膽汁一合分溫再服

猪膚湯 少陰病下痢咽痛胸滿心煩者此主之

猪膚一斤 右一味以水一斗煮取五升去渣加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服引少陰之虛火下達

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與桔梗湯

甘草二兩 右一味以水二升煮減半去渣溫服七合日二服 桔梗湯加桔梗一兩煎法同此方制少陰在上之火

瓜蒂散 治太陽病胸中痞鞭氣上沖胸不得息此胸中有寒也又或手足厥冷脈乍緊心中煩滿不能食病

在胸中並當吐之

瓜蒂熬 赤小豆各一分 右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作

稀糜去渣取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後厥逆寸脈沉遲下部脈不至咽喉不利吐膿血泄痢為難治主之

麻黃二兩半去節 升麻各一兩 當歸各一分 知母 黃芩 葶藶各十 石膏碎綿裹 白朮

乾薑 芍藥 天冬去心 桂枝 茯苓 甘草炙各六銖 右十四味以水一斗先煮

麻黃一兩沸去上沫納諸藥煮取三升去渣分溫三服令汗出愈

旋覆代赭湯 治傷寒汗出吐下後心下痞鞭噫氣不除此主之

旋覆花三兩 人參二兩 生薑五兩切 半夏半升洗 代赭石一兩十二枚 甘草三兩炙 右七味以水

一斗煮取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡聲不出者

半夏洗破十 雞子一枚去黃納 右二味納半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去渣少少

含嗽之不差更作三劑服之製法奇

枳實梔子豉湯 治大病瘵後勞復

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 豉一升綿裹 右三味以清漿水七升空煮取四升納枳實梔子煮取二升下豉更

煮五六沸去渣溫分再服覆令微似汗若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚大病後勞復瘵必作虛治乃純用降氣清火之品當細參之

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者方見通治 壯火食氣 故少氣者多屬火症

燒視散 治陰陽易病其人身重少氣少腹裏急陰中拘攣熱上衝胸頭重不舉眼中生花膝脛拘急

右取婦人中視近陰處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視當燒

灰

豬膽導法 以豬膽汁加醋納穀道中

蜜煎導法 以蜜煎老捩作指大一條納穀道中以手按之

右二方俱治傷寒大發汗小便利津液內竭大便雖鞭不可攻之用此法

治男子新病起房內復者方千金 取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方千金 取所交接婦人衣服以覆男子立愈

竹皮湯 外症 治交接勞復卵腫腹痛便絕欲死

青竹皮一升 右一味水三升煮五六沸絞汁頓服立愈此方范汪亦治大便後勞復

療食勞方 外症 杏仁五十枚 右一味以酢二升煎取服之取汗則差

治結胸灸法 本事方

巴豆十四枚 黃連七寸連皮用 右搗細末用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯

數以病退為度纒灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也此法最穩凡胸中病俱可依此法外治

鵲石散 本事方 治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋

黃連 寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草汗調服

驚甲散活人書

治傷寒八九日不瘥名曰壞證傷寒不能治者宜此療之

升麻 前胡去蘆

烏梅去核

枳實炒

犀角鎔

黃芩各半兩

生地黃切兩

甘草一分炙

驚甲去甜米醋炙赤黃碎用牛兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去渣溫服

升麻驚甲湯金匱

陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治此湯主之

升麻二兩

當歸一兩

蜀椒炒去汗

甘草二兩

驚甲手指大一片炙

雄黃半兩研

右六味以水四升煮取一

升頓服之老小再服取汗

升麻驚甲去雄黃蜀椒方

陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛日五日可治七日不可治升麻驚甲湯

去雄黃蜀椒主之 肘後千金方陽毒用升麻湯無驚甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人陽毒升

麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒驚甲雄黃蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之疑誤活人書加犀角等四味頗切當

梔子仁湯活人書

治陽毒傷寒壯熱白節疼痛

梔子仁一兩

柴胡一兩半

升麻

黃芩各二兩

赤芍

大青各一兩

石膏二兩

知母一兩

甘草半兩炙

杏仁二兩湯浸去皮尖及雙仁者麩炒微黃

右件搗為粗末每服抄四錢以水一盞入生薑半分豉一百粒煎至

六分去渣不許時候溫服

還陽湯本事方

治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛 用硫黃末新汲水調下良久或寒一起或熱一起更看

緊慢再服一二錢則為汗出差

萎蕤湯活人書

治風濕兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉咽乾舌強胸內疼痞滿腰背強

萎蕤三分

石膏一兩碎

白薇

麻黃湯泡焙

川芎

葛根生者可用

大羌活去蘆

甘草炙

杏仁去皮尖雙仁

青木香一分冬一兩始

春用半兩炒

麻黃湯泡焙

川芎

葛根生者可用

大羌活去蘆

甘草炙

此清散之劑可治時疫

白虎蒼朮湯

本方

治濕溫多汗

知母五兩

甘草二兩

石膏一斤

蒼朮

粳米各三兩

右為末每服四錢水一盞半煎至七分

去渣取汁溫服

黑膏

潘人

治溫毒發斑

好鼓一升

生地黃牛斤切

右二味以猪膏二斤合露之煎令三分減一統去渣用雄黃麝香如大豆者

內中絞和盡服之毒便從皮中出則愈

凡外感之症治之得宜六七日間無不愈者過期不愈皆治之不得其法所以或傳經或變病種種現症不可窮極以致治法千端藥訟不息故仲景傷寒論治傷寒之正方不過

數首餘皆誤治之變症故取治雜病之方隨證救療也 按傷寒為外感之總名傳變出入于頭萬緒仲景傷寒論一字不可遺漏今止舉六經本證及六經主方數首以存大略不可以此而廢全書也 能將傷寒全書熟讀而精通之則凡為外感之病遊刃有餘矣 故此集外感之方選錄甚少 意在 有在也

百合病

金匱

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲臥不能臥欲行不能行飲食或有美時或有不聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脈微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦

為逆

此等證病後得之者甚多醫者不知多方誤治以致病氣日深不可救藥始終無一人能識之者遍地皆然也 百脈一宗悉病蓋肺朝百脈故以百合治肺為主藥

百合病方

百合知母湯

金匱 百合病發汗後者主之

百合七枚

知母三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去渣

以泉水二升煎知母一升去滓後合和煎取

滑石代赭湯 金匱 百合病下之後者主之

百合七枚碎 滑石三兩碎 代赭石如彈丸大一枚碎

升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五分溫服

百合雞子湯 金匱 百合病吐之後者主之

百合七枚碎 雞子黃一枚 右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去渣

內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合地黃湯 金匱 百合病不經吐下發汗病形如初者主之

百合七枚碎 生地黃汁一升 右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去

渣內地黃汁煎取一升五分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合洗方 金匱 百合病一月不解變成渴者主之

百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

括蠶牡蠣散 金匱 百合病渴不差者主之

括蠶等分 牡蠣等分 右為細末飲服方寸匕日三服

百合滑石散 同上 百合病變發熱者一作益寒熱 主之

百合一兩益 石滑三兩 右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

感冒方附

九味羌活湯 張元素方 四時發散

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 蒼朮 黃芩 甘草

生地 右加生薑三片葱白三莖水煎服 此外感之總方惟生地不若易當歸為佳 此方

敗毒散 活人 治傷寒瘟疫風濕風眩拘蹇風痰頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 白茯苓 桔梗

人參各一兩 甘草五錢 右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服 煩熱口

渴加黃芩

麥蘇飲 易簡 治感冒風寒頭痛發熱憎寒欬涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參 蘇葉 乾薑 前胡 陳皮 枳殼 茯苓 半夏各八分

桔梗 木香 甘草各五分 生薑五片 大棗一枚 右十三味水煎熱服取汗

其病止在皮毛肌肉之中未入經絡故不能傳變大段驅散太陽陽明之風寒足矣其有食者則兼用消食之品可也此等證四時皆有南方最多

寒熱

靈素

靈口問篇帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄

粟逆調論黃帝問曰人身非常溫也非常熱也為之熱而煩滿者何也岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩

滿也帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從

水中出帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而

陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風寒如炙如火者是人當內鑿而

帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰

腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝

一陽也心二陽也腎孤臟也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當鑿節也帝曰人之肉苛者雖

以上三方乃悉醫風寒之總法

近於衣絮猶尚苛也是爲何疾岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮氣俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

移熱移寒 素氣厥論黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於脾脾腫少氣脾移寒於肝肝腫筋攣肝移寒於心狂隔中心移寒於肺肺消飲一洩二死不治肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水之病也脾移熱於肝則爲驚衄肝移熱於心則死心移熱於肺傳爲鼻淵肺移熱於腎傳爲柔痙腎移熱於脾傳爲虛腸澀死不可治胞移熱於膀胱則癰溺血膀胱移熱於小腸爲腸不便上爲口糜小腸移熱於大腸爲虛瘕爲沉大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳爲衄衄瞑目故得之氣厥也

雞經

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻翼不得汗肌寒熱者皮膚痛唇口燥無汗骨寒熱者病無所安汗注不休齒齩痛 陽維爲病苦寒熱

傷寒論

病人身大熱反欲近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

此種寒熱既非感冒亦非傷寒其淺深有皮膚骨髓之殊其久暫有歲月之異輕者有似感冒重者即變骨蒸所以內經以後諸書寒熱日有方論不入傷寒等法大段以清醫中之疑爲主其或有風有積有瘵者則隨證消息之可也

寒熱方

四時加減柴胡湯 金匱 治五臟寒熱

柴胡 白朮各八兩 大腹楨榔 四枚并皮子用 陳皮 生薑各五分 梗桔七分 以上冬三月柴胡稍

多春三月減白朮增枳實夏三月又增甘草仍用枳實白朮秋三月同冬三月惟陳皮稍多 右各咬咀分

爲三貼一貼以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服渣再合煎一服 治寒熱總不能外柴胡寒熱久者必有積滯分說去聲二

續中爲

一分

天行熱病方外靈 療天行三日外至七日不歇內熱令人更相染著主大青消毒湯

大青四兩 香豉八合 絲蘇 乾葛 梔子各四兩 生地一升切 芒硝三兩 右六味切以水五升煮取

二升半去渣下芒硝分三服

一方有石膏八兩忌蕪蕪熱麵酒蒜等物此方專清陽明之熱

苦參湯 千金 療天行熱病五六日以上宜服

苦參三兩 黃芩二兩 生地黃八兩 右三味切以水八升煮取二升去渣溫服半升日再服忌蕪蕪

燒雪湯 外靈 療天行毒病七八日熱橫胸中煩亂欲死

芫花一升 右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也

按本草芫花能治蠱毒消胸中痰水

大黃湯 外靈 療天行五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食

大黃胃 黃連心肝 黃柏腎 梔子肺各半 兩擘 右四味以水八升煮六七沸內豉一升葱白七莖煮

取三升去渣分三服此許推然方神良又療傷寒已五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌蠶肉冷

水此三黃湯之變能除六經之熱

桃葉熏身法 外靈 水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簣下取熱自熏停少時當雨

汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈 按寒熱之因于蠱毒有屬外感有屬內傷而外感內傷之中又各不同其外有屬痰飲有屬瘀血屬積聚有屬敗證不可勝舉其治法各詳於本病錄下當細審之此

只隨時行驗病之數方耳

霍亂附靈篇

傷寒論

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此何病答曰此名霍亂
自吐下又利止復更發熱也 傷寒其脈微澀者本是霍亂今是傷寒卻四五日至陰經上轉入陰必利本嘔
下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡故也下利後當
便鞭鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也吐利
發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣也 此霍亂是傷寒變證 與霍亂本證微別

病源

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相于亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛
其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹並痛者則吐利俱發挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐利
虛者但吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉腥膻生冷過度因居處不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之
氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相于脾胃虛弱便則吐利水穀
不消則心腹脹滿皆成霍亂 霍亂脈大可治微細不可治霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不可治 霍此

亂之正病 言之最詳

乾霍亂者是冷氣搏於腸胃致飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾
霍亂也 霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也冷入於足之三陰三陽則脚轉筋入於手之三陰三陽則手轉

筋隨冷所入之筋筋則轉轉者皆由邪冷之氣擊動其筋而移轉也

按轉筋之病金匱有雞屎白散一方附脾氣條下而 轉筋之證不一有平時常轉筋者有霍亂而轉筋者

并有轉筋入腹者當用木瓜吳茱萸 等藥及外治湯熨之法以備選擇

霍亂轉筋方

五苓散 霍亂頭痛發熱多欲水者主之寒多不用水者理中丸主之 二方俱傷寒 論見通治

理中丸 此是寒霍亂之方百不得 一者也誤用者害不旋踵

加減法 若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩 吐多去朮加生薑三兩 下多者還用朮 悸者加茯

苓二兩 渴欲得水者加朮足前成四兩半 腹中痛者加人參足前成四兩半 寒者加薑成四兩半 腹

滿者去朮加附子一枚 服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣服

霍亂轉筋入腹極鹹作鹽湯於糟中煖漬之則差千金 又方 以醋煮青布揔腳膝冷復易之

又方千金 治霍亂轉筋兩臂及腳胸脇諸轉筋並主之

香薷一把水煮令極濃服二三升即差青木香亦佳

廣濟高良薑湯外症 治霍亂吐痢轉筋入腹

高良薑 桂心各四兩 右二味以水七升煮取二升去渣分三服此亦治寒霍亂之方

霍亂轉筋入腹方外症 木瓜子根皮合煎湯服之

茱萸湯外症 療霍亂轉筋不止

吳茱萸一升 甘草 乾薑各二兩 藜子一把 亂髮一兩燒 桂心二兩 右六味以水七升煮取二

升三合去渣分溫三服

灸法外症 以手拘所患脚大母指當脚心急筋上七壯 又灸當足大母指聚筋上七壯 又灸足大母指

下約中一壯 又灸湧泉入腹者灸臍寸二寸十四壯 又灸股中大筋上陰一寸 轉筋四並者灸兩乳

根黑際各一壯 轉筋欲者灸臍上一寸十四壯

蜜香正氣散局 元散河 蘇合香丸局 香薷飲局方俱見通治

瘧

金匱

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧一作瘧餘同 太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧 太陽病發熱脈沉而細

者名曰瘧為難治 太陽病發汗太多因致瘧 夫風病下之則瘧復發汗必拘急 瘧家雖身疼痛不可發

汗汗出則瘧 病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者瘧病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇 暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者瘧 夫瘧脈按之緊如弦直上下行 瘧病有灸瘡難治 太陽病其症備身體強凡八然脈反沉遲此為瘧 太陽病無汗而小便反多氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧 瘧為病胸滿口噤臥不著席脚攣急必灸齒

瘧方

栝蠹桂枝湯 金匱 太陽病其症備身體強凡八然脈反沉遲此湯主之

栝蠹根二兩 桂枝 芍藥各三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右六味以水九升煮取三

三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜熱粥法

麻黃加獨活防風湯 同上 治剛瘧

麻黃 桂枝各一兩 芍藥三兩 甘草半兩 獨活 防風各一兩 右六味每服一兩水煎

瘧病乃傷寒證小兒得之猶有愈者其餘則百難瘧一其實者或有因下而得生虛者竟無法金匱諸方見效絕少

葛根湯 大承氣湯 同 桂枝加葛湯 有汗用見傷寒門 小續命湯 見中風門

瘧閉利淋

靈素

靈本輸篇三焦手少陽之脈入絡膀胱約下焦實則閉癰虛則遺溺 五味篇酸走筋多食之令人癰 素宣明五氣論膀胱不利為癰不約為遺溺 氣厥論胞移熱於膀胱則癰溺血 骨空論督脈為病癰痔遺溺

金匱

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中 淋家不可發汗發汗則必便血 熱在下焦者則尿血亦令淋 祗不通 小便不利者有水氣其人苦渴

病源

石淋 淋而出石也腎主水水結則化為石

氣淋 腎虛膀胱氣熱脹所為也

膏淋 淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋 熱淋之甚者則尿血心主血血之行身通遍經絡循環腑臟勞甚則散失其常經溢滲入胞而成血淋也

也

胞轉 其病狀臍下急痛小便不通是也或因小便應下而強忍之或為寒熱所迫此二者俱合水氣還上氣

於胞使胞屈則不得充張外水應入不得入內洩應出不得出外內相壅塞故令不通病至四五日乃有致死

者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急疾走或忍水入房皆令胞轉或胞落並致死數便為癰結不便為胞轉

尿床 小便乃水液之餘從膀胱入於胞夜臥則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發於眠睡不覺尿出也

癰閉利淋方

括囊麥圓 金匱 小便不利者水氣其人苦渴此主之

括囊根二兩 茯苓 薯蕷各三兩 附子一枚 炮 瞿麥一兩 右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸

日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

滑石白魚散 同上 主小便不利

滑石二分 亂髮二分 燒 白魚二分 右三味杵為散飲服半錢七日三服

茯苓戎鹽湯 金匱 小便不利主之

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽一枚彈丸大 右三味以水五升煮取三升溫三服

猪苓湯 同上 脈浮發熱渴欲飲水小便不利者主之

瘡毒去皮 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各二兩 右五味以水四升先煮四味取二升去

滓內膠烱消溫服七合三服 此著飲之

治諸種淋方千金

葵根八兩 茅根 石首魚頭口 各三兩宜用頭中骨 甘草一兩 通草二兩 貝子五合 天麻根五兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋 治石淋尤切

石葦散千金 治血淋

石葦 當歸 蒲黃 芍藥 右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三

胞轉方 千金 治丈夫女人胞轉不得小便八九日者

滑石一斤 寒水石 一兩碎 葵子一升 右三味以水一斗煮取五升盡服即利

療小便難方 本事 治便難小腹痛不急治殺人

用葱白三斤細剉炒令熱以帕子裹分作二處更替運臍下即通

石葦散 局方 治膀胱有熱淋瀝不宣或尿如豆汁或便出砂石並治之

木通到二兩 石葦 二兩去毛 滑石 白朮 瞿麥 芍藥 葵子各三兩 當歸

甘草炙 王不留行 右為細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服

藕蜜煎 養老 治老人淋病小便不利痛悶之極

藕汁五合 白蜜五合 生地黃汁一升 右相和微火煎之令如饑空心含半匙漸漸下飲食忌熱食

灸肉 此方亦治血淋

治石淋方千金

車前子二升 緇袋貯以水八升煮取三升空腹頓服之須臾當下石子宿勿食服之瓦

治熱淋方 千金 白茅根四兩 以水一斗五升煮取五升每服一升日三夜二

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄 取白 生薑 取汁 生地 取汁 白蜜各五合右和勻先把一盞銀器石器內慢火熬沸不拘時溫服

牛膝膏 治死血作淋

桃仁 去皮尖 歸尾各一兩 牛膝 四兩酒浸一宿 赤芍 生地 各一兩半 水十鍾微火煎至二碗入麝香少許分

四次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

八正散 寶鑑 治諸淋

瞿麥 梔子 篇蓄 大黃 滑石 木通 車前子 甘草各一錢

加燈心一錢煎服

治小便失禁方 千金 以水三升煮雞腸取一分三服

家韭子丸 治遺溺及陽氣衰敗白濁遺精

家韭子 炒六兩 鹿茸 四兩酥炙 肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸 熟地 當歸各二兩 兔絲子酒浸 巴戟 各一兩半

杜仲 石斛 桂心 乾薑各一兩 右為末酒糊丸桐子大每服五十丸加至百丸食前

鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦陽氣不足也別作小丸服

夜多小便方 千金 治膀胱冷故小便至夜獨多

雞腸 五具治如食法 羊腎 一具去脂並令乾 赤石脂六兩 龍骨三兩 肉蓯蓉四兩 川連五兩 桂心二兩 右七味為末

每服方寸七日二服五日中作羊腎炙一劑十日日外作羊腎膈香味如常食飽與之

猪肚丸 治小便頻數

猪肚 一個蓮子一升同煮一 舶上茴香 五 破故紙 一兩鹽水炒 川楝子 酒炒去核一兩 母丁香三兩 加桑螵蛸一

同去皮心焙乾為末

兩尤效蜜丸梔子大每服五十丸空心溫酒送下

縮泉丸 治脾胃氣不足小便頻多

烏藥

益智仁各等分

右二味爲末酒煮山藥糊丸如梔子大每服五十丸空心鹽湯送下

一丸有
覆盆子

治尿床千金

取雞吐脛一具并腸燒末酒服男雌女雄

威喜丸見道

蒲灰散見水

龍腦雞蘇丸治五淋血
崩見道治