

金鑑外科  
三  
の  
五  
六

18

編輯婦科心法要訣目錄

生育門

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草

臨盆

交骨不開

開骨散

盤腸生

補中益氣湯

十全大補湯

草蓀貼法

酥油潤法

難產

產後門

胞衣不下證治

奪命散

產門不閉證治

十全大補湯

血暈證治

清魂散

佛手散

醋漆薰法

惡露不下證治

失笑散

聖愈湯

惡露不絕證治

加味十全大補湯

佛手散

頭疼證治

芎歸湯

八珍湯

心胃痛證治

大巖蜜湯

玉燭散

腹痛證治

失笑散

香桂散

異功散

少腹痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

五苓散

脇痛證治

延胡索散

四君子湯

八珍湯

腰痛證治

佛手散

加味六味地黃湯

偏身疼痛證治

赴痛散

加味四物湯

腹中塊痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

筋攣證治

加味四物湯

八珍湯



傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲

治腫證治

枳木湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯

生化湯

四物湯

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

參附湯

寒熱證治

柴胡四物湯

生化湯

更生散

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

參附湯

中風證治

十全大補湯

瘧病證治

加味八珍湯

行考...  
癩瘖抽搐證治

加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯

百會疽



百會穴在頂中央自面側觀之正對耳六

頭部

百會疽○百會疽在顛頂結經篇督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實青毒  
火平塌陽虛溫補祛腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕其此百會疽又名玉頂發生在顛頂正中  
屬督脈經百會穴由膏梁太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬

如鐵高共紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦唇焦便秘煩燥脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒散以清毒火外敷  
中和膏若漫腫平塌紫暗堅硬瘡痛根散惡寒便瀉脈見細數者此屬陽虛宜十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍膏若面赤過頤口乾  
不渴唇潤者屬陽虛宜服桂附地黃丸引火歸源再用生附子餅蓋兩足心湧泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀膏已潰爛黃蠟藥  
太乙膏益貼腐蓋再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲 蘇木二分 甘草三分 陳皮二分 桔梗五分 黃芩五分 黃蘗五分 人參三分 藜蘆五分 防己五分 防風四分  
知母四分 羌活四分 獨活四分 連翹四分 黃連一錢 生地黃四分 黃耆二錢 澤瀉二分 當歸尾四分 水煎食遠溫服  
勳黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮枯苓藥人參藜蘆二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最  
忌飲寒涼

透腦疽



透腦疽生在百會穴前額會穴前

透腦疽○透腦疽生百會前形如雞子痛而堅軟漫腫稀虛陷陷紅硬膿稠實腫去此證生於百  
會穴之前額門之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡頂塌陷脚根漫腫  
色暗者屬虛若色紅腫硬頂六膿稠者屬實速清者順遲清透腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百

侵腦疽

侵腦疽○侵腦疽生透腦傍濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順緊逆要審詳註此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名  
五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服荆防敗毒散汗  
之次服內疏黃連湯下之將清服託裏透膿湯已潰服託裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷中和膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門  
託裏透膿湯 人參 白朮炒 穿山甲炒 白芷各一 升麻 甘草節各五分 當歸錢 皂角刺一錢 生黃耆三錢 青皮炒五分 水三  
鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱服 方託裏透膿治癰疽已成未

潰服之宜參朮甲芷升麻單當歸黃耆刺青皮  
荆防敗毒散 額部 ○內疎黃連湯 ○沖和膏 俱見腫

佛頂疽



佛頂疽生在透腦疽之前上星穴

佛頂疽 佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛黑陷必然凶 註此證一名頂門疽生於頭頂顛門之前屬督脈經上星穴由藏府陰陽不調熱毒上壅而成色紫眩暈腫痛脈洪大而數者為實脈微細而數者為虛皆屬險證若爛黑陷六脈散大神昏譫語二便閉結者為逆首尾內外治法俱按百會疽

額疽



傍額疽

傍額疽

額疽 ○額疽生額火毒成左右膀胱正督經頂陷佳紫無膿重高脊根收紅腫輕 註此證生則額正中者屬督脈經或生左右額角者屬膀胱經總由火毒而成初起塔頂塌陷乾焦色紫不生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束者其勢輕而屬順也初服荆防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰氣虛者宜服託裏透膿湯熱實者宜服透膿散外敷沖和膏已潰宜服託裏排膿湯外貼琥珀膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

勇疽



勇疽生在眼角後五分童子將火又名太陽穴

仙方活命飲 ○內疎黃連湯 ○一味拔毒散 俱見腫

勇疽 ○勇疽皆後太陽穴膽經怒火伏鼠形七日不潰毒攻眼黃膿為吉黑血凶 註此證一名勇疽又名腦發瘡風足少陽膽經怒火而成生於目小眥之後五分生在太陽穴者無論左右皆可以生初起如粟漸腫疼痛形如伏鼠面自浮腫七日信膿不潰火毒攻睛腐爛損目若十一日鍼出黃膿毒從膿解為順易治若出紫黑血者係氣虛不能化毒為逆難治初服仙方活命飲消解之毒甚宜服內疎黃連湯外敷一味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

鬚疽



鬚疽生在左右鬚角

柴胡清肝湯 柴胡 生地 各一錢 當歸 二錢 赤芍 五錢 川芎 一錢 連翹 去心 牛蒡子 一錢 黃芩 一錢 生梔子 研 天花

鬚疽 ○鬚疽三焦膽二經證由怒火凝成此經氣多而血少潰腐惟宜少見膿 註此證發於鬚角屬手少陽三焦足少陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒念火生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼鬚角肌肉淺薄不宜鍼灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗血液難斂初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜託裏消毒散托之外敷一味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

粉甘草節 防風 水二鐘煎八分食遠服 救柴胡清肝治怒證宜血疎通解毒良四物生用柴胡黃芩枳殼芍藥

託裏消毒散 一味拔毒散 俱見腫

天疽 銳毒



天疽生耳後一寸三分高骨後

天疽 銳毒 天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救此二證左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如木堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡倍增名雖各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀慮不潔鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終屬險證急當治之遲則熱氣下入淵液則傷任脈內薰肝肺急證添添必致不救若紅腫連潰者順堅硬

黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜託裏消毒散虛者十全大補湯託補之外俱數烏龍膏

餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門 淵液 膽經穴名


烏龍膏 俱見腫瘍門 十全大補湯 見潰瘍門

耳後疽



耳後疽 耳後疽生耳摺間三焦風毒騰炎火紅腫有頭厥為順黑陷舉痛冷潰難此證生於耳摺之間無論左右屬三焦經風毒兼膽經怒火上炎而成初起如粟漸增腫痛小者如杏大者如桃若紅腫有頭厥熱易潰稠膿者為順若黑陷堅硬舉痛引腦甚則項頰肩肘俱痛不熱連潰紫血者為逆初治法同天疽已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門又有初起失於託裏或誤食寒涼則毒必不能外發遂攻耳竅服從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此証者其愈最緩老年得此証者易於成漏

耳發



耳發 耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃膿屬白紫血山此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房粉腐亦多眼孔厥亦疼痛腫連耳輪蓋發者乃難証之毒甚者也不可聽其自潰致潰遲膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之外敷一味拔毒散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲



耳根毒 耳根毒初發核形腫如伏鼠厥亦疾三焦風火膽怒氣暴腫潰速非疽癰此証生於耳後初起形如痰核漸增腫勢狀如伏鼠厥亦疾痛由三焦風火胆經怒氣上冲凝結而成但此証暴腫潰速根淺易愈非若癰疽之勢更毒甚也初起寒熱往來宜服荆防敗毒散汗之發熱痛甚者仙

耳根毒



耳根毒 耳根毒初發核形腫如伏鼠厥亦疾三焦風火膽怒氣暴腫潰速非疽癰此証生於耳後初起形如痰核漸增腫勢狀如伏鼠厥亦疾痛由三焦風火胆經怒氣上冲凝結而成但此証暴腫潰速根淺易愈非若癰疽之勢更毒甚也初起寒熱往來宜服荆防敗毒散汗之發熱痛甚者仙



方活命散消之膿成者服透膿散虛者服託裏透膿湯後外撒紅靈藥貼太乙膏膿盡換搽生肌玉紅膏生肌缺口若過虛者膿水清稀或  
瘡口斂遲即服香貝養榮湯補之自斂  
仙方活命飲見腫○刑防敗毒散見腫  
香貝養榮湯見頂部石疽

玉枕疽○玉枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上腦戶穴高枕為順紫陷凶註此證由督脈  
經積熱外受風邪凝結而成生在玉枕骨穴初起如粟麻脹相兼寒熱往來口渴便秘  
漸增堅硬大者如加小如鵝卵紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌陷潰出血水者屬凶

神授衛生湯○託裏消毒散○沖和膏  
腦後發○腦後發生在督經結熱風府紫腫疾紅活易潰稠膿順紫暗難潰血水凶註此證屬督脈  
經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米炊腫作疼痛引頭頂項氣粗鼻鼾漸  
大如盤如盈紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時津血水者逆初起內外治法俱按玉枕疽其餘內  
治法俱按癰疽腫潰瘍門

腦鑠○腦鑠項後如橫木精酒毒火上乘升黑如竈烟唇唇硬木痛木腐水流清急施灸法至痛  
火燎刺痛屬陽經速服仙方活命飲若見七惡定然凶註此証先於督脈經風府穴由陰精枯涸毒  
火乘之而生初起形如椒粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至顛頂下至大椎色如灶烟硬若牛唇  
未膿皮先腐爛時流清水肌肉冰冷輕者不痛重者毒氣將陷全不知痛宜急施桑柴烘法或用艾  
壯灸法以痛為度連服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯

救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛屬陽證速服黃連消毒飲外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之  
證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法○艾壯灸法俱見首卷○仙方活命飲見腫瘍門○十全大補湯見潰瘍門○黃連消毒飲見前百會疽○回陽玉龍丹見腫瘍門

油風○油風毛髮乾脫皮紅光亮癢難堪毛孔風乾發傷血養真海艾散血痊註此證毛髮乾焦  
成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼刺頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風燥血不能榮養  
毛髮宜服神應養真丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若乾髮年久宜服其丸



玉枕疽



腦後發



腦鑠



玉枕疽

油風注神應養真丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若乾髮年久宜服其丸

神應養真湯 羌活 木瓜 天麻 赤芍 當歸 羌活子 熟地 酒洗 川芎 等分為末入地黃膏加蜜炙桐子大每服百丸溫煮酒

或鹽湯任下 神應養真油 風養血消風髮復生羌歸木瓜天麻芍羌絲熟地與川芎

海艾湯 海艾 菊花 藜蘆 蔓荊子 防風 薄荷 荆穗 藿香 甘松 各二 水五六碗同藥煎數滾連湯共入厥口鉢內先將熟

氣薰面候湯少溫用布蘸洗日洗二三次洗後避風忌食腥發物 神海艾湯治油風癩先重後洗善消風雨蓋蔓荊風薄穗藿香海艾與

甘松



白屑風 ○白屑風生頭與面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥燥換肌潤肌膏此患註此証初生髮內

祛風換肌丸 大胡麻 蒼木 炒 牛膝 酒洗 石菖蒲 苦參 何首烏 花柳 葳靈仙 各二兩 當歸身 川芎 甘草 各一 右為

細末陳酒煮跌丸 萊菔大每服二錢白滾水送下忌食腥發物火酒 神換肌丸治白屑風燥癢日增若蟲行風燥血分失潤養愈起白屑

落復生歸芳胡麻蒼木膝菖蒲花柳葳靈仙苦參何首烏為末煮酒跌丸萊菔形

潤肌膏 香油四兩 奶酥油二兩 當歸五錢 紫草一錢 將當歸紫草入二油內浸二日又火煤焦去渣加黃蠟五錢溶化盡用布蘸

傾盥內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二次 神潤肌膏擦白屑風肌膚燥癢用更靈香二油歸紫草煤焦加蠟濾攪凝



禿瘡 ○禿瘡風熱化生蟲蟻癢難堪却不去白如錢生髮內宜服通聖搽膏靈膏此證頭生白如

小者如豆大者如錢俗名錢癬又名肥瘡多生小兒頭上騷癢難堪却不去痛日久延漫成片髮焦

脫落即成禿瘡又名癩頭瘡由胃經積熱生風而成宜用防風通聖散料醇酒浸焙為細末每服一

錢或二錢量其壯弱用之食後白滾湯調下服至頭上多汗為驗初起肥瘡宜搽肥油膏用久則致

已成禿瘡者先宜艾葉錫煎湯洗淨瘡加再用豬肉湯洗之隨擦神油花油以殺蟲散風蟲死則癢止散散則髮生血潮則肌膚潤久擦甚

防風通聖散 防風 當歸 白芍 酒炒 芒硝 大黃 連翹 桔梗 川芎 石膏 煨 黃芩 薄荷 麻黃 滑石 各一兩 荆芥

白朮 土炒 山梔子 各二錢 甘草 二兩 生 共為末 神防風通聖治禿瘡胃經積熱致風傷連翹梔子麻黃桔白朮歸芍滑石防黃

肥油膏 番木鱉 六錢 當歸 藜蘆 各五 黃蘗 苦參 杏仁 狼毒 白附子 各三 鯉魚膽 二個 用香油十兩將前藥文油內熬

至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布蘸搽每用少許用藍布裹於手拍熱油擦瘡 神肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮

強黃蘗苦參白附子番薯根毒杏仁良薑薑黃歸經管膽煤佳入蠟寶奇方

躑躅花油方 躑躅花根四兩搗爛用菜油一盤煤枯去渣加黃蠟少許布濾候冷膏布煎搽日用三次乾帽戴之勿令見風 助躑躅花油療禿瘡驅蟲止癢擦之良躑躅花根研極爛菜油煤枯入蠟強

圖 癖 姑 蜈



蜈蚣癖○蜈蚣癖即蟻拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多衣膠着熱形大功易收此證多生小兒頭上俗名貉猶未破如曲蟻拱頭破後形似蜈蚣串穴有因胎中受毒者其瘡腫勢雖小而根則堅硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收斂越時復發本毒未龍他處又生其屬纏綿難斂宜用三品一條槍插於孔內化盡堅硬衣膜換撒生肌散貼玉紅膏以收斂之不致再發也亦有暑熱成毒

者大如梅李相聯三五枚潰破膿出其口不斂及頭皮空亦如蜈蚣串穴之狀宜貼絳珠膏搽膿毒將所事之空皮剪通使無藏膿之處用米泔水日洗一次乾撒生肌散貼萬應膏其效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作癢抓破津水相延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之宜當腥發物

三品一條槍 白砒五錢 明礬三兩 砒礬二味共研細末入小罐內加炭煅煉紅青烟已盡登起白烟片時約上下紅微住火取罐安地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搗成條陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先用鍼連孔竅早晚插樂二條插至三日後孔大者每插十餘條插至七日孔內藥條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至十四日前後其堅硬衣膜及疔核燥癢痔漏諸管自然落下隨用湯洗搽玉紅膏瘡者兼服健脾劑自然收斂 助神奇三品一條槍能醫硬衣膜瘡雄乳白砒礬生用研末煅煉條條良

敗銅散 化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能溼祛瘡瘡口易斂 助敗銅散治潰風傷醫瘡破津脂水瘡化銅舊罐研細末香油調敷溼良 助調敷溼良 紺珠膏○萬應膏○生肌散○玉紅膏俱見清癩門

圖 瘡 際 髮



髮際瘡○髮際瘡生髮際邊形如黍豆瘡痂堅頂白肉亦初易治胖人肌厚最纏綿此証生頂後髮際形如黍豆頂白肉亦堅硬痛如錐刺瘡如火燎破津膿水亦有浸淫髮內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成也初宜紺珠丹汗之次用酒製防風通聖散清解之外搽黃連膏致胖人頂後髮際肉厚而多相結其髮反刺瘡內因日久不瘥又兼受風寒凝結形如卧瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也

蠟溶化盡用夏布濾淨傾入磁碗內預將定粉銀朱輕粉琥珀四味各研極細共合一處徐徐下入油內用柳枝不時攪之以冷為度  
 脂攤貼紅綿紙攤貼亦可 玳瑁珀膏能治諸毒活瘀解毒化腐良定血輕朱椒蠟珀油熬膏亦療瘍

**紺珠丹**

即萬靈丹見腫瘍門 ○防風通聖散 見前元卷 ○黃連膏 見鼻部鼻瘡

**頭風傷目** ○頭風引目眉稜痛風火寒痰有四因或因楊梅毒攻項或因產後被風侵 註此證畏風惡寒其痛走法不定得煖少減者風痛也  
 寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青唇白氣逆不渴小水白者寒痛也身重肢痠胸煩作嘔口吐痰沫者痰痛也以上四證舊  
 有古方羌活沖和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失治風攻眉稜痠痛眼及跳動漸攻睛珠起藍雲遮睛多致損目若眉  
 稜痠痛以碧雲散常吸之甚效

**羌活沖和湯** 防風 白芷 各一錢 細辛 甘草 各五分 生地 蒼朮 黃芩 各一錢 羌活 一錢 川芎 二錢 引加葱頭三根生薑一片紅  
 棗肉二枚水煎食遠服 痛由頂後起屬膀胱經倍加藜本 痛由耳後起屬膽經加柴胡 痛由太陽牽引頭額兩目屬胃經倍白芷芎  
 根煨石膏 頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼朮 頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛甚者加麻黃生附子減黃芩 頭痛兼有嘔涎沫  
 者手足厥冷屬肝經加吳茱萸 頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏 便秘者加生大黃 頭痛吐痰涎四肢不冷者加半夏 方沖  
 和頭風風傷目風火寒痰四因生日久眉稜痠痛跳遮睛損目此能清防風白芷細辛生地蒼朮羌活芎藭在隨加引經藥蔥薑紅棗水  
 煎成

**碧雲散** 川芎 鵝不食草 各一錢 細辛 辛夷 各二錢 青黛 一錢 共為細末患者口噤涼水令人以麈尾吹入左右鼻孔內取嚏為效  
 每用少許鼻常吸之其效緩 碧雲散去頭風證眉稜痠痛更堪醫鵝不食草辛夷皆苦細同研不時吸

**貼兩太陽穴法** 治頭痛如破 雀腦川芎 白附子 各等分 研末葱汁調糊紙攤貼左右太陽穴效 產後風寒使腦頭痛不可發汗宜用  
**四物湯** 倍川芎加荆芥穗服之其效緩 楊梅毒入腦髓以致頭痛者治在本門

**四物湯** 見腫瘍門

**四物湯**

額場宜腫色赤左右同



額場宜腫色赤左右同

**面部**

**額場** 額場疔 額場疔漸粗形風熱積熱小腸經場起焮紅浮腫痛癢紫漫硬不麻疼 註此二證發  
 於額骨之處屬小腸經不論左右初小漸大如榴發陽分者由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日  
 即潰名為額場毒輕根淺易愈發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方潰名為額  
 疔毒甚根深難愈場證初宜仙方活命飲疽證初宜內疎黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按腫  
 疔腫毒門

**仙方活命飲** ○內疎黃連湯 ○麥靈丹 見腫瘍門

外科心法

額疔



蟾酥丸

見疔瘡門○麥靈丹見腫瘍門○黃連消毒散見頭部百會疽

面發毒



涼膈散

黃芩 薄荷 梔子 礞石 連翹 石膏 甘草 芒硝 大黃 水二鍾苦竹葉二十片煎八分加蜂蜜三匙和服

面遊風



面遊風條虫起白皮形似細魚鱗

疔腮



痛楚難堪

由平素血燥過食辛辣厚味以致陽明經濕熱受風而成癢甚者宜服黃連消毒散外敷摩風膏

黃即撈去渣加蜜蠟五錢溶化蓋用絹濾過攪冷塗抹瘡上

額疔○額疔初起粟米形證由陽明火毒生堅硬頂凹根深固寒熱交作麻癢疼此證生在額骨之間屬陽明經不論左右初如粟米黃色小胞次如赤豆頂凹堅硬按以疔頭麻癢疼多因過食炙燥藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸或麥靈丹汁之火服黃連消毒散清之外治法同疔門凡疔皆屬迅速之證初覺即當急治遲則毒火攻心令人昏潰諸語惡證悉添多致不救

面發毒○面發毒在頰車生初少漸多赤豆形腫硬焮痛津黃水證屬風熱客陽明此證生面上頰車骨間初生一個漸發數枚形如赤豆色紅焮痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜服劑防散毒散汗之若胃火盛則唇焦口渴便燥者即服涼膈散下之外以清涼消毒散敷之即愈

面遊風○面遊風燥熱濕成面自浮腫癢甚行膚起白屑而癢極破津黃水津血疼此證生於面上初發面自浮腫癢若蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極癢抓破濕熱感者津黃水風燥感者津血

疔腮○疔腮胃熱是其端初起焮及熱復寒高腫焮紅風與熱平腫色淡熱濕原註此證一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不着骨之處無論左右總發端於陽明胃熱也初起焮痛寒熱往來若高腫色紅焮者係胃經風熱所發若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜託裏消毒散託之膿熟者鍼之體虛者宜平補之其餘治法按癰疽潰瘍門此證初起若過服涼藥冷毒攻喉者險

八分不持服  
 四順清涼飲 防風 梔子生研 連翹去心 甘草生 當歸 赤芍 羌活 各一錢 大黃二錢 水二鍾燈心五十寸煎八分食遠服  
 方四順清涼散裏強口乾便秘炸腮瘡防風梔子連翹草歸芍燈心羌大黃 〇託裏消毒散見腫瘍門

頰 瘍



頰瘍 頰瘍胃經積熱生初如紅粟漸榴形腫消易斂愈腫難斂漏因成註此證生於耳下頰車骨間由陽明胃經積熱而生始發如粟色紅漸大如榴初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過數寒藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰者宜升陽散火湯宣發之將清宜託裏消毒散散熱斂之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙關緊急不關或旁腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用巨鼓餅灸灸壯初用九壯以知熱瘡為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹熬入瘡口內萬應膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角升麻湯 犀角二錢 升麻一錢 黃芩八分 白附子八分 羌活 生甘草五分 白芷八分 川芎八分 羌活一錢二分  
 防風 八分 水三鍾煎一鍾食遠熱服 〇犀角升麻湯頰瘍色紅初起服之良黃芩白附生甘草白芷川芎羌活防風 〇巨鼓餅灸法內 〇紅升丹 〇萬應膏 俱見潰瘍門

升陽散火湯 撫芎 蔓荊子 白芍 酒炒 防風 羌活 獨活 甘草 升陽散火過數寒牙又拘急不痛堅撫芎防羌獨草桑香附 〇託裏消毒散 〇巨鼓餅灸法內 〇紅升丹 〇萬應膏 俱見潰瘍門

骨 槽 風



骨槽風 骨槽風火三焦胃耳前頰頰隱隱腐潰筋骨仍硬痛牙關拘急火邪風 註此證一名牙 又發一名穿腮發乃少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰 腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬存筋骨陰分致初起腫 脹升發 〇託裏消毒散 〇巨鼓餅灸法內 〇紅升丹 〇萬應膏 俱見潰瘍門

硬難消潰後瘡口雖合多致不救初起熱不瘳者內宜服清陽散火湯外以清胃散擦牙真君抄貼散敷腮如初起發表之後人壯火盛者用 良刺大黃甘草節白芷癩癩下之後滅大黃如生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有硬腫日久失治不能盡消者膿熱將 成宜用中和湯託之已潰按癩癩清腐治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非癩癩不能搜風如法治 之諸證俱減惟才關拘急不關宜用生薑斤熱灸頰車穴二七壯其穴在耳垂下五分陷中處骨灸之兼用鍼刺口內牙盡處出血其牙關即 開若寒熱不退形焦體削痰盛不食或口內腐爛則刺穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過刺盡人事耳

清胃散 姜黃 白芷 細辛 川芎 各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處 〇清胃散擦牙腫痛姜黃白芷細辛芎同研先以鹽 湯漱後擦此藥有奇功 〇中和湯 白芷 桔梗 人參 黃耆 藿香 肉桂 甘草 白朮 川芎 當歸 白芍

湯漱後擦此藥有奇功 〇中和湯 白芷 桔梗 人參 黃耆 藿香 肉桂 甘草 白朮 川芎 當歸 白芍

發頭圖



發頭 麥門冬五分 水二鍾姜三片棗三枚煎八分加酒一杯食遠服 疔中和湯治骨槽風日久  
不消欲潰膿正梗參者霍桂木考歸為麥門冬  
理中湯見瀉疔門 ○真君妙貼散見腫疔門 ○升陽散火湯方見頰疔  
發頭 ○發頭腫痛結核經屬陽明身熱寒傷寒腫痛汗失表腫至咽喉調治難註 此證又名汗毒

時毒圖



時毒在項領之間左右同

發於頭領之間屬足陽明胃經初起身發熱腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李夜痛倍增由傷寒發汗未盡或疹形未透壅積而成初起  
宜刑防敗毒散汗之外以二味拔毒散敷之即消如消之不應者腫痛日增勢必潰膿宜服託裏透膿湯清後按癰疽潰疔門治法若此證失  
於調治或誤投寒涼剋伐之藥毒必內陷腫至咽喉痰湧氣堵湯水難嚥者逆  
刑防敗毒散見項部腫疔 ○二味拔毒散見腫疔門 ○託裏透膿湯見頭部侵腦疔

潰疔圖



潰疔在額部左右同

潰疔 兼咽痛一二日間發於項腮頰頰作腫無頭漸漸焮亦發痛或以結核有根漫腫色赤俱由感冒四  
時不正邪氣客於經絡釀結而成非發於病後之頭毒也惟在醫者精察察之辨別虛實治法須  
宜疎解不可驟用寒涼致毒不外發而內攻因喉者險矣初服刑防敗毒散汗之其腫不消有宜服連  
翹敗毒飲腫仍不消膿勢將成壯者宜服透膿散弱者宜服託裏透膿湯外敷二味拔毒散膿熱鐵

眉疔圖



眉疔 鳳眉疔生兩眉形長如瓜漫腫紅勝脫小腸肝膽熱煩悶嘔逆不食凶 註 此疔亦名眉  
發生於眉稜無論左右俱屬足太陽膀胱手太陽小腸足厥陰肝足少陽膽四經積熱所致形長如  
瓜疼痛引腦二目合腫硬硬色赤按之有根六日內刺之得膿則吉無膿則險甚則十四日不消煩  
悶嘔逆不食者凶初宜服仙方活命飲次服託裏透膿湯速消為妙遲則恐攻眼損睛矣其餘內外治法按癰疽潰疔門  
仙方活命飲 見腫疔門 ○託裏透膿湯 見頭部侵腦疔

心疔圖



心疔 眉心疔生在印堂硬腫為疽浮腫湯皆經風熱氣凝滯根堅木痛當丹防註 此證生於兩眉中  
間疔名曰印堂疔毒初起色暗根平腫硬痛至二十一日腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆疔名曰面風  
毒疔毒初起色赤浮腫焮痛易治七日潰膿若黑木痛麻癢太過根硬如鐵釘之狀寒熱並作即眉心

龍泉疽



龍泉疽在命之中

虎鬚毒



虎鬚毒在下唇之下

燕窩瘡



燕窩瘡生於下頰

蒼連平胃湯



蒼連

斑毒

淡黃碎點無數由火鬱於孫絡之血分風邪外搏發為在斑宜常服犀角升麻丸並治一切粉刺酒刺野鷄鷹子等證外用時珍正容散早晚洗之以澤其肌久久自愈亦有水虧火滯而生在斑者宜服六味地黃丸

黑痣



黑痣生於面

龍泉疽○龍泉疽起在命中之中麻癩瘡亦豆形上佳風熱攻骨腫痛與壯熱治同并此證生於水溝穴即人中是也屬督脈經形如赤豆勢小根深堅硬木痛色紫項佳寒熱交作不時麻痺由上佳風熱攻於督脈而成宜按打門急速治之遲則毒氣內攻令人煩悶惡心乾嘔神亂昏惰腮頰俱腫多致不救

虎鬚毒○虎鬚毒在頰下生胃腎積熱入任經癰疽腫痛連清易疽堅硬痛麻癢疔此證一名頑癰疽腫痛癰亦速清易治一名敗漿疔堅硬痛腫連清難治若根深形小似豆麻癩痛甚惡寒發熱心煩作嘔者疔也當從疔治皆由過食炙烤以致胃腎二經積熱上攻任脈而成癰疽二證初起仙方活命飲加升麻桔梗消之若便秘唇焦大渴者宜內疎黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫痛癰瘍門初起麻癩如疔治法按疔門

仙方活命飲○內疎黃連湯俱見腫瘍門

燕窩瘡○燕窩瘡在下頰生如攢粟豆瘡癢痕形類黃水瘡破爛此證原來濕熱成此證生於下頰俗名羊鬍子瘡聖小者如粟大者如豆色紅熱痒微痛破津漿形類黃水瘡浸淫成片但疔瘡如攢由脾胃濕熱而成宜服蒼連平胃湯外搽碧玉散即效

厚樸姜炒 蒼朮炒 甘草五分 陳皮一錢 水二鍾姜一片煎八分食後服 歌方蒼連平胃

燕窩瘡除濕清熱服更良姜炒厚樸蒼朮陳皮同煎引生薑○碧玉散 黃蘗末 紅棗肉各五錢 共研極細末香油調搽患處 勳碧玉散搽燕窩瘡色紅疔瘡津水黃粟炭藥末香油消消止痛滲透方

犀角升麻丸 犀角五錢 升麻兩 羌活兩 防風兩 白附子五錢 白芷五錢 生地黃一兩 川芎五錢 紅花五錢 黃芩五錢 甘草二分 各研細末合均蒸餅為小丸每服二錢食後臨臥用茶清送下 勳犀角升麻治在斑野鷄鷹子亦能痊犀角羌活防

附正生地考紅芍草丸 ○時珍正容散 猪牙皂角 紫背浮萍 白梅肉 甜櫻桃枝各一兩 焙乾克鷹毒白三錢共研為末每早晚用少許在手心內水調濃搽面上良久以溫水洗面用至七八日其斑皆沒神效 歌正容散洗在斑容猪牙皂角紫浮萍白梅櫻桃枝鷹毒研末早晚水洗靈六味地黃丸 懷熟地八兩 山萸肉 懷山藥各四兩炒 白茯苓 丹皮 澤瀉各三 共為



細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢空心淡鹽湯送下  
貼之兼戒醬醋愈後無痕  
起一線有自幼生者亦有中年生者由孫絡之血滯於衛分陽氣束結而成宜用線針挑破以水晶膏點之三四日結痂其痣自落用具葉膏  
水晶膏 礞子石灰水化開取末五錢又用濃鹹水多半茶鍾浸於石灰末內以鹹水高石灰二指為度再以糯米五十粒撒於灰上如鹹水  
滲下陸續添之泡一日一夜冬天兩日一夜將米取出搗爛成膏挑少許點於痣上不可太過恐傷好肉 貼水晶膏能貼黑痣鹹水浸  
灰入糯米一日一夜米泡紅取出搗膏效無比  
貝葉膏見潰瘍門

黎黑肝黯○肝黯如塵久始暗原於憂思抑鬱成大如蓮子小赤玉容久洗自然平 此證一名魚黑斑初起色如塵垢日久黑似煤形粘  
暗不澤大小不一者如粟粒亦大者似蓮子或長或斜或圓與皮膚相平由憂思抑鬱血氣不華火燥結滯而生於面上婦女多有  
之宜以玉容散早晚洗之常以美玉磨之久久漸退而愈戒憂思勞傷忌動火之物  
玉容散 白牽牛 團粉 白礬 白細辛 甘松 白鶴黃 白芨 白芷 白朮 白殭蠶 白茯苓 各一兩 荆芥 獨活  
羌活 各五錢 白附子 鷹條白 白扁豆 各一兩 防風 五錢 白丁香 一兩 共研末每用少許放手心內以水調濃搽面上良久  
再水洗面早晚日用二次 勸玉容散退黎黑肝黯牽牛團粉紋細辛甘松鶴黃及蓮蕊並末殭蠶白茯苓荊芥獨活白附子鷹條白扁豆  
防風白丁香共研為末早晚洗面去斑容

卷四  
編輯外科心法要訣

腦疽



腦疽生項後入髮際正中屬督脈經  
項部  
腦疽○腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治與癰疽大法同 此疽有正有偏正屬  
督經入髮際名為腦疽俗名對口偏屬太陽膀胱經名為偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽亢熱極而生  
其毒多故亦腫痛色鮮紅活根束頂尖時痛時止腎脈純陽起於尾閭上貫顛頂扶毒上升故易脹易腐  
易斂多屬順證若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌堅硬然足太陽經外陽內陰從頭走足  
陽降陰凝難脫難腐難斂多屬逆證更有兼風濕者其根又易於散大旁流故順逆二證治法當辨別  
是癰是疽腦癰者皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有表證令人寒熱往來宜服劑防敗毒散有表證令

荆防敗毒散 荆芥 防風 羌活 獨活 前胡 柴胡 桂枝 川芎 枳殼 炒 茯苓 歸一 人參 甘草 五分 姜三片 水二鍾煎八分 食遠服 寒甚加葱三枝



天柱疽 天柱疽生天柱骨上焦鬱熱毒經灸之有胞方為順色黑形陷逆而凶註此疽生於項後高骨名天柱骨即大椎骨也疽之初起形如針露由上焦鬱熱毒毒於脊脈以致肩背拘急極痒入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有胞者順無胞者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是為大山其內外治法同腦疽



魚尾 魚尾在項後髮際下兩鬢角俗名魚尾即偏腦疽之穴也 生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱七日潰膿出腫消毒自寧註此疽生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱凝結而發其毒或在左或在右皆屬輕淺初起宜荆防敗毒散膿將

成宜服託裏排膿湯其外治之法同癰疽腫瘍潰瘍諸證  
託裏排膿湯 當歸 白芍 酒炒 人參 白朮 土炒 茯苓 連翹 去心 金銀花 浙貝母 各一錢 生薑者 二錢 陳皮 八分 肉桂 六分 桔梗 加一錢 牛膝 下部加 白芷 項上五分 甘草 四方 姜一片 水三鍾 食遠溫服 敷託裏排膿治潰瘡排膿消腫實稱強歸 四君翹桂並銀者 貝桂膠陳良 荆防敗毒散 見腦疽



百脈疽 百脈疽生腫色形引耳繞頸色紫紅痛熱不食氣逆嗽刺出膿吉血出凶註此疽初發漫腫大小數塊環繞項頸其色紫紅痛熱不食氣逆咳嗽其發引耳十五日可刺遲則毒攻咽喉刺見膿者順見血者逆餘治法癰疽腫瘍潰瘍門



結喉癰 結喉癰發項前中肝肺積熱壅塞山膿成若不急速刺潰穿咽喉何以生註此癰發於項前結喉之上又名猛疽以其毒勢猛烈也蓋項前之中經屬任脈兼肝肺二經積熱壅積所致腫甚則堵塞咽喉湯水不下其凶可畏若膿成不鹹向內潰穿咽喉者則難生矣初宜服黃連消毒散外敷二味拔毒散將潰調治法按癰疽腫瘍潰瘍門

黃連消毒散 見頭部百會疽 一味拔毒散 見腫瘍門



夾喉癰 夾喉癰生喉兩旁肝胃毒熱發其痞癰與結喉癰同治尤兼痰壅不時噎註此癰一名夾疽生於結喉之兩旁屬足厥陰肝經足陽明胃經火毒上攻而致其治法與結喉癰同

外科心法



甘草分 昆布酒洗 海藻酒洗 鹽薑酒炒 薄荷 水煎服 歌內...

夏枯海藻升種 治風痰瘰癧連項而生無寒熱者常服消盡為止 海藻菜 去冬同炒過 白蠟蠶 微炒 右等分爲細末用白梅肉泡湯爲丸

如梧桐子大飯後或臨卧時每服六七十丸米湯送下兼忌富腥厚味 歌海菜丸治風痰瘰癧海藻菜與白蠟蠶梅湯爲丸如桐子米湯送

下病可痊 升陽調經湯 治熱毒瘰癧透於項下或至頰車此證由陽明胃經中來也若其瘰癧遠隱齒肉俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作

丸服亦可 升麻八錢 連翹去心 龍膽草酒炒 桔梗 黃連去蘆酒炒 京三棱酒炒 葛根 甘草各五錢 知母酒炒 廣

茂酒炒 脩黃芬六錢 黃蘗七錢去粗 右撮一劑稱一半爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸或一百五十九一平研粗末

每用五錢若胃強能食大便乾燥者可旋加至七八錢用水二鍾先將粗末浸半日煎至一鍾去渣熱服服時仰卧伸腳置高處枕頭窩

藥一口作十次蒸之一鍾將喫完可留一口將丸藥送下服藥畢卧如常此治法也 勸升陽調經湯 瘰癧項頑瘰癧堅如鐵升葛甘知

蘇梭黃連膠草翅茂桔 柴胡連翹湯 治男婦熱毒馬刀瘰癧氣寒血滯經閉等證 柴胡 連翹去心 知母酒炒 葛今各五 黃蘗酒炒 生地 甘草各三

錢 瞿麥穗六錢 牛蒡子二錢 當歸尾五分 肉桂三分 右共研粗末每服三錢或五錢水二大鍾煎至一鍾去渣食後熱溫服

雞鳴散 治瘰癧疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者 黑牽牛 兩 胡粉一錢 生大黃二錢 朴硝煉成粉 右共爲細末每

服三錢雞鳴時并花水調服以二便利爲度如不利再服 勸雞鳴散 治瘰癧瘰癧結核頑悶軟相牽粉牽硫黃爲細末并水調服便利通

李東連翹散堅湯 治氣毒瘰癧耳下或至缺盆或至肩以上生瘡堅硬如石推之無根者名馬刀瘰癧手足少陽經中來也或坐兩脇或已流

膿或未破並皆治之 當歸酒洗 連翹去心 莖朮酒炒 京三棱酒炒 土瓜根酒炒 龍膽草各一兩酒洗

黃芩生用一兩二錢半 炙甘草六錢 黃連酒炒 蒼朮各三 赤芍藥一錢 右以一半爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸或

一百五十九一平研粗末每用五錢水一鍾八分先浸半日煎一鍾去渣熱服臨卧頭低脚高去枕而卧每口作十次噉之留一口送下丸

子服畢如常安卧 勸李東連翹散堅湯氣毒瘰癧馬刀瘰癧均堪之核莖草二瓜龍膽黃連蒼

舒肝瀆堅湯 夏枯草 鹽薑酒炒 赤附子酒炒 石決明各五分 當歸 白芍酒炒 陳皮 柴胡 撫芎 穿山甲各一錢 紅花

片子薑黃 甘草各五 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開

鬱筋癭石瘰癧法當夏枯草鹽薑酒炒 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開

鬱筋癭石瘰癧法當夏枯草鹽薑酒炒 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開

鬱筋癭石瘰癧法當夏枯草鹽薑酒炒 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開

鬱筋癭石瘰癧法當夏枯草鹽薑酒炒 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開

鬱筋癭石瘰癧法當夏枯草鹽薑酒炒 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開

鬱筋癭石瘰癧法當夏枯草鹽薑酒炒 引燈心五十寸水三鍾煎一鍾食送熱服 便燥者加乳香一錢 便溏者加煨牡蠣一錢 勸舒肝瀆堅湯開



胡黃色去 共研細酒調服一錢或錢半量入強弱 助消核散 諸瘰癧 瘰癧男婦小兒用之愈後根結 米炒黃甘其元氣 瘰癧

犀角丸 治諸般瘰癧心火上攻兩目赤澀服之有效 犀角 青皮 黑牽牛 陳皮 連翹 薄荷 皂角 右

五味共研細末用皂角去子皮弦泡槌以布絞取汁一益又用新薄荷搗取汁同熬成膏和入藥末內為丸如梧桐子大每服三十九食

後滾湯送下 治犀角丸能除心火諸般瘰癧兼自紅牽牛半生半炒用陳薄皂角連翹青

夏枯草膏 治男婦小兒憂鬱氣鬱瘰癧硬肝肝血燥燥用迅烈少劑恐傷脾氣以此膏常服消之 京夏枯草 當歸 白芍 黑參

高藥 浙貝母 去 矽蠶 昆布 桔梗 陳皮 撫芎 甘草 香附 紅花 前藥共入砂鍋內水煎濃湯布濾去渣將湯

復入砂鍋內漫火熬濃加紅蜜八兩再熬成膏磁罐收貯每用二匙滾水沖服兼戒氣怒魚腥亦可用薄紙攤貼瘰癧自消 助夏枯草膏

醫諸瘰癧化硬消堅理肝虛血燥憂慮肝小旺烈藥傷脾服此宜歸身貝蠶香附桔紅牽牛草無陳皮為藥同熬加紅蜜滾水沖服戒怒急

瘰癧未潰敷貼方 瘰癧未潰敷貼方 瘰癧未潰敷貼方

金倍散 治瘰癧堅硬難消難潰敷之神效 整文蛤 一枝 禮札 金頭蜈蚣 一條 研粗末 將蜈蚣末裝入文蛤內紙糊封口外用西紙糊

七層晒乾麩拌炒以紙黑焦為度去紙研極細末加麝香一分再研勻陳醋調稠溫敷堅硬核處外用薄紙蓋之每日一換 助金倍散敷

堅瘰癧蜈蚣末入文蛤中紙糊晒乾同麩炒加麝研之醋調靈 共研細末米醋調稠溫敷腫處每日一換

神功散 治濕毒瘰癧敷之神效 製川烏頭 嫩黃藥 各等 共研細末米醋調稠溫敷腫處每日一換

李泉龍泉散 治諸般瘰癧未成者消已成者潰 瓦粉 即定粉 龍泉粉 即磨刀石 莪朮 酒浸 京三稜 酒浸 昆布 各五錢 去 右共研

極細滾水調塗患處用此消堅尤速 助李泉龍泉散諸瘰癧瓦粉龍泉粉莪朮稜石布共研為細末滾水調塗速又靈

朱震亨貼瘰癧餅 治項間瘰癧不辨肉色不問大小及日月深遠或有赤硬腫痛普皆貼之效 生山藥 芫芩子肉 右等分搗勻攤貼

之 助朱震亨貼瘰癧餅可移鹿麻山藥共研泥不問日久並腫硬作餅貼之效更奇 右等分研末溫水調稠薄紙攤貼 助神效瘰癧膏良方疎

神效瘰癧方 治瘰癧初起消腫止痛 白膠香 海螵蛸 降真香 右等分研末溫水調稠薄紙攤貼 助神效瘰癧膏良方疎

滯消腫止痛強木破以前用之效 白膠香 海螵蛸 降真香 右等分研末溫水調稠薄紙攤貼 助神效瘰癧膏良方疎

龍珠膏 龍牙草 棘棗根 海藻 蘇木 右細切水二十碗煎至二三碗去渣又用桑葉及蒼耳草灰石皮各

二梳半紙兩層先鋪羅底次置三種反於羅內用滾水熱淋取汁十梳澄清同前湯入鍋內熬成膏用已豆霜白丁香膏鹿茸粉各

少許研細入膏內攪勻磁罐收貯取敷核上再敷時若傷藥其核即清根小者但塗於根上其核自潰 助龍珠膏膏數瘰癧毒瘰癧連末潰敷

之良海藻蘇木龍牙草再加桑根煎湯桑石蒼耳及淋水同煎成膏添麝香石膏白丁香已豆研入膏內塗瘰癧

外科心法

瘰癧潰後方

蟾酥黃豆大一塊 白丁香十五粒 寒水石黃豆大一塊 巴豆十粒 寒食麵黃豆大一塊 右各研細共合一處再研勻煉蜜搗成餅子每

用一根用鐵將瘰癧潰貫鐵一孔插餅子入孔內用綠雲膏黃豆大一塊 龍連插三日後單換膏藥候數日後頑根自脫以膿淨硬退為效如硬未盡

再用以盡為度 蟾酥餅子化堅方瘰癧將潰納入瘡寒水石黃豆大一塊 巴豆十粒 寒食麵黃豆大一塊 用砂鍋一口盛香油火溫候油熱將銀釵子投入油內用桃

五雲膏 專貼鼠瘻馬刀瘰癧已潰 銀釵子四兩 黃丹八兩 香油二十 用砂鍋一口盛香油火溫候油熱將銀釵子投入油內用桃

柳桑槐棗五樣樹枝攪之候起珍珠花時撈去渣用布濾淨將油下入鍋內慢慢將黃丹篩入油內用五枝不住手攪之以滴水成珠為

度取出收貯用時勿令見火以重湯炖化紅緞攤貼 五雲膏貼鼠瘻瘰癧潰後共馬刀銀釵油煎渣濾淨黃丹五枝攪成膏

綠雲膏 黃連 大黃 黃芩 元參 黃蘗 木鱉子各一錢 右藥共切片用香油一兩煤焦色去渣入淨松香五兩再熬成膏傾入水

中扯拔令金黃色入鉢內再熬數滾候溫將猪膽汁三枚銅綠三錢預用醋一兩浸一宿絹濾去渣同入膏內用柳枝攪之候冷為度用時

以重湯炖化薄紙攤貼甚效 蟾酥雲癧破貼最神軍藥連紫元參各油煤渣加松脂膽汁銅綠入攪勻

蛇蛻膏 蜜蜂二付 蛇蛻七分 蜈蚣二條焙干 右用香油四兩將前三藥入油用文武火煤枯撈去渣入定粉二兩用如筋粗桑枝七條

急攪候冷出火氣七日夜方用紙攤貼患處 蟾酥膏貼潰後瘰癧消腫功效極捷蜈蚣蜜蜂煤去渣定粉油熬出火氣 凡治瘰癧馬

刀潰破之後應用方藥氣血兩虛宜八珍湯堅硬未消者宜香貝養榮湯食少便瀉者宜香砂二君子湯血虛肝熱或瘡口出血或紅腫者

宜逍遙散加丹皮炒梔子瘡口啟遲宜十全大補湯加白敏虛煩不寐者宜歸脾湯調理但藥劑大小量人歲數虛實斟酌用之 八珍湯

見諸○香貝養榮湯見諸○香砂二君子湯見諸○逍遙散見諸○十全大補湯見諸○歸脾湯見諸○益元散見諸○許見諸○非靈血

上石瘰○石瘰生於頸項旁堅硬如石色紫常帶肝鬱結於經絡潰後法依瘰癧瘡此瘰生於頸

項兩旁形如桃李皮色如常堅硬如石舉痛不熱由肝經鬱結以致氣血凝滯經絡而成此證初小

漸大難消難潰既潰難斂疲頑之證也初起氣實者宜服舒肝清肝湯氣虛者宜服香貝養榮湯外

用葱白蜂蜜搗泥敷貼日久不消者以陽燧鏡每日炙之以或消或軟或特潰為度既潰法同瘰癧

香貝養榮湯 白朮二錢 人參 茯苓 陳皮 熟地黃 川芎 當歸 貝母去心 香附 酒炒 白芍 各一錢 桔梗 甘草各五分

姜三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服 胸膈痞悶加枳殼木香 飲食不甘加厚朴蒼朮 寒熱往來加柴胡地骨皮 膿潰作渴倍人參

當歸白朮加黃耆 膿多或清倍當歸川芎 脇下痛或痞加青皮木香 肌肉生邊加白薇肉桂 痰多加半夏橘紅 口乾加麥冬五

味子 發熱加柴胡黃芩 渴不止加知母赤小豆 潰後反痛加熟附子沉香 膿不止倍人參當歸加黃耆 虛煩不眠倍人參熟地

加遠志棗仁 貼香貝養榮用四君四物貝桂香附陳血兩虛宜多服瘰癧石瘰效如神○陽燧鏡見首卷○舒肝清肝湯見原

石瘰圖



石瘰頸項傍瘰癧如石者同



失榮證○失榮且勞及項肩起如癩核不動堅皮色如常○漸大覺思起備火燥日久之氣衰則  
瘦愈潰愈硬現紫斑腐爛流注流水水瘡口翻化治總難註此榮證生於耳之前後及項肩其證初  
起狀如癩核推之不動堅硬如石皮色如常日漸長大由憂思志怒氣鬱血逆與火凝結而成日久  
難愈形氣漸衰肌肉削瘦愈潰愈色現紫斑腐爛流注流水水瘡口開大穿肉高突形似翻花

瘡證古今雖有治法終屬敗證但不可棄而不治初宜服和榮散堅丸外貼阿魏化堅膏然亦不過苟延歲月而已  
和榮散堅丸 治失榮調和榮散堅丸 川芎 白芍 酒炒 當歸 茯苓 熟地 陳皮 桔梗 香附 白朮 各一錢 人參 甘  
草 炙 海粉 昆布 貝母 各五錢 升麻 紅花 各三 夏枯草 一斤 熟湯 再加紅 蜜 四兩 再煎成膏 共研細末 夏枯草膏 含丸如梧桐子 大每服三錢  
食遠白滾水送下 身熱加黃芩 柴胡 自汗盜汗 去升麻 倍人參 加黃耆 飲食無味 加藿香 砂仁 飲食不化 加山查 麥芽 胸膈痞  
悶 加澤泄 木香 欬嗽痰氣 不清 加杏仁 冬 口乾作渴 加知母 五味子 睡眠不寧 加黃蘗 遠志 棗仁 驚悸健忘 加茯神 石菖蒲  
有汗惡寒 加薄荷 半夏 無汗惡寒 加蒼朮 藿香 婦人經事不調 加延胡索 丹皮 腹脹不寬 加厚朴 大腹皮 黏和榮散堅丸 消鬱開  
結 益虛理肝 脾八珍 貝結陳香附 昆海升紅 結草 宜

阿魏化堅膏 用蟾酥丸藥末一料 金頭蜈蚣五條 灸黃去頭足 共研勻 將太乙膏二十四兩 重湯炖化 離火盆前 藥末攪冷 為度 每用時以  
重湯炖化 用紅絹攤貼 半月一換 輕者漸消 重者亦可稍解 常貼可保不致翻花 黏阿魏化堅消結聚蟾酥丸 料研末 細蜈蚣 灸黃 太乙  
膏 此化攪勻 功速 極

太乙膏 見潰瘍門 蟾酥丸 見疔瘡門  
鈕扣風 ○鈕扣風生胸脘間 風濕結聚 搔痒難延 及成片浸汁水 因地而名 富癖者註 此證生於頭  
下天突穴之間 因汗出之後 邪風襲於皮裏 起如粟米 搔痒無度 抓破津水 誤用水洗 浸淫成片 輕  
者外敷獨勝散 冰硫散 甚者宜服消風散 即愈



獨勝散 芥菜花一味 研細 醋調 患上 黏獨勝散 治鈕扣風 已破未破 用俱靈內 只芥菜花一味 止癢消腫 有奇功  
冰硫散 硫黃一錢 潮腦 川椒 生白礬 各二 共為細末 先用白蘿蔔一個 掏空 將藥填滿 用蘿蔔皮 益之 紙包三四層 用炭火內 煨  
半時許 待冷 將藥取出 同熟猪脂 油調 稠搽 患處 自愈 黏冰硫散 內首硫黃 潮腦 椒 蒼用 最良 蘿蔔 掏空 藥 滿油 調 專 搽 鈕 扣 瘡

消風散 治鈕扣風 搔痒無度 抓破津水 亦有津血者 荆芥 防風 當歸 生地 苦參 蒼朮 炒 蟬蛻 胡麻仁 牛蒡子 炒 研  
知母 生 石膏 煨 一錢 甘草 生 木通 各五分 水二鍾煎 八分 食遠服 黏消風 止癢 散風 濕木通 蒼朮 苦參 知荆防 歸參 蟬青草  
胡麻 生地 水煎之

外科心法



上中下發背



對膈發其形平漫如龜其初起皆形如粟米焮痛麻痺周身拘急寒熱往來因循數日突然大腫氣貫者多焮痛氣虛者多麻癢初起治法不論虛實即宜隔蒜灸灸之不應則就患項當肉灸之至知痛為效以大小移深居淺灸後用鐵當瘡頂點破一孔隨用拔法務使毒氣內外疏通庶不致內攻如有表證發熱惡寒無汗者宜刺防敗毒散汗之如有裏證發熱惡寒大便燥者宜內疎黃連湯下之表裏證兼有者宜神授衛生湯雙解之以減瘡勢膿將成必行託裏如潰破腐肉不去外貼巴膏以化之其餘治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門蓋此三證無論老少總以高腫紅活焮痛者為順若漫腫塌陷枯紫重者為逆

荆防敗毒散 見項部 腦疽門 ○內疎黃連湯 ○神授衛生湯 俱見腫瘍門 ○巴膏 見潰瘍門 膏藥類方

上搭手




逍遙散 當歸 酒洗 白芍 酒洗 白茯苓 白朮 土炒 香附 各一錢 柴胡 八分 黃芩 五分 陳皮 一錢 薄荷 五分 甘草 六分生

水二鍾煎八分食遠服 方 逍遙散能氣血開鬱行滯又消結歸芍苓朮香附陳薄甘草清毒熱

六鬱湯 香附 酒炒 茯苓 陳皮 半夏 製 川芎 山柰 一錢 蒼朮 炒 縮砂仁 甘草 各五 姜三片 水二鍾煎八分服 方 六鬱湯能開六鬱取其消痰又行氣考縮二陳蒼山柰香附生薑兼化滯

中搭手



中搭手 ○中搭手生近膏肓經屬膀胱脊骨旁七情不和憤怒火虛虛熱細參詳註此證生在脊骨兩旁屬足太陽膀胱經膏肓穴一名龍疽由七情不和憤怒火凝而生遇氣寒而實便燥不渴者宜一粒金丹溫下之若氣熱而實便燥大渴者宜內疎黃連湯寒下之若氣血虛瘡不能發長者宜內託黃膏散託補之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

一粒金丹



一粒金丹 木香 乳香 路五 巴豆霜 沈香 五分 各為細末和勻用肥膠囊個年去及核高調和藥末為丸如艾膏大每服一丸

細嚼用滾水一口將藥送下少頃再飲白滾水一口即瀉一次若飲滾水二口即瀉二次遇胃氣壯實者服藥後連飲滾水三口即瀉三四次不可太過毒滯瀉盡即以米飯補之 秘方一粒金丹癩瘡寒實不渴使燥良木乳沉香已豆肉棗肉為丸服即康

內託黃耆散 當歸 白芍 炒 川芎 白朮 土炒 陳皮 穿山甲 炒 皂刺 黃耆 各一 檳榔 三分 紫肉桂 五分 水二鍾煎

八分食前服 秘方內託黃耆治瘡虛託諸瘡用甚宜歸芍芩朮陳皮桂山甲檳榔皂刺者

內疎黃連湯 見腫瘍門

下搭手



下搭手 下搭手生經膀胱穴在背門腰窩旁房勞過度生毒火紫陷腐爛透膜腸 註此證發於腰窩旁開三寸屬足太陽膀胱經背門穴由房勞過度有傷腎水水竭不能制火火旺以致榮衛不和逆於肉裏而生也初發紅活嫩腫令人寒熱往來口渴煩燥百節疼痛宜服仙方活命飲宣解毒火次服內託黃耆散託毒發長將潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若初腫腰痛如折不能俯仰者

仙方活命飲

見腫瘍門 ○內託黃耆散 見前中搭手

蓮子發



蓮子發 蓮子發名取象形膽與膀胱毒化成形斜平塌侵骨重形長高腫半背輕此證一名太陰疽生於脊骨兩脇及屬膀胱經火毒合化凝結而成若形斜平塌頭侵骨尾站肋骨者屬毒重若形長高腫偏於半背中不過督脈旁不過肋骨屬毒輕遇氣實之人初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次宜一粒金丹下之遇氣虛之人初宜仙方活命飲宣解之次宜內託黃耆散託補之其餘內

外治法俱宜按癰疽腫瘍潰瘍門

蟾酥丸 見疔瘡門 ○仙方活命飲 見腫瘍門

蜂窩發



蜂窩發 蜂窩發似蜂窩形每在肩後脊旁生此證最忌頭向上急清心火免內攻註此證多生肩後及脊旁形似蜂房由脾經積熱更兼心火凝結成毒初起高腫如甌形胖脹半背者輕瘡軟橫斜漫夫者重一服內疎黃連湯若頭向上屬心火熱極防毒火內攻臟腑亦有瘡形長若尺許根橫滿背者名為竟體疽屬毒甚險初覺宜急服黃連消毒清心解毒厚皮內攻其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

陰陽二氣疽



陰陽二氣疽 陰陽二氣疽脊旁腫消軟硬變不常七情內乖逆榮衛如期膿潰自無妨 註此證生於脊背之旁乍膿乍消時軟時硬由七情內乖榮衛不和而生也初發令人寒熱往來若大渴神清

高腫脈洪二七膿成潰破者順若不渴神昏漫腫脈細應期無膿飲食不患者逆初服奪命丹以退寒熱次服仙方活命飲其餘內外治法俱按癰疽腫潰湯門

奪命丹 輕粉 麝香 白砒各五分起  
銅綠各二錢 蝸牛二十一個連殼  
白礬 辰砂為衣 血竭各一錢 雄黃二錢 蟾酥二錢乾者 乳香 沒藥 寒水石

右為細末先將蝸牛研爛如泥勻合煎藥丸如不成加好黃酒少許打三五百下為丸如菘豆大每服二三丸先用葱白一寸令病者嚼爛自吐於手心內男用左手女用右手將丸藥裏急泥內用無灰酒一大鐘溫熱送下破益汗出為度重者不過三服不可多用

丹中粉麝香砒礬砂竭共雄黃蟾酥乳沒兼寒水銅綠蝸牛用最良

申疽 ○申疽生於背脇間連發相連色依然漫腫漸紅多痛積憤鬱火是其原此證生於背脇之間初發一處其後接次發出二三處形雖不同而色仍同也潰後多相串通故名老鼠齧又名遊走血脾癰初發漫腫無頭皮色如常漸腫漸透紅色多疾牽引旁處骨痛因積憤鬱火而成也初

申疽生於背半至脇



申疽 ○申疽生於背脇間連發相連色依然漫腫漸紅多痛積憤鬱火是其原此證生於背脇之間初發一處其後接次發出二三處形雖不同而色仍同也潰後多相串通故名老鼠齧又名遊走血脾癰初發漫腫無頭皮色如常漸腫漸透紅色多疾牽引旁處骨痛因積憤鬱火而成也初

服仙方活命飲宜解鬱毒其次內外治法俱按癰疽腫潰湯門

仙方活命飲 見腫瘍門



酒毒發 ○酒毒發生滿背間皮色不變如彈拳堅硬麻木痛徹內藥酒厚味使之然此證生於背背皮色不變鬱紫如彈如拳堅硬如石時麻時木痛徹五內二便澀滯周身拘急數日後頭面手足虛腫泄瀉似痢總由過飲藥酒更兼厚味積毒所致初起宜服連翹消毒飲次服內疎黃連湯其證或消或潰須速治為順若遷延日久不消不潰必腐爛筋骨即成逆證其餘內外治法俱按癰疽腫潰湯門

連翹消毒飲 連翹去心 梔子 桔梗 赤芍 當歸 元參 射干 黃芩 紅花 葛根 陳皮各一錢 甘草五分生 大黃初起

一者加 花 粉 一錢 水二鍾煎八分食遠服 有痰者加竹如一錢 射干 黃芩 紅花 葛根 陳皮各一錢 甘草五分生 大黃初起

射陳當 ○內疎黃連湯見腫瘍門

連珠發皮色淡紅



連珠發 ○連珠發發於背脊微皮色淡紅發時尿閉少腹滿陰囊作腫百節痠疼此證生於背背論左右連腫三五塊形若貫珠由榮血大毒或酒色過度而成其瘡微痛皮色淡紅發時少腹脹滿小水閉陰囊作腫百節痠疼初起宜服神授衛生湯加木通車前其餘內外治法俱按癰疽腫潰湯門

神授衛生湯 見腫瘍門

連珠發 ○連珠發發於背脊微皮色淡紅發時尿閉少腹滿陰囊作腫百節痠疼此證生於背背論左右連腫三五塊形若貫珠由榮血大毒或酒色過度而成其瘡微痛皮色淡紅發時少腹脹滿小水閉陰囊作腫百節痠疼初起宜服神授衛生湯加木通車前其餘內外治法俱按癰疽腫潰湯門

丹毒發



丹毒發○丹毒發如湯火傷細瘡亦常湯非常丹石剛刺致此證紅活者生紫黯亡此證生於背形如湯火所傷細瘡無數赤暈延開發時其渴非常用素服丹石剛刺所致初服黃連消毒散赤國老膏服之外用牛肉薄片貼之其色紅活鮮潤神清者生若紫黯神昏更兼脈脹眼脹嘔噦者一

國老膏 甘草二斤 搗碎河水浸一宿揉令散汁濃去盡筋渣再用絹漉過銀器內慢火熬成膏用鐵罐收貯每服三錢無灰溫酒調下或白滾水亦可

黃連消毒散 見頭部百會症

禽疽圖



禽疽○禽疽毒由時氣成數塊似疹色紫紅背生形如拳打狀拘急麻木不作疼 註此疽之毒由時氣風熱而成指發數塊如疹其色紫紅在背而生形如拳打之狀背脊麻木拘急並不作痛種清脈和服藥得汗者順若神昏脈燥或微或代發高者逆初宜急服仙方活命散如羌活獨活汗之外敷二味拔毒散或蟬蛻拔毒散消之若漫腫不潰即服託裏透膿湯其餘內外治法俱按癰疽腫瘍清門

癩注圖



癩注發○癩注發如布袋形按之木硬覺微疼其發不紅亦不熱濕痰七情鬱滯成 註此證發於背背長形如布袋短形如冬瓜按之木硬微覺疼痛不熱不紅皮色如常由濕痰七情鬱滯凝結於肌肉之間日積深久而成初起宜服瘡科流氣飲貼金鳳化痰膏消之如此證久遠疲頑治之不消者屆期要清治法俱按癰疽清門

瘡科流氣飲 人參 厚朴 姜製 桔梗 防風 紫蘇 黃耆 鹽水炒 枳殼 麩炒 當歸 白芍 肉桂 烏藥 甘草 各文 芫 南木香 白芷 檳榔 各五分 引加生薑一片水二鍾煎八分溫服

藥橫柳歸芍芫 金鳳化痰膏 風仙花 一捧去青 大葱自然汗 一茶 好米醋 一茶 廣膠 三錢切末粒大 人中白 八錢火微 先將葱汁米醋廣膠投

入鍋內熱化次下鳳仙花末熬成膏再入人中白末將鍋離火不時攪勻用時以重湯化化量痰色之大小薄紙攤貼候膏自落再換新膏

黃瓜癰圖 黃瓜癰 黃瓜癰在背旁生腫火色紅黃瓜形腫高寸餘長尺許四股麻木引心疼 註此證生於背

黃瓜癰 黃瓜癰在背旁生腫火色紅黃瓜形腫高寸餘長尺許四股麻木引心疼 註此證生於背

黃瓜癰 黃瓜癰在背旁生腫火色紅黃瓜形腫高寸餘長尺許四股麻木引心疼 註此證生於背

黃瓜癰 黃瓜癰在背旁生腫火色紅黃瓜形腫高寸餘長尺許四股麻木引心疼 註此證生於背

黃瓜癰 黃瓜癰在背旁生腫火色紅黃瓜形腫高寸餘長尺許四股麻木引心疼 註此證生於背

黃瓜癰 黃瓜癰在背旁生腫火色紅黃瓜形腫高寸餘長尺許四股麻木引心疼 註此證生於背

內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門 ○奪命丹 見陰陽二氣症

腎俞發背 第十四節之傍脊中左右同



人參養榮湯或加減八味丸以救其源其順逆內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門



沒藥丸 桃仁一兩炒 乳香 川芎 川椒去目 當歸 赤芍 各五錢 自然銅二錢五分 煅礬石五分 共研細末用黃蠟二兩火化開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每用一丸以好酒一鍾將藥化開煎至五分乘熱服下 勳沒藥丸治中石疽乳沒桃芳歸為宜藏川自然銅黃蠟用酒服之行瘀血



中石疽○石疽寒凝於血聚生於腰膈最纏綿堅硬如石皮不變時覺木痛消滑難註此證由寒氣瘀血凝結生於腰膈之間纏綿難以收功其痛時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色不變初宜內服沒藥丸外用鮮商陸搗爛貼於患處治之隨用艾炷富頂灸之以較為度清後按癰疽潰瘍法治

用白葉散敷之若不速治纏腰已偏毒氣入膈令人膨脹悶嘔者逆  
龍肝瀉肝湯 龍膽草 連翹 去心 生地 澤瀉 各一錢 車前子 木通 黃芩 黃連 當歸 梔子 生研 甘草 各五分 生軍 二錢 使 水二鍾煎八分食前服 勳龍膽瀉肝火丹生形如雲片粟多紅花連梔車歸尾生地軍翹木通 除濕胃苓湯 蒼朮 厚朴 姜炒 陳皮 猪苓 澤瀉 赤茯苓 白朮 土炒 滑石 防風 山梔子 生研 木通 各一錢 肉桂 甘草 分三 水二鍾燈心五十寸煎八分食前服 勳除濕胃苓火丹磨脾肺濕熱飽白黃胃苓湯用通梔子滑石防風共作湯 栝葉散 側柏葉 炒黃 蛇蛻 冀 韭菜地 黃蘗 大黃 各五 雄黃 赤小豆 輕粉 各三 右為細末新水調服

纏腰火丹○纏腰火丹蛇毒名乾濕紅黃似珠形肝心脾肺風熱濕纏腰已偏不能生註此證俗名蛇串瘡有乾濕不同紅黃之異皆如粟珠形乾者色紅赤形如雲片上起風粟作癢發熱此屬肝心二經風火治宜龍膽瀉肝湯濕者色黃白水泡大小不等作爛流水較乾者多疾此屬脾肺二經濕熱治宜除濕胃苓湯若腰筋生之條肝火妄動宜用柴胡清肝湯治之其間小胞用線鍼穿破外

編輯外科心法要訣

眼胞菌毒圖



凡患眼胞腫形如蟹黃白色不起日久如菌形

眼部

眼胞菌毒○菌毒生於眼胞邊如菌黃亮水炮圓頭大蒂小漸垂出脾濕鬱熱結凝堅 註此證生於上下眼胞睫邊初如菌形頭大蒂小黃亮水胞或頭有小蒂大者漸長垂出眼凝不痛有纏綿經年不愈者以致目病益眼胞屬脾其經素有濕熱思鬱氣結而生也初起宜用清涼圖洗即消有經年皮厚消之不愈者法當用軟棉紙蘸水潤眼皮菌毒處少頃用左手大指甲執於患根右手持銀針

大頭齊根切下血出不妨即用翠雲鏡磨塗之其血即止內服涼膈清脾飲忌海腥煎炒  
清涼圖 當歸尾 石菖蒲 赤芍藥 川黃連 地膚子 杏仁 羌活 膽礬 共研粗末以大紅絹包之如櫻桃大

甜滾水浸泡乘熱洗勿見塵土 輕粉一錢 右共為細末糯米百粒水一盞煎半盞去米再煎至三分和藥作錠陰乾用時水  
翠雲鏡子 杭粉五兩 銅綠 黃連 磨令濃以雞翎蘸塗患處 防翠雲鏡子能止血銅綠輕杭黃連強共為細末和成錠菌毒切後塗之良

涼膈清脾飲 生地黃 連翹 枳子生研 薄荷 荆芥 防風 石膏 黃芩 赤芍 甘草 水二鍾燈  
心二十根煎八分食透服 註涼膈清脾生地黃連翹枳子薄荷荆芥防風石膏兼甘草醫治菌毒服即康

眼丹○眼丹眼胞上下生紅熱腫痛較偏風燥熱緊硬偏於熱劑防敗毒服有功 註此證由脾胃濕熱受風而成紅腫疼痛若腫較下垂不能視物者偏於風盛也浮腫易消若嫩紅色緊硬者偏於熱盛也腫硬難消初起俱宜荊防敗毒散散其風口渴便燥者宜內疎黃連湯瀉其熱有日消之不應者宜服透腹散熱針之腫用如意金黃散洗之潰用琥珀膏或白膏藥貼之 註宜速消則愈深穿透眼胞成漏難收

荊防敗毒散 見頂部 內疎黃連湯 如意金黃散 透腹散 琥珀膏 白膏藥  
眼胞生於眼睫如痛小瘡也

眼丹至眼胞左右相同



圖眼鍼



鍼眼○鍼眼眼睫豆粒形輕者洗消膿不成甚則赤痛膿愈破後風浸浮腫生 註此證生於眼皮毛睫間由脾經風熱而成形如豆粒有尖初起輕者宜用如意金黃散散湯沖洗膿不成即消去風熱感者色赤多痛洗之不消膿已成也候熱鍼之貼黃連膏亦有破後邪風侵入瘡口令人頭面浮

腫目赤澀痛者外仍洗之內服考皮散即愈

考皮散 川芎二兩 青皮兩 共為末每服二錢菊花湯調服。○外以枯礬末雞子清調敷腫處。又用南星末同生地黄搗膏貼太陽穴。如意金黃散見眼科。○黃連膏見鼻部。

如意金黃散 見眼科。○黃連膏 見鼻部。



眼胞痰核 ○眼胞痰核濕氣鬱結如粟如豆形皮裏向外推之動皮色如常硬不疼。此證結於上下眼胞皮裏向外其形大者如棗小者如豆推之移動皮色如常硬腫不疼由濕痰氣鬱而成宜服化堅二陳丸外用生南星蘸醋磨爛塗眼皮日數淺者即消日數深者雖不能即消常塗冷皮薄微微損以手指甲擗出如白粉汁即消貼貝葉膏收口從眼皮裏潰破者難斂。

化堅二陳丸 陳皮 半夏各一兩 白殭蠶炒二兩 白茯苓五錢 甘草三錢 川黃連三錢 共研細末荷葉煎湯合丸如梧桐子大每服二錢白滾水送下 散化堅二陳丸消痰週身結核服更痊陳皮半夏茯苓草殭蠶荷葉川黃連

貝葉膏 見潰瘍門

椒瘡粟瘡 ○椒瘡粟瘡生胞裏脾胃血熱是根由粟瘡黃軟濕易散椒瘡亦硬熱難消。此二證生於眼胞之裏雖皆由脾胃血熱所致然粟瘡偏於濕盛故色黃形軟其證易愈椒瘡偏於熱盛故色赤形硬其瘡難消俱宜服清脾涼血湯外以清涼圓洗之若眼裏有紅絲堆疊者乃血熱有瘀也法以燈草刮瘡處令血出即愈。

清脾涼血湯 荆芥 防風 赤芍 黑參 陳皮 蟬蛻 蒼朮炒 白鮮皮各一錢 連翹去心 生大黃各一錢五分酒洗 厚朴姜炒

椒瘡生於眼胞裏形如椒粒色赤



粟瘡



清涼圓洗 見齒毒

皮翻證生於眼皮更翻轉如舌紙卷之狀



皮翻證 ○皮翻證係眼胞翻狀如舌紙卷一般翻因胞腫脹緊故血壅氣滯胃經原。此證由胃經血壅氣滯而成小兒多有之眼皮外翻如舌紙卷之狀又如痘風眼爛胞腫弦緊者則眼皮亦翻治宜瀉脾胃之積熱以瀉黃散服之即愈亦有內翻者即目科拳毛倒睫弛不內外翻者即目科胞垂難治之證也。

神效黃散治皮翻證石膏梔子草防風



漏睛瘡○漏睛瘡在大眇生肝熱風濕病睛明紅腫痛潰膿稠易青黑膿稠雖長平註此證生於目大眇由肝熱風濕病發太陽膀胱經睛明穴其穴之處係藏淚之所初起如豆如粟紅腫疼痛瘡勢雖小根源甚深清後出黏白膿者順出青黑膿或如膏者險初宜服疎風清肝湯湯後用黃靈燻入瘡口兼貼萬應膏其口漸漸收斂有膿從大眇內出者成漏雖斂亦有瘡口過出淚液以致目內

乾澀者收斂更遲若清斷眼邊強者不治  
疎風清肝湯 當歸尾 赤芍 荆芥穗 防風 川芎 菊花 生梔子 薄荷各一  
燈心五十寸水煎食遠服 防疎風清肝漏睛瘡又除肝熱散風強弱以銀花苦菊草紫翹梔子薄荆防  
黃靈膏○萬應膏 俱見清瘡門

目中弩肉○目中弩肉心火成實火大皆色深紅小皆紅綠淡虛火弩肉時覺或脹疼 註此證生於目兩眇瘀肉弩出時覺疼痛總屬心火所成然火有虛實如大皆紅肉色深紅者心經實火也宜決明散主之外俱用清涼圖泡洗久自愈  
黑參湯 黑參 苦參 梔子研 菊花 黃連 枳殼炒 草決明 車前子 防風 大黃炒  
升麻各二 水煎食後服



方黑參湯治大皆疾內生弩肉實火成苦參梔子黃連殼草決明車前子防風大黃升  
決明散 玉竹 黃連 枳殼炒 川芎 甘草生 荊羊角各一兩 車前子 青箱子 草決明各五  
再用一服 決明弩肉虛火攻玉山黃連枳殼芍車前青箱荊羊草研末水調最有功  
清涼圖 見齒毒



鼻部  
鼻疽○鼻疽生於鼻柱間肺經鬱火發督原堅硬色紫常木痛于金仙方託裏痊 註此證生於鼻柱屬督脈經鼻為肺竅故又屬肺由肺經鬱火凝結而成堅硬色紫時覺木痛初宜服千金漏蘆湯

宣解鬱毒次用仙方法命飲加梔子木通薄荷桔梗消之若腫痛不減效後作膿則宜託裏透膿湯並外治法按癰疽潰瘍門  
千金漏蘆湯 漏蘆一兩 枳殼一兩 梔子 朴硝一兩 大黃一兩 五錢 甘草一兩 生 麻黃 黃芩 白斂各一兩 連翹一兩 去心

御纂醫宗金鑑 卷五 外科心法 十四



升麻一兩 共研末每用二錢水一鍾姜三片薄荷葉一錢煎五分溫服以取便利為度 勑千金漏蘆鼻疽發色紫駁疾效更嘉漏蘆根  
 殺硝黃草麻芩白敏翹升麻  
 仙方法命飲 見腫瘍門 ○託裏透膿湯見頭部位腦疽

鼻疔



鼻疔 ○鼻疔生在鼻孔中鼻竅腫引腦門疼甚則脅腮傷子腫肺經火毒蟾離宮註此證生於鼻孔  
 內鼻竅腫塞脹痛引腦門甚則脅腮俱作浮腫由肺經火毒凝結而成宜蟾酥丸汗之再用蟾酥研  
 細末吹入鼻竅若腫硬外發用離宮欬塗之此證初起之時須當速治遲則毒氣內攻以致神昏  
 嘔噦鼻腫如疽者逆

蟾酥丸 見疔瘡門 ○離宮欬 見腫瘍門

鼻淵 ○鼻淵濁涕流鼻中久淋血水穢而腥胆熱移腦風寒火控腦砂因蝕腦蟲 註此證內因胆經之熱移於腦髓外因風寒凝鬱火邪而成  
 鼻竅中時流黃色濁涕宜奇授霍香丸服之若久而不愈鼻中淋漓腥穢血水頭眩虛暈而痛者必係蟲蝕腦也即名控腦砂宜天羅散服之  
 但此證久則必虛當以補中益氣湯兼服之即效

奇授霍香丸 霍香連枝葉 八兩 研細末雄豬膽汁和丸如梧桐子大每服五錢食後蒼耳子湯下或黃酒送下

勑奇授霍香鼻淵流濁涕淋漓久不休豬膽汁和霍香末蒼耳湯下患可瘳

天羅散 ○絲瓜藤 近根處者 為末每用三錢食後黃酒送下 勑天羅蟲蝕腦髓中頭痛鼻流血水腥絲瓜根燒研細末黃酒調服慣殺蟲

補中益氣湯 見消瘡門

鼻齧



鼻齧者多小兒鼻地及肉傍

鼻齧者 鼻齧者多小兒生鼻下兩傍疔爛形總由風熱客於肺膿汁浸淫癢不疼 註此證多生小  
 兒鼻下兩旁色紫疔爛由風熱客於肺經膿汁浸淫癢而不痛宜服澤瀉湯外搽青蛤散即愈  
 澤瀉散 澤瀉 鬱金 山柰 甘草 各一錢 共研末每服一錢甘草煎湯送下

勑澤瀉散治鼻齧膿腫膿汁浸淫肺火毒澤瀉鬱金柰草木甘草煎湯調送服

輕粉 黃藥 各五錢 共研細末先用香油調成塊次加涼水調稀薄塗瘡處

鼻瘡 鼻瘡肺熱生鼻中燥乾如火微腫痛內服黃芩外定痛燥乾黃連膏潤靈註此證生於鼻竅  
 內初覺乾燥疼痛狀如粟粒甚則鼻外色紅微腫痛似火炎由肺經熱上攻鼻竅聚而不散致成

此瘡內宜黃芩湯消之外用油紙熱粘辰砂定痛散送入鼻孔內若乾燥者黃連膏抹之立效

鼻痔



鼻痔者鼻痔被爛生鼻孔難以閉塞

青蛤散 蛤粉 一兩 青黛 三錢 石膏 一兩  
 勑青蛤散治鼻痔消粉青黛煨石膏輕粉黃藥研細末香油拌塊涼水調

食後服 乾黃芩湯醫肺火盛鼻內生瘡赤腫痰草麥冬桑柘翹赤芍桔梗薄荷煎

辰砂定痛散 辰砂五分 冰片二分 胡黃連二兩 石膏散兩 共研細末

乾辰砂定痛鼻瘡乾冰片胡連膏煨研油紙攤藥入鼻孔消痰散熱效通仙

黃連膏 黃連三錢 當歸尾五錢 生地一兩 黃藥三錢 姜黃三錢 香油十二兩將藥煤枯搗去渣下黃蠟四兩溶化盡用夏布將

油濾淨傾入磁盤內以柳枝不時攪之候凝為度 乾黃連膏潤諸燥瘡歸尾生地藥善黃油煤去渣加黃蠟布濾攪凝塗抹強

鼻痔○鼻痔初起榴子形久垂紫硬疑氣通肺經風濕熱鬱滯內服辛夷外點平註此證生於鼻內形如石榴子漸大下垂紫微硬擗塞鼻

孔礙人氣息難通由肺經風濕熱鬱滯而成內服辛夷清肺散以清肺熱外以硃砂散逐日點之漸化為水而愈宜戒厚味暴怒庶不再發

辛夷清肺散 辛夷六分 甘草五分 石膏散 知母 梔子生研 黃芩各一錢 枇杷葉三片去毛蜜炙 升麻三分 百合

麥冬各一錢去心 水二鍾煎八分食遠服 或加羌活防風連翹薄荷

乾鼻痔辛夷清肺散辛草膏知梔子及枇杷升麻百合麥冬或加羌活翹薄斟 ○硃砂散 見耳部耳痔內



肺風粉刺○肺風粉刺肺經熱高鼻花瘡亦腫破出粉汁或結屑枇杷顛倒自收功註此證由肺經血熱而成每發於鼻真起碎疙瘩形如黍屑色赤腫痛破出白粉汁日久皆成白屑形如黍米白屑宜內服枇杷清肺散外敷顛倒散緩緩自收功也

枇杷清肺飲 人參三分 枇杷葉一錢刷去 甘草三分 黃連一錢 桑白皮二錢 黃藥一錢 水一鍾半煎七分食遠服

乾枇杷清肺枇杷葉參黃連桑白皮黃藥同煎食遠服肺風粉刺盡宜宜

顛倒散 大黃 硫黃各等分 研細末共合一處再研勻以涼水調敷

乾顛倒散敷功致極大黃硫黃各研細等分再勻涼水調而醫酒皴肺風刺

酒皴鼻



酒皴鼻○酒皴鼻生鼻及邊胃火重肺外受寒凝血初紅久紫重宣鬱治痰緩緩痊註此證生於鼻準頭及鼻兩邊由胃火重肺更因風寒外來血瘀凝結故先紅後紫久變為黑最為纏綿治宜宣肺中鬱氣化滯血如麻黃宣肺酒涼血四物湯俱可選用使榮衛流通以滋新血再以顛倒散敷於患處若日久不愈以梔子仁丸服之緩緩取愈

麻黃宣肺酒 麻黃 麻黃根各二 頭生酒五壺將藥入酒內重湯煮三炷香盡一宿早晚各飲三五杯至三五日出膿成瘡十餘日則膿

盡膿盡則紅色退先黃後白而愈 乾麻黃宣肺酒皴鼻血熱上注外寒癢麻黃並根入酒泡重湯煮飲致不虛

涼血四物湯 當歸 生地 川芎 赤芍 黃芩酒炒 赤茯苓 陳皮 紅花酒洗 甘草各一 水二鍾姜三片煎八分加酒一杯調

五靈脂末二錢熱服 氣弱者加酒炒黃耆二錢立效 射涼血四物鼓鼻紅散於化滯又調紫芩芩四物陳紅草姜煎加酒入五靈

梔子仁丸 梔子仁研末黃蠟溶化和丸如彈子太每服一九茶清嚥下忌辛辣之物 射梔子仁丸鼓鼻赤紫黑纏綿皆可施梔子為末黃

蠟化丸如彈子茶清食○顛倒散見肺風粉刺 耳部

耳部 黑疔○黑疔暗藏耳竅生色黑根深椒目形痛如錐刺引腮腦破流血水火毒攻註此證生於耳竅

暗藏之處由腎經火毒所發亦有因服丹石熱藥積毒而成者色黑根深形如椒目疼如錐刺痛引

腮腦破流血水急服蟾酥丸汗之再用蟾酥丸水調濃滴於耳竅內立效毒甚者以黃連消毒飲疏

解之黃連解毒湯清之即瘥

黃連解毒湯 黃連 黃芩 黃蘗 生梔子各一錢 水煎熱服 射黃連解毒飲瘡者般疔毒煩燥狂黃連芩蘗生梔子四味煎服保妥

康○蟾酥丸 見疔瘡門○黃連消毒飲 見頭部百會疽

耳疔○耳疔時出黑臭膿青雲白纏黃色停胃濕相兼肝經火紅風偏肝血熱成 註此證耳內悶腫出膿因膿色不一而名亦各殊如出黑色

臭膿者名耳疔出青膿者名震耳出白膿者名纏耳出黃膿者名停耳總由胃濕與肝火相兼而成宜紫胡清肝湯王之氣實火盛者宜龍膽

瀉肝湯服之惟風耳則出紅膿偏於肝經血熱宜四物湯加丹皮石膏蒲服之外俱用醬茹內自然油滴之俟膿盡換滴耳油時時滴入腫消

生肌自愈

滴耳油○核桃仁研爛搾油去渣得油一錢兌水片二分每用少許滴於耳內 射滴耳油治耳疔證膿淨滴之效更生核桃搾油消腫痛冰

片發散熱通神

柴胡清肝湯 見頭部髮疽○龍膽瀉肝湯 見腰部纏腰火丹○四物湯 見潰瘍門

耳衄○耳衄上焦血熱成鮮血時流耳竅中肝火柴胡清肝治胃熱生地麥門冬 註此證由上焦血熱所致耳竅中時流鮮血若肝脈弦數者

以柴胡清肝湯服之腎脈虛數者以生地麥冬飲王之總以涼血為多乃抽薪止拂之法也外以神塞丸塞之即瘥

生地麥冬飲 生地黃 麥冬各五錢 水二鍾煎八分食後服 射生地麥冬耳衄熱上焦血熱是其原各用五錢煎食後清肺降火保平安

神塞丸 麝香一分 生白礬一錢 沉香三分 糯米五十 共研細末麵糊為丸如梧桐子大每丸薄棉裹之如左耳出血塞右鼻右耳

出血塞左鼻左耳出血塞右耳右鼻出血塞左耳兩耳俱出血塞兩鼻兩耳俱出血塞兩耳 射神塞麝香生白礬沉香糯米同研麵糊丸大如

梧子薄棉裹塞入耳鼻衄血痊 ○柴胡清肝湯 見頭部髮疽



圖證六部耳

形如羊奶者耳聾形類初生廢語頭大蒂小耳挺形若棗核細條而長努出耳外俱由肝經怒火腎經相火胃經積火凝結而成微腫悶疼  
色紅皮破不當觸犯偶犯之痛引腦顛宜服梳子清肝湯外用確砂散點之漸漸消化

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

水二鍾煎八分食後服 梳子清肝葷痔披腎肝胃火忿怒成苦歸藥乃丹皮草膏萎苈連用有功

確砂散 確砂 一錢 輕粉 雄黃 各三分 冰片 五厘 共研細末水調濃用殼草細梗咬毛蘸點痔上

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五



梳子清肝湯 梳子生研 川芎 當歸 柴胡 白芍 酒炒 丹皮 各一錢 甘草 五分生 石膏 煨 牛蒡子 各一 黃芩 黃連 各五

穿粉散 輕粉 研隔紙 穿山甲 炙 鉛粉 黃丹 各三錢 共研極細末香油調敷 梳穿粉散敷旋耳瘡清熱滲濕油調良輕粉研細隔紙炒穿山甲共鉛粉黃

口部 大人破 ○大人破分虛實紅為實淡紅虛實則滿口爛斑腫虛白不腫點微稀 此證名曰口瘡有虛火實火之分虛火者色淡紅

滿口白斑微點甚則陷露通紋脈虛不渴此因思慮太過多醒少睡以致心腎不交虛火上炎宜服四物湯加黃蘗知母丹皮少佐肉桂以為

引導從治之法也外以柳花散搽之實火者色艷紅滿口爛斑甚者腮舌俱腫脈實口乾此因過食膏粱厚味醃酒炙煇以致心脾實火妄動

宜服涼膈散外搽廷散吐涎則效如口瘡古乾黃硬作渴者宜服加減八味丸以滋化源俱禁水救

柳花散 黃蘗 木 青黛 三錢 肉桂 一錢 龍腦香 二分 各研細再合一處研勻每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

赴庭散 黃芩 黃連 梳子生 乾姜 黃蘗 末 細辛 各等分 共研細末每用少許搽於患處

重手血出無妨隨用冰硼散搽之內服涼膈散即愈

冰硼散 水片五分 硼砂 元明粉各五分 硃砂六分 共研極細不用少許搽於瘡處如咽喉腫痛以蘆筒吹之立效

冰硼散治咽喉腫痛口瘡白點滿口生冰硼硃砂元明粉研末搽之立見功

涼膈散 見面部面發毒

口糜○口糜陰虛陽火成膀胱濕水溢脾經濕熱於胃胃口滿口糜爛色紅疼甚此證由陽旺陰虛膀胱濕水泛溢脾經濕熱於胃又

則化為熱執氣薰蒸胃口以致滿口糜爛甚於口瘡色紅作痛甚則連及咽喉不能飲食初起宜服導赤湯口臭瀉泄脾虛濕者宜服連理湯

糜爛延及咽喉日輕夜重者服少陰甘桔湯使秘者服涼膈散外俱以姜蘇散搽之有效

導赤湯 木通 生地各二錢 甘草一錢 竹葉二十片 水一鍾煎半鍾溫服 妙導赤湯醫口糜證脾濕化熱薰胃成木通生地甘草竹葉

煎服熱自平 加味連理散 白朮二錢土炒 人參 白茯苓 黃連 乾姜 各一錢 甘草五分 炙 水煎熱服 妙連理胃熱脾虛濕口糜臭氣瀉泄

俱麥冬白朮炙甘草乾姜黃連脾胃宜 少陰甘桔湯 桔梗二錢 甘草一錢 川芎 黃芩 陳皮 元參 柴胡 各六分 羌活 升麻 各四分 葱白一根水二鍾煎八分

食遠服 妙少陰甘桔治口糜羌活羌活陳皮元參柴胡升麻共葱白水煎神效奇

姜蘇散 乾姜 黃蘇各等分 各研末共合一處研勻乾搽口內溫水漱口

妙姜蘇散搽口糜爛黃蘇乾姜各細研等分兌勻搽患處溫水漱口效如仙○涼膈散 見面部面發毒

唇部 反唇疔同鎖口疔○反唇疔發唇裏稜鎖口疔在嘴角生粟米堅腫麻痒痛脾胃心經火毒成註此二證俱由火毒而成反唇疔生於唇稜

偏裏上唇屬脾下唇屬胃鎖口疔生於嘴角係心脾二經所屬二證初起形如粟米色紫堅硬如鐵腫甚麻癢木痛寒熱交作煩悶作嘔反唇

甚則令唇外翻鎖口甚則口不能開俱屬迅速之證須當速治遲則毒氣攻裏令人昏憤惡心即名走黃治法俱按疔門禁用灸法

唇疽○唇疽生於上下 唇寒熱交爭毒氣生紫 硬時覺木痛甚脾胃積 熱乃其因註此證生於

唇無論上下左右由脾胃積熱所致色紫有頭大者如李小者如粟腫硬如鐵時覺木痛甚則寒熱交作初宜服神授衛生湯裏裏者服雙

反唇疔 上下唇皆同

鎖口疔 生在口角左右同

唇疽 上下唇皆同



唇疽○唇疽生於上下 唇寒熱交爭毒氣生紫 硬時覺木痛甚脾胃積 熱乃其因註此證生於

神授衛生湯 ○雙解貴金丸 ○離宮錠 俱見腫瘍門


齒部



齒部

齒部 ○牙衄牙縫內出血胃腎二經虛熱實多口臭牙堅牢虛者反此當分別 註此證由熱而成無論虛實無論大人小兒若胃經實熱者則血出如湧口必臭而牙不動宜服清胃湯甚則服調胃承氣湯或用酒製大黃末三錢以枳殼五錢煎湯少加童便調服下黑裏即愈若胃經虛火者牙齦腐爛淡血滲流不已宜服二參湯及補中益氣湯加黃連丹皮若腎經虛者血則點滴而出牙亦微痛口不臭而牙動或落者治宜滋腎有火者一味地黃丸無火者七味地黃丸俱加猴姜隨手應效若疳積氣盛兼服虛膏丸外兼用小薊散擦牙隨青竹茹醋浸一宿含救其效

唇



唇

如翻花時津血水者屬逆失於調治久則變為上消中消下消之證屬凶  
積火結聚而成初起豆粒漸長若蠶繭堅硬疼痛妨礙飲食初起及已成無內證者用蟾酥餅貼之陀僧膏蓋之日久漸消或口渴者宜服清涼甘露散若面赤口唇燥裂便秘者此屬氣虛宜服涼膈散若日輕夜重五心煩熱兩額現紅脈虛數無力者宜服加減八味丸以滋水養陰若清後


唇



唇

唇風多在唇生陽明胃經風火攻初起發癢色紅腫久裂流水火燎疼 註此證多生下唇由陽明胃經風火凝結而成初起發癢色紅作腫日久破裂流水疼如火燎又似無皮如風感則唇不時翕動俱內以雙解通聖散服之外以黃連膏抹之自愈


雙解通聖散



雙解通聖散

防風 荆芥 當歸 白芍酒炒 連翹去心 白木土炒 川芎 薄荷 麻黃 梔子名五錢 黃芩 石膏 桔梗各一  
甘草 二兩生 滑石 三兩 共研粗末每用五錢水一鍾半煎八分澄渣溫服

雙解通聖散



雙解通聖散

雙解通聖散 胃火風疎表清裏膏防歸芍連翹苓木桔麻黃梔草薄荷滑芎  
黃連膏 見鼻部鼻衄

清胃湯 石膏四錢 黃芩 生地各一錢 丹皮一錢五分 黃連 升麻各一錢 水二鍾煎八分食後服

清胃承氣湯 大黃四錢 酒洗 芒硝三錢 甘草二錢 水三鍾煎一鍾去渣少少溫服

調胃承氣湯 大黃四錢 酒洗 芒硝三錢 甘草二錢 水三鍾煎一鍾去渣少少溫服

二麥湯 人參 元參各五分 水煎溫服 二麥湯醫虛火泛齩腐滲流血水淡人參元參各等分水煎服下有神驗

蘆薈丸 蘆薈 子青皮 白雷丸 白燕羨 川黃連 胡黃連 鶴虱草各一兩 木香三錢 麝香一錢 共研末蒸餅糊丸如麻子

大每服一錢空心清米湯送下 蘆薈丸醫積氣感木磨青皮胡黃連燕羨雷丸鶴虱草川連同末蒸餅丸

小薊散 小薊 百草霜 蒲黃微炒 香附子各五分 醋浸陰乾 右研細末用搭牙上半刻時溫茶漱之

補中益氣湯 見清癰門 〇六味地黃丸 見面部雀斑 〇七味地黃丸 附子見面部頰癩

牙宣〇牙宣初起腫牙齦日漸腐積久露根惡熱惡涼當細別胃經客熱風寒侵註此證牙齦宣腫齩肉日漸腐積久則削縮以致齒牙宣露

總由胃經客熱積久外受邪風寒涼相搏而成有喜涼飲而惡熱者係客熱遇寒涼凝滯於齩肉之間有喜熱飲而惡涼者係客熱受邪風稽

留於齩肉之內客熱遇寒者牙齦出血惡熱口臭宜服清胃湯客熱受風者牙齦惡涼遇風痛甚宜服獨活散外有牙齦腐臭齒根搖動者屬

胃中虛火而兼腎虛齒乃腎之餘宜服三因安腎丸又有牙齦腐臭時津白膿者屬胃中濕熱宜服犀角升麻湯外俱用胡桐淚散擦之以食

鹽沖湯漱口惟牙齦動搖或兼疼痛者日以李杲牙散擦之夜用固齒白玉膏貼之緩緩取效若齩肉腐爛露牙床骨者逆

獨活散 獨活 羌活 防風 川芎各一錢 薄荷 生地 荊芥 各一錢 細辛 七分 右為粗末每用二錢水煎澄渣食後服日用三服

三茵安腎丸 補骨脂炒 胡蘆巴炒 茴香炒 川棟子炒 續斷各三兩炒 山藥 杏仁炒 白茯苓 桃仁各二兩炒 共研細末

煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢空心淡鹽湯送下 三因安腎虛火燔牙齦腐臭齒根搖山藥杏仁白茯苓胡蘆巴續川棟桃

胡桐淚散 胡桐淚 細辛 川芎 白芷各一錢 寒水石二錢煨 生地一錢 青鹽二分 共研細末乾搭牙齦患處待頓飯時以溫

水漱去少時再上 胡桐淚散牙齦腫津血宣露或出膿石寒水石生地青鹽白芷共川芎

李杲牙散 龍胆草酒洗 羌活 地骨皮各一 升麻四分 共研末先以溫水漱口用少許擦之

固齒白玉膏 官粉一兩 珍珠三錢 陽起石一兩 用鹽四十九條 防風當歸 川芎牙兒 青鹽升麻 白芷地骨皮 各五錢 細辛薑末 各二

錢 共研末先以溫水漱口用少許擦之

錢 共研末先以溫水漱口用少許擦之

錢 共研末先以溫水漱口用少許擦之

此藥膏用起石火燻通紅入於汁內洋之麝香末一錢 龍骨二 象牙五錢 用黃蠟三兩溶化濾淨再化雜火候溫方入前藥和勻來  
如此火去藥汁將龍骨馬起石焙乾研末麝香末一錢 龍骨二 象牙五錢 用黃蠟三兩溶化濾淨再化雜火候溫方入前藥和勻來  
熱攤紙上如膏冷將熨斗燒熱仰放紙鋪熨斗底上攤之用時先以溫水漱口將膏剪一小條貼於患處閉口勿語 黏固齒白玉貼牙效

一切牙痛及動搖宮粉珍珠陽起腐龍骨象牙黃蠟煎

清胃湯 見牙血 ○犀角升麻湯 見面部煩傷

鑽牙疳 ○鑽牙疳在牙根生突出硬骨銳而鋒痛如針刺殊難忍證由肝胃積熱成 註此證由肝胃二經所致積熱乃牙根肉內鑽出骨尖如  
刺疼痛異常小兒多有之法用鉞針就患處刺開好肉連牙齦根取去若血出不止者以濕紙換貼二次即止內服蘆薈消疳飲外以冰硼散  
搽之戒厚味其牙復生如舊

蘆薈消疳飲 蘆薈 胡黃連 石膏 羚羊角 梔子生研 牛蒡子炒研 銀柴胡 桔梗 大黃生 元參各五 薄荷葉分

甘草 水二鍾淡竹葉一錢煎六分食遠服 黏蘆薈消疳清胃肝荅膏梔子苦胡連銀胡桔梗大黃薄荷甘草元參竹葉煎

冰硼散 見口部喉口瘡

牙疔 ○牙疔牙縫胃火成大腸濕熱亦可生腫如粟米連腮痛若兼麻癢即黑疔 註此證由胃經火毒或太陽經濕熱皆可致之每生於兩旁  
牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項若兼麻癢破流血水疼痛異常者即黑疔也屬腎火毒俱用銀簪挑破以見血為度搽拔疔散再以蟾  
酥丸噙化徐徐嚥之若煩燥口渴者宜服黃連解毒湯即愈若失治毒及攻心令人煩燥昏潰者逆

拔疔散 硃砂 白礬 硃砂 食鹽 用鐵錐刀燒紅將白礬 各等分擇丁日午時研為細末收之 黏拔疔散治諸疔毒硃砂白礬食鹽

硃砂分研末搽患處化硬搜根功效殊

蟾酥丸 見疔瘡門 ○黃連解毒湯 見耳部黑疔

牙癰 ○牙癰胃熱腫牙床寒熱堅硬痛難當破流血水未收口誤犯寒涼多骨妨 註此證由陽明胃經熱毒所致生於牙林堅腫疼痛身發  
寒熱腮頰浮腫初宜服荊防敗毒散若大渴煩嘔者蟾酥丸汗之便秘者雙解貴金丸下之腫處宜刺破搽冰硼散若初時堅腫破流血水  
久不收口過食寒涼者必生多骨俟骨刺出搖則內動始可取出其口方能收斂而愈

荊防敗毒散 見項部腫血 ○蟾酥丸 見疔瘡門 ○雙解貴金丸 見腫瘍門 ○冰硼散 見口部喉口瘡

走馬牙疳 ○走馬牙疳證不輕癰積疹痘毒火攻牙齦腐臭隨變黑頑肉難脫不食凶 註此證多由癖疾積火疹痘餘毒上攻最為迅速總  
因積火熱毒而成牙根作爛墮黑腐臭難離聞若癰積毒火攻牙者初宜服蘆薈消疳飲脾胃虛者兼服人參茯苓粥若疹痘餘毒所中者  
宜服清疔解毒湯外勢輕者俱用白散搽之若堅硬青紫漸腐穿腮當搽者宜蘆薈散搽之如牙縫黑腐不盡及腐爛深坑藥不能到宜用  
勒馬聽做絲塞之再用手法去其黑腐內見紅肉流鮮血者吉若取時頑肉難脫堅硬腐爛漸開以致穿腮破唇宜貼青蓮膏身熱不食者逆



但此證惟瘡疾攻牙成疔者好後易犯有積火時時上攻也惟在調理飲食得宜如山藥菓子鵝饅甜辣等物俱當禁忌若稍有疎忽必致復發慎之慎之

人參茯苓粥 人參一錢 白茯苓六錢 共研末同粳米一茶鍾熬成粥先以鹽湯將口漱淨後再食粥

人參茯苓善扶脾胃飲食短少服之宜二味研末加粳米熬粥食之理胃虛

清疔解毒湯 人中黃 川黃連生 柴胡各五錢 知母生 連翹去心 牛蒡子炒研 犀角鎊 黑參 荆芥 防風各一錢 石膏一錢五分煎 淡竹葉一錢燈心五十寸水二鍾煎八分食遠服 嘔吐蘆葦根五錢

方清疔解毒牙疔證疹痘餘毒化熱成中黃知連柴翹蘆葦角桑葯防風

濁白散 濁垢印婦人尿桶中 白霜梅燒存 枯白礬各二 右研細末先用非根松蘿茶煎成濃汁乘熱以雞鵝蘆洗患處去淨腐肉見

津鮮血再敷此藥白敷三次若爛至咽喉以蘆葦吹之 方濁白散搽走馬疔濁垢白霜梅白礬非根茶葉煎湯洗腐肉敷藥痊

蘆葦散 蘆葦一錢 黃藥五錢末 人言五分用紅棗五枚去核每 共研細末先用米泔水漱淨疔毒後用此藥於堅硬及腐處

勒馬聽徽線 白砒一分末 麝香三分末 青綿搗碎 青黛各一兩 用香油拌勻用時先以清米泔水漱口次用鑷夾將線挑少許塞於牙根縫內日三易之 勒勒馬聽徽疔漸蝕牙縫腐黑急速施油調砒麝膏綿蜜泔水漱口後塞之

青蓮膏 青黛二錢 乳香 輕粉各一錢 麝香五分 白砒一分 右為細末用香油調稠薄攤紙上用鎚槌實陰乾收之每於卧時以泔水漱淨口拭乾隨指證大小前膏藥貼之至晚揭去再以泔水將口漱淨吐之至晚再貼

點青蓮膏貼腐疔宜化腐消堅效更奇乳腐白砒輕粉蜜研末油調紙攤之

蘆葦消疔散 見疔牙疔

齒齲 ○齒齲齒內生小蟲胃經痰濕風火凝口臭只緣胃火盛齒根腐爛出血膿 此證係齒內生蟲由胃經痰濕風火凝聚而成齒根脹痛腐爛時出膿血若口臭盛者胃火盛極上攻所致也宜服玉池散外用雀麥連扳一把苦瓠三十片洗淨將麥剪長二寸以瓠葉裹作五色廣一寸厚五分三年陳醋漬之至日中時以兩包火中炮炙令熱納口中噉齒外冷更易之取包置水中解視之即有蟲長三分老者黃色新者白色其效如神

玉池散 當歸 白芷 升麻 防風 甘草 地骨皮 川芎 細辛 藁本 槐花 各一錢 生薑三片黑豆三十粒水煎去渣候溫合

救冷則吐之若用此方煎服更效 點玉池疏風癩蟲牙津膿根爛服佳歸並升防甘地骨芎辛薑藁槐花

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

齒齲 ○齒齲風熱客明牙根腫痛出臭膿風痛甚久當露白馬鬚蒂入靈注此散白風丸之

痛逆風痛甚常作歪口吸氣之狀牙齦腐孔時出臭膿久則跟齒宣露初宜服清胃湯加羌活外用白馬懸蹄少許以綿裹之塞入膿孔甚效  
清胃湯見牙加

卷六

編輯心科心法要訣

舌部

紫舌脹○紫舌脹屬心經火熱甚血壅腫硬舌腫滿口宜鍼刺血色紫重色紅輕註此證由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬疼痛宜用  
衣鍼紫筋頭上露鋒分許當舌刺數十刺令血出紅色者輕紫色者重隨以溫水漱口搽冰硼散內用涼膈散去朴硝大黃加牛蒡子荆芥倍  
用梔子服之神效

冰硼散見口部熱口瘡○涼膈散見面部面發毒

痰包○痰包每在舌下生結腫綿軟似筋形痛脹舌下妨食語大稽痰涎流注成註此證生於舌下結腫如筋光較如綿塞脹舌下有妨飲

食言語色黃木痛由大稽痰涎流注而成宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠粘不斷拭淨搽冰硼散服加味二陳湯煎炒艾酒等物

加味二陳湯 陳皮 半夏製 白茯苓 黃芩各八分 黃連 薄荷 甘草各五分 水二鍾姜三片煎八分食前服

歌方加味二陳瘰癧包結腫舌下形如飽二陳湯加苓連薄姜煎服下自然消

冰硼散見口部熱口瘡

舌衄○舌衄心火血分炎舌上生孔似鐵尖或如筋頭其色紫甚重腐爛血出泉註此證係舌上忽生孔小者如鍼尖大者如筋頭其孔色

紫屬熱甚色黑防腐爛血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行而成宜服升麻湯兼搽必勝散甚效

升麻湯 升麻 小蘗根 茜根各一兩五錢 艾葉七錢五分 寒水石三兩 共研每三錢水一鍾煎七分渣入生地黃汁一羹匙

再煎二液溫服或加炒側柏葉五錢亦可 歌方升麻古衄心火炎小蘗茜根各兩半艾葉七錢五分加寒水三兩同研爛

必勝散 螺青另研 蒲黃各一錢炒 共合一處研細搽於患處後用溫鹽湯漱口

歌方必勝心熱血妄行舌生小孔湧血紅螺青研末蒲黃炒同勻搽之自歸經

重舌 痰核 重脛 舌疔○舌疔發於心脾經其證皆由積熱成重舌舌下血脈脹痰核舌上一核生重脛生於口上脛時覺心煩梅子形

舌疔舌上生紫胞其形如豆寒熱增註此證無論大人小兒俱可以生重舌者由心脾熱循經上冲舌本遂令舌下血脈脹起如小舌狀故

名重舌宜用冰硼散搽之痰核者心脾痰涎鬱熱舌上生核強硬作痛宜用衣鍼點破搽冰硼散內服加味二陳湯重脛者心脾有熱以致上

脛生瘡形如梅子外無寒熱內時作煩此屬熱極宜服黃連解毒湯加桔梗不時用紫雪散噙化舌疔者心脾火毒舌生紫胞其

形如豆堅硬寒熱疼痛應心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨化隨嚥或再服三粒以解內毒甚者刺之服黃連解毒湯兼紫雪散及徐檢之即愈  
紫雪散 犀角 羚羊 石膏 寒水石 升麻 各一兩 元參 二兩 甘草 八錢 沉香 到 木香 各五錢 水五錢煎藥刺湯一

盃將渣用絹濾去將湯置滾投提淨朴硝三兩六錢文火慢煎水氣將盡欲凝結之時傾入盃內下硃砂冰片各三錢金箔一百張各預  
研細和勻將盃安入冰水盆中候冷凝如雪為度大人每用一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效或用淡竹葉燈心煎湯化服亦

可咽喉腫痛等證吹之亦效 紫雪散醫精熱致沉木犀於元參草寒水升膏朴硝加珠箔冰研入內攪  
冰硼散 見口部結口瘡 加味二陳湯 見痰包 黃連解毒湯 見耳部黑疔 蟾酥丸 見疔瘡門

吉疳 附瘰癧風 ○吉疳 心脾毒火成如豆如菌痛爛紅漸若泛連難飲食綿潰久變瘰癧風 此證由心脾毒火而成其證最惡初如豆次  
如菌頭大蒂小又名吉菌 瘰癧紅爛無皮朝輕暮重急用北庭丹點之自然消縮而愈若失於調治以致焮腫突如泛連或有狀如雞冠舌本

短縮不能伸舒妨礙飲食 言語時津是再因怒氣上冲忽然崩裂血出不止久久延及項領腫如結核堅硬脊痛皮色如常頂較一點色暗  
木紅破後時津臭水腐如爛棉其證雖破堅硬腫痛仍前不退此為難潰甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名瘰癧風也蓋舌本屬心舌邊屬

脾因心緒煩擾則生火火心慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證外勢頗類喉風但喉風咽喉常腫湯火不能下咽此證咽喉不腫可以下湯  
水胃中亦思飲食因舌不能轉動送送硬食故每食不能充足致令胃中空虛而怯證悉添日漸衰敗初起宜服導赤湯加黃連虛者服歸脾

湯熱甚者服清涼甘露 飲合歸脾湯使溘者服歸脾丸其功湯領下腫核初起宜用錦地羅煎醋磨濃敷之潰後宜水登膏貼之自古治法雖多  
然此證百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已

清溪秘傳北庭丹 香 燭砂 人中白 各五分 瓦上青苔 瓦松 澹難矢 各一錢 用傾銀罐二個將藥裝在罐內將口封嚴外用鹽泥  
封固以炭反煨紅待 三炷香為度候冷開罐將藥取出入麝香冰片各一分共研細末用磁針刺破舌菌用丹少許點上再以蒲黃蓋之

粘北庭丹點舌菌生 瓦松澹難矢 人中瓦上青苔 燭末 罐封火煨入麝冰  
歸脾丸功湯 人參 白朮 土炒 廣陳皮 白芍 酒炒 當歸身 各一錢 甘草 五分 炙 白茯苓 二錢 燈心 五十寸 水煎空心服

水登膏 硃砂 二錢 飛 白及 白礞 五倍子 鬱金 各一兩 雄黃 乳香 各五錢 右為細末米醋調濃以厚紙攤貼之  
水登膏貼潰核 水飛硃砂末 二錢及敏鬱金雄黃乳香五倍同研用醋攤

導赤湯 見口部口瘡 ○歸脾湯 見乳部乳中結核 ○清涼甘露 見唇部唇唇

喉部

邪風風木搏上壅咽喉腫痛聲音難出湯水不下痰涎壅塞之聲頗似拽鎖初發甚速急刺手大指內側少商穴出紫黑血以瀉其熱服湯

者以桐油錢導吐之吐痰後隨用甘草湯漱之以解桐油之氣內服雄黃解毒湯吐下之喉中吹白降雪散俟開閉之後內宜服清咽利膈湯

按法調治隨手應效者順若面青唇黑鼻流冷涕者逆若兼項外遠腫即名纏喉風其治法雖與此證相同然終屬險惡難治

桐油錢 温水半盞加桐油四匙攪勻用硬雞翎蘸油探入喉內熱之連探四五次其痰壅出再探再吐以人醒聲高為度

枳桐油錢法專痰壅一切喉風用最靈半盞温水桐油入雞翎蘸探吐喉中

雄黃解毒丸 雄黃一兩 鬱金一錢 巴豆十四粒去皮油 共研末醋糊為丸如黍粒大每服五分津液送下

方雄黃解毒喉風開關通閉火能平巴豆去油鬱金末醋糊為丸黍粒形

白降雪散 石膏三錢五分 硼砂一錢 煇硝 膽礬各三分 元明粉三分 冰片二分 共研極細末以筆管吹入喉內

方白降雪散喉風證腫痛聲難風火凝結石膏與膽礬末煇硝硼片共元明

清咽利膈湯 牛蒡子炒研 連翹去心 荊芥 防風 梔子生研 桔梗 元參 黃連 金銀花 黃芩 薄荷 甘草各一錢

大黃 朴硝各一錢 水二鍾淡竹葉二錢煎八分食遠服 枳清咽利膈喉痛消疏風清熱芩連翹荆防梔參連草銀花薄荷大黃硝

慢喉風○慢喉發緩體虛生微腫咽乾色淡紅或由暴怒五辛火或因憂思過度成此證有因平素體虛更兼暴怒或過食五辛而生者

亦有憂思太過而成者俱屬體虛病實其發緩其色淡其腫微其咽乾舌見滑白胎大便自利六脈微細脣如蠶色若干前痛者服補中益氣

湯加以清涼如麥冬黑參桔梗牛蒡子服之若午後作痛作渴身熱足冷者陰陽兩虛也忌用苦寒宜少陰甘桔湯以宣達之若面赤咽乾不

渴者其脈必虛大以甘露飲服之必效俱兼用冰硼散一錢加燈心煨灰存性三分吹之立驗

甘露飲 天冬去心 麥冬去心 黃芩 生地 熟地 枇杷葉 石斛 枳殼炒 茵陳蒿 甘草各等分 水一鍾煎八分食遠服

枳甘露飲清內熱侵面赤咽乾生液津天麥冬各生熟地枇杷斜草枳殼陳

補中益氣湯 見潰瘍門 ○少陰甘桔湯 見口部口瘡 ○冰硼散 見口部口瘡

喉閉 附酒毒喉閉 ○喉閉肝肺火盛由風寒相搏腫咽喉甚則腫痛連項外又有酒毒當細求此證由肝肺火盛復受風寒相搏而成咽喉

腫痛面赤腮腫甚則項外漫腫喉中有塊如拳湯水難嚥語言不出暴起身發寒熱急刺少商穴或鍼合谷穴以開咽喉初起宜疎散服荊防

敗毒散寒熱已退即用清咽利膈湯兼吹紫雪散隨以姜汁漱口以宣其熱或用醋漱以消積血痰壅塞者桐油錢探吐痰涎若腫發於項外

腫脹痛者防透咽喉不可輕鍼急用皂角末吹鼻取嚏其腫即破或兼用皂角末醋調厚敷項腫須臾即破初腫時用生羊肉片貼之喉閉聲

軒者肺氣將絕急宜獨參湯救之若卒然如啞吞吐不利係寒氣客於會厭也宜蜜炙附子片含之勿嚥初終忌用苦寒之藥恐難消難潰又

有酒毒喉閉由酒毒蒸於心脾二經熱壅咽喉腫色黃其人面赤目睛上視以桐油錢導吐痰涎宜服鼠粘子解毒湯亦用紫雪散吹之

外科心法

外

外

外

外

外

外

外

外

鼠粘子解毒湯 鼠粘子 炒研 桔梗 青皮 升麻 黃芩 花粉 甘草 生 元參 梔子 生研 黃連 連翹 去心 葛根 白朮 炒

防風 生地 各等分 水煎食後服 鼠粘子解毒酒 毒閉 桔梗 青皮 能降氣 升 花粉 草 元參 梔子 連翹 葛根 防地

荆防敗毒散 見項部 腦疽 ○清咽利膈湯 ○桐油錢 俱見喉風 ○紫雪散 見舌部 重舌 ○獨參湯 見清痛門

啞瘵喉風 ○啞瘵喉風 腫痛 咽牙 關緊 急不能言 風痰 壅塞 咽膈 上火 盛生 疾風 搏源 此證 頗類 喉風 由肺 胃蘊 熱積 久生 痰外 復受

風邪 與痰 熱相搏 壅塞 咽膈 之上 而成 斯疾 初起 咽喉 腫痛 痰湧 湯水 難嚥 語言 不出 牙關 緊急 此屬 險候 急用 雄黃 解毒 丸 水化 用細 竹管

將藥 水吹入 鼻孔 直達 咽喉 藥入 作嘔 即令 患者 吐之 其牙 關頓 鬆 喉即 稍開 通先 與米 飲飲之 次服 清咽 利膈 湯兼 吹冰 硼散 用藥 不應

者 險若 昏黑 鼻流 涕者 逆 雄黃 解毒 丸 ○清咽 利膈 湯 俱見 喉風 ○冰 硼散 見口 部 舌口 瘡

弄舌 喉風 ○弄舌 喉風 心脾 經實 火外 寒凝 滯成 舌出 攪動 因脹 悶咽 喉作 腫更 兼疼 此證 由心 脾實 火與 外寒 鬱滯 而成 咽喉

腫痛 痰涎 堵塞 音啞 言澀 舌出不 縮時 時攪 動覺 舌脹 悶常 欲以 手捫 之故名 弄舌 急刺 少商 穴在 兩手 大指 裏側 去指 甲旁 韭菴 寬即是

用三 稜鍼 刺之 有血 者生 無血 者死 噲噲 酥丸 徐嚥 藥汁 若痰 涎上 湧不 能下 嚥者 急用 桐油 錢探 吐痰 涎隨 服清 咽利 膈湯 吹金 鎖匙 若喉

內如 松子 魚鱗 狀不 堵塞 者此 屬虛 陽上 浮急 用蜜 炙附 子片 嚥其 汁即 效 金鎖 匙 冰片 二分 五厘 白蠟 蠶一 錢 雄黃 二錢 煅硝 一兩 五錢 硼砂 五錢 各研 末和 勻以 細筆 管吹 入喉 內腫 痛處

歌 金鎖 匙吹 弄舌 風心 脾火 鬱外 寒乘 消痰 逐熱 除痰 痛冰 片蠶 蠶雄 燭硼

蟾酥 丸 見疔 瘡門 ○桐油 錢 ○清咽 利膈 湯 俱見 喉風

喉疳 ○喉疳 初起 陰虛 成咽 乾刺 痛色 淡紅 腎火 炎上 全受 冠破 爛失 音臭 腐疼 註此 證一 名陰 虛喉 疳初 覺咽 噙乾 燥如 毛草 常刺 喉中

又如 硬物 溢於 咽下 嘔吐 酸水 喉出 甜涎 淡紅 微腫 微痛 日久 其色 紫暗 不鮮 頗似 石榴 子色 由腎 液久 虧相 火炎 上消 燥肺 金童 燿咽 喉腫

痛日 增破 爛腐 衣若 蝦皮 聲音 啞喘 喘急 多痰 貝腐 蝕延 其疼 培坊 礙飲 食胃 氣由 此漸 衰而 虛火 益盛 煩燥 者宜 服知 藥地 黃湯 若吐

酸噦 涎者 宜服 甘露 飲加 川黃 連連 便燥 者兼 服萬 氏潤 燥膏 面唇 俱白 不寐 懶食 者宜 歸脾 湯加 酒炒 川黃 連連 吹紫 雪散 腐吹 八寶 珍珠 散

其證 投方 應病 或者 十全 一二 否則 難效 萬氏 潤燥 膏 豬脂 一斤 切碎 煉油 去滓 加煉 過白 蜂蜜 一觔 攪勻 候凝 挑服 二匙 日用 三五 次

八寶 珍珠 散 兒茶 川連 末 川貝 母 去心 研 青黛 各一 錢五分 紅燭 燒灰 存性 宮粉 黃蘗 末 魚腦 石 微煨 琥珀 末 各一 錢 人中 白 二錢 煨 硼砂 八分 冰片 京牛 黃 珍珠 各五分 豆付 內煮 半 麝香 三分 各研 極細 末共 凡一 處再 研勻 以細 筆管 吹入

喉內爛肉處 八寶珍珠喉疔腐水腐兒茶連貝母紅楊柳蜜牛黃石中白礬研  
知藥地黃湯 母黃藥見面部花斑 甘露飲 見慢喉風 ○歸脾湯 見乳部乳中結核

喉癰 ○喉癰咽乾生苔癰初發時增燥裂疼過飲藥酒五辛火微爛延開蟻蛀形 註此證一名天白蟻咽嗑乾燥初覺時癢次生苔癰色暗

木紅燥裂疼痛時吐臭涎妨礙飲食由過食炙燥藥酒五辛等物以致熱積於胃胃火薰肺而成斯疾宜服廣筆鼠粘湯未潰吹藥精散已潰

吹清涼散患者清心寡慾戒厚味發物或者十全一二若失治兼調理不謹致生微爛延漫開大壺起腐衣旁生小孔若蟻蛀蝕之狀多致不救

廣筆鼠粘湯 生地黄 浙貝母 各三錢 元參 甘草 各五分 鼠粘子 酒炒 花粉 射干 連翹 各二錢 白鐘蠶 一錢炒研

苦竹葉二十片水二鍾煎八分飢時服 方廣筆鼠粘喉癰乾初發生苔裂痛添生地元參花粉貝連翹射干白鐘蠶

清溪秘傳藥精散 白礬 不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅酒水於磚上將鹽末布

細末以細筆管吹入喉內 吹藥精散用火燒磚水浸布卷上覆盤霜霜再見雄梅甲研末吹喉癰自痊

清涼散 硼砂 三錢 人中白 二錢 黃連末 一錢 南薄荷 六分 冰片 五分 青黛 四分 共研極細末吹入喉癰腐處

方清涼散吹天白蟻胃火薰成此疾薄黛冰硼中白蓮腐裂疼痛皆可去

上脘癰 ○上脘癰若葡萄形少陰三焦積熱成舌難伸縮鼻紅涕口難開合寒熱增註此證又名懸癰生於口中上脘由心腎經與三焦經

積熱而成形若紫葡萄舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕令人寒熱大作宜黃連消毒飲加桔梗元參服之兼吹冰硼散或日久腫硬下垂

不潰者以燒鹽散日點三五次兼服射干丸過時失治飲食不入煩燥神昏者逆

燒鹽散 食鹽 枯白礬 各等分 二味研細以筋頭蘸點患上

射干丸 射干 川升麻 杏仁 去皮尖炒 甘草 各五錢 木鼈子 川大黃 各二錢 右研細末煉蜜和丸如小彈子大每用一

丸口中含化徐徐 射干丸療懸癰熱聚成形口開難大黃升草木鼈子蜜丸彈狀口中含

黃連消毒飲 見項部百會通 冰硼散 見口部喉口瘡

鎖喉毒 ○鎖喉毒生因積熱外感風寒耳前結外似瘰癧漸攻喉心與小腸積熱外感風寒凝結而成初生於

耳前聽會穴形如瘰癧漸攻咽喉腫塞疼痛妨礙飲食證須速治宜服牛黃清心丸開關解熱兼服清咽利膈湯吹冰硼散方應效勞能成功

牛黃清心丸 九轉膽星 一兩 雄黃 黃連末 各二錢 茯神 元參 天竺黃 五倍子 未 荊芥 防風 桔梗 犀角末 當歸 各

錢 冰片 麝香 珍珠 各五分 京牛黃 輕粉 各三 各研極細末共和一處再研勻甘草熬膏和丸如龍眼大硃砂為衣日中晒

乾收入磁瓶內將瓶口堵嚴勿令洩氣臨服時一丸薄荷湯磨服

射牛黃清心鎖喉毒花輕冰麝參雄竺珍倍荆防桔胆星犀角歸連款連連

清咽利膈湯見喉喉風○冰硼散見口部鴉口瘡

乳蛾○乳蛾肺經積火成雖輕重喉旁生狀若蠶蛾紅腫痛關前易治關後凶此證由肺經積熱受風凝結而成生咽喉之旁狀如蠶蛾亦有形若棗栗者紅腫疼痛有單有雙雙者重生於關前者形色易吹藥易到手法易施故易治生於關後者難見形色吹藥不到手法難施故難治宜服清咽利膈湯吹冰硼散易見者服熱鐵之難見者用雞翎探吐膿血若兼痰壅氣急聲小探吐不出者險急用三稜鐵刺少商穴出紫黑血仍以服前藥緩緩取效

清咽利膈湯見喉喉風○冰硼散見口部鴉口瘡

喉瘤○喉瘤鬱熱屬肺經多語損氣相兼成形如圓眼紅絲或單或雙喉旁生此證由肺經鬱熱更兼多語損氣而成形如元眼紅絲相裏或單或雙生於喉旁亦有項大帶小者不犯不痛或純酒火燔或因怒氣喊叫犯之則痛忌用鐵刀宜服益氣清金湯以消瘡碧玉散點之即效

益氣清金湯 苦桔梗三錢 黃芩二錢 浙貝母去心 麥冬去心 牛蒡子各一錢五分 甘草各一錢 紫蘇五分 竹葉三十片水三鍾煎一鍾食遠服渣再煎服

防益氣清金肺熱攻注喉成瘤元眼形陳夢苓蘇苦桔貝參冬槐薄草參苓  
消瘡碧玉散 硼砂三錢 冰片 麝香各三分 共研細末用時以筋頭蘸藥點患處

消瘡碧玉散 硼砂三錢 冰片 麝香各三分 共研細末用時以筋頭蘸藥點患處

甘疽○甘疽憂思氣結成膈生穀粒紫莖形寒熱硬痛宜速清消遲須防毒陷攻註此證由憂思氣結而成生於膈上即胸堂兩旁肉高處屬肺經中府穴之下無論左右皆能為患初如穀粒色青漸若枯莖色紫堅硬疼痛憎寒壯熱速清補膿者順若過十日寒熱不退信膿不生脈見浮數防毒內陷攻裏致生惡

甘疽○甘疽憂思氣結成膈生穀粒紫莖形寒熱硬痛宜速清消遲須防毒陷攻註此證由憂思氣結而成生於膈上即胸堂兩旁肉高處屬肺經中府穴之下無論左右皆能為患初如穀粒色青漸若枯莖色紫堅硬疼痛憎寒壯熱速清補膿者順若過十日寒熱不退信膿不生脈見浮數防毒內陷攻裏致生惡

證屬逆初宜服荆防敗毒散以疎解寒熱次服內托黃耆散應期不潰者急服十全大補湯托之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

荆防敗毒散見項部癰疽○內托黃耆散見背部中搭手○十全大補湯見潰瘍門

腫中疽○腫中疽起粟粒形色紫堅硬漸焮疼七情火毒發任脈急隨證治緩成凶此證生於心窩之上兩乳中央屬任脈經腫中穴由臍腑不和七情不平火毒凝結而成初起如粟色紫堅硬漸生焮熱腫痛憎寒壯熱宜服仙方活命飲如蘇葉薄荷葉汗之或煩燥作嘔唇焦大渴宜奪命丹清之俟



腫中疽○腫中疽起粟粒形色紫堅硬漸焮疼七情火毒發任脈急隨證治緩成凶此證生於心窩之上兩乳中央屬任脈經腫中穴由臍腑不和七情不平火毒凝結而成初起如粟色紫堅硬漸生焮熱腫痛憎寒壯熱宜服仙方活命飲如蘇葉薄荷葉汗之或煩燥作嘔唇焦大渴宜奪命丹清之俟

表發已退急服託裏透膿湯若瘡勢不起屬虛宜十全大補湯托之但體中為氣海氣之所居為施治貴早若遲則毒陷攻裏傷榮透氣者逆其餘內外治法俱按癰疽腫瘍清門



脾發疽○脾發疽生心下旁火燔毒酒火為殃初如粟粒時寒熱漸增腫痛潰膿昌註此証生於心窩下兩旁屬脾經食管穴無論左右俱生之皆由過食炎燔厚味藥酒以致脾經積火成毒而發初起形似粟粒寒熱往來漸增腫痛若頂尖根束紅活鮮潤應期即潰稠膿者順若頂平根散色紫堅硬屆期不潰既潰膿如蠟末者逆初服荆防敗毒散汗之脣焦大渴煩燥者宜服太乙紫金錠水內疏黃連

湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍清門

太乙紫金錠一名紫金丹 雄黃三錢 雄雞冠血一錢 硃砂三錢 麝香二錢 煉淨 川五倍子二兩 一名文 紅牙大戟 杭州紫大戟為上 江 飾大戟色白者性烈峻利 藥人服之反致吐血 山慈姑二兩 洗去毛 千金子一兩 一名綠龍 以上之藥各擇精品於淨室中製 勿用取上品者去蘆根洗淨焙乾為六一兩五錢 山慈姑皮焙乾研末 千金子仁白者去油

畢候端午七夕重陽或天月德天醫黃道上吉之辰凡入室合藥之人三日俱宜為沐更換新潔衣帽臨日方入室中淨手盥者預設藥

王牌位主人率眾焚香拜禱畢各將前藥七味稱準入於大乳鉢內再研數百轉方入細石臼中漸加糯米濃汁調和較硬得中方用杵

搗千餘下極至光潤為度每飲一錢每服一錢病勢重者連服二錢以取通利後用溫粥補之修合時除合約潔淨之人餘皆忌見此藥唯

在精誠潔淨方效 勸太乙紫金諸瘡毒疔腫癰疽皆可除雄珠倍屬千金子紅穿大戟山慈姑 一切飲食藥毒蠱毒瘴氣惡菌河豚

中毒自死牛馬猪羊六畜等類之內人誤食之必昏亂卒倒或生異形之證並用水磨灌服或吐或瀉其人必甦 一南方山嵐瘴氣烟霧

瘴疫最能傷人感之纔覺意思不快惡寒惡熱欲嘔不嘔即服一錠服之得吐利便愈 一癰疽發背對口疔瘡天蛇無名腫毒疔節紅絲

等疔及楊梅瘡諸風癩疹新久痔瘡並用無灰淡酒磨服外用水磨塗搽上日夜數次覺癢而消 一陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸

膈塞帶邪毒未出瘟疫煩亂狂發喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服 一赤白痢疾肚腹泄瀉急痛霍亂絞腸痧及諸疫喘並用姜湯磨服

一男子婦人急中顛邪喝叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼魔失心狂亂羊兒猪顛等風俱用石菖蒲煎湯磨服 一中風中氣口眼歪邪牙關

緊急言語蹇澀筋脈攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸癩並用酒磨此熱服之 一自縊溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微溫

未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服 一一切惡蛇瘋犬毒蟲溪澗諸惡等毒傷人隨即發腫攻注過身甚者毒氣入裏昏悶叫命在須臾

俱用酒磨灌下再吃葱湯一盞蓋被出汗立甦 一新久瘧疾臨發時東流水煎柳桃枝湯磨服 一小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫

癩疹瘡癬牙關緊急並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽腫上年歲幼者每歲分作數服 一牙痛酒磨塗痛上仍少許良久嚥下 一小

兒父母遺毒生下白內皮塌爛斑駁道眼腫爛者俱用清水磨塗 一打撲傷損用松節無灰酒研服 一年深月近頭脹頭痛太陽



痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨壺太陽穴上 一婦人經水不通紅花湯下 一凡遇天行疫  
證延街圍巷相傳傳染者用桃根湯磨濃滴入鼻孔次服少許任入病家再不傳染 一又治傳屍勞瘵諸藥不能取效一方士指教用此  
每早磨服一錠至三次後遂下惡物屍蟲異形怪類後得脫利以此相傳活人不計其數 一女子久患勞瘵為屍蟲所噬磨服一錠片時  
吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也

荆防敗毒散

見項部瘡症 ○內疏黃連湯 見腫瘍門

井疽



井疽生在心窩中穴

井疽 ○井疽心火發中庭初如豆粒漸腫疼心燥肌熱唇焦渴紅活易治黑陷凶註 此證生於心  
窩屬任脈中庭穴由心經火毒而成初如豆粒腫痛漸增心燥如焚肌熱如火自汗唇焦大渴飲  
冷急服內疏黃連湯或麥雲丹若頭悶作嘔煩熱無汗者奪命丹汗之如紅活高腫者順黑陷平  
塌者逆其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若潰後經年不愈者必成穿心冷瘻難治


蜂窩疽



蜂窩疽生在乳房之穴形似蜂房

蜂窩疽 ○蜂窩疽形似蜂窩胸側乳上瘡孔多漫腫紫痛心火毒黑陷者逆順紅活註 此證生於胸  
側乳上亦有偏身而發者由心火毒盛而成色紫漫腫疼身發寒熱初起六七孔漸漸延開有三  
五寸亦有六七寸者形似蜂房即有數十竅每竅出黃白膿宜腫瘡面全腐腐脫有新肉色紅鮮潤

瘰癧



瘰癧生在頸子骨軟筋處

瘰癧 ○瘰癧生於缺盆中初豆漸李堅紫寒熱痰濕宜蒜炙證由膽胃積熱生註 此證一名缺盆  
疽又名頸骨疽生在胸上項下顛子骨內棘陷中缺盆穴屬膽胃二經積熱而成初發寒熱往來筋  
骨拘急飲食不思胸腹膨脹小水短澀初發如豆漸大如李色紫堅硬疼痛初宜艾壯隔獨頭蒜片  
灸之內服奪命丹汗之次服六一散通利小水膿勢將成宜服內託黃者散氣血虛甚者宜服十全  
大補湯托補之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門此證宜急託治若失治腐爛內陷瘡口難斂

必成敗證



必成敗證

必成敗證

六一散

六一散 滑石六兩 甘草一兩生

共為末每服三錢燈心煎湯調服

奪命丹

奪命丹 見背部陰陽二氣疽 ○內託黃者散 見背部中搭手 ○十全大補湯 見潰瘍門

散六一散醫小水瘰癧除燥濕熱有功滑石甘草研成末燈心湯調服立通

癰癧瘰癧



瘰癧癰癧在乳旁生結核紅腫硬厥皮色絡痰凝脾氣鬱治宜溫舒化堅散此證生於乳旁初腫堅硬形類結核發長緩慢漸增蠟腫色紅疼痛由包絡寒痰脾氣鬱結而成條寒證非熱証也治宜溫和舒緩化堅以內補十宣散服之外敷回陽玉龍膏消之如不消膿勢將成也內外治法即按癰疽腫瘍潰瘍門

內補十宣散 人參 黃耆 當歸 各二兩 桔梗 厚朴 姜製 川芎 白芷 肉桂 防風 甘草 各一兩 共研末每服三錢 黃酒調服不飲酒者木香煎湯調服

回陽玉龍膏 見腫瘍門 內外吹乳 吹乳乳毒乳腫疼內吹胎熱酒焮紅外吹于鼻涼氣鬱熱煩渴結腫疼註乳房屬胃乳頭屬肝而有內吹外吹之分內吹者懷胎六七月胸滿氣上乳房結腫疼痛者色紅者因多熱也不紅者既因氣鬱且兼胎旺也多熱者宜服柴胡清肝湯氣鬱者宜服逍遙散外俱敷沖和膏必消或初腫失於調治或本人復傷氣怒以致大腫大痛其勢必欲成膿宜用逍遙散加黃者白芷連翹以養血排膿治之膿消之後宜調養血氣待生產後按清湯治法方得收口妊娠用藥禁忌另有歌訣詳載首卷外吹者由乳母肝胃氣濁更兼子吮乳睡熱氣涼氣鬱入乳房與熱乳凝結腫痛令人寒熱往來煩燥口渴初宜服荆防牛蒡湯外用隔蒜灸法俟寒熱退仍腫者服橘葉桔萸散外敷沖和膏消之其腫消之不應者將欲作膿即用透膿散其餘內服外敷之法俱按癰疽腫瘍潰瘍門又有至於內未懷胎外未行乳而生毒者像皮肉為患未傷乳房此肝胃濕凝結而成乳毒也法當按瘡癩治之無有不效者

荆芥 牛蒡湯 荆芥 防風 牛蒡子 炒研 金銀花 陳皮 花粉 黃芩 蒲公英 連翹 各一錢 柴胡 香附子 甘草 各五分生 水二鍾煎八分食遠服 歌荆防牛蒡湯外吹寒熱腫痛俱可推銀花陳草柴香附花粉蒲翹刺隨

橘葉桔萸散 橘葉 二十 桔萸 按証用半 川芎 黃芩 梔子生研 連翹 去心 石膏 煨 柴胡 陳皮 青皮 各一 甘草 五分生 水二鍾煎八分食遠服 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之 紫腫厥痛用石膏紅腫者去之

乳疽



乳疽 乳癰 ○乳疽乳癰乳旁生肝氣鬱結胃火成癰形紅腫焮熱痛疽形不硬覺微疼癰膿膿成十四日疽發月餘膿始成未潰託裏排膿治已潰大補養榮靈註此證總由肝氣鬱結胃熱滯而成男子生者稀少女子生者頗多俱生於乳房紅腫熱痛者為癰十四日膿成若堅硬木痛者為疽月餘成膿初起寒熱往來宜服橘葉牛蒡湯寒熱悉退腫硬不消宜用復元通氣散消之若不應復

外科心法 二十三

時時跳動者勢將潰膿宜用託裏透膿湯脹痛者鍼之宜服託裏排膿湯虛者補之如人參養榮十全大補等湯俱可選用外敷貼之藥俱按

癰疽腫瘍潰瘍門  
枯草半莖湯 枯草仁 牛蒡子 炒研 花粉 黃芩 生梔子 研 連翹 去心 皂刺 金銀花 甘草生 陳皮 各一錢 青皮 柴胡 各

分 水二鍾煎八分入煮酒一杯和勻食遠服 託裏透膿湯 見頭部後腫疽 託裏排膿湯 見頭部魚尾毒 人參養榮湯 十全大補湯 俱見潰瘍門  
復元通氣散 見腫瘍門 〇託裏透膿湯 見頭部後腫疽 〇託裏排膿湯 見頭部魚尾毒 〇人參養榮湯 十全大補湯 俱見潰瘍門



乳癰 乳癰 〇乳癰如癰胃火成男女皆生赤腫疼潰久不斂方成漏只為膿清肌不生 註此證發於乳房腋赤腫痛其勢更大如癰皮肉盡腐由胃腑濕火相凝而成治法急投乳癰未成形者消之已成形者託之腐脫遲者黃雲藥撒之以免偏潰乳房致傷靈樞難以收斂若久不收口外寒侵襲失於調養時流清水者即成乳漏外用紅升丹作搽以去腐生肌再兼用豆豉餅灸法緩緩灸之以

祛寒內當大補氣血節勞煩慎起居忌發物漸可生肌斂口而愈  
黃靈丹 〇紅升丹 俱見潰瘍門 〇豆豉餅 見首卷灸法內

乳中結核 〇乳中結核梅李形按之不移色不紅時時隱痛勞嚴漸證由肝脾鬱結成 註此證乳房結核堅硬小者如梅大者如李按之不

移推之不動時時隱痛皮色如常由肝脾二經氣鬱結滯而成形勢雖小不可輕忽若延日久不消輕成乳癰重成乳巖慎之慎之初起氣

實者宜服清肝解鬱湯氣虛宜服香貝養榮湯若鬱結傷脾食少不寐者服歸脾湯俱用木香餅灸法消之甚效  
清肝解鬱湯 當歸 生地 白芍 酒炒 川芎 陳皮 半夏 各八分 姜製 貝母 去心 茯神 青皮 遠志 去心 桔梗 蘇葉 各

六分 梔子 生研 木通 甘草 各四分 生香附 一錢 醋炒 水二鍾姜二片煎八分食遠服

方清肝解鬱員茯神四物青皮遠夏陳栝桔通蘇香附草能消乳核氣鬱伸  
歸脾湯 人參 白朮 土炒 棗仁 炒研 龍眼肉 茯神 各二錢 黃耆 一錢五分 當歸 一錢 酒洗 遠志 去心 木香 未

分 生薑 三片 紅棗 肉二枚 水煎服 歸脾湯 治脾胃怯食少怔忡夜不安寐遠龍眼肉歸單後卷木香煎  
木香餅 生地黃 一兩 搗爛 木香 五錢 研末 共研勻量結核大小作餅貼腫上以熱熨斗間日熨之堅硬木痛者每日熨之

木香餅 消乳核方舒通結滯功倍強生地研爛木香末和餅貼患處之良 〇香貝養榮湯 見頭部上石疽

乳癰 〇乳癰初核漸腫堅硬形散漫大如盤未潰先腐微斑點收膿津久勞証添 註此証即由乳中結核而成或消之不應或失於調治軌

延數月漸大如盤如盤堅硬疼痛根形散漫延胸肋腋下其色或紫或黑未潰先腐外皮微點爛斑數處漸漸連破輕津白汁重真流水即

敗膿膿也日久潰深傷膜內病漸添午後煩熱乾嗽頰紅形瘦食少陰虛等証俱見變成癰癆初結腫時氣定者宜服員散及神效枯草散

敗膿膿也日久潰深傷膜內病漸添午後煩熱乾嗽頰紅形瘦食少陰虛等証俱見變成癰癆初結腫時氣定者宜服員散及神效枯草散

氣虛者道遠散及歸脾湯合而用之陰虛之證已見宜服六味地黃湯以培其本外治法按癰疽潰瘍門然此癰成變至易難  
蓂貝散 枯蓂 貝母去心研 南星 甘草生 連翹各一錢去心 水二鍾煎八分澄滓加酒二分食遠服 加青皮升麻

歌蓂貝散治乳結核漸大失調變乳勞初腫氣定宜服此南星甘草共連翹  
神效枯蓂散 大枯蓂一個去皮 當歸 甘草各五錢 沒藥 乳香各二錢 共研粗末每用五錢醇酒三鍾慢火熬至一鍾去滓食後  
服之 歌神效枯蓂散乳香甘草當歸研末良乳勞初腫酒煎服消堅和血是神方

道遠散 見背部上搭手 ○歸脾湯 見乳中結核 ○六味地黃湯 即六味地黃丸改作煎劑見面部雀斑

### 乳巖圖



乳巖

乳巖 ○乳巖初結核隱疼肝脾兩損氣鬱凝核無紅熱身寒熱速矣養血免患改航延續後如堆菓  
堅硬巖形引腋胸項透紫先腐爛時流污水日增痰漬後翻花怒出血即成敗證藥不靈証  
由肝脾兩傷氣鬱凝結而成自乳中結核起初如棗栗漸如棋子無紅無熱有時隱痛速宜外用  
突法內服養血之劑以免內攻若年深日久即潮熱惡寒始覺大痛牽引胸腋腫如覆鉢堅硬形

如堆菓高凸如巖頂透紫色光亮肉含血絲先腐後潰汚水時津有時湧胃臭血腐爛深如巖壑翻花突如泛蓮疼痛連心若復因急怒暴流  
鮮血根腫愈堅斯時五臟俱衰即成敗證百無一救若患者果能清心務慮靜養調理庶可施治初宜服神效枯蓂散次宜服清肝解鬱湯外  
貼李芝鯽魚膏其核或可望消若反復不應者瘡勢已成不可過用剋伐峻劑致損胃氣即用香貝養熱湯或心煩不寐者宜服歸脾湯潮熱  
惡寒者宜服道遠散稍可苟延歲月如得此証者於腫核初起即加醫治宜用豆粒大艾壯當頂灸七壯次日起鮑挑破用三稜鐵刺入五六  
分插入冰螺散搽子外用紙封糊至十餘日其核自落外貼絳珠膏生肌玉紅膏內服舒肝養血理脾之劑生肌破口自愈

李芝鯽魚膏 活鯽魚肉 鮮山藥 各等分去皮 右共搗如泥加麝香少許塗核上覺瘡極勿搔動隔衣輕輕揉之七日一換旋塗即消

歌鯽魚膏貼乳巖疾腫如覆鉢似堆菓山藥同研加麝香塗於患處七日易  
冰螺散 硃砂二分 大田螺五枚去殼 冰片一分白砒即人言一錢二分起 粟殼去殼用此 將螺肉切片同白砒研末再加硃砂片同碾細以稠米糊搗

成燕子磁罐密收用時將搽插入鐵孔外用紙糊封貼核上勿動十日後四邊裂縫其核自落  
歌冰螺散消諸核癭硃砂肉煨白砒再加片冰米糊搽乳巖堅硬用之宜

神效枯蓂散 見乳勞 ○香貝養熱湯 見項部上石疽 ○清肝解鬱湯 ○歸脾湯 俱見乳中結核 ○道遠散 見背部上搭手 ○絳珠膏 見潰瘍門  
生肌玉紅膏 見潰瘍門

屬陰虛宜滋陰潤肺以清潤之用麥味地黃

湯治之

六味地黃湯

方見首卷

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

飲食如常煩不卧不得小便轉胞稱舉胎救急丹

溪法四物升麻參朮陳服後探吐吐再服不應阿

膠入五苓

註  
妊娠胎壓胞系了戾不得小便飲食如常心  
煩不得卧者名曰轉胞宜用丹溪舉胎法令  
穩婆香油塗手舉胎起則尿自出以暫救其  
急然後以四物湯加升麻人參白朮陳皮煎  
服服後以指探吐吐後再服再吐如此三四  
次則胎舉而小便利矣如不應則是有飲用  
五苓散加阿膠以清利之

四物湯 方見首卷

子淋證治

加味五淋散

子淋頻濁窘澁疼五淋梔苓歸芍苓甘草再加生  
地澤車前滑石木通尋

註 孕婦小便頻數窘澁點滴疼痛名曰子淋宜  
五淋散卽黑梔赤茯苓當歸白芍黃苓甘草  
加生地澤瀉車前子滑石木通以清熱而利  
水則小便自通矣

激經胎漏尿血總括

妊娠經來名激經胎漏下血腹不疼若是傷胎腹

必痛尿血漏血要分明

註

婦人受孕之後仍復行經者名曰激經為血  
有餘若孕婦無故下血或下黃汁豆汁而腹  
不痛者謂之胎漏若其胎已傷而下血者其  
腹必疼孕婦又有尿血一證腹亦不痛然與  
胎漏之證又不同蓋尿血出於溺孔漏血出  
自人門三者俱下血而各不同治者不可不  
詳辨也

激經胎漏尿血證治



阿膠湯

黃耆湯

銀芩酒

加味四物湯

激經無病不須治子大能食經自停胎漏下血多  
因熱四物阿膠梔側苓或下黃汁豆汁樣黃耆糯  
米芩根銀若是尿血膀胱熱四物血餘共茅根

註

激經無他證相兼者不須用藥其胎壯子大

能食其血而經自停若胎漏下血多屬血熱

宜阿膠湯清之其方卽四物湯加阿膠黑梔  
側栢葉黃芩也或漏下黃汁或如豆汁甚多  
者其胎乾枯必倚而墮宜用黃耆湯卽黃耆  
二兩糯米一合煎服或銀苧酒卽苧麻根紋  
銀煎酒服若尿血則是膀胱血熱宜四物湯  
加血餘白茅根以涼之

四物湯

方見首卷

胎不安小產墮胎總括

氣血充實胎自安衝任虛弱損胎原暴怒房勞傷

肝腎疾病相干跌撲顛五月成形名小產未成形象墮胎言無故至期數小產須慎胎爲慾火煎

註

孕婦氣血充足形體壯實則胎氣安固若衝任二經虛損則胎不成實或因暴怒傷肝房勞傷腎則胎氣不固易致不安或受孕之後患生他疾干犯胎氣致胎不安者亦有之或因跌撲築磕從高墜下以致傷胎墮胎者亦有之然小產墮胎亦自有別五七月已成形象者名爲小產三月未成形象者謂之墮胎

以上小產墮胎皆出有因若懷胎三五七月無故而胎自墮至下次受孕亦復如是數數墮胎則謂之滑胎多因房勞太過慾火煎熬其胎因而不安不可不慎者也

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

胎傷腹痛血未下聖愈湯加杜續砂下血腹痛佛  
手散膠艾杜續朮芩加十全續縮減芩桂因病傷  
胎十聖誇跌撲芎藭調益母怒勞逍遙地黃佳

註

妊娠胎傷若腹痛不下血者宜用聖愈湯加  
杜仲續斷砂仁安之若下血腹痛者宜用佛  
手散加阿膠蘄艾杜仲續斷白朮條芩安之  
若因母病以致傷胎欲墮者宜十聖散卽十  
全大補湯減茯苓肉桂加續斷砂仁若因跌

撲築磕傷胎欲墮者宜芎藭湯調益母丸服之芎藭湯卽川芎當歸也若暴怒房勞傷肝腎以致胎動不安者宜逍遙散地黃湯治之

聖愈湯

佛手散

逍遙散

地黃湯

方俱見首卷

墮胎下血不止血瘀不出證治

獨參湯

回生丹

墮胎暴下血不止面黃唇白獨參湯惡血不出疑  
脹痛回生益母酌相當

註

妊娠胎墮後血暴下不止面黃唇白者名脫  
榮宜用獨參湯峻補其氣以生其血所謂無  
形能生有形也若惡血瘀滯不行腹脇脹痛  
者宜於回生丹益母九酌其虛實緩急相當  
而用之

回生丹

見產後彙方

子死腹中總括

子死腹中須急下舌青腹痛冷如冰時久口中穢氣出寒熱峻緩詳斟平

註凡一應傷胎子死腹中者須當急下勿使上奔心胸然必驗其舌青面赤肚腹脹大腹冷如冰久之口中有穢氣出者方可議下然猶必審其人之虛實寒熱或宜寒下熱下峻下緩下隨其宜而施之

子死腹中證治



佛手散

平胃散加芒消方

下胎緩劑佛手散峻劑平胃加芒消宜熱宜寒須  
細審產婦虛實莫溷淆

註

孕婦子死腹中宜下者緩下用佛手散峻下  
用平胃散加芒消或宜寒下或宜熱下須細  
細詳審而投之蓋以產母之虛實或緩或峻  
不可溷淆輕率以致誤也

佛手散

方見首卷

辯子母存亡

妊娠一切垂危候母子存亡可預推面赤舌青必  
子死面青舌赤母命危面舌俱青口吐沫子母俱  
亡二命虧

註

凡妊娠一切凶危之候欲知母子存亡者當  
於孕婦面舌之色定之若面赤舌青則其子  
必死面青舌赤則其母必亡若面舌二者俱  
見青色口角兩邊流涎沫者則子母二命俱  
不能保也

胎兼癥瘕

妊娠有病當攻下衰其大半而止之經云有故而無殞與病適當又何疑

註凡孕婦素有癥瘕舊疾或有新病應攻下者但攻其大半餘俟其自消不可盡攻經云有故無殞言藥雖峻有病則病受之不能傷胎也攻其大半與病相當又何疑於有妊必不可攻之說耶

胎不長證治

八珍湯

六君子湯

胎萎不長失滋養氣血不足宜八珍脾虛胃弱六君子穀化精微氣血生

註

妊娠五六個月胎萎不長由於妊母稟賦虛弱者宜用六君子湯但使飲食強壯俾水穀運化精微則氣血日生而胎自長矣

八珍湯

六君子湯 方俱見首卷

子瘖證治

子瘖聲啞細無音非謂絕然無語聲九月胎盛阻其脈分娩之後自然通

註

妊娠九月孕婦聲音細啞不響謂之子瘖非似子啞絕然無語也蓋少陰之脈絡於舌本九月腎脈養胎至其時胎盛阻遏其脈不能上至舌本故聲音細啞待分娩之後腎脈上

通其音自出矣

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

腹內鐘鳴與兒哭子啼之證出偶然空房鼠穴土能治黃連煎湯亦可捐

註孕婦腹內有鐘聲或嬰兒在內啼哭者名曰子啼古書雖載其證然不經見或偶然有之古方用空房中鼠穴土同川黃連煎湯名黃連煎飲之自愈

臟燥證治

甘麥大棗湯

臟燥無故自悲傷象若神靈大棗湯甘草小麥與  
大棗方出金匱效非常

註

孕婦無故時時傷悲哀痛象若神靈憑依者  
名曰臟燥宜用金匱甘麥大棗湯服之其方  
卽甘草小麥大棗三味煎服其效非常也

鬼胎總括

邪思情感鬼胎生腹大如同懷子形豈緣鬼神能  
交接自身血氣結而成

註 鬼胎者因其人思想不遂情志相感自身氣  
血凝結而成其腹漸大如懷子形狀古云實  
有鬼神交接其說似屬無據婦人石瘕腸覃  
二證亦俱如懷孕之狀由氣血凝結而成則  
可知其必無是理矣

腸覃石瘕證治

香稜丸

腸覃石瘕氣血分寒客腸外客子門二證俱如懷  
子狀辨在經行經不行石瘕吳萸湯最效腸覃香



稜丸若神丁木苗香川棟子青皮廣茂與三稜

註

經云寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮

因有所繫瘦而內着惡氣乃起瘕肉乃生始

如雞卵稍以益大如懷子狀按之則堅推之

則移月事以時下石瘕生於胞中寒氣客於

子門子門閉塞氣不得通惡血當下不下衄

以留止日以益大狀如懷子月事不以時下

皆生於女子可導而下由經文觀之二證雖

皆如懷子狀腸覃氣病而血不病故月事以

時下石瘕先氣病而後血病故月事不來也  
石瘕宜吳萸湯腸覃宜香稜丸卽木香丁香  
茴香川楝子青皮廣茂三棱醋煮麩糊爲丸  
也

吳茱萸湯 方見首卷

胎前母子盛衰

母盛子衰胎前病母衰子盛產後殃子母平和無  
衰盛坦然分娩不須忙

註

此言觀孕婦與所懷之胎有盛衰之辨也若

御纂醫宗金鑑 卷四十一  
三  
娠母氣血壯盛而胎元弱者胎前必多病若  
孕婦衰弱而胎元壯實則產後其母必多病  
若子母俱和平無偏盛偏衰則胎前產後均  
平安無疾可坦然無憂也

胎前有餘詳不足產後不足審有餘產後惟多虧  
損病胎前子母盛衰知

註

古云胎前無不足產後無有餘此言其常也  
然胎前雖多有餘之證亦當詳察其亦有不  
足之時產後雖多不足之病亦當詳審其每

挾有餘之證也欲知產後常多虧損之故於  
胎前子母盛衰求之可預知也

胎前門彙方

保生湯

人參

甘草 各二錢半

白朮

香附子

烏藥

橘紅 各五錢

右剉每服三錢薑五片煎服

加味六君湯

無  
18  
歌

人參

白朮

土炒

茯苓

陳皮

半夏

各一錢五分

甘草

炙五分

藿香葉

枇杷葉

各一錢

縮砂仁

枳殼

各八分

右剉加生薑煎服

加味溫膽湯

恨歌

陳皮

半夏

製

茯苓

各一錢

甘草

炙五分

枳實

竹茹

黃芩 各一錢

黃連 八分

麥冬 二錢

蘆根 一錢

右剉薑棗煎服

加味平胃散

無效歌  
各同藥不同

鏡性歌  
亦不同

鏡性歌  
又不同

厚樸

薑汁炒

蒼朮

米泔浸炒

陳皮

甘草 炙

人參 各一錢

右爲末每服三錢加薑煎服

延胡四物湯

當歸

川芎

白芍

熟地 各七錢五分

延胡索

二兩  
酒煮

右剉水煎服

加味膠艾四物湯

當歸

熟地

阿膠

白芍 各二錢

杜仲 一錢五分

川芎

斬艾

右加葱白三寸大豆淋酒煎服

蜜消煎

蜂蜜

芒消

右煎溶化服

加味芎歸飲

川芎 二錢

當歸 五錢

人參 一錢

吳茱萸 五分

阿膠 二錢

斬艾 八分



甘草 五分  
炙

右剉水煎服

導赤散

生地 三錢

木通 二錢

甘草稍 一錢

燈心一團煎服

五苓散

白朮 土炒

茯苓

猪苓

澤瀉 各二錢半

桂

右剉作一服水煎服

茯苓導水湯

無微歌  
名同藥不同

茯苓

檳榔

猪苓

縮砂

木香

陳皮

澤瀉

白朮

木瓜

大腹皮

桑白皮

蘇梗 各等分

右加薑煎服

脹加枳殼

喘加苦葶藶子

腿脚腫加防己

知母飲

知母

麥冬

甘草

各五錢

黃耆

子芩

赤苓

各七錢五分

石叟咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入

竹瀝一合溫服

紫蘇飲

當歸

川芎

白芍 各二兩

陳皮

蘇莖葉

大腹皮 各一兩

甘草 五錢  
炙

人參 量虛實用

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓服日進二服

有熱加黃芩竹茹

心煩加羚羊角

有食加神麴山查

羚羊角散

宜對歌  
名同藥不同

羚羊角鎊

獨活

酸棗仁

五加皮

防風

薏苡仁

杏仁

當歸酒浸

川芎

茯神各五分  
去木

甘草

木香各二分

右咬咀加生薑五片水煎服

釣藤湯

釣藤鈎

當歸

茯神

人參 各一兩

苦桔梗

一兩五錢

桑寄生

五錢

右為粗末每服五六錢水二盞煎至一盞去

滓溫服無時忌猪肉菘菜

煩熱加石膏二兩半

臨產月加桂心一兩

枳桔二陳湯

病作歌

陳皮

半夏

茯苓

甘草

各二錢

炙五分

枳殼

桔梗

各一錢

右剉薑煎服

桔梗湯

天冬

赤苓

去心

各一錢

桑皮

桔梗

紫蘇

麻黃

各五分

三分  
去節

貝母

人參

甘草

各二分  
炙

右剉加生薑水煎服

一方有杏仁無貝母

舉胎四物湯

當歸

白芍

熟地

川芎

人參

白朮 各二錢

陳皮

升麻 各一錢

引真經卷六 婦科心法要訣 三



右剉水煎服

麥味地黃湯

熟地 四錢

山萸肉 二錢

山藥 二錢

澤瀉

茯苓

丹皮 各一錢五分

麥冬 二錢

五味子 十二粒

右剉水煎服

五淋散

赤芍

山梔子 各一錢

赤茯苓

當歸

子芩 六分

甘草 五分

右水煎服

阿膠湯

阿膠

炙燥

熟地

焙

艾葉

微炒

芎藭

當歸

切焙

杜仲

去粗皮炙剉

白朮

各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半棗三枚擘破同

煎至八分去滓食前温服

黄耆湯

處非各同藥不同

向非歌均不同

糯米 一合

黄耆 二兩

川芎 一兩

右細剉水二大盞煎至一盞温服  
芎一方無川

銀苧酒

苧麻根 二兩

紋銀 五兩

清酒 一盞

右以水二大盞煎至一大盞去渣分温二服

十聖散

人參

黃耆

白朮

熟地黃

砂仁

各五分

甘草

炙

當歸

川芎

白芍

各一錢  
炒

川續斷

八分

右剉水煎服

獨參湯

用好人參

二兩  
或四兩

右水煎徐徐服

益母丸

益母草

五月五日或六月六日採之陰乾忌鐵器

右一味以石器碾為細末煉蜜丸彈子大每

用一丸童便好酒各半研化服之

六味地黃丸

熟地

八兩 蒸曬九次

山藥

四兩

茯苓

三兩 乳拌

山萸肉

四兩 酒浸

丹皮

三兩

澤瀉

三兩

煉蜜爲丸如梧桐子大每服三錢

桂附地黃丸 卽六味地黃丸加肉桂附子

黃連煎

黃連

右一味煎湯調空房中鼠穴內土服

甘麥大棗湯

甘草 三兩

小麥 一升

大棗 十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

香棱丸

木香

丁香 各半兩

枳殼

麩炒

三棱

酒浸一夕

莪茂

細剉每一兩用巴豆三十粒去殼同炒待巴豆黃色去巴豆不用

青皮

炙

川楝子肉

藎香

各等分炒

右為末醋煮麵糊丸如桐子大硃砂為衣每服三十九丸薑鹽湯送下或溫酒下無時

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳腹內雖疼切莫慌舒身仰臥容  
胎轉靜待生時不用忙

註

妊娠月足臨產腹內如覺動轉疼痛須要安  
詳莫自慌亂舒體仰臥時時緩步使兒身轉  
正靜以待之至其生育之時自然順生不用



忙也

### 產室

產室寒溫要適時嚴寒酷熱總非宜夏要清涼冬

要煖病者醫人俱要知

註

產室之內四時俱要寒溫適中若太熱太寒

均不相宜夏月必須清涼勿令炎熱致產母

中暑暈迷倘有其事不妨少與凉水以解之

冬月必須溫煖勿令寒冷以致血凝難產當

多備火爐使產母腰背下身就火烘之此臨

擇收生婆

臨產穩婆須預擇老成歷練又精明無故莫教使  
手法寬心寧耐待時生

註

臨產之家必用收生婆須預先擇老成歷練  
明白經事之人無故切勿令其先使手法如  
試水探漿等事但囑令寬心寧耐以待生時  
可也

人驚生

力早逼胎不正悔難追

註

凡產婦坐草最要及時不可太早若兒身未  
順寧可遲遲寬心以待倘坐草太早非正產  
之時妄使產母用力往往逼胎不正遂至橫  
倒者有之雖悔無及矣

臨盆

兒身轉順頂當門胞漿已破腹腰疼中指跳動穀  
道挺臨盆用力送兒生

註

凡兒之生自有其時時至則兒身轉順頭頂

正當產門胞漿大來腰重腹痛穀道挺迸產  
母中指中節或本節跳動此方爲正產之時  
方可臨盆用力送兒自順生矣

交骨不開

交骨不開須細審或因不足或初胎總宜開骨通  
陰氣佛手龜板婦髮灰若因不足加參妙一服能  
令骨立開

註

產婦交骨不開有因氣血不足者有因初次  
胎產者二者均宜用開骨散通其陰氣其方

即佛手散加敗龜板其生過子女婦人頭髮也氣血不足者加人參服之可使其骨立開

### 盤腸生

盤腸未產腸先出已產嬰兒腸不收頂貼革麻服升補腸乾潤以奶酥油

註

妊娠婦人有盤腸生者臨產之時其腸先拖出及兒已產下其腸有仍不收者須以革麻仁搗爛貼於頂心內服升補之劑如補中益

氣湯或八珍十全大補等湯加升麻以升補

之其腸自收矣

補中益氣湯

十全大補湯

方俱見首卷

難產

難產之由不一端胎前安逸過貪眠驚恐氣怯用力早胞破血壅血漿乾

註

妊娠難產之由非只一端或胎前喜安逸不耐勞碌或過貪眠睡皆令氣滯難產或臨產驚恐氣怯或用力太早則產母困乏難產或

胞傷血出血壅產路或胞漿破早漿血乾枯  
皆足以致難產臨證之工不可不審也

八早崩如血聚血乾枯

致之由不一

數動

全大崩

寸身尺許余

中益流

其線白如

胞衣不下證治

胞衣不下因初產用力勞乏風冷凝下血過多產路澁血入胞衣腹脹疼急服奪命沒竭散勿使冲心喘滿生諭令穩婆隨胎取休驚產母莫教聞

註

產婦胞衣不下者或因初產用力困乏風冷相干致血瘀凝或因下血過多血枯產路乾澁或血入胞衣脹滿疼痛皆能使胞衣不下均當急用奪命散即沒藥血竭二味爲散也



免致上攻心胸脹滿喘急爲害不小且宜諭令穩婆隨胎取下莫使產母聞之恐被驚則愈難下也

產門不閉證治

產門不閉由不足初產因傷必腫疼不足十全大補治甘草湯洗腫傷平

註

凡產後玉門不閉者多由氣血不足所致亦有因初產傷重者必腫而疼也氣血不足者用十全大補湯治之因傷腫痛者濃煎甘草

湯洗之其腫傷自平

十全大補湯

方見首卷

血暈證治

清魂散

產後血暈惡露少面脣色赤是停瘀惡露去多脣  
面白乃屬血脫不須疑虛用清魂荆芥穗人參芎  
草澤蘭隨腹痛停瘀佛手散醋漆薰法總相宜

註

產後血暈有因惡露去少內有停瘀上攻迷  
暈者面脣必赤色有因去血過多血脫而暈

者面脣必色白血弱者宜用清魂散卽荆芥  
穗人參川芎甘草澤蘭葉也若停瘀腹痛者  
用佛手散二者俱宜頻燒乾漆及用火燒鐵  
釘淬醋不時薰之

佛手散 方見首卷

惡露不下證治

惡露不下是何因風冷氣滯血瘀凝若還不下因  
無血面色黃白不脹疼風冷血凝失笑散去多聖

愈補而行

言產後惡露不下有因風冷相干氣滯血凝而  
不行者必腹中脹痛有因產時去血太多無  
血不行者面色必黃白腹必不疼以此辨之  
血凝者用失笑散逐而行之無血者用聖愈  
湯補而行之

失笑散

聖愈湯

方俱見首卷

惡露不絕證治

惡露不絕傷任衝不固時時淋漓行或因虛損血

不攝或因瘀血腹中停審色汚淡臭腥穢虛補實  
攻要辨明虛用十全加膠續瘀宜佛手補而行

註

產後惡露乃裏兒汚血產時當隨胎而下若

日久不斷時時淋漓者或因衝任虛損血不

收攝或因瘀行不盡停留腹內隨化隨行者

當審其血之色或汚濁不明或淺淡不鮮或

臭或腥或穢辨其爲實爲虛而攻補之虛宜

十全大補湯加阿膠續斷以補而固之瘀宜

佛手散以補而行之

十全大補湯

佛手散 方俱見首卷

頭疼證治

產後頭疼面黃白無表無裏血虛疼惡露不行兼  
腹痛必因瘀血上攻冲逐瘀芎歸湯最效虛用八  
珍加蔓荊

註

產後頭疼若面色黃白無寒熱身痛之表證  
又無便秘之裏證則是因產後去血過多血  
虛頭痛也若惡露不行兼腹痛者乃屬瘀血

上攻之痛也去瘀以芎歸湯補虛以八珍湯

加蔓荊子

八珍湯 方見首卷

心胃痛證治

大巖蜜湯

心痛厥逆爪青白寒凝大巖蜜溫行四物去芎加

獨活薑桂茱萸草遠辛因食惡食多嘔吐麩麥香

砂入二陳大便燥結小便赤兼熱飲冷玉燭攻

註 產後心胃痛若四肢厥逆爪甲青白乃風冷

寒凝氣血滯澁宜用大巖蜜湯溫以行之卽  
生地當歸赤芍獨活乾薑桂心吳茱萸甘草  
遠志細辛也若因飲食停滯中脘作痛必惡  
食嘔吐宜二陳湯加神麩麥芽木香砂仁若  
大便結硬小便赤澁渴欲飲冷者乃內有實  
熱也宜玉燭散攻之

玉燭散

方見首卷

腹痛證治

香桂散



去血過多血虛痛去少壅瘀有餘疼傷食惡食多  
脹悶寒入胞中見冷形血虛當歸建中治瘀壅失  
笑有奇功傷食異功加查麴胞寒香桂桂歸芎

註產後腹痛若因去血過多而痛者爲血虛痛

若因惡露去少及瘀血壅滯而痛者爲有餘  
疼若因傷食而痛者必惡食脹悶若因風寒  
乘虛入於胞中作痛者必見冷痛形狀血虛  
宜當歸建中湯血瘀宜失笑散傷食宜異功

散加山查神麴胞寒宜香桂散卽佛手散加

桂心也

當歸建中湯

失笑散

異功散 方俱見首卷

少腹痛證治

延胡索散

少腹痛微名兒枕硬痛尿利血瘀疼尿澀淋痛蓄  
水證紅腫須防癩疝癢兒枕瘀血延胡散歸芍蒲  
桂琥珀紅蓄水須用五苓散癩疝吳萸溫散行

註

產後少腹痛其痛若微乃產時血塊未淨名  
兒枕痛若少腹堅硬小便利者為瘀血痛少  
腹硬而小便不利淋澁脹痛者乃蓄水作痛  
若堅硬紅腫而痛者須防成癩疝癰之證因  
兒枕瘀血者宜延胡索散即當歸赤芍蒲黃  
肉桂琥珀紅花也因水蓄者宜五苓散若將  
成癩疝癰者當以吳茱萸湯溫散之

吳茱萸湯 方見首卷

五苓散 方見三卷

脇痛證治

脇痛瘀滯犯肝經左血右氣要分明血用延胡散  
可治氣宜四君加柴青去血過多屬虛痛八珍加  
桂補其榮

註

產後脇痛因氣血瘀滯干犯肝經在左多屬  
血在右多屬氣血宜延胡索散氣宜四君子  
湯加柴胡青皮若因去血過多而痛者爲虛  
痛宜八珍湯加肉桂以補其榮血自愈

四君子湯

八珍湯 方俱見首卷

腰痛證治

腰疼下注兩股痛風冷停瘀滯在經佛手散加獨  
活桂續斷牛膝桑寄生血多三陰傷氣血地黃桂  
附續杜尋

註

產後腰疼下注兩股皆痛者乃產時風冷乘  
之瘀血滯於肝經宜用佛手散加獨活肉桂  
續斷牛膝防風桑寄生以溫散而行之若因  
去血過多三陰經氣血虧損者則當用六味

地黃湯加肉桂附子續斷杜仲以溫補之

佛手散

六味地黃湯

方俱見首卷

偏身疼痛證治

趁痛散

產後身疼榮不足若因客感表先形趁痛散用歸  
耆朮牛膝甘獨薤桂心血瘀面唇多紫脹四物秦  
芫桃沒紅

註

產後偏身疼痛多因去血過多榮血不足或

因風寒外客必有表證二者俱宜用趺痛散  
卽當歸黃耆白朮牛膝甘草獨活薤白桂心  
也若面唇紫色身脹痛者必是停瘀所致宜  
用四物湯加秦艽桃仁沒藥紅花以行之

四物湯

方見首卷

腹中塊痛證治

產後積血塊冲疼多因新產冷風乘急服延胡散  
可逐日久不散血癥成更有寒疝亦作痛吳萸溫  
散不須攻

產後腹中有塊堅硬攻痛多因新產之後風冷乘虛而入以致瘀血凝結宜服延胡索散以逐之若遲久不散必結成血瘕矣又有寒疝之證亦在少腹中攻築而痛此屬寒氣滯澁宜用吳茱萸湯溫散其寒自愈不必攻也

吳茱萸湯 方見首卷

筋攣證治

產後筋攣雞爪風血虧液損復乘風無汗養榮兼散邪四物柴瓜桂釣藤有汗八珍加桂枝黃耆阿



膠大補榮

註

產後筋脈拘攣疼痛不能舒展俗名雞爪風  
皆由產後血液虧損不能榮筋又被風乘故  
令拘攣疼痛也無汗者宜於養榮之中兼祛  
外邪用四物湯加柴胡木瓜桂枝釣藤若有  
汗者宜八珍湯加桂枝黃耆阿膠以大補其  
榮血可也

四物湯

八珍湯 方俱見首卷

傷食嘔吐證治

產後傷食心下悶惡食嘈雜吞吐酸六君查麴香  
砂共嘔逆痰涎二陳煎

註

產後過食肉麴傷於飲食者必心胸飽悶惡  
聞食氣懊懜嘈雜吞酸吐酸宜用六君湯加  
山查神麴香附縮砂以補而消之若更嘔逆  
痰涎必是兼痰兼飲宜二陳湯加減調治

六君子湯 見首卷

二陳湯 見三卷

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

產後呃逆胃虛寒丁香白蔻伏龍肝桃仁吳萸湯  
冲服不應急將參附添熱渴面紅小便赤竹茹乾

柿橘紅煎

註

產後呃逆皆因氣血兩傷脾胃虛寒中焦之  
氣厥而不順所致宜服丁香豆蔻散即丁香  
白豆蔻伏龍肝為末也用桃仁吳茱萸煎湯

冲服如不效當以參附湯峻補之若發熱面  
紅小便赤色屬熱實者宜用竹茹乾柿橘紅  
煎服之名茹橘飲

氣喘證治

二味參蘓飲

產後氣喘爲危候血脫氣散參附煎敗血上攻面  
紫黑二味參蘓奪命痊

註

產後氣喘極危證也因下血過多榮血暴竭  
衛氣無倚孤陽上越宜驟補其氣用參附煎

湯不時飲之若因惡露不行敗血上攻於肺而喘者必面色紫黑宜奪命散下瘀瘀去喘自定虛者參蘓飲卽人參一兩爲末蘓木二兩煎湯冲服也

浮腫證治

枳朮湯

小調中湯

產後腫分氣水血輕浮脹滿氣之形水腫喘嗽小便澀皮如熟李血之情氣腫枳朮湯最效水腫茯苓

苓導水靈血腫調中歸芍木茯陳煎沖小調經歸  
芍珀麝辛桂沒理氣調榮瘀血行

註

產後浮腫由於敗血乘虛流入經絡血化爲  
水故令浮腫然有氣腫水腫之別不可不辨  
也若輕虛浮腫心胸脹滿者因素有水飲所  
作名曰氣分也宜用枳朮湯卽枳實白朮煎  
湯服之若喘嗽小便不利者則爲水腫宜茯  
苓導水湯利之若皮如熟李或徧身青腫者  
則爲血分宜小調中湯治之其方卽當歸白

芍藥白朮茯苓陳皮煎湯沖小調經散服之  
卽當歸赤芍琥珀麝香細辛肉桂心沒藥也

茯苓導水湯 方見三卷

發熱總括

產後發熱不一端內傷飲食外風寒瘀血血虛與  
勞力三朝蒸乳亦當然陰虛血脫陽外散攻補溫  
涼細細參

註

產後發熱之故非止一端如食飲太過胸滿  
嘔吐惡食者則爲傷食發熱若蚤起勞動感

受風寒則爲外感發熱若惡露不盡瘀血傳  
留則爲瘀血發熱若去血過多陰血不足則  
爲血虛發熱亦有因產時傷力勞乏發熱者  
三日蒸乳發熱者當詳其有餘不足或攻或  
補或用涼藥正治或用溫熱反治要在臨證  
細細參考也

### 發熱證治

加味四物湯

加味異功散



生化湯

產後發熱多血傷大法四物加炮薑頭疼惡寒外  
感熱四物柴胡葱白良嘔吐脹悶傷食氣異功查  
麩厚朴薑脾不化食六君子瘀血腹痛生化湯當  
歸川芎丹參共桃仁紅花炮乾薑

註

產後發熱多因陰血暴傷陽無所附大法宜  
四物湯加炮薑從陰引陽爲正治若頭疼惡  
寒而發熱者屬外感不當作傷寒治惟宜用  
四物加柴胡葱白服之若嘔吐脹悶屬傷食

若倦怠氣乏者屬傷氣宜四異功散加山查  
神麩厚朴生薑治之若因脾虛不能化食而  
停食發熱者宜六君子湯若因瘀血發熱者  
必兼腹痛宜用生化湯卽當歸川芎丹參桃  
仁紅花薑炭也

### 六君子湯

### 異功散

### 四物湯

方俱見首卷

勞力發熱用十全氣血兩虛八珍痊血脫躁熱補

血效虛陽外越參附煎

註

產後發熱因產時用力勞乏者宜十全大補湯氣血兩虛者八珍湯去血過多血脫煩躁乾渴面赤而熱者宜當歸補血湯若陰血暴脫孤陽無附而外越發熱者急進參附湯遲則必大汗大喘是陽欲亡雖藥必無救矣

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

方俱見首卷

寒熱總括

寒熱往來遞更換乍寒乍熱時熱寒寒熱似瘧按時發壯熱憎寒熱畏寒

註

產後寒熱名既不同其證亦異當先明辨之如曰寒熱往來者謂寒去熱來熱去寒來遞相更換也曰乍寒乍熱者謂有時寒有時熱寒熱無定時也曰寒熱似瘧者謂或先寒後熱或先熱後寒一定不移至其時而始作也曰壯熱憎寒者謂其身既壯熱而復時時畏

寒也

往來寒熱陰陽格時熱時寒榮衛乖寒熱似瘧疾

兼食壯熱憎寒帶表推

註

產後血氣虛損陰陽不和則寒熱往來陰陽

相乘榮衛不調則時寒時熱敗血不散飲食

停滯則寒熱似瘧汗出遇風則壯熱憎寒有

諸內自形諸外辨之既明然後治無不愈矣

寒熱證治

往來寒熱陰陽格柴胡四物各半湯榮衛不和乍

寒熱歸芍芎參甘草薑寒熱似瘧瘵兼食生化柴  
胡查麴良憎寒壯熱更生散歸地芎參荆穗薑

註

產後陰陽不和往來寒熱者宜柴胡四物湯  
若榮衛不調乍寒乍熱者用憎損四物湯其  
方卽當歸白芍川芎人參甘草乾薑也若停  
瘀兼食寒熱似瘧者用生化湯加柴胡山查  
神麴若感受風寒憎寒壯熱者宜更生散卽  
當歸熟地川芎人參荆芥穗乾薑也

柴胡四物湯

方見首卷

自汗頭汗總括

產後陰虛陽氣盛微微自汗却無妨頭汗陰虛陽  
上越周身大汗是亡陽

註產後血去過多則陰虛陰虛則陽盛若微微

自汗是榮衛調和故雖汗無妨若周身無汗  
獨頭汗出者乃陰虛陽氣上越之象也若頭  
身俱大汗不止則恐有亡陽之慮矣

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

虛熱上蒸頭汗出治用當歸六黃湯黃芩連蘖炒  
黑用歸耆生熟二地黃自汗黃耆湯牡蠣耆朮苓  
甘麥地防大汗不止陽外脫大劑參附可回陽

註

產後亡血陰虛陽熱上蒸頭上汗出至頸而  
還者宜當歸六黃湯卽黃連黃芩黃蘖當歸  
黃耆生地熟地也內苓連蘖三味俱炒黑用  
若自汗太甚宜黃耆湯卽牡蠣粉黃耆白朮  
茯苓甘草麥冬熟地防風也若陰血大脫孤



陽外越大汗不止非大劑參附不能回陽也

中風證治

產後中風惟大補火氣風痰末治之十全大補為  
主劑臨證詳參佐使宜

註

產後氣血大虛雖患中風惟宜大補即有火  
熱風痰氣閉亦當末治總以十全大補湯主  
之臨證詳參其火氣風痰而佐使之

十全大補湯

方見首卷

瘧病證治

加味八珍湯

新產血虛多汗出易中風邪痙病成口噤項強身  
反折八珍者附桂防風搖頭氣促寒不止兩手撮  
空莫望生

註

產後血氣不足藏府皆虛多汗出腠理不密  
風邪乘虛襲入遂成痙證手三陽之筋結於  
頷頰風入頷頰則口噤陰陽經絡周環於身  
風中經絡則頭項肩背強直如角弓反張之  
狀產後患此皆屬虛象惟宜用八珍湯加黃

耆附子肉桂大補其陰陽少佐防風以治之  
若見頭搖喘促汗出不止兩手撮空者則爲  
真氣去邪氣獨留必死之候故曰莫望生也

八珍湯

方見首卷

瘈瘲抽搐證治

加味八珍湯

陰血去多陽氣熾筋無所養致抽搐發熱惡寒煩  
又渴八珍丹地鈞藤鈞抽搐無力戴眼折大汗不  
止命將休

言產後血去太多陽氣熾盛筋無所養必致瘰  
癧抽搐發熱惡寒心煩口渴不宜作風治惟  
當氣血兼補用八珍湯加丹皮生地鈞藤鈞  
治之若無力抽搐戴眼反折大汗不止者則  
爲不治之證故曰命將休也

八珍湯 方見首卷

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

產後不語分虛實痰熱乘心敗血衝氣血兩虛神  
鬱冒實少虛多要辨明虛用八珍籐菖志痰熱星  
連入二陳敗血衝心七珍散芎地辛防硃蒲參

註

產後不語須分虛實治之有痰熱乘心者有  
敗血衝心者有氣血兩虛而鬱冒神昏者大  
抵產後屬虛者多而實者少也虛宜八珍湯  
加釣藤菖蒲遠志痰熱宜二陳湯加膽星黃  
連敗血冲心宜七珍散卽川芎生地細辛防

風礪砂菖蒲人參也

八珍湯 方見首卷

二陳湯 方見三卷

續醫心法要訣 三