

御纂醫宗金鑑卷五十三

編輯幼科雜病心法要訣

感冒門風泮風濕身痛心法要訣

感冒風寒總括

小兒肌膚最柔脆偶觸風寒病榮衛輕為感冒病

易痊重為傷寒證難退夾食夾熱或夾驚疎散和

解宜體會

註

小兒氣血未充肌膚柔脆風寒所觸邪氣入

於腠理榮衛受病輕者為感冒易痊重者為



御纂醫宗金鑑卷五十三

編輯幼科雜病心法要訣目錄

感冒門

感冒風寒總括

傷風

杏蘇飲

金沸草散

傷寒

九味羌活湯

御纂醫宗金鑑卷五十三

雙解通聖湯

雙葛解肌湯

大柴胡湯

減冒夾食

雙解通聖湯

藿香正氣湯

平胃散

感冒夾熱

雙解通聖湯

涼膈散

天水散

感冒夾驚

疏解散

涼驚丸

柴胡溫膽湯

瘟疫門

瘟疫總括

溫病

雙解通聖湯

風濕

荊防敗毒散

桂枝合白虎湯

熱病

瘟疫

荊防敗毒散

普濟消毒飲

二聖救苦丹

癰癩疹痧

升麻葛根湯合消毒犀角飲

三黃石膏湯

消癰青黛飲

雙解通聖湯

暑證門

暑證總括

中暑

加味人參白虎湯

傷暑

二香飲

六合湯

加味香薷飲

暑風

加味香薷飲

玉露散

暑厥

清暑益氣湯

辰砂益元散

抱龍丸

霍亂門

霍亂總括

濕霍亂

二香飲

辰砂益元散

乾霍亂

桂苓甘露飲



理中湯

痢疾門

痢疾總括

寒痢

理中湯

真人養臟湯

熱痢

當歸芍藥湯

白頭翁湯

香連丸

時痢

倉廩湯

噤口痢

參連開噤散

瘡疾門

瘡疾總括

寒瘡風瘡

麻黃羌活湯

桂枝羌活湯

食瘕

柴平湯

大柴胡湯

瘕痰瘕飲

加減清脾飲

咳嗽門

咳嗽總括

肺寒咳嗽

聖惠橘皮散

補肺阿膠散

肺熱咳嗽

火加味瀉白散

涼膈散

食積咳嗽

麩麥二陳湯

蘇葶滾痰丸

風寒咳嗽

參蘇飲

金沸草散

加味華蓋散

喘證門

喘證總括

火熱喘急

喉涼膈散

涼膈白虎湯

導赤散

知藥地黃湯

肺虛作喘

潔古黃耆湯

百合固金湯

本事黃耆湯

風寒喘急

華蓋散

紫蘇飲子

蘇子降氣湯

痰飲喘急

蘇葶滾痰丸

蘇葶丸

馬脾風

五虎湯

一捻金

御纂醫宗金鑑卷五十三

編輯幼科雜病心法要訣

感冒門風泮風濕身痛心法要訣

感冒風寒總括

小兒肌膚最柔脆偶觸風寒病榮衛輕為感冒病  
易痊重為傷寒證難退夾食夾熱或夾驚疎散和  
解宜體會

註

小兒氣血未充肌膚柔脆風寒所觸邪氣入  
於腠理榮衛受病輕者為感冒易痊重者為

御纂醫宗金鑑卷五十三 編輯幼科心法要訣





傷寒難治又有夾食夾熱夾驚等證或宜疎  
散或宜和解臨證時細為體察焉

### 傷風

肺主皮毛感邪風發熱憎寒頭痛疼有汗嚏涕  
浮緩鼻塞聲重咳嗽頻杏蘇飲同金沸散疎風解  
表莫從容

註

傷風者風邪傷衛也衛主皮毛內合於肺故  
令身體發熱憎寒頭疼有汗嚏涕鼻塞聲重  
不時咳嗽也脈浮緩宜杏蘇飲解散外邪繼

用金沸草散開通氣逆則愈

杏蘇飲

杏仁

炒去皮尖

紫蘇

前胡

桔梗

枳殼

麩炒

桑皮

炒

黃芩

甘草

生

麥冬

去心

浙貝母

去心

橘紅

引用生薑水煎服

方歌 杏蘇飲治風傷肺杏仁紫蘇前桔同枳殼桑

皮黃芩草麥冬貝母合橘紅

### 金沸草散

細辛

荆芥

半夏

薑製

旋覆花

前胡

甘草

生

赤苓

引用薑棗水煎服

方歌 金沸草散微傷風細辛荆芥半夏同旋覆前

胡生甘草生薑紅棗赤茯苓

傷寒

小兒傷寒表感寒發熱無汗而惡寒頭痛身痛脈  
浮緊嘔逆煩渴病邪傳初用羌活熱通聖邪傳柴  
葛大柴煎

註

傷寒者乃寒邪傷表營分也其證身體發熱  
惡寒無汗頭痛身痛而脈浮緊若嘔逆煩渴  
者則爲邪盛欲傳經也此證初宜九味羌活  
湯如熱盛者以雙解通聖湯治之服此藥後

已汗下不解而傳經者用柴葛解肌湯兼裏  
證者用大柴胡湯以解表通裏因證施治庶  
不致悞

九味羌活湯

蒼朮

炒

白芷

川芎

細辛

羌活

防風

生地

黃芩

甘草

生

引用生薑蔥白水煎服大便秘者加大黃

方歌傷寒初起羌活湯蒼芷芎細合羌防生地苓

草薑蔥入便秘之時加大黃

雙解通聖湯

麻黃

樸消

大黃

當歸

赤芍

川芎

白朮

石膏

土炒

滑石

桔梗

行身身身身身  
卷五三  
四  
梔子

連翹

去心

黃芩

薄荷

甘草

生

荊芥

防風

引用生薑蔥白水煎服

方傷寒熱盛通聖湯表裏兩解麻消黃歸芍芎

術膏滑桔梔翹苓薄荷草荊防

柴葛解肌湯

葛根

柴胡

白芷

羌活

桔梗

石膏

黃芩

赤芍藥

甘草

生

引用生薑紅棗水煎服

方歌柴葛解肌解三陽葛根柴胡白芷羌桔梗石

膏芩赤芍甘草煎服自安康

大柴胡湯

柴胡

黃芩



赤芍藥

半夏

薑製

枳實

麩炒

大黃

引用生薑大棗水煎服

方歌

大柴胡治邪傳經少陽陽明表裏通柴胡黃

芩赤芍藥半夏枳實大黃同

感冒夾食

內傷飲食感寒風發熱憎寒頭痛疼惡食噯臭吐  
酸物便秘尿澀腹熱膨雙解藿香正氣飲化滯平  
胃斟酌行

註

小兒平日飲食無節內傷停滯外復爲風寒所襲故成是證也其候發熱憎寒頭痛惡食噯臭吐酸便秘尿瀉腹熱膨脹也熱盛者用雙解通聖湯兩解之內無熱者用藿香正氣湯和解之表邪旣解然後調理其脾用平胃散消導之度幾外無餘邪內無滯熱而病自愈矣

雙解通聖湯

方見傷寒

藿香正氣湯

蘇葉

白芷

藿香

陳皮

半夏

薑製

茯苓

大腹皮

甘草

生

厚樸

薑炒

桔梗

引用生薑紅棗水煎服

方歌 和解藿香正氣湯蘇葉白芷共藿香陳半夏

苓大腹草厚樸桔梗引棗薑

平胃散

方見兜乳

加山查神麩麥芽

感冒夾熱

平素有熱感風寒面赤脣焦口鼻乾憎寒壯熱頻  
飲冷心煩譫妄便多艱瀉熱先宜用通聖清熱涼  
膈天水煎

註

小兒臟腑素稟多熱今復爲風寒所傷風熱  
相搏則火邪愈盛故其現證有面赤脣焦口  
鼻乾燥增寒壯熱口渴飲冷心神煩燥譫語  
狂妄二便秘澀治宜散其風寒更宜兼瀉其

熱須用雙解通聖湯兩解之若服藥後汗出  
便利病雖少減熱猶不退者治宜清熱為主  
當以涼膈散合天水散治之則表裏清而病  
愈矣

雙解通聖湯 方見傷寒

涼膈散 方見急驚風

天水散

滑石

六兩  
飛

甘草

一兩  
生

共爲細末每服一錢燈心湯調下

感冒夾驚

感冒病時觸驚異心驚膽怯睡不安身熱煩躁面  
青赤疏散與涼驚丸和以柴胡溫膽劑寧神定  
志效通仙

註

小兒感冒邪氣未解復爲驚異所觸故見心  
驚膽怯睡卧不安身熱煩躁面色青赤之證  
先以疏散劑散之再以涼驚丸清鎮之如  
病雖退尚覺心驚不寐者宜用柴胡溫膽湯  
和解之

疏解散

羌活

蘇葉

防風

枳殼

麩炒

桔梗

前胡

赤芍藥

杏仁

炒去皮尖

僵蠶

炒

甘草

生

黃連

酒炒

引川生薑水煎服

方歌 疏解散治感冒驚羌活蘇葉及防風枳桔前

胡黃連芍杏仁殭蠶甘草同

涼驚丸 方見急驚風

柴胡溫膽湯

柴胡 陳皮

半夏 薑製 茯苓

甘草 生 竹茹

枳實 麩炒

引用生薑水煎服

方歌柴胡溫膽感冒驚病後餘邪尚未寧柴胡陳

印百發設胃六入公監  
卷二十一  
三編  
編輯初科心法要訣



半蒴苔草竹茹枳實薑用生

瘟疫門

瘟疫總括

瘟病傷寒傳變同感寒卽病傷寒名冬受寒邪春復感因感而發溫病成至夏感發爲熱病逐戶相傳乃天行四時不正爲時氣痧疹瘟癘要詳明

註

瘟病之傳變與傷寒無異有冬感於寒而卽病者名曰傷寒有冬傷於寒而未卽病者寒邪藏於肌膚之內伏於榮衛之間至春復感春風發爲溫病至夏復感暑熱發爲熱病若

逐戶闔門老幼相傳乃天行瘟疫其害更烈  
或春夏應煖熱而反寒秋冬應寒涼而反熱  
此爲四時不正之氣名曰時氣相感爲病亦  
與傷寒同其治也其間或發痲發痧發疹要  
當詳明其證治法在後

### 溫病

冬受寒邪不卽病復感春寒發名溫證同傷寒治  
雙解嘔加生薑半夏均

註

溫病一證乃冬受寒邪不卽爲病至春復感

春風而發者也現證與傷寒相同用雙解通  
聖湯兩解之若嘔吐者以生薑半夏入之其  
嘔自止

雙解通聖湯 方見傷寒

風溫

風溫復感春風發汗熱身重睡寤眠汗少荆防敗  
毒治汗多桂枝白虎煎

註

風溫冬受寒邪復感春風而發爲病也其證  
身重睡憇發熱自汗汗少者以荆防敗毒散

解之汗多者以桂枝合白虎湯清解之

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

柴胡

前胡

甘草

川芎

枳殼

桔梗

麩炒

茯苓

引用生薑水煎服

方歌 荆防敗毒宜時氣風濕無汗用之靈荆防羌

獨柴前草川芎枳桔與茯苓

桂枝合白虎湯

桂枝

芍藥

石膏

煨

知母

生

甘草

生

粳米

引加生薑大棗水煎服

方歌 桂枝湯合白虎湯壯熱多汗服此方桂芍石

膏知母草粳米大棗共生薑

熱病

冬受寒邪不即病至夏復感暑熱成身不惡寒而  
多渴證同溫病治亦同

註

熱病乃冬受寒邪不即為病至夏復感暑熱  
而成故名曰熱病現證與溫病相類但不惡  
寒口乾作渴為少異耳治法亦與溫病同

瘟疫

天行厲氣瘟疫病為病挨門合境同皆由邪自口  
鼻入故此傳染迅如風當分表裏陰陽毒因時取

治審重輕古法皆以攻爲急荆防普濟救苦攻

註

瘟疫一證乃天地之厲氣流行沿門闔戶無  
論老少強弱觸之者卽病蓋邪氣自口鼻而  
入故傳染之速迅如風火但毒有在表在裏  
在陰在陽之分其或發或攻或清當因春風  
夏熱秋涼冬寒之四時各異隨人虛實量乎  
輕重以施治也古法皆以攻毒爲急者以邪  
自口鼻而入在裏之病多故也發以荆防敗  
毒散清以普濟消毒飲攻以二聖救苦丹則



行身醫案全錄 卷三十一 三  
酌量合宜審度醫治庶幾臨證時有得心應

手之妙矣

荆防敗毒散

方見風溫

普濟消毒飲

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

陳皮

桔梗

板藍根

升麻

柴胡

薄荷

連翹

去心

牛蒡子

炒研

殭蠶

炒

馬勃

甘草

生

元參

引用燈心水煎服

方歌普濟消毒清時瘟  
芩連陳桔板藍稜升柴薄

荷翹牛蒡殭蠶馬勃草元參

二聖救苦丹

大黃

四兩

皂角

二兩

右為末水丸每服一錢量兒大小與之用無

根水下

癩癧疹痧

傷寒疹癧失汗下時氣初感卽其然表邪覆鬱榮  
衛分外泛皮脈痧疹癧痧白疹紅如膚粟癧紅如  
豆片連連紅輕赤重黑多死淡紅稀暗是陰癧未  
透升麻消毒治熱盛三黃石膏煎已透消癧青黛  
飲痧疹表裏雙解先

註

傷寒發癧疹痧皆因汗下失宜外邪覆鬱內

熱泛出而成也惟時氣傳染感而卽出亦猶

疫之爲病烈而速也發於衛分則爲痧衛主

氣故色白如膚粟也發於榮分則爲疹癩榮  
主血故色紅膚淺爲疹深重爲癩癩形如豆  
甚則成片連連癩疹之色紅者輕赤者重黑  
者死此以色辨熱之淺深驗死生也若其色  
淡紅稀暗者皆因邪在三陽已成癩疹由外  
入裏邪從陰化或過服涼藥所致是爲陰癩  
陰癩陰疹法當從陰寒治也癩出未透表熱  
輕者宜升麻葛根湯合消毒犀角飲治之表  
熱重者宜三黃石膏湯發之已透者用消癩

青黛飲加減清之疹痧初起表裏不清用雙  
解通聖湯先通表裏餘法同前

升麻葛根湯合消毒犀角

升麻

葛根

芍藥

甘草  
生

牛蒡子

荆芥

防風

犀角

引用芫荽水煎服

方歌升麻消毒表癩疹升葛芍草蒡荆防倍加犀

角急煎服表實熱盛另有方

三黃石膏湯

黃連

黃芩

梔子

黃蘗

豆豉

麻黃

石膏

引用生葱水煎服

方歌 三黃石膏發癩疹表實熱盛有奇功連芩梔

藥與豆豉麻黃石膏生用葱

消癰青黛飲

石膏 煨

知母

犀角

甘草 生

梔子 生

川連 生

青黛

元參

柴胡

生地

人參

大黃

引用葶棗水煎臨服入苦酒一匙和服

方消癰青黛消毒癰石知犀角草梔連青黛元

參柴生地人參大黃斟酌添

雙解通聖湯

方見傷寒





暑證門

暑證總括

小兒暑病有四證中暑陽邪傷暑陰暑風攻肝抽搐見暑厥攻心不識人

註

中暑爲陽邪單中暑熱也陽邪身熱有汗傷暑爲陰邪中暑復感寒也陰邪身熱無汗中暑熱極攻肝則抽搐攻心則厥冒不省人事治者果能因證分別施治自無難矣

中暑

中暑汗出身壯熱頭痛大渴煩不寧氣乏神倦兩  
足冷加味人參白虎靈

註

中暑之證身熱有汗因暑熱熏蒸故頭痛口

渴煩躁不寧甚則氣乏神倦足冷惡寒須以

加味人參白虎湯治之

加味人參白虎湯

人參

石膏

生

知母

生

粳米

甘草

蒼朮

水煎服

方歌加味人參白虎湯暑熱傷氣服最良參膏知

母粳米草停飲嘔水更加蒼

傷暑

傷暑受暑感寒風無汗熱渴面赤紅乾噦惡心腹  
絞痛嗜卧懶食肢重疼清散二香飲極效氣虛六  
合湯奏功夾食惡食多吐瀉加味香薷法最靈

註

小兒傷暑謂受暑復感風寒也其證發熱無  
汗口渴飲水面色紅赤乾嘔惡心或腹中絞

痛嗜卧懶食以二香飲治之此內清外散之  
法也若正氣虛弱當補正除邪以六合湯治  
之若傷暑夾食大吐瀉者以加味香薷飲治  
之

二香飲

蘇葉

藿香

白茯苓

扁豆  
炒

厚樸

陳皮

半夏

薑製

甘草

生

大腹皮

白芷

桔梗

川黃連

香薷

引用生薑燈心水煎服

方歌二香飲治風暑病蘇葉藿香白茯苓扁豆厚

樸陳半草腹芷桔連香薷靈

六合湯

人參

香薷

半夏

薑製

甘草生

印泰設夏六入監  
編幼  
心法

砂仁

木瓜

赤茯苓

藿香

杏仁

炒去皮尖

厚樸

薑炒

扁豆

炒

引用薑棗水煎服

方六合虛暑用人參香薷半夏草砂仁木瓜赤

苓藿香杏厚樸扁豆棗薑勻

加味香薷飲

香薷

厚樸

薑炒

陳皮

扁豆

炒

山查

肉

豬苓

甘草

生

枳實

麩炒

水煎服

方歌加味香薷治夾食香薷厚樸共陳皮白扁豆

配山查肉豬苓甘草炒枳實

暑風

暑風抽搦似驚風煩渴汗熱便黃紅先用加味香

薷飲繼用玉露散即寧



註

暑風者手足搖擗狀似驚風者也由暑熱攻  
肝內生風病其證煩渴身熱有汗二便黃赤  
先宜加味香薷飲疏其風繼以玉露散清其  
熱暑熱一解而搖自止矣切不可當驚癇治  
之

加味香薷飲

香薷

黃連

扁豆

炒

厚樸

薑炒

羌活

引用燈心水煎服

方歌加味香薷治暑風香薷黃連扁豆同厚樸薑

炒羌活入燈心煎服效從容

玉露散 方見火瀉

### 暑厥

暑厥昏眩不知人氣虛挾痰上衝心虛者瀉暑益

氣治挾痰益元抱龍均

註

暑厥之證昏昧不省人事因其人元氣素虛

暑熱衝心或挾痰上衝以致精神昏憤虛者

御纂醫宗金鑑 卷五十三 編羅幼科心法要訣

以清暑益氣湯治之實者以辰砂益元散合

抱龍丸治之

清暑益氣湯

人參

黃耆

當歸

白朮

甘草

陳皮

麥冬

五味子

青皮

蒼朮

黃蘗

升麻

去心

酒洗

炙

炙

土炒

炒

炒

酒炒

葛根

澤瀉

神麩

炒

引用薑棗水煎服

方歌清暑益氣虛受暑參耆歸朮草陳皮麥味青

皮蒼朮藥升葛澤瀉炒神麩

辰砂益元散

辰砂

三錢  
水飛

滑石

六兩  
水飛

甘草

一兩  
末

每用一錢薑燈心湯調勻合抱龍丸服

抱龍丸

黑膽星 四兩 天竺黃 一兩

九轉者佳

雄黃

水飛

辰砂

各半兩 另研

麝香

一錢 另研

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化

下

霍亂門

霍亂總括

霍亂風寒暑飲成卒然吐瀉腹心疼飲暑盛兮濕  
霍亂寒勝爲乾症不輕

註

霍亂者乃風寒暑飲之雜邪爲病卒然揮霍  
變亂心腹大痛吐瀉交作也其能吐能瀉者  
謂之濕霍亂夫暑飲雖盛若已經吐瀉其邪  
卽解故易治也若欲吐不能欲瀉不能者謂  
之乾霍亂蓋寒盛則凝旣不吐瀉則邪無去

路故病多不救也

### 濕霍亂

吐瀉不已腹頰疼口渴引飲胸悶膨飲盛主以三香飲暑盛益元散最靈

詩

濕霍亂者乃暑飲合邪也其證吐瀉不已肚腹疼痛口渴引飲胸膈膨悶飲盛者以二香飲主之暑盛者以辰砂益元散主之因證調治則暑飲之邪既清而霍亂之證立愈矣治者宜詳辨之

二香飲 方見傷暑

辰砂益元散 方見暑厥

### 乾霍亂

欲吐瀉之不吐瀉腹中絞痛不能堪煩渴大飲甘露飲肢厥不渴理中煎

註

乾霍亂者乃寒暑凝結欲吐不吐欲瀉不瀉腹中絞痛俗名絞腸痧病也治者當分寒暑如煩渴大飲者為熱以桂苓甘露飲主之若厥逆不渴者屬寒以理中湯主之因證調治



其病自愈

桂苓甘露飲

白朮

土炒

茯苓

澤瀉

豬苓

肉桂

少許

石膏

滑石

水飛

寒水石

水煎服

方歌 寒暑凝結霍亂成桂苓甘露莫從容白朮茯

苓豬澤桂膏滑寒水石相同

理中湯 方見不乳

印纂 設有六 全監  
六一五 一  
三編 輯幼科心法要訣



痢疾門

痢疾總括

痢疾暑濕生冷成傷氣爲白傷血紅後重裏急腹  
窘痛寒熱時痢噤口名

註

痢之爲證多因外受暑濕內傷生冷而成傷  
於氣者色多白以肺與大腸爲表裏也傷於  
血者色多赤以心與小腸爲表裏也裏急者  
腹窘痛也後重者頻下墜也又有寒痢熱痢  
時痢噤口痢之別醫者須詳察之

寒痢

寒傷久痢藏虛寒腸鳴切痛實難堪面脣青白喜  
飲熱理中養藏效通仙

註

寒痢者寒冷傷胃久痢不已或藏氣本虛復  
爲風冷所乘傷於腸胃故痢時腸鳴切痛面  
脣青白口雖渴喜飲熱此裏寒虛之證也初  
宜理中湯久則真人養藏湯治之寒得溫散  
而證愈矣

理中湯方見不乳

真人養藏湯

人參

白朮

土炒

木香

煨

當歸

土炒

白芍

炒

肉桂

甘草

炙

罌粟殼

蜜炙

訶子肉

麵煨去核

肉果

煨

引用烏梅水煎服

方歌 寒痢須用養藏湯 人參白朮廣木香 歸芍肉桂炙甘草 粟殼訶子肉果良

桂炙甘草粟殼訶子肉果良

熱痢

痢初實熱腹窘痛下痢無度尿短紅舌赤脣焦喜  
飲冷芍藥白頭香連靈

註

熱痢者皆因濕熱凝結於腸胃以致腹中窘  
痛頻頻下痢尿短色紅舌赤脣焦喜飲冷水  
此裏熱之證也重則當歸芍藥湯主之輕則  
白頭翁湯主之或香連丸主之

當歸芍藥湯

當歸

白芍

木香

黃芩

黃連

肉桂

大黃

甘草

生

檳榔

水煎服

方歌 熱痢當歸芍藥湯裏急後重服最良歸芍木

香苓連桂大黃甘草共檳榔

白頭翁湯

黃連

黃蘗



秦皮

白頭翁

水煎服

方歌

白頭翁湯治熱痢腹中窘痛溺短赤連蘗秦

皮白頭翁煎服之後痢自愈

香連丸

木香

川黃連

各等分

共為細末醋糊為丸如桐子大量兒大小用

之空心米飲下

時痢

時痢痢疾感時氣發熱無汗徧身疼熱爲邪束固  
作嘔倉廩湯散有奇功

註

時痢者乃痢疾時復感時氣也身熱無汗徧  
身疼痛熱爲邪束頻作嘔逆須以倉廩湯散  
之先解時邪其痢自止

倉廩湯

人參

茯苓

獨活

桔梗

前胡

川芎

甘草  
炙

枳殼  
麩炒

倉米

柴胡

羌活

引用生薑水煎服

方歌時痢須用倉廩湯參苓獨活桔梗良前胡川

芎炙甘草枳殼倉米及柴羌

噤口痢

火毒冲胃成噤口脈大身熱不能食舌赤脣紅惟  
飲冷參連開噤散功奇

註  
噤口痢一證乃火毒冲胃而成其證脈大身  
熱不能飲食舌赤脣紅惟喜飲冷急宜參連  
開噤散救之

參連開噤散

人參

川連

薑炒

蓮子肉 各等分

右爲細末米飲調下

蘇氏識宋米好臨可

肉 齊善

出惠

出國

出國

蘇氏識宋米好臨可

蘇氏識宋米好臨可

瘧疾門

瘧疾總括

瘧疾夏暑秋寒風榮衛合邪病始成陰陽相並發  
寒熱日間淺深作分明

註

瘧疾者多因夏傷於暑其氣舍於榮內至秋  
復感寒風則榮衛合邪而成瘧發時或寒或  
熱者陰陽相並也每日作者因初病邪氣尚  
淺伏藏於榮隨經絡而行故也其間日作者  
因邪已深入脊間伏藏於衝脈故也其晝

發者因邪在三陽之淺夜發者因邪在三陰  
之深瘧將退者亦由夜而晝由間日而至每  
日此爲去陰就陽由深而淺其病欲已也治  
者須詳細分別可也

### 寒瘧風瘧

先寒後熱身無汗此爲寒瘧不須評先熱後寒身  
有汗此爲風瘧須詳明寒宜麻黃羌活劑風惟桂  
枝羌活從

註此瘧疾初起發散之法也先寒後熱者因先

傷於寒後傷於風寒多熱少身無汗者謂之  
寒瘧以麻黃羌活湯主之先熱後寒者因先  
傷於風後傷於寒熱多寒少身有汗者謂之  
風瘧以桂枝羌活湯主之

麻黃羌活湯

麻黃

羌活

防風

甘草  
生

引用生薑水煎服

方歌麻黃羌活湯醫瘧身體無汗寒熱增麻黃羌



活防風草引薑煎服體安寧

桂枝羌活湯

羌活

防風

桂枝

甘草生

引用生薑水煎服

方歌桂枝羌活湯治瘧豈尋常羌活生甘草防風

桂枝良

食瘧

食瘧寒熱腹脹面黃惡食悶不通輕者須用柴

卒劑便鞭加味大柴攻

註

食瘧者因食而病瘧者也山小兒飲食無節復受風暑之氣以致寒熱交作胸腹脹滿否悶不通面黃惡食也但食有輕重須當別之輕者宜柴平湯主之重者宜大柴胡湯加檳榔草果主之治者果能因證調理則積滯清而瘧漸退矣

柴平湯

陳皮

半夏

薑製

蒼朮

米泔水浸炒

厚樸

薑炒

黃芩

柴胡

甘草

人參

引用薑棗水煎服

方歌

柴平湯治傷食瘧陳半蒼朮同厚樸黃芩柴

胡草人參薑棗作引為良藥

大柴胡湯

方見傷寒

瘧疾瘵飲

瘧疾瘵飲多嘔逆而黃口腫胸膈膨痰盛清脾加

橘半飲盛加蒼倍入苓

註

小兒素有痰飲復因外邪凝結脾胃故嘔逆也若瘧疾或經汗下之後表裏無證宜用清脾飲以和之痰盛者本方加橘紅倍半夏飲盛者加蒼朮倍茯苓若兒氣已虛弱更當加人參以扶其正

加減清脾飲

柴胡

黃苓

半夏

薑製

甘草

炙

厚樸

薑製

青皮

醋炒

檳榔

茯苓

草果

人參

白朮

土炒

橘紅

南蒼朮

炒

引用生薑水煎服

方歌

清脾治瘧兼痰飲柴苓半草樸青榔苓果氣

虛參朮入痰盛加橘飲盛蒼

咳嗽門

咳嗽總括

肺病咳嗽有痰聲有聲無痰咳之名有痰無聲謂之嗽爲病寒熱食與風

註

病機式要云咳嗽謂有聲有痰因肺氣受傷動乎脾濕而然也咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也二者雖俱屬肺病然又有肺寒肺熱之分食積風寒之別醫者宜詳辨之

肺寒咳嗽

肺虛飲冷致咳嗽面色皤白痰涕清聖惠橘皮宜  
初進補肺阿膠久嗽靈

註

寒嗽者因平素肺虛喜啖生冷以致寒邪傷  
肺發爲咳嗽其證面色皤白痰多清稀鼻流  
清涕初宜聖惠橘皮散主之若日久不愈者  
須以補肺阿膠散主之則氣順痰清而嗽自  
止矣

聖惠橘皮散

人參

貝母

蘇葉

陳皮

桔梗

杏仁

去皮尖炒

引用紅棗水煎服

方歌 肺虛受寒頻咳嗽橘皮散治效通仙參貝蘇

葉陳皮桔杏仁微炒去皮尖

補肺阿膠散

人參

阿膠

麩炒

牛蒡子

炒

杏仁

去皮尖炒



糯米

甘草

炙

馬兜鈴

水煎食後服

方歌 小兒肺寒時時嗽補肺阿膠效若神人參阿

膠牛蒡子杏仁糯米草兜鈴

肺熱咳嗽

火嗽面赤咽乾燥痰黃氣穢帶稠黏便軟加味瀉

白散便硬加味涼膈煎

註 火嗽一證乃火熱薰擾肺金遂致頻頻咳嗽

面赤咽乾痰黃氣穢多帶稠黏也便軟者加  
味瀉白散主之便硬者涼膈散加桔梗桑皮  
煎服則熱退氣清而嗽自止矣

加味瀉白散

桑皮

蜜炙

地骨皮

甘草

生

川貝母

去心礞

麥冬

去心

知母

生

桔梗

黃芩

薄荷

水煎服

方歌加味瀉白治火欬桑皮地骨甘草合貝母麥

冬生知母桔梗黃芩同薄荷

涼膈散 方見急驚風

食積咳嗽

食積生痰熱薰蒸氣促痰壅咳嗽頻便溏麩麥二

陳治便燥蘇葶滾痰攻

註

積嗽者因小兒食積生痰熱氣薰蒸肺氣氣

促痰壅頻頻咳嗽便溏者以麩麥二陳湯消

導之便秘者以蘇葶滾痰丸攻下之

麩麥二陳湯

陳皮

半夏

薑製

茯苓

甘草

生

黃連

薑製

山查

麥芽

炒

神麩

炒

栝蒌仁

枳實

麩炒

引用生薑紅棗水煎服

方歌 麩麥二陳食積嗽陳半夏草川黃連山查麥

芽神麴炒栝萋枳實一同煎  
川黃取山查麥

蘇葶滾痰丸

蘇子 一兩 炒

苦葶藶 一兩 微炒

大黃 四兩 酒蒸 一次

沉香 五錢

黃芩 四兩

青礞石 五錢 火煨 如金為度

右為末木為丸量兒虛實服之薑湯送下

風寒咳嗽

風寒咳嗽頻嚏涕鼻塞聲重唾痰涎疎風參蘇金

涕散散寒如味華蓋痊

註

小兒脫衣偶為風冷所乘肺先受邪使氣上逆衝塞咽膈發為咳嗽嚏噴流涕鼻塞聲重頻唾痰涎先以參蘇飲疏解表邪再以金沸草散清其痰嗽若寒邪壅蔽當以加味華蓋散治之則風邪解而氣道通氣道通而咳嗽止矣

參蘇飲

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

印真參蘇飲  
編輯幼科心法要訣

半夏

薑製

甘草

生

枳殼

麩炒

桔梗

赤茯苓

水煎服

方歌 參蘇飲治風寒嗽蘇葉乾葛前胡從陳皮半

夏生甘草枳殼桔梗配赤苓

金沸草散

方見傷風

加味華蓋散

麻黃

杏仁

去皮尖炒

蘇子炒

前胡

橘紅

甘草生

桑皮

炒

桔梗

赤茯苓

水煎食後溫服

方歌華蓋散治風寒盛氣促胸滿咳嗽頻麻杏蘇

子前橘草桑皮桔梗赤茯苓



干前淋草桑虫淋淋赤淋芥

心平温甜命胆寒益尿功刚淋迎迎迎和杏藕

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

水銀食針漏眼

喘證門

喘證總括

喘則呼吸氣急促擡肩欠肚哮有聲實熱氣粗胸

滿鞭寒虛痰飲馬脾風

註

呼吸氣出急促者謂之喘急外候擡肩欠肚

若更喉中有聲響者謂之哮吼然致病之原

不一如氣粗胸滿痰稠便鞭而喘者此實熱

也氣乏息微不能續息而喘者此虛邪也其

中有風寒鬱閉而喘者又有痰飲壅逆而喘

者更有馬脾風一證最爲急候醫者須分別  
詳明度用藥如響矣

火熱喘急

火喘燥渴面脣紅肺胃涼膈白虎清瀉心宜用導  
赤散陰虛知藥地黃靈

註

火邪刑金作喘者多口乾舌燥作渴面赤脣

紅也因於肺熱者以涼膈散主之胃熱者涼

膈白虎湯主之心火刑金者導赤散主之腎

虛火來爍金者宜知藥地黃湯主之醫者果

能審察精詳按證調治庶幾用藥如響而不

致有虛實之誤矣

涼膈散

方見急驚風

涼膈白虎湯

大黃

生

樸消

甘草

生

連翹

去心

梔子

黃芩

生

薄荷葉

石膏

生

知母

生

引用粳米水煎溫服

方歌涼膈白虎肺胃熱梔子連翹薄荷葉黃芩大

黃樸消草知母石膏粳米列

導赤散

方見不小便

知藥地黃湯

乾生地黃

山茱萸肉

山藥

炒

知母

炒

黃蘗

鹽炒

牡丹皮

澤瀉

茯苓

水煎服

方歌知藥地黃陰虛熱知母黃藥牡丹皮乾生地黃並澤瀉茯苓山藥共茱萸

肺虛作喘

虛喘氣乏聲短濇潔古黃耆湯效捷百合固金化  
虛痰本事黃耆清虛熱

註

虛喘之證氣乏聲音短濇以濇古黃耆湯主  
之若喘促夾痰者以百合固金湯主之夾熱  
者以本事黃耆湯主之

潔古黃耆湯

人參

黃耆

炙

甘草

炙

地骨皮

桑白皮

炒

水煎溫服

方歌 潔古黃耆湯虛喘最為良  
人參黃耆共甘草

地骨桑

百合固金湯

百合

天門冬

麥門冬 去心

生地黃

熟地黃

當歸

白芍藥 炒

甘草

貝母 去心

元參

桔梗

水煎服

方歌 百合固金虛痰喘 百合二冬二地黃 當歸白

芍生甘草貝母元參桔梗良

木事黃耆湯



五味子

白芍藥

天門冬

麥門冬

去心

人參

黃耆

炙

熟地黃

甘草

炙

茯苓

引用烏梅薑棗水煎服

方歌

本事黃耆虛熱喘五味芍藥二門冬參耆熟

地炙甘草烏梅薑棗白茯苓

風寒喘急

風寒傷肺氣喘急表熱無汗華蓋方肺虛被邪紫蘇飲無邪氣逆降氣湯

註

肺主皮毛一受風寒內閉肺氣則氣逆不降呼吸氣急故作喘也發熱無汗宜以華蓋散汗而散之若肺氣本虛外復被風寒所傷者宜以紫蘇飲子補而散之若肺虛外無風寒所傷內無痰涎壅塞惟氣逆喘急者以加減蘇子降氣湯降其逆氣其喘自愈治者宜詳察之

華蓋散 方見風寒咳嗽

紫蘇飲子

蘇葉

杏仁

炒去皮尖

桑皮

炒

陳皮

青皮

醋炒

半夏

薑製

人參

五味子

甘草

生

麻黃

引用生薑水煎服

方歌 氣虛又被風寒傷紫蘇飲子最相當蘇葉杏

桑陳青半人參五味草麻黃

蘇子降氣湯

蘇子炒

當歸

陳皮

半夏薑製

甘草生

前胡

厚樸

薑製

桂心

沉香

引用薑棗水煎服

方歌氣逆喘用降氣湯肺虛無邪服最良蘇子當

歸陳半草前胡厚樸桂沉香

痰飲喘急

痰飲壅逆因作喘痰飲蘇葶滾痰從停飲喘急不  
得卧瀉飲降逆用蘇葶

註

小兒痰飲作喘者因痰壅氣逆也其音如潮

響聲如拽鋸者須急攻痰壅蘇葶滾痰丸主

之若停飲喘急不得卧者又當瀉飲降逆蘇

葶丸主之醫者須分別施治庶幾曲中病情

矣

蘇葶滾痰丸 方見食積欬嗽

蘇葶丸

南蘇子 炒

苦葶蘆子 各等分  
微炒

右爲細末蒸棗肉爲丸如麻子大每服五丸  
至七丸淡薑湯下

馬脾風

暴喘傳名馬脾風胸高脹滿脇作坑鼻竅撮動神

因亂五虎一捻服最靈

註 馬脾風俗傳之名卽暴喘是也因寒邪客于

肺俞寒化爲熱閉于肺經故胸高氣促肺脹  
喘滿兩脇振動陷下作坑鼻竅擗張神氣悶  
亂初遇之急服五虎湯繼用一捻金下之倘  
得氣開其喘自止如兒生百日內見此者病  
多不救

### 五虎湯

麻黃

蜜炒

杏仁

炒去皮尖

甘草

生

白石膏

研爲末

細茶

引用生薑水煎臨時用藥沖石膏服

方歌五虎湯治馬脾風麻黃蜜炒杏仁從甘草石

膏細茶葉煎服之後喘自寧

一捻金 方見不大便