

竹林女科證治目錄卷二

安胎上總目

妊娠脈訣歌

驗胎有無

脈辨男女歌

胎辨男女法

預知男女法

轉女爲男法

妊娠宜禁房勞

妊娠宜小勤勞

妊娠宜戒生冷

妊娠宜慎寒溫

妊娠宜知靜養

妊娠宜戒惱怒

妊娠須知調護

妊娠宜節飲食

妊娠飲食禁忌

妊娠藥物禁忌

妊娠宜服藥餌

妊娠護胎法

初月胎形

二月胎形

三月胎形

四月胎形

五月胎形

六月胎形

七月胎形

八月胎形

九月胎形

十月胎形

初月養胎

二月養胎

三月養胎

四月養胎

五月養胎

六月養胎

七月養胎

八月養胎

九月養胎

十月養胎

初月胎證

二月胎證

三月胎證

四月胎證

五月胎證

六月胎證

七月胎證

安胎總論

胎寒不安

胎熱不安

胎虛不安

胎實不安

胎痿不長

胎氣上逼

胎氣攻心

胎氣喘急

胎動

胎漏

痛胎

滑胎

胎熱

胎寒

小產

半產

小產胎宮下陷

安胎下總目

暗產須知

妊娠至寶

惡阻

子氣

子滿

子腫

子暉

子癟

子懸

子煩

子喫

子瘧

子啼

子瘡

轉胞

子淋

子痢

姪娠衄血

姪娠吐血

姪娠怔忡

姪娠消渴

姪娠臟燥

姪娠燥渴

姪娠霍亂

姪娠泄瀉

姪娠大便虛急

姪娠遺尿

姪娠白帶

姪娠傷食

姪娠傷寒

姪娠中寒

姪娠中風

姪娠癆癰

姪娠中惡

姪娠中暑

姪娠頭痛

姪娠耳鳴

姪娠口痛

姪娠咽痛

姪娠心痛

姪娠心腹痛

姪娠腰痛

姪娠腹痛

姪娠心腹痛

妊娠小腹痛

妊娠血塊痛

妊娠腹癰

妊娠陰癰

妊娠陰腫

妊娠腳痛

妊娠癰瘍

妊娠遍身瘻瘍

妊娠遍身瘡瘍

火熱侵胎

房勞傷胎

跌撲傷胎

毒藥傷胎

毒物傷胎

鬼胎 胎死腹中

雙胎證治

預防難產

竹林女科證治卷二

安胎上

妊娠脈訣歌

肝主血兮肺主氣血爲榮兮氣爲衛榮衛和諧胎必成血衰氣盛未有體寸微關滑尺帶數流利往來如雀啄三部沉正等無疑尺按不止胎始確滑疾不散三月胎但疾不散五月母弦緊牢強滑利安沉細而

微歸泉路

驗胎有無

婦人二三月經水不行疑是有孕又疑血滯心煩寒

熱恍惚不定宜用驗胎散以探之服後一時許覺腹內中動則有胎也臍下動乃血痕也不動則血凝而非胎也如一服未效再用紅花煎湯調服無不神效

驗胎散

雀腦川芎一兩大當歸七錢

右藥不見火研末分作二次服濃煎艾葉湯調服
脈辨男女歌

左手沉實是男胎右手浮弘女孕來兩尺偏大分男女命門滑疾主懷胎左脈帶縱兩個男右手帶橫一雙女左手脈逆生三男右手脈順生三女寸關尺部

皆相應一男一女分形證諸陽爲男諸陰女指下分

明常記取

愚按男左女右胎之所居氣血聚焉故左

盛則男右盛則女常診癰疽脈癰疽在上

則寸脈盛癰疽在下則尺脈盛癰疽在左則左脈

盛癰疽在右則右脈盛此左盛男右盛女之理也

胎辨男女法

婦人有孕三五月之間令人摸之上小下大形如箕者爲女以女胎面向母腹其足膝抵母腹故也正中圓高形如釜者爲男以男胎面向母背其背脊抵母腹故也又妊娠左乳房有核爲男右乳房有核爲女又男動在三月陽性早也女動在五月陰性遲也是胎氣鍾於陽則生男鍾於陰則生女也

預知男女法

命姪婦前行夫從後急呼之左回首者是男右回首者是女蓋男胎在左則左重故回首時慎護重處而就左也女胎在右則右重故回首時慎護重處而就右也推之於脈亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而左疾爲男左大爲男也胎在右則血氣護胎而盛於右脈亦從之而右疾爲女右大爲女也此陰陽自然之理也

轉女爲男法

易曰乾道成男坤道成女此定理也男子平時清心

寡慾養其乾健之體則得其所感而生男又積德以
正心更能戒殺則冥冥之中自有報應孕必生男且
俊且壽故天之生物必因其材而篤焉此生男神效
法也至於受胎時日之法謂經盡一二日感者成男
三四五日感者成女似爲近理終不足憑卽今方家
偷轍轉女爲男之法用之或驗或不驗未可深信然
物易得而用在外亦有益而無損姑錄數法於後

附法

婦人始覺有孕以釜置婦牀下繫刀向下勿令知之
若不信待雞抱卵時以釜懸窠下則一窠盡是雄雞
可驗

又法

受妊之後月弓弦一條繫縛婦人腰中滿百日去之

又法

受妊三月以前用雄黃而絳囊盛佩婦左腰間卽生男以雌黃佩之卽生女

又法

受妊三月以前用雄雞尾尖上毛三莖潛安婦人臥席下勿令知之

妊娠宜禁房勞

保胎以絕慾爲第一要策其次寡慾然絕慾甚難苟能寡慾則身心清靜不犯房勞腰法而產亦易卽嬰兒亦可少病而多壽若不知謹戒而觸犯房事三月

以前多犯暗產三月以後常致胎動小產卽倖免夫
小產一則胞衣太厚而難產二則子身有白濁而不
壽三則多患瘡毒出痘細密難起以致夭亡皆由父
母淫慾之過也

妊娠宜小勤勞

婦人有孕全賴血以養之氣以護之宜時常行動令
氣血流通筋骨堅固胎在腹中習以爲常雖微閃挫
不致墮胎然非孕後方勞正謂平日不宜過逸耳若
久坐久臥氣血凝滯後必難產常見田家勞苦之婦
孕而不墮正產甚易可證也

妊娠宜戒生冷

胎前喜食生冷只因懷孕以後多惱多氣不慎房勞以致火旺口渴殊不知生冷等物豈能退血分之熱徒使脾胃受傷瘧疾痢疾嘔吐泄瀉諸病皆由此起病則消耗精液口渴愈甚惟戒惱平怒慎房勞服健脾補血之藥調理本原可保平復否則臨產之虛脫產後之絕證斷不免也

妊娠宜慎寒溫

胎前感冒外邪或染傷寒時症鬱熱不解多致小產墮胎攸關性命要知起居飲食最宜調和夏不登樓

宜着地氣夜不露坐宜緩背腹古云不受寒自不發
熱不傷風自不咳嗽此胎前緊要關頭敢不慎歟

妊娠宜知靜養

胎前靜養乃第一妙法不校是非則氣不傷矣不爭
得失則神不勞矣心無嫉妒則血自充矣情無淫蕩
則精自足矣安閒甯靜卽是胎教紹宗祧之重承舅
姑之歡叶琴瑟之和衍螽斯之慶所以古人必先靜
養無子者遵之卽能懷孕懷孕者遵之卽能易產靜
養所關豈不大哉

妊娠宜戒惱怒

凡受胎後切不可打人罵人蓋氣調則胎安氣逆則胎病惱怒則否塞不順肝氣上冲則嘔吐衄血脾胃受傷肝氣下注則血崩帶下滑胎小產欲生好子者必須先養其氣氣得其養則生子性情和順有孝友之心無乘戾之習所謂和氣之祥合家吉慶無不由胎教得之

姪娠須知調護

受孕之後衣無太煖煖則竅開易招風寒食無太飽飽則傷神有礙胎產飲無太醉醉則亂性子必淫暴且酒散百脈致成諸疾凡一切藥物勿用酒煎爲要

勿妄服湯藥勿妄用鍼灸勿過勞力勿多睡臥須時
時行步勿登高廁勿入產婦房勿到喪亡家勿進熱
鬧場勿登高涉險恐傾跌有傷勿舉手向高取物恐
傷胎而子鳴腹中勿看宰殺兇惡之事勿看修造立
木動土勿看戲及鬼怪形象異物看則心驚子必癲
癇又勿多洗浴洗浴過多毛竅頓開易受風寒尤易
墮胎凡初受胎及臨月尤宜禁戒經云力犯者形必
傷泥犯者竅必塞打擊者色青黑繫縛者相拘攣甚
至母殞驗若反掌可不戒哉

姪娠宜節飲食

胎之肥瘦氣通於母恣食厚味多致胎肥難產故孕婦調攝飲食宜淡泊不宜濃厚宜清虛不宜重濁宜和平不宜寒熱但富貴之家肥甘悅口抑令從儉簡素勢必不能酌其所宜開列於後

蓮子 茄實 松子 熟藕 山藥 鯽魚 鴨
鱸魚 鰻鱺 銀魚 海參 淡菜 猪肚 筍
鯛魚 蒜油 解毒 腐皮 滑胎 此二味尤宜臨月多服
妊娠飲食禁忌

受孕之後食犬肉令子無聲食兔肉令子缺唇食姜芽令子多指食螃蟹令子橫生食羊肝令子多厄食

鼈肉令子項短縮頭食鮀魚令子生疳蝕瘡食山羊
內令子多病食野鴨肉令子倒生食鴨卵令子心寒
食雞肉雞卵同糯米食令子生寸白虫食雀肉飲酒
令子多溼無耻或生雀子斑食諸般茵蕈令子驚風
而死他若麥芽大蒜最消胎氣薏米莧菜亦易墮胎
至於無鱗魚鱸馬肉食之過月難產若生冷辛熱煎
炒油麵等物亦宜避忌免後多病只宜蔬飯薄粥少

佐肉食

姪娠藥物禁忌

蠶青班毛水蛭及蚩蟲烏頭附子配天雄野葛水銀

升巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜代赭茺花麝大戟蛇
蛻莪朮雌黃雄黃牙硝芒硝牡丹桂桂枝肉桂槐花牽牛

皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通

木通砂硝

乾漆蟬甲爪地胆茅根及草麻常山商陸并牛黃藜
蘆葫粉金銀箔王不留行鬼箭羽神麴葵子與大黃

妊娠宜服藥餌

胎前產後藥能起死回生世人鑒誤治之失遂言胎
產不必服藥迷亂人意愚者株守強忍以致失於調
養氣血虧損諸證蜂起卒致難治安可因噎而廢食
乎若知保養隨時調治氣充血盈胎安產易其所以

安全母子者藥餌之功正不淺也

妊娠護胎法

孕已知覺用布一幅濶六七寸長可橫纏腰間兩道者常束腰間直至臨盆方解蓋胎當未長成得此腰脅有力潤或撲跌不致損胎及臨產解開腹中乍寬胎兒轉身亦易誠護胎之妙訣也

初月胎形

婦人初受胎一點精血凝成一粒形如珠露乃太極動而生陽天一生水謂之胚此月未有宮羅在褪戶之間未入腹內若無寒熱疼痛不必服藥尤不可觸

犯房勞致成暗產

二月胎形

姪娠受胎一月滿足精血近陽珠露變成赤色形如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生火謂之暉此月在母陰戶內六七寸已入腹內未入衣裏或動或不動猶有狐疑若吐逆吞酸有孕明矣或偏嗜一物則知一臟之虛如愛酸物乃肝臟不能養血

三月胎形

三月形如蠶繭漸漸長大一頭大一頭小其頭微圓未入宮羅已至臍下微有薄衣包裹乃太極乾道成

男前道成女也故謂之胎此月胎最易動最宜防護

四月胎形

四月男女已分始受水精以成血成形體初具六腑
成此月已入宮羅之室衣裏漸至丹田之所忌食
牛馬豬頭諸般發毒之物

五月胎形

五月始受火精以成其氣筋骨四肢初成毛髮始生
此月已入宮室其胎安穩令人摸之如覆盂者是男
如肘頸參差起者是女也

六月胎形

六月始受金精以成其筋口目皆成此月男動左手
動右常在臍中漸漸浮上如魚浮水一般

七月胎形

七月始受木精以成其骨皮毛初成遊其魂能動左手
此月男向左脇動女向右脇動七月巳足亦有降
生成人所以姪姪至此行步艱難

八月胎形

八月始受土精以成皮危形骸漸長九竅皆成遊其
魄能動右手此月臟腑初具毛髮俱生元神俱降真
靈也

九月胎形

九月始受石精以成皮毛百節畢備三轉其身此月
穀入胃眼有光鼻有氣耳有聞口有味宮室羅布以
定生人也

十月胎形

十月受氣足五臟六腑齊備納天地氣於丹田關節
神皆備待時而生其有延月而生者富貴而壽有
月不足者貧賤而夭

初月養胎

妊娠十月名胎胚飲食須精熟酸美勿受預宜食大

麥母食腥辛是謂才正是月足厥陰肝脈養胎其經
不有鍼灸肝主筋及血月之時血行否澁不爲力
未寢必安靜無令恐畏此月經閉無潮熱疼痛不可
輕率服藥若素體弱及慣墮胎者一有不安卽當調
治而預防之宜大安胎飲

大安胎飲

當歸二錢熟地黃白朮蜜炙川芎煨白芍酒炒續
斷鹽水炒條芩酒炒砂仁炒不去殼桑寄生各一錢
甘草荆芥穗各五分水一鐘半煎七分服如氣不

喘加蘇梗成

二月養胎

妊娠二月名始膏毋食辛躁居必靜處勿犯房勞百節皆痛是爲胎是月足少陽膽脈養胎其經不可鍼灸膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護之勿驚動也若氣血不足胎氣始盛逆動胃氣惡心嘔吐飲食少進宜半夏湯

半夏湯

陳皮去白水炒半夏姜製炒黃茯苓各一錢子芩酒炒枳殼炒麸各五分甘草炙五分姜一片水一鐘煎七分食遠服

三月養胎

妊娠三月名始胞此時未有定象見物而化欲生男
者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子賢能講論詩書欲
子端嚴口談正言身行正事是外象而內感者也是
月手厥陰心胞絡養胎其經不可鍼灸胞絡屬心母
悲哀思慮驚動此月心經火盛最易墮胎若嘔吐不
止飲食少進宜抑青丸

須未交三月前服起

抑青丸

川黃連姜汁炒次三兩研末米糊丸如菉豆大每服三四
分加至七八分用半夏湯方見上煎湯送下

四月養胎

妊娠四月始受精水以成血脈食宜稻宜魚是謂盛
血氣以通耳目而行經絡是月手少陽三焦脈養胎
其經不可鍼灸內輸三焦此時兒六腑順成當靜形
體和心志節飲食若倦臥不安或口苦頭痛腳弱及腫
急宜安胎和氣散

安胎和氣散

白朮密炙一錢五分廣陳皮去白鹽製白芍炒黃芩酒炒各一錢當歸
身一分茯苓八分香附鹽水製二錢川芎炙甘草各五分
水煎服如熱多加山梔仁炒黑一錢

五月養胎

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣
深其居處厚其衣服食稻粱羹牛羊調五味是謂養
氣以定五臟是月足太陰脾脈養胎其經不可鍼灸
此時兒四肢皆成毋太饑飽毋食乾燥炙熱毋太勞
倦若胎長腹重睡臥不安宜養胎飲

養胎飲

白朮密炙一錢五分當歸身酒洗白芍酒炒澤瀉鹽水炒川芎
黃芩酒炒枳殼麸炒各八分炙甘草四分

水一鐘半煎七分服二劑

六月養胎

姪娠六月始受金精以成其筋宜小勞毋逸慾毋食
鳥獸肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂是月
足陽明胃脈養胎其經不可鍼灸胃主口目此時兒
目皆成調五味食甘美毋太飽是月胎氣不和卒有
所動不安或腹痛或脹悶安胎和勝飲

安胎和勝飲

當歸二錢 白朮蜜炙一錢 分 黃芩 酒炒 白芍 酒炒 砂仁 炒
衣 茯苓 繢斷 酒蒸 各一錢 炙甘草 五分

水一鍾半煎七分服 六日進一服

七月養胎

姪娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢毋使安逸
動作屈伸以運血氣居燥處飲食辟寒食稻粱以密
腠理是謂養骨而堅齒是月手太陰肺脈養胎其經
不可鍼灸肺主皮毛此時兒皮毛已成毋多言哭毋
洗浴毋薄衣毋飲冷若胎氣不安或損傷漏血或腹
大重墜宜清胎萬全飲

清胎萬全飲

阿膠蛤珠炒熟地黃 白芍酒炒 黃芩酒炒各一錢 繢斷酒蒸
當歸土炒 川芎各一錢 茯苓炒 荆芥炒 桑寄生各八分
炙甘草五分 水煎服二劑

八月養胎

妊娠八月始受土精以成皮膚和心靜息無使氣極
是謂密腠理而光澤顏色是月手陽明大腸脈養胎
其經不可鍼灸大腸主九竅此時兒九竅皆成毋食
燥物毋大怒若胎氣不安氣逆氣喘不問有無外感
宜和胎調氣飲

和胎調氣飲

陳皮去白炒二錢黃芩酒炒五分茯苓一錢白朮蜜炙一錢枳殼各一分
麸炒蘇梗各八分炙甘草五分水煎服七日進一服

九月養胎

姪娠九月始受石精以成皮毛六腑百節無不悉備
飲醴食甘緩帶是謂養毛髮致才力是月足少陰腎
脈養胎其經不可鍼灸腎主續縷此時兒脈絡續縷
皆成毋處溼冷毋着炙衣故雖無他證亦宜順氣和
中安胃使無難產之患宜順胎飲

順胎飲

當歸二錢 白朮一錢 蜜炙黃芩 酒炒蘇梗 白芍 酒炒
大腹皮酒洗各一錢 水煎服八日進

十月養胎

姪娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田關

節人神皆備待時而生是月足太陽膀胱脈養胎其經不可鍼灸自初月至此惟手少陰手太陽心脈也以君主之官無爲而尊也宜滑胎飲

滑胎飲

當歸 茯苓各一錢五分 白朮 蜜炙川芎 煙香附 製陳皮
去白各蘇梗八分 黃芩酒炒五分 炙甘草三分

一錢
水煎服如氣虛加人參一錢 胎肥者加枳殼炒一錢五分 二三日進一服至產方止

初月胎證

婦人月經一月不行六脈平和或見吞酸惡食或見

微寒、微熱懶於舉動胎也。若六脈中見有病脈便非
若知已有胎而惡心嘔吐不思飲食惟養血安胎理
氣健脾爲第一要策宜中和湯。若少婦初次懷胎一
月滿足含羞不對人言醫者不識誤作阻經醫治致
有頭暈惡心嘔吐飲食不進腰腹疼痛六脈浮緊及
體弱病後受胎宜罩胎煎。

中和湯

人參六分當歸身一分砂仁炒香附製各一分白芍酒炒
茯苓 薤香 陳皮去白各八分炙甘草五分
水一鍾半煎七分空心服

罩胎煎

當歸

白芍

酒炒各一錢半

枳殼

麸炒二錢

砂仁

一錢

炙甘草

分五錢

水煎空心服

二月胎證

妊娠稟受怯弱受胎一月便有阻病顏色如故脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩惡食擇食甚者或作寒熱嘔吐痰水恍惚不能支持宜用蒺荅湯若臟寒嘔惡胎氣不安宜理陰煎若心虛煩悶惡進飲食宜木瓜湯若胃虛氣逆嘔吐不食宜縮砂散若寒儉之婦移磚運瓦致胎不安宜和氣散若慣墮胎者宜每月服和氣散兩劑保過五個月而止

赤茯苓湯

赤茯苓

熟地黃各一錢

製炒黃

半夏一錢

旋覆花

人參

白芍

炒川芎

桔梗

甘草

炙

橘紅

各七分

姜七片水煎瀝渣服

理陰煎

熟地黃

三錢

當歸二錢

炙甘草一錢

乾姜

炒一錢

水一鍾半煎七分食遠服

木瓜湯

人參

一錢

木瓜

橘紅

枇杷葉

去毛

蜜炙

麥冬

去心

藿香

各八分

竹茹

彈子大丸

一丸

姜三片

水煎溫服

縮砂散

縮砂仁

炒去殼

研極細末每服二錢姜汁調米飲下

和氣散

藿香

陳皮

白朮

蜜炙

砂仁

炒

黃芩

桔梗

益

智仁

各一錢

厚樸

姜製

枳殼

麸炒各半錢

甘草

炙蘇葉各八分

小茴

七分

燈心十莖水煎空心服

三月胎證

婦人受胎經三月而墮者雖氣血不足亦中衝脈有傷中衝卽陽明胃脈供養胎孕至此時必須節飲食絕嗜慾戒惱怒若胎動不安宜千金保胎丸若大便燥

厥腹滿努力難解無故悲泣謂之臟燥宜清燥湯若
值天時大寒大熱所染各證宜和氣散加減服之

千金保胎丸

杜仲

姜汁炒
斷絲

白朮

蜜炙各二兩

當歸

酒洗熟

地黃

姜汁炒

阿

膠

蛤粉炒珠

益母草

川續斷酒炒

香附米

四條芩酒炒各

製

一錢

各一兩

川芎

艾葉

醋煮陳皮

去白五錢

各一錢

砂仁

一分一錢

炙甘草

一錢

右爲末棗肉和丸梧子大每服百丸空心米飲下

清燥湯

桔梗仁

炒研

白芍

酒炒

當歸身

各一錢半

生地黃

酒洗

麥

冬去心

麻仁

炒各二錢

枳殼

麸炒

條芩

各一錢半

甘草

四分

松子仁三錢河水煎入蜂蜜十匙溫服

和氣散

藿香 陳皮 白朮 磬炙砂仁 炒黃芩 桔梗 益

智仁各一錢 厚樸炒姜汁松殼麩炒各一錢 甘草 蘇葉各八分

小茴七分 燈心莖水煎服 熱加柴胡一錢 黃芩加倍

瘧加青皮一錢 草果一分 破加杏仁去皮尖并五味子各一錢

半錢喘加香附米製一錢 嘔加茯苓半夏製炒黃芩各一錢

四月胎證

妊娠四月身體困倦寒熱往來飲食無味貪睡頭暈四肢瘦軟宜活胎散若內熱體倦腰腿痠痛白帶淋

濟小便頻數不思飲食宜固真飲

活胎散

蘇葉六分枳殼炒
錢三分厚樸姜製
蒼朮米泔浸陳皮去白各七分小茴香甘草各五分

水煎溫服

固真飲

白朮蜜炙條芩續斷鹽水炒
皮杜仲鹽水炒山藥各一錢麥冬去心
心五粒杵三分白建蓮不去
天泉水或井華水煎服

五月胎證

胎臨五月姪娠因弱但覺腹重食睡飲食無味腹中
膨脹宜瘦胎飲若稟賦虛弱胎萎不長由血虛者宜
四物湯加香附砂仁由氣虛者宜四君湯加香附砂
仁由氣血兩虛者宜八珍湯加香附砂仁古人治胎
前證每將人參砂仁同用取其一補一順補則氣旺
而無墮胎之患順則氣和而無難產之憂良要法也

瘦胎飲

當歸身 白朮

蜜炙各七分

澤瀉

白芍

枳殼

炒益

砂仁

益智仁

香附

製各一錢

柴

母草

茯苓

各二分

水煎空心服

胡

甘草

各五分

安胎上

卷二

九

加味四物湯

熟地黃

當歸

各一錢

川芎

白芍

香附

製各一錢

砂仁

五分炒

姜三片

棗二枚水煎服

加味四君湯

人參

白朮

蜜炙

茯苓

各一分

炙甘草

一錢

香附

製各一錢

砂仁

五分炒

姜三片

棗二枚水煎服

入珍養胎飲

人參

白朮

蜜炙

茯苓

熟地黃

當歸

白芍

川芎

香附

製各一錢

砂仁

炒去殼

炙甘草

各五分

姜三片棗二枚水煎服

六月胎證

妊娠元氣不實發熱倦怠致胎不安宜當歸散若飲食不甘嘔吐不止宜加味六君湯若脾胃氣虛不能承載致胎作脹或脹作痛宜加味安胎飲不應宜補中益氣湯

當歸散

當歸

川芎

白芍

炒白朮

蜜炙

黃芩

酒炒各

五錢

五錢

各

爲末每服二錢白湯調下若因氣惱不安加枳殼

炒熟五錢胸膈痞悶再加蘇梗三錢

或作疼痛加柴胡五錢

加味六君湯

竹林子和譜治

卷之二

人参 白朮

蜜炙各一錢半

茯苓

陳皮

去白

半夏

製炒黃

蘇葉

枳殼

麸炒各八分

炙甘草

五分

姜三片棗二枚水煎服

加味安胎飲

白朮

蜜炙二錢

人參

當歸

熟地黃

川芎

白芍

陳皮

蘇葉

黃芩

蜜炙一錢半

炙甘草

各一錢

升麻

五分

姜三片棗二枚水一鍾半煎七分服

砂仁

補中益氣湯

人參

黃芪

蜜炙

白朮

蜜炙

炙甘草

各一錢

當歸

一錢

陳皮

五分

升麻

炒

柴胡

各三分

姜三片棗

二枚

水煎空心服

七月胎證

婦人受孕遇三五七陽月往往墮胎如前次三箇月而墮則後次有胎必如期復墮故牛產後須服養氣血固胎元之藥以補其虛若後次有胎必先於兩箇月半後卽服清熱安胎藥數劑以防三月之墮至四箇半月後再服八九劑防過五月至六箇半月再服五七劑以防七月及至九箇月可保無虞矣其預防墮胎之藥三月以前宜芎歸補中湯或泰山盤石散五月以前宜安胎飲或加味異功散如嘔吐宜加味六君煎七月以前宜保胎無憂丸或加味益氣湯如

有別證更加斟酌此月防過尤宜服安胎丸

芎歸補中湯

黃芪
蜜炙當歸

酒洗

白芍
酒炒

白术

蜜炙各

一錢半

阿膠

蛤粉

炒珠五味子
乾姜

炮各

人參

杜仲

鹽水

炒木香

不見

火炙甘草
各五分

水一鍾半煎七分不拘時服

木香

泰山盤石散

人參
黃芪
蜜炙

川續斷

黃芩

當歸
各一錢

白芍

酒炒熟地黃
各八分

川芎

砂仁

研炙甘草
各五分

白术

蜜炙糯米
二錢

水一鍾半煎七分食遠服

但覺有孕三五

日常服一劑
方保無虞

若有熱者倍用黃芩少用砂仁胃弱

者倍用砂仁少加黃芩

安胎飲

白术 蜜炙當歸 條芩 炒蘇梗 各一錢
各八分 川芎 香附 製砂仁 炒研各六分
陳皮 五分 甘草 四分

水煎服如胎不安加阿膠 蛤珠 粉炒一錢
胎痛倍用砂仁

加味異功散

人參 白术 蜜炙當歸 川芎 陳皮 茯苓 阿

膠 蛤珠 炒麥冬 去心 炙甘草 各等 分
姜三片棗二枚水 前服

加味六君煎

人參 白术 蜜炙茯苓 炙甘草 陳皮 去白半夏

炒黃 姜製白扁豆 砂仁 各一錢

姜五片棗四枚水一鍾半煎七分食遠服

保胎無憂丸

黨參 飯上蒸三次 白米 蜜炙黃勿焦 當歸 酒炒各四兩 大熟地 酒蒸
茯苓 乳蒸三欠 純山藥 乳蒸三次 杜仲 姜沫炒各二兩 繢斷絲 川芎
炒黑二兩 繢斷酒洗晒乾五兩 子芩 酒炒砂仁 細末各一錢 白芍 酒炒各三兩
兩 糯米 炒五兩 為末蜜丸每服三錢 白湯下早晚各二服

加味益氣湯

人參 黃芪 蜜炙白朮 蜜炙甘草 蜜炙各一錢當歸二錢川芎 砂仁 陳皮 酸棗仁 炒各八分升麻 炒柴胡 各三分

分

姜三片棗二枚水煎空心服

安胎丸

生地黃

四兩砂仁末一兩
拌酒蒸晒九次

當歸身

白芍酒炒白

赤各二兩切片
蒸晒五次蜜炙

廣陳皮去白

橘芩酒炒川續斷

炒鹽水杜仲斷絲

鹽水炒麥冬去心各二兩

右爲末蜜丸桐子大每朝砂仁湯送下四錢如脾
虛泄瀉加懷山藥菟絲餅各三錢虛加人參二兩
血

虛加阿膠

蛤粉炒珠二兩

八月胎證

妊娠七八箇月覺胎氣展大恐患難產宜束胎丸以

扶母氣縮兒胎使之易產然必胎氣強盛者乃可服
又妊娠常苦難產至七八月心更恐懼致胎不安蓋
恐則氣怯怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產
宜達生散以寬其氣

束胎丸

條芩酒炒勿太熟春冬用
五錢秋七錢夏一兩白朮蜜炙
三兩陳皮二兩茯苓七錢
五分爲末粥糊丸每服五十丸白湯下

達生散

大腹皮酒洗
二錢甘草炙一錢當歸
大腹皮二錢甘草五分當歸
人參錢
陳皮
蘇葉枳殼
炒仁各五分

水一鍾半煎七分服

九月胎證

妊娠八九月胎動不安心腹疼痛面目青冷汗出氣
欲絕此由勞動用力有傷胎宮宜鈎藤湯若胎動下
血宜膠艾芎歸湯

鈎藤湯

鈎藤 當歸 人參 荸神各一錢 桔梗一錢 桑寄生
五分 水煎服

膠艾芎歸湯

阿膠蛤粉炒 當歸 川芎 艾葉各二錢 甘草一錢

水煎服

十月胎證

妊娠難產多由氣血虛弱榮衛滯以致之故生不可催只宜調和氣血氣充血盈產自無虞若素稟虛弱胎素不安者臨月宜常服五福飲若胎肥氣逆臨蓐難產者宜保生無憂散若素患產難者欲縮胎易生宜達生散若保產催生屢試屢驗惟資生湯福胎飲堪稱神劑

五福飲

人參錢二三熟地黃錢四當歸錢二三白朮錢一
蜜炙錢五分炙甘草錢五分

草一錢

水一鍾半煎七分食前溫服

保生無憂散

當歸

酒浸炒

枳殼

鹽水炒

川芎

木香

不見火

白芍

酒炒

炙

甘草

各一錢

血餘

另研末

存性

乳香

另研末

各五分

水煎入血餘乳香二味末藥不拘時服

達生散

鱗治陰懷少產至三月後常

之臨產前一日加熟地

膏藥

秋葵子一錢催生

智神可免難產諸症

大腹皮

洗三錢

豆汁浸水

次淨晒乾

人參

陳皮

紫蘇葉

當

歸身

白芍

酒炒

白朮

蜜炙各一錢

炙

甘草

分葱白

黃楊

樹頭枝

七

春加川芎夏加黃芩

秋冬加砂仁枳殼水

煎服

資生湯

經驗治有難產或
慣滑胎或偶動胎氣

紫厚樸

姜汁炒

艾葉七分

當歸酒洗川芎各一錢

川貝

母心另研

菟絲子各一錢

川羌活

甘草各五分

荆芥穗

生黃芪各八分

枳殼炒六分

白芍酒炒二分

姜片三錢

水鍾煎八分

入川貝母末和勻空心溫服臨月服三劑永無難

產之患若七箇月服起七月服一劑八月服二劑

九月服三劑臨產再服一劑其效如神

福胎飲

當歸

一兩酒洗

枳殼炒

川芎三錢

益母草二錢

黃芪五錢

水煎服臨盆將產服此最妙

安胎總論

妊娠脾胃旺氣血充則胎安產易子亦多壽何必服藥若氣血衰脾胃弱而飲食少思則虛證百出或不妊或妊而屢墮更或外感六淫內傷七情耗散真元皆墮胎之由也故參朮條芩乃安胎之聖藥芎歸熟地實補血之良方佐以蘇葉陳皮可爲常服之劑妊娠六月之前其胎尙未轉運茯苓性降不宜多用黃芪肥胎豈可常加香附雖胎喘宜加久服則虛人有害砂仁雖止嘔定痛多服亦動血行胎歷考丹溪之論不過數言安胎之方止於三四若能加減醫治可

以十全八九

胎寒不安

胎寒之證或吞酸吐酸或嘔惡脹滿或喜熱畏涼或
下寒泄瀉或腹多沉細而胎有不安者宜溫胃飲理
陰煎加減主之

人參

三分蜜炙二錢

扁豆

炒二錢

乾姜

炒黑二錢

炙甘草

當歸

一二錢滑一錢當歸泄者勿用

水煎食遠溫服若下寒帶濁加

破故紙

錢氣滯加木香

七分腹痛加砂仁

七分泄瀉加

白豆蔻

錢如兼外邪及肝腎病加肉桂桂枝甚者

加柴胡

一錢脾虛下陷加升麻

分三五服

濕痰痞滿加茯

芩錢一
二脾
胃虛極嘔吐不止倍用參术

理陰煎

熟地黃

三五錢

當歸二錢

三炙甘草一錢

乾姜二錢

少炒

一錢

水煎溫服或加肉桂一錢

若脾胃兩虛或嘔或脹加

茯苓三錢

泄瀉不止去當歸加山藥扁豆破故紙各

錢腰腹疼痛加杜仲炒絲

枸杞各一錢

一錢

一腹脹滯痛加

陳皮砂仁各錢

如兼外邪加柴胡一錢

胎熟不安

胎熟之證必多煩熱或渴或躁或上下不清或漏血
溺赤或六脉滑數而胎有不安者宜涼胎飲保陰煎

涼胎飲

生地黃 白芍各二錢 黃芩

當歸各二錢

甘草七分

枳殼各一錢

炒石斛各一分

茯苓一錢

水煎食遠溫服如熱甚加

黃柏一錢

保陰煎

生地黃

熟地黃

白芍藥各二錢

懷山藥姜川續斷

黃芩

黃柏各一錢

甘草五分

水煎食遠溫服如

小水多熱或怒火動血加梔子炒焦一錢

夜熱身熱加

地骨皮

一錢

肺熱多汗加麥冬酸棗仁各一錢

血熱

甚者加黃連一錢血虛血滯筋骨腫痛加當歸

一錢

氣滯而痛去熟地黃加陳皮香附各一血脫血滑

日久不止加地榆錢或烏梅箇肢節筋骨腫痛加

秦艽丹皮

各一錢

胎虛不安

胎氣有虛而不安者最費調停要皆以胎元飲爲主
若心脾氣虛者宜逍遙飲歸脾湯若肝腎血虛者宜
左歸飲固陰煎若脾胃氣虛而兼帶濁者宜祕元煎
菟絲煎若氣血俱虛者宜八珍湯十全大補湯

胎元飲

人參

當歸

杜仲

斷絲

水炒白芍

各二錢

熟地黃

二錢

三

白朮

蜜炙一錢五分

炙甘草

蜜炙一錢

陳皮

七分無滯不用

水煎服如下

元不固而多遺濁者

加懷山藥

補骨脂

各一錢

一氣虛

倍白朮

加黃芪

蜜炙一錢快者芪

朮俱勿用

虛而兼寒多嘔

加炮姜

蜜炙一錢

虛而兼熱去杜仲

加黃芩

一錢或加生

地黃

二錢陰虛小腹痛加枸杞

錢多怒氣逆

氣附

錢多怒氣逆加香附

製錢一或加砂仁

炒一錢

觸傷動血

加川續斷阿膠

炒味錢多怒氣逆加香附

各一錢

一嘔吐不止加半夏

製炒黃一錢

生姜

三五片

逍遙飲

當歸

錢一二

白芍

五錢一分

熟地黃

三五錢

酸棗仁

二錢

茯苓

二錢

一錢

遠志

肉三分

陳皮

八分

炙甘草

一錢

水煎溫服如

氣虛加人參

一錢

氣滯加香附

製一錢

歸脾湯

人參

黃芪

蜜炙白朮

蜜炙

茯苓

酸棗仁

炒二錢

各遠

志肉

當歸

各一錢

木香

不見火

炙甘草

各五分

圓眼內

一枚

水煎食遠服

左歸飲

熟地黃

二三錢

懷山藥

枸杞

各二錢

灸甘草

一錢

茯苓

一錢

五分

山萸肉

一錢者少用

畏酸

水煎食遠服

如肺熱而煩加

麥冬

去心二錢

血滯加丹皮

二錢

心熱而躁加玄參

二錢

脾

熟易饑加白芍

二錢

腎熱骨蒸多汗加地骨皮

二錢

血

二錢

脾

熱妥動加生地黃二錢陰虛不甯加女貞子二錢血虛而躁加當歸二錢

固陰煎

人參

一二錢

熟地黃

三五錢

懷山藥

姜製二錢

山萸肉

一錢五分遠

志肉

炒七分

炙甘草

一五錢

味子

十四粒

兔絲子

炒香二錢

水煎食遠服如陰虛微熱加川續斷

二錢

腹痛溏泄

加補骨脂

一錢肝腎血虛小腹疼痛加當歸

二三錢

脾

虛多濕或兼嘔惡加白朮

一二錢

元氣不固加升麻

炒一錢

心虛不眠多汗加酸棗仁

少二錢

祕元煎

遠志肉

炒分

八懷山藥

姜製二錢

芡實

炒一錢

酸棗仁

炒二錢

白

朮

蜜炙

茯苓

各五分

炙甘草

一錢

人參

錢一二分

北五味

十四粒

畏酸者去之

水煎食

遠服氣虛加黃芪

蜜炙一錢

有熱加

苦參

一錢

免絲煎

人參

懷山藥

當歸

免絲子

製炒

酸棗仁

炒

茯苓

炙甘草

遠志肉

製四分

右加白朮

蜜炙一錢

水煎調鹿角霜

研末

服

八珍湯

人參

白朮

蜜炙

茯苓

炙甘草

當歸

熟地黃

當歸

熟地黃

白芍 川芎

各一分等

姜三片棗二枚水煎服

十全大補湯

人參 白朮

蜜炙

茯苓

黃芪

蜜炙

當歸

熟地黃

白芍 川芎

各一錢

肉桂

炙甘草

各五分

姜三片棗二枚水煎服

胎實不安

胎實而不安者惟其素本不虛而或多鬱滯者有之
治宜開之導之若嘔吐不止者參橘湯食滯脹滿者
小和中飲肝氣滯逆脹滿者解肝煎怒動肝火者化
肝煎脾肺氣滯上攻作痛者紫蘇飲氣滯兼痰者四

七湯氣滯兼火者枳殼湯

參橘湯

人參 陳皮 夢冬 去心 白朮

蜜炙各一錢

厚模 茶荳 各五

分炙甘草

三分

右加淡竹茹

彈子大一丸

姜三片 水煎溫

服若中脘停痰加枳殼

炒熟

半夏

姜製炒黃各一錢

小和中飲

陳皮

茯苓

厚模

姜製各一錢半山查

扁豆

炒各二錢甘草

五分

姜

水煎服嘔吐加半夏

姜製炒黃各一錢

脹滿加砂仁

七分火鬱加梔子

炒黑一錢

氣逆血滯加紫蘇梗香附

製各

錢一寒滯加乾姜

錢一肉桂

分五

解肝煎

陳皮

半夏

姜製炒黃

厚朴

姜製

茯苓

各一錢

蘇葉

白芍

各一錢

砂仁

七分

姜

三片

水煎服

如胸腹脹痛

加白芥子

一錢

炒香附

製各一錢

化肝煎

青皮

陳皮

各二錢

白芍

丹皮

梔子

炒澤瀉各一錢

焦澤瀉

各五錢

分貝母

二三分錢

水煎食

遠溫服

大便下血

加地榆小便

血竭通草

各一錢

澤瀉

加甘草五分

去

兼寒熱

加柴胡

一錢火

盛加黃芩

一錢

腸腹脹痛

加白芥子

一錢

脹滿勿用白

芍

紫蘇飲

大腹皮

川芎

白芍

陳皮

蘇葉

當歸

各一錢

人參

甘草

各五分

姜三片葱白一莖水煎服

四七湯

半夏

姜製一錢五分

茯苓

二分

蘇葉

六分厚模

姜製九分

姜七片棗二枚水煎服或加當歸一錢

更妙

枳殼湯

枳殼

麸炒

黃芩

酒炒各一錢

白朮

蜜炙二錢

水煎食遠服氣

滯加陳皮

一錢

茯苓

八分

胎癆不長

妊娠五六個月胎瘦不長由於姪母稟賦虛弱若氣血兩虛宜八珍湯方見前胎虛不安條中 參朮茯苓宜加倍若

脾胃虛弱宜六君子湯但使飲食強壯水穀運化則氣血日生而胎自長矣若素有風冷宜長胎白朮丸

六君子湯

人參 白朮蜜炙 茯苓 炙甘草 陳皮 半夏黃製
姜棗爲引水煎服若鬱怒脹痛嘔吐寒熱往來加
柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗

長胎白朮丸

白朮蜜炙 川芎 阿膠 炒珠 乾地黃各六錢 牡蠣煅研 二錢

川椒去目一
蜜丸米飲下每服三十丸

胎氣上逼

姪娘將養如法則氣血調和胎安而產亦易否則胎動氣逆臨產亦難且危矣治宜芩朮湯加阿膠

芩朮湯

子芩三錢白朮

蜜炙五錢右加阿膠

炒珠一錢

水煎服風邪

加乾姜豆豉

各一錢

寒加葱白

三

熱加天花粉

一錢

熱加柴胡

一錢

頂強加葱白

三

溫熱腹痛加白芍

一錢

腹脹加厚樸

姜製一錢

下血加熟艾地榆

各一錢

腰痛加

杜仲炒一
鹽水

驚悸一錢

加黃連

煩渴加麥冬

去心一錢

烏梅

一箇思慮太過加茯神一錢痰嘔加旋覆花川貝母心去

各一錢或酌用半夏麪一錢勞役加黃芪一錢氣喘去白

朮加香附一錢便燥加麻仁一錢素慣難產加枳殼

炒蘇葉各一錢素慣墮胎加杜仲一錢鹽小炒若素血虛

川芎當歸各一錢

胎氣攻心

妊娠過食辛熱毒物熱積胎中以致胎兒不安手足
亂動上攻心胞母多痛苦宜調中和氣飲勝紅丸

調中和氣飲

大黃石膏各一錢橫榔枳殼炒黃芩知母各八分

黃連 六分 黃柏 五分 柴胡 三分 水煎空心服

勝紅丸

紅花子

研去
十粒

百草霜

一錢爲末
粳米糊丸
葱湯下

胎氣喘

妊娠過食生冷兼有風寒客於胃肺因而痰喘氣緊夜臥不安宜此
不蘇安胎飲

紫蘇安胎飲

紫蘇 枳實 大腹皮 枯梗 貝母

去心

知母

桑

皮 當歸

各八分

甘草

五味子

石膏

煨各三分

水煎服

胎動

婦人受姪則礙脾運化遲則生濕濕則生熱熱則血易動血動則胎不安猶風撼其木人折其枝也火能消物造化自然之理故胎之墮也屬虛屬熱者常多治宜清熱養血若素慣半產者宜金匱當歸散脾虛而血熱者宜四聖散肝腎虛而血熱者宜涼胎飲前方見前胎虛安條中肝脾虛而血熱者宜因陰煎前方見前胎虛安條中若素稟虛弱或值天行炎熱或患熱證病愈後而胎有不安者宜芩朮湯黃芩白朮爲安胎之聖藥蓋爲血熱胎不安者言也

金匱當歸散

黃芩

白朮

蜜

當歸

川芎

白芍

各一

爲末每服三錢米飲調下

四聖散

條芩 白朮 蜜炙砂仁 炒阿膠 珠炒右各等分研細

細末每服二錢蘄艾煎湯調服

一方有白
芍無阿膠若監
散

爲湯則砂仁用當減半

芩朮湯

子芩 三錢 白朮

蜜炙一錢五分水煎服急則一日服二劑緩則五日服一劑

胎漏

妊娠心腹痛而下血者爲胎動不痛而下血者爲胎漏大抵胎漏由血熱者下血必多若內熱作渴者宜

益母四物湯血黑成片者宜加味三補丸血虛者宜
膠艾四物湯或二黃散血虛微熱者宜續斷湯氣虛
者宜膠芩四君湯氣虛有熱者宜香砂四物湯勞役
下血者宜加味枳殼湯勞役感寒以致氣虛欲墮者
宜芎歸補血湯房勞觸傷者宜八珍湯方見前胎
不安條中
加阿膠錢薦艾五分下血過多者宜八珍湯方見前
胎
虛
不安
條中
中未應用補中益氣湯脾胃虛弱而下血不止宜補
中益氣湯倍加柴胡升麻若漏血如月經以致胞軟子
俱損者宜二妙煎若漏下黃汁如豆汁甚多者宜

黃芪湯若火熱迫血妄行者宜涼胎飲

方見前胎熱
不安條中

熟甚者徒薪飲若肝有風熱者宜防風黃芩丸若怒氣傷肝而暴下血者宜保陰煎

方見前胎熱
不安條中

若母氣

壯盛身無所苦而月經如常漏下者此蔭胎有餘而

血之溢也兒大能飲血自止矣不必治之然亦不可

使之多下治宜和血涼血健脾安胎宜四妙散

益母四物湯

熟地黃 當歸 白芍 酒炒川芎 益母草 黃芩

酒炒

黃連

姜汁炒

白朮

蜜炙各一錢

水煎食前服

加味三補丸

黃芩 酒炒 黃連 酒炒

黃柏 酒炒

香附 製

白芍

酒炒 各一錢

水煎溫服

膠艾四物湯

阿膠 炒珠

艾葉

熟地黃

當歸

川芎

白芍

酒炒

各一錢

水煎服

二黃散

生地黃 熟地黃 各等分 為末 每服三錢

白朮蜜 桂枝 肉桂

炒各一錢 煎湯調下

續斷湯

當歸 生地黃 各一錢 川續斷 赤芍 各五錢

右爲末每服二錢空心葱白煎湯調下

膠芩四君湯

人參 白朮 蜜炙 茯苓 甘草 炙阿膠 炒珠 黃芩 炒酒

各一錢
一 姜三片棗二枚水煎服

香砂四物湯

熟地黃 當歸 白芍 川芎 阿膠 炒珠 條芩 各一錢

砂仁 香附 炒黑 艾葉 各五分 糯米一撮水煎服

加味枳殼湯

白朮 蜜炙 熟地黃 各一錢 生地黃 枳殼 麴炒 黃芩 炒酒

各一錢

水煎服如未效加當歸一錢

本草綱目
卷之三
三
芎歸補血湯

黃芪 蜜炙當歸

白芍 白朮

蜜炙各一錢

阿膠炒硃

五

味子 拌乾姜

炮各一錢

人參

杜仲

鹽水炒斷絲

炙甘草各五

分

水煎服

一方有木香五分

補中益氣湯

人參

黃芪 蜜炙白朮

蜜炙各一錢

甘草

炙各一錢

陳皮

五分

升麻

柴胡各三分

姜三片棗二枚水煎空心服

二妙散

熟地黃 炒乾姜

炮各二錢

爲末米飲調服

黃芪湯

黃芪二兩 糯米一合 水煎服

徒薪飲

陳皮八分 黃芩二錢 麥冬去心 白芍 黃柏 茯苓

牡丹皮各一錢

水煎食遠溫服如鬱氣逆肝腸痛

動血者加青皮山梔仁

炒黑各一錢

防風黃芩丸

條芩炒黑 防風等分爲末酒丸米飲送下二錢

四妙散

當歸二錢 川芎 白朮 蜜炙黃芩各一錢

水煎食遠服如未效加阿膠

炒珠一錢

痛胎

姪娠初受姪時卽常患腹痛者此由血熱之故名曰
痛胎一時不能速癒宜時服梔芩湯數劑

梔芩湯

山梔仁

黃芩

當歸

元參

枳殼

麸炒

蘇梗

廣皮

白芍

杜仲

鹽水炒斷絲

各等分水煎服

滑胎

姪娠有三四月而墮者有六七月而墮者有屢孕屢
墮者由於氣血不充名曰滑胎宜固胎丸益母丸

固胎丸

人參

黃芪

蜜炙

茯苓

白朮

蜜炙

杜仲

炒

鹽水

川續

斷

山萸肉

白芍

丹參

川芎

山藥

當歸

生地黃

香附

製砂仁

薄荷

水煎服

益母丸

益母草

一斤當歸

四兩爲末蜜丸

彈子大白湯下

胎熱

妊娠將臨月兩目失明不見燈火頭痛眩暈腮頷腫不能轉側此肝經熱毒上攻由過食炙燙火酒辛辣等物名曰胎熱宜消風散天冬飲

卷之二十一
消風散

荆芥
甘草
羌活
川芎
人参
茯苓
殭蠶
炒防風
藿香葉
蟬退去翅足
陳皮去心
厚樸姜製

水煎食遠服

天冬飲

天門冬去心
知母
茯苓
羌活
人参
防風
五味子
茺蔚子
水一鍾煎七分食遠服

胎寒

姪娠不守禁忌貪恣口腹遇食生冷瓜菜及當風取涼以致胎冷不安胸腹脹痛腸中虛鳴四肢拘急泄

瀉欲絕名曰胎寒宜安胎和氣飲

安胎和氣飲

調子

一錢
蜜灸各一錢

陳皮

良姜

炒木香各一錢

白芍

炙甘草

陳米各一錢

姜五片水煎服

小產

小產非正產之證不可作產前治蓋小產氣血大傷
胎動而下必損帶脈急宜大補氣血則帶脈損處可
以復生他日受姪庶無再損之患宜大補地黃湯

大補地黃湯

人參

白朮

蜜灸各一兩

當歸

各一錢

茯苓

三錢

熟地黃

一兩

杜仲

鹽水炒
二錢

炮姜

五分

水煎服

半產

妊娠三月未成形而胎下者爲墮胎五月而墮者爲小產七月而墮者爲半產此皆重於大產但人視爲輕忽而殞命者有之治宜補血養氣生新去瘀若未足月而欲產下血不止宜芎歸補血湯倍加知母止之產而下血不止宜人參黃芪湯產而血瘀心腹疼痛手按愈甚宜當歸川芎湯胎氣弱而小產宜八珍湯前方見安條中不血出過多而發熱宜聖愈湯汗出不止宜獨參湯發熱煩躁大渴面赤脈洪而虛宜當歸補血

湯身熱面赤脈沉而細宜姜附四君湯

芎歸補血湯

黃芪 蜜炙

當歸

白朮 蜜炙

杜仲

鹽水

白芍

各一錢

乾

姜

阿膠 炒珠

川芎

五味子

木香 不見

人參

甘草

炙各五分

右加知母

二錢水煎服

一方無

木香

人參黃芪湯

人參

黃芪 蜜炙

當歸

白朮 蜜炙

白芍

艾葉

各一錢

阿膠

炒珠二錢

水煎服

當歸川芎湯

當歸

熟地黃

白芍

炒玄胡索

炒川芎

桃仁

去皮

去皮

去皮

尖搗紅花

香附

製

青皮

炒澤蘭葉

牡丹皮

水煎入童便酒各小半冲服

聖愈湯

人參

川芎

當歸

熟地黃

酒蒸

生地黃

酒洗

黃芪

蜜炙各一錢

水煎服

獨參湯

人參

二兩

水一鍾半煎七分溫服

當歸補血湯

黃芪

蜜炙一兩

當歸

三錢

水一鍾半煎八分食遠服

姜附四君湯

人參

白朮

蜜炙

茯苓

炙甘草

各一錢

乾姜

炮

附子

製熟各五分

水煎服

小產胞宮下陷

妊娠年及中喪胎元無力則常有胎不能長及多小產昏暉之患此氣血衰敗而然血氣既衰則凡小產之後往往有胎既落而復又下墜如更有一胎欲產者此非胎也乃因氣虛而胎宮隨胎下陷也妊娠不知必至驚慌抑知此無足慮但以壽脾煎加升麻五分或入珍湯方見前胎虛不安條中或十全大補湯方見前胎虛不安條中治之則自安矣

方見前胎虛不安條中

方見上半治之則自安矣

方見前胎虛不安條中

壽脾煎

白朮

蜜炙二三錢

當歸

山藥各二錢

炙甘草一錢

酸棗仁一錢

蜜炙二三錢

一錢

遠志五分

製三分乾姜

炮一錢

蓮肉二十粒

去心炒二錢

隨宜三十粒

人參三錢

則用一兩

加升麻炒五分

水煎服