000371



雲南中医学院
图書館
1960

女科要旨

文科要旨

閻長樂陳修園著

敬厚堂藏板

敘言

醫者意也靈素具在非神而明之則拘守成方將為斯世厲顧醫難而醫婦女尤難昔人以小人女子尤難養也婦女則言不能盡惟醫婦女科亦然蓋小兒不能言而婦女則言不能盡意也非神而明之則拘守成方將為斯兒為啞科竊為指下洞見乎脈與證之相符焉不致於差謬矣吳航陳修園先生儒也幼讀書時醫之論能力窮其理一切皆以四診法佐撫字至今燕南趙北人爺娘頭之科舉出為旋由科舉而登仕籍又遭屬盡刻所著生不欲秘活人方既手刊各種書

令嗣適之次第行於世為世利檢

又以醫學成先志檢　先生所撰女科要旨將付梓人

以年來之詔命作弁言余心好與君家世往能善承家學存心濟人功誠偉焉不揣固陋因為之序侯宜林鴻年拜手

令孫心典一兒頼今

上海中醫藥大學 SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

女科要旨目錄

一卷　調經種子

二卷　胎前

三卷　產後

四卷　雜病

目錄終

1960

GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

先大父公餘之暇命
心典少隨任北直獲覩
先伯父擬註傷寒論淺註為後集剖晰詳
金匱要略淺註為前
集命　先君擬註
明以示來者更遺女科要旨一書命
之未及付梓憶當年典與弟
心蘭伏讀之餘不勝
霜露之感忽忽忽幾數十春秋矣是
殫精竭慮之稿於世者
書也吾
不能梓而行之則吾
付攻木氏
祖所
之責也謹校之以
辛丑荔月長孫
心典謹識

女科要旨卷一

閒長樂陳念祖脩園著

男 蔚古愚參訂

元 犀靈石顧註

孫男 心典徽巷

心蘭芝亭仝校字

調經

婦人以血爲主醫者不可不知經水所在乎

門人問曰人身之血海胞也居腸胃之後膀胱之前而爲膀胱所在乎

陳脩園曰人身之血海胞也居腸胃之後膀胱之前而爲膀胱之外而爲膀胱之內是男女皆有此血海但

室經云血海可以寫其

鞕云血海

婦人皆起於胞中

男則運而行之。女則停而止之。
陽氣應日而一舉。故陰血應月而一下。此一定之總根也。而始滿。故陰血應月而一下。以象月之盈虧。
土經云。女人一科專以月事爲主。蓋時下。
者滿三旬之期而始滿。故陰血應月而一下。以象月之盈虧。
故名月經名爲月信。不止命名確切而月事之有無
門人高子問曰。女科中好手甚少。不可不大爲之振作。
因執女科書數十種。屬余潭而授之。余遍閱大全。

CHINESE MEDICINE UNIVERSITY OF 1960

多少遲速○及一切治療之原委○
屬任、督、二脉俱爲血海○爲月信之原○而統主脾胃和則血自生○謂血生於水穀之精氣也○脾胃和則唯脾胃不調則爲病○
夫五常之信也○脾爲陰土○胃爲陽土○而脾不能不包括於信字之中○
行之土○猶五常之信也○脾不能不包括於信字之中○
前後多少、有無大過則敦阜○
云、土不及則卑監○卑者下也○監者陷也○坑也○既下而又云、土不及則卑監○卑者下也○監者陷也○坑也○既下而又

又陷之類。此言經水不調以虛實分之也。又有以陰分之者許叔微云。婦人病多是月經作多作少或前或後。時發疼痛者一例呼爲經病。不辨陰勝陽勝陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令午少而在月後。或陽勝陰。胞寒氣冷。血不運行。經或斷絕不行，或午多而在月前。或一月數至。崩漏不止。當別其陰陽調其氣血。此叔微統論陰陽之道也。而余

若陽氣乘陰則血氣散溢。經所謂天暑地熱經水沸騰。故令午少而在月前。或一月數至。崩漏不止。當別其陰陽調其氣血。此叔微統論陰陽之道也。而余

則以陰陽二字專
不得陽明煽氣以
即內經卑監之旨
濕氣以調之則燥
燥而陰獨勝陰濕土也
胃者陽明道常實即
陽道常虛不得
太陰之
經卑
土也

之吐血。言。或珍偽杌秋而不來。註金匱云。家有不閱於痌者。或塞其病也。閱或有不閱於痌者。願聞其說。曰。女人之經。一月一行。其常也。或先或後。或遏或逆。或暫或久。或一月再行。或兩三月一行。或終年不行。或經行過多。或淋漓不斷。或全然不見。或行而腹痛。或不痛。或寒熱。或不寒熱。或頭痛。或腰痛。或腹痛。或腹脹。或腹滿。或嘔吐。或泄瀉。或痢疾。或小便不通。或大便不通。或小便如淋。或大便如痢。或口鼻出血。或耳出血。或目出血。或齒出血。或舌出血。或乳汁出。或乳腫。或乳癰。或乳癌。或乳核。或乳岩。或乳瘡。或乳痛。或乳汁不通。或乳汁自出。或乳汁如膿。或乳汁如血。或乳汁如水。或乳汁如油。或乳汁如蜜。或乳汁如酒。或乳汁如醋。或乳汁如鹽。或乳汁如糖。或乳汁如茶。或乳汁如藥。或乳汁如毒。或乳汁如蟲。或乳汁如蛇。或乳汁如鼠。或乳汁如犬。或乳汁如貓。或乳汁如猪。或乳汁如牛。或乳汁如羊。或乳汁如馬。或乳汁如驢。或乳汁如騾。或乳汁如駱駝。或乳汁如象。或乳汁如虎。或乳汁如豹。或乳汁如熊。或乳汁如猿。或乳汁如猴。或乳汁如人。或乳汁如天。或乳汁如地。或乳汁如日。或乳汁如月。或乳汁如星。或乳汁如雲。或乳汁如雨。或乳汁如雪。或乳汁如霜。或乳汁如露。或乳汁如風。或乳汁如雷。或乳汁如電。或乳汁如虹。或乳汁如霞。或乳汁如霧。或乳汁如氣。或乳汁如煙。或乳汁如火。或乳汁如水。或乳汁如土。或乳汁如金。或乳汁如木。或乳汁如石。或乳汁如玉。或乳汁如珠。或乳汁如寶。或乳汁如貨。或乳汁如財。或乳汁如穀。或乳汁如菜。或乳汁如果。或乳汁如花。或乳汁如草。或乳汁如木。或乳汁如竹。或乳汁如葦。或乳汁如蘆。或乳汁如荻。或乳汁如蒲。或乳汁如藻。或乳汁如苔。或乳汁如藓。或乳汁如菌。或乳汁如蕈。或乳汁如蘑菇。或乳汁如木耳。或乳汁如銀耳。或乳汁如金耳。或乳汁如黑耳。或乳汁如白耳。或乳汁如紅耳。或乳汁如黃耳。或乳汁如青耳。或乳汁如紫耳。或乳汁如綠耳。或乳汁如藍耳。或乳汁如靛耳。或乳汁如墨耳。或乳汁如漆耳。或乳汁如膠耳。或乳汁如糊耳。或乳汁如粉耳。或乳汁如麵耳。或乳汁如米耳。或乳汁如豆耳。或乳汁如麥耳。或乳汁如稻耳。或乳汁如粟耳。或乳汁如黍耳。或乳汁如稷耳。或乳汁如麻耳。或乳汁如菽耳。或乳汁如豆耳。或乳汁如麥耳。或乳汁如稻耳。或乳汁如粟耳。或乳汁如黍耳。或乳汁如稷耳。或乳汁如麻耳。或乳汁如菽耳。

此先師之所禁。制方用藥之旨。凡思議不可及之。方書插血之盟也。雖經載黃帝謂雷公曰。不背師老矣。不得不擇人而傳之。但既傳之而又囑之曰。靈樞

衂血。或眼耳出血者。是謂倒經。逆行也。謂居經有一年一行者。是謂避年。有一生不行者。是謂避一行而受胎之後。月月行經。有暗經有受胎。盛俗名垢胎。有受胎數月血忽大下。而胎不墜者。是謂胎漏。此雖異常。而事也。彼皆以妄爲常。而中土失其主信之道。如人無信。行。全賴妓詐以成家。君子不爲也。大抵婦人患此者。性情亦必乖張。

門人問曰。經侯不一。諸家調經之說。是非奈牛。而蕭頴士調經莫先於去

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG 1960

病○錄李氏之一條論以分田詳症治法○錄方氏之論一條○以統論之○深合部意○今全錄於後○

李氏云婦人月水循環纖痾不作而有子○若兼潮熱腹痛○重則咳嗽汗嘔或瀉○有潮熱則血愈消耗○有汗咳嘔則往上行○瀉則津偏于後痛則積結于中○是以必先去痾而後可以滋血調經○就中潮熱疼痛○尤爲婦人常痾○蓋血滯積痰與日生新血相搏則爲痾○骨蒸骨髓便爲骨○骨蒸則血枯不能滋養百骸則蒸熱火盛或挾痰氣食積寒冷則爲疼痛○凡此諸病皆

趲 音坦去聲
攢 攢俗趲字

阻經候不調必先期而後可以調經也
方氏曰婦人經病有月候不通者然不通中有兼痰痛者有兼發熱者有兼退後者此分而爲四也細詳之中又分爲八矣人之氣血周流忽有不通中有血滯者血滯宜破血枯宜補也疼痛中有常時作痛者有經前經後作痛者有常時與經前後作痛者有經前爲熱經後爲虛有積經行爲血虛而有熱者有常時發熱者有經前經後爲血虛而發熱中

則鬱結不行。經前產後。忽遇飲冷。
經候不調。不通作痛。發熱所由作也。
止血止。故治血病。以行氣爲先。香
通。寒則凝。塞。故治血病。以熱藥爲
蕭愼齋曰。按婦人有先病而後致經不
調而後生諸病者。如先因病而後經
去則經自調。若因病而後生諸病。當
病自除。李氏一論。調經之要。可謂調經之要。然偏而不全。余故補
其未盡之旨。若方活氏分因許痘。誠得統論調經大法。

門人問曰大子以月事爲月信專主脾胃不拘內經之字句。邪敝而獨得其精華。究竟從何節而有得之。內經云二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風消。其傳爲息賁。胃脈也。爲倉廩之官。主納水穀。乃不一節領會出來。今將故該之。余此論緣其原文。又採集各家之說。從二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風消。其傳爲息賁。胃脈也。爲倉廩之官。主納水穀。乃不得來乎。日。能納受者何也。此故心不能生血。血不能養

註云。由心脾所發耳。曲事贅之於心故心不能生血。

有所受。脾不運化。而經絡由是水穀衰少。無以化精微。使一身盡用歸脾湯重加鹿茸麥門冬。服二十餘劑可愈。或武淑卿注云。此節當從隱曲推解。事不能暗下矣。余擬用歸脾湯加丹皮梔子地骨皮芍藥柴胡傳爲息奔者。

情曲意難以舒其志。則氣鬱而不暢。不暢則心脾氣不化。水穀日少。無以化氣化血。以入二陽之海。

脾氣不能變化氣血。所以不月經。故而胃病發於心血。余擬用歸脾湯加鹿茸麥門冬。服二十劑。遂枯。月事不行。

血海無餘。所以不月。此之化也。

爲風淫之名。火者。風之化也。發熱消瘦、胃主肌肉。消瘦也。消瘦地骨皮芍藥柴胡傳爲息奔者。喘息者。余擬用歸脾湯加丹皮梔子地骨皮芍藥柴胡傳爲息奔者。喘息

上奔胃氣上逆也余用仝陳麥門冬湯人無胃氣則死
故云死不治此一節爲經血本原之論也
門人問曰婦人經閉或因胎產或因家務煩惱或因
傷其不調之病乎余曰室女何以亦有乃渾全之人
女患此甚阻塞竟患經閉不行若非血海乾枯則爲
逆轉血氣血正用當歸補血湯加麥冬白芍各五
錢以助之倘或失治而成怯症矣
則內熱咳嗽肌肉甲錯毫髮焦落
錢炙甘草二錢虛極者加阿子二
錢炙甘草二錢虛極者加阿子二

者宜用金匱麥門冬湯芍藥甘草湯加牛膝茜草之類
兼服四烏鯉魚湯加龜甲鱉甲以滋陰養血。
劇者加紫河車、鹿茸以補火生精。
衄血咳嗽骨蒸而成瘵病者并治。
生瘵癒佐以逍遙散。
類若肝脈弦虛寸、藥所不能治即與增損逍遙散。
或與加味逍遙散。
湯加乾薑黃之類歸脾湯入珍珠母以出入互用。
有深一層治法。
方二十二歲始因經閉服朱紫坊黃姓之女年

食少。
明數。土
以次便後帶血。
乾薑易附子。
服加生地黃。
四劑。然後再調其經。水連服八劑。
後服六味湯。以赤石脂易黃
五錢。煎。
先止其泄。
故而經水
乾薑收功。
君子湯加
之。
木所
脈大能補
意草載楊
季登之女。閉經年餘。
汗。而成痿症。見汗出如
蒸籠氣。水
謂虛也。投

發熱
可比也。
可知
逆矣。
又服五劑。漸
血俱止。後服六
脈。
血非無病。
者。
閉經謂

可療虛勞亦血也故無路以汗血之全在有汗蓋經血內閉止有從皮毛間透出一宜用極書之藥以飲其血入內而下通於衝脈則皮毛乾槁而死矣經行而汗自止非補其血所能效也而經血略至汗熱稍輕姑減前丸只日進三次月餘忽覺經血大下一月經血大略淋漓五日三次又一次。

二案爲一處一實之對子。

門人問曰女科書一流一方一病而有數方其方倍於男子此書於調經一節止取二十九方毋乃太簡乎。

日內經只有十二方傷寒論止有一百四十三方金匱止有三百四十五方而女科所載不過壹集集藥品而已其餘不可以名方不可以謂之方而方之為淺陋大失神農本經之旨與伊聖製方之法淺陋之本草之淺陋之病家服之不愈而病家服之不愈亦自怨言或日久而病深矣而病家服之不愈亦自怨言或日久而病深矣而病家服之不愈亦自怨言或日久而病深矣

諸同學皆好學深思士也儒者以濟人為心而濟人之方而精選之則如四物湯木淺近猥俗熟濟人不庸禮貴從俗醫道何獨不然今取習用之方而精選之則如四物湯木淺近猥俗熟濟人不庸禮貴從俗醫道何獨不然今取習用

而無深義也。余則
奈贊其內。
翁道人之
也。又加茯
幾爲君。是取
血之渾而不
息也。變瀆近
景書者。方信
宜。加芩、運、知
實。者、加人參白朮大實
葉。者加陳皮朮
大黃枳實
參朮鹿
角膠牛膝外
藤更佐以朮
當湯桃仁承
養榮湯。經

加入香附依神各二錢爲佐。是取鐵
感者以氣之
化於無形。
復脈湯主
脈變澁近
爲神奇。惟

行而腹痛拒按者。加延胡索、木香。經已行而腹痛拒按者。加延胡索、木香、人參、膝澤蘭韭汁童便。若腹中素有痰。欽食滿閉者。加白芥子。夏。色紫者、風也。加荊防白芷。黑者、熱甚也。加黃芩。半夏。色淡白者、虛也。加參、朮、芩、連、丹皮、地骨皮。水如屋漏者。合二陳湯。再加防風、秦艽、羌活、蒼朮、連翹。或帶黃混濁者。熱甚也。加防己、黃芩、牛蒡子、連翹。或成塊作片血不變者。氣滯也。加元胡、枳實、陳皮。色變紫黑者。屬寒者、亦有之。宜審脈審症。此外若

六君子湯
方中參朮苓草。
脾藥也。陳皮半夏胃藥也。經血走於

平胃散
治血不調達生篇加芍藥名
平胃散。

古今方十九
肯與丹溪順丸之類則胃氣太過。經
候頻。詳於海藏六合湯不載。其餘歸脾逍遙各方雖不可
一概丸等方並論而觀益見勝金

牌胃。故加歸芍之類便是調經之的方。

四物湯

新定婦科總方時人習用之方中妙在川芎一味。

十全大補湯

八珍湯

二仙湯

人參養榮湯

五臟兼補視八珍十全更高一格。以藥品雖云滋補。其如板實。却亦平穩可從。

女科要旨

法也，

生白芍　一錢分　去蘆　當歸　陳皮

桂心　徐徐　枝脂　臺朮　茯苓

白朮　一錢　去蘆　乾薑　甘草

熟地　七分　三片。　紅棗二枚。水煎溫服。

加生薑　三片。　內經　人參　志鼓

四烏鯽魚　一尾　加茯苓　五味　五味

調經種子、丸　內經　十四

去四物湯治婦人陽痿。

長男濕、五苓散、毛腸不見水、搽乾、用當歸三兩、川芎一兩、入羊毛黑骨雄雞內、加酒二碗、蒸到、汁乾、將雞用童便一碗、煎藥於、晒焙爲末、或加香附四兩、炒紫、夜神、入參各一兩爲末、煉蜜爲丸、如梧桐子大、酒送下、或米湯送下、

抵當湯、通瘀猛劑、見傷寒論、

桃仁承氣湯、

食前以鮑魚汁送下、

鷄鼠砂 通瘀行經 俱見傷寒

鷄鼠砂 治月經久閉 按此方較上二

鷄鼠砂 無灰酒 方更見平穩

右重湯煮熟去砂溫飲一盞即

歸脾湯 內經發二陽之病發心脾一節

當歸 茯神 人參 各二錢

白朮 棗仁 龍眼

木香
右水煎服
衆草名錢
高鼓峯云男婦性慈不論何症。止以此方吾不知。
芍藥。麥冬。五味子。守服川斛必愈。雖有他方中全賴。
也。木香二味。若去之何以成補之妙。
若有寒熱往來。加柴胡芍藥。若潮熱骨蒸加丹皮。
地骨皮。及梔子。若起於怖驚。加貝母黃連。若腹痛經閉。
逍遥散加桃仁。紅花元胡索之類。

越鞠丸 治六鬱、脇痛、嘔吐、吞酸、腹滿、飲食不消、胸膈痞悶、肩背疼痛、大便不調、五鬱俱作、及婦人經候不勻、赤白帶下、產後惡露不盡、小腹堅痛、發熱惡寒、頭目昏暈、肢體倦怠、百般鬱病、悉屬於肝、醫師但以開鬱順氣治之、鮮不誤矣、此方解鬱總方也、而諸醫不知用此方、變化屢用屢驗、故名越鞠丸、丹溪

香附 童便 山梔 蒼朮 神麯

以上各等分、為末、蒸餅為丸、每服三錢、陳米湯送下

溫經湯

治經閉或經行過多或崩漏不止或久不受胎統名帶下。

吳茱萸三兩　當歸　芍藥　桂枝　阿膠　人參各二兩　半夏半升　一升　麥冬一升　甘草一兩　右十二味以水一斗。煮取三升。分溫三服。亦主婦人少腹寒。久久不受胎及過期不來。

腹滿掌心燒世六歌曰乾

不註該詢有十三痛共三十六種詳七情五害金匱五傷淺深各

膠芎藭阿膠當歸芍藥甘草人參桂枝半夏生薑大棗

權稱銖迪參桂參月

草數相佐。八物二兩也。整升重用。
半半不來次同用。整升重用。
半止有少腹寒久各探門。麥冬勝五。減半
不外也相濡牛夏速水。吳茱生薑各三。減一
崩來而不肯歸芎藭。胎首幽。吳茱阿膠。肝藥也。丹皮杜仲。
過多不受。
男元犀拔當歸。
心藥也。吳茱。
黃肝藥亦胃藥也。人參補五臟生血。
即胃藥也。
參冬甘草。
血生於心。藏於肝也。衝爲血海也。胃
陽明厥陰衝脈麗之也。然細繹方意。以陽明爲主。
兩驅陽明中土之寒。即以麥門冬用

逆

至謂去而通治之月來過多者能止之少腹寒而不受胎者並能

二一升滋陽明中土之燥一熱不使偏亢以薑能降逆而胃氣順也其餘皆相輔

三兩者以薑能行氣安胃絕無逐瘀之品故過期不來者能

桂附壯水之主以制陽光

六味丸

八味丸

益火之源以消陰翳
一方治婦人經水病無子加香附
各三兩艾葉醋炒二兩多效
當歸補血湯
治血虛發熱症類白虎但脈不洪長以別
黃耆一兩 當歸三錢
右水煎服 尤
余未知其所本
麥門冬湯

YUNNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

治長蓋逆火逆上氣咽喉疾不利止逆下氣
孫男心典稟按可借治婦人返經上逆
陽明陽明之脈以下行爲順上行爲逆
法若去粳米加蜂蜜八錢取百花之菁華以補既
之胃陰更爲周到然陽明因虛火而逆者固宜此
湯陽明因虛寒而逆者舍吳茱萸之溫降將何道以
鎖納之乎噫噎吐血衄血之症違衆說而專主此湯
恐漢唐以下至今日而始聞是語也

麥門冬　四錢　煮半夏二錢
不去心　煮半夏三錢
一草錢　粳米半

大棗二枚
入參一錢

右諸味清水煎服於嵩山之井上草堂座中有謂某
脩園與諸生講學於嵩山之方來詢余手執其常用
醫書而世上醫輩更不覺大發一噱曰女科本無純粹可觀之書而相傳習用之藥不自知其爲害不必深求之也然人之一品者則有四不攻一味功兼四物且能去瘀生新血李士材謂

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

其去瘀之功多於生血爲婦人之要藥豈知本草經云丹參味苦微寒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣一名卻蟬生山谷通下文寒熱之氣也邪在心則煩邪在腹則滿腸居腹內邪氣積而不走於腸中故幽幽鳴如走水積聚亦病於腹內積聚推之不移爲癥癥瘕者徵也以其有形可徵或散推之則移爲瘕瘕者假也言其假借而成也或聚散推之不移以心腹邪氣爲提綱邪氣既除則正

氣自然受益非丹參能補益之也詳經文之旨專主驅邪且驅心腹之裏邪與四物湯之功用之攻伐無異若過服以平時調理胎前產後之常藥而輒用其災樂其所亡是也此女科習用丹參之害人一也盖脈調經水去而益母能通血脈生新爲婦人之良藥豈知本草經云荒蕪子味辛微温主明目益精除水氣久服輕身益壽可作浴湯一名益母一名大札生池澤通共四十三字無一字言及

婦人經產之症○微温者得春木之氣也○和○性和則有制、則其性和、
得效○秋金之味也○木有生物是也○其云益精明目者以經所謂風能
而目也○其云益精生於飲食之者以精生於飲食之養華○先散於肝
之甚為對症○若產後虛風也○若產後膚表微微發熱是外感微風○
甚一日○終至敗壞而莫救○若轟東請西延○醫別有殺人不見血之技○
修園亟之○此女科習用益母草之害

人。載。而開寶有之。極贊其功。但爲後人新增之品。或遲。

腸見。或得之傳聞。不足尚也。余惟於久瘧偶用之取其味濇之能截瘧也。久痢偶用之取其味濇之能澁腸也。若謂其能滋陰補腎如開寶所誇之效。吾不

養者必其氣味之和也。試問。滯濇如首烏何以能滋潤者必其脂液之足也。藥之能補

告劣如首烏何以能補正與地黃相反何以謂其功

而四婦有惡苦血而血苦寒者、謂氣寒而善降、味苦而善泄也、其云血積下氣生肌、此物神農本草經不載、唐本云、鬱金味苦寒、主血瘀、血淋尿血、金瘡、原文只此二十三字、其云上血積者、從口鼻出則爲衄血、從下竅出則爲血淋、無痛爲尿血、不行則爲積、積不去則爲惡血、血走於上、從便溺而出、有痛爲瘀血、

相同而相代乎、此女科習用何首烏之害人之良藥、而諸鬱、鬱金謂婦人之病多起於鬱、鬱金能解鬱、鬱金唐本爲木卓經不載、

吾之之而說他之血不能生肌此物所以統主之者以其病原皆由於積也蓋血以氣爲主又標之血視邪之所在而頻用之不可以治若處方不調因寒大泄其氣即所以大破其血也故曰下氣者以苦破惡血之功見經傳切不可叮嚀二字不解一步解嚴一步而閉者寔閉者是其寇讐閉者不妨以此次之若因虛陽上攻破此藥更不可輕用若外邪未結停滯者亦不可輕用若產後非熱結病發心脾大有深旨若錯認此藥爲解機所謂二陽之病起於懷孕最忌攻破此藥更不可以治

學者以此擅攻其內則邪氣乘虛而內陷若氣血兩虛者、用參金之皆入混珠、甚爲不解。昔人謂不讀人間非聖書、吾深以此重虛其虛、則氣血無根而暴脫、此女科習、雜說居然可據、維書魚目乎斯言、四也、聖經灼然嘗放神農作脯鞭鉤鋪。從六陰陽與太乙外五岳四瀆石骨肉心灰毛羽千類皆入間之得地所生草、能治主當其五味一日七十毒是神農本草經或取雜

為辨藥之祖。何以後人食唐宋

書附會鋪張之說。及斯人也。侮聖人之言。可以爲醫人鏡經。謂當碎其面正非過激之談。

種子門

人問曰。婦人何以無子。曰婦人無子。皆由經水不調。經水所以不調者。內有七情之傷。外有六淫之感。或氣血偏盛。陰陽相乘。所致。種子之法。卽在於調經之中。前論已詳矣。若經水既調身無他病而亦不孕者。

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1956

則身體過於肥盛脂滿了宮而不納精也。前人有磨宮、凡。一方。人意。究竟是二陳湯加蒼朮、川芎、六神麴、香附之類。不聚也。景岳有育麟珠極效。然則身體過於羸瘦。子宮無血而精如直說出來更妙。一、鹿角霜、川椒、杜仲四味。似亦不必另立名色也。其有生女不生男者。係男人督脈不足。陽不勝陰。令其男人以鹿茸、菟絲子半斛。釀酒為丸。服之所謂得其要者。一言而盡。他書皆繁而無當也。

啓宮丸　時方

半夏麯　各二兩　香附　各四兩
茯苓　生薑汁浸炒
蒼朮　陳皮　各三兩　川芎　白芍　各四兩
香附便
川芎童便浸炒
天生朮
杜仲
茯苓　各二兩
甘草　一兩

六神丸　時方

肉蔻　水煮
木香　各二兩　丁香　一兩
青皮　酒炒
白朮　各三兩　天生朮
茯苓　各二兩
甘草　一兩

六味地黃丸　錢氏

熟地黃　各四兩　山藥　山萸肉
丹皮　澤瀉　茯苓

門人問曰、好人不能得孕、或易於得孕、可以診脈而預知之否乎、曰、可知、舍脈而獨言藥者、妄也、脈不宜太熱、熱則爲寒、不宜太有力、有力而遲、遲則爲實、實者、正氣虛、邪乘之以實也、治法當散鬱以伐其邪、邪去而後正可補、不宜太無力、無力而虛、虛乃血氣各有虛實寒熱之異、法當補其氣血、又有女子氣多血少寒熱不調月水違期、皆當診脈而以活法治之、務使夫婦之脈和乎有力、交合有期、不妄用藥、乃能生子也、

女科要旨　卷一　三

門人問曰。東垣言婦人經水甫淨三日前交者成男。後交者成女。以精勝於血也。七日子宮既閉。雖交而赤不孕。褚氏來血先至裹精以生男。精勝於血也。三日後一三五。成男。二四。成女。聖濟言因氣而右動。陰資之則成男。血勝乎精則成女。道藏言月水淨後交者成男。血勝於精也。七日子宮既閉。雖交而赤不孕。褚氏來血先至裹精以生男。精勝於血也。三日後一三五。成男。二四。成女。聖濟言因氣而右動。陰資之則成男。血勝乎精則成女。程鳴謙言精之一字到勝乎精則成男。血之百脈齊到勝乎血則成女。此皆一偏之言。不足以語乾坤陰陽之而已然天令雖盡其自然。而人事亦不可不盡。

生之道也。老子云。天法道道法自然。亦

節開求聞。細緻之。也。其雌。必狂呼而奔。不能自。將受斃。
。。。

之而萬物化生則偏陰不生偏陽不長理必有然者也然夫婦交媾而不適其會天命豈不泥乎種孕育多峻補以求可痛也惜也茲幸拜方三首卓然不凡論云男子精薄而不能生女精稀而無子而亦偏陰偏陽之謂也則以詭遇又求名師於百年中而得有秘授焉一曰擇地二曰養種三曰乘時四曰救虛地則母之血也種則父之精也時則之初也余聞之師曰孕不受胎者氣盛血衰感之會也虛則去舊生新

傷於寒熱感於七情氣凝血滯營衛不和以致經水前後多少謂之陰失其道何以能受父不種子氣虛精弱故也弱由過於色慾精既弱辟之乎者方道何以能種故腴地不發瘠種而傷乎五臟微矢枉不大粒亦不長磽地調經養精之時近斤宜講也誠精血盛矣又必待時而入如月經一來即記其時葬至三十時辰則有奇砭納之初萌虛之時也乘而投之如悉情竇不開陰陽背馳則有奇砭納之戶內以動其燃庶予宮開兩情美

雖素不孕者亦孕矣此法歷試歷驗百發百中者也豈謬言哉及其既孕欲審男女先以父生年一爻在上後以受胎之月起生年一爻在下再以遇乾坎艮震陽生男或遇巽離坤兌陰生女有可預知者焉嗚呼始而無予者非天也人定可以勝天也終而有予者亦非天也已而有予者所謂奇香

廣嗣九流此方乃論巾帼之戶內者也

丁香

吳茂

官桂 各二錢
細木香 辛夷 各二錢
別甘草 杏仁 各二錢
白茯苓 各二錢
砂仁 蛇床子 杜仲去絲炒 當歸洗洒炕 烏藥天台者 石菖蒲毛燥去 牡蠣一枚煅 桂心去皮 龍齒

右十味煉蜜爲丸如綠豆大 以下兩方乃論市肆所謂藥也 作簇如皂角子半子大 入硃砂三錢 膩粉一錢 濕心紙裹三遍 厚紙包煨如法用之 桂心一錢 透出者童便塗之 乾以炭煅醋淬 一枚重八錢 經年之物 研細 入前藥末 和丸如梧桐子大 每服五十丸 以下兩方 經調經

YUNNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

山柒去枝 牛膝酒浸
梗

細辛 半夏 防風
川烏去皮臍 生薑去皮 秦艽
右十一味研粗末為九每服三十九加至七十九空心煖酒或鹽湯下

增損地黃丸 治月經不調久而無子 半斤懷熟地黃 二兩全用歸

五子治鬼五煉蜜爲丸如梧子大每服以左尺虛爲天之水衰宜合六味地黃丸右尺虛。

五子衍宗丸

菟絲子八兩 車前子 枸杞子各二兩 覆盆子各四兩

右三味酒浸一宿。焙乾爲末煉蜜爲丸。桐子大。每服十丸。至一百丸。如經少溫酒下。經多米湯下。

1960

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

五子衍宗丸

菟絲子 車前子 枸杞子 覆盆子各四兩

右三味酒浸一宿。焙乾爲末煉蜜爲丸。桐子大。每服十丸。至一百丸。如經少溫酒下。經多米湯送下三錢。時法

五子衍宗丸

菟絲子八兩 車前子 枸杞子 覆盆子各四兩

右三味酒浸一宿。焙乾爲末煉蜜爲丸。桐子大。每服十丸。至一百丸。如經少溫酒下。經多米湯送下三錢。時法

五子衍宗丸

菟絲子八兩 車前子 枸杞子 覆盆子各四兩

右三味酒浸一宿。焙乾爲末煉蜜爲丸。桐子大。每服十丸。至一百丸。如經少溫酒下。經多米湯送下三錢。時法

爲地二之水衰宜合桂附地黃丸。
或以黃耆一斤熬膏和煉蜜爲丸。
俱衰宜合十補丸。余每用加人參鹿茸魚鰾各四兩
長孫男心典稟　拔尤多子丸。凡物之多子者。
且兎絲子車前子煮汁膠臒聚精。況又得枸杞覆盆皆滋
滿與車前子之通利。並用之。助之乎。尤
妙。而在五味子之收斂。
然開開闔闔之妙。亦時方之頗有意義者。
脩園於友科擇用數方之後。必
須短註數語。諸子讀之

咸謂法也肺之劑亦用之者取土旺生金
川之義也惟脾胃虛最下用藥宜速
其下行若雜以脾胃之藥恐遲留其下行
於中而作脹前者時行之某醫治一老婦大
去年陰虛當以六味地黃丸爲主而脾胃又須兼
顧加大粳米八錢爲脾胃雙補古法夫子曰
飯茲何以補腎諸丸而以米湯送下平曰
內經云精

不足者補之以味○味者五穀之精華也○腎者益其精○精者五味也○也開竅於舌○舌能食穀味最能養精○精衰了九竅之精液所聚○食之最能補精○精余於補腎各九必以米湯送下者○此物此志也若時醫以熟地黃與白朮粳米同煎者則有壅滯之害耳○

十補丸

治氣血兩虛先天之水火俱衰少年而有老態者

鹿茸　澤瀉
肉桂　山茱萸
茯苓　人參
白朮　各等分
煉蜜爲丸。如櫟桐子大。米湯送下三錢
此方與十全大補湯從氣血之流行
本根處着眼。分別在此
分別在此是先天無形之體用也此方之
本根處着眼。水火者。後天有形之氣血
行處着眼。氣血者。水火之流行處着眼。

新定加味逍遙丸

治婦人不育晝夜發熱。

當歸一斤 白朮一斤 茯苓一斤 甘草一斤 柴胡一斤 白芍一斤 薄荷一斤 烏梅一斤 生薑一斤 各服三錢 水一鍾半煎七分 去滓 食遠服

香附童便炒 炒老黃色 牛膝酒炒 地骨皮炒 各一斤 製香附四兩

右為末 煉蜜為丸如梧桐子大 每服七十丸 空心晚食各服三錢 白湯送下 或煎湯送下亦可

逍遙散本治肝脾血虛發熱 今加香附童便炒 牛膝酒炒 地骨皮炒 則肝脾與胃俱治 而發熱之症 無不盡除 蓋肝藏血 脾統血 胃為水穀之海 主生血 肝脾胃俱虛 則血不生 而發熱之症作矣 柴胡薄荷烏梅 能發肝脾之鬱 而清其熱 當歸白芍 能養肝血 而和其陰 白朮茯苓甘草 能補脾胃 而滋其化源 生薑能發胃氣 而和中 香附童便炒 能入肝脾 而解鬱 牛膝酒炒 能引血下行 而補肝腎 地骨皮炒 能涼血 而退熱 烏梅能斂肺氣 而生津液 加此數味 則肝脾胃俱治 而發熱之症 無不盡除 蓋肝藏血 脾統血 胃為水穀之海 主生血 肝脾胃俱虛 則血不生 而發熱之症作矣 柴胡薄荷烏梅 能發肝脾之鬱 而清其熱 當歸白芍 能養肝血 而和其陰 白朮茯苓甘草 能補脾胃 而滋其化源 生薑能發胃氣 而和中 香附童便炒 能入肝脾 而解鬱 牛膝酒炒 能引血下行 而補肝腎 地骨皮炒 能涼血 而退熱 烏梅能斂肺氣 而生津液 加此數味 則肝脾胃俱治 而發熱之症 無不盡除 蓋肝藏血 脾統血 胃為水土之氣。土、水一物而備兩名。水土之氣故取之為乾燥故取之為濕。濕、土氣也。燥、火氣也。君火以明。相火以位。君火當寄寓能滋乎。宮火之燥。其效詳載於內經。拾遺中不待

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1962

瘡疽論

門人孚姊佩極大之雄黃者。有令着左旋三週面覘井中之刑。不令入井而刀背抵厚紙陰功。廣行善事而不沒人善。更爲第一善事。不必拈香誦禱。定叫熊羆之占。

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1960

女科要旨卷二

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石韻註

孫心蘭芝亭同校字

門人胎前

道也。已矣。後之淺者自見其淺深者自見其深也。金匱之註甚詳。門人易之法。豈患門人不知牛脾敗衍成編。如今之舉

女科要旨卷二

業家取五經四書題目作泉腐立言之語氣而合時文之法度時法王海藏云胎前熱熱則耗氣血而胎不安當清食調攝得宜絕嗜慾安胎氣主又云胎安胎之法有二如母病以致胎動胎者但療母則胎自安或胎氣不固或有觸動以致母病者宜安胎胎前總以母爲主吾鄉楠爲女科之最上者予相傳不外此說而直

時文無定體唯不失斯得矣茲且從俗而言

則百病不生若氣血和平熱養血爲主若起居飲食雖感別症總以安胎爲急

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

深一步者。趙養葵云。治萎之緊
者。棟柱不固。棟梁亦撓。必使腎
平易近人。行道人不可不備而
問曰。夫子引王海藏云。熱
則耗氣血而胎不安。而
朱丹溪謂胎前當清熱養血爲
主。以白朮黃芩爲安胎
之聖藥。立論相同。而金匱治妊娠開章即以
桂枝湯爲
首方。且有大熱之
戒。附子湯溫補
之賸艾湯。不
啻南轅北
轍。究竟從伸景乎。從海藏丹溪乎。曰。海
藏丹溪之

論原從金匱崇服之湯又與其本篇養胎當歸散得來金匱之附子湯膠艾湯之白朮散同義須審婦人平日之體氣偏陽偏陰豐厚羸瘦致病之因寒因熱之人合之吉熱之人合之吉寒多熱病情之吉寒一也

門人問曰金匱論妊娠小便難飲食如故當以何湯主之師曰當以腎氣丸主之又云婦人得平脈陰脈小弱其人發熱不能食無寒熱名妊娠開章以茯苓湯不能食無寒熱名妊娠開章以茯苓湯不能食無寒熱名妊娠小便難飲食如故當以何湯主之師曰當以腎氣丸主之又云婦人得平脈陰脈小弱其人發熱

卻一月加吐下者則絕之各家所註非失之淺則失之

深請

一、三經水不行不可爲無病之人。而平脈乃爲無病之人得平脈一脈診見此脈有喜出望外之意故曰得也其小弱者以陰脈屬下焦非等於濇爲血滯之病脈此卽兩經所謂婦人有孕身有病而無邪脈之旨也其云渴不能食者以婦人所食穀味化爲血氣下爲月水今月水不通小弱則中焦之氣壅塞中焦者胃也胃病則懶於納穀故不能食胃病則燥氣偏勝故口乾而渴也其云無寒熱

膜莫胡切音模梅說文始胎也膜胎也非也

女子要脈者。胃內起不關外那。安有惡寒發熱之象。故以為不能食無寒熱七字為衍文。無疑。

六十日當有此症者。特為陰脈外弱一句。自明其師古而不泥。

旺與陽寸適別難經云。按之不絕者有孕也。亦言按陰尺脈不絕。今女陰血脈小弱。何以與前聖後賢相反。至此而不知妊娠之初。月為膜。二月為胞。三月為胎。四月為胚。則已成之胎。下焦轉運於中焦。而漑膜胚。則胞尚在將成未成之間。下焦轉運於中焦。以見小弱

之脈遲此胎成則漸見陰持與按之不絕之脈來其云
墮治法逆者四旬言妊娠只有六十日以三月成胎之數
計之不過為一個月其形不過為一團結聚之血豈容
棄之稍誤若誤棄而加吐下則胎不旋踵告其故更以周易勿藥之說謂之不藥也其用桂枝湯奈何
蓋以身有病而脈無故又非寒熱邪氣凡一切溫涼神
劑皆未盡善惟有桂枝湯一方調和陰陽之為得
也
門人問曰巢元方謂妊娠一月名胚胎足厥陰脈養之

二月名始胄足少陽之當此時血不流行形象胎化四月始受水精以成血脈手少陽脈養之五月始受金精以成氣足太陽脈養之六月始受火精以成飲食足陽明脈養之七月始受土精以成骨手太陰脈養之八月始受石精以成毛髮足少陰脈養之九月始受人形皆備陳良甫宗其說以五行之說當從不易之說也

十月分胞四時俱全之說當從不易之說也

冬家

十月五臟六腑關節

某月見某症

則用某藥

之

巢氏諸病源候論卷之四十三

婦人妊娠病候

婦人妊娠經氣養胎血俱盛以養胎之理又豈有限於某月某日某方施治之理齊東野人自爲胎以後切勿述及胎事以汚口耳此說也門人問曰時醫相傳與冊溪口訣謂胎前無寒吾鄉女科俱宗其說然其說與冊溪同合者多而求之金匱則大不然金匱云婦人懷孕六七月脈弦發熱其胎愈脹腹如扇所以然者子藏開故也當以附子湯去其藏仲景安胎用附子湯去有取義今人置而弗

1960 SCHOOL OF CHINESE MEDICINE HONG KONG UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

用。豈古法不堪爲今法用與。曰。得朗論相規。無大病可知。也。今診入懷孕六七月。其脈弦。弦爲陰象。其身發熱熱爲陽淨。其脇痛。脹賬爲虛寒。何以謂之一字而定其脈。曰。愈愈者。更加之意也。若病而增脹。賬。曰。愈也。且可因此一字。而定其陰陽也。昔爲陽格於內。發熱爲陰。而頭痛腹脹。

大小腹該括其中今痛而惡寒不在陽部之腹大腹在劑上之中小腹在劑下之少陰水藏腸光水土所屬也小腹如扁者寒氣習習如冷狀陰寒不能司開藏之令故陰中寒氣習習如冷狀陰寒不能司開藏之令故陰中寒氣習習如冷狀陰寒不能司開藏之令故陰中

門人問曰。妊娠二三月。心煩惡食。嘔吐等症。醫名惡阻。得胎後腹痛痛。醫名胞阻。但惡阻症金匱無其名。而胞阻者。宜逼保胎。豈得用通阻則有不然之。但阻者阻隔之義。隔之阻乎。曰金匱雖無惡阻之名。而第一節云。其人渴不能食。無寒熱名妊娠。桂枝湯主之。一本渴字作嘔字。註家謂爲惡阻症。實謂爲子病。是也。嘔註不止者。金匱用半夏人參丸。主胃有寒。飲若胃熱上行而嘔吐。千金此方。以生薑易乾薑。加茯苓麥冬。重加竹茹。作湯煮之。方中取半夏味辛降逆。辛則性

烈以直通其阻隔庶全活辞立斋
方高鼓峯謂與參
胎之功余每
用六君子湯倣名
效至於胞衣
金匱則
其血海
論蓋以
且也
今

入扣且胞阻與所云漏下等症皆陰陽水於抱負
水於隄防中考歸宣通其陽血考地宣通其陰陽
之品同類相從者以養之也皆令陰陽各病徵乎徵
中解急又得艾葉溫煖子宮補火而生土老以助
令坤土之健隄防也故爲調經止漏安胎養血之良
劑也
問金匱云婦人腹中疼當歸芍藥散土乙赤是
與否曰芍疼者徵寒而絺絺也乃脾虛反受木侵
與痛宜當歸芍藥散兼滲其濕欲

胞阻之治不同。婦人妊娠。宜當歸散主之。此以涼補爲安胎法也。又云妊娠養胎白朮散主之。此以温補爲安胎法也。今皆宗丹溪黄芩白朮爲安胎之聖藥。而當歸散用蜀椒之法。可以永遠矣。夫子以二方皆主白朮。爲何如。曰。二方皆主白朮。爲安胎之聖藥則可。又合黄芩。以兼有痰火。或有火而兼虚。虚則生熱。而胎不長。宜用白朮當歸散。余內子每得胎三月。必瀉痢數日。血傷胎動。宜用當歸散。胎自安。

女科要旨

法用藥連墜五次。後余赴省應試內子胎適三月。欲墜。先慈延族伯学廷義以四物湯加鹿角膠補骨脂各二錢一服而安。令每旬一次。余歸已六箇月矣。閱其方大爲一劑。杜仲續斷

長之勢。譬如果實生於春。而納於夏。若春夏忽作非時之寒氣。涼風則果實亦因之以黃隕矣。唯用大補大溫之劑。令子宮常得煖氣。則胎自平產。不必小題大做。凡得胎後。預服扶胎之藥。以防漏墜。既墜祇用平補之法。余新定所以載丸最驗。

門人問曰。夫子前刻三字經。引而光湯居三。蓋以湯者溫也。妊娠當以安胎爲主。則攻補皆忌。不宜峻攻也。但十方間有未識見。百倍於今人。凡未悉其所

以然之妙者。恐鍼鋒不能相對。而胎娠後人。故姑闕之。且當歸芍藥。且海藏載加之雜病宜取按各病之方。余亦竊用之。而可從。但傷寒宜拔六門人問曰。海藏以六合湯驅病而無損于胎。且亦簡便可從。夫四物等分。隨所患之症加入二味名之。四物湯爲婦科之總方。海藏取之以錄之。是以爲法乎。曰四物湯爲婦人補劑。俱在胎外以除病。護胎。而胎得所護。則胎元則晏然不動。加之雜病。主藥而加之。難以預定。

NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

方加防風蒼朮則失之滯矣何不云一合麻黃湯一合桂枝湯之爲得乎○忽見通身腫滿是脾不能制水、陳皮茯苓澤瀉子氣者、病在氣而不在水氣滯而足面腫、脚指出黃水○甚則與血相搏前方去地黃加香附紫蘇子茯苓散愼勿輕用了○

懸者何○蒲前方去地黃加白朮、婦人參甘草生薑○煩者心中懊憹口燥心煩前方加麥冬知母竹葉人參

加天門冬以清之。佐木通茯苓以通其便。入參甘草以補其虛。卽本草以潤燥而地氣不升。前方加麥門冬以清之。佐木通茯苓以通其便。入參甘草以補其虛。卽本草以潤燥而天氣不降。

甘草子淋者。孕婦小便澁少。乃肺燥而天氣不降。前方加麥門冬以清之。佐木通茯苓以通其便。入參甘草以補其虛。卽本草以潤燥而地氣不升。

安榮散之義。而金匱貝母書參丸主之。大意以肺之治節行於膀胱。則邪熱之氣除而淋澁自止。

貝母書參丸。

或因忍小便所致者。或因憂鬱傷脾者。或因房勞胞胞系急傷肝者。或因產後胎下而陰虛。卽本草以潤燥而地氣不升。前方加麥門冬以清之。佐木通茯苓以通其便。入參甘草以補其虛。卽本草以潤燥而天氣不降。

其狀小便甚者至死。必令脹急難一起分。

藤細辛鈎良鈎藤

在中央胞系得趺、董堂云但利小便則愈。胞之氣所以、大氣充滿、扶之意者、吧之所以正者。

水道自行前方加參木陳皮半升麻生。藥後以手探吐吐後又服之或服。之又金匱。

宜腎氣丸主之。

加減。

知母吊口噤角弓反張。係肝風內動火勢乘風而迅發。藤竹瀝貝母蟲甚者間。

前方加羚羊角鈎。藤竹瀝貝母連湯。

繼以急救之。子鳴者妊娠。

加減。

知母吊口噤、角弓反張、係肝風內動、火勢乘風而迅發、藤竹瀝貝母連湯、甚者間、以急救之、子鳴者妊娠、

前方加羚羊角鈎、藤竹瀝貝母連湯、

繼以、竹葉石膏湯、雞子黃連湯、

SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

腹內胎兒有哭聲乃胎兒口也以作聲前方加茯苓白朮仍用散錢於地

脅脫曲腰抽之一刻間兒口其鳴即止子癎忽然不語盖胎氣壅閉腎脈阻塞應靜候其分娩後則自愈或用安胎方加茯苓遠志一二服亦可凡此之類言之不盡也

繁而難學者以意通之可

門人問曰婦人妊娠之脈何如曰婦人妊娠內經及後賢論脈尚繁而難學唯普明子簡便可從普明子云經

孕者身有病而無邪脈也有病謂經閉無邪脈謂脈息如常不斷絕也經又云手少陰脈動甚者孕子也少陰心也心主血脈此脈既動甚者孕子之兆經又云尺脈既旺而滑者亦為孕子言二尺脈旺與兩寸適別亦為有孕子之有孕以上三者但得其一即為孕脈分而占之合而推之、、、、、而孕脈無過情矣或謂流利者血正旺雀啄亦為孕脈何也答曰、、、流利者經脈閉塞不行故脈疾而數至此數月之胎也不知者斷為病脈則令人恥笑或謂孕有男女何以脈而知之乎答曰左寸脈太陽脈浮大而

為男也。主生二男。兩尺皆浮大而實。主生二女。兩尺皆沉實。主生一男一女。兩尺一浮一沉。浮為女也。若兩寸皆浮大而實。為女也。若兩寸皆沉實。為女而胎孕弦緊滑利為陰。脈沉實知為男。

順流細微弱為逆。門人問曰。妊娠有順逆、之板法。達生篇及婦人良方女科大成濟陰剛目等書皆互相沿習。今以誰氏為主。曰。

食忌藥忌當以誰氏為主。曰。

普明子所定為主。普明子云。

後凡忌食之物。切宜戒食。

食羊肝。令子多疾。

食雞子糯米。令子生寸白蟲。

食鯉魚令子成痃。

食犬肉令子無聲。

食兎肉令子缺唇。

食鴛肉令子頂禿。

食鴨子令子心寒。

食螃蟹多致橫生。

食雀肉令子多淫。

食豆醬令子發哮。

食野獸肉令子多怪疾。

一食生薑令子多生指
一食水雞鱔魚令子生癩
一食騾馬肉延月難生。
如此之類無不驗者所當深戒。
又云。娠孕藥忌歌。凡數十種。推之尙不止此。然藥中如班蝥水蛭蛇蜕蟅蝱蚣水銀信礜等藥。皆非恒用之品。姑置不論。茲特選其易犯者約纂數語。俾醫者舉筆存神。免致差誤。其他怪異峻險之品。在有孕時自應避忌不也。

即槐實

蘭 凌茹切 音閭又本草一名蘼蕪

歌曰烏頭阿子與天雄牛黃巴豆并桃仁芒硝大黃牡州薏苡仁乳漆蘭茹瞿麥穗半夏南星遍草同乳薑大蒜蒲黃茅蒐根槐角紅花與皂角三稜莪朮桂牛膝黎蘆蜈蚣常山廣茵天雄烏頭阿子與天雄牛黃巴豆并桃仁芒硝大黃牡州薏苡仁乳漆蘭茹瞿麥穗半夏南星遍草同乳薑大蒜蒲黃茅蒐根槐角紅花與皂角三稜莪朮桂牛膝黎蘆蜈蚣常山廣茵莫聞。此係婦人胎前忌。常山廣茵莫聞。此係婦人胎前忌。忌犯此物。

本草言女傷胎 神農本草載 本草言女傷胎 本草言女傷胎 本草言女傷胎

犯也。胎也。亦無須者。
胎氣。然大積大聚。病勢堅強。乃可攻矣。用藥者無損乎產母。亦無損乎胎氣。
此。不宜過劑。則病當之。
大法耶。
護。及救治之法。何如。曰。達生篇一書。
珠。不必再贅。凡男人遇本婦懷孕。宜
門人問曰。臨產將
發揮詳盡。一字一
乾此書。日夜
而止。有故者謂有病。無殞者無損乎
也。蓋有病有病則病當之。
可不攻。攻則藥之。
故藥無損乎
胎氣。

又於達生篇所未及者補之凡驗產法腰痛腹未產腹痛腰不痛者未產必腹腰齊痛甚緊時產也。如或遲滯以藥投之則得矣。自然之妙不用人力之造作。但順其性之自然而已。

次男元犀拜。

前宜服保生無憂散二三劑撙開道路則易生此方新產之婦其藏氣堅固胞胎緊實宜於漿水未行時服之若漿水既行遲滯不產勢倦神疲宜十全大補湯以助其力。且恐漿水太過。血傷而胎不靈活。急宜當歸補血湯或加肉桂或加附子。隨

宜。門人傳有加味歸芎湯。張石頑立誠之。謂每見服此惡開者。前不閉者。十全大補湯倍參。桂補而益氣湯加酒芍一錢。狂妄過正。即如加味歸芎湯。張石頑之論。亦未免矯而舉之。其實艱於催生有所傳試驗之。先重不大則可。至于前人所傳。

其血血海。滯反成不救。惟大劑人參。桂補兩飲之。功立效。陰門不閉者。十全大補湯倍參。桂補而益氣湯加酒芍一錢。狂妄過正。即如加味歸芎湯。張石頑之論。亦未免矯而舉之。其實艱於催生有所傳試驗之。先重不大則可。至于前人所傳。

人傳有加味歸芎湯。張石頑立誠之。謂每見服此惡開者。前不閉者。十全大補湯倍參。桂補而益氣湯加酒芍一錢。狂妄過正。即如加味歸芎湯。張石頑之論。亦未免矯而舉之。其實艱於催生有所傳試驗之。先重不大則可。至于前人所傳。

門不閉。子宮不收。三者皆元氣不足。交骨不開。或陰血虛澁滯。反成不救。惟大劑人參。童便入芎歸劑中助功立效。陰門不閉者。十全大補湯倍參。桂補而益氣湯加酒芍一錢。狂妄過正。即如加味歸芎湯。張石頑之論。亦未免矯而舉之。其實艱於催生有所傳試驗之。先重不大則可。至于前人所傳。

宜。此高鼓峯之心法。余屢用屢效。或交骨不開。或陰門不閉。子宮不收。三者皆元氣不足。交骨不開。或陰血虛澁滯。反成不救。惟大劑人參。童便入芎歸劑中助功立效。陰門不閉者。十全大補湯倍參。桂補而益氣湯加酒芍一錢。狂妄過正。即如加味歸芎湯。張石頑之論。亦未免矯而舉之。其實艱於催生有所傳試驗之。先重不大則可。至于前人所傳。

華陀順生丹如神散胞衣不下有失笑散花蕊石散
業是道者不可不備。又難產象產婦右足小指尖艾
妊如小豆大三五壯立產不可不頭講其法。
金匱方八首
時方九首
桂枝湯合胎前第一方
金匱妊娠胎前第一
桂枝湯。治惟有桂枝湯調和陰陽而已矣。
尤在涇云脉無故而身有痛。無寒熱邪氣則無
可施治。
徐忠可云桂枝湯外症得之爲解肌和榮。內症得之

爲化氣調陰陽也。今妊娠初得。有凝痰。上溢以桂甘薑棗扶上焦之陽氣充。能禦相侵之陰氣。而和其胃氣。病正所以治也。否則以渴爲熱。那以解之。以不能食爲胖。以不健而燥之。豈不謬哉。

橘枝茯苓丸

治婦人宿有癥病。成胎後三月而得漏下。又三月應朝而下。而無前後參差。且動在臍上。不在臍下。可以

小法

桂枝　去皮　茯苓　各等分

桃仁　去皮尖　芍藥

右五味末之煉蜜丸如兎屎大每日食前服九丸

差加至三丸

歌曰妨下癥瘕痼未除恐害胎胎動於臍下爲欲落動於臍上是每月凑集之血因癥痼之氣胎安癥去悟新裁桂苓丹芍桃同等氣血

下痛也

陰陽本未該
次孫心蘭稟接
論

一血合之桃仁桂枝芍藥一陽
方見傷寒逐痛而不傷新為丸緩服所以為佳

附子湯 一陰茯苓丹皮一氣
膠艾湯

金匱云婦人有漏下者有半產後因續下血不絕者有妊娠下血假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

乾地黃六兩

川芎

阿膠

甘草 各二兩　艾葉 當歸各三兩

芍藥 四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消酒三合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

歌曰妊娠腹痛阻胎名曰胞以胞中之氣血而阻其化育也

蓴草與膠歸艾各三兩去梗芎藭四兩地黃六兩去枝梢

炊男元犀按芎藭歸地補血之藥也然血不自生生於陽明之水穀故以甘草補之阿膠滋血海爲胎產百病之要藥艾葉煖子宮爲調經安胎之專品合之

爲厥陰少陰陽明及衝任兼治之神劑也
草阿膠艾葉名爲四物湯則板實而不靈矣
本論中所解互異學者當於所以異處而悟其所以
同則知聖方如神龍變化不可方物也

當歸芍藥 各三兩
川芎 白朮 各四兩
芍藥一斤
澤瀉半斤

當歸芍藥散
茯苓
右六味杵爲散取方寸七酒和日三服
歐曰妊娠疝痛不若寒疝之殺痛三兩芍歸澤

且宣者藥一劑澤瀉半兩四兩妙盤旋
者土燥不生物故用歸芎芍藥補血也土燥不生物故用歸芎芍藥補血也
次男元犀拔懶妊腹痛多屬虛血而血生於水
以苓朮澤瀉滲之燥濕得宜則中氣治而血自
生其痛自止
當歸貝母苦參丸
當歸 貝母 苦參 各四兩
右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸
日飲食如常小水難妊娠欝熱液內竭苦參

歸貝飲服三丸至十丸男子加沼
次男元肩披苦參當歸補心血而清心火○
鬱而瀉脯火○然心火不降則小便短澁○肺
勝光則水道不通此方爲下痛上取之法也○況貝母
主淋瀝邪氣○神農本草有明文哉○

當歸散

當歸　黃芩
川芎　各一斤
右五味杵爲散酒服方寸七日再服妊娠常服自易

中醫藥大學 1960 SHANGHAI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

產胎無疾若產後百病悉主之
歌曰萬物原來自土生妊娠常服一劑芎
窮不一劑乃歸滋血血爲氣之主分兩如
生生不息以生血藥而入脾土則土得滋
木木又有血之溫化則氣利則血不滯所
白朮散
白朮 川芎 羌活 甘草 各等分
右四味杵爲散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛

加芍藥心下毒痛倍加芍藥嘔心下毒痛不能飲食加吐痛不能
細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之勿
之若嘔止以醋漿水服之復不解者小麥十服之已後
渴者大麥粥服之此病雖愈服之勿
歌曰胎由土載虫之功血養相資妙有蘄血以養之陰
日胎氣上凌椒攝不忌陰氣上逆蜀椒具純陽之性陽
蠕潛龍性得眞詮以牡蠣水氣所結以牡蠣熱燎原本
分兩
此方舊本三物各三分牡蠣闕之徐靈胎云原本無

新定

加減歌曰苦痛芍藥加最美心下毒痛倚芎是叫痛不食嘔藥可止不解者以小麥煮汁嘗之又煩加夏廿枚一細使醋漿水須服後呑若還不既食愈常服勿輕拋壺中陰陽大變理程雲來云以大麥粥能調中補脾故服之勿置非指上藥可常服也此解亦超

方義已詳歌中不再釋

所以載丸

治胎氣不安不長婦人半產或

三月或五月

YUN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1966

後者。白朮一斤去皮。盧甘草半斤。炙香。勿犯鐵。細末。每服八兩。煎湯送下。

本草白朮爲補土之正藥。土爲萬物之母。而藏萬物。故

NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE 1960

得土氣之全而暗長寿生臧桑精之氣而生根不入土氣之全而暗長寿生臧桑精之氣而生根不入

母腹一者出於枝上居然胎孕而敷榮一者伏於土中儼若君子君子

化之神功故能資養氣血於無形之處而收效倍於天地造他藥也杜仲補先天之水火而其多絲尤能繫維而養以成不陸人參具三才之位首而其多液尤能潤

功○臨症頗熟悟出蓋自唐宋以後著女科書之前輩不

下數百人未聞有一人道及於此今特為補論大為

神驗保生無憂散　治婦人臨產先服一二劑自然易生或遇橫生倒產甚快事　聞

至連日不生速服一二劑應手取效未救孕婦產難之速災常保母子安全之吉

當歸酒炒一錢　川貝母一錢　黃芪蜜炙厚朴炒一錢　川芎三分　甘草五分

兎絲子一錢　甜烏藥各七分　艾葉各八分　薤白酒洗炒二錢　川芎三分　羌活五分　白芍酒洗炒二錢　分冬月用一錢

敲六牙

水煎至六分空腹温服

普明子曰。此方妙在用芎歸二鐘薑三片煎至六分空腹温服。人皆不得其解。是故疑信相半。余因斟酌而製方之。

方流傳海內用者無不饗應。而胎氣完固腹皮緊張。氣血裏急。胎動難轉動此用撑法焉。當歸川芎皆治血活血也。但厚朴去濕。血脈俾惡露不致填塞。差活辛荑芥。

者也用之撑太陽經。而後一撑太陽治而諸。

一撑伸胎氣飲抑而。

脈最長太陽經。

無經跡可尋。

胞胎靈動。

川貝兎絲

最能運胎順產將胎氣至體一撐大具天然活發之趣矣。

也。生加黃芪者。所以撐扶元氣。元氣旺則轉動有力。而安胃氣。甘草協和諸藥。俾其左宜右有。而全其撐法之妙。則亦惘惘然矣。予衛猶言之。學者。而不知變方之妙。則今人不知所用之。

華陀順生丹

硃砂一兩人

研末 五錢 細

明乳香 一兩 去噎 灰乾

催生

右爲末端午日猪心血爲丸如
常制法治胎逆産横生其功甚大
百草霜不見火白蔴末各等分爲
末每服三錢。酒調下。
右以少許熱服書符
加味芎歸湯

但順生大能固血又免血粘爲妙

酒煎少許入童便少許熱服書符
右以童便米醋和如膏塗兒黑則止。

加味芎歸湯送下三十丸用

當歸 一錢 川芎 各二錢

當歸補血湯 治婦人頭髮枯燥自敗龜板酥炙 五錢 水煎服約人行五里許即牛設是死胎亦下必過一斤調之此。

當歸 一兩

長務心典稟投胎猶舟也血猶水也水旋則舟行血
乾則胎滯其彰朗較著也若源少而
不資流多而於當歸藉氣藥以生其血氣行迅速而血即
胎遂得血而順下矣然猶恐十全不珍之功緩而不及唯此湯黃芪
守而不走以助藥力勿疑附子之過於辛熱而少用
也高敬堂謂一切
桂二三錢堪云神
驗

失笑散

治兒枕痛神效

蒲黃 血脹胞。並治

共爲末醋糊丸。

如桐子大每服二三錢。淡醋湯

花蕊石散

治產後敗血不下。脹急不省人事但心頭溫者。急用一服灌下。

治兒枕痛神效

五靈脂去土炒

各等分

花蕊石一斤一

即甦效驗如神。醫家不可缺此

上爲末和勻。先用紙泥封固瓦罐入藥仍用

紙泥封口臘乾用炭煅二灶香次日取出研細每服一錢童便相熱酒調下甚者用三三錢。

牛膝散

治胎衣不下。腹中脹急。以此藥腐化而下。緩則不救。

牛膝 川芎 蒲黃炒 當歸 各二兩

用皮桂心四兩

共爲末每服五錢。水煎服

又婦人服藥勿犯三大忌一百日內麥麪一百牛膝二百木耳又頭蠶子亦然。

余於胎前諸證屬其勿犯業醫者當

加所戒矣

女科要旨卷二終

1960
YUNNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE