

小葉ハ廣倒心臟形ニシテ葉柄ト共ニ毛茸ヲ帶ブ。花莖ノ中央ヨリ上ニ二個ノ小苞ヲ有シ。上端ニ一個ノ花ヲ開ク。花瓣ハ倒卵形。白色又ハ淡紅ヲ帶ビテ更ニ淡紅色ノ線條ヲ具フ。蒴ハ圓柱狀卵形也。◎植エテ觀賞ニ供ス。

(453) *Oxalis corniculata*, L.

かたばみ。スイモグサ。カバミグサ。

酢漿草。

麓。大宮。栗倉。北山ノ高田。篠坂。

◎莖葉共ニ酢味アリ。鹽ニテ扱メバ生ニテ食フベク又煮テモ漬ケテモ食フベシ。中古鏡ヲ磨クニ此物ヲ用ヒシニヨリカバみぐさノ稱ヲ得タリ。

Geraniaceae. 牻牛兒科

(454) *Geranium eriostemma*, Fisch.

ぐんないふうろ。

喬。草。麓。大從ノ上。大宮口一合ノ上下。同ニ三合。鈴ヶ原。吉田口五合ノ上。

花ハ紫藍色。托葉ハ卵形。下部ノ葉ハ五七裂シ其他ハ通常三裂シ。裂片稍菱形ニシテ銳頭ナリ。有毛ノ多年草ナリ。甲州郡内ニ多キヨリ其名ヲ得タリ。◎觀賞用。

(455) *Geranium nepelense*, Sweet.

げんのしやうこ。フウロサウ。ウメヅル。

ネコアシサウ。牻牛兒苗。

麓。大宮。村山。札打。北山。上井出。白絲瀧。御殿場。鈴ヶ原。カケスバタ。

◎莖葉ヲ乾シテ藥用ニ供ス。最病病ニ効アリ。

(456) *Geranium japonicum*, F. et S.

たちふうろ。

麓。大宮。大岩。栗倉。篠坂。長坂ノ上。山中村。カケスバタ。

莖ハ直立シテ高二尺餘ニ及ビ。枝ヲ開出ス。前者ノ如クニ根ヲ處々ヨリ發スルコトナシ。莖ハ基脚葉ヲ具セザル部長シ。葉面伏毛ヲ以テ澁粗ノ感ヲ有シ下面脉上ニ毛アリ。上部ノ葉ハ小クシテ多クハ三裂スルモ下部ノモノハ長柄ヲ具ヘ且ツ深ク五七裂シ裂片又缺刻アリ。花瓣ハ倒卵形白質ニシテ紫條アリ。花瓣ハ萼片ヨリ長キコト一倍半アリ。◎植エテ觀賞ニ供ス。

(457) *Geranium tripartitum*, Kunth.

こふうろ。

麓。喬。細紺野。八幡堂。大宮新道一二合。

莖ハ纖細。成長スレバ稍偃臥シ。屢々根ヲ發ス。毛アリ。葉ハ三裂シ裂片深ク缺刻シテ銳頭齒牙ヲナス。花ハ小形白色ニシテ瓣片ハ萼片ト殆ド等長ナリ。

Leguminosae. 荳科

(458) *Aeschynomene indica*, L.

くさねむ。合蒴。

麓。大宮。宮原。

莖ハ中空。葉ハ頗れむノ葉ニ似タリ。花ハ小形。黄色ニシテ後長一寸餘幅三分許ノ扁クシテ汽腔多キ莢ヲ成シ熟シテ黒褐トナリ。豆ノアルトコロ膨レテ横ニ切レ易シ。

◎盆養シテ觀賞ニ供スルコトアリ。山扁豆ト共ニ茶トナシテ飲用ニ供ス。

(460) *Albizia Julibrissin*, Durraz.

ねむのき。カウカノキ(古名) ネブタ。

合歡

麓。栗倉。中畑。トガミ。大宮新道一合ノ下。

◎邊材ハ白色。心材ハ帶紫赭黑色ニシテ光澤アリ。木理桐

ニ似テ飽削面甚ダ平滑ナリ。薪炭ニ供スルノ外、桐丸火鉢、屋根板、馬ノ鞍、斧ノ柄、車輪材等トナシ又下駄トナス。此材ヲ黒焼トシテ飯ニテ煉リテ屨麻質斯ニ塗レバ効アリト云フ。又葉ノ汁ヲ以テ衣ヲ洗ヘバ最モヨク垢ヲ去ル。又抹香トモナス。樹ハ栽エテ庭前ニ觀賞シ或ハ乾燥セル瘠地ノ保安林トナス。

(461) *Astragalus adsurgens*, Pall.

むらさきもめんづる、ワウギ(富士)

灌草、大宮一合ヨリ五合マテ、吉田口五六合、須走口1100m.ヨリ二三合マテ。

高二三尺ノ多年草。葉ハ奇數羽狀ニシテ小葉ハ長橢圓形ナナス。花ハ盛夏ニ至リ紫色ニ開キ梢頭ニ總狀花序ニ集ル。根ハ肥大、ヤ、紫色ヲ帶ブ。

◎栽エテ觀賞ニ供シ、マタ根ヲ藥用トス。

(462) *Astragalus membranaceus*, Fisch. var. *obtusius*, Mak.

たいつりねうぎ、ボウコウワウギ。

草灌、大宮口一合二合。

高一二尺ノ宿根草ニシテ多枝ナリ。葉ハ六七對ノ小葉ヨリ成ル奇數羽狀複葉ニシテ微毛アリ。小葉ハ小判形ニシテ頂端ハ微ニ鈍凹ナナス。花ハ帶黃白色。七八月頂枝頭ニ總狀ヲナシテ開ク。苞ハ永存ス。莢ハ短扁ニシテ尖頭ヤ、鈎曲ス。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(463) *Astragalus sinicus*, L.

げんげ、レンゲサウ、紫雲英。

麓、大宮。

◎觀賞ニ供シ或ハ牧草、肥料トナス。

(464) *Astragalus reflexistipulus*, Miq.

もめんづる、木黄莖。

草、須走口20.0m. 吉田口六七合。

莖ハ地ニ臥シテ蔓狀ヲ呈ス。葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ無柄、小橢圓形又ハ長卵形ヲ呈シ、拾壹個以上アルヲ常トス。花ハ淡黃綠色、夏月葉腋ニ短キ穗狀ノ總狀花序ヲナシテ綴リ後莢ヲ結ブ。根ハ多肉也。

◎根ヲ藥用トス。

(465) *Cassia mimosoides*, L.

かはらけつめい、コウボウチヤ、ネムチヤ、ハマチヤ(富士) 山藟豆。

麓、大宮口。

一見くされむノ如クナルモ莖ヤ、剛ク而シテ中空ナラズ莢ハ彼ノ如ク長大ナラズシテ熟スルモ粗々膨起シテ斜メニ折ル、コト彼ノくされむノ如クナラズ。

◎畑ニ栽エテ茶ノ代用トナス。藥用トシテハ水腫、脹滿ニ効アリト云フ。

(466) *Caesalpinia sepioides*, Roxb.

じやけついばら、カハラフヂ、ガンゼキイバラ、サルトリイバラ(同名アリ)

雲實。

麓、大岩、賽河原。

◎有毒ナリ。花ヲ食ヘバ人ヲシテ狂奔セシム。藥用トシテハ泄痢ヲ止メ瘡疾ヲ治シ又止痛殺蟲ノ効アリ。種子ヲ念珠トス。此樹ノ莖中ニ棲メル蠶蟲ヲ浴間炒リテ小兒ノ蟲藥トナス。

(467) *Cladrastis amurensis*, B. et H. var.

いぬゑんじゆ、クロエンジユ。

オホエンジユ、榎槐。

麓、大宮、須走口1200m. 瀧ヶ原、鈴ヶ原。

◎邊材ハ狭クシテ帶黃白色ナレドモ心材ハ帶紫暗黑色ヲ呈

シ材質堅硬ニシテ弾力強ク、折レ難シ。光澤アルヲ以テ指物、床板、床柱、斧柄、三味線、鼓ノ胴、鏡臺、茶棚等ヲ作ル。殊ニ手斧及ビ改良織ノ如キ農具ニ賞用ス。北海道ニテハ鐵道ノ枕木トナス。樹皮ハ染料トナリ或ハ胃藥打撲ノ藥トナル。樹ハ栽エテ庭中ニ觀賞シ或ハ行道樹トナス。

- (468)
- Cladrastis platycarpa*
- , Mak.

ふぢき、ヤマエンジユ、シロエンジユ。

麓、栗倉、村山。

葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ藤ノ葉ニ似ル故ニ名アリ。小葉ノ數ハ通常拾壹。芽ニ褐色ノ毛アリ。花ハ淡黄色。莢ハ十月下旬成熟シテ一寸許トナル。此種ハ葉ノ基部ニ全ク芽ヲ包容ス。

◎邊材ハ廣クシテ淡黄色。心材ハ帶褐黄色ニシテのぶの木ニ似ル。材質いぬゑんじゆニ類シテ堅硬、ヤ、疎ニシテ鉋削シ難シ。天秤棒ヲツクリ又鐵道ノ枕木、鐵作用、建築用、洋傘ノ柄、薪炭材トナス。樹皮モ亦器物ヲ作り或ハ繩ヲ製ス。

- (469)
- Crotalaria sessiliflora*
- , L. forma
- eriantha*
- , Mak.

たぬきまめ、野百合。

麓、大宮新田、賽河原、宮原、中原

◎觀賞用。

- (470)
- Desmodium laburnifolium*
- , De.

うじくさ、ミソクサ、ミソナホシ。

麓、北山、中畑、大口宮。

◎葉ニ毒アリ。以テ味噌ノ蟲ヲ殺スニ用フ。

- (471)
- Desmodium*
- ,
- Oldhami*
- , Oliv.

ふぢかんざう。

麓、村山、富士根村、御殿場、中畑。

花ハぬすびとはぎヨリ微大。色モ亦美ニシテ淡紅色ナリ而シテぬすびとはぎノ如クニ多ク葉腋ヨリ花莖ヲ出スコトナク、草本亦長大ナリ。

- (472)
- Desmodium caudatum*
- , De. var.
- japonicum*
- , Nakai.

ぬすびとはぎ。

麓、大宮新田、須走口(須走口ヨリ1000m.マテ)

明ニ節ヲ有スル莢果ヲ結ビ熟スレバ節々切レテ人衣ニ襲キ、ヨク種子ヲ散布ス。

- (473)
- Desmodium podocarpum*
- , De. var.
- latifolium*
- , Max.

ひろはのぬすびとはぎ。

麓、大宮新田、須走口1000m.マテ。

- (474)
- Desmodium polycarpum*
- , De.

しばはぎ、クサハギ。

麓、大宮口、大宮新道一合及其下

地上ニ延布スルコトれはぎノ如シ。サレド莖ヤ、太ク葉モ亦微大ニシテ微卵形乃至長卵形トナス。莖、葉柄及ビ葉背ニ微小ノ白毛ヲ帶ブ。花ハはぎノ花ニ似テ頗微細長二分ヲ超エズ。紫色ヲ帶ビ一分許ノ小梗ニヨリテ二寸ノ總狀花序ヲツクル。果實ハ扁長ニシテ數個ノ結節ヲ有シ、長五六分アリ。

- (475)
- Dunbaria villosa*
- , Mak.

のあづき、ヒトクヅ。

麓、大岩。

◎子實ハ食用トナスニ足ル。

- (476)
- Dumasia truncata*
- , S. et Z.

きつねさゝげ、ノササゲ、カラスマメ。

山黒豆。

麓、村山、バツカケ、大宮新道一合。

莖細クシテ根線ノ如キ多年生ノ蔓草。葉ハつるまめニ似テ三個ノ小葉ヨリ成ルモ、ヤ、大ナリ。小葉ノ基部特ニ廣ク。葉質ハ薄シ。花ハ淡黄色ニシテ較大ク夏秋ノ際ニ開ク。莢ハ一寸餘ノ長ニ達シ淡紫色ヲ呈シ種子ハ黑色ニシテ丸シ。

(477) *Falcata japonica*, Komar.

やぶまめ。ギンマメ。

麓。宮原。天照教。篠坂。

莖細クシテ長ク。葉ハ薄クシテ微ニ毛茸ヲ存ス。花ハ淡紫色ニシテ秋月開キ。莢熟スレバ扁長ニシテ一寸許トナリ頗扁豆ノ形ニ類スルモ遙ニ小ナリ。種子ハ扁圓褐色ニシテ斑アリ。此種ヨク地下ニ結實ス。

◎種子ヲ焙リテ食用トス。愛乃人ハ其實ヲ掘リ洗ヒテ莢皮ヲ去リ煮テ之ヲ食フ。

(478) *Hedysarum esculentum*, Ledeb.

いはわうぎ。タテヤマワウギ。

灌。草。大宮一合ノ下及二合。吉田口六七合。須走口(10.0m.ヨリ登ルニ隨ヒテ多ク1950m.マデ)

莖高一尺許。葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ幅二三分。長四五分。八月頃淡黄色ノ花ヲ綴ル。翼瓣狭小ニシテ雄蕊ハ二体ナリ。花後扁平ナル長一寸餘ノ莢ヲ結ブ。莢ニテ其中ニ二三子ヲ藏ス。根ハ莖ニ比スレバ長大ニシテ二三尺長ニ達シ。柔ニシテ強韌ナリ。

◎根ハ微苦ニシテ甘味ヲ帶ブ。山民掘リ來リテ藥舗ニ鬻グ

(479) *Indigofera pseudotinctoria*, Matsum.

こまつなぎ。コマドメ。馬棘。

麓。大宮。バツカケ。一里松。篠坂。鈴ヶ原。

◎觀賞ニ供ス。吾邦ノ此種ハ印度ノ木藍種ニ似タレド別物ニシテ染料ニ適セズ。

(480) *Indigofera decora*, Lindl.

にはふち。イハフチ。胡荳。

麓。村山。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(481) *Lathyrus Davidii*, Hance

いたちさゝげ。エンドウサウ。苳芒決明。

麓。大淵。大宮。宮内。篠坂。大宮新道一合ノ下。

吾邦産れんりさう屬中ノ最大ナル品種。著シキ三角狀ノ托葉アリ。花ハ八九月頃開ク。其形くらゐノ花ニ似テ色ヤ、濃ク。花序ハ總狀ナレドモ拾數花ヨリ成リテくらゐノ如クニ多數ノ花ヨリ成ラズ。始メ黄色ナルモ後褐色ニ變ズ。果實ハ豌豆ノ莢ニ類シ細長クシテ一寸餘アリ。

(482) *Lathyrus pratensis*, L.

さばなのれんりさう。

麓。粟倉。村山。

◎小毒ヲ含ムト雖栽エテ觀賞ニ供ス。

(483) *Lespedeza bicolor*, Turcz. var. *intermedia*, Max.

やまはぎ。胡枝子。

麓。村山。中畑。水土野。萬濃。鈴ヶ原。篠坂。須走。

◎觀賞用。葉ヲ茶ノ代用トシ殊ニ嫩葉ヲ燥熟シテ救荒用ニ充ツ。農家ハ多ク刈リ採リ乾シ貯ヘテ牛馬ノ飼料トナス。マタ幹ヲ筆管トナスニ頗雅致アリ。仙臺及ビ遠州ノ名産ナリ。

(484) *Lespeza cyrtobotrya*, Miq.

まるばはぎ。ミヤマハギ。

麓。村山ノ上。細紺野。富岡村。鈴ヶ原。篠坂。

◎栽エテ觀賞ニ供シ。幹ヲ筆管。籬。藩木トナス。

- (485)
- Lespeza pilosa*
- , S. et Z.

ねこはぎ.

麓. 大宮. 富岡. 萬濃.

地ニ延キテ走ル細蔓状草本ニシテ葉ハ三小葉ヨリ成リ有毛ナリ。

- (486)
- Lespedeza juncea*
- , Pers. var.
- sericea*
- , Max.

めごはぎ. メドギ. 著. 鐵掃帚.

◎切りテ活花トス。薬用トシテハ目ヲ明ニシ瘡塊ヲ治ス。又莖ヲ採リテ^{ノドキ}籠トナス。

- (487)
- Lespedeza*
- ,
- Buergeri*
- , Miq.

きはぎ. ノハギ. ヤマハギ.

麓. 仁杉. 須走ノ上.

高一丈ニ餘リ普通ノはぎニ比スレバ著シク木質ニシテ時トシテハ直径二寸餘ノ幹ヲ成ス。葉縁ハ微ニ波状ヲ呈シ葉裏ニ毛アリ。花ハ小ク帯白色ニシテ紫斑ヲ存シ。夏月開花ス。◎觀賞用。籬垣用。筆管用。

- (488)
- Lespedeza stricta*
- , Hook. et Arn.

やはすさう. 鶏眼草.

麓. 大宮. 富岡. 須走口800m.ノ上下.

◎茶ノ代用。肥料及ビ牧草。マタ救荒ノ食ニ充ツ。

- (489)
- Lespedeza tomentosa*
- , Sieb.

いぬはぎ. シラハギ(同名アリ)

麓. 大宮. 北山. トガミ. 篠坂.
カケスバタ.

普通ノはぎニ比スレバ莖ヤ、勁直。葉ト共ニ密生毛アリ葉背殊ニ著シ。花ハ微小ニシテ白色。長キ花莖ノ上部ニ總狀ニツマル。◎往々栽エテ觀賞ス。

- (490)
- Lespedeza virgata*
- , De.

まきるはぎ.

麓. 大宮. バツカク. 大岩. 萬濃.

◎栽エテ觀賞ニ供ス。古來蒔繪ニ畫クトコロノはぎハ概此種ナリ。

- (491)
- Lotus corniculata*
- , L.

みやこぐさ. コガネバナ. キレンジ.

百脉根.

麓. 御殿場. 中畑道. 栗倉. 大岩.

◎栽エテ觀賞ニ供シ又牧草。肥料トス。

- (492)
- Milletia japonica*
- , A. Gr.

なつふぢ. ドヤウフヂ.

麓. 大宮新田.

蔓状ナシ夏月白花ヲ開キ。往々盆養セラル。

- (493)
- Phaseolus multiflorus*
- , Willd.

べにばないんげん.

麓. 大宮新道一合(培) 上吉田(培)

近來ノ舶來品。概形いんげんまめニ類シ緋紅色ノ花ヲ開ク。◎栽エテ觀賞ニ供シ又食用トナス。

- (494)
- Phaseolus*
- ,
- Mungo*
- , L. var.
- pedula*
- , F. et S.

つるあづき. コメアヅキ. カニノメ.

シヤボンマメ.

麓. 吉原 三倉. 大宮新道一合ノ上.

葉ハ倒卵形ニシテ尖リ。赤小豆ノ葉ト大ニ其趣ヲ異ニス莢ハ細クシテ長ク。子ノ形赤小豆ヨリ狭細ニシテ白目ノ長キヲ以テかにのめノ稱アリ。

◎果實ヲ食用トシ又花穂アル枝ヲトリニ瓶花トナス。

- (495)
- Pueraria, Thunbergiana*
- , Benth.

くず. マクス. 葛.

麓. 粟倉. 村山. 篠坂. 大宮新道一合ノ下.

◎澱粉ヲトリ纖維ヲトリ藥用トシ又觀賞ニ供ス。藥用トシテハ渴ヲ止メ泄瀉服治シ酒毒ヲ解ス。又葛ヲ赤小豆ト併セ乾シテ末トナシ酒ニテナスレバ酒ヲ飲ミテモ酔フコトナシト云ヘリ。

(496) *Rhynchosia volubilis*, Lour.

たんきりまめ. キンチャクマメ. 鹿藿.
麓. 富士根村.

◎藥用及ヒ食用トス。往時ハ去痰劑トナセリ。又ヨク婦人ノ腰痛. 痲痺ヲ治シ頭痛ヲ止ムト云ヘリ。又種子ヲ炒リテ茶ニ代フ。コノモノニ砂糖ヲ加フレバヨク咖啡ヲ欺ク

(497) *Rhynchosia volubilis*, Lour, var. *acuminata*, Max.

とぎりまめ. ペニカハ.
麓. 吉原. 鈴川. 大宮.

莖細長クシテ物ニ巻絡ス。葉ハやぶまめニ似テ三個ノ小葉ヨリ成リ。小葉ハ質薄クシテ先端細ク尖レリ。夏月葉腋ニ數個ノ小黄花ヲ開キ。後短潤ナル莢ヲ結ブ。熟シテ紅色. 頗美麗ナリ。ヨリテペニカハノ名アリ。中ニ貳個ノ黒キ種子ヲ藏ム。其葉先端レリヨリとぎりまめノ稱ヲ得タリ。◎果實ヲ食スルコトヲ得。

(498) *Sophora flavescens*, Ait.

くらら. クサエンジユ. キツネノサ、ゲ.
苦參.
麓. 鈴ヶ原.

◎有毒ナレドモ藥用等ニ供ス。秋末根ヲ掘リ貯ヘオキテ疥癬ノ如キ寄生物ヲ去リ熱毒ヲ去リ又癩疾ニ用フ。莖葉ノ煎汁ニテ農作物ノ害蟲ヲ驅除シ或ハ湯火傷ヲ治スルニ用フ。又民間ニテハ小兒ノ種藥ニモ用フ。莖ノ纖維ヲトリ

テ織物其他ニ使用ス。

(499) *Vicia amoena*, Fisch, var. *lanata*, F. et S.

つるふちばかま.

麓. 大宮新田. 篠坂. 鈴ヶ原.

葉ハ五六對ノ小葉ヨリ成リ花ハ紅紫色ニシテ八月頃葉腋ニ總狀花序ヲ作リテ綴ル。

◎栽エテ觀賞ニ供シ又家畜ノ飼料及ビ田畑ノ肥料トナスベシ。

(500) *Vicia cracca*, L.

くさふち.

麓. 大宮新田. 村山ノ上. 北山. 鈴ヶ原. 籠坂峠.
御殿場ヨリ須走ニ至ル間. 大宮新道一合ノ下.

前種ニ酷似スレド葉ハ拾對許ノ小葉ヨリ成リ六七月頃青紫色ノ花ヲ密ナル總狀花序ヲシテ綴リ頗美麗ナリ。

◎栽エテ觀賞ニ供シ又家畜ノ飼料及ビ田畑ノ肥料トナス。

(501) *Vicia Pseudo-orobus*, Fisch. et Mey

おほばくさふち.

麓. 大宮ノ上. 北山.

葉ハくさふちヨリ大ク花モ亦大ナリ。花ハつるふちばかまヨリ小ナリ。

(502) *Vicia sativa*, L.

やはすゑんごう. ノエンドウ.

麓. 大宮口. 須走口.

◎肥料及ビ牧草ニ適ス。救荒時ニハ葉及ビ種子ヲ食用トナス。

(503) *Vicia unijuga*, Al, Br.

なんてんばぎ. タニワタシ. フタバハギ.
歪頭菜.

麓 大宮新田・大岩・栗倉・北山・
山中村・大宮新道一合ノ下。

◎嫩葉ヲ摘ミ來リテ浸物トナスニ香味アリテ甚ダ口ニ佳ナリ。

(504) *Vicia nipponica*, Matsum.

よつばはぎ。

麓 北山。

莖ハ延ビテなんてんはぎニ類シ稍蔓状ヲ呈ス。葉ハ偶數羽狀複葉ニシテ其小葉ハ四個或ハ六個ヲ算シ基脚ニ三四ノ尖起アル托葉二個ヲ具フ。

(505) *Vicia venosa*, Max, var. *cuspidata*, Max.

えびらふち。

麓 北山。

葉ハ偶數羽狀複葉ニシテにはふちノ如クニ頭末ニ葉ナク頂端ニ細小ノ一刺ヲ見ルノミ。◎觀賞ニ供ス。

(506) *Milletia floribunda*, Matsum.

ふち。ムラサキフヂ。紫藤。

麓 大宮。

◎觀賞ニ供シ食用トシ纖維ヲトリ材ヲ用フル等効用尠カラズ。即チ蔓ヲ編ミテ橋ヲツクリ絶崖ニ渡セルナド木曾山中等ニテ見ル所ナリ。蔓ソノ儘物ヲ束ヌルニ繩ノ代用トナリ或ハ樹皮ヨリ纖維ヲトリテ編物。織物等トナス。春月發芽セザル際此蔓ヲ採リテ皮ヲ剥キ釜ニ入レ木灰ヲ加ヘテ煎シ取り出シテ再ビ其外皮ヲ去リテ晒乾シ以テ藤布。索繩。草履ノ裏面等ニ用ル。穀篩。土瓶敷箕ヲ編ム木曾ノ山民ハ此皮ニテ布ヲ織リタルモノヲたこののト稱シ遠州ニテハふちだこト呼ブ。

又直徑三四寸ニモ及ベル莖ハ之ヲ切斷シテ土瓶敷等ヲツクル。木曾。日光。伊勢菰野等ノ名産ナリ。

葉ヲ以テ茶ヲ製ス。藤茶ト云フ。飯ニ交ヘテ藤飯ナツクル實ヲ炙リテ食ヘバ味栗ノ如シ。花モ亦煤ヲ絞リ酢味噌ニテアシラヒ食フ。支那ニテコレヲ藤花菜ト稱ス。實ヲ炒リテ酒ニ入ルレバ酒散レズ。敗酒ニ入ルレバ其味ヲ復スト云フ位ナリ。又藤ノ枯レムトスルニハ酒ヲソ、メバ活ク。花瓶ニ紫藤ヲ挿スニ酒ヲ加フレバ久シク萎レズ。酒毒ヲ解スルニ生ニテモ陰干ニシタルモノニテモ服スレバヨシ。酒。醋ノ衣服ニツキテ黴ビタルトキニ紫藤花ヲ用ヒテ摩スレバ落ツルト云ヘリ。

Rosaceae. 薔薇科

(507) *Agrimonia*, *Empatoria*, L. var. *pilos*, Mak.

きんみづひき。シシヤキグサ(同名アリ)
龍牙草。

麓 大宮。細紺野。大宮新道。

◎葉莖及ビ根ヲ收飲藥トス。古人ハ葉ハ金瘡ヲ治シ根ハ腹痛ヲ治スト云ヘリ。

(508) *Aruncus silvester*, Kostel, var. *Americana*, Michx.

やまぶきしやうま。

灌 麓 栗倉。大宮口一合。大宮新道一合。

雌雄異株ノ宿根草。葉ハ複葉ナレドモ小葉ハやまぶキノ葉ニ似タリ。虎耳草科ノこりあじしやうま等ト混シ易シト雖。其子房ノ數ニ注意スレバとりあじしやうま類ニハ子房必ズ二個ヲ有スルノ異アリ。

(509) *Cydonia japonica*, Pers. var. *pygmaea*, Max.

くさぼけ。シドミ。

麓 大宮。須走。山中村。大宮新道一合ノ下。

◎觀賞用トシテ栽培ス。又果實ハ酸味強クシテ生食スルニ

佳ナラズト雖。其搾汁ヲ酢ニ代用シ或ハコレニテ酒ヲ醸
スト云フ。又藥用トシテハ痢ヲ止メ惡心ヲ治シ葉ハ陰乾
トナシ煎ジテ水腫ニ用フト云フ。

- (510) *Duchesnea indica*, Fock.

へびいちご。クチナハイチゴ。蛇莓。

麓。上井出。大岩。二俣。

- (511) *Filipendula*, Kamtchatica, Max. var. *pilosa*, Koidz.

なつゆきさう。

麓。吉田馬返間。

宿根草ニシテ觀賞ニ供スベシ。

- (512) *Fragaria*, Hayatai, Mak.

しろばなへびいちご。

麓。喬。灌。草。札打ノ上。天照教。吉用口四合ヨリ
七合半間。須走口一合ノ上下。八幡
堂ト大從トノ間。

莖細ク長ク六七寸乃至一尺許ニ達ス。諸高山ニ普通ナリ
葉ハ三個ノ小葉ヨリ成リ葉背柄共ニ筆シ雖キ纖細ノ軟毛
アリ。和蘭莓ニ似タレド更ニ纖細ナリ。根際ヨリ絲蔓ヲ
出シテ處々ニ葉ヲ起シ且ツ根ヲ下ニ以テ苗ヲ分ツ。夏月
葉間ヨリ細莖ヲ抽キテ花アリ。花ハ五瓣白色ニシテ大サ
六七分。莢ノ様ノ苞ヲ具フ。果實ハ肉質ノ花托ヲ有シ。熟
スレバ紅色ヲ呈ス。和蘭莓ヨリ小ナリ。

◎果實ハ甘味ニ微酸ヲ帯ビ生食スルニ適ス。

- (513) *Genm japonicum*, Thunb.

だいこんさう。水楊梅。

麓。大宮。北山。中畑。細甜野。
大宮新道一合及其下。

◎根ハ收斂解熱ノ効アリ。古人傳ヘテ人ヲシテ子アラシム
ト云ヘリ。蓋シ強壯劑ナリ。

- (514) *Kerria japonica*, De.

やまぶき。棣棠花。

麓。大宮。村山。

◎觀賞用トシテ庭園ニ栽培ス。花ノ陰乾ニナルモノハ止血
ノ効アリト云フ。

- (515) *Micromeles japonica*, Koehne

うらじろのき。ゴロベツキ(下野)

ヤマナシ(大和)

喬。須走口1500m。吉田口。

◎邊材帶紫白色ニシテ紫黒ノ線アリ。心材ハ帶紅深赭黑色
ニシテ赤黒ノ細斑點アリ。材質おほすみニ似テ稍軟ク。
盆類。斧柄。櫛。机。箱等ヲツクル。果實ハ救荒時ノ食
ニ充ツベシ。

- (516) *Micromeles alnifolia*, Koehne.

はかりのめ。アヅキナシ。カタスギ。

喬。灌。大宮口1300m.—1400m。同ニ三四合。
須走口。

ヤ、前種ニ似タリ。樹皮ハ褐色ニ緑ヲ帯ビ。枝條ハ細ク
伸暢シ。赤褐色ノ地色ニ白色ノ皮目ヲ有シ宛然櫛衡ノ目
盛ノ如シ。故ニ其名アリ。

◎邊材帶黃淡褐色。心材帶赤褐色。前種ヨリ少シ軟質ナリ
洋家具。陳列棚。靴型其他ノ鐵作用ニ使フ。樹皮ハ染料
トナル。果實ハ酸甘ニシテ生食スルコトヲ得。

- (517) *Photinia villosa*, Dc.

かまつか。ウシコロシ。ナタハジキ。

喬。麓。入幡堂ノ上。大宮。村山。
大宮新道一合。

◎材ハ白質ニ淡紅ヲ帯ビ堅韌ニシテ折レ難シ。鍛工。石工
ノ器具及ビ杖ヲ作り又皮ヲ去リ曲ゲテ牛ノ鼻木トナシ或
ハ鎌ノ柄ニ賞用ス。ヨリテかまつか一名うしろしの稱
アリ。椎茸ノ母樹トモナス。紅熟セル果實ハ甘味アリテ

生食スルニ足ル。

(518) *Pirus, Toringo, Sieb.*

すみ. ヤツモモ. ヒメカイドウ,

ヤブリンゴ. ミツバカイドウ.

麓. 須走口(82)m. 850m. 1170m. 1190m.等)

◎果實ハ味甘酸。霜ニ達ヒテ殊ニ佳ナリ。山麓ノ民或ハ之ヲ生食シ或ハ秋月黄熟セルモノヲトリテ鹽漬トナシオキ砂糖ヲツケテ食フ。風引キテ熱アル時ナドニ最妙ナリ。樹皮ヲ黄色ノ染料トシ樹ヲ盆養シテ花ヲ賞シ或ハ栽メテ林檎ノ臺木トナス。

(519) *Potentilla, Kleiniana, Wight, et Arn.*

をへびいちご. 蛇含.

麓. 北山村.

(520) *Potentilla chinensis, Ser.*

かはらさいご. 委陸菜.

麓. 粟倉. 村山. 仁杉. 大岩.

諸國ノ原野河原等ニ普通ニシテ多少地上ニ伏臥ス。葉ハ羽狀複葉ニシテ小葉モ亦長形ニテ羽狀ニ缺刻ヲ有シ裏面ニ白毛アリ。花ハつちぐり。をへびいちご等ト相似タリ

◎古來解熱及ビ通經劑トナス。

(521) *Potentilla discolor, Bunge.*

つちぐり. ブクレウサウ. 翻白草.

麓. 大宮口. 須走ノ上.

花ハ黄色ニシテ五六月頃ニ開ク。根ハ塊狀ニ肥大シ一箇ニ數個アリ。赤皮白肉ニシテ兩頭尖レリ。一種大葉つちぐりト云フモノアレドモ是レ全ク本種ノ秋形ニ外ナラズト云フ。

◎根ヲトリ生食スレバ味栗ノ如シ。古來マタ吐血. 下血等

ニ藥用セリ。

(522) *Potentilla cryptotaenia, Max.*

みつもと. ラフダ. ミツモトサウ. 狼牙.

麓. 喬. 八幡堂ノ上下. 大宮口ニ合. 鈴ヶ原.

有毛ノ多年生草本ニシテ二尺許ノ高ニ達ス。葉ハ三小葉ハ長帶ニツキ。柄本披針狀ノ二托葉アリ。又其側ニ一ニ小葉ヲツクルコトアリ。根ハ尖リテ獸牙ニ類ス。故ニ狼牙ノ稱アリ。嫩根ハ白ク舊根ハ黒シ。

◎有毒ナリ。

(523) *Prunus donarium, Sieb, subsp, elegans, Koidz, var.*

やまざくら.

麓. 鈴ヶ原.

◎材精緻ニシテ狂ヒ少シ。器具機械彫刻等ニ使用ス。栽エテ觀賞ス。

(524) *Prunus incisa, Thunb.*

まめざくら. フジザクラ. ミヅザクラ.

ラヤマザクラ.

麓. 喬. 粟倉. 八幡堂. 細紺野. 大宮新道一合及其下須走口馬返. 狩休. 須走ノ上.

葉ハ長一ニ寸許。廣楕圓形ニシテ先端尖リ。重鋸齒縁ニシテ且ツ毛アリ。五月頃葉ニ先チテ開花ス。瓣爪ハ白ク或ハ微紅ヲ帯ビテ開出ス。苞ハ宿存シ萼筒ハ圓筒形ニシテ縁邊ノ長サニ二倍スレドモ丁字櫻ノ如クニ長カラズ。花柱ト若キ枝ニ花ヲ有スルコトナシ。

◎材ヲ種々ノ用ニ供シ。果實ヲ生食シ。樹ヲ好ミテ盆養シ以テ觀賞ス。

(525) *Prunus nipponica, Matsum.*

みねざくら.

麓. 吉田口五合目附近.

日光其他吾邦中央部及ビ北部ノ諸高山ニモ在リ。まめざくらニ似タレド。葉ヤ、大ニシテ葉柄短ク。托葉モ亦稍小キト花梗ノ長クシテ苞ノ狭小ナルコトト。花瓣モ稍細キトニヨリテ異レリ。

(526) *Prunus, Pessica*, Stokes.

もゝ。桃。

麓。

◎花ヲ賞シ果實ヲ食トシ果。花。葉ヲ藥用トス。

(527) *Prunus, Itorakura*, Sieb.

ひがんざくら。シダレヒガン。

麓。大宮。権現モヤ。

葉ヤ、細長クシテ尖リ花形亦細瓣ニシテ多クハ淡紅色。葉ハ花ニ後レテ生ジ。花柱。葉柄及ビ若キ枝ニモ毛ヲ帶ブ。樹皮ハ普通ノ山櫻ノ如クニ横ニ輪狀ナシテ剝離スルコトナクシテ縦ニ裂目ヲ生ズルノ異アリ。花期モ亦早シ。◎材ヲ種々ノ用ニ供シ。樹ヲ栽エテ觀賞ス。

(528) *Rosa acicularis*, Lindl. var. *nipponensis*, Koehne.

たかねいばら。タカネバラ。

灌。喬。大宮口一合ノ上下。二合目
吉田口二合半。四五合邊。

莖高一丈餘。枝條ニ人ヲ刺スノ棘多シ。小枝ハ帶赤紫色。葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ橢圓形或ハ卵形。長四五六分幅三四分。縁邊ニ上向ノ細鋸齒アリ。花ハ單生。有梗。比較的大形ニシテ直徑一寸五分乃至二寸許。淡紅ニシテ甚ダ艶美ナリ。七月ヨリ八月ニ涉リテ開花ス。

◎觀賞ニ供ス。愛乃人ハ實ヲ食用トス。

(529) *Rosa microphylla*, Roxb.

さんせうばら。

麓。細紺野。天照教。バツカケ。大平
吉田口二合。大宮新道一合ノ下

高二丈徑五寸ニ達スルモノアリ。枝條ハ灰褐色ニシテ前種ノ如ク帶紫紅色ナラズ。莖ニ強キ刺ヲ有スレドモ前者ノ如クニ多數ナラズ。葉ハさんせうノ如ク。小葉ハ長卵形或ハ橢圓形。微鋸齒ヲ有シ。九乃至拾五小葉ヨリ成リ前者ヨリ比較的多數ナリ。六七月頃淡紅花ヲ開ク。果實ハ外面ニ多クノ鋭刺ヲ有ス。

◎觀賞用トシテ栽培ス。

(530) *Rosa multiflora*, Thunb.

のいばら。野薔薇。

麓。大宮。宮原。札打ノ下。

◎花ヨリ香水ヲ製ス。果實ヲ營實ト稱シ下劑トナル。又松魚等ニ酔ヒタルトキ用ヒテ妙効アリ。葉ヲ焙リ研リテ下疳瘡ニ傳ケ。根ヲ煎ジテ其汁ヲノメバ癩小便ヲ止メ又口舌ノ癢爛シタル時其濃煎汁ニテ口中ヲ洗ヘバ効アリ。但シ食スレバ嘔吐ヲ催スコトアリ。葉ヲ代用スルモ可ナリト云フ。

(531) *Rosa, Luciae*, Franch. et Rochebr.

てりはのいばら。ハヒイバラ。

麓。阿幸地。篠坂。村山ノ上。須走口100m。
一里松。

花大花期遅ク香氣強烈。葉面光澤アリ。効用前種ニ同シ

(532) *Rosa, Luciae*, Fr. et Ruh. var. *Fujsanense*, Mak.

ふじいばら。

麓。カケスバタノ上。須走口馬返附近。

莖ハ粗大強直ニシテ枝ニ長刺アリ。葉ハ密。平滑ニシテ光ナク。裏面中肋ニ微ニ柔毛アリ。葉ハ五七又ハ九雙ノ小葉ヨリ成リ。小葉ハ廣卵形。廣橢圓形ニテ基脚ハ鈍ニ。長二分五厘乃至六七分ニシテヤ、内曲セル鋭齒ヲ具フ。七八月頃嫩房又ハ短圓錐狀嫩房花序ヲナシテ直徑八分許ノ白花ヲ開ク。小梗ハ平滑ニシテ丈夫ナリ。萼筒ハ

楕圓。平滑。長サ一分四五厘。萼片ハ外反シ楕圓形又ハ卵形ニシテ鋭尖頭ヲナシ長ク尾ヲ引ケリ。花瓣ハ楔形倒卵形ニシテ凹頭ヲナシ。花柱ハ一個ニ合一シ。柔軟毛ヲ有ス。

(533) *Rubus, Ikenoensis*, Lev, et Vnt.

ごえふいちご。

麓。須走口1950m. 吉田口四五合目。

長二尺許。莖ヤ、蔓ノ如ク長ク。微毛ヲ帯ブ。葉ハ五小葉ヨリ成リ一見もみぢノ葉ノ如ク。小葉ハ橢圓形ニシテ尖リ重鋸齒アリ。花ハ五瓣白色ニシテ長梗ヲ有ス。果實ハ熟シテ深紅色ヲ呈ス。

◎果實ヲ食用ス。

(534) *Rubus crataegifolius*, Bunge.

くまいちご。ヤマイチゴ。キイチゴ(富士)
ゴザイシヨイチゴ。タチイチゴ。フクロ
イチゴ。

喬。須走口1600m. 山中村。吉田口馬返一合間。
大宮新道一二合。

莖葉共ニ紫黑色ニシテ鋭刺多シ。果形ハ末端尖リ大サニ三分。熟スレバ俄ニ五六分トナリ紅色ニシテ中空シ。ヨリテふくろいちごト呼ブ。

◎果實ハ甘酸ニシテ生食スルニ足ル。

(535) *Rubus palmatus*, Thunb.

もみぢいちご。キイチゴ。アハイチゴ。

懸鈎子。

麓。粟倉。村山ノ上。須走口1000m, 1020m, 1400m.

◎果實ハ甘酸ニシテ生食スレバ頗佳味ナリ。根ヲ神經過敏
營養不良ノモノニ用フ。

(536) *Rubus triphyllus*, Thunb.

なはしろいちご。ピツクリイチゴ(富士)

ミツパイチゴ。ツルイチゴ。藤田蔗。

麓。大宮。阿幸地。札打ト天照教トノ間。一里松。
鈴ヶ原。山中村。須走口1000m. 大宮新道一合。

◎果實ヲ生食シ又じやむヲ製ス。スベテいちごノ類ハ解熱
消化ノ効アリト云フ。

(537) *Rubus phoenicolasius*, Max.

うらじろいちご。ミヤマナハシロイチゴ。

エビガライチゴ。ミヤマアシクダシ。

麓。札打ノ上下。村山ノ上。仁杉。須走ノ上。

葉柄莖等ニ赤褐色ノ毛及ビ刺アリ。殊ニ梢端ニ紫紅色ノ
腺毛密生ス。葉モ莖モ前種ヨリハ著シク肥大ニシテ葉背
更ニ雪白ナリ。花ハ帯紅紫色ニシテ初夏梢上ニ多クノ小
梗ヲ出シテ簇攢シテ開キ。秋月深黄赤色ニ熟ス。

◎果實ヲトリテ生食ス。

(538) *Rubus illecebrosus*, Fock.

ばらいちご。サルナゲイチゴ。フクペラ
イチゴ。

麓。札打ノ上下。天照教。仁杉。
大宮新道一合ノ上下。

◎果實ヲ生食スレバ頗口ニ佳適ス。夏月登山者ノ嗜好スル
所ナリ。

(539) *Rubus, Lambertianus*, Ser, var, glaber, Hemsl.

みやまふゆいちご。

喬。雲切神社附近。

葉ハ通常廣卵形ニシテ三裂若クハ五裂シ先端尖鋭ナリ。
莖葉共ニふゆいちごヨリ平滑ナレドモ却リテ刺ヲ疎生ス

◎果實ヲ生食ス。

(540) *Rubus Thunbergii*, S. et Z.

くさいちご、ナベイチゴ、ヤブイチゴ、
ワセイチゴ、蓬藥。

麓、大宮、賽河原。

◎果實ハ甘味ニシテ微酸ヲ帯ビ頰口ニ適ス。

(541) *Rubus trifidus*, Thunb.

がぢいちご、タウイチゴ、テフセンイチ
ゴ、ゴゼンイチゴ、

麓、須走口1260m.

◎果實ハ熟シテ黄色。其粒大ナリ。甘味ニ微酸ヲ配シ頰佳
味アリ。樹ハマタ栽エテ觀賞セラル。

(542) *Sanguisorba officinalis*, L.

われもかう、ノコギリサウ、カルカヤ (同
名アリ) 地榆。

麓、村山、大宮、細紺野、鈴ヶ原。

◎秋ノ草花トシテ觀賞シ葉ヲ茶ノ代用トシ、全部ヲ藥用ト
ス。殊ニ婦人經水不止ヲ治ス。富士ノ山民ハ根部ヲ鍋ニ
テ煮テ手足ノ瘰癧ニツクルニ妙効アリト云ヘリ。

(543) *Sorbus japonica*, Koehne.

なゝかまご、オヤマノサンセウ。

喬、大宮口八幡堂附近、吉田口一合、四五六合。

小葉ハ長卵形ニシテ五六双ヲ有シ、葉縁ハ下部ノ外細説
ノ鋸齒アリ。葉裏ノ脉並ニ葉柄ニ褐色毛アリ。而メ托葉
ハ細微ナリ。五六月頃五瓣白色ノ小花ヲ聚繖花序ニ簇
シテ開キ。果實ハ熟シテ紅色、南天大トナル。材燒エ難
キヨリ炭燒人が七度籠ニ入ル、ヨリ其名アリト云フ。邊
材帶褐 暗色、心材ハ帶紫暗黑色、質緻密堅硬ニシテ以
テ器具及作用薪炭材トナシ樹皮ヲ染料トシ外皮ヲ藥用ト
ス。

(544) *Sorbus gracilis*, K. Koch.

なんきんなゝかまご、コバノナナカマド、
ヤマザンセウ。

喬、大宮口。

小葉ハ三雙乃至五雙ヲ常トシ、長橢圓形ニシテ極メテ短
キ柄ヲ有シ、中ヨリ先端ニ尖銳ナル微齒ヲ具ヘ、下部ノ
小葉ハ小クシテ上部ノ小葉ノ凡ソ三分ノ一ナリ。托葉ノ
基脚ニアル托葉ハ廣クシテ稍々圓形ナリ尖銳齒牙アリ
初夏枝梢上ニ繖房狀ヲナシ淡白綠色ノ小花ヲ開ク。

◎材ヲ器具ヲツクルニ用ヒ果實ヲ生食ス。

(545) *Spiraea, Blumei*, G. Don,

いはがさ、イハデマリ、ヤブデマリ (同
名アリ)

麓、バツカケ林中

莖高三四尺。多ク分枝シテ叢生ス。葉ハ菱狀倒卵形、上
半部ノ縁邊ニ缺刻及ビ鈍鋸齒アルモノ多シ。こでまりノ
葉ヨリ短シ。六月頃五瓣ノ小白花ヲ聚繖花序ニ綴ル。花
瓣ハ圓キ倒卵形ニシテ雄蕊ト其長ヲ等クス。

◎觀賞ニ供ス。

(546) *Spiraea japonica*, L. f.

しもつけ、繡線菊。

喬、麓、大宮口450m. 二俣、バツカケ、大宮口一合ノ
下、須走口1250m. 太郎坊、上吉田

◎觀賞用。

(547) *Spiraea japonica*, L. f. var. *bullata*, Mak.

こしもつけ。

灌、喬、麓、大宮ノ上、大宮新道一二合、鈴ヶ原、
須走口(850m. 900m. 1500m. 1600m. 一二合)

前種ニ比スレバ葉短ク、多クハ卵形ニシテ尖リ鋸齒アリ

質ハ薄シ。花序ヲ作セル花數ハ比較的少シ。

●栽エテ觀賞ニ供ス。

(548) *Spiraea nipponica*, Max, form *typica*, Mak.

いはしもつけ。コバノシモツケ。

麓。大宮口一合附近。

高三四尺ニシテ叢生ス。莖枝共ニ硬質ニシテ多少縱稜ノ存スルヲ見ル。葉ハ小ク。多クハ倒卵形。廣楕圓形ナレドモ。時ニ圓形ノモノアリ總ベテ全邊ナレドモ先端ニ一ニノ微缺刻ヲ存ス。◎觀賞用ニ供ス。

(549) *Spiraea*, *Thunbergii*, Sieb.

こめざばな。ユキヤナギ。イハヤナギ。

ユキモヤウ。珍珠花。

麓。須走ノ上(980m.)

枝ハ多少垂柳ノ如クニ枝垂シ。花ハ三四月頃新葉ノ未ダ長セザル時ニ於キテ枝條ノ上部ニ叢リテ長キ總狀花序ヲ作りテ開キ。一見雪ノ如シ。◎觀賞ニ供ス。

(550) *Stephanandra incisa*, Zabel.

こごめうつぎ。キクバヤマブキ。

シロウツギ。

麓。大宮。宮原。二俣。權現モヤ。吉田口二合。札打天照教間。大宮新道一合ノ下

落葉小灌木ニシテ莖中ニ髓ヲ有スルコトうつぎニ似タリ

●花ヲ觀賞ニ供ス。

(551) *Stephanandra*, *Tanakae*, F. et S.

かなうつぎ。オホバノコゴメウツギ。

ヤマドウシン。ヤマアサ。

麓。

高五六尺ノ落葉灌木。葉ハ三角狀卵形ニシテ尖リ。缺刻及ビ鋸齒ヲ有シ。基脚ハ往々心臓形ヲ呈ス。花ハ白色小

形ニシテ貳拾個乃至多數ノ雄蕊ヲ有シ。細キ花梗ニ疎ナル圓錐花序ニ排列ス。

Hamamelidaceae. 金縷梅科

(552) *Hamamelis japonica*, S. et Z.

まんさく。金縷梅。

麓。大宮口。須走口

●活花トナシ又栽エテ觀賞ニ供ス。

Saxifragaceae. 虎耳草科

(553) *Astilbe chinensis*, F. et S. var. *japonica*, Max.

ちたけさし。

麓。大宮新田。大岩。天照教。大宮口一合ノ下。須走ノ上。太郎坊。大宮新道一合。

木曾ノ山民此草ノ莖ニち葷ヲサシテ携ヘ來レヨリ其名ヲ得。

(554) *Astilbe*, *Thunbergii*, Miq, var. *congesta*, Boiss.

とりあししようま。

喬。麓。栗倉。村山。札打天照教間。瀧ノ澤。須走口(860m. 1400m. 等) 大宮新道一合。

あはもりしようまニ似タレド此モノハ遙ニ大形ニシテ花瓣モ亦彼ハ倒卵形或ハ筧形ナルニ此モノハ披針形ヲ呈ス。●地下莖ヲ強壯劑トス。栽エテ觀賞ス。又嫩葉ヲ煮テ食ヘバ淡泊ニシテ口ニ適ス。

(555) *Chrysosplenium macrostemma*, Max

みやまねこのめさう。

喬。八幡堂。須走口。大宮新道一合ノ西。

(556) *Chrysosplenium flagelliformum*, Fr. Schm.

つるねこのめさう。

喬 八幡堂 大宮新道一合

(557) *Deinathe bifida*, Mox.

ぎんばいさう。ギンガサウ。

喬 吉田口。

◎観賞用トシテ栽培ス。又其粘液ヲ製紙ノ糊料トス。

(558) *Deutzia scabra*, Thunb, var, *crenata*, Mak.

うつぎ。ウノハナ。ユキミグサ。洩硫。

麓 大岩 村山 賽河原 八幡堂 上吉田 須走口100m 鈴ヶ原 大宮新道一合

◎材質緻密硬重ニシテ割レ易シ。主トシテ木釘ヲ作り又樽ノ呑口 楊枝其他寄木細工ニ用ヒ或ハ莖ヲ適當ニ切断シテ兩端ヲ四側ヨリ少シク向ヘテ削リ取りテ小鳥籠ノどまり木トナス。或ハ庭園ニ栽エテ観賞ニ供シ或ハ生垣トス。薬用トシテハ遺尿ヲ止メ熱ヲ去リ。又煎シテ飲メバ難産ヲ安クスト云ヘリ。

(559) *Hydrangea hirta*, S. et Z.

しばあぢさゐ。クロアヂサキ。フシグロ (同名アリ) コアヂサキ。

麓 大宮口 須走口。

◎嫩葉・黒色ヲ帯ブ。トリテ飯ニ交ヘテ山民ノ食トス。

(560) *Hydrangea involucrata*, Steb

たまあぢさゐ。

麓 村山 上井出 粟倉 菜黄澤 瀧ノ澤 須走口 大宮新道一合

七八月頃梢頂ニ球状ノ蕾ヲ生ズ。

◎観賞用トシテ栽培ス。

(561) *Hydrangea opuloides*, K. Koch, var, *japonica*, Schneid.

べにあぢさゐ。ベニガク。

麓 細紺野。バツカケ林中。大宮新道一合ノ上。

陰地ニ生ズル小灌木。花ハ帶紫白色、中心ニ小キ多数ノ正花ト周圍ニ大形ノ假花數個ト有シ外圍ノ花ハ漸次ニ紅色ニ變ズ。◎屢々観賞ニ供ス。

(562) *Hydrangea paniculata*, Sieb.

のりうつぎ。サビタ(北海道)。ノリノキ。ニベノキ。ヤマウツキ。

麓 細紺野。太郎坊。須走口(1000m.-1120m.等) 吉田口馬返。吉田口一合。大宮新道一合ノ西。

◎材質堅硬緻密ニシテ木釘ヲ作り。ばいぶヲ作ル。樹皮ヲ削リテ製紙ノ糊料トナス。

(563) *Hydrangea virens*, Sieb.

がくうつぎ。コンテリキ。ヤマドウシン。

麓 村山。天照教。白絲。瀧ヶ原。

莖ノ内部ニ大ナル白色ノ髓ヲ有ス。

(564) *Hydrangea petiolaris*, Sieb, var, *cordifolia*, Max.

ごとうづる。ツルアヂサキ。ツルデマリ。藤繡毬。

麓 八幡堂ノ下。

◎山民葉ヲトリ味噌又ハ鹽ト揉ミ食フニ味瓜ノ如シ。

(565) *Parnassia foliosa*, H. f et Thoms.

しらひげさう。

麓 須走。須山。

莖高五七寸ノ多年草ニシテ願うめがささうニ類似ス。夏日葉間ニ莖ヲ抽キテ五瓣白色ノ花ヲ開ク。花瓣ハ甚ダ深ク多数ニ剪裂セリ。うめばちさうハ一莖ニ一葉ヲ附クレド此種ハ莖上ニ三五葉ヲ着ケ且ツ彼ノ瓣片ハ細裂スルコトナシ。◎栽エテ観賞ニ供ス。

(566) *Parnassia palustris*, L.

うめばちさう。

麓. 天教. 細紺野. 須走口(850m.—980m.)

莖高六七寸ノ多年草。葉ハ圓形ニシテ尖リ。基脚ハ心臓形ヲナシ長柄アリ。但シ莖ノ上部ノ葉ハ圓クシテ無柄ナリ。花ハ一見梅花ニ類スレド雄蕊五個アリ。一個ヅ、内方ニ屈曲シテ柱頭ニ觸レ。葯ハ一個ヅ、順次ニ熟ス。瓣ニ接シテ鱗片アリテ其先端ニ拾本或ハ拾二本ノ細絲アリテ其先端ニ黄色ノ小体ヲ具フ。

◎觀賞用トシテ盆栽ス。

(567) *Philadelphus*, Satsumi, Sieb.

ばいくわいうつぎ. サツマウツギ。

山梅花。

麓. バツカケ. 吉田馬返間. 大宮新道一合。

葉ハうつぎニ類シテ縦肋脉著シク。花ハ四瓣白色ニシテ梅花ノ如シ。◎栽エテ觀賞ニ供スベシ。

(568) *Ribes alpinum*, L. var. *japonicum*, Max.

ざりごみ. ザリグミ。

喬. 八幡堂ノ上. 吉田口一合

落葉灌木ニシテ刺ナク頗やぶさんざしニ似タリ。葉ハ有毛ニシテ細長キ葉柄ヲ具ヘ。掌狀ニ三四裂シ。裂片ハ尖リテ不整ノ鋸齒ヲ有ス。花ハ小形白色。多ク集リテ總狀ニ排列ス。花實ハやぶさんざしニ似テ共ニ小ク。漿果ハ熟シテ黄赤色。

(569) *Ribes ambiguum*, Max.

やしやびしやく. テンノウメ. キウメ。

ヤシホ. 蔦。

喬. 宮原. 大宮口八幡堂ノ上。

高一二尺ノ落葉小灌木ニシテ刺ナク。深山古木ノ高所ニ着生ス。葉ハやぶさんざしニ似テ長柄アリ。葉質ヤ、厚シ。初夏葉間ニ五瓣綠白色ノ花ヲ一個乃至三個ヅ、一ノ花軸ニ生ズ。子房ハ下位。有毛ニシテ一室ヨリ成リ花後楕圓ニシテ長五六分ノ漿果ヲ結ビ後紅熟シ其外皮ニ短毛ノ毛刺ヲ存シ一見ななもみノ實ノ如シ。

◎屢々盆栽シテ觀賞ニ供ス。果實ハ酸味ヲ有シ。山民トリ食フ。熊野ノ山民ハ莖葉共ニ煎服シテ乳汁ヲ瀉シ淋疾ヲ治ズルニ用フ。或云フ胃癌ヲ治スルノ効アリト。

(570) *Ribes burejense*, Fr. Schmidt.

はりすぐり。

喬。

莖ハ往々地ヲ匍フ。刺甚ダ多シ。葉ハ五裂。缺刻鋸齒アリテ長一二寸。裏面ニ絨毛アリ。花ハ一個。直徑四分。實ハ刺ヲ有ス。◎果實ハ食スルニ足ル。

(571) *Ribes fasciculata*, S. et Z.

やぶさんざし. キヒヨドリ。

麓. 細紺野

葉ハ互生。長柄ヲ有シ。心臟形ニシテ叢生シ。多クハ淺ク三裂シ且ツ疎ニ深重鋸齒ヲ具ヘ。さんざしノ葉ニモ似タレド遙ニ大ナリ。四月頃一處ニ叢リテ黄白色ノ花ヲ開ク。果實ハ小漿果ニシテ熟シテ黄赤色ヲ呈シ。やしやぶシノ果實ヨリ稍小ク且ツ彼ノ如クニ毛刺ヲ有スルコトナシ

◎栽エテ觀賞ニ供スルモノアリ。

(572) *Rodgersia podophylla*, A. Gr.

やぐるまさう. 鬼燈檠。

麓. 喬. 須走口1250m. 狩休ノ上(1650m.等)
吉田口馬返以上。

一柄頭ニ矢羽ノ如キ五葉ヲ掌狀ニ出スニヨリテ名ク。

(573) *Saxifraga cortusaeifolia*, S. et Z.

だいもんじさう。ユキモヤウ。ママゴケ
(伊豆)

麓。白絲瀧。大宮新道一合。

花形ノ大ノ字ニ似タルヨリ其名アリ。此種ノ葉ノ分裂スルコト淺深一ナラズ。此變形トモノ有無等ニヨリテ更ニ種々ノ名稱ヲ存ス。

◎觀賞用トシテ栽培シ。米麥ト共ニ炊キ食シ或ハ牛馬ノ飼料ニ充ツ。

(574) *Saxifraga sarmentosa*, L.

ゆきのした。キジンサウ。虎耳草。

◎觀賞用。藥用及ビ食用トモナス。葉ヲ搾リテ其汁ヲ滴シテ障耳ヲ治シ。燒キ糞ベテ痔ヲ療シ。熱シテ吐利ヲ止メ或ハ葉ノ搾リ汁ニ少量ノ砂糖ヲ混シ飲ミテヨク小兒ノ久シキ咳ヲ治スベシト云フ。

(575) *Schizophragma hydrangeoides*, S. et Z.

いはがらみ。ユキカツラ。ウリヅタ。

アマザケカツラ。鑽地風。

麓。八幡堂。大宮新道一合二合。

莖頗長クシテ附着根ヲ生ズルコト甚ダごとくづるニ似タリ。花ハがくばなニ類シ外圍ノ花ハ不整齊ノ萼ヲ有シ其一片ハ大ニシテ團扇狀ヲ呈シ。中心ノ花ハ有性ノ小花ニシテ整齊ノ花被ヲ有ス。

◎山民嫩葉ヲトリテ食料ニアツ。又此蔓ヲ煎ジテ其汁ヲ飲メバ甘キコト醜ノ如シ。又觀賞ニ供スルコトアリ。

(576) *Tanakaea radicans*, F. et S.

いはゆきのした。ヤマユキノシタ。

ウラベニサウ。

麓。須走。

岩上ニ生ツ高五六寸ニ達スル多年草。根莖ハ斜ニ走リテ密集スル絲狀ヲ呈シ。匍枝ヲ出シテ地上ニ曳キ先端ヨリ根ヲ生ズ。葉ハ地上ニ叢生シテ長キ柄ヲ有シ。質厚クシテ硬ク。葉面卵狀披針形。尖頭ニシテ基脚ハ圓形或ハヤ心臓形ヲナシ。縁邊不齊ノ鋸齒アリ。長一寸乃至二寸餘。舊葉ハ下面帶紅色。後兩面トモニ暗紅色トナル。故ニうらべにさうノ稱アリ。春月葉間ヨリ花莖ヲ抽クコト五六寸ニシテ二三寸ノ小葉ヲ互生シ。多ク枝ヲ分チテ小形ノ白花ヲ聚繖狀複繖狀花序ニ綴ル。雄蕊拾個アリテ五個ハ長ク五個ハ短シ。

◎白鬚さう等ト共ニ好ミテ盆栽セラル。

(577) *Tiarella polyphylla*, Don.

づたやくしゆ。

喬。八幡堂ノ上。大樞ノ下。狩休ノ上。
須走口(1880m.—1950m.等)

草狀ちやるめるさうコ似タレド。彼ノ葉ハ心臓形ニシテ分裂著カラス。莖上ニ多クノ葉ヲ有スルコトナク。花序ノ種モ遙ニ短ク且ツ枝ヲ分ツコトナシ。

◎喘息ヲ療スル効アリ。信州ノ方言ニ喘息ヲづたと云フ。屢々栽エテ盆栽ス。

Crassulaceae. 景天科

(578) *Sedum alboroseum*, Bak.

べんけいさう。イキクサ。景天。

麓。入山瀬(人家) 大宮(人家) バツカケ
吉田口中ノ茶屋。吉田口馬返。

◎觀賞ノ爲メ栽培ス。藥用トシテハ熱ヲ去リ血ヲ止メ漆瘡ヲ治シ。マタ葉ヲ火ニアブリ薄皮ヲ剥ギトリテ腫物ニ貼レバ痕跡ヲ殘スコトナクシテヨク膿ヲ吸出スト云ヘリ。

(579) *Sedum, Alfredi*, Hance.

こもちまんねんぐさ.

麓. 大宮口.

葉腋ニ肉芽ヲ生シ地ニ落チテヨク繁殖ス。

(580) *Sedum japonicum*, Sieb, var. *senauensis*, Mak.

みやままんねんぐさ.

喬. 大樫附近.

岩上ニ生ズル小草ニシテ高二三寸ニ過ギズ。莖ノ下部ハ紅色ヲ帯ブ。葉ハ小ク。多肉ニシテ疎ニ互生ス。其向陽ノ地ニ生ズルモノハ夏時深紅色ヲ呈シテ美ナリ。六七月頃梢上ニ五瓣黄色ノ細花ヲ簇生ス。めのまんねんぐさニ酷似スレド其苗遙ニ小ナリ。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(581) *Sedum lineale*, Thumb.

をのまんねんぐさ.

麓. 粟倉.

每節多肉線状ニシテ尖レル三葉ヲ輪生ス。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(582) *Sedum*, *Kamtschaticum*, Fisch

きりんさう. 費菜.

麓. 須走口1060m. 籠坂峠. 吉田口中ノ茶屋

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(583) *Sedum verticillatum*, L.

みつばべんけいさう.

麓. 細紺野.

葉ハ一節ニ三枚ヅ、輪生ス。葉ハ倒長卵状鋭頭ニシテヤ、粗大ノ鋸齒ヲ有シ 葉柄短シ。

Cruciferae. 十字花科

(584) *Arabis amplexicaulis*, Edgew.

いははたざを.

草. 吉田口五合.

莖高一尺餘。根葉ハ筧形ニシテ鈍頭。縁邊ニ波状粗鋸齒ヲ具フ。莖生葉ハ披針形ナリ。五月頃白色十字形ノ花ヲ總状ニ開ク。角果ハ少シク下方ニ彎曲シ其長二寸餘ニ及ブ。

(585) *Arabis sagittata*, Dc.

やまはたざを. ノハタザヲ.

麓. 阿幸地. 天照教. 中畑道一里松ノ邊. 鈴ヶ原.

莖一尺餘ニ達スル有毛草本。根生葉ハ稍範形。鈍頭。微凸頭。小齒アリ。莖生葉ハ長卵形ニシテ鋸齒及ビ箭形ノ基部ヲ有ス。はたざをモ有毛ナレドモ山はたざをハ花モ小ク莖モ細ク。葉ハ疎ニシテ角モ細シ。

(586) *Arabis serrata*, F. et S.

ふじはたざを.

灌. 草. 大宮口一合目ノ前後ヨリ五六合マテ. 吉田口五六七合. 須走口1560m. ヨリ一三合迄

高山ノ草本帯ニ普通ノ有毛草本。莖ハ四五寸乃至七八寸根生葉ハ筧形。粗ニシテ深キ鋸齒アリ。莖生葉ハ卵形又ハ披針形。花ハ比較的大ク四瓣白色ニシテ七八月開ク。角ハ長クシテ一寸乃至一寸五分ニ達シ。少シク下方ニ彎曲ス。高山植物トシテ觀賞セラレ。

(587) *Capsella bursa-pastoris*, Moench.

なづな. ベンベンダサ. 薺.

麓. 大宮. 白絲瀧.

◎春ノ七草ノ一ニシテ古來其嫩苗葉ヲ食用ニ供セリ。根葉共ニ赤痢ニ効アリ。子モ根モヨク目ノ病ヲ治シ其痛ヲ去ルト云ヘリ。花ハ又陰乾トナシテ臥床ノ下ニ布ケバヨク蚤ヲ避ケトモ云フ。

(588) *Cardamine flexuosa*, With.

たねつけばな。碎米薺。

麓。大宮。白絲瀧。

◎刺身ノ痺トナセバ微辛アリテ宛然わさびノ如シ。

(589) *Cardamine lyrata*, Bunge.

みづたがらし。ミヅガラシ。

麓。大宮。吉原。

葉ハ羽狀ニ深裂シ。葉柄ノ基部ハ耳形ナシテ稍莖ヲ抱ク。頂生葉ハ圓形又ハ卵形ニシテ波狀ノ齒牙ヲ有シ。側生葉ハ卵形。全邊。而シテ上部ノ葉ハ細クシテ羽狀ニ分裂ス。四五月頃莖頂ニ四瓣白色ノ小花ヲ總狀ニ綴ル。此草蔓ヲ延キテ繁殖ス。

(590) *Dentaria appendiculata*, Matsum.

たでのうみこんろんさう。

ヒロハノコンロンサウ。

麓。白絲瀧。

葉ハ葉柄アル羽狀複葉ニシテ基脚ハ擴大シテ小耳チナシ稍莖ヲ抱キ。小葉ハ披針狀卵形ニシテ縁邊ニ大鋸齒アリ花ハ小形ニテ白色ノ四瓣ヲ有シ。總狀花序ニ排列シ。花梗ハ平滑ナリ。

(591) *Dontostemon dentatus*, Ledeb.

はなはたぎを。

麓。吉田口。中ノ茶屋。

高二尺餘ニ達スル直立草本。葉ハ披針形ニシテ大鋸齒ナ

有シ。互生ス。花ハ淡紫色ノ比較的着シキ四瓣ヲ有シ總狀花序ニ排列ス。殆ド平滑ナリ。

(592) *Draba nemorosa*, L. var. *hebecarpa*, Ledeb.

いぬなづな。ヒナノキンチャク(同名アリ)

麓。御殿場。大宮。

向陽ノ處ニ生ズル有毛小草ニシテ薺ヨリハ遙ニ瘦セテ細シ花ハ黄色ニシテ四五月頃總狀花序ニ排列シテ開ク。

◎或ハ曰ク水腫ヲ治シ小便ヲ通シ經水ヲ利スト。

(593) *Nasturtium officinale*, R. Br.

おらんだがらし。ミヅガラシ。

オランダミヅガラシ。

麓。白絲。吉原。上吉田。

歐洲ノ原産ナリト雖現今吾邦各地ニ蔓延シ溝澤等ニ多シ莖ハ一ニ尺ノ高サニ及ブ。サレド好ミテ水中ニ横ハリ其下部ヨリ根ヲ發ス。葉ハ平滑。奇數羽狀ニ分裂シ。小葉ハ卵狀或ハ楕圓形ニシテ縁邊波狀ヲ呈ス。春夏ノ候其梢上ニ白色ノ細花ヲ短總狀チナシテ開ク。果實ハ線形ヤ、短大ナリ。

(594) *Nasturtium indicum*, Dc

いぬがらし。アビガラシ。ゴバウナ。

蔞菜。

◎莖葉共ニ辛味ヲ帶ビ食用トナスコトヲ得。

(595) *Nasturtium palustre*, Dc.

すかしたごぼう。

麓。大宮。上井出。上吉田

◎葉ノ分裂ハ或ハ深ク或ハ浅キモ而モいぬがらしヨリハ規則正シク細裂シ裂片齒牙アリ。角ハ短クシテ楕圓体チナシ長サ二三分ニ出テズ。コレ前種ノ角ノ線形ニシテ長六七分アルモノト一見異ルトコロナリ。

Papaveraceae. 罂粟科

(596) *Macleya cordata*, B. Br.

たけにくさ。チャンバギク。博落廻。

麓。大岩。村山。宮原。水土野。鈴ヶ原。大宮新道。宮内村。御殿場口太郎坊。篠坂。

◎有毒ナリ。誤リテ食ヘバ心臓麻痺ヲ起シテ斃ル。予馬ニ騎リテ富士山麓ヲ通過スル際馬ハ他ノ路傍ノ草ヲ食スレド決シテ此草ヲ食スルコトナカリキ。此植物ヲ竹ト共ニ煮レバ其竹柔軟トナリテ細工ヲ易キヨリ竹煎草ト云フトノ説アレド或ハ竹似草ノ義ナラントノ説モアリ。又煎汁ヲ害虫ノ驅除ニ用フ。

(597) *Chelidonium majus*, L.

くさのわう。タムシグサ。白屈菜。

麓。大宮。北山。

◎峻下性麻醉性ヲ有シ有毒ナリ。葉ヲ揉ミテツクレバ腫物ヲ和ゲ。たむしニ貼シテ治スルコト妙ナリ。因リテたむしぐさノ稱アリ。又疣ヲ去ルトモ云ヘリ。獨逸ニテハ夙ニ此草ヨリ胃痛ノ特效薬ヲ製出ス。近來吾邦人亦煎シテコレヲ服スルモノアリ。又下腹部ノ疾病ヲ治スルニ用フ。

(598) *Corydalis decumbens*, Pers.

やぶえんごさく。ピツチリ。

麓。喬。大宮。八幡堂。

陰濕ナル草原ニ生ズル多年生ノ軟弱草本ニシテ有毒ナリ

(599) *Corydalis pallida*, Pers.

やぶけまん。ムラサキケマン。ヤブゼリ。

紫堇。

麓。大宮口。

◎有毒ナレドモ花ヲ乾シテ粉トナシ大小兒ノ脱肛ニ塗布ス

(600) *Corydalis pallida*, Pers.

みやまきけまん。

喬。八幡堂。

楕形きけまんニ類スレド根生葉ヲ除クノ外ハ缺刻頗繊細ナリ。花モまけまんヨリ小ク。果實ハ細長クシテ連珠状ヲ成ス有毒ナリ。

(601) *Corydalis racemosa*, Pers.

きけまん。ウバコロシ。黄堇。

麓。喬。八幡堂。須走口900m。

路傍樹陰或ハ石垣ノ間等ニ生ズル草本ニシテ四五月頃最盛ニ花アレド暖地ニテハ四時枯ルニコトナク。随ヒテ時々花ヲ見ルコトアリ。根ハ纖維状ニシテ塊状ナナサズ。花ハ帶黄綠色ニシテ斷テハ黄汁出テ甚ダ惡臭アル有毒ノ草ナリ。

Lauraceae. 樟科

(602) *Cinnamomum pedunculata*, Nees.

やぶにくけい。ホトケダラ。マツラニクケイ。クスダモ。アブラダモ。天竺桂。

麓。大宮。村山。萬濃。

肉桂ニ似タル常緑喬木。葉ハ革質ニシテ光澤ヲ有シ。表面稍褐青色裏面ハ灰青色。葉脈ハ葉ノ基部ニ近ク二大側脈ヲ分チ其側脈ハ殆ド葉頭ニ近ク而モ全ク達セズ。肉桂ノ帶辛甘味ナルト異ニシテくすのき。しきみ等ニ似タル一種強烈ナル香氣ヲ有ス。

◎材ハ淡褐色ニシテ樟ヨリハ稍硬ク割レ易シ。木理緻密ニシテ鉋削スレバ光澤ヲ現ハス。椅子。卓子置物。其他殊

ニ燻作用ニ使ハル。果實ヨリ得ル油ハ豊前ニテおきみつあぶらト呼ビ樹ヲあぶらだもト稱ス。又蠟ヲ製シテかこ蠟ト呼ブ。融熔ケ易キ故ニ冬時ニ用フルニ適ス。近時ハ石鹼ヲツクル。枝葉ハしきみニ代ヘテ佛前ニ供スル故ニほとけだらト稱ス。藥効ハ桂ニ類ス。産後ノ惡血ヲ破リ血痢ヲ治シ。腰脚ヲ暖メ以テ腹内ノ諸冷ヲ治スト云フ。苗木ヲ肉桂ヲツグ臺木トモナス。

(605) *Ginnamomum, Camphora, Nees. et Eberm.*

くすのき。クス。樟。

麓。大宮。

◎心材ハ赭黒色ヲ帯ビ邊材ハ淡黄ナリ。質輕軟ニシテ工作シ易ク。光澤アリテ香氣モ芬々タリ。殊ニ老木ニ至リテハ木理渦状ヲ呈シテ大小ノ木目アリ。俗ニ之ヲたまもく或ハじよりんもくと稱ヘ天井板。門扉等ニ用フ。普通ノ材ト雖香氣ト脂氣トヲ有シ。ヨク水ニ堪ユルノミナラズ害蟲ヲ防グ効アルヲ以テ造船材トシテ此上ニ出ヅルモノナシ。マタ箆筒。木箱。木魚。額縁。衣箱等ヲ作ルニヨシ。而メ其樟腦ヲ製シテ諸種ノ用ニ供スルコトハ人ノヨク知ル所ナルガ果實ヨリハ蠟ヲ製出ス。現今吾政府ハ盛ニ樟樹ノ栽培ヲ獎勵シ特ニ一局ヲ設ケテ專資トナスニ至レリ。其輸出ハ年々數十萬圓ニ達スト雖。外國ハ吾邦ノ粗製樟腦ヲ購求シテ之ニ精製ヲ加ヘテ更ニ四方ニ輸出スルモノナルコトヲ思ヘバ吾人豈大息シテ止ムベクムヤ。

(604) *Lindera glauca, Bl.*

やまかうばし。シヤウブノキ。アツキ。

コセウノキ。ソバノキ。山胡椒。

麓。栗倉。村山。

◎樹皮ハからかばト稱シ仙臺地方ニテハ正月ノ煮物ニ用フ葉モ亦救荒時ノ食料トナスベシ。藥用トシテハ心腹ノ冷

痛ヲ治シ又葉ノ粘液ヲ蕎麥粉ヲ捏ルニ用フト云フ。

(605) *Lindera praecox, Bl.*

むらだち。アブラチヤン。コヤスノキ。
アカヂシヤ。フキダマ。ヅサ或ハヂシヤ
(富士)

麓。北山。細紺野。八幡堂。仁杉。一ノ澤。
大宮新道一合。

くろもじニ似タル落葉樹ニシテ同様ノ香氣アリ。葉ハ卵形又ハ橢圓形ニシテ先端尖リ長二三寸アリテ全邊ナリ。春月葉ニ先チテ黄色ノ細花ヲ簇生ス。果實ハ球形直徑四五分アリ。

◎材暗灰色ニシテ質ヤ、硬ク香氣アリ。専ラ杖ニツクル。又果實ヨリ搾リタル油ヲちさの油ト稱シ燈用ニ供ス。ヨリテ此樹ニあぶらちやんノ稱アリ。栽エテ垣根トモナス

(606) *Lindera obatusiloba, Bl.*

だんかうばい。ウコンバナ。シロヂシヤ。

麓。大宮新田。村山。北山。

頗しろもじニ類スル落葉小喬木ニシテ樹皮ハ帯灰褐色ヲ呈ス。葉ハ廣卵形或ハ圓狀心臟形ニシテ直徑三寸。先端淺ク鈍三裂ヲナス。

◎植エテ觀賞ニ供シ。材ヲ器具ヲ造クルニ用ヒ。實ニテ油ヲ搾ル。

(607) *Lindera umbellata, Thunb.*

くろもじ。トリシバ。トリキシバ。

トリキ。鉤樟。

麓。入山瀬。須走口1000m.

樹皮ハ綠色ニ黒色ノ斑紋ヲ存ス。三四月頃葉ノ充分發展セザルニ先チテ五瓣淡黄色ノ細花ヲ三々五々群リ生ヅテ繖形ヲ成ス。香氣強シ。

◎材質輕軟ニシテ割レ易シ。香氣アルニヨリ皮付ノマ、細ク割リテ牙杖トナス。奥羽地方ニテハ雪中ニ用フルかんじキナツクル。實ヨリ蠟油ヲ搾製ス。香油ヲ製出スル爲メニ近年静岡県下ヨリ外國ニ輸出ス。葉莖等ヨリモ亦良好ノ油ヲ製シ得ルト云フ。根皮及ビ莖葉ハコレヲ藥用トモ爲シ或ハ栽エテ生垣トナシ。花ノアル枝ヲ切りテ生花ニ用フ。

(608) *Lindera triloba*, Bl.

へろもじ。ハタウコン。ウコンバナ。

シロキ。チシヤガラ。

麓。バツカケ。八幡堂。中畑。一ノ澤 仁杉
茶黄澤。大宮新道一合。

頗だんこうばいニ似タル落葉木。葉ハ稍廣倒卵形ニシテ通常三裂片ヲナシ。裂片ハ卵形稀ニ不裂ノモノアリ。雌雄異株。葉ハだんこうばいヨリ深ク三裂シ。裂片モ亦更ニ鋭頭ナリ。◎果實ヨリ香油ヲ搾ル。

(609) *Machilus, Thunbergii*, S. et Z. var. *glaucescens*, Bl.

たぶのき。タスグス。タモノキ。

タモノキ。イヌグス。楠。

麓。

高大ナル常緑喬木。樹皮ハ初メ平滑暗白色ニシテ後ニ栓質トナリ淡黄灰色ト變ズ。葉ハ革質ニシテ厚ク。長楕圓形ヲナシ基部狹窄シテ通常長七八分アル葉柄ニ移行ス。先端ハ鋭尖ナリ。葉面深緑裏面灰緑。葉裏ニ明瞭ナル細網脈ヲ現出ス。種子ハ大豆大ニシテ斑紋ヲ有シテ美ナリ能ク鳥糞ニ混ジテ各地ニ散布ス。

◎心材帶淡褐色。邊材ハ帶紅深褐色ニシテ質樟樹ヨリヤ、堅密ニシテ割レ難シ。殊ニ其老幹ニ至リテハ環紋雲様ヲナスヲ以テたまぐすノ稱アリ。八丈島ニテハ船材トナス而シテ其老根部ハ美欄ト稱シテ机。茶棚。盆。置物臺其

他高等美術的指物器具等ニ愛用セラル。木魚。寫眞機械樂器材トモナス。八丈島ニテハ樹皮ニテ八丈絹ヲ藍色ニ染メ種子ヨリ油ヲ搾ル。又神社佛閣及ビ庭園ニ栽ヨテ觀賞ニ供ス。

(610) *Tetradenia foliosa*, Nees.

いぬがし。マツラニクケイ。ハナニクケイ

麓。北山。

高二三丈ニ達スル常緑喬木。葉ハ短柄ヲ以テ好ミテ叢生シ。長楕圓狀披針形。上下狹窄。革質平滑ニシテ三縱道アリテ殊ニ底部ニ近キトコロヨリ發スル肋脈ハ他ノモノヨリモ著シ。花ハ小ク。紅色四片ノ花蓋ヨリ成リ。三四月頃葉脈及ビ小枝ノ基部ニ拾個許ヅ、撥簇ス。果實ハ楕圓體。黑色ヲ呈ス。コノ種頗しろだもニ似タレド。其花ノ紅色ニシテ果實ノ黑色ニ熟スルト。葉ノ小形ニシテ嫩葉ニ毛ナキヲ以テ容易ニ區別セラル。

◎材質たぶのきニ類ス。器具及ビ小細工用トス。

(611) *Tetradenia glauca*, Matsum.

しろだも。コガタマ。ウラジロダモ。

タマガラ。ツバ。

麓。大宮。二俣。

たぶのきニ似タル常緑喬木ナレドモ葉裏ニ白色ノ細毛ヲ密布ス。花ハ黄色ニシテ果實ハ直徑三四分ニ達シ紅色ニ熟ス。

◎材ヤ、硬クシテ割レ難ク。邊材ハ帶白紫黑色ニシテ中心ニ向ヒ漸次ニ濃色トナル。以テ器具ヲツクルベク實ヲ以テ蠟ヲトルベシ。九州ニテつゞの油ト稱シテ蠟燭ヲ製ス東京地方ニテ尙同様ニ稱ヘテ燈油ニ供スト云フ。

Menispermaceae. 防己科

- (612) Cocculus, Thunbergii, De.

つづらふち。アヲツヅラフチ。

チンチンカヅラ。防己。

麓。大宮。

◎莖ヲ編ミテ籠。葛籠。鐵瓶敷又ハ土瓶ノ燥梁トナシ或ハ物ヲ束ヌルノ用ニ供ス。根及ビ葉ヲ藥用トス。近來水腫僕麻買斯等ニ特效アリト稱フルモノアリ。

Lardizabalaceae. 木通科

- (613) Akebia lobata. Dcne.

みつばあけび。

麓。村山。八幡堂ノ下。鈴ヶ原。大宮新道及其下。

葉ハ三小葉ヨリ成リ。小葉ハ有柄。卵形或ハ廣卵形ニシテあけびノ長楕圓形ナルニ似ズ。且ツ彼ノ葉ハ全邊ナレドモ此モノ、葉ハ粗齒牙乃至鈍鋸齒ヲ存ス。

◎果實ノ白瓢ハ甘味ニ富ミ生食スルニ足ル。蔓ヲあけび細工ニ用フ。

- (614) Akebia quinata. Dcne.

あけび。アクビ。アキビ。通草。

麓。大宮。北山。

◎果實ノ白瓢ハ甘味アレバ生食ス。蔓ハ籠類ヲ編ムニ適ス種子ヨリ油ヲ搾リテ燈用又ハ食用トス。通常藥用ニハ蔓ヲ使ヘド。果皮及ビ蔓モ亦治淋。利水。催乳。清肺解熱ニ用ヒラル。核ハ藥舗ニテ肉袋子ト稱ス。其小便通利ノ功ハ遙ニ木通ニ勝ルト云フ。

Berberidaceae. 小蘗科

- (615) Berberis Thunbergii, Cc. var. Maximwiczii, F. et S.

めぎ。コトリトマラス。ヨロヒトブシ。小蘗。

麓。富士根村。粟倉。中畑道一里松。鈴ヶ原。大宮新道一合。

各葉叢ノ下部ニ葉ノ變形シテ成レル一乃至三條ノ針アリテヨク人ヲ刺ス。四五月頃新葉ノ間ヨリ花軸ヲ出シテ大サ二分許ノ六瓣黄色ノ小花ヲ下垂ス。雄蕊亦六個アリテ他物コレニ觸ルレバ動クノ性アリ。根ハ鮮黄色ヲ呈ス。

◎材ハ質重硬ニシテ割レ難シ。寄木細工又ハ木象嵌ニ用ヒテ其黄色ヲ賞ス。樹皮ハ粗皮ヲ去リ黄色ノ染料トナル。木ヲ刻ミ又ハ陰乾トナシ煎シテ洗眼藥トナス。ヨリテ目木ノ稱アリ。又婦人ノ崩血ヲ治スルニ用フ。

- (616) Berberis, Sieboldi, Miq.

へびのぼらす。オホトリトマラス。

サハイバラ。イヌノシリツキ。伏牛花。

麓。

前種ニ類スル小灌木。前者ノ樹皮ハ暗灰色ニシテ葉ハ全邊。長サ四五分ノ倒卵狀ヲナシ全邊ナレドモ此モノハ樹皮帶紫黑色ニシテ葉モ大クシテ長一二寸ノ倒卵狀長楕圓形ヲナシ縁邊ニ毛狀鋸齒アリ。

◎藥用トシテハ一切ノ腫痛。風疾ヲ治ス。根枝葉トモニ焙リテ末トナシ温酒ニテ服ス。又健胃ノ効アリト云フ。往々栽エテ觀賞ス。

- (617) Berberis vulgaris, L. var. japonica, Rgl.

ひろはのへびのぼらす。オホへビノボラス。ナガミノへビノボラス。

喬。

莖高六七尺ヨリ一丈許。尋常葉ハ長倒卵形ニシテ縁邊ニ鋸齒毛ヲ有ス。葉脚漸尖。葉柄ヲ併セテ長サ一吋乃至三吋。幅三分乃至一吋。上面平滑ナリ。刺ハ單又ハ三岐ス。花ハ黄色ニシテ總狀花序ニ排列ス。果實ハ長楕圓形ノ漿果。熟シテ紅色トナル。

◎果實ハ疔疾藥トス。觀賞用トシテ栽培セラル。

(618) *Epimedium macranthum*, Moor. et Dcne.

いかりさう。ヤマドリグサ。カリガネサウ。淫羊藿。

麓。札打。天照教。

◎栽エテ觀賞ス。和漢古來陽ヲ補ヒ精氣ヲ益シ筋骨ヲ堅クシ人ヲシテ子アラシムトマテ言ヘリ。所謂陰痿ノ如キハ數回服用スレバ漸次回復スト云ヘリ。

(619) *Nandina demestica*, Thunb.

なんてん。ナリテン。ナルテン。ランテン。南燭。南天竹。

麓。大宮。北山。

◎莖葉共ニ雅致アルノミナラズ美果ヲ着クルヲ以テ庭園ニ栽エテ觀賞セラル。幹ノ大ナルモノハ床柱又ハ小器具ヲ作ルニ用ヒラル。葉ハ慶事ニ赤飯ヲ贈クルトキ之ヲ盛ル器中ニ添フ。漢方ニテハ泄ヲ止メ腫ヲ除キ筋ヲ強クシ氣力ヲ増シ鬚髮ヲ長クシ顏色ヲ益スト云ヘリ。葉ヲ採ミテ木灰ヲ水ニテ溶キマセ火傷ニクルレバ妙効アリト。又葉ヲ鹽ニテモミコレヲ吞メバ食物ノ停滯ヲ治ストテ熊野山民好ミテ使用セリ。尙世ニ傳フルコトアリ曰ク南天ノ實ヲ三粒水ニテ吞メバ酒ニ酔ハザルコト頗妙ナリト。

Ranunculaceae. 毛茛科

(620) *Aconitum japonicum*, Thunb.

とりかぶと。カブトギク。ウズ。ブシ。鳥頭。附子。

麓。喬。細紺野。八幡堂ノ上下。大宮口一合ノ上下。大宮新道一合ノ上。須走口(1750m.—1950m.)同一合ノ下。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。japaconitin ト稱スル鹽基ヲ含ミ。有名ナル毒草ナリ。サレドマタ藥用ニ供ス。從來北海道。樺太ノ土人ハ此根ヲトリテ魚油ト煉リ合セ矢毒ニ附シ以テ猛獸ヲ斃セリ。

(621) *Aconitum lycoctonum*, L.

れいじんさう。牛扁。

麓。喬。細紺野。八幡堂。須走口1900m. 大宮新道一合一合半。

少シクモアル多年草。葉ハ多クハ掌狀ニ五裂シタル單葉ニシテ裂片又鋭頭ノ缺刻或ハ齒牙ヲ有スレドモ前者ノ如キ深キ分裂ナシ。下部ノ葉ニハ長柄アレド最上部ノ葉ハ無柄ナリ花ハ前者ヨリ遙ニ小ク淡紫又ハ淡黄色ヲ呈シ。帽ハ圓錐狀圓壘形ニシテ少シク彎曲ス。

◎古來藥用ニ供シタル有毒植物ナリ。

(622) *Adonis vernalis*, L. var. *amurensis*, Fin, et Gagn.

ふくじゆさう。側金盞花。

麓。喬。八幡堂。

高一尺許ニ達スル多年草。葉ハ三五寸位ノ二回羽狀複葉ニシテ小葉ハ深裂シ裂片マタ鋭頭ナル線狀披針形ノ小部分ヲナシ一見セリノ葉ニモ似タリ。早春葉ニ先チテ黄色ノ美花ヲ開ク。

◎有毒ナレドモ觀賞ノタメ好ミテ栽培ス。

(623) *Anemone cernua*, Thunb.

おきなぐさ、白頭翁。

麓、富士根村、栗倉、村山、一里松、山中村、篠坂。

●花ハ觀賞ス。サレド刺戟性ノ毒アルヲ以テ過量ニ用フレバ死ヲ致スト雖、根莖葉共ニ藥用ニ供セラル。月經閉止劑熱性下痢劑トシ、マタ氣管ノ病ニ効アリト云ヘリ。

(624) *Anemone japonica*, S. et Z.

しうめいぎく、秋牡丹。

麓、入山瀬、大宮、栗倉、北山。

有毛ノ多年草。秋月直徑二寸許ノ美麗ナル紅紫色ノ花ヲ開ク。其花瓣ノ如キモノハ萼片ニシテ數多ク一見菊花ノ態アリ。◎觀賞用トシテ栽培ス。

(625) *Anemonopsis macrophylla*, S. et Z.

れんげしようま、クサレンゲ。

麓、北山、吉田口一合ノ上。

莖高三尺許ニ達スル多年草ニシテ觀賞ニ供ス。

(626) *Aquilegia buergeriana*, S. et Z.

やまをだまき。

麓、麓、喬、天照教、細紺野、八幡堂、大宮口一合、吉田口馬返五合、須走口1340m-1710m。

花瓣ノ下部及ビ萼片ハ褐紫色ニシテ花瓣ノ上部ハ淡黄色ナリ。而メ花瓣ハ萼片間ニ下方ニ伸出シテ距チナス。

◎觀賞用トナスベシ。

(627) *Cimicifuga foetida*, L. var. *intermedia*, Rgl.

さらしなしようま、クロシヨウマ。

麓、須走口(1400m)、長坂ノ上、鈴ヶ原。

莖高三四尺ニ達スル多年草ニシテ好ミテ溪間陰地ニ生ズ葉ハ數回三出複葉、小葉ハ尖頭卵形ヲナシ鋭頭ノ缺刻及

ビ齒牙アリ。夏秋ノ候長キ花軸ニ穗狀ヲナシテ白花ヲツク。◎觀賞ニ供スレド有毒ナリト云フ。

(628) *Cimicifuga biternata*, Miq.

みづばしようま、イヌシヨウマ。

ミヅフデ。

麓、喬、北山村高田、大宮新道一合、須走口1700m、長坂ノ上、吉田口一合。

産地及ビ發達ノ程度ニヨリテ其形態一ナラズ。通常いぬしよしまと呼ブモノハ主トシテ此種ノ葉ノ缺刻淺ク、葉末尖鋭ナラザルモノ、稱ナリ。有毒ナリ。

(629) *Clematis alpina*, Mill.

みやまはんしやうづる。

麓、灌、草、大宮口一合ノ下ヨリ四合目ノ西マテ、大宮新道一合、吉田口三合五合六合七合

高山ニ産ズル木質多年生ノ蔓草。葉ハ二回三出ニシテ長柄アリ。小葉ハ卵狀披針形、粗鋸齒アリテ甚ダ微ニ毛アリ。六七月頃葉腋ヨリ二三寸ノ長梗ヲ出シテ藍紫色ノ花ヲ着ク。花ハ萼片ヲ併有シ、直徑一寸乃至一寸五分許アリテ萼片ノ外縁ニ毛茸ヲ存ス。而メ花瓣ハ細長筒形、多數ニシテ萼ヨリ短シ。瘦果ノ尾ハ長クシテ概一寸。其毛ハ稍褐色ヲ帶ブ。◎觀賞ニ供スベシ。

(630) *Clematis apiifolia*, Dc.

ぼたんづる、女萎。

麓、栗倉、茶黄澤、大宮新道一合及其下。

微毛アル多年生ノ蔓草ニシテ葉ハ長柄ニヨリテ對生シ、三全裂シ小葉ハ略卵形ニシテ尖リ縁邊ニ二三ノ缺刻ヲ有シ葉裏ノ脉上ニ毛アリ。七八月頃圓錐花樣ノ聚繖花叢ヲナシテ葉腋ニ白花ヲ開ク。頗せんに人さうニ似タレド小クシテ直徑四五分。瘦果ハ毛ヲ密生ス。有毒ナリ。

(631) *Clematis heracleifolium*, Dc. var. *stans*, O. Kunze.

くさばたん。

麓。大宮。賽河原。粟倉。村山。札打。水土野。
一里松。大宮新道一合及其下。

稍木質ノ直立多年生ノ有毛草本ニシテ三尺許ニ達ス。雌雄異株。邦産本屬中獨リ直立莖ヲ有ス。有毒ナリ。

(632) Clematis japonica, Thunb.

はんしやうづる。

麓。バツカケ。吉田口一合。

蔓狀草本ニシテ莖ニ微毛アリ。葉ハ對生。三小葉ヨリ成リ小葉ハ卵形。鋭尖ニシテ粗鋸齒ヲ有シ。少シク伏毛ヲ見ル。萼ハ鐘狀暗紫色。外縁ニ毛茸アリ。花絲扁平ニシテ毛ヲ有ス。瘦果ノ尾ハ凡ソ一寸許ニシテ其毛ハ白シ。

◎屢々觀賞ニ供ス。

(633) Clematis paniculata, Thunb.

せんになさう。ハコボレ。大蓼

麓。大宮。賽河原。粟倉。村山。

◎有毒ノ蔓草。誤リテ食ヘバ口中腫レ痛ミテ齒脱落スト云フ。和方ノ膏藥中ニ此草ヲ交ヘテ膿水ヲ破ルニ用フ。民間僕麻質斯ニ外用ス。

(634) Coptis brachypetala, S. et Z.

せりばわうれん。

喬。八幡堂。

山陰ニ生ズス多年草。根生葉ハ明瞭ナル柄ニヨリテ三分シ。三區分各羽狀複葉ヲナシ。羽狀又羽狀ニ分裂シ。小葉又二三裂シテ鋭頭缺刻アリ。早春五七寸ノ花莖ヲ抽キ莖上二三ノ枝ヲ互生シテ其頂ニ一箇ノ白花ヲ着ク。其苞ハ線形。花ハ小形ニシテ萼片ハ線狀披針形ヲナス。本形ハほそげのせりばわうれんと稱スルモノ也。

◎根ヲ強壯劑トナシ又黃色ノ染料ヲトル。

(635) Coptis quinquefolia, Miq.

ばいくわわうれん。ゴカエフワウレン。

喬。大宮口。

宿根草ニシテ莖ハ地中ヲ匍匐ス。葉ハ掌狀複葉ニシテ五小葉ヨリ成リ。花ハ五瓣白色ニシテ梅花ニ類ス。葉形ノ五加ニ似タルヨリ五加葉黃連ト云ヒ。花形ニヨリ又梅花黃連トモ呼ブ。◎根莖ヲ葉用トス。

(603) Isopyrum stoloniferum, Max.

しろかねさう。

麓。喬。細紺野。八幡堂。吉田口一合。
大宮新道一合ノ四。

山陰ニ生ズル多年草ニシテ莖高六七寸ヨリ一尺許ニ達ス根生葉ハ三出複葉ニシテ下部葉ハ甚ダ長キ總葉柄ヲ有シ上部ノ葉ハ短キ總葉柄ヲ具ヘ。各小葉ハ小柄アル卵形ニシテ鈍頭ノ缺刻鋸齒アリ。三小葉中。頂葉ハ單。側葉ハ分裂シテ二三ノ有柄區分ヲナス。莖生葉ハ花梗下ニ對生ス。花ハ直徑四分許。白色ニシテ細キ花梗アリ。花梗ハ二三個。莖頂ニ生シ苞ヲ具フ。果實ハ蒴果ニシテ二個ヅ。開張シテ對生ス。根莖ハ細クシテ水平ニ横ル。此種ハさげのなニ類スレド此種ノ葉柄ノ基部ハ少シク擴大スルノミニシテさげのなノ如クニ甚シク膨大シタル膜質ヲナサザルノ異アリ。

(637) Paeonia obobata, Max. var. japonica, Mak.

やましやくやく。ヤマシヤクジャウ。

草芍薬。

麓。細紺野。八幡堂ノ下。バツカケ。
麓。大宮新道一合。須走口(1330m.-1700m.)

花ハ通常ノ芍薬ヨリ遙ニ小形ニシテ白色又ハ淡紅。

◎觀賞ニ供スベシ。

(638) Ranunculus acris, L.

うまのあしがた。オニゼリ。ウマゼリ。
オコリオトシ。毛茛。

麓。大宮。栗倉。村山。

◎有毒ナリ。伊藤圭介博士ノ有毒植物ノ圖説ニハ山民齒痛ヲ止メ或ハ瘡ヲ截ルニ此生葉ヲ搗キ罌ヲシ手ノ脉部ニ貼スルニ効アリトアリ。往々益愛セラル。

(639) *Ranunculus trichophyllus*, Chaix.

ばいくわも。ウメバチモ。

麓。吉原。大宮。

◎有毒ナレドモ往々水中ニ培養シテ觀賞セラル。

(640) *Ranunculus japonicus*, Langsd.

きつねのぼたん。オホゼリ。回々蒜。

麓。大宮。北山。村山。細紺野。

◎有毒草本ナレドモ賤民往々みつばト誤認シ食シテ腹痛吐瀉スルモノ多シ。瘡ヲ截リ齒痛ヲ止ルニ藥用ス。

(641) *Ranunculus sceleratus*, L.

たがらし。タ、ラビ。石籠茛。

麓。大宮。

無毛平滑ノ二年草ニシテ光澤アリ。好ミテ水田又ハ湿地ニ生ズ。花ハきつねのぼたんヨリ更ニ小ク。果實ハ多數小形ノ瘦果ヨリ成リテ橢圓狀壘形ヲナス。

◎誤リ食ヘバ頬腫シ或ハ衄血ス。本種亦瘡ヲ截ルニ用フ。

(642) *Thalictrum aquilegifolium*, L.

からまつさう。

喬。灌。大宮口(1800m. 2100m.) 雲切神社(一合ノ上)
須走口(1470m. 1500m.)

◎觀賞用トシテ栽培スレド小毒アリト云フ。

(643) *Thalictrum minus*, L.

あきからまつ。

麓。大宮。村山ノ上。鈴ヶ原。

高三四尺。此種ノからまつさうト異レトコロハ小葉ハ彼ヨリ廣クシテ彼ノ如ク尖鋭ナルコトナク。形不同ニシテ圓形。橢圓形等種々アリテ先端三裂スルヲ常トス。花モ彼ノ如ク美白ナラズ。

(644) *Thalictrum simplex*, L. var. *affine*, Rgl.

のからまつ。キカラマツ。

麓。大宮新田。村山。

莖高二三尺。莖ニ著大ナル稜條アリ。枝ハ少シ。小葉ハ稍長形ノ楔状ノ基部ヲ有シテ狭ク。頭ハ通常三裂。時トシテハ五七裂ノ銳頭ヲナシ。上部葉ハ殆ド無柄ナリ。花ハ前者ト同ク淡黄色ヲ呈ス。果實ハ無柄ノ瘦果ナリ。

Cercidiphyllaceae. 桂科

(645) *Cercidiphyllum japonicum*, S. et Z.

かつら。カモカツラ。ヲカツラ。アカキ。

喬。八幡堂。龜芝。大宮新道一合半ノ上。

幹高六七丈ニモ達スル落葉喬木ニシテ樹皮ハ灰色ヲ呈シ厚ク裂目アリ。大枝ハ直立シ小枝ハ細弱ニシテ緻ク垂下シ。新葉ノ色ハ微紅ヲ帶ブ。葉ハ對生。心臟形。鈍頭ニシテ細鋸齒アリ。雌雄異株。四五月頃葉ニ先チテ紅紫色ノ細花ヲ開ク。頗美ナリ。

◎邊材ハ帶暗黄色。心材ハ帶黄褐色ニシテ質ヤ、軟ク頗ほゞのきニ類ス。工作ヲ施シ易シト雖反張シ易シ家屋。橋梁。造船其他建築材料トシ又神像製圖板。張板。版木。碁盤。机。箱。釜蓋。琵琶胴。ラツケツト。組板。靴型度器。帽子型等ヲ作り又鉛筆材。櫛材トモナス。樹皮ハ

屋根ヲ葺クニ用ヒ又染料トナル。此葉ハ京都加茂ノ祭曲ニ用フル故ニかもかつらノ稱アリ。以テ抹香ヲ作ルベシ花ヲ活花ニ用フ。

Trochodendraceae. 雲葉科

(846) Euptelaea polyandra, S. et Z.

ふさざくら。ナツマンサク。カウノマンサク。タニグハ。サハグハ。雲葉。

喬。大宮口。須走口。吉田口。大堂新道一合。

落葉喬木。葉ハ廣卵形又ハ稍圓形。長尖頭。大小不齊ノ鋸鋸齒アリ。花ハ紫色。葉ニ先ニ開キ雄蕊房状ヲナス果實ハ扁平。秋ニ至リ熟シテ淡褐色ヲ呈シ翅ヲ有ス。

◎心材ハ赭色ヲ呈シ邊材ハ淡褐色。質硬ニ似テ光澤ヲ有シ割レ難ク。挽物細工。櫛。簪等ヲ造ル。樹皮ヨリハ鳥糞ヲトリ。樹ヲ庭ニ栽エテ觀賞ス。

Magnoliaceae. 木蘭科

(647) Magnolia, Kobus, Dc.

こぶし。ヒキザクラ。ヤマモクレン。コボシ。

麓。大宮。中畑。山中村。

◎邊材帶紫白色。心材帶黃淡赭黑色ニシテ質ほゞのきヨリ微ク硬シ。双物箱。製圖板。裁物板。樂器。鉛筆材。水棹。印板。箸等ヲツクリ或ハ丸太ノヤ、床柱トナセバ雅致アリ。樹皮ハ北海道士人ハ絲及ビ茶ニ代用ス。漢方ニテハ蕾及ビ樹皮ヲ瘡毒及ビ頭痛等ニ藥用ス。其他花ヨリ香水ヲトリ樹ヲ栽エテ觀賞ス。而メ其木炭ハ金銀琢磨用トス

(648) Magnolia hypoleuca, S. et Z. var. cocolor, Miq.

ほゞのき。浮爛羅勤。

麓。喬。栗倉。村山。細紺野。八幡堂。鈴ヶ原。大宮新道一合。

落葉喬木。葉ハ長倒卵形。微凸頭。全邊又ハ少シク波狀。上面平滑。下面粉白。微毛アリ。長一尺乃至一尺五寸アリ。新葉ハ紅色ヲ帶ブ。四五月頃枝頭ニ一大帶白色ノ花ヲ直上シテ開ク。香氣強シ。果叢ノ長四五寸。種子ハ外皮鮮紅ニシテ内皮黒色ナリ。こぶしノ花柱ハ果實ニ於キテ脱落スルモ此モノ、花柱ハ宿存ス。

◎邊材ハ狭クシテ黒紫色。心材ハ帶紫黑色。質輕軟ナレドモ伸縮反張ノ憂ナシ。双物箱。製圖板。裁物板。樂器。組板。木履其他匣類。彫刻カ。傘柄。硯箱。重箱。漆器。木地等ニ賞用ス。又鉛筆材。燐寸軸トモナス。而メ炬燵槽ノ如キ火熱ノ吸收ヲ避クベキモノヲ作ルニ適ス。此木炭ハ質微細ナレバ金銀及ビ金漆琢磨料トシテ賞用セラレ又三ヶ月様味噌漬トシテ荒レタル肌ヲ洗フニ用フ。

◎樹皮ハ收斂劑トナリ果實ノ煎汁ハ疝氣ニ効アリト稱セラレ。葉ハ竹箨ニ代ヘテ食物ヲ包ムニ用ヒ樹ヲ栽エテ觀賞ニ供ス。

(649) Kadsura japonica, Dunal.

さねかづら。オホスケカヅラ。フノリカヅラ。ドロリノカヅラ。ビナンカヅラ。ピンツケカヅラ。トロロカヅラ。

麓。大宮。

木質常緑ノ蔓性植物ニシテ多量ノ粘液ヲ含ム。花ハ白色ニ微黄ヲ帶ビ。果實ハ綠色ノ小球形ニシテ其果叢ハ球形直徑一寸餘ニ達ス。

◎庭園又ハ盆中ニ栽エテ觀賞シ。莖ノ粘液ヲ製紙ノ糊料トシ或ハ之ヲ頭髮ニ塗布ス。對島地方ニテハ其液ヲ絹布ノ

のり付ニ用ヒテ光澤ヲ出サシム。果實ヲ強壯刻。咳ノ葉トナス。

(650) *Schizandra nigra*, Max.

まつぶさ。

喬。村山。細紺野。

前者ニ似タレド葉頗廣ク上端急ニ短尖。全邊。果實ハ倒卵形又ハ卵形熟シテ稍々黒色。前者ノ種子ハ平滑ナルモ此種ノモノニハ疣状ノ突起アリ。

Ceratophyllaceae. 金魚藻科

(651) *Ceratophyllum demersum*, L.

きんぎよも。コイモ。

麓。大宮。

●金魚ヲ飼養スル器中ニ入レテ樂ム。故ニ其名アリ。

Nymphaeaceae. 睡蓮科

(652) *Nympha tetragona*, Georg. var. *angustata*, Casp.

ひつじぐさ。睡蓮。

麓。吉原。大宮。

水中ニ生ズル多年草。根莖ハ水底ヲ匍匐シ葉ハ水面ニ浮ブ。モト午後二時即未ノ刻頃ニ開花スルヨリ其名ヲ得タリ。此花開キテハ閉ゲ。四五日開キテハ閉ゲ途ニ脱落ス

●観賞用。食用。薬用。

Goryophyllaceae. 石竹科

(653) *Arenaria serpyllifolia*, L.

のみのつどり。

麓。阿幸地。

のみのふすまニ似タレド莖ハ多ク分岐シテ叢生シ。葉ハ彼ノ如クニ長カラズ。花瓣モ亦分裂セザルノ異アリ。

(654) *Cerastium triviale*, Link, var. *glandulosum*, Koch.

みゝなぐさ。卷耳。

麓。大宮新田。白糸。

莖葉共ニ微毛アリ。葉ハうしはこべノ葉ヨリハヤ、狭小ナリ。花ハ小形。五瓣白色ニシテ瓣端ニ裂ス。

(655) *Cucubalus baccifer*, L. var. *japonicus*, Miq.

なんばんはこべ。ツルセンノウ。狗筋蔓。

麓。北山。仁杉。山中村。

莖ハ蔓状ヲ呈スル多年草。葉ハ卵形又ハ長卵形ニシテ大サ五六分乃至一吋アリテ鋭頭ナリ。夏月葉腋ヨリ分枝シテ梢梢ニ通常一花ヲ着ク。花ハ割合ニ大クシテ鐘状ノ合片萼ト淡黄淡色ノ五花瓣トナ有ス。果實ハ球形ノ漿果ニシテ黒色ニ熟ス。本科ニテ漿果ヲ結ブモノハ獨リ此種アルノミ。

(656) *Dianthus superbus*, L.

かはらなでしこ。ナデシコ。ヤマトナデ

シコ。瞿麥。

麓。大宮新田。一里松。御殿場口太郎坊ノ下。
麓。鈴ヶ原。籠坂。

●観賞用トス。即秋ノ七草ノ一ナリ。漢方ニテハ種子ヲ通經。利尿ニ用フ。

(657) *Lychnis Miqueliana*, Rohrb.

ふしぐろせんわう。

麓。村山。バツカケ。大宮新道一合及其下。

莖高二三尺ノ直立草本。節ハ膨起シテ紫黒色ヲ帯ブ。七八月頃黄赤ヲ多クハ三個ヅ、聚繖花序ヲナシテ梢枝ニ開ク。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(658) *Sagina*, Linnaea, Presl var. *maxima*, Max.

つめくさ。スマメグサ。漆姑草。

麓。大宮新田。

◎諸島ノ足ヲ傷ケタルトキ此草ノ汁ヲ用フレバ治ス。又漆瘡ヲ治ト云ヘリ。

(659) *Silene aprica*, Turcz. var. *firma*, Willd.

ふしぐろ。カハラゴマ。女蓼菜。

麓。大宮。阿幸地。白糸。富岡。水土野。

莖高二三尺ノ直立草本。硬質ニシテ多少ノ微毛ヲ有シ節ハ帯黒色ナリ。秋ニ至レバ屢々紅紫色ヲ帯ブ。葉ハ長楕圓狀披針形ニシテ上部ノモノハ殊ニ細シ。花ハ小クシテ五瓣白色ナリ。

(660) *Stellaria aquatica*, Scop.

うしはこべ。繁縷。

麓。大宮新田。粟倉。須走。

はこべヨリ大ナリ。効用相同シ。はこべノ條ヲ見ヨ。

(661) *Stellaria florida*, Fisch. var. *angustifolia*, Max.

いはつめくさ。

灌。草。地。大宮口一合ノ直下ヨリ3000mノ上ニ至ル須走口一合以上。吉田口五六七合。

諸高山ノ草本帯及セ其附近ニ在リ。莖ハ平滑。叢生ニ高三五寸アリ。葉ハ對生。無柄。線形又ハ線狀披針形。鋭尖頭。長五分ヨリ一寸ニ達ス。夏月花アリ。花ハ白色。長梗ヲ有シ深ク二裂セル五花瓣ヲ有シ。内ニ拾個ノ雄蕊ト三個ノ花柱ヲ有スルニ雄蕊トナ有ス。花瓣ハ萼片ヨリ長キコト殆ド二倍ニシテ子房ハ卵形ナリ。

◎土人ハ藥用トナス。嫩苗葉ハ食フコトヲ得。

(662) *Stellaria*, *Nemorum*, L. var. *japonica*, F. et S.

みやまはこべ。マルバハコベ。

麓。喬。大宮口。須走口1500m。

莖葉共ニ其質軟弱ニシテ莖ハ稍地シ臥シ。長サ一尺餘ニ達シ一線ノ毛華ヲ存ス。莖ハミナ有柄。廣卵形鋭頭ニシテ其脚稍心臟形ヲナシ毛ナシ。夏日葉腋ヨリ通帯一個ノ白花ヲ開ク。花瓣深ク二裂シ花柱ハ三個アリ。

(663) *Stellaria media*, Cyr.

はこべ。ハベラ。ヒヅル。

麓。大宮新田。

うしはこべハ花モ葉モ大ク。花柱五個アルモ此モノニハ三個ノ花柱アリ。彼ニハ葉面脈條ノ處並ニ葉緣波皺ヲ有スルコトアルモ此モノニハ之ナシ。且ツ此モノノ莖ハ彼ノ莖ノ如クニ紅色ヲ呈スルコトナシ。

◎春ノ七草ノ一ニシテ又小鳥ノ飼料ニ賞用ス。はこべ搥ナモ製ス。莖葉ノ搾リ汁ハ創傷ニ塗布シテ偉効アリ。婦人産後乳汁ノ出テザル時服用スレバ乳汁多量ニ分泌ス。

(664) *Stellaria uliginosa*, Murr.

のみのふすま。スマメノアミ。スマメグサ

麓。大宮。宮原。

Portulacaceae. 馬齒莧科

(665) *Portulaca oleracea*, L.

すべりひゆ。トンボグサ。ギツチヨグサ
馬齒莧。

麓。大宮。宮原。

莖ハ平臥シテ直上スルコトナシ。圓クシテ赤ミチ帯ビ。
枝多ク全草肥厚ニシテ葉軟多汁ナリ。此葉緑ニ梗赤ク花
黄ニ根白ク子黒キヲ以テ五行草トモ云ヘリ。

- ◎諸ノ腫瘡及ビ蜂ニサ、レタル時此汁ヲツケテヨシ、淋病
ニハ此汁液ヲ飲メバ痛去リテ全治スト云ヘリ。サレド身
ヲ冷スモノニテ多食スレバ孕婦其胎ヲオトスト云フ。又
嫩莖葉ハ煮テ食ヒ又ユデテ和物トナシテ可ナリ。

Amaranthaceae. 苋科

- (666) *Achyranthus bidentata*, Bl.

ぬのこづち。ヌスビト。トビツキ。牛漆。
麓。入山瀬。大宮。宮原

莖高二三尺ヤ、方ニシテ節高シ。葉ハ對生。卵狀楕圓形
ニシテ尖リ一見柿ノ葉ノ如クナルモ差尖リ短毛アリ。花
ハ少ク綠色ニシテ集リテ長キ穗ヲ作ル。花後ノ小刺實ハ
頗人衣ニ襲キ易シ。

- ◎地下部ヲ收斂刻。利尿刻トナス。和漢方ニテハ惡血ヲ去
リ。溜飲及ビ淋莖病△ヲ治シ。又カミ綱シテ竹木ノ肉中
ニササリタルニ塗レバ容易ニ出ヅ。麝香ト共ニ胎ヲ墮ス
コト甚ダ捷シト云フ。

- (667) *Amaranthus*, *Blitum*, L.

いぬびゆ。ノビユ。野苋。
麓。北山。宮原。

- (668) *Celosia cristata*, L.

けいどう。雞冠。
麓。大宮。御殿場。須走。

- ◎花ヲ觀賞シ嫩葉ヲ食トス。又花ノ汁ヲ加ヘテ色餅ヲツク
ニ使用ス。實モ花モ葉モ共ニ痔疾ニ煎シ用ヒテ効アルノ

ミナラズ總ベテ血病ニ用ヒテ温熱ヲ去ルト云フ。

Chenopodiaceae. 藜科

- (669) *Chenopodium album*, L.

あかざ。藜。
麓。富岡。宮原。

- ◎葉ヲ食用ニ供シ老セル莖ヲ杖トスレバ輕クシテ曳キ易
シ。漢方ニテハ蟲ヲ殺シ癩風。疣。黒子ヲ去レニ用フ。

- (670) *Kochia scoparia*, Schrad.

はゝきぎ。ハウキグサ。地膚。
麓。(民家)

- ◎莖枝ヲ草帯トナシ葉及ビ若キ花實ヲ食用ニ供ス。又利水
ノ目的ニテ藥用トス。

Polygonaceae. 蓼科

- (671) *Fagopyrum esculentum*, Moench.

そば。蕎麥。
麓。大宮。粟倉。

- ◎種子ヨリ蕎麥粉ヲ製シ。マタ嫩莖葉ヲ食トスベシ。而シ
テ葉根ヲ漬クル時層々蕎麥稈ニテ被ヒオクトキハ其漬物
ノ色ヲ鮮美ナラシム。蕎麥ノ粗穀ハ柔粗ニシテ頭熱ヲ去
ルト稱シテ枕ニ容ル。

- (672) *Polygonum alatum*, Ham.

たにそば。ソバタデ。アカヅラ。
麓。村山。札打。宮原。

莖初メ地ニ臥シ。後漸ク頭ヲ擡グ。長サ二三尺ニ至ルモ

ノアレドモ高サハ一尺ヲ超エルモノ稀ナリ。全体淡緑色ニ微紅ヲ帯ブ。葉ハ本潤ク末尖リテヤ、三角状卵形ヲ呈シ一吋前後アリ。葉身ノ其脚ハ漸次葉柄ニ流レテ耳ヲナシ以テ莖ヲ擁ス。梢葉ハ三角状披針形ヲ帯ブ。夏秋ノ候枝梢葉腋ニ多少ノ細花ヲ擧簇ス。花ハ白質ニシテ先端ニ淡紅ヲ帯ビ。苞ハ概ネ卵形ナリ。花梗ノ外、平滑ナリ。

(673) *Polygonum debile*, Meisn. var. *trangulare*, Meisn.

みやまたにそば。ミヤマミゾツバ。

麓。喬。細紺野。八幡堂。須走口1400m.

高一二尺ニ達スル草本ニシテ半匍匐ス。莖ハ纖細ニシテ葉ハ等邊三角状ヲナシ先端尖リ。左右ニ尖起シテ殆ド蝙蝠形ヲナス。たにそばノ如クニ狭長ノ葉ヲ有セズ且ツ葉柄ハ頗細クシテ彼ノ如クニ莖ニ流ル、ノ翼ナシ。葉面微毛及ビ下向セル鎌形ノ薄キ黒起ヲ存ス。花ハ帶紅白色ニシテ盛夏ニ開ク。花梗極メテ細ク。數本枝ノ先端ヨリ生シ。疎々相集リテ頭状花序ヲ形ツクル。

(674) *Polygonum flaccidum*, Meisn.

ぼんとくたで。

麓。大宮。御殿場。

葉ハ卵状披針形ニシテ鋭尖頭。普通ノいぬたでヨリハヤ、硬質。糙澁且ツ葉面ニ黒記ヲ存ス。花ハ疎々ト散生シ他ノ蓼類ノ如クニ密布スルコトナシ。マタいぬたでヨリハ花微大ニシテ蕾ノトキハ紅色ヲ呈シ開ケバ淡紅色トナル。

(675) *Polygonum, Hydropiper*, L.

やなぎたで。アヲタデ。

麓。水土野。

莖ハ綠黄色又ハ少シク紅褐色ヲ帯ビ。葉ハ概針形ニシテぼんとくたでヨリ狭シ。葉面平滑ニシテ黒記ナク。花穂

ハぼんとくたでニ以テヤ々纖細。辛味アリ。

◎葉ヲ調味料トナス。培養スル諸種ノ蓼ハ概此種ノ變形ニカ、ル。古來霍亂及ビ小兒頭瘡ヲ治スルニ用フ。又ヨク水氣ヲ下シ目ヲ明ニスト云ヘリ。

(676) *Polygonum, Hydropiper*, L. var. *leetevirens*, Mak.

あむたで。ホンタデ。

莖葉共ニ藍ニ似テヤ、狭ク。味辛シ。

◎辛味アルヲ以テ調味料及ビ薬用トス。

(677) *Polygonum brevichreatum*, Mak.

ほそばのやのねぐさ。

麓。八幡堂ノ下。

莖ハ横臥シ高一二尺。纖弱ニシテ逆刺ハ甚ダ微小ナリ。節間長ク。疎ニ枝アリ。葉ハ披針形。ヤ、薄ク。長一二寸。基部ハ矢ノ根形ヲナシ。葉柄短クシテ一分乃至三分許。九月頃枝ノ頂上ニ一ニ二又ハ三匹個ノ白質帶紅ノ細花ヲ着ク。鞘ノ先端ハ水平又ハヤ、斜ニ切りタルガ如シ。

(678) *Polygonum hastato-sagittatum*, Mak.

ながばのうなぎつかみ。ナガバノウナギヅル。

喬。大宮新道一合。

水邊ニ生ズル草本ニシテ逆向スル小刺アル細長キ莖ヲ有ス。葉ハ披針形ニシテ稍戟形ヲナセル基部ヲ有シ。葉柄ニ鞘状托葉ヲ具ヘ互生ス。花ハ小形無瓣ニシテ紅色ノ萼ヲ有ス。

(679) *Polygonum nodosum*, Pers.

おほいぬたで。

麓。水土野。

(680) *Polygonum polymorphum*, Ledeb. var. *japonicum*, Max.

おんたで。イハタデ。

草。灌。地。御殿場口一合以上。須走口117. m. ヨリ現
レニ三四合最多シ。大宮口一合ノ下ヨリ
七八合迄。吉田口五合ノ上ヨリ七合半迄

高山特有ノ多年草。莖一尺乃至三尺。緑色或ハ淡紅ヲ帯
ビ。莖ノ節ニ托葉アリテおほけたでニ似タレド彼ノ如ク
ニ著毛ナラズ。下部ノ葉ハ大ニシテ廣ク。廣卵形ニシテ
其端尖リ。或ハ屢球形ニ廣ク。長四五寸濶二三寸殆ド全
邊ナリ。葉質厚クシテ硬ク。粗糙ナリ。梢上葉ハ披針様
ニ近シ。毎年宿根ヨリ生ジ。七八月頃梢上多數分枝シテ
細長ナル穗状花序ヲナシ帯黄白色ノ細花ヲ綴ル。

◎山民薬用トス。嫩苗葉ハ採リテ蔬トナスベシ。

(681) *Polygonum Yokusaiana*, Mak.

はなたで。

麓。大宮新田。

高一二尺。葉ハ有柄。長卵形ニシテ漸尖頭ヲ有シ。軟弱
ナリ。いぬたでニ比スレバ葉ヤ、濶短ニシテ面背共ニ微
毛アリ。托葉ハ長ク。鞘状ニ結合シテ莖ヲ圍ミ。縁部ニ
長毛ヲ具フ。花色ノ紅暈次者あかのままヨリ更ニ淡ク
穂モ亦花ノ疎々トシテ且ツ長キヲ以テ彼ト別ツベシ。

(682) *Polygonum Blumei*, Meisn.

いぬたで。アカノマミ。馬蓼。

麓。大宮。富士根村。札打。北山。白絲。
鈴ヶ原。

通常各地ニ普ク産ズル品種ナリ。葉ハ披針形。長楕圓形
ニシテ尖ル。夏秋ヲ通シテ久シク花アリ。前種ハ葉廣ク
シキ兩端狹捲シ。花穂ハ其花粗ナルヲ以テ此モノト別ツ
ベシ。

(683) *Polygonum sagittatum*, L. var. *sibiricum*, Meisn.

うなぎつかみ。ウナギヅル。雀翹。

麓。大宮。村山。大宮新道一合。

(664) *Polygonum senticosum*, F. et S.

ままこのしりぬぐひ。

麓。粟倉。

莖ハ四稜形ニシテ角ニ沿ヒテ逆鉤アリ。莖ハ紅色ヲ帯ビ
テ蔓性ヲナシ。葉ハ略三角形ニシテ基部心臟形ヲナシ葉
柄ノ逆鉤亦著シ。

(685) *Polygonum sagittatum*, L. var. *americanum*, Meisn.
forma *sieboldi*, Mak.

あきのうなぎつかみ。アキノウナギヅル

麓。大宮。村山。大宮新道一合。

全体うなぎつかみヨリ長大ナリ。此種マタ花期ト莖ノ横
斜スルトニヨリテうなぎつかみト相區ツベシ。

(686) *Polygonum Thunbergii*, S. et Z.

みぞそは。ウシノシタヒ。タソバ。

イヌソバ。苦蕎麥。

麓。北山。上吉田。

そばニ似タル草本ナレドモ好ミテ溝側。田傍等ニ生ズ。
莖軟弱ニシテ殆ドつる草ノ状ヲ呈シテ直上スルコトナシ
莖ハ細刺毛ヲ帯ビテ微ニ糙澁ナレドモ。さてぐさ或ハま
まこのしりぬぐひノ如クニ著シカラズ。花ハ白質ニ微紅
ヲ帯ブ。◎民間莖葉共ニ採取シテ冷麻質斯ニ煎服ス。

(687) *Polygonum Thunbergii*, S. et Z. var. *Maackianum*,
Meisn.

さでくさ。

麓。十里木。三倉。浮島原。

草状みぞそばニ類ス。莖及ビ葉背ノ大脉上ニ多クノ逆向
セル剛刺ヲ有ス。葉ハ長柄ヲ有スル戟形ニシテみぞそば

ヨリ差く細長ク。托葉ヨリ成レル鞘部ハ膜質ノ上部ニ葉状ノ縁邊ヲ有シ。逆刺ヲ有スル有様等ハマまこのじりぬぐひニモ似タレド花數ヤ、少ク。葉形モヤ、狭長ナルヲ覺フ。

(688) *Polygonum, Virginianum*, L.

みづひき。金線草。

麓。バツカケ。細紺野。宮原。大宮新道一合。

◎觀賞ニ供シ又淋病ニ白糖ト煎ツテ服用ス。

(689) *Polygonum viscoferum*, Mak.

ねばりたで。

麓。篠坂。籠坂峠。水土峠。須走ノ上。

莖ニ粘液アリテヨク人ニ粘着ス。

(690) *Polygonum viscoferum*, Mak. var. *robustum*, Mak.

おほねばりたで。

麓。上吉田。大宮新田。

頗ねばりたでニ類スレド彼ノ如クニ著クモヲ有セズ且ツ葉ノ狭キ披針形ヲナスノ異アリ。

(691) *Reynoutria japonica*, Houtt.

いたざり。サストリ。スイカンボ。虎杖

麓。喬。灌。御殿場口太郎坊同一合。大宮。賽河厚。北山。村山。吉田口中ノ茶屋同六合七合半。上井出。大宮口二三合。須走口(860)m. - 1150m. - 2000m. - 二合

◎嫩莖ヲ生食ス。マタ煮テモ漬ケテモ蔬トナスベシ。葉ヲ烟草ノ代用トス。虎杖ハ古來淋病ニ用フ。經水ヲ通ズレド孕婦ニハ忌ムト云ヘリ。熊野山民ハ嫩葉ヲ乾燥シオキテ解熱劑ニ使用ス。

(692) *Reynoutria japonica*, Houtt. var. *humilis*, Nakai.

めいげつさう。

草。吉田口六七合。其他ノ各方面。

いたざりノ一變種ニシテ淡紅色ノ花ト帶紅色ノ果實トヲ有ス。

(693) *Rumex japonicus*, Meisn.

ぎしぎし。ノダイワウ。シブクサ。羊蹄麓。宮原。

草狀頗酸澁ニ似タレド。較々大ク葉ノ本彼ノ如ク股ヲナサズ。彼ハ冬春ノ間葉脈新苗。紫色ヲ帶ベトモ此モノハ其事ヲ必トセズ。且ツ彼ハ酸味アレドモ此モノハ然ラズ花ハ綠白色ニシテ穗狀ヲナシ層ヲナシテ下垂ス。花被ハ六片ヨリ成リ内部ノ片ハ増大成長シテ小形ノ堅果ヲ包ミ翼ハ廣卵形又ハ心臓形ヲ呈ス。外部下面ノ中央ニ粒状ノ隆起ヲ生ズ。盛夏ノ際ニハ明カナラザレドモ稍老ユレバ著シ。根ハ長大ニシテ黄色ヲ呈ス。

◎古來根ヲ瘡毒。疥癬。痔疾等ニ貼用シ煎ツテ産後ノ便秘ヲ治ズ。葉ハ小兒疳蟲魚毒ヲ除キ。實ハ痢病及ビ婦人血ノ道ニ用フベシ。

(694) *Rumex acetosa*, L.

すいば。アカギシキシ。スカンボ。酸模麓。大宮。御殿場。

葉ハ長卵形ニシテ尖リ。基部ハ稍々箭形ヲナス。雌雄異株ニシテ花ハ赤味ヲ帶ブ。

◎若キ莖葉ヲ食用トス。又藥用トナスベシ。

Aristolochiaceae. 馬兜鈴科

(695) *Aristolochia debilis*, S. et Z.

うまのすゞくさ。ウマノスゞカケ。オハグログサ。馬兜鈴。

麓. 御殿場.

多年生ノ纏繞草本。葉ハヤ、やまのいも葉ニ類シ。花ハ葉腕ニ單生シ不整齊ニシテ一見馬頭鈴ノ如ク。上部黒紫色ニシテ下部ハ綠色ヲ呈シ。其本筒狀チナス所多少膨脹ス。●有毒ナレ共根ヲ清血、通經ノ藥トシ。果實ヲ祛痰劑トシ民間之ヲ淋病ニ用フト雖多量ニ服スレバ死ヲ致スコトアリ。

(696) *Aristolochia, Kaempferi, Willd.*

おほばうまのすすくさ。

麓. 三倉.

前種ヨリ遙ニ肥大ニシテ下部ハ木質ナリ。葉ハ大形ニシテ厚ク。長柄ヲ有シ。彼ノ如クニ濃綠色ヲ呈セズ。其下部ノモノハ基部左右ニ擴リテ耳形チナシ。上部ノモノハ卵狀心臟形チナシ。葉背毛茸密布ス。花モ著シク大形ニシテ黄色チ帶アルノ異アリ。●前種ニ同シ。

Santalaceae. 檀香科

(697) *Thesium chinensis, Turz.*

かなびきさう。百蕊草。

麓. 大宮. 宮原. 阿幸地. 須走口.
麓. 御殿場. 大宮新道一合ノ下

莖一尺前後ニ達スル纖細ナル半寄生草本ニシテ淡綠色チ呈ス。葉ハ狹長ニシテ尖リ花ハ白色ニシテ微小ナリ。

Loranthaceae. 槲寄生科

(698) *Viscum album, L.*

やどりぎ。ホヤ。トビツタ。

カラスノウエキ。

麓. 村山. 須走吉田間. 上吉田淺間社内.

えのき其他ノ樹木ニ寄生スル常綠植物ニシテ木質ノ莖ヲ有シ。莖ノ若キ部ハ綠色ナリ。葉ハ革質ニシテ對生シ。V字形チ成ス。枝モ亦節毎ニ二又或ハ三又ニシテ末頭ニ葉チ着ク。雌雄異株。三四月頃帶黄白色ノ花チ葉腕ニ開ケ果實ハ南天大ノ漿果ニシテ之チ破レバ粘滑ナリ。鸚鵡ノ類好ミテ之チ食フ。種子ハ堅硬ニシテ鳥糞ト共ニ樹上ニ排出セラレテ茲ニ發芽ス。

●宿主ニ有害ナリ。果實粘滑ナル肉部チ鳥糞トナス。

Urticaceae. 蕁麻科

(699) *Boemeria holosericea.*

おにやぶまを。ノマヲ。ヲリ。

麓. 大宮.

莖高三四尺ニ達スル直立生ノ多年草。木質ノ葉ト強韌ナル韌皮トチ有ス。有毛ニシテ糙澁ナリ。枝少シ。葉ハ大ナル卵圓形ニシテ徑四五寸。尖頭。有鋸齒厚クシテ毛チ密生シテ糙粗ナリ。

(700) *Boemeria grandiflora, Wedd.*

やぶまを。ヤブカラムシ。

麓. 大宮. 栗倉. 北山.

外面ニ短キ毛茸アレドモいらくさノ如クニ人チ刺スコトナシ。葉ハ廣卵形ニシテ大鋸齒チ有シ。有毛ナレドモおにやぶまをノ如クニ厚ク且ツ粗糙ナルコトナシ。

●韌皮纖維チトリテ緒トナス。

(701) *Boemeria tricuspis, Mak.*

あかそ。

麓. 大宮. 宮原. 北山. 瀧ヶ原. 権現モヤ.
茶黄澤. 籠坂. 大宮新道一合.

莖高二三尺。莖及ビ葉柄ハ赤色ヲ帯ブ。葉ハ卵形ニシテ不整ノ鋸齒ヲ有シ先端ハ龜尾狀ヲナシ。葉面ニ微毛アリ花ハ單性。淡黄綠色ニシテ夏秋ノ候葉腋ニ長穗狀ニ綴ル
◎靱皮纖維ヲ用フ。越後ノ人ハ秋ニ至リ刈リ採リテ皮ヲ剥キ。灰汁ニテ練リ混セ。石ノ上ニテ擲キ水ニテ浸シ。簀上ニ置キ形細竹ヲ以テ打チ綿トナシ。布子ノ綿ニ用ヒ。あかわたト稱ス。

(702) *Boemeria nivea*, Hook. et Arn.

からむし。アヲ。苧麻。

麓. 大宮. 北山.

莖ハヤ、木質ヲ呈ス。葉ハ心臟卵形ニシテ尖リ背面ハ白粉ヲ撒布スルガ如ク白シ。

◎靱皮纖維ハ細美ニシテ光澤ニ富ミ一見絹ノ如ク且ツ強靱ナリ。其上品ハ織物ノ原料トナリ下品ハ繩索ヲ造ル。琉球上布。越後縮。奈良晒。木津晒。近江晒等ハ皆此種ヲ以テ織リ成セリ。近來舶來セルラミー (Ramie) ハ此一變種ニシテ外國ニテハ窓掛。手巾。卓子掛。夏衣等ヲ織ル

(703) *Boemeria sieboldiana*, Bl.

ながばやぶまを。クサマヲ。

麓. 大宮.

莖少シク紅色ヲ帯ビ。枝少シ。葉ハ軟弱。長柄ヲ有シ。卵狀披針形。漸尖頭ニシテ長五寸許。葉面僅ニ糙澁ニシテ縁邊ニ中大ノ鋸齒アリ。

◎靱皮纖維ヲ工業ニ用フ。

(704) *Boemeria spicata*, Thumb.

こあかそ。小蕎麥。

麓. バツカケ林中. 茶黄澤. 大宮新道一合.

莖高三四尺ニ達スル木質狀植物ニシテ多枝ヲ有ス。皮ハ赤色ヲ呈シ一見あかそニ似タレド其枝葉ハ細小ナリ。

◎越後ニテハなろト稱シ秋ニ至リ其靱皮ヲトリテ布ニ織ル

(705) *Elatostemma sessile*, Forst. var. *Cuspidatum*, Wedd.

ときほこり。

喬. 八幡堂附近.

陰濕ノ地ニ生ズル多年草ニシテ高五六寸。通常ハ傾斜シ柔軟葉質ナリ。葉ハ互生稍長倒卵形ニシテ尖リ。兩列ニ排ビ。無柄ニテ顔うはばみさうニ似タリ。夏秋ノ際葉腋ニ淡綠色ノ微花ヲ多數ニ攢簇シテ略球狀ヲナス。雌花ハ苞ノ合ニシテ生セル花托上ニ位シ。有柄ナルコトうはばみさうト同様ナリ。

(706) *Elatostemma umbellata*, Bl. var. *majus*, Max.

うはばみさう。クチナハジヤウゴ。

赤車使者。

麓. 喬. 細紺野. 白絲. 八幡堂附近.
三坂峠ノ下リ坂.

深山溪側ノ陰地ニ生ズル小草ニシテ高一尺許。軟弱ニシテ葉腋ヲ含ミ莖ハ直立スルコトナクシテ傾斜ス。葉ハ淡綠色。長橢圓形或ハ卵狀披針形ニシテ銳頭鋸齒縁アリテ一見むくノ葉又ハけやきノ葉ニ似テ互生ニ排列シ。其相對スル葉ハ其大サヲ異ニシ或ハ一小葉トナリ或ハ托葉ノミ發達セルモノアリ。五月頃葉腋ニ極メテ微細ナル綠白色ノ花ヲ小頭狀ニ簇生ス。根ハ淡紅色。此種秋ニ至レバ葉腋ニ肉芽ヲ出シ莖モ節モ切レテ各一株トナリ以テ繁殖ス。◎嫩苗葉ハ以テ蔬トナスベシ。

(707) *Laportea bulbifera*, Wedd.

むかごいらくさ。

麓. 細紺野. 龜芝. 須走. 大宮新道一二合間.

いらくさニ似タル草本ニシテ莖高二尺許。莖及ビ葉柄ニ

彼ノ如キ軟毛アリ。葉腋ニ肉芽ヲ生ズルノ異アリ。

◎愛乃人ハ其肉芽ヲ食スト云フ。

(708) *Nanocnide japonica*, Bl.

かてんさう。ヒシバカキトホシ。

麓。大宮。

陰地ニ生ズル柔軟ナル一年草ニシテ莖ハ方形チナシ。高數寸乃至一尺許ニ達ス。葉ハかきとほしノ葉ニ酷似スレド互生スルト其基部ノ楔形チナストノ異アリ。又葉ハ甚ダ菱ノ葉ニ似タルヨリひしばかきとほしノ異名アリ。三四月頃莖頂ノ葉腋ニ細莖ヲ抽出シテ白綠色ノ細花ヲ開ク此種ノ雄蕊ハ花絲ニ彈力ヲ有シ。時來レバ急ニ延ビテ白色ノ花粉ヲ吐ク。

(709) *Pellionia radicans*, Wedd.

さんせうさう。ハヒミツ。

麓。白絲瀧。

水濕ノ多キ陰地ニ生ズル小草ニシテ葉形略山椒ノ葉ニ似タルヨリ其名アリ。又みづノ名ハアレドみづトハ遙ニ狭小且ツ莖地ニ這ヒテ長ク延ビテ處々へ細根チ下スノ異アリ。

(710) *Pilea*, Hamaoi, Mak.

みづ。ミヅナ。

喬。麓。大岩。入幡堂。

陰濕ノ地ニ生ズル草本ニシテ莖ハ鈍方。多液柔滑ニシテ淡綠色チナシ且ツ紅暈アリ。節著シ。葉ハ苧麻葉ニ似テ更ニ小ク。柄ヲ有シ枝葉對生ス。秋月毎葉腋ニ短柄アル多クノ細花ヲ簇生ス。雌雄異株。雄花ハ其片側ニアリテ白質。雌花ノ花蓋ハ通常三深裂シ。聚繖花序ヲ爲ス。此種一見苧麻ノ如クナルモ彼ノ如キ軟毛ナク且ヤ、小形ニシテ頗る滑柔ナルノ異アリ。みやまみづニ似タレド花ハ長

莖ナク。葉モ亦小ナリ。◎苗葉ヲトリテ蔬トナスベシ。

(711) *Pilea petiolaris*, Bl.

みやまみづ。

麓。村山。北山。細紺野。白絲瀧。

みづヨリ微大。みづノ花ハ葉腋ニ攢簇スルモ此モノハ葉腋ニ細莖ヲ出シテ横ニ延ビ且ツ分叉シテ細花ヲ小穗狀ニ綴ル。葉ハ有柄。卵形ニシテ尖リ。長三寸内外幅二寸許鋸齒アリ。三脉著シク面ニ軟刺毛ヲ粗生ス。雌花ノ花被ハ三裂ス。

(712) *Pouzolzia hirta*, Hassk.

つるまを。シキンドウ。

麓。大宮。入山瀧。

富士山麓殊ニ多シ。莖ハ針金ノ如ク。地ニ搦シテ長ク蔓狀ヲ呈シ。先端上昇ス。到ルトコロニ根チ下シテ繁殖ス頗る強靱ナリ。葉ハ對生。披針形ニシテ長一寸餘幅五六分短柄アリ。葉ハ全邊ニシテ面三縱脉著シ。雌雄異株ニシテ七八月頃帶黃色ノ細花ヲ葉腋ニ攢簇ス。

(713) *Urtica*, Thunbergiana, S. et Z.

いらくさ。イタイタグサ。マムシグサ。

苧麻。

麓。大宮。北山。白絲瀧。

方莖ニシテ高三四尺ニ達スル多年草ニシテ莖葉共ニ軟毛アリテ蟻酸ヲ含ミ。人チ螫スコト甚ダ劇シ。苧麻ニモヤ、類スレド彼ノ花穂ハ葉下ニ垂ル、モいらくさノ花穂ハ葉間ニ立上ルノ異アリ。

◎靱皮纖維ヲ疊絲。織物料等ニ充ツ。北海道ノ土人ハ此纖維ヲ弓弦トナスト云フ。外國ニテハ本植物ニテ酒ヲ釀ス吾邦ニテモ嫩芽ヲ古來救荒時ニ浸物又ハ和物等ト爲セリ

Moraceae. 桑科

- (714)
- Broussonetia, Kazinoki, Sieb.*

かうぞ. カミノキ. 楮.

麓. 大宮. 北山. 大宮新道一合.

高一丈餘ニ達スル落葉樹ニシテ雌雄異株ナリ。葉ハ桑ノ葉ニ類ス。構ノ如クニ枝ニ密毛ナク又樹皮ニ斑紋ナシ。樹モ構ノ如キ喬木トナラザルヲ常トス。葉モ構ヨリ薄クシテ小ク。其葉柄ニ附着スルトコロ彼ノ如クニ楕狀ナナスコトナシ。果實ハ構ヨリ小ナリ。

◎樹皮ヲ製紙ノ原料トス。果實ハ黃熟スレバ甘クシテ生食スルニ足ル。

- (715)
- Broussonetia papyrifera, Vent.*

かぢのき. カミノキ. オホカホゾ.

マムシカツ. 楮.

麓. 大宮.

莖ハ直立スル喬木ニシテ樹皮ニ斑紋ヲ存シ。枝ニ密毛アリ。葉ハ厚クシテ大ク其面剛毛アリテ粗糙ナリ。且ツ楕狀ナシテ葉柄ニツク。托葉ハ廣シ。雌花ノ花序ハ球形ニシテ後直徑一寸許ノ蛇莓實ノ如キ集合果ヲ結ヘバ小子柑紅色トナリ。毎子一核ヲ存ス。コレ即チ構子ナリ。

◎樹皮ヲ製紙ノ料トシ。甜味アル熟セル果實ヲ生食ス。

- (716)
- Cannabis sativa, L.*

あさ. 大麻.

麓. 大宮. 北山(共ニ人家)

雌雄異株。葉ハ掌狀複葉ニシテ通常五七ノ小葉ヨリ成リ長柄ニヨリテ溝稜アル方形ノ直立莖ニ對生ス。

◎韌皮纖維ヲ使用スルコト人ノ知ル所。又皮ヲ去リタル葉

ヲ火藥ノ原料及ビ種々ノ用ニ供シ。子實ヲ香味料及ビ榨油料並ニ小鳥飼料トナス。

- (717)
- Fatousa pilosa, Gaud. var. subcordata, Bur.*

くはくさ.

麓. 入山瀬. 大宮. 宮原.

一見桑苗ニ似タル草本ニシテ莖高一尺餘ニ達ス。葉ハ桑葉ニ似タレド小クシテ質モ亦軟ナリ。莖葉共ニ微毛ヲ帶ブ。雌雄同株。花ハ綠黄色。

- (718)
- Ficus erecta, Thunb.*

いぬびは. ヤブビハ. コイチヂク.

イヌイチヂク. イチジク(古名).

カハビハ. チチボ. 天仙果.

麓. 大宮.

無花果ニ類スル落葉灌木ニシテ木モ果實モ小ナリ。葉ハ楕圓形ナリ。

◎韌皮纖維ヲ抄紙ノ料トス。果實ヲ生食シ。樹ヲ觀賞ノ爲メ庭中ニ植ウ。

- (719)
- Humulus japonicus, S. et Z.*

かなむぐら. 葎草.

麓. 粟倉. 瀧ノ澤. 萬濃.

藪叢等ニ繁茂スル蔓草ニシテ莖ニハ多クノ下向セル短鉤刺ヲ有シ以テ他物ニ纏繞ス。葉モ亦短刺毛アリテ粗糙ナリ。葉ハ掌狀ニ分裂シ。長柄ニヨリテ對生ス。淡綠色ノ單性花ヲ夏秋ノ際異株ニ生ズ。雄花ハ圓錐花序ヲナシ雌花ハ松球ニ似テ甚ダ小ナル果實ヲ生ズ。

◎果實ヲ健胃劑トス。秋父邊ニテハなべつころげト稱シ。養蠶ノまぶしニ用フ。

- (720)
- Humulus, Lupulus, L. var. cordifolius, Max.*

からはなさう。

麓。上吉田。山中村

概形前者ニ似タレド葉ハ心臟形ニシテ尖リ。鋸齒ヲ有ス。往々三裂又ハ五裂シ。互生又ハ對生ス。果實ハ前者ヨリ大ナリ。

◎果實ヲ忽布^{ホツフ}ノ代用トシ。又健胃藥トス。

(721) *Morus alba* L. var. *stylosa*, Bureau.

くは。ヤマグハ。ササグハ。桑。

麓。大宮新田。賽河原。村山。上井出(野生)等

◎邊材狭クシテ淡黄色心材ハ淡黄褐色ニシテ光澤アリ。老材ハ殊ニ黒褐ヲ帶ブ。材質堅實ニシテ肌理頗美觀ナルガ故ニ各種ノ裝飾材トシ獵銃ノ臺木トシテ最貴バレ。箱類。文房具。茶器。火鉢。柱時計ヲ製作スルニ適用シ又彫刻材。鑲作材ニ供シ。其他提琴三絃ノ胴ヲ作レバ其音ノ優美ナルコト他材ノ上ニ出ヅ。又馬鞍ヲ作り其長キモノハ柱又ビ床間ノ落シ掛ケ。床板トナシ。北海道ニテハ土人ノ弓及ビ雪車ヲ作ルニ用フ。木工ハ石灰汁ヲ用ヒテ材ヲ暗褐色ニ染メテ使用ス。葉ハ蠶ノ飼料トシ靱皮ヲ紙及ビ絲ノ料トシ。果實ヲ食用及ビ釀酒用トシ。嫩葉ヲ救荒時ノ食料及ビ桑茶ヲツクルニ用ヒ。桑白皮ヲ水腫病ニ用ヒ果實ヲ清涼劑。消化劑トス。桑茶ハ古來中風ノ藥トモラル。皮ハマタ下劑。驅蟲劑トナルト云フ。

Ulmaceae. 榆 科

(722) *Celtis sinensis*, Pers. var. *japonica*, Nakai

えのき。え。メムクノキ。朴樹。

落葉喬木。むくのきニ似タレド葉ハ綠色淡クシテ光澤アリ。鋸齒モ亦細銳ナラズ。果實ハ球形ノ小核果ニシテ秋

月熟スレバ直徑二分許。暗黄色トナリ遂ニ褐色ニ變ズ。

◎心材帶黄褐黑色。邊材帶黄淡暗褐色。質けやきニ似テ稍軟ク。木理緻密ニシテ彈力強ク。割レ難クシテ挫折スルコトナシト雖反張シ且ツ腐朽シ易シ。好ミテ裁板。組トナシ荷鞍。滑車等トナシ或ハ色ヲ附ケテ樺材ニ擬ス。薪炭材トナセバ火力強シ。果實ハ甘味ニシテ生食ス可ク。嫩葉ハ燥食スベク成葉モ亦茶ニ充ツベシ。藥用トシテハ葉ハ漆瘡ヲ治シ樹皮ハ進食通經ノ効アリ。又庭中ニ植エテ觀賞シ或ハ行道樹トナス。即チ往時ハ一里塚トシテ植エラレタルモノ也。

(723) *Ulmus campestris*, Sm. var. *laevis*, Planch.

はるにれ。ネレ。ネリ。アカダモ。

コブニレ。榆。

麓。喬。吉田口一合ノ上。須走。

寒地ニ多キ落葉喬木。幹皮ハ深褐色ニシテ扁平ナル裂目ヲ有シ。鱗狀ニ剝脱ス。葉ハ倒卵形又ハ橢圓形ニシテ重鋸齒縁ヲ具ヘ。ヤ、櫻ノ葉ニ似タレド質更ニ厚クシテ甚ク粗皺。裏面脈上ニ細軟毛アリ。四五月頃葉ニ先チテ帶紫淡綠色ノ細花ヲ多數擧簇シテ開ク。果實ハ扁圓ニシテ膜質ノ翅ヲ具ヘ大サ三四分アリ。

◎材質割レ難シ。椀。獨樂。車軸。梓弓。大鼓ノ胴。下駄材。薪炭用等トシ。樹皮ヲ細粉トナシテ瓦等ヲ接合ス。其纖維ヲ繩ニ代用ス。根ノ粘液ハ製紙用トナル。葉ハ家畜ノ飼料及肥料ニ供ス。

(724) *Zelkovia serrata*, Mak.

けやき。ケヤ。樺。

麓。大宮。北山。細紺野。八幡堂。大宮新道一合。

植皮ハ帶灰褐色ニシテ始メハ平滑。堅硬。粗キ横皺ト無數ノ細突起ト有シ。大樹トナレバ厚大ナル木皮鱗片ト

ナリテ剥離ス。葉ハ長卵形。長楕圓形ニシテ先端鋭尖。葉底ハ鈍。葉縁ニ粗鋸齒ヲ有シ。短柄ニテ互生ス。支脈ハ明瞭ニ且ツ正シク中肋ノ兩側ニ發出ス。

◎材質堅牢ナルコトカシニ次ギ且ツ靱性アリ。邊材ハ白黄色ナルモ心材ハ黄褐色ニシテ老木ニテハ稍紫黒ヲ帯ビ香氣ヲ存ス。老樹ノ木理ハ雲ノ如ク渦ヲ成ス。コレヲ如椀木又ハ玉杓ト稱ス。其他鶴杓。牡丹杓等ノ稱アリ。本材ハ磨ケバ美麗ナル光澤ヲ生シ木理密ナラズト雖。能ク重キニ耐エ又水濕ニモ堪ユルガ故ニ船艦。建築。各用器具ニ賞用セラレ就中近來ハ椅子。食卓。馬車。電車。汽車ノ客車ニ用ヒタリ。其他古來神社佛閣或ハ大家高樓ノ門柱。門扉及ビ木工ノ削臺等ニ用ヒラル。樹皮ニテ煙草入煙草盆等テ製ス。即越前ノ名産ナリ。枝ハ薪料ニ適用シ又海苔粗朶ノ用ニ供スベシ。材ヲ燒キテ得タル灰ハ白灰ニ亞キテ磁陶品製造ニ用ヒラル。樹ハ又栽エテ觀賞ニ供ス。

(725) *Zelkovia stipulacea*, F. et S.

つき。ツキケヤキ。槻。

麓。

前者ニ似タレド葉ハ細小ニシテ葉裏。葉柄ニ毛ナシ。花ハ雌雄異株ナリト云フ。げやきト混生スレド材ヤ、劣レリ。

Fagaceae. 殼斗科

(726) *Castanea vulgaris*, Lam. var. *japonica*, De.

くり。栗。

麓。村山。北山。宮原。須走ノ上。鈴ヶ原。大宮新道一合。

◎種子ヲ食用ニ供シ樹皮ヲ染料及ビ鞣皮料ニ供シ葉ヲ天蠶

ノ飼料トス。材ハ硬クシテ水濕ニ耐ユルヲ以テ鐵道ノ枕木。湯殿板。船ノ舵。櫂。杭及ビ家屋ノ土臺等ニ賞用ス又木箱。鏡臺。煙草盆。食卓。違棚等ノ雅致アルモノヲ造ルベシ。而メ栗炭ハ鍛冶屋ニテハ專ラ用ヒテ火力ノ強キヲ賞ス。

(727) *Fagus sylvatica*, L. var. *Sieboldi*, Max.

ぶな。シロブナ。ホンブナ。ブナキ。

ソバグルミ。ソバグリ。(櫨)

麓。喬。細紺野。龜芝ノ西。大樞。須走口。天照教。大宮新道一二合。吉田口一合ノ上。

七八丈ニ達ス。落葉喬木。樹皮青黒色ニ灰色ヲ帯ビ平滑ニシテ皺ナク。枝條ハ細長クシテ紫黒褐色ヲ帯ブ。葉ハ卵狀楕圓ニシテ尖リ。葉邊ハ淺キ波狀ノ鋸齒ヲ具ヘ其鋸齒ハ側脈ト側脈トヲ中間ニ來ルノ特徴アリ。葉面濃綠色裏面ハ淡綠色ニシテ若キ間ハ褐色ノ毛アレドモ充分成長スレバ之ヲ失フ。葉長三寸幅一二寸。葉柄四五分アリテ互生ス。花ハ單性。六月頃同株ニ着キ。雄花ハ菜莖狀ヲナシテ葉腋ニ垂下シ。淡綠色ニシテ白色ノ長毛ヲ密布シ雌花ハ楕圓ニ生シ二三葉相集リテ苞ヲ被ル。實ハ卵形ノ殼斗ヲ被リ十月頃成熟スレバ頂上ヨリ四裂シテ果實ヲ散落ス。一般中二子アリ。其形栗子ノ如ク茶色ニシテ三分ノ大サアリ。

◎邊材ハ白質ニ褐色ヲ帯ビ心材ハ紫褐色ヲ帯ブ。質堅硬緻密ナレドモ屈撓力ニ抵抗スル力乏シク。割レ易ク且ツ水濕ニ遇ヘバ腐朽ニ易シ。北國ニテハ親船ノ傳馬ヲ造リ。冬時雪掻キニ用フル木鋤。鐵柄。下駄ノ齒等ヲ造リ又ラケット。杖。車輛。盆。膳。椀。柄杓。杓子。絲操器械等ヲモ作ルベシ。樹皮ハ綱ノ染料トナリ種子ハ炒リテ食スレバ香味アリ或ハ油ヲ搾リテ燈用トナス。葉ハ西洋ニテハ藁ニ代ヘテ臥蓆ニ使用スト云フ。

(728) *Pasania cuspidata*, Oerst.

しひのき。シヒ。シヒガシ。ツブラシヒ
柯樹。

麓。大宮。村山。

常緑喬木ニシテ五六丈ノ高サニ出ルモノアリ。雌雄異株
果實ハ三四分ノ圓錐形又ハ尖頭長卵形ニシテ蜜狀ノ總苞
ニテ包被セラレド後ニハ裂開シテ子實墜落ス。

◎邊材ハ廣クシテ帶淡赭黑色心材ハ帶黃淡黑色。質硬重ニ
シテ割レ易シ。條板。床柱。椅子。洋家具。斧柄。下駄
砂糖樽。栓木。船脛斧鉞ノ柄。農具ノ柄。荷棒等ニ用フ
樹皮ヲ漁網等ノ染料トナル。彼ノ黒八丈ハコノモノニテ
染ムト云フ。染戸ニテハ此樹ヲ澁木ト稱シ。樹皮ヲ澁皮
又ハもく皮ト云フ。種子ハ炒リテ食シ得ベク。樹ハ植エ
テ庭園樹又ハ防火樹トナスベシ。木材ハマダ香葎ノ母材
トナル。

(129) *Quercus crispula*, Bl.

おほなら。ヌナラ。ノイシナラ。

ミヅナラ(木曾)

麓。喬。天照教。細紺野。八幡堂。

幹七丈圍六尺ニ達スル落葉喬木ニシテ樹皮ハ帶黃赭黑色
ニシテ綠白色ノ斑點ヲ有シ。粗大ニシテ深ク扁平ナル裂
目ヲ存シ殆ド脱落セントスルノ狀アリ。枝條ヤ、細密ニ
シテ灰白色ヲ呈ス。葉ハ倒卵形ニシテ基部狹ク。粗大ノ
鋸齒アリ。葉長五六寸乃至九寸ヲ算シ。柄ハ極メテ短ク
長キモノモ四五分ニ過ギズ。而メ葉ノ小ナルモノハ鋸齒
銳ク。大ナルモノハ鋸齒鈍ナリ。質薄クシテかじはノ如
クニ厚カラズ且ツ光澤ヲ有シ毛ヲ有スルコトナシ。花ハ
五月頃開ク。實ハ枹ニ似テ尙大ク。殼斗淺クシテ皿狀ヲ
ナシ子實ノ下端ヲ覆ヒ。殼斗ノ縁邊ハ甚ダ厚シ。本樹ハ
木曾。秩父ニテハ美林ヲナス。又奥羽地方 北海道ニモ

多シ。

◎材質栗ニ似テ木理疎ニシテ稍軟ク割裂シ易ク又反張シ易
シ。船及ビ櫂トシ春ヲツクル。薪炭トシテ櫟ニ次ク。其
老木ハ燐ナク燃エテ爆發セザル故ニ上等暖爐ニ用ヒ。壯
樹ノ炭ハ熔鐵爐ニ用フ。又枝葉ノ灰及ビ樹皮ハ染料トナ
ル。又香葎ノ母材トナスベシ。

(730) *Quercus acuta*, Thumb.

あかがし。オホバガシ。クマガシ。

オホガシ。血赭。

麓。大宮。村山

常緑喬木ニシテ樹皮ハ帶綠赭黑色ヲ呈シ板狀ニ剝離ス。
新芽ニハ黃褐色ノ線毛ヲ被ル。葉ハ大形ノ楕圓形ニテ尖
リ厚クシテ光澤アルモ初メハ毛ヲ被ル。果實ハ圓ニシ
テ殼斗ハ碗狀ニテ枹ノ實ヨリ微大ナリ。

◎邊材ハ狹クシテ帶褐暗黃色。心材ハ帶黃赭黑色ナリ。質
堅硬ニシテ割レ難キモ割合ニ工ヲ施シ易シ。強キ韌性アル
ガ故ニ油捺道具。工場器械。人力車。荷車等トナスニ
適シ又下駄ノ齒。砲臺。櫓。櫂。楸。棒。三味線棹。算
盤。槌頭。楔。杵其他農具ノ柄等ニ賞用セラレ。薪炭材
ニモ貴重セラレ。材ハ植エテ防風防火樹トシ生垣トナス
ベシ。

(731) *Quercus grosseserrata*, Bl.

みづなら。オホナラ(東京)。ハハソ(紀
伊。畿内)。ヤマホソ。ヤマナラ。

麓。喬。細紺野。龜芝。龜芝。天照教。山中村。
大宮新道一合。須_上口149 m.

落葉喬木。樹皮ハ帶赤赭黑色ニシテ綠白色ノ斑點ヲ有シ
深ク粗ナル裂目ヲ存ス。葉長倒卵形尖頭。長四五寸。周
邊ニ鋸齒ノ粗鋸齒アリテ間々其鋸齒ノ縁邊僅ニ齒狀ヲナ
スモノアリ。花ハ帶黃褐色ニシテ五月頃雌雄同株ニ開キ

果實ハ大ニシテあかかしノ實更ハ大ナラノ實ニ似テ。殻斗ハ深ク椀状ヲ呈シ。其縁邊ハ甚ダ薄シ。たほならトみづならトハ共ニ葉柄頗短クシテ其長キモノモ四五分ニ過ギズ。何レモこならノ葉ニ類スレド更ニ大ナリ。又かしハニ類スルモ其質薄ク且ツ彼ノ如クニ葉裏ニ褐色毛アルコトナシ。此二者ハ共ニ葉縁ニ鋭頭鋸齒アルモみづならノ鋸齒大ニシテ淺ク。葉ノ大サハみづならハ四五寸アルモおほならハ六七寸アリ。又おほならハ殻斗淺クシテ皿状ヲナシ縁邊甚ダ厚キモみづならハ深ク椀状ヲナシ縁邊甚ダ薄キ故ニ本種ハ其種子熟シテ落下スルモ其皿ト種子ト附着シ居ルコトアリト云フ。

◎邊材甚ダ廣クシテ淡褐色。心材ハ深赭黑色ヲ呈シ。質おほならニ似テ稍硬シ材中ニ水分ヲ含ミテ容易ニ燃エザルニヨリ其名アリ。樹皮ヲ染料トシ種子ヲ晒シテ食用トス。材ヲ床板。屋根板。窓縁。洋家具。煙草壺。曲物細工。玉突臺。ラケット。スキー。ビー。樽。汽車。電車等ヲツルニ用フ。

(732) *Quercus dentata*, Thunb.

かしは。エドカシハ。モチガシハ。

ゴヘイナラ。コガシハ。榲

麓。カケスバタノ上。

葉ハ革質。長大ナル倒卵状ヲナシ兩邊各八九個ノ波状鈍鋸齒ヲ具ヘ。若葉ノ表裏ニ褐色ノ毛アリ。殻斗ニ鱗毛アリ。

◎樹皮ハ魚網ノ染料。鞣革料トナル。種子ハ粉ニ挽キテ團子トナシ或ハ糊料トナル。葉ハ所謂柏餅ヲ作ルトキニ用ヒ又炒リテ咖啡ノ代用トス。材ハ建築ノ土臺。床板。床柱。椅子。定規。薪炭用。鐵道ノ枕木トシ又裁エテ觀賞ニ供ス。

(733) *Quercus glauca*, Thunb.

あらかし。カシ(富士)。クロガシ。

イヌガシ。ツボガシ。桐。

麓。大宮。萬濃。榮次澤。

常緑木ニシテ樹皮ハ帶緑赭黑色ニシテ後ニハ厚キ小鱗片状トナリ。下部ノ外面ハ屢々瘤状ノ不整突起ヲ有シ。枝モ亦黒キヲ帶ブ。葉ハ倒卵状ニシテ尖リ。通常上半ニノミ粗鋸齒ヲ有シ。しらかしヨリハ其幅廣ク且ツ厚ク。葉脈モ亦粗大著明ナリ。新條ハ赤褐色ノ毛ヲ被ル。殻斗ハ比較的薄シ。

◎心材ハ帶褐淡黑色。邊材ハ淡褐色。質ハしらかしニ類ス。和船ノ舵。短艇ノ櫂。馬車人力車ノ舵棒。銃臺。水車ノ器具其他量衡及ビ下駄齒等ニ製造セラレ。近頃ハ啞鈴。球竿。棍棒等ヲ作ルニ用フ。又薪炭材ニ適ス。裁エテ庭園樹トシ生垣トシ又防風防火ノ用ニ供セラレ。

(734) *Quercus glandulifera*, Bl.

こなら。イシナラ。コマキ。コボウソ。

ナラノキ。枹。

麓。大宮新田。須走。

落葉樹。樹皮ハ淡灰褐色ニシテ綠黄白色ノ斑點ヲ帶ビ常ニ *Physcia*, *Pertusaria*, *Graphis*. 等ノ地衣ヲ寄セシム。葉ハ長倒卵形ニシテ先端尖リ。兩邊ニハ各四乃至拾個ノ齒頭内曲セル單鋸齒アリ。葉面深緑。滑澤ナレドモ裏面ハ絨毛ヲ密布シテ粉白色ヲ呈シ。新葉ハ銀白色ナリ。秋月黄葉或ハ紅葉シ霜ニ會ヘバ忽チ落下ス。

◎邊材ハ灰白色。心材ハ帶黄淡赭黑色。材質みづならニ類シテ稍硬ク。割裂且ツ彎曲シ易ク又水濕ニ耐ユ。頗薪炭用ニ適ス。其良材ハ雪車。箱。椅子。洋傘ノ柄等ヲツクルニ用フ。樹皮ヲ染料トシ樹ヲ香草ノ母材トシ又海苔粗朶トス。種子ヲ澱粉製造用及ビ醸造用ニ供ス。

(735) *Quercus serrata*, Thunb.

くぬぎ、ドングリ(富士)、トチ、

フシマキ、メクスキ、櫟、

麓、大宮、富岡、吉原、

落葉喬木。樹皮灰褐乃至暗褐ニシテ甚ダ粗厚ニ、深ク大ニ縦裂シテ樹状ヤ、栗ニ類ス。葉ハ披針形ニシテヤ、歪ミ、又稚枝ノモノハ倒卵状ヲナシテ先端尖リ兩邊ニ拾乃至拾三個ノ長ク尖リタル鋸齒アリ。新葉ハ表裏共ニ白毛ヲ存スレドモ老葉ニハ之ヲ缺ク。葉ハ霜後枯レテ褐色ヲ呈シテ久シク落チズ。果實ハ栗ニ似テ小ク、圓クシテ其頂微シク尖ル。殻斗ハ刺毛アリテ柔軟ナリ。

◎邊材廣クシテ灰白色。心材ハ淡褐色ニ暗赤ヲ帯ビ堅重ニシテ摩擦ニ堪ユ。橈、粗白ノ齒、桶類、車輛、下駄齒、船腕等トス。薪炭ノ王ト稱セラル、モノニテ木炭トシテハ其ノ保存力カシニ及バズト雖、其性質之、次グ。佐倉炭、池田炭ノ原料トス。菊炭是也。樹皮ヲ染料、鞣皮料トシ又乾燥シテ疝氣痢病等ニ用ヒ又忍冬ト合セ煎服スレバ腫物ヲ治スト云ヘリ。枝上ニ生ズル窠所謂さるのこしかけモ飛騨國ニテハならだんごト稱シテ染物ニ用フ。材ハ又皮付ノマ、垣根其他庭園用ノ杭及ビ魚網ノ張杭ニ用ヒラレ。又香單ヲツクル母材トナリ葉ヲ野蠶ノ餌料トナス。

Betulaceae. 樺木科

(736) *Alnus alnobetula*, Hartig, var. *fruticosa*, Winkl.

みやまはんのき、マルバハンノキ、

クロモンジャ(富士)、

喬、灌、大宮口二三合及四合ノ西、須走口1500mヨリ2000mマテ、吉田口三合半、五六七合、

寒地ヲ好ム故ニ北海道ニ多シ。彼地ニテハ幹高四丈圍五尺ニ達スルモノアルモ富士山ニテハ灌木ノ状ヲ呈ス。樹皮ハ帶赤緒黒色ニシテ綠色ノ斑點ヲ有シ平滑ナリ。葉ハ廣卵形ニシテ尖リ、細キ重鋸齒ヲ有シ基脚ヤ、心臟形ヲ呈シ、長二寸内外アリ無毛ニシテ光輝アリ。果實ハ所謂多花果ニシテ短梗ヲ有シ、秋ニ至リ熟シテ長六七分トナル。

◎果實ハ貴重ノ染料トナル。材ヲ器具及ビ薪炭ノ料トス。此樹ノ根元ニハ有名ナルおにくヲ生ズ。

(737) *Alnus incana*, Willd. var. *emarginata*, Matsum.

やはすはんのき、

灌、草、大宮口一合附近、同二三合、須走口一合半、二三合、

頰山はんのきニ類ス。葉ハ倒卵狀圓形ニシテ基底ハ微ク楔形ヲ呈シ頂端ハ凹ミテ矢筈狀ヲ呈ス。但シ葉縁ノ重鋸齒ハ山はんのきノ如クニ著大ナラズ、

◎木材ヲ器具、薪炭ノ料ニ供ス。

(738) *Alnus firma*, S. et Z. var. *multinervis*, Rgl.

ひめやしやぶし、ミネバリ、ハゲシバリ、

ツチシバリ、

高一丈餘ノ落葉灌木。葉ハ廣披針形、其支脈最多ク其數ニ拾以上、鋸齒縁、互生。花ハ雌雄同株。雄花ハ雄蕊ト分裂セル萼トナリ有シ、長キ穗狀花序ニ排列シ、雌花ハ松球狀ノ小ナル穗狀花序ヲナス。やしやぶしヨリ葉モ實モ共ニ小ク、且ツ實ハ一所ニ多ク生ジテ其柄長ク垂レクヲ異トス。

◎植エテ土砂扞止用トシ、材ヲ床柱、挽物細工、薪炭料トシ果實ヲ染料、葉ヲ肥料トス。

(739) *Alnus incana*, Willd. var. *sibirica*, Spach.

やまはんのき、マルバハンノキ、

ツチシバリ。ヤマツナギ。

大宮。春河原。村山。小屋坂。札打。カケスバヤ
麓。中畑。同口太郎坊。須走口1100m.—149'm。
大宮新道一合。

落葉喬木。樹皮緒黒ニシテ白キ斑點アリ。初メハ平滑ナルモ後ニハ割ル。枝ハ灰褐色ニシテ軟毛アリ。葉ハ潤大卵圓形ニシテ長サ三寸内外アリ。縁邊ニ粗大ナル缺刻及ビ重鋸齒ヲ存ス。葉柄長一寸許。新枝及ビ葉柄ニハ毛アリ。果實ハ橢圓形ニシテ鱗密疊シ長六七分アリテ短梗ニツキ熟シテ黒褐ナリ。

◎邊材帶黃赭色ニシテ白色ノ斑點ヲ存シ。心材ハ帶黃淡赭黑色ニシテ帶綠白色ノ斑點アリ。質ハ人のキニ似タリ。樹皮ハあのかはト稱セラレ瀟網ヲ染ムルニ用ヒラレ。實モ亦染料トナル。材ハ茶箱下駄箱ヲ造リ挽物細工ニ用ヒラレ又薪炭材トシテ貴重セラレ。火薬用ニ供セラレ。

(740) *Alnus firma*, S. et Z. var. *Yasha*, Winkl.

やしやぶし。オホバミネバリ。

ニクカウブシ。キブシ。

栗倉。村山。須走ノ上。大宮新田。
麓。大宮新道一合。

落葉喬木。樹皮帶赤緒黒色ニシテ綠白色ノ斑點ヲ存シ。硬クシテ厚キ鱗皮ヲナス。葉ハ長卵形ニシテ尖リ。中肋ヨリ拾七八條ノ表面ニ陷没シ裏面ニ凸出セル支脈ヲ有シ葉柄ト葉裏ニハ毛ナシ。果實ハ橢圓形ニシテ外形稍松球ニ類ス。

◎材ハ淡緒黒色ニシテ通常淡褐色ノ縞及ビ白色ノ小斑點ヲ存シ。質硬重ニシテ堅キコトかへでノ如シ。又鉋削スレバ木理美ナリ。櫛ヲ製シ其他鐵細工ニ供ス。樹皮ヲ剥ギタル圓材ノ外面ハ奇雅ナルヲ以テ床注トナス。又薪炭材ニモ適ス。其炭ハヨク火ヲ保ツト云フ。果實ハ夜叉附子ト稱シテ五倍子ノ代用トシ齒及ビ他ノ染料トナル。又新

製ノ陶器ニ古色ヲ帶ベシムルニハ此液中ニ浸スト云フ。

(741) *Betula alba*, L. var. *vulgris*, Rgl.

しらかんば。カバ。シラカバ。カンバ。

シラハリノキ。白樺。

喬。灌。大宮口(2030m.四合目) 吉田口四五合。
須走口1110m.—1880m.—2080m.—2100m。

内地高山ト北海道ニ多シ。幹高九丈圍八尺ニ達スルコトアル大樹ナリ。樹皮ハ横理斑點アリ。外面ハ雪白内皮ハ帶綠赭色ニシテ脂氣ヲ含ム。紙ノ如ク容易ニ數層ニ剝離ス。枝ハ細クシテ黒褐色ニ白點ヲ存シ。柔軟ニシテ少シク垂下ス。葉ハ互生。三角狀卵形或ハヤ、心臟形ナリシテ端長ク尖リ。重鋸齒縁。長三寸幅二寸許。表面綠色ニシテ滑澤。裏面ハ青白色ニシテ粗糙。兩面無毛。微細ノ脂腺滿布ス。葉柄一寸許。冬季葉腋ニ帶黃綠褐ノ單性花ヲ垂下シ長サ一寸五分。鱗片ノ長サ二三分ニシテ深ク三裂シ。中心ノ者小クシテ尖ル。種子ハ扁平ニシテ赤褐色ヲ呈シ長楕圓形ノ翼ヲ存ス。

◎邊材帶褐白色。心材ハ褐色。質緻密堅硬ニシテ甚ダ割レ難ク工作シ難ク而シテ腐朽シ易シ。黒褐色ノ斑條ヲ生ズルヲ以テ指物又ハ挽物ノ料トシ又ばいぶヲ製ス。又硝子木型。靴型。木釘。鋤ノ柄。經木用トナスベシ。樹皮ハ脂肪ニ富ミ雨天ニテモヨク燃ユルヲ以テ松明トナスニ最宜ク。又附木蠟燭ニ代用セラレ或ハ火繩ヲ製スベシ。又澱粉ヲ含ムニヨリ皮ヲ春キテ製粉ノ料トシ。單寧ヲ含ムニヨリ鞣皮用ニ供セラレ又煎シテ鬱金色ノ染料トス。其他皮質ノ強靱ナルニヨリ器物ヲ製出ス。以前北海道ノ土人ノ製スル器物ニ止リシモ今ハ煙草入。短冊。小刀及ビ劍ノ鞘。水桶。把杓其他ノ器具ヲ製シ或ハ合セ箱ヲ縫合スニ用ヒ或ハ食物ヲ包ムニ用ヒ或ハ屋根ヲ葺キ又油ヲトル。葉ハ黄色ノ染料トナル。朝鮮ニテハ厚皮ヲ卷キテ瀉

綱ノ標識トス。此餘又醋酸石灰及ビ木精ヲ製スベク。材ヨリタールヲ製シ皮膚發疹。梅毒性潰傷。使麻質疥等ノ藥トナス。

(742) *Betula corylifolia*, Rgl.

ねこしで。ウラジロカンバ。ヒカンバ。

喬。灌。吉田口五合ノ上下

葉ハ廣卵形。全長二三寸。基脚ハ往々心臟形ナシ。葉縁重鋸齒アリ。表面殆ド平滑ナレドモ新葉及裏面脉上ニハ長白毛アリ。葉裏別ニ軟毛密布スル爲メニ白色ヲ呈ス。樹皮鼠色。老木ハ白色。五月頃葉腋ニ穗状ナシテ淡黄褐色ノ單性花ヲ開ク。

◎樹皮ハ脂氣ニ富ミテ鶴飼ノ篝火トナリ又屋根葺用トナル材ヲ薪炭用トス。

(743) *Betula*, *Ermanni* Cham. et Schl. var. *subcordata*, Koidz.

あかかんば。

灌。喬。吉田口四合半 五合七合。

内地諸高山ニ産ズル落葉木。樹皮赤褐。老大セルモノハ外面白粉ヲ吐出シ稚木ノ如ク鮮明ナラズト雖尙多少棒色ヲ帶ブ。芽及ビ新條ニ毛ナク。葉ノ裏面ニ脂點ナシ。葉裏ノ脉上及ビ葉柄ニ長毛アリ。果ノ鱗苞頭外反シ縁邊ニ毛アリ。五合目ニハ老大ナルモノアリ。七合邊ニ至レバ灌木状ヲ呈シ。樹幹偃蹇シ地ニ臥シテ岩石間ヲ瀾蔓セリ此種ノ葉ハ卵圓ニシテ頭尖リ。基脚心臟形ナシ。周邊重鋸齒ヲ具ヘ。一見みやまはんのき若クハたけかんばノ葉ト別チ難シト雖。たけかんばヨリハ廣キヲ以テ區別セラル。◎たけかんばニ類ス。

(744) *Betula*, *Ermaunia*, Cham. var. *nipponica*, Max.

たけかんば。サハブナ(富士)

灌。大宮口二三四合。須走口1590m.同一二合。吉田口七合ヨリ七合半。

幹高三丈圍六尺ニ達スルモノアリ。甚ダ短矮ナルモノアリ。樹皮ハ淡紫黑色ニシテ白點ヲ存シ且ツ剝離シ易ク。新梢ニ毛ナシ。葉ハ卵状尖頭ニシテ略三角形ヲ呈シ。重鋸齒ヲ具ヘ。葉脉及ビ葉柄ニ長毛アリ。雌花ハ花被ヲ缺キ。雄花ハ苞上ニ二裂セル花被アリ。果實ハ長サ寸餘ニシテ其鱗片ハ三裂ス。而シテ此種ハ葉裏新枝。苞鱗等ニ脂點ナキヲ以テさうしかんば(*B. Ermanni*, Cham.)ト區別シ易シ。

(745) *Carpinus cordata*, Bl.

さはしば。ブナゾロ。サハマキ。クロク
チ(富士)。イシゾネ。シバシデ。サハブ
ナ。メグロ(富士)。

麓。仁杉。大宮新道一合ノ四。

高山ノ谷合ニ多キ落葉喬木。樹皮淡緑灰色。厚硬ニシテ裂目ヲ存シテ平滑ナラズ。枝條ハ伸張シ褐色ヲ帶ビ白斑點多ク。嫩枝ニハ軟毛アリ。葉ハ橢圓形ニシテ尖リ基部心臟形。重鋸齒縁。葉脉顯著ニシテ毛ヲ有シ。長二寸五分幅二寸許。拾五六條ノ支脉アリ。雌花ハ花被ヲ有シ。花色黄緑。十月頃果實ヲ熟スレバ大ナルモノハ長一寸許一子ニ一苞アリ。苞ハ大小二片ニ分裂シ。大ナルモノハ長一寸。上部ニ鋸齒縁アリ。下部ノ内面ニ白色ノ粗毛密生シ其部ニ種子ヲ着ク。小ナルモノハ稍々卵形ニシテ二三分。反曲シテ種子ヲ覆フ。

◎邊材ハ暗白色。心材ハ帶黄深褐色。質堅硬ニシテ粘カアリ工作ヲ施シ難シ。其切口ニ黒色ノ斑紋アルヲ以テくちくろノ稱アリ。薪材トシテハくぬぎ。こならニ次ギ。炭材トシテハかし類ニ次グ。此材ヲ丸太ノマ、皮ヲ剝キ磨キテ床柱ニ用フルコトアリ。又櫛靴型ヲ作り。細キ材モ洋傘ノ柄又ハ洋杖トナスベシ。而メ樹ハ又香草ノ母材トナル。

(746) *Carpinus disterocarpus*, Koidz.

くましで。カタシデ。カナシデ。イシソ
ノ。クロソネ。イシソネ。カタシデ。
シデ。

麓。粟倉。北山。龜芝。大宮新道一合。

樹皮帯赤緒黒色。葉ハ長卵状楕圓形ニシテ先端尖リ基脚
微シク心臟形。葉脈ハ表面ニ凹ミテ裏面ニ凸出シ。支脈
ノ數多クシテ各側ニ貳拾以上アリ。中肋ニハ表裏トモニ
毛アリ。葉長二三寸幅一寸二分ニ達シ一見栗ノ葉ノ細小
ナルモノ、如シ。托葉ハ長披針形。葉柄四五分共ニ毛ア
リ。此種ハ雄花モ雌花モ長キ穗状花序ニ排列シ。雌花ハ
花被アルモ雄花ニハ之ヲ缺キ。此類皆然リ。花絲ハ二裂
シ大形ノ苞ヲ有ス。鱗果ハ全形圓筒状ニシテ頂端稍尖リ
長一二寸。直徑七八分。各鱗片密ニ覆瓦様ニ排列シ。鱗
片革質。卵状楕圓ニシテ長五六分柄二三分。鋸齒アリ。
子實ハ黒褐色。扁卵形ニシテ一側高マリ。長一分五厘許
アリ。

◎邊材ハ帶黃淡褐色。心材帶紫淡褐色ニシテ質さばしはニ
似タレド稍々硬重ニシテ割レ難シ。多ク薪炭用ニ供セラ
ルレド又農具ノ柄。床柱。傘柄。荷棒トシマタ香蕈育成
ノ用ニ供ス。

(747) *Carpinus laxiflora*, Bl.

あかしで。ホンソネ。コシデ。ソロ。
コメシデ。見風乾。

麓。バツカケ。細紺野。

枝ハ黒褐色ニ灰色ヲ帶ビ細枝ニ白點アリ。葉ハ此類中最
小ナルニヨリこしでト云ヒ。春季新芽ノトキ小枝ト共ニ
紅色ヲ呈スルニヨリアかしでトモ云フ。

◎材ハ帶黃淡褐色。質硬重ニシテ割裂シ難シ。建築用。床

柱。洋傘柄。靴型。電氣コイル。挽物。洋家具。下駄齒
香蕈ノ櫛木トシテ良好ナリ。

(748) *Carpinus yedoensis*, Max.

いぬしで。ソロ。ソネ。シロソネ。

シロシデ。アヲシデ。アブラシデ(富士)

麓。大岩。中畑。水土野。大宮新道。

樹皮帯灰濃褐色ニシテ枝ハ綠色ナリ。葉ハ卵状楕圓ニシ
テ基部著シク心臟形ヲ呈シ。長二寸幅一寸乃至一寸五分
不整鋸齒アリ。新葉ハ表裏トモ軟毛著シク密生シテ大ニ
白色ヲ帶ブ。果實ノ鱗片ハ特リ緩ク散生ス。

◎材ハ暗褐色ニシテ帶黃白色ノ斑點ヲ存シ。質くましでニ
似テ稍軟ナリ。多クハ薪炭用トスレド外面奇雅ナルニヨ
リ細幹ヲ床柱。杖。傘柄等ニ賞用シ又香蕈育成ノ櫛木ト
ス。

(749) *Corylus heterophylla*, Fisch. var. *japonica*, Koidz.

はしばみ。カシバミ。榛。

麓。仁杉。

落葉灌木。葉ハ廣キ圓形ニシテ基底ハ心臟形ヲ呈シ。先
端ハ短尖。葉縁不等ノ重鋸齒ヲ存シ。葉面皺紋多シ。ヨ
リテ葉しばみノ稱アリ。果實ハ堅果ニシテ熟スレバ大サ
五六分ニシテ茅栗ノ如ク。圓尖葉状ノ總苞ヲ以テ其下部
ヲ被包ス。

◎種子ヲ食用トシ又搾リテ油ヲトリ藥用食用トス。樹ヲ栽
エテ觀賞シ又材ヲ種々ニ使用ス。

(750) *Corylus rostrata*, Ait. var. *Sieboldiana*, Max.

つのはしばみ。ヤツドメ(富士)。

ナガハシバミ。オニハシバミ。

前者ノ如キ植物ニテ葉ハソレヨリ狭ク且ツ小形ナリ。
苞ハ長クシテ上部ハ角状ヲ呈シ全ク果實ノ全部ヲ被包ス

此種ハ枝ニ毛茸ヲ存ス。

◎種子ハ美味ナレバ好ミテ食用トス。

Salicaceae. 楊柳科

(751) *Populus nigra*, L. var. *italica*, Dauri.

あめりかやまならし。

麓. 御殿場. 山中村.

近來舶來セル落葉樹ニシテ生長頗速ナリ。枝ハ上部上向ニテ繖狀ヲ呈シ。葉ハ三角狀ニシテ表面滑澤ナリ。元來西部亞細亞ノ産ナルガ米國ヲ經テ吾邦ニ入レリ。

◎庭園風致木トシテ盛ニ栽培セラル。又他ノ柳類ト等シク燐寸ノ軸木トナス。

(752) *Populus tremula*, L. var. *villosa*, Wesm.

はこやなぎ。アヲドロ。ツラフリ。

ヨメフリ。ヤマナラシ。マルバヤナギ。

マドロリ。

麓. 大岩. 鈴ヶ原.
須走口 980m. - 1000m. - 1200m.

葉ハ稍心臟形ニシテ先端稍尖リ。縁邊ニ粗鋸齒アリ。表面深綠。裏面白綠ニシテ白毛ヲ密布シ。新葉ニ於キテ疎ニ多毛ナリ。葉長二三寸。葉柄一二寸。葉片ト直角ヲナシテ扁平ナルガ故ニ風ノ爲メニ動搖セラレ易シ。ヨリテ山ならし或ハよめふり等ノ名アリ。

◎邊材殆ド白ク心材ハヤ、黃褐ヲ帶ブ。質輕軟ニシテ割裂シ易シ。箱類ヲ作ルニ最好ク。桐ニツゲリヨリテはこやなぎノ稱アリ。又房櫛枝及ビ印板トス。古來佛像ヲ刻メルニヨリ佛木ノ稱アリ。火藥用ノ木炭ヲ製ス。明治七年頃ヨリ燐寸用材ニ供シタリシガ近頃ハ鈹片ヲ以テ髮掛ト

シ又眞田紐トナシ又編ミテ布團及ビ帽子ノ原料トス。又製紙原料トナル。

(753) *Salix brachystachys*, Benth.

おほさるこやなぎ。山柳。

麓. 灌. 大宮口一合. 須走口 1100m.

落葉喬木。葉長四五寸ニ達スル長橢圓形ニシテ基底ハ圓ク。先端鋭尖。縁邊ニ微鋸齒アリ。裏面白色ノ毛茸ヲ密布ス。葉面モ亦微ニ粗糙ナリ。秋月既ニ葉腋ニ大ナル蕾ヲ生シ早春開花ス。苞ハ全邊黑色多毛ニシテ一個ノ蜜腺アリ。雄花ハ黃赤色ノ葯ト絹絲狀ノモトヲ有シ。雌花ハ綠色ヲ呈シ其白毛アル子房ハ柄ヲ有スト雖。鱗苞ノ長サニ及バズ。柱頭ハ黃色四裂。

(754) *Salix, Caprea*, L.

やまねこやなぎ。バツマヤナギ。

オホバヤナギ。

麓. バツカケ。

内地諸高山及ビ北海道ニ多ク。幹高四丈ニ達スルモノアリト云フ。樹皮緒黑色ニシテ裂目アリ。枝條褐綠ニシテ柔軟ナリ。葉ハ長橢圓若クハ卵形。尖頭ニシテ縁邊ニ顯著ナラザル淺鋸齒若クハ小波狀ヲ存シ。表面綠色。裏面ハ綠白色ニシテ細毛密布シ長三四寸幅二寸許。葉柄六七分アリ。柄ノ基ニ腎臟形ノ苞葉對生ス。早春葉ニ先チテ花アリ。花ハ柳類中最大ノモノニシテ雌花穗ハ果實ノ時伸長シテ長サ三寸。徑五分餘ニ達シ。雄花穗ハ橢圓形ニシテ花時雌花穗ヨリ稍長大ナリ。

◎材質垂柳ニ似テヤ、軟ナリ。箱類 截板. 小細工用ニ供シ。樹木ノ纖維ヲ各種ノ用ニ供シ樹ヲ栽エテ土砂止メトス。又火藥用ノ木炭トス。

(755) *Salix japonica*, Thunb.

しばやなぎ.

麓. 瀧ノ澤. 阿幸地. 賽河原. 篠坂. 籠坂.
須走. 大宮新道一合及ビ其下.

短小ノ落葉灌木ニシテ莖ハ多少傾斜シ枝極瘦長ナリ。葉ハ二三四分ノ柄ヲ有シ葉身ハ卵狀披針形或ハ長卵形ニシテ鋭尖. 小ナルハ柯樹ノ葉ノ如ク大ナルハ長四寸幅一寸二三分ノモノアレドモ通常ハソレヨリ小ナリ。邊緣ニ細鋸齒アレドモ著シカラズ。葉柄ノ上面多クハ紅染ス。葉面平滑. 光澤ヲ有シ. 裏面ヤ、灰白色. 托葉ハ綠色ニシテ一二分。マター二ノ鋸齒アリ。花ハ三四月ノ交開キ雌ノ葉莖ニ極短キ柄ヲ有シ三四葉之ニ散布シ. 葉莖ナク鱗苞ハ綠色ニシテ長ク. 其頭銳ナラズ。子房ハ柄ナク短柱アリテ頭ニ裂シテ紅色ヲ帶ブ。短小ノ蜜腺アリテ總軸ニ毛アリ。◎往々栽エテ觀賞ス。

(756) *Salix amygdalina*, L.

たちやなぎ.

麓. 須走ノ上. 山中村.

ヤ、水濕ノ附近ヲ好ム。幹枝ハ殊ニ直立スルノ態アリ。葉ハ線狀長橢圓形ニシテ長二三寸乃至四五寸アリ。切株ヨリ芽出スモノハ殊ニ長大ナリ。三月下旬花アリ。葉莖ハかはやなぎヨリ大ク。花序ニ花柄ヲ存シ三四葉之ヲ護ル。苞ハ淡黄色。雄花ハ三雄蕊ヲ有シ. 葯ハ黄色。鋭頭ノ鱗苞之ヲ擁シ内ニ一片ノ蜜腺アリ。葉莖ノ軸ニ毛アリ他ノ葉莖ニハ雌蕊アリ。其雌蕊ニ有柄ノ子房ヲ有シ. 其柱頭ニ裂シ. 淡黄色ニシテ毛ノアル鱗苞之ヲ擁シ. 内ニ黄色ノ蜜腺一個アリ。五月己ニ絮トナル。

◎ねこやなぎニ同シ。

(757) *Salix glandulosa*, Seem.

まるばやなぎ. アカメヤナギ. ウラジロヤナギ. アカヂクマルバヤナギ.

麓. 喬. 瀧ノ澤. 狩休. 須走ノ上. 須走口一合.

落葉喬木。葉ハ橢圓形ニシテ長二三寸時トシテハ四寸。微小ノ鋸齒縁アリ。初夏枝梢ノ新葉鮮紅色。雌雄異株。四月中旬開花。葉莖ノ長二寸許。雄ノ葉莖ニハ長梗アリテ四五葉之ニ散生スルノ狀ヲちやなぎニ彷彿タリ。而シテ雌蕊四個(時ニ六個)アルト蜜腺二個アルニ至リテハ大ニ異レリ。鱗苞淡黄色ニシテ内面ニ毛ヲ有シ. 鱗頭ハ銳ナラズ。

(758) *Salix purpurea*, L.

こりやなぎ.

麓. 賽河原. 富岡村. 篠坂. 籠坂. 大宮(塔)

莖ハ狭長。枝ヲ叢生スルコト繁シ。莖ハ灰褐色。新枝ハ綠色ヲ呈ス。葉多クハ對生。線狀披針形。長二三寸。幅三四分。先端短ク尖リ。細鋸齒縁。新芽ハ少シク紅色ヲ帶ブ。側脈頗多シ。

◎樹皮ニテ紙ヲ製シ. 皮ヲ去リタル木部ニテ柳行李ヲ製ス其外葛籠. 行厨. 笠. 盆等ニモ製セラル。此種ハ但馬國城崎郡ヲ始メ因幡. 丹後. 丹波等ニテ盛ニ栽培ス。其起原詳ナラズト雖但馬地方ニテハ天正年間既ニ之ヲ耕作シ寛文年間其栽培大ニ盛ニナレリト云フ。

(759) *Salix purpurea*, L. subsp. *amplexicaulis*, Boiss

いぬこりやなぎ. ヒロハコリヤナギ.

オトギリヤナギ. コブヤナギ.

麓. 須走ノ上(800m-900m.) 御殿場口太郎坊ノ下.
麓. 萬歳. 篠坂.

前者ニ似タル落葉灌木。樹皮灰褐色ニシテ屢々こぶヲ生ズ。葉ハ長柄圓形ニシテ先端尖ラズ。葉柄極メテ短ク。全邊ニシテ裏面淡白。初生葉ノ背ニ絹ノ如キ毛アリ。

◎葉ヲ煎服シテ喘息ノ藥トナス。行李ヲ作ルノ要材トナリ又堤防ニ栽エテ土砂止メトス。

(760) *Salix Sieboldiana*, Bl.

いはやなぎ. ヤマヤナギ.

灌. 草. 賽河原. 大宮口二三四合. 吉田口五六合.
須走口. 大宮新道一合ノ途中.

山地ノ岩石上ニ生ズル小灌木。葉ハ圓形又ハ橢圓形ニシテ短柄ヲ有シ。葉質厚クシテ粗ク。縁邊ニ波状ノ微鋸齒ヲ有シ。裏面ニ灰白粉ヲ布ク。

(761) *Salix, Reirii*, F. et S.

みやまやなぎ.

草. 灌. 吉田口五六合. 大宮口三四合.

高山ニ生ズル落葉灌木。枝ハ比較的太クシテ短ク。葉ハ橢圓形又ハ卵形ニシテ長一寸乃至一寸五分。鋸齒縁ヲ有シ裏面ニ白色毛茸ヲ密布ス。花候六月。

Juglandaceae. 胡桃科

(762) *Juglans Sieboldiana*, Max.おにぐるみ. フグルミ. クルミ. 山胡桃
麓. 大宮. 葉黄澤.

落葉喬木。幹高五六丈圍一丈ニ達スルモノアリ。樹皮帯褐紫黑色。厚クシテ密ニ深キ裂目ヲ有ス。枝ハ肥大ニシテ灰白色ナリ。葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ無柄ナルモ總葉柄ハ長サ一尺餘ニシテ褐色ノ柔毛ヲ密生シ。葉裏ハ帶白色ニシテ茶褐色ノ短柔毛ヲ被リ。一見漆樹ノ葉ノ如クニシテソレヨリ大ク。細鋸齒アリ。雄花ハ柔荑狀ニ葉腋ニ綴リ長サ五六寸。雌花ハ頂生。帶赤色ノ花柱ヲ存ス。果實ハ數個相集ル。其形桃ニ似テ初メ綠色ナルモ秋ニ至リ黑色ニ熟ス。内果皮即チ核ハ稍卵形ニシテ頗堅ク表面ニ凹凸ヲ存ス。

◎心材ハ初メ白色ナルモ後ニハ淡褐暗色ニ變ズ。質堅軟中ヲ得。割裂シ易キモ粘靱ニシテ反張セズ。小銃ノ臺トシテ此右ニ出ヅルモノ無シ。磨ケバ光澤ヲ生ズル故ニ文房具. 鏡臺. 机. 椅子. 箱類. 天秤棒. ラケツト梓等ノ製作ニ用フ。又構寸ノ軸木トナリ薪材ニ用フルモ火力可ナリ強シ。樹皮ハ染料及ビ驅蟲劑トナリ。葉モ亦驅蟲ノ用ヲナシ或ハ樟蟲ノ食餌トモナル。蝦夷地ニテハ胡桃ノ皮ヲ卷キテ喇叭ノ如キモノヲ作ル。コレ即胡桃笛ニテ世ニ胡沙ト稱スル由。白井博士ニヨレバ此具ハ山中ヲ行ク時ニハ喇叭ノ代リトナリ。家ニアル時ハ樂器ノ用ヲナス故ニ内地ノ尺八ト法螺ノ具トノ二用ヲ兼ネシ如キモノ也ト果實ハ破リテ内部ノ種子ヲ食トシ或ハ油ヲ搾リテ食用其他ノ用ニ供ス。而メ外殼ハ膳若クハ廣蓋ノ脚トナリ又核ヲ磨キ或ハ彫刻シテ根付トナス。且ツ其形ノ雅致アルニヨリ之ヲ漆器ノ象眼. 其他工藝品ノ模様取りニ供スト云フ。又實ノ綠皮ハ揮發油ヲ含ミ且ツ單寧. 枸橼酸等ヲ含ムニヨリ之ヲ以テ皂色染料及ビ藥用ニ供ス。仁モ亦民間齒ノ藥トナス。

(763) *Pterocarya rhoifolia*, S. et Z.

さはぐるみ. コグルミ. ヤスノキ.

ジユカウボク. カハグルミ. フヂグルミ.

(壽香木)

麓. 八幡堂ノ上. 須走口馬返及其上. 吉田口一合.
大宮新道一合半二合.

山間ノ低濕地ニ適スル落葉喬木。樹皮ハ赭黑色ニシテ厚密。深キ裂目アリ。枝ハ褐色ニ灰色ヲ帶ビ且ツ白斑アリ。葉ハ前者ヨリ質薄クシテ軟ク。細齒ヲ有シ。縁邊ニ細齊鋸齒ヲ存シ。葉本ハ耳形ヲ呈ス。雌雄同株。雌花穗ハ一尺餘ニ垂下シ。一梗ニ數多ノ果實ヲ結ブコト其狀藤ノ花房ノ如クナルヨリ藤ぐるみノ稱アリ。果實ハ徑二分許ニシテ二個ノ翅ヲ有ス。他ノぐるみヨリ果實小ナル故ニこ

ぐるみト云ヒ水邊ニ多ク生ズルヨリ澤ぐるみ或ハ河ぐるみト呼ブ。

◎心材暗褐邊材淡褐。質輕虚ナルコト桐ニ似タリ。故ニ材名ヲ山ざり(同名多シ)トモ云フ。下駄トシテ桐ニ次グ。マタ火鉢ノ胴。馬鞍。小銃臺木。白箸。燐寸ノ軸木トモナシ。鉋ニテ削リタルモノヲ編ミテ座布團トナス。内皮ハ壽光皮ト稱シ磨キテ紋理ヲ表ハシ卷キ合セテ匣。盆其他ノ細工物トスルニ頗雅美ニシテ又能ク久シキニ耐ユ。外皮ハマタ魚網ヲ染ムルニ用フ。葉ハ毒蟲ニサ、レタル時揉ミテ之ヲツケ或ハ浴湯ニ投ジテ入浴スレバ一夜ニシテしもやけ。あかざれ等ヲ治スト云フ。

Chloranthaceae. 金粟蘭科

(764) *Chloranthus serrata*, Roem et Schult.

ふたりしづか。サヲトメバナ。及己。

麓。村山ノ上。札打。一ノ澤。大宮新道。

陰地ニ生ズル一尺許ノ高サル多年草。莖ハ明ニ三四ノ節ヲ有シ枝ヲ分ツコトナシ。葉ハ卵形又ハ橢圓形ニテ尖リ細鋸齒アリ。通常莖頂ニ四葉ヲ對生シ。其處ヨリ長一寸餘ノ二穗ヲ立テ、細花ヲ互生點綴ス。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(765) *Chloranthus japonicus*, Sieb.

ひとりしづか。マユハキサウ。ヨシノシ

ヅカ(同名アリ)。銀線草。

麓。村山ノ上。札打。大宮新道一合。

頗前者ニ似タル品種ナレド葉ヤ、小ク且ツ葉面光澤アルノ異アリ。通常莖上ニ一穗ヲ抽ク。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

Saururaceae. 三白草科

(766) *Houttuynia cordata*, Thunb.

ごくだみ。シブヤク。チゴクバ。

ロウダウヤサ。蕺菜。

麓。大宮。北山。

花ハ裸花ニシテ淡綠色ヲ呈シ。聚リテ小穗ヲナシ。其下ニ白色花瓣様ノ四苞片ヲ具フ。此草臭氣強シ。

◎臭氣ハ煤熱スレバ消失スルヲ以テ駿甲ノ山民好ミテ之ヲ蔬トス。和方ニハ瘡腫ノ類ニ外用ス。脱肛。痔ヲ病ムモノ此煎汁ニテ洗ヘバ病ヲ和グ。生草ハ以テ馬ヲ飼フベク又ヨク馬病ヲ治スト云フ。

Monocotyledoneae. 單子葉類

Orchidaceae. 蘭科

- (767)
- Calanthe discolor*
- , Lindl.

えびぬ.

麓. 村山ノ上.

根形えびノ如クニ屈曲ス。花ハ帶褐紫色。白色等ニシテ美麗ナリ。◎觀賞用トシテ栽培ス。

- (768)
- Cyrtopodium japonicum*
- , Thunb.

くまがえさう。ホテイサウ(同名アリ)

喬.

高一尺許ノ多年草。其上部ニ扇ヲ開キタル如キ潤大ナル葉ヲ出シ。春月葉間ヨリ花莖ヲ抽キテ淡黄綠質ニ暗紫點アル美花ヲ開ク。旗瓣ノ母衣狀ヲナセルヨリ其名アリ。

◎觀賞用トシテ栽培ス。

- (769)
- Epipactis falcata*
- , Wettst.

きんらん。キサラン。アサマサウ。

麓. バツカケ。

葉ハ無柄。廣披針形又ハ楕圓形ニシテ所謂笹葉狀ヲ呈シ基脚ハ稍莖ヲ包ム。花ハ上ニ向ヒ花蓋片ハ十分開展セザル狀アリ。◎栽エテ觀賞ニ供スベシ。

- (770)
- Epipactis erecta*
- , Wettst.

ぎんらん。ハクサンラン。

麓. 大宮口。

葉ハ長卵形或ハ廣披針形ニシテ前者ヨリヤ、短小ニ。質モ亦薄シ。花被ハ白色ニシテ前者ヨリヤ、小ナリ。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

- (771)
- Epipactis, Thunbergii*
- , A. Gr.

すゞらん。カキラン。小紫含笑。

麓. バツカケ。村山及其上。

濕潤ノ地ニ生ズ。花色深黄ニシテ唇ハ白質ニ鮮紅點ヲ印ス。一見きんらんニ似タレド花被及ビ莖ニ多少紫色ヲ帶ブ。◎栽エテ觀賞ニ供スベシ。

- (772)
- Epipactis latifolia*
- , All. var.
- papillosa*
- , Max.

えぞすゞらん。アヲスマラン。

麓. 喬. 大宮口一合ノ下。須走口1960m.—2000m.

莖高一尺内外ニ達スル多年草。葉ハすゞらんノ葉ヨリ更ニ狭長ニシテ先端尖リ。質ヤ、剛ク且ツ微ク毛ヲ帶ビ。彼ノ如クニ紫黑色ヲ呈スル部ナシ。花ハ帶褐紫色ニシテ七八月梢上ニ總狀花序ニ綴ル。

- (773)
- Ephiphianthus, Schmidtii*
- , Reichb. fil.

こいちえふらん。

麓. 八幡堂。

多年草ニシテ一莖ヲ抽クコト四五寸。略卵形ヲナセル一葉ヲ着ケ。葉ハ鈍頭カ然ラザレバ鋭頭ナラズ。基脚ハ葉面ヨリ殆ド同長ノ葉柄ニ連ル。八月頃莖頂ニ疎穂ヲナシテ短總狀花序ヲナシテ白色ノ小花三四個ヲ綴ル。

◎高山植物トシテ觀賞ス。

- (774)
- Galeola septentrionalis*
- , Reichb.

つちあけび。ヤマシヤクヂヤウ。

ヤマタウガラシ。山珊瑚。

麓. 喬. 大宮新道一二合。

莖高二三尺。枝アレドモ葉ナシ。七月枝上ニ數花ヲ著ク形蘭花ニシテ淡紫黄色。果實ハ小指大トナリ鮮紅色ニシテ恰モ蕃椒ノ如シ。

◎山民此實ヲ味噌汁ニテ煮食シ或ハ甘草ト煎服シテ痲痺ノ妙藥トナス。

(775) *Gastrodia elata*, Bl.

おにのやがら。ヌスビトノアシ。

赤箭。天麻。

麓。吉田馬返間

樹蔭ニ生ズル寄生植物ニシテ葉緑ヲ含マズ。地中ニ肉質塊状ノ根部ヲ有ス。地上莖ハ黄赤色ニシテ三尺許ニ達シ鱗状葉ヲ存ス。五六月頃黄赤色ノ不整齊花ヲ穂ノ如キ總状ニ綴ル。蒴ハ短小ナリ。◎地下部ヲ薬用トス。

(776) *Goodyera pendula*, Max.

つりしゆすらん。

麓。八幡堂ノ上。

根莖ハ古木ノ幹上ニ匍匐シ太キ鬚根ヲ有ス。莖ハ根莖ヨリ垂下シ。長五寸許。葉ハ常緑披針形ニシテ五條ノ肋ヲ有シ。縁邊皺縮セリ。七八月頃莖ト稍銳角ヲナシテ登ラスル穗状花序ヲ成シテ帯褐白色ノ細花ヲ一側ニ偏リテ密生ス。◎觀賞ノ爲メ好ミテ栽培ス。

(777) *Goodyera repens*, R. Br.

しゆすらん。ピロウドラン。

喬。

莖高四五寸ヨリ六七寸ニ達スル常緑披針形ニシテ莖ノ下部ヨリ太キ鬚根ヲ生ズ。葉ハ長橢圓形。尖頭。七八月頃帯緑淡紅色ノ數花ヲ梢上ニ絲状ヲナシテ綴ル。

◎觀賞用トシテ栽培ス。

(778) *Gymnadenia conopsea*, R. Br.

ちどりさう。テガタチドリ。

草。麓。大宮口三合。同四合ノ西。

地下ニ掌状ニ分裂セル扁平ナル根莖アリテコレヨリ太キ鬚根ヲ生ズ。莖高一二尺。葉ハ柔滑。披針形ニシテ基脚ハ鞘状ヲナシテ莖ヲ抱キテ互生シ。梢ニ至ルニ從ヒテ小形トナル。六七月頃梢上ニ花莖ヲ抽キテ深紅紫色ノ花ヲ穗状ヲナシテ綴ル。毎花一小狭苞アリ。唇瓣ハ三裂シ基脚ニ距ヲ具ヘ。距ハ絲状ニシテ長五分許。多少前方ニ彎曲ス。◎觀賞ノ爲メ栽培ス。

(779) *Gymnadenia cuculata*, Reich.

みやまもちづり。

喬。須走口(1350m.—1360m. 即馬返及其下。

富士山ヲ始メ御岳駒ヶ岳等ノ内地諸高山ノ喬木帯及ビ北海道ニ生ズル多年生ノ小草本ニシテ莖高三四寸ニ過ギズ葉ハ長卵形。全邊ニシテ通常二三個叢生ス。八月頃梢上ニ穗ヲナシテ紅紫色ノ花ヲ開ク。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(780) *Liparis auriculata*, Bl.

くもきりさう。タカノハ。クモチリサウ

麓。村山ノ上。

莖高五六寸時トシテハ一尺許。所謂二葉蘭ノ著大ナルモノニシテ葉面ハ卵圓形ニシテ銳頭ナラズ。基脚ハ溝ヲナシテ葉柄トナル。六月頃葉間ヨリ更ニ長キ一ノ花莖ヲ抽出シテ上部一寸許ノトコロニ疎穗ヲ綴ル。

◎栽エテ觀賞ス。

(781) *Liparis, Kramerii*, F. et S.

ちがばちさう。

喬。大宮口

五月下旬ヨリ七月上旬ニ涉リテ葉間ヨリ一葉ヲ抽出シテ總状花序ヲナシテ花アリ。葉ハ前者ヨリ狭クシテ頭尖リ花ハ前者ヨリ長形ニシテ殆ドちがばちノ形ニ似タリ。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(782) *Liparis nervosa*, Lindl.

こくらん。

麓。大宮口。

地下莖ハ壯大綠色ヲ呈ス。其二葉相向ヒテ生ズルノ状クもきりさうノ如クナルモ葉形ヤ、狹長ニシテ尖リ。葉脈著シキノ殊散アリ。五月頃莖ヲ抽クコト五六寸。上部ニ疎穂ヲナシテ殆ド黒色ノ數花ヲ綴ル。

◎栽エテ觀賞ス。

(783) *Listera cordata*, R. Br.

こふたばらん。

麓。灌。村山ノ上。大宮口ニ合目。

細莖ノ小草本ニシテ四五寸ノ高ニ達ス。莖ノ中央ニ無柄心臓形ノ二葉ヲ對生シ。七八月頃其頂上ニ總狀花序ヲナシテ淡綠色ノ花ヲ着ク。其牌瓣ノ裂片ハ線形ニシテ鋭尖ナリ。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(784) *Listera*, Savatieri, Max.

あをふたばらん。

麓。喬。村山ノ上。大宮口喬木帯。須走口1520m。狩休ノ上。

葉ハ莖ノ上部ニ附着シ。往々葉脈ニ沿ヒテ白斑ヲ具フ。七八月頃綠色ノ細花ヲ綴ル。牌瓣ハ狹長ナル倒卵狀楔形ヲナシテ上部ニ裂シ。裂片ハ通常開離セズ。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(785) *Listera*, Yatabe, Mak.

たかねふたばらん。

喬。須走口(1500m.)

前二者ニ似タル草本ニシテ八月花アリ。牌瓣ニ裂シ裂片ハ開長シ。鋭頭長橢圓形ヲナス。◎栽エテ觀賞ス。

(786) *Neottia micrantha*, Lindl.

ひめむえふらん。

喬。麓。村山ノ上。小屋坂。吉田口四合。

寄生小草本ニシテ高七八寸ニ達ス。根ハ纖維狀ニシテ叢生シ。葉ハ鱗狀ニシテ互生ス。夏月赤褐色ノ不整齊ナル細花ヲ總狀花序ニ排列ス。

(787) *Oberonia japonica*, Max.

やうらくらん。

麓。喬。八幡堂。村山。

頗小形ノ氣生植物ニシテ多クハ喬木ノ梢上ニ附着シテ垂下ス。葉ハ平滑。微小ニシテ左右ニ鱗狀ニ密列ス。五六月頃淡紅綠色ノ微花ヲ一ニ寸ノ長穂ヲナシテ着ク。其形ニヨリテやうらくらんノ稱アリ。

◎雅致アルヲ以テ觀賞ノ爲メニ愛養ス。

(788) *Orchis cyclochila*, Max.

いちえふらん。カモメラン。イチエフチドリ。

喬。須走口(1630m - 1650m.) 狩休ノ上。吉田口四合。

高四五寸ノ宿根草ニシテ根際ヨリ一莖一葉ヲ生ズ。葉ハ廣楕圓形。倒卵形ニシテ頭圓ク。基脚ハ溝ヲナシテ葉面ヨリ短キ葉柄トナル。七月頃莖上ニ通常ニツノ花梗稀ニ三ツノ花梗ヲ出シテ淡紅色ノ花ヲツク。花ハ下方ノ瓣比較的大ニシテ深紅色ノ斑點ヲ存シ。距ハ著シク長シ。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(789) *Platanthera interrupta*, Max.

おほばのさんぼさう。

麓。

高二尺許ノ直立草本。普通種ニシテ下部ノ一葉ハ最大ニシテ長楕圓形又ハ長倒卵形ヲナシ上部ニ至ルニ從ヒ漸次

ニ披針狀ノ小形トナル。夏月綠質ノ小花ヲ疎穂ニ綴ル。其唇瓣ハ子房ヨリ長キ壯大ナル距ヲ有シ。或ハ横向ニ或ハ斜メニ上向ス。

(790) *Platanthera mandurinatorum*, Reich. fil.

やまさぎさう。

麓. 喬. 天照教. 細紺野. 中畑. 吉田口五合. 大宮口一合. 須走口喬木帯.

莖七八寸ヨリ一尺餘ニ及ブ。莖上ニ二三ノ葉ヲ互生ス。下部ノ一葉最大ニシテ其他ハ小ナリ。花ハ夏月開キ。黄綠色ニシテ唇瓣ハ披針狀線形ヲナシ。花蓋片中最大ナル外花蓋ハ倒生片ヨリ微シ長ク。距ハ壯大ニシテ彎曲シ上向ス。

(791) *Platanthera listeroides*, Takeda.

じんばいさう。ミヅモラン。

麓. 喬. 大宮口. 狩休附近.

葉ハ二個アリテ莖ノ下部ニ互生シ。橢圓形或ハ卵形。花ハ淡綠ニシテ夏月穂狀ニ排列シ唇瓣ニ長キ距ヲ具フ。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(792) *Platanthera ophryoides* Fr. Schm.

きそちどり。

麓. 喬. 入幡堂大從間. 吉田口三四五合.

高六七寸乃至八九寸ノ直立多年草。葉ハ少數ニシテ其最下ノ一葉ハ大ナル橢圓形ヲナシ其下底ヲ以テ莖ヲ抱ク。ソレヨリ上ニ尙一二ノ細キ披針形ノ葉ヲ着ク。七八月頃頂上ニ二寸内外ノ總狀花序ヲナシテ六七個ノ淡黄綠色ノ小花ヲ綴ル。◎栽エテ觀賞ス。

(793) *Platanthera ussuriensis*, Max.

こどんぼさう。トンボサウ。

麓. 大宮口. 須走口.

大葉とんぼさうヨリ莖細ク葉モ薄クシテ小ナリ。但シ下部ノ二葉ハ大ニシテ長倒卵形或ハ倒披針形ヲナス。唇瓣ハ下垂シ。基部ノ兩側ニ短キ側片ヲ有シ。中央片ハ長橢圓形ニシテ鈍頭ヲナシ。距ハ瘠長ニシテ子房ト長サヲ均シクス。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(794) *Pogonia japonica*, Reich. fil.

ときさう。

麓. 大宮口.

山麓ノ濕地又ハ山腹ノ濕原等ニ生ズル多年草。莖ハ細クシテ高四五寸乃至一尺許。地下ニ少數ノ鬚根ヲ有ス。地上莖ニハ殆ド其中央ニ披針形ノ一葉アリ。頂上ニ披針形ノ苞ト共ニ一花ヲツク。花ハ初夏開キ恰モ白及ノ花ノ如クニ上向シテ僅ニ開展ス。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(795) *Spiranthes australis*, Lindl.

もちづり。ネヂバナ。綬草。

麓. 大宮新田. 村山ノ上. 須走口1240m. 同(800m. - 900m.)

山足及ビ里間近キ堤防。芝地等ニ普通ノ直立草本ナリ。初夏五六寸乃至一尺餘ノ莖ヲ抽キテ其上部一二寸ノ穂ヲナシテ淡紅紫色ノ無梗花ヲ右旋シテ綴ルニヨリれぢばなノ稱アリ。◎觀賞ニ供ス。

Iridaceae.

鳶尾科

(796) *Belamacanda chinensis*, Lem.

ひあふぎ。射干。

麓. 富士根村. 粟倉.

葉ハ廣キ劍狀ヲナシテ密ニ互生シ扁平トナリテ槍扇ヲ展ケルガ如シ。花ハ夏月。

◎屢々庭園ニ栽エテ觀賞ス。根ハ水腫ヲ治ス。マタ餉飲ノ下シ藥トモナシ目ノ星ヲ去ルニモ用フ。

(797) *Iris japonica*, Thunb.

しやが。蝴蝶花。

麓。宮原。村山。御殿場。

葉ハ前者ニ似タレド濃綠色ニシテ頗光澤アリ。四五月頃花莖ハ數枝ヲ分チテ各三五花ヲ着ク。花ハ細キ花梗ヲ有シ。白質ニシテ紫色ヲ帯ビタル花被アリ。而シテ其花蓋片ハ上面ニ毛狀ノ突起ヲ有シ。邊緣ニ鋸齒ヲ具フ。

◎觀賞ニ供ス。

(798) *Iris sibirica*, L. var. *orientalis*, Thunb.

あやめ。ハナアヤメ。溪蓀。

麓。

葉ハ比較的細ク扁平ニシテ外花被ノ内面ニ網狀ノ斑紋ヲ存ス。觀賞ニ供ス。

Dioscoreaceae. 薯蕷科

(799) *Dioscorea japonica*, Thunb.

じねんじょう。ヤマノイモ。薯蕷。

野山藥。

麓。大宮。村山ノ上。

つくねいもの原種ニシテ長大ノ根ト細長キ莖トヲ有スル纏繞植物。葉ハ對生。長心臟形或ハ披針形。卵狀披針形ニシテ尖リ。基脚ハ心臟形ヲ呈シ。長柄アリ。蒴果ハ三個ノ翅ヲ有シ且ツ蒴ハ下向シ多クハ上下凹入ス。葉腋ニ零餘子ヲ生ズ。◎根モ零餘子モ食用及ビ藥用トナル。

(800) *Dioscorea septemloba*, Thunb.

きくばごころ。モミヂドコロ。

麓。バツカケ。大宮新道一合。吉田口。

葉ハ心臟形。互生。長柄ヲ有シ。多クハ七數ノ掌狀ニ分裂シ。裂片ハ長卵形ニシテ多クハ銳尖頭ヲ有シ。邊緣ノ皺曲スルモノ多ク。平滑ニシテ毛茸ナク且ツかへでどころノ如クニ葉柄本ニ二細刺ヲ存スルコトナシ。乾枯スレバ暗黒色トナル。雄花ノ穂ハ多クノ枝ヲ分ツヲ常トシ其無柄ナル細花ハ個々穂狀ニ點花シテ膜質ノ鱗苞ヲ具フ。花色淡黃綠色ニシテ甚ダかへでどころト異レリ。蒴果ハ廣キ倒卵形ニシテ上部微ニ廣闊凹頭ヲナシ。翅ハ種子ヲ全周ス。零餘子ナク。根莖ハ横行ス。

(801) *Dioscorea tenuipes*, F. et S.

ひめごころ。

麓。大宮。村山。

葉ハ心臟底ニシテ底耳開出シ。銳尖頭ニシテ掌狀分裂ヲナサズ。葉質薄ク。葉柄ノ基部ニハ刺狀ノ二小突起アリ。雄花ノ花序ハ下垂スルコト三四五寸。總狀ニシテ有梗ノ細花ハ軸上ニ二把生ス。花蓋片ハ圓柱狀長橢圓形ニシテ邊緣ハ縦ニ反卷シ。淡綠色ナリ。柱頭ハ分裂セズ。蒴ハ圓形。微凹頭。翅ハ種子ヲ全周ス。根莖ハ肥大横行シ根ハ鬚狀ナリ。

(802) *Dioscorea*, Tokoro, Mak.

おにごころ。(山草薺)

麓。大宮。大宮新道一合。

葉ハ互生。長柄ヲ有シ。圓形或ハ卵圓形。全邊ニシテ裸出シ。心臟底。銳尖頭。皺縁ヲ有ス。雌雄異株。花序ハ雄花ハ總狀。雌花ハ無柄。柱頭ハ各縦ニ二裂根ヲ印ス。蒴ハ橢圓形。凹形ニシテ翅ハ一方ノミ偏張ス。根莖ハ肥大ニシテ横行シ苦味アリ。根ハ悉ク鬚狀ナリ。此種やま

のいもニ似タレド其葉ハ彼ニ比スレバ通常幅廣ク。基脚心臓形ノ凹入稍淺ク又互生スルヲ以テ識別シ得ベシ。

(803) *Dioscorea gracillima*, Miq.

たちどころ。

麓。栗倉。須走ノ上。

葉ハ其距離不正ニ遠近シテ互生シ。皺縁ヲ有シ。鋭尖頭心臓底ナリ。莖ハ下部割合ニ堅ク強クシテ多少直立スルノ状アリ。蒴果ハ圓形或ハ平圓形。微凹頭。翅ハ種子ヲ全周シ。菱圓形或ハ長方圓形ナリ。

◎古來葷蕒ト稱シテ藥用ニ供スルモノハ概此種ノ地下部ナリ。

Amaryllidaceae. 石蒜科

(804) *Lycorils radiata*, Herb.

まんじゆしやけ。シタマガリ。ヒガンバナ。石蒜。

麓。

秋ノ彼岸頃ニ一ニ尺許ノ花軸ヲ抽キテ其頂端ニ鮮紅燄ユルガ如キ美花ヲ繖形ニ開出ス。

◎味苦辣ニシテ嚙メバ舌曲リ語滲ル。サレド球莖ヨリ澱粉ヲ製シテ食用トス。生者ヲ其儘食スレバ嘔吐シ或ハ下痢ス。故ニ古來吐劑トナセリ。又花莖根ヲ搗キテ其汁ヲ書物箱ナドニ塗りオケバ蟲食ハズ。又繪ヲ書クトキニ膠ノ代用トナスベク。或ハ泥土ニ和シテ壁ヲ塗レバ鼠入ラズト云フ。

(805) *Lycoris sanguinea*, Max.

きつねのかみそり。鐵色箭。

麓。北山。栗倉。村山。

葉ハ石蒜ノ葉ヨリ幅潤クシテ長ク。其色水仙ニ見ルガ如クニ白緑ニシテ石蒜ノ如ク綠色ナラズ。盛夏花莖ヲ抽クコト一尺許ニシテ莖頂ニ黄赤色ノ四五花ヲ繖形ニ綴ル。花蓋ハ石蒜ヨリ淺ク分裂シ裂片彼ノ如クニ反捲セズ。花蓋モ亦彼ノ如クニ花蓋外ニ超出スルコトナシ。

◎有毒ナレドモ往々觀賞ニ供ス。

Liliaceae. 百合科

(806) *Alectris japonica*, Lamb.

そくしんらん。(即心蘭)

麓。大宮口。

直立草本ニシテ莖細ク一尺餘ニ達シ微ニ毛ヲ帶ブ。葉ハ薄ク。細長ク狹線形ヲナシテ尖リ。地下ノ莖ヨリ叢生ス五月頃二三寸ノ穗ヲナシテ淡紅白色ニシテ稍鐘狀ヲナセル細花ヲ開ク。◎往々栽エテ觀賞ス。

(807) *Allium Bakeri*, Regel.

らつきやう。薤。

麓。北山ノ和平。

葉ハ細長ク中空ニシテ五稜ヲ有ス。秋月小紫花ヲ繖形ニ簇開ス。

◎地下莖ヲ酢漬又ハ二杯酢漬トナシテ食用トス。又臍汗。臍血等ノ藥ニ用フ。

(808) *Allium japonicum*, Regel.

やまらつきやう。ムラサキビル。

ヤマニラ。山薤。

麓。村山ノ上。天照教ノ上。大宮新道一合。

のびるニ似テ莖ヤ、硬ク。薤葉ヨリ細クシテ厚シ。葉ハ

扁長ニシテ其背隆起アリ。秋月莖頂ニ繖形ニ多梗ヲ出シテ深紫色ノ花ヲ開ク。六雄蕊アリテ花蓋ノ外ニ超出ス。

(809) *Allium odorum*, L.

にら。フタモジ。韭。

麓。宮原村。

葉ハ扁長ニシテ柔軟ナリ。花ハ白色。全体ニ一種ノ臭氣アリ。花序ハ繖ノミニシテ肉芽ヲ生ゼズ。果熟スレバ自ラ開キテ内ヨリ小黑子ヲ現出ス。

◎食用及ビ薬用トスレド多食スレド神ヲ暗クスト云ヘリ。

(810) *Clintonia udensis*, Trautv. et Mey.

つばめおもと。サ、ニンドウ。スパシリオモト(富士)タウチサウ。

麓。狩休ノ上(134m.—1650m.—1750m.—1950m.—2100m.) 吉田口一合ノ上ヨリ三合ノ上マテ。

吾邦中部及ビ北部ノ喬木帯ニ生ズル多年草ニシテ莖高五七寸乃至一尺餘ニ達ス。六月莖頂ニ長梗ニヨリ繖形ヲナシテ六片ノ花被ヨリ成レル白花ヲ開ク。八九月頃帯碧黒色ニシテ球形ノ漿果ヲ熟ス。葉ハ長倒卵形ニシテしやうじやうばかまニ似テヤ、大且ツ厚ク。色モ亦濃緑黒色ヲ呈シ頗萬年青ノ状アリ。故ニ山民ハ之ヲ富士おもとト呼ブ。◎往々栽エテ觀賞ス。

(811) *Disporum sessile*, Don.

はうちやくさう。(寶鐸草)

麓。細紺野。大宮新道一合。

山陰ニ生ズル宿根草ニシテ莖一尺ノ高ニ達シ枝ヲ分ツ。葉ハ長卵形ニシテ先端尖リ條脉著明ナリ。五月頃六片ヨリナル筒状花ヲ枝端ニ下垂シテ開ク。花ハ下部白クシテ上部ハ綠色ナリ。果實ハ黒シ。

(812) *Disporum smilacium*, A. Gr.

ちごゆり。

麓。細紺野。

莖高五六寸乃至一尺許ニ達スル宿根草ニシテ林中ニ生ズ葉ハ卵狀楕圓形ニシテ先端尖リ。一見はうちやくさうノ葉ニ似タレド小形ナリ。春月莖頂ニ白質ニ淡黄緑ヲ帯ベル小花ヲ開ク。花被ハ六片ヨリ成リ各尖披針狀ヲ呈シ。果實ハ球形ノ漿果ニテ熟スレバ黒色ナリ。

(813) *Hemerocallis fulva*, L.

わすれぐさ。萱草。

麓。大宮新田。

春月長葉ヲ宿根ヨリ叢生スルコト一二月。六月頃莖高二尺許ニ達シ枝ヲ分チテ數花ヲツケ。漸次ニ開花ス。花蓋片ハ大形ニシテ卵黄色ヲ呈シ明瞭ニ結合シ。朝ニ開キテ夕ニ萎ム。香氣アリ。外花片ハ狭小。内外片ハ濶大ニ各一雄蕊ヲ出シ。三房三稜ニシテ尖レル一柱長ク雄蕊ノ先ニ出ヅ。◎觀賞ニ供ス。

(814) *Hemerocallis fulva*, L. var. *Kwanso*, Regel.

やぶくわんざう。オニクワンザウ。

千葉萱草。

麓。

山林草叢ノ間ナドニ生ズル宿根草。葉ハはなしやうぶナドニ似テ柔ク。彼ノ如クニ葉面ヲ失フコトナシ。夏月二三尺アル梢上ニ赤褐色ノ重瓣花ヲツク。

◎栽エテ觀賞ス。

(815) *Hemerocallis fulva*, L. var. *longituba*, Mak.

のくわんざう。紅萱。

麓。

草叢ノ間ニ生ズル多年草ニシテ毎年地下莖ヨリ叢生スル

葉ハ淡綠色ニシテ其質柔ク、細長キ劍状ナシテ多少彎曲スル傾アリ。夏月葉間ニ花莖ヲ抽クコト二尺許、總状ナシテ様黃色ノ六片ヲツク。其花おにゆりニ比シテ稍小ク、又彼ノ如クニ花片ノ反捲スルコトナシ。草状萱草ヨリヤ、小ク、花形ヤ、筒状ヲ呈スルノ徴アリ。

◎往々栽エテ觀賞セラル。

(816) *Hemerocallis minor*, Mill.

ゆうすげ、アツヨヒグサ(同名アリ)。

ヨシノキスゲ、麝香萱。

麓、鈴ヶ原。

葉ハ萱草ヨリ小ニシテひめくわんざうヨリハ大ナリ。夏月莖ヲ抽クコト三尺ノ高サヲ超エテ瘦細ニ、梢頭分叉亦長梗ヲ出スノ状ひめくわんざうト其趣ヲ異ニス。花モ亦微大、其花尤淡クシテ微香アリ。花叢ノ下部瘦筒ヲナシテ小柄ノ如シ。此モノ日落チテ開キ日昇リテ衰へ午前ニ凋ム。故ニゆうすげ又まつよひぐさノ名アリ。根ハ叢生シテ鬚状ヲ呈ス。

(817) *Hosta coerulea*, Tratt.

ぎばうし、ウルイ、紫萼。

麓、喬、村山、北山、太郎坊ノ下、須走口900m. - 1420m.

山野ニ自生アレド庭園ニモ培植セラル。莖高二尺餘ニ達ス。葉ハ全邊ヤ、卵形ニシテ四五寸ノ長ヲ有シ、長柄ニテ叢生ス。地下ニ塊莖ナシ。夏月叢葉ノ間ヨリ花莖ヲ抽キ其上部ニ總状ナシテ帶紫色或ハ白色ノ六片ヨリ成レル花ヲ着ク。花ノ下部ハ筒状ニシテ苞ハ綠色ナリ。

◎觀賞ニ供ス。又若キ葉ヲ蔬トナス。

(818) *Hosta japonica*, var. *angustifolia*.

みづぎばうし、サジギバウシ。

麓、村山、北山。

山野水澤沮洳ノ地ニ生ズ。葉ハ狭長ニシテ尖リ、通常六七寸アリテさじノ如シ。秋月一尺許ノ花莖ヲ出シテ數個ノ白質又ハ帶紫色ノ花ヲ總状ニ綴ル。

◎栽エテ觀賞ス。

(819) *Hosta, Sieboldiana*, Engl.

たうぎばうし、テウセンギバウシ。

玉簪、白鶴。

麓、村山(人家)。

主トシテ人家ニ栽培ス。葉ハ長柄ヲ有スル卵形ニシテ通常六七寸ニ達ス。濃綠色ニシテ蠟質ノ粉白ヲ帶ビ縦條多シ。夏月葉間ヨリ圓莖ヲ抽クコト三四尺ニシテ上部ニ粗キ穗状ナセル總状花序ニ排列ス。花ハ淡紫色或ハ白色ニシテ正開セズ。一花ノ長サ一吋四五分、長莖花外ニ出テテ鶴ノ形ニ似タルヨリ又白鶴仙ノ名アリ。

◎觀賞ノ爲メニ栽培ス。

(820) *Hosta, Sieboldiana*, Engl. var. *longipes*, Matsum.

いはぎばうし、ウルイ。

喬、麓、村山、北山、鈴ヶ原、須走口(1430m.附近)

普ク山中ノ磯地ニ生ズル多年草ニシテぎばうしニ類似スレド短小ニシテ葉裏ノ並行脈間ニ有スル横皺ノ著シキ異アリ。

◎觀賞用ノ外、山民採リテ蔬トナス。秩父地方ニテハ楮ノ製紙ノ時、黄蜀葵、のりうつぎト共ニ此物ヲ使用ス。

(821) *Lilium auratum*, Lindl.

ほうらいじゆり、ヤマユリ、エイザンユ

リ、天香百合。

麓、バツカケ、栗倉。

莖高四五尺ノ高サニ達スル雄大ナル品種ナリ。三河ノ鳳

蒸寺邊ニ生ズルヨリ其名ヲ得タリ。葉ハ披針形、廣披針形ニシテさくゆりヨリ大ク且ツかのこゆりノ葉ニモ似タレド遙ニ長大ナリ。花美大ニシテ直徑一尺ニ近キモノアリ。花蓋片ハ白質ニシテ反捲シ。中心ニ黃色ノ一縱道ヲ存シ且ツ暗紅色ヲ散布シ。爪ニ同色ノ刺毛様突起アリ香氣強シ。

◎鱗莖ヲ食用トシ又花ヲ觀賞ス。外國へ輸出スル百合類中最重要ノ品タリ。

(822) *Lilium avenaceum*, Fisch

くるまゆり。

灌. 喬. 大樞ノ下. 大宮口一合ノ下. 吉田口五合. 馬返. 須走口(1000m.-1950m.) 大宮口(1500m.-1200m.)

深山ニ在リ。葉ハ披針形ニシテ下部ノモノハ正ニ叢リテ輪生ノ狀ヲナシ上部ニ至レバ小葉ヲ互生ス。夏月莖頭ニ近ク通常一二ノ枝ヲ分チテ黃赤色ニ暗色ノ斑點アル花ヲ開ク。花ハヤ、下向シ花被ハ外反ス。◎觀賞用食用。

(823) *Lilium concolor*, Salisb. var. *parthenion*, Bak.

あかひめゆり。山丹。渥丹。

麓. 村山ノ上。

春月地下莖ヨリ苗ヲ出シ高一尺乃至一尺餘ノ高サニ達シテ花アリ。葉ハおにゆりノ葉ヨリ遙ニ小形ニシテ綠色淺ク密ニ莖ニ分布ス。初夏梢上ニ一花又ハ二三花ヲツク。花ノ大サ躑躅花ノ如クニシテ上向ス。花蓋片ハ狭クシテ充分ニ展卷セズ。通常赤色ニ暗色ノ斑點ヲ存ス。

◎前者ニ同シ。

(824) *Lilium cordifolium*, Thunb.

うばゆり。ガバユリ。ヤブイモ。

蕎麥葉貝母。

麓. 細紺野. 大宮新道一合。

莖高三四尺ニ達スル多年草。葉ハ大形。心臟形ニシテ長柄アリ。夏月葉間ニ長莖ヲヌキテ梢上ニ帶綠白色ニシテ横向セル大形ノ花二三個ヲツク。

◎鱗莖ヨリ頁質ノ澱粉ヲトル。葉莖ノ嫩キモノハ煮テ蔬トナスベク。往々栽エテ觀賞ス。

(825) *Lilium japonicum*, Thunb.

さくゆり。サユリ。百合。

麓. 大宮口。

莖ハ高二三尺。葉ハヤ、披針形ニシテ竹葉ニモ類似シ。短柄ニテ疎ニ莖ニ互生ス。六月頃莖梢ニ花ヲ着クルコト一二。花ハ大形ニシテ長四寸許。本ハ聚リテ筒ノ如ク末ハ次第ニ開出シテ遙ニ反卷ス。花色白質ニ微ニ紅紫ヲ帶ビ。おにゆりノ如クニ斑點及ビ小突起ヲ有セズ。

◎花ヲ觀賞ニ鱗莖ヲ食用ニ供ス。

(826) *Lilium*, *Maximowiczii*, Regel.

こおにゆり。

麓. バツカケ. 細紺野. 水土野. 須走. 篠坂. 鈴ヶ原。

おにゆリニ似テ小ナリ。莖ニ紫黑色ヲ帶ブコト少シ。花モ稍小形ニシテ花蓋片肉ノ斑點おにゆリノモノヨリ細小ニシテ多ク。葉腋ニ珠芽ヲ生セザルノ異アリ。

◎鱗莖苦味少クシテ食用ニ佳適ス。又栽エテ觀賞スベシ。

(827) *Liriope graminifolia*, Bak.

やぶらん。大葉麥門冬。

麓. 阿幸地. 大宮. 上井出。

樹下竹陰等ニ多キ常綠草。葉ハ潤三四分。長一二尺。厚クシテ縱道多シ。一根ニ叢生ス。夏月一尺餘ノ花莖ヲ抽キ淡紫色ノ小花ヲ三五個ヅ、簇生シテ穗狀ノ總狀花序ニ排列ス。果實ハ秋ニ至リテ黒熟シテ南天子大トナル。

◎栽エテ觀賞シ根ヲ祛痰劑トス。

(828) *Majanthemum bifolium*, Dc.

まひづるさう。

喬。バツカケ。八幡堂附近。須走口 1340m. - 1980m.
大宮新道一合半ト二合間。吉田口二三合。小形ノ多年草ニシテ莖高四五寸ニ達シ莖上ニ通常二個特
トシテハ三個ノ柄アル卵狀心臟形ノ葉ヲ具フ。夏月總狀
チナシテ花アリ。花ハ小ク白色ニシテ四個ノ花被ト四個
ノ雄蕊トヲ有ス。果實ハ小球形ノ漿果ニシテ熟スレバ帯
褐色ナリ。◎栽エテ觀賞ニ供ス。(829) *Metanartheisium foliatum*, Max

ねばりのぎらん。

喬。灌。草。大宮口一合。同二三合。吉田口五六合。
須走口 (1590m. - 1970m.)頗のぎらんニ似タレド葉ノ狭長ナルノミナラズ。花部ニ
粘液ヲ分泌スルノ異アリ。(830) *Ophiopogon japonicus*, Gaur. var. *genuinus*, Max.

じやのひげ。リウノヒゲ。(沿階草)

麓。賽河原。バツカケ。

やぶらんニ似テ遙ニ纖小ナリ。夏月花莖ヲ出シテ短梗アル
六片ノ淡紫花ヲ總狀ニ綴リ後豆粒大ノ球形ニシテ碧色
ノ果實ヲ結ブ。◎多クハ庭園花壇ノ外圍等ニ栽エテ觀賞ニ供シ或ハ根ヲ祛
痰劑トナス。(831) *Paris quadrifolia*, L. var. *obovata*, Reyer et Til

くるまばつくばねさう。

灌。喬。大樞ノ上下。大宮口一合ノ前後。
吉田口三四合地下ニ結節狀ノ莖ヲ有シ。之ヨリ苗ヲ抽出スルコト一尺
許。莖頂ニ通常五七乃至八個ノ披針形或ハ倒卵狀橢圓形
ニシテ尖レル葉ヲ輪生ス。六七月頃葉間ニ高サ二三寸ノ一梗ヲ抽キ。其頂ニ淡黄綠色ノ花ヲ開ク。花被ハヤ、廣
披針形ノ大ナル四萼片ト其間ヨリ垂下スル線形ノ四瓣片
トヨリ成リ長形ノ葯ヲ有スル八雄蕊ト纖細ナル四本ノ花
柱ヲ有スル雌蕊トヲ有シ、葯隔ハ葯上ニ挺出ス。

◎栽エテ觀賞スル値アリ。

(832) *Paris tetraphylla*, A. Gr.

つくばねさう。王孫。

喬。八幡堂。大根ト八幡トノ間。第二中食。

深山ニ生ズル多年草ニシテ莖高一尺許ニ達ス。七八月頃
中心ヨリ一梗ヲ出スコト一寸許ニシテ頂ニ淡綠色。廣披
針形ノ四萼片ヨリ成レル一花ヲ着ク。葯隔ハ極メテ微ニ
葯上ニ出ヅルコトアレドモ全ク出デザルモノアリ。

◎觀賞ニ供スベシ。

(833) *Polygonatum falcatum*, A. Gr.

なるこゆり。黄精。

喬。須走口 1300m. 吉田口四合

あまどころニ似タレド莖圓クシテ決シテ稜條ヲ有セズ。
高二三尺許ニ達ス。葉ハ披針形ニシテ五縱道ヲ有シ。下
面多少ニ色ヲ呈ス。初夏葉腋ヨリ一花梗ヲ出シ。通常三
五岐チナシテ淡綠白色ニテ風鈴狀ノ花ヲ垂下シテ開ク。
根ハあまどころニ比スレバ粗短ニシテ結束ヲ有ス。◎地下莖ヲ滋養緩和劑トシテ病後衰弱症ニ用フ。又嫩苗葉
ハ食スルニ足ル。(834) *Polygonatum giganteum*, Dietr. var. *falcatum*, A. Gr.

ほそばのなるこゆり。

麓。大宮口

前者ニ似タレド其葉著シク狭細ナリ。

(835) *Polygonatum officinale*, All.

あまどころ。

麓. 大宮口.

なるこゆりニ類スレド莖ニ稜條ヲ帶ブ。地下ニ肉質ノ根莖アリ。莖ハ多ク暗紫色ヲ帶ブ。六七月頃葉腋ヨリ出テタル花軸ニ白色ニシテ先端綠色ヲ帶メル小キ筒狀花チ一
個或ハ二三個ヅ、生ズ。

◎地下莖ヨリ澱粉ヲトリ或ハ芳香。顔面除汚ニ用ヒ或ハ打撲傷ノ外用藥トナス。又屢々庭園ニ栽エテ觀賞ニ供シ救荒時ニハ苗葉ヲ食用ニ充ツ。

(836) *Polygonatum giganteum*, Dietr. var. *macranthum*, Max.

おほばわうせい.

喬. 須走口1370m.(馬返ノ上)

なるこゆりニ似テ更ニ大形ナリ。

(837) *Seilla japonica*, Bak.

つるば. サイダイガサ. スミラ. 綿棗兒.

麓. 大宮. 村山. 宮原.

春月地下ノ鱗莖ヨリ細長キ葉ヲ叢生シ。晩夏ヨリ初秋ニ
涉リテ七八寸乃至一尺許ノ細莖ヲ抽キ。其上部ニ淡紫紅
色ノ六片ヨリ成レル小花チ一二寸ノ穂ニツマル。

◎九州ノ癖地及ビ對馬ノ如キ穀類ノ少キ地方ニアハ古來食
用トスレド食後雷鳴下利スルヲ常トス。其方鱗莖ヲ洗滌
シ釜ニ入レ煮ルコト七八時間ニシテ其間時々釜中ノ水ヲ
替ヘテ苦味ヲ去リ後ニ食ニ充ツ。又煮沸シタルモノヲ搗
キ碎キ麥麩ヲ和シテ醱酵セシメ以テ酢ヲ造ルト云フ。

(838) *Smilax china*, L.

さるとりいばら. サンキライ. サルカキ
イバラ. ガンタチイバラ. 蕨蕨.

麓. 村山. バツカケ.

木質ノ多年生植物ニシテ多クノ刺ヲ有ス。莖ハ細クシテ

節毎ニユガミ高二三尺ヨリ大ナルハ一丈ニ達ス。葉ハ殆
ド卵圓形或ハ橢圓形ニシテ互生シ。托葉ハ著シキ卷鬚ト
ナリテ他物ニ卷絡ス。雌雄異株。果實ハ秋ニ至リニ小球
形ニ熟シ赤色トナル。

◎嫩葉ヲ煙草ニ代ヘ或ハ救荒時ノ蔬トナシ。塊根ヲ利尿劑
トシ解熱瘡毒ニ藥用シ。俗ニ和ノ山歸來ト稱ス。葉ハマ
タがしは餅ノ如クニ餅ヲ包ムニ用ヒラル。

(839) *Smilax herbacea*, L. var. *nipponica*, Max.

しほで. 牛尾菜.

麓. カケスバタノ上. 大宮新道一合.

雌雄異株ノ多年生攀緣草本ナリ。葉ハ互生。心臟狀圓形
或ハ卵狀披針形ニシテ卷鬚ニ變ジタル托葉アリ。夏月葉
腋ニ二寸許ノ花軸ヲ出シテ淡黃綠色ノ小花ヲ繖形ニ覆ル
果實ハ熟シテ黑色豆大トナル。

◎若キ莖葉ヲ救荒時ノ用ニ充ツ。

(840) *Streptopus ajanensis*, Til. var. *japonica*, Max.

たけしまらん.

喬. 八幡堂ノ上下. 吉田. 大宮新道一合.

一見スレバはうちやくさう又ハたうちくらんノ如キ多年
草ニシテ莖高一二尺ニ達シ通常枝ヲ叉狀ニ分ツ。葉ハ全
邊. 卵形或ハ長卵形ニシテ尖ル。八月頃有梗ノ小白花ヲ
葉腋ニ單生シ。下垂シテ開キ花蓋ハ外反ス。果實ハ赤色
球形ノ漿果ナリ。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(841) *Trillium smallii*, Max.

えんれいさう. エフロウサウ. タチアフ
ヒ(同名アリ). エレサウ.

麓. 喬. 細紺野. 八幡堂. 大宮新道一二合間.
吉田口二合. 同五合.

深山ニ生ズル多年草ニシテ高數寸乃至一尺許。地上莖ノ

上部ニハ卵圓形ニシテ尖レル三葉ヲ輪生ス。五六月頃花梗ヲ葉叢ノ中央ヨリ生ジテ一個ノ花ヲ戴ク。花ハ三個ノ花瓣ト三個ノ萼片トヲ有シ。花瓣ハ帶紫色ニシテ鈍頭ヲ有シ其長サ萼片ヨリ短シ。果實ハ球形ノ漿果ナリ。

◎有毒ナレドモ往時ハ地下莖ノ煎汁ヲ胃腸病ヲ治スルニ用ヒタリキ。亦栽エテ觀賞ス。

(842) *Trieyrtis hirta*, Hook.

ほどぎす。油點草。

麓。白糸。細紺野。大。新道一合。

山間ニ側ノ陰地ニ生ズル多年生ノ直立草本ニシテ高二尺餘ニ達シ莖葉共ニ微毛アリ。葉ハ互生。長卵形乃至披針形ニシテ尖リ。基部ニテ莖ヲ抱ク。葉面ニ油點ノ如キ數個ノ斑紋アリ。花ハ通常淡紫色ニシテ濃紫色ノ小點ヲ具ヘタル六片ノ花被ヲ有シ。夏秋ノ際葉腋ヨリ生ズ。

◎觀賞用トナス。

(843) *Veratrum album*, L. var. *granuliformum*, Max.

ばいけいさう。蒜藜蘆。

麓。喬。八幡堂。大宮新道一合。

深山ノ卑濕地ニ生ズル多年草ニシテ春月舊根ヨリ苗ヲ生シ夏月莖ヲ抽クコト三五尺ニ達シテ梢ニ枝ヲ分チテ花アリ。葉ハ大形ノ長卵形或ハ廣披針形ニシテ互生ス。花ハ六個ノ黃白色ノ花被ヨリ成リ。花被片ニ黃綠色ノ條脈ヲ有ス。花序ハ穗狀ニシテ雄蕊ハ花被ヨリ短シ。花ハ單性物ニシテ多クハ異株ニ在リ。

◎根ハ味辛ク有毒ナリ。飯ニ和シテ蠅トリニ用ヒ煎汁ヲ以テ牛馬ノ虱ヲ驅ルベク又厠ノ蛆ヲ防グベシ。但シ馬之ヲ食ヘバ酔フ。根ハマタ臭氣強シ。元來峻烈發炎ノ者トレバ誤リテ嘔下スレバ嘔吐下痢甚シク過分ニ用フレバ痙攣痲醉シテ人事不省トナル。又硫黃膏ニ和シテ皮膚ノ殺蟲劑トナス。

(844) *Veratrum Maximowiczii*, Bak.

あをやぎさう。

麓。大瀨ノト1820m. 大宮口一合。須走口第二中食。

年々宿根ヨリ叢生ス。莖長ズルコト二三尺許ニ達ス。葉ハ披針形ニシテ互生ス。夏月花軸ヲ抽キテ帶綠色ノ小花ヲ圓錐花序ニ排列ス。草狀しゆるさうノ如クニシテ綠色ナルノ異アリ。◎有毒ナリ。

(845) *Veratrum nigrum*, L. var. *japonicum*, Bak.

しゆるさう。藜蘆。

麓。喬。細紺野。村山。篠坂。カケスバタ。宮内。須走口1510m.

莖高二尺許ニ達スル多年草。葉ハ細キ披針形ナリ。夏月莖頂ニ圓錐花序ヲナシテ花アリ。花ハ紫黑色ニシテ小形ノ六花片ヨリ成ル。實ハ扁蒴ニシテ稜毛ニ似タル毛ヲ以テ根及ビ莖本ヲ被フヲ以テしゆるさうノ名アリ。

◎有毒ニシテ之ヲ食ヘバ或ハ流涎シ或ハ發狂シテ斃ルト云フ。然レドモ之ヲ吐劑ニ使用シ或ハ全草ヲ煎ジテ害蟲ヲ驅除スルニ用フ。

(846) *Yucca filamentosa*, L.

いどらん。ジュモウラン。

麓。宮原(培)

合衆國南部ノ原産ナレドモ今ハ吾邦各地ニモ栽エタリ。莖ハ花時ノ外ハ短縮シテ殆ド無キガ如シ。葉ハ鋸狀數十枚輪生シテ放射狀ヲナシ。長一尺五寸乃至二尺。幅一寸内外アリテ帶白綠色ヲ呈シ。邊緣ニ纖毛アリ。葉端ハ鋭ク尖レリ。夏月四尺乃至八尺許ノ圓莖ヲ抽出シ枝ヲ岐シテ複總狀花序ヲナシテ白色六片ノ鐘狀花ヲ綴ル。

◎葉ハ纖維頗強韌ナルヲ以テ絲ヲトリ或ハ織物トナスベク又栽エテ觀賞ス。

Stemonaceae. 百部科

(847) *Croomia japonica*, Miq.

なべわり. カハナスビ. 草本黄精葉鉤吻.
麓. 喬. 八幡堂附近.

深山ノ樹陰ニ生ズル多年草。根莖細長クシテ横行シ。相接近セル節アリ。莖高七八寸乃至一尺許ニ達シ脚部ニ少数ノ鱗片アリ。且ツ卵形ノ三五葉ヲ互生ス。葉面ニハ五縦脈著シク。邊緣皺波ヲ存シテ細鋸齒ヲ見ルガ如シ。初夏葉腋ニ二寸餘ノ細梗ヲ出シテ其頂ニ分レテ二花ヲ垂下ス。花ハ四瓣ニシテ一瓣ハ大ク三瓣ハ小ク淡黄色ヲ呈ス。雄蕊四個恰モ牙齒ノ如ク。本小ニシテ末太ク色紫黒ナリ。果實ハ蓇葖。橢圓狀卵形ニシテ多数ノ縱裂アリ。種柄ニ白色大形ノ假種皮アリテ先端細裂シ以テ種子ノ下部ヲ被フ。種子ハ革質ニシテ褐色ナリ。

◎人誤リテ莖葉ヲ舐レバ舌頭破裂スルニヨリ名ヅク。

Juncaceae. 燈心草科

(848) *Juncus effusus*, L. var. *decipiens*, Ruch.

ゐ. ほそゐ.
麓.

原野濕地ニ生ズル直立生ノ多年草ニシテ高一二尺ヨリ三四尺ニ達ス。莖ハ綠色。細線狀ニシテ外觀葉ニ類シ。中ニ白髓アリ。葉ハ莖ノ基部及ビ花部ニアリテハ鱗片ヲナス。夏月莖ノ上部ニ花梗ヲ側生シ。多ク分岐シテ三箇ノ雄蕊アル緑褐色ノ細花ヲ點綴ス。

◎莖ヲ疊表及ビ藍。笠等ノ原料ニ供シ。莖ノ心ヲ燈心ト稱

シテ燈用。外科用及ビ其他ノ用ニ供ス。和漢方ニテハ小便ヲ利シテ水腫ヲ治シ。小兒ノ夜啼ヲ止メ喉痺ヲ療ス。此草ヲ燒キテ灰トナシ。喉ニ吹き入ルレバ最喉痺ノ急病ニ宜シ。又夜睡リ難キ人ハ此草ヲ茶ニ代ヘテ飲メバ効アリ。

(849) *Juncus palillosus*, F. et S.

ほそばのかうがいせきしやう。
アヲカウガイ。

麓. 天照教.

濕地ニ生ズ。莖高一尺ヨリ二尺許ニ達シ通常簇主ス。葉ハ細長クシテ通常其幅一分ニ達スルモノナシ。夏月梢上分岐シテ淡緑褐色ノ細花ヲ繖生ス。

(850) *Juncus prismatocarpus*, R. Br. var. *Leschenaultii*, Buch.

かうがいせきしやう。
麓. 天照教. 粟倉. 大宮新道一合.

水濕アル低地ニ普ク生ズル草本ニシテ莖高七八寸乃至一尺餘アリ。葉ハ細長ク且ツ扁平ニシテ尖リ。五六月頃頂端ニアル葉間ヨリ二三軸ヲ抽キ數個ニ分岐シテ淡綠色小形ノ數花密集シテ略球狀ヲナス。

(851) *Juncus Maximowretzii*, Buch.

いとゐ。
喬.

須走口二合ノ直下. 大宮新道一合.

山中ノ陰地ニ生ズル草本ニシテ葉ハ極メテ細キ線狀寧絲狀ニシテ尖リ叢生シ長四五寸ヲ常トス。夏月葉間ニ殆ド葉ト同長ノ花莖ヲ抽キテ其先端ニ通常淡緑白色ノ二細花ヲ着生ス。果實ハ長卵形ノ蒴ナリ。

(852) *Luzula campestris*, Dc. var. *capitata*, Miq.

すゞめのひえ。シバイモ。地揚梅。

麓。阿幸地。天照教。

原野堤防等ニ普通ノ多年生小草ニシテ早春宿根ヨリ長キ白毛ヲ疎生セル細長クシテ尖レル葉ヲ叢生シ。夏ニ涉リテ葉間ヨリ高五七寸ノ花軸ヲ抽キテ殆ド球形ノ穗状花ヲ綴ル。其形楊梅ノ如ク又小栗毬ノ如ク。其色帶褐ナリ。コレ即チ一花序ニシテ小花ハ六雄蕊ヲ有シテ黄粉ヲ吐ク此種地中ニ小キ澱ヲ貯藏ノ塊ヲ有スルヨリしばいもノ稱アリ。◎救荒時ノ食トナス。

(853) *Luzula campestris*, De. var. *sudetica*, Celak

みやますゞめのひえ。

麓。喬。天照教。須走口一合。

高山ニ生ズル宿根草ニシテ莖細ク高七八寸ニ達シ。白色ノ毛ヲ有スル細長キ葉ヲ互生ス。七八月頃梢頭ニ數梗ヲ分チテ殆ド球状ノ穗状花ヲ綴ル。すゞめのひえニ比スレバ小穂小クシテ其數多ク又彼ノ淡褐色ナルニ反シテ黒褐色ヲ呈ス。

(854) *Luzula plumosa*, E. Mey.

ぬかぼしさう。

麓。細紺野。

諸國山中ニ普通ナル草本ナリ。莖ハ纖細ニシテ高一尺以内ナリ。四五月頃梢頭ニ纖細ナル花莖ヲ抽キ。時トシテハ更ニ分岐シテ其頂ニ淡褐色ノ一小花ヲ着ク。稍すゞめのひえニモ似タレド彼ノ如クニ花集リテ頭状ヲナスコトナシ。

Pontederiaceae. 雨久花科

(855) *Monochoria*, *Korsakowii*, Reg. et Maack.

みづあふひ。雨久花。

麓。大宮。

水田。池溝等ニ生ズル草本ニシテ莖高一二尺ニ達ス。葉ハ卵状心臓形ヲナシ長柄ヲ有シ。其葉柄ノ下部ハ膨大シテ莖ヲ抱ク。夏秋ノ候莖頂ニ美花ヲ開ク。花序ハ總状ニシテこなぎヨリ花數多シ。花蓋ハ六片ヨリ成リテ深碧色ヲ呈シ。雄蕊三個アリテ其中一個ハ大ナリ。

◎觀賞ニ供ス。

(856) *Monochoria vaginalis*, Presl.

こなぎ。サ、ナギ。鴨舌草。

麓。大宮。

水田。小川等ニ生ズル草本ニシテ前者ヨリ較々小形ナリ葉ハみづあふひニ似テ圓形ナルト狭クシテ竹葉ニ類スルモノ等アリ。通常卵状披針形ナレドモ初生ノモノ又ハ水中ノモノハ其形狭長ナルヲ以テ之ヲさゝなぎト呼ブ。秋月三四寸乃至七八寸ノ莖ヲ出シテ大サ三四分ナル碧色ノ花ヲ短總状ニ綴ル。マタ白色ノモノモアリ。

◎栽エテ觀賞ニ供シ民間ニテ往々暑氣中リ等ノ藥トナス。

Commelinaceae. 穀精草科

(857) *Ancilema*, Keisak, Hassk.

いぼくさ。イボトリグサ。水竹葉。

麓。大宮。阿幸地。

水田・沼澤等ニ生ズル草本ニシテ頗つゆくさニ類スレド
莖モ纖長ニシテ好ミテ地ニ匍ヒ。節々細根ヲ生ズ。葉モ
一層狭小ナリ。夏月枝頭ニ二三ノ小花ヲ着ク。花モつゆ
くさヨリ小形ニシテ三瓣ハ白質ニ紅紫暈ヲ有シ。萼モ亦
三片アリテ綠色ナリ。一雄蕊一雌蕊アリ。雌蕊ノ間ニ短
小ニシテ頂ニ淡紫色ノ圓キ蒴ヲ具フル變形雄蕊三個アリ
子房ハ罐形ニシテ基部ニ長凸モヲ生ズ。

◎俗間葉ヲトリモミテ疣ニツケテ疣ヲ落スニ用フ。

(858) *Commelina communis*, L.

つゆくさ。パウシバナ。ホタルグサ。

鴨跖草。

麓。大宮。阿幸地。村山。

路傍畑地等生ズル多年草。莖モ前者ヨリ太ク。葉モ大ナ
リ。夏月花アリ。通常朝開キテ午後ニ萎ム。花色藍青。
形不整齊ニシテ編笠状ノ苞ヲ有ス。

◎花被ヨリ搾リタル藍青色ノ液ヲ以テ藍紙ヲ製シ繪具ニ供
ス。

Eriocaulaceae. 鴨舌草科

(859) *Eriocaulon*, *Sieboldianum*, S eud.

ほしくさ。ミヅタマサウ。穀精草。

麓。大宮。傳法。御殿場。

沼澤水田等ニ生ズル小草ニシテ莖細長クシテ尖リ。一科
ニ數十葉ヲ叢生ス。秋月叢葉間ニ數本ノ細莖ヲ抽出スル
コト四寸許ニシテ其頂ニ圓尖白綠色ノ小球ヲ結ブ。此球
ハ多數ノ鱗片ノ集合ニシテ各鱗片ノ間ニ一花ヲ藏ス。

◎屢々觀賞ニ供ス。漢方ニテ眼病ニ用フ。

(860) *Eriocaulon nudicuspe*, Max

しらたまほしくさ。チクトウサウ。

麓。大宮。御殿場。

水濕アル低地ニ生ズル纖細ナル直立草本ニシテ前者ヨリ
丈高ク往々二尺ニ及ブ。葉ハ根生。前者ヨリ更ニ長ク
多ク叢生ス。八九月頃數多ノ花莖ヲ抽出シテ其頂ニ花ア
リ。花ハ純白。小形ニシテ球状ニ攢簇ス。

◎屢々觀賞ニ供セラレ。

(861) *Eriocaulon*, *Miquelianum*, Koern.

いぬのひげ。

麓。

沼池水田等ニ生ズル小草ニシテ葉ハ根生シ。長四五寸。
幅二分許アリテ一科ニ叢生ス。夏秋ノ際叢葉ノ間ヨリ細
キ多數ノ花莖ヲ抽クコト葉ヨリ長ク。其頂ニ淡黄白色ノ
細花ヲ綴ル。花ハ稍扁平ノ球状ヲ呈シ。周邊ニ雌花ヲ有
シ。中心ニ雄花ヲ集メ更ニ其外部ニハ先端尖レル大小數
個ノ總苞ヲ繞ラセリ。

Araceae. 天南草科

(862) *Acorus gramineus*, Ait.

せきしやう。石菖蒲。

麓。大宮。宮原。

溪間水傍等ニ生ズル帶綠草ニシテ白菖ノ如ク匍匐スル地
下莖ヲ有ス。葉ハ細キ劍状ニシテ頗平滑ニ。白菖ノ如ク
ナル中肋ヲ見ズ。春月一二寸ノ肉穗花序ヲ作ル。香氣強
烈ナリ。

◎栽エテ觀賞シ。強壯及ビ目薬トシテモ使用ス。試ミニ朝
起キテせきしやうノ葉ノ露ヲ眼ニ點スレバ甚ダ目ニ爽快
ヲ感ズ。

(863) *Arisaema japonicum*, Bl.

てんなんしやう。天南星。

麓。村山。細紺野。

陰地ニ生ズル宿根草ニシテ高二三尺時トシテハ四尺許ニ達ス。葉ハ鳥足状ニ排列セル數個ノ廣披針形。長楕圓形尖頭ノ小葉ヨリ成リ長柄ヲ有ス。花ハ單性ニシテ肉穗花序ニ排列シ。大ナル佛焰状ノ苞ニテ被ハル。花軸ノ頂ハ鈍形ナリ。

◎有毒ナレドモ民間薬トナス。又地下莖ニハ多量ノ澱粉ヲ含ムヲ以テ救荒時ノ食トナス。八丈島ノ土人ハ殊ニ之ヲ常食スト云フ。

(864) *Arisaema japonicum*, Bl. var. *serratum*, Engl.

まむしぐさ。へびノダイハチ。斑杖。

麓。細紺野。大宮新道。鈴ヶ原。

前者ニ似タノ小葉ノ縁邊ニ鋸齒ヲ有スルコト。莖ニ紫褐色ノ斑紋アリテ甚ダ蝮蛇ノ体紋ニ似タルト。花ノ色モ亦多クハ緑白間道ヲ有スルトノ異アリ。六七月花アリ。

◎前者ヨリ一層有毒ナリト云フ。

(865) *Pinellia tuberfera*, Ten.

からすびしやく。

麓。大宮口。須走口。

畑地其他路傍等ニ生ズル宿根草ニシテ高七八寸ニ達ス。地下ニ球形ノ塊莖アリテソレヨリ一ニノ莖ヲ出ス。葉ハ複葉ニシテ三個ノ小葉ヨリ成ル。葉柄ハ長クシテ腋ニ肉芽ヲ生ズ。花ハ肉穗花序ヲナシ。雌花ハ其下部ニ位ス。花序ハ大形ノ苞ニテ包マレ。花軸ノ上部ハ線状ニ伸長シテ苞外ニ突出ス。

◎生根ハ鱗毒ナリ。誤リテ嚙メバ口腫ル。民間コレヲそこまめノ薬トシ又其煎汁ヲ鎮吐劑トス。

Palmae.

棕櫚科

(866) *Trachycarpus excelsa*, Wendl.

しゆろ。椶櫚。(棕櫚)

麓。北山。粟倉(人家)

◎支那ノ棕櫚ハ同國人其實ヲ椶櫚魚鱗ト稱シテ食用トス。材ヲ床柱或ハ小器具ノ料トシ。葉ノ基部ニアリテ莖ヲ包メル苞毛ハ俗ニしゆろのかはト稱シ其用極メテ廣ク。水ニ堪フルヲ以テ船艦用。釣瓶用。垣根用等ノ繩トシ又刷毛帚ヲ作ル等ニ用フ。葉ヲ中氣ノ薬トナシ晒シテ下駄ノ緒。夏帽。草履表等トナス。樹ヲ栽エテ觀賞ス。

Cyperaceae.

莎草科

(867) *Bulbostylis capillaris*, Kunth. var. *capitata*, Mak.

いとてんつき。

麓。大宮。バツカケ。

一年生ノ直立草本。葉ハ根生葉ノミニシテ細ク。殆ド線状ヲナシ。葉間ヨリ又線状ノ花莖ノ抽出スルコト六七寸乃至一尺許。九月頃梢上ニ二三分岐シテ其頂ニ楕圓形ノ小穂ヲ散生ス。花色茶褐色。此種ハてんつき。ひめてんつきヨリハ一層纖細ナリ。

(868) *Carex arenicola*, F. Schim.

くろかはすすげ。

麓。札打。

堤防田畔等ニ普通ニシテ屢々芝草ト混生ス。莖高三四寸乃至七八寸。其下部ニノミ根生葉ヲ有ス。葉質強剛。春三四月頃莖頂ニ多數ノ小花ヲ攢簇シテ五六分乃至一寸ニ滿タザル褐色直立セル穗ヲナシ。粗粒ノ果實ヲ結ブ。

(869) *Carex breviculmis*, R. Br. var. *Boyleana*, Kuek.

あをすげ。

麓。

原野ニ普通ノ小草ニシテ四五月頃幅一二分ノ細長キ葉ヲ叢生シ。葉間ヨリ花莖ヲ抽クコト四五寸乃至八九寸ニ至リ梢上ニ雌雄花ヲ別々ニ小穗状ニ出ダス。雄穗ハ上端ニ一個ヲ存シ。其下方ニ二三ノ濃綠色ノ雌花穗アリ。

(870) *Carex brownii*, Kuek. var. *transversa*, Kaek.

やはらすげ。

麓。大宮。

原野堤防等ノヤ、陰地ニ生ズル草本ニシテ莖高一二尺ニ達シ叢生ス。葉ハ細長クシテ其幅一分五厘ヲ常トス。四五月頃梢頭ニ近キ葉腋ニ二三個ノ雌花穗ヲ生ジ。頂ニ一個ノ雄花穗ヲ出ダス。雌花穗ハ乾ケバ暗黒褐色ヲ呈シテ多クノ雌花ヲ密生シ。下位ノ花序ハ長キ柄アリ。雄花穗ハ細長クシテ淡茶褐色ヲ呈ス。概シテじゆすすげニ似タレド彼ヨリハ葉細クシテ通常種モ亦長カラズ。

(871) *Carex brunnea*, Thunb.

なきりすげ。

麓。白絲。

山麓ノ陰地ニ普通ナル草本ニシテ葉ハ細長クシテ叢生シ長サ一尺餘アリ。葉縁ニハ微細鋸齒アリテ甚ダ粗糙ノ感アリ。九月頃尺許ノ細莖ヲ抽出シ。微ニ傾斜シテ其頂部ニ數個ノ小穗ヲ出ダス。各穗ハ下部ニ雌花。上部ニ雄花ヲ存ス。

◎伊吹山麓ノ山民ハ此葉ヲ乾柿ヲツルスニ用フ。

(872) *Carex conica*, Boot.

ひめかんすげ。

麓。

かんすげニ似テ遙ニ纖細ナリ。四五月頃花アリ。莖ノ上部ニ數個ノ雌蕊ヲツケ。每節赤褐色膜質ノ細長キ苞アリテ鞘状ヲナシテ莖ヲ圍メリ。初メ莖ノ頂ニ一個ノ褐赤色ノ雄穗ヲ居ス。葯ハ淡黄白色。

(873) *Carex curvicollis*, F. et S.

なるこすげ。

麓。

水邊ノ附近ニ多ク生ズル草本ニシテ莖高六七寸乃至一尺餘ニ達ス。五月頃緑褐色ノ花穗ヲツク。概状ガうそすげニ似タレド。雌花穗更ニ細長ク。花柱ノ分裂セル毛状突起非常ニ多キ等ノ異アリ。

(874) *Carex Doenitzii*, Boeck.

こたぬきらん。

草。灌。喬。大樫ト入幡堂間。須走口一合
大宮口一三四五合。

諸高山ノ草本帯ニ普ク生ズル多年草ニシテ莖高一尺餘ニ及ブ。葉ハたぬきらんヨリ更ニ細長ク且ツ其質ヤ、剛シ莖葉叢生ス。夏月花莖ヲ抽出シテ其梢ニ雌雄花ヲ穗状ニ出スコトたぬきらんニ類スレド。花梢小ニシテ芒毛長キノ異アリ。

(875) *Carex gibba*, Wahl

ますくさ。コマトメ。

麓。

多ク路傍。堤防等ニ生ズル草本ニシテ莖高一二尺ニ達スあをすげニ似タレド肥大ナリ。四五月頃葉頂ニ近キ葉腋

=緑色ノ小穂數個ヲ着生ス。子供等此細キ莖ヲトリテ其
 兩端ヨリ割キテ樹形ヲツクルニヨリ其名アリ。

(876) *Carex incisa*, Boot.

かはらすげ。タニスゲ。

麓。天照教

川原及ビ高山ノ叢原ニ生ズル草本ニシテ莖高六七寸ヨリ
 一尺許アリ。葉ハ長ク。莖葉共ニ平滑。比較的柔軟ナリ
 五六月頃葉間ヨリ花莖ヲ抽出シ。更ニ細梗數個ヲ分チテ
 圓柱狀ノ長サ一寸餘アル穂ヲヤ、鎌形ニ傾出ス。雄花穂
 ハ通常一個。莖ノ頂端ニ居シ。其下部ニ於ケル數個ハ皆
 雌花穂ナリ。

(877) *Carex ischorostachya*, Steud.

じゆすすげ。

麓。バツカケ。札打。

高一二尺。概形やはらすげニ似タレド。其葉ハ幅廣クシ
 テ二分許。雌花穂モ亦細長クシテ稍々疎ラニ花ヲ附着ス
 ル等ノ異アリ。雌花ノ花序ハ暗黒ニシテ細キ圓柱形ヲナ
 シ。其花ハ各々甚ダ短キ鱗片ヲ具フ。

(878) *Carex japonica*, Thunb. var. *chlorostachys*, Kuek.

しらすげ。

麓。天照教ノ上。

水濕地又ハ堤防等ニ生ズル帶白色ノ草本ニシテ莖高二尺
 餘アリ。莖葉ノ模様ハ、かやつりぐさニ似タレド葉ノ幅
 廣ク。色モ淡緑ニ白色ヲ帶ビ。質稍々軟弱ナリ。夏月梢
 上ニ穂ヲ抽キ。其上部ニ帶褐一寸餘ノ雄花穂一個ヲ直立
 セシメ。其下部ニ一寸餘ノ圓柱狀ノ綠色ニシテ柄アル雌
 花穂二三個ヲ傾垂ス。

(879) *Carex japonicum*, Thunb. var. *aphanolepis*, Kuek.

えなしひごくさ。サハスゲ。

山中ニ生ズル一ニ尺ノ草本。葉長クシテ三縱列ノ脉アリ
 花ハ小ク單性ニシテ穂狀花序ニ排列ス。雄花ノ花序ハ細
 長クシテ莖ノ頂ニ位シ。雌花ノモノハ短クシテ其下部ニ
 位ス。雌花ノモノニシテ上方ニアルモノハ柄ナク。下方
 ノモノニハ短柄アリ。

(880) *Carex jackiana*, Boot. var. *macroglossa*, Kuek.

こじゆすすげ。

麓。大宮口。八幡堂ノ上下

田側其他日蔭地ニ生ズル草本ニシテ莖ハヤ、横行シ一科
 ニ叢生シ。五六寸乃至一尺ノ高ヲ普通トス。葉細クシテ
 比較的短クシテ尖リ。三縱列ニ排列ス。四五月頃葉腋ニ
 花梗ヲ抽キテ四五個ノ雌花ヨリ成レル楕圓形ノ疎穂數個
 ヲ生ジ。莖頂ニ一個ノヤ、細キ雄花穂ヲ抽出ス。果穂ハ
 隨ヒテ疎ラニシテ粒ハ大ナリ。

(881) *Carex japonica*, Thunb.

ひごくさ。

麓。村山ノ上。札打ノ上。天照教。
 麓。大宮新道一合。同一合中ノ上。

根莖ヲ延キテ繁殖ス。四五月頃或ハ山野ニテハ六月頃葉
 間ヨリ細キ花軸ヲ抽キ。其上端ニ通常一個ノ雄花穂ヲツ
 ケ。其下ニ雌花穂二三ヲ生ズ。花柱甚ダ長ク。果穂ハ楕
 圓狀ニシテ柄アリ。葉ハ幅二分前後長五七寸アリテ各節
 ヲ生ズ。

(882) *Carex Krebsiana*, Boeck.

しらすげ。

喬。麓。八幡堂ノ上下。

地面ヨリ叢生ス。葉ハ細長クシテ幅一分アリ。五六月
 頃葉間ヨリ長一尺乃至一尺五寸許アル無節ノ莖ヲ抽出シ

其上部七八分ノ間、疎ナル穂ヲナシテ直立ス。

(883) *Carex Wrightii*, Fr.

ひめすげ。ミヤマスゲ。

灌草。大宮口一合ノ下ヨリ二三四五合マテ。須走口一合以上五合目マテ。吉田口五六七合。吾邦中部以北ノ諸高山ニ生ズル小草。下部ノ葉鞘並ニ地下莖ノ鱗葉紅色ヲ帯アルヲ特徴トス。莖ハ一尺未満ニシテ極メテ細ク叢生ス。葉ハ頗細クシテ三縦列ニ排列シ。花ハ帯黒色ノ小形ナル無柄ノ穂状花序ヲナシ。數個。花莖ノ上部ニ着ク。而メ此草山上ノモノハ低地ノモノヨリ矮小ナリ。

(884) *Carex Morrowii*, Boott.

かんすげ。ミノスゲ。カンス、キ(同名アリ) 蓑衣草。

麓。大宮口。

山麓ノ陰地ニ生ズル多年草ニシテ一科ニ叢生ス。葉ハ常緑。大形ニシテ原ク且ツ剛クシテ光澤ヲ存シ。縁邊特ニ粗糙ニシテヨク手ヲ切ル。春月一尺餘ノ花莖ヲ抽キテ其頂ニ雄花穂ヲ着ケ。其下部ニ數個ノ雌花穂ヲ具フ。

◎庭園ニ栽エテ屢ク觀賞ニ供ス。此種ノ培養品ニ白邊葉ノ者アリ。

(885) *Carex mollicuta*, Boott.

ひめしらすげ。

麓。札打

しらすげヨリ小形ニシテ且柔ク。ひびくさニモ酷似ス。五六月頃花アリ。

(886) *Carex caryophylla*, Latour. subsp. *nervata*, Kuek.

しばすげ。

麓。細細野。

山麓林野ニ生ズル多年草。高五寸乃至八寸許。葉ハ細長クシテ尖ル。四月頃花莖ヲ抽クコト數寸ニシテ少數ノ花序ヲ着ク。花ハ單性ニシテ雄花穂ハ稍大クシテ頂生シ。其下部ノ葉腋ニ細長クシテ短柄アル一ニ個ノ雌花穂アリ。花ニ大ナル褐色ノ葯アリ。

(887) *Carex nikoensis*, F. et S.

あぶらしば。

麓。瀧ノ瀬。水土野。須走口ヨリ其1100mマテ。

山麓ノ砂地ニ叢生ス。葉ハ細長クシテ幅一分五厘。長數寸乃至一尺許。夏月葉間ヨリ數寸乃至殆下葉ニ等キ長サノ莖ヲ抽キテ上部一二寸處ニ茶褐色ノ細花ヲ圓錐狀ニ綴ル。

(888) *Carex pruinosa*, Boott.

がうそ。ゴウソスゲ。

麓。村山ノ上下。

稍水濕ニ富メル處ニ多ク生ズル草本ニシテ莖高一尺許ニ達シ。通常數莖叢生ス。四五月頃梢上葉腋ニ二三個ノヤ、太短キ雌花穂並ニ一個ノ雄花穂ヲなるこノ如クニ垂下ス。何レモ纖細ナル柄ヲ具フ。

(889) *Carex pseudoconica*, F. et S.

おほいとすげ。

喬。麓。八幡堂ノ上下。札打。天照教。

山地ニ生ズル小草ニシテ莖細ク。二三寸乃至六七寸アリ。上部ニ一二ノ細枝ヲツケテ二三ノ小キ穂ヲ着ク。葉ハ細長クシテ幅一分乃至一分五厘。長三寸乃至四五寸アリ。莖ニハ葉ナシ。五月ヨリ七月頃マテ細キ粗穂ヲナシテ花アリ。莖ハ多少地ニ匍フ。

(890) *Carex renota*, L.

やぶすげ。シヨタイスゲ。

喬。八幡堂邊。

山麓ノ陰地ニ多ク叢生スル草本ニシテ莖ハ長ク延ビテ二尺ニ達スル者アレドモ通常ハコレヨリ短シ。葉ハ細長クシテ幅二分長一尺許ニ達シ。地面ヨリ生ツ又莖ノ節毎ニモ生ズ。五六月頃花アリ。花穂ヲツクルコトまずくさニ似テ穎ハ細長シ。

(891) *Carex Tenuissima*, Boott.

いどすげ。

喬。八幡堂及其上。

諸高山ノ喬木帯並ニ諸國山麓及ビ竹林中ニ多キ小草ニシテ葉莖細ク。高四五寸乃至一尺餘ニ達シ叢生ス。葉ハ幅一分ニ足ラズ。冬ヲ經テ枯ル、コトナシ。夏月莖ヲ抽キテ其上部ニ細キ褐色ノ穂ヲ着ク。

(892) *Carex Gaudicaudiana* Kunth, var. *Thunbergii*, Kuek.

あせすげ。

麓。大宮。

田畔等ニ近キ多年草ニシテ莖高六七寸ヨリ一尺餘ニ至ル葉ハ細長クシテ綠色ヲ呈シ。四五月頃梢上葉腋ニ通常二三個ノ黒褐色ニシテ一寸許アル雌花穂及ビ其上端ニ一ニ個ノ茶褐色ノ雄花穂ヲ具フ。

(893) *Cyperus amuricus* Max

かやつりぐさ。

麓。大宮。高田。天照教。

水田又ハ殆ド水ヲ離レタル處ニモ生ズル最普通ノ一年草莖ハ綠色ニシテ一尺餘ニ及ブ。まずくさノ如ク兩端ヨリ割リテ蚊屋ヲツルガ如クニ四角ニ張ルヲ得ベシ。

(894) *Cyperus difformis* L.

たまがやつり。

麓。大宮新田。白絲。

水澤ノ附近ニ普通ナリ。葉ハ通常かやつりぐさノ葉ノ如シ。八九月頃一尺餘ノ三稜莖ノ頂ニ數個ノ不整ナル花柄ヲ出シテ其端ニ直径二三分ノ小球狀ノ穂ヲ着ク。小球穂ハ淡褐若クハ黒褐ヲ常トス。此屬ノ花柱ハ三分シ果實ハ三角形ヲナス。

(895) *Cyperus globosus*, All. var. *striata*, Clarke.

あせがやつり。

麓。入山瀬。バツカケ。細紺野。

一科ニ數莖ヲ叢生ス。葉ハ細クシテ長シ。莖ハ他ノかやつりぐさ類ニ比スレドヤ、細ク。高一尺餘ニ達シ。莖上ニ三個斗リノ葉ヲ開出シテ其間ヨリ數個ノ細キ花軸ヲ出シテ各光澤アル茶褐色ノ穂ヲ廣羽狀ニ出シ。其又一個ノ小穂ヲ檢スレバ扁平ニシテ細長ク。箭羽狀ニ明瞭ナル斜線ヲ認ム。

(896) *Cyperus hakonensis*, F. et S.

ひながやつり。

麓。大宮。

水田ノ附近ニ生ズル小草ニシテ前者ヨリ遙ニ短小ナリ。全体ヤ、柔ニシテ淡綠色ヲ呈ス。夏月四五寸乃至七八寸ノ根生葉間ニヤ、短キ軟莖ヲ抽キテ梢上ニ長短ノ花軸ヲ分岐シテ多數ノ小穂ヲ攢簇ス。小穂ハ扁平。長橢圓形ヲナシ縁邊ニ鋭鋸齒アリ。

(897) *Cyperus*, Haspan, L.

こあせがやつり。

麓。バツカケ。

田間ニ四五寸乃至一尺許ノ細莖ト細葉トヲ出ス草本ニシ

テ莖ノ下部ニ著シキ葉ナシ。秋月莖頂ニ一二回、細軸ヲ出シテ光澤アル茶褐色扁平ノ小穂ヲ岐出ス。其一個ノ小穂ヲ檢スレバ扁平ニシテ細長ク、ヨクあぜがやつりニ似タレド一般ニ纖細ナリ。

(898) *Cyperus rotundus*, L.

はますげ。

麓。入山瀬。宮原。

元來海ニ近キ地方ニ多キ多年草ナレドモ他ノ荒地等ニモ在リ。かやつりぐさニ類シテヤ、硬ク深綠色ニシテ光澤アル葉ヲ叢生ス。夏月莖頂ニ濃茶褐色ノ穂ヲ分岐ス。

◎地下ノ塊根ヲ香附子ト稱シ祛痰劑或ハ健胃収斂劑ニ用フ

(899) *Cyperus sanguinolentus*, Vahl.

かはらすがな。

麓。白絲。バツカケ。御殿場。

水田ノ附近等ニ多キ一年草ニシテ概形かやつりぐさニ似タリ。夏秋ノ候、長キ三個ノ梢葉間ニ小梗ヲ抽キ、若クハ直接ニ長橢圓形ナル無柄ノ小穂ヲ生ズ。花色淡褐ナリ

(900) *Cyperus seratinus*, Rottb.

みづがやつり。

麓。大宮口。

水田沼澤ノ附近ニ生ズル多年草ニシテ八九月頃高二三尺ノ三稜莖頂ニ茶褐色ノ穂ヲ生ズルコトかやつりぐさニ類スレド莖葉遙ニ肥大ニシテ穂モ亦彼ノ如クニ細裂スルコトナク且ツ小穂ハ小花莖ノ左右ニ相對シテ羽狀ニ排列スル等ノ異アリ。

(901) *Cyperus tegetiformis*, Roxb.

しちたう。ナナシマキ。リウキウキ。

苳苳。盛草。

麓。上井出。

水田ニ栽培スル多年草ナレド又屢々野生ス。吾邦ニテハ沖繩ニ多ク自生シ、東海道ニテモ栽培ス。形状かやつりぐさニ類スレド遙ニ大形ニシテ其小穂花序ハ往々一寸二分ノ長サニ達ス。

◎席ヲ織リテ琉球表ト稱ス。莖ヲニツニ裂キテ花筵ヲ製造シ米國等ニ輸出ス。年額ニ三百萬圓アリ。滑澤ナラザルガ故ニ緻密ナル草匠ヲ施スコト能ハズト雖其質頗強韌ナリ敷物ノ外ニハ靴下。帆。着吳座トナシ屑物ハ繩。草履かます等ヲ作り其切屑ヲ折紙ノ料トナス。

(902) *Eleocharis acicularis*, R. Br.

まつばら。

麓。白絲。

水田又ハ水濕多キ畦畔等ニ密生スル綠色ノ細草ニシテ高僅ニ二三寸長キモ四五寸ヲ超ユルコトナシ。莖モ葉モ同様ニ纖細ニシテ細針ヲ叢立セルガ如シ。夏秋ノ候細莖ノ頂ニ淡褐色ノ卵狀橢圓形ノ微穂ヲ出ダス。

(903) *Eleocharis japonica*, Miq.

はりら。

麓。傳法。

水田。沼地等ニ生ズル綠色ノ草本ニシテ通常叢生ス。莖ハ細ク圓クシテ高四五寸乃至一尺許。下部ノ外ハ葉ナシ夏月莖頂ニ橢圓若クハ卵狀穂ヲ出ダス花ハ淡綠褐色。此種ハ莖ノ先端地ニ接スルトコロヨリ數莖ヲ分チテ新シキ株ヲ生ジテ繁殖スルコトアリ。

(904) *Eleocharis plantaginea*, R. Br.

くろぐわら。蒨臍。

麓。大宮新田

池沼及び田側等ノ水中ニ生ズル多年草ニシテ高二三尺アリ。地下ニ塊莖アリ。地下莖ハ綠色管狀質柔ニシテ處々ニヘダテアリテ撫ヅレバハシバシト音ヲ發ス。塊莖ハ大サ六七分。肉白クシテ黒皮ヲ被ル。故ニ其名アリ。夏秋ノ候筆頭狀ノ穂ヲ莖頭ニ出ダス。

◎冬春ノ間泥中ヨリ塊莖ヲ掘リトリテ食用ニ宛ツ。漢方ニテハ中ヲ温メ氣ヲ益シ心下ノ痞ヲ消スト稱セラレ又黃疸ヲ治シ小便ヲヤリ。耳目ヲ明ニスト云ヘリ。

(905) *Eleocharis tetraquetra* Nees, var. *Wichurai* Mak.

しかくゐ。

麓。大宮。

田畔等ニ普通ノ一年草ニシテ一見やまゐてんつきニ類スレド。穂ハ彼ヨリ狭長ナルノミナラズ。穂ノ基部ヨリ葉ヲ出スコトナシ。

(906) *Fimbristylis autumnalis*, Roem. et Sch.

ひめてんつき。

麓。大宮新田。御殿場。

田畔等ノ濕地ニ生ズル一年草。てんつきヨリ全形ヤ、短小ナレドモあぜてんつきニ比スレバ莖葉共ニ更ニ大ナリ。秋月花莖ヲ抽クコト一尺許。莖上ニ排列スル小穂ハあぜてんつきノ如クニ毛茸狀ノ長突起物ヲ有スルコトナシ。

(907) *Fimbristylis diphylla*, Vahl.

てんつき。飄拂草。

麓。

田畔等ニ生ズル一年草ニシテ前者ヨリ更ニ長大ナリ。小穂ハ前者ヨリ一層大クシテ長二分ニ近ク。茶褐色ニシテヤ、光澤アリ。此種ハ莖葉ニ密ニ短毛ヲ具フ。

(908) *Fimbristylis miliacea*, Vahl.

ひでりこてんつき。

麓。大宮。

田畔等ニ多キ一年草ニシテ細長キ葉ヲ叢生シ其中間ヨリ五六寸乃至一尺許ノ莖ヲ直上シ。梢頭マタ多クノ花梗ヲ出シ。其梗更ニ分岐シテ褐色球狀ノ小穂ヲナシテ秋月花アリ。莖葉前者ヨリハ著シク纖細ナリ。

(909) *Fimbristylis Picrotii*, Miq.

のてんつき。

麓。

山麓ノ水濕地等ニ生ズル一尺高ノ草本ニシテ通常叢生ス。八月頃梢頭ニ岐シテ長橢圓形ヲナセル茶褐色ノ瘰セタル小穂ヲ着ク。多少しちたうニ似タレド遙ニ小ナリ

(910) *Fimbristylis sub-bispicata*, Nees, et Mey.

やまゐてんつき。ヤマキ。

麓。大宮。大岩。白絲。御殿場。篠坂。
麓。大宮新道。

水濕アル原野ニ生ズル草本ニシテ頗細キ根生葉ヲ叢生シ夏月細莖ヲ出シテ頂上ニ卵狀橢圓ニシテ四五分アル緑褐色ノ花穂ヲツク。而シテ花穂ノ基部ニ小葉片ヲ附スルヲ常トス。

(911) *Fimbristylis squarrosa*, Vahl.

あせてんつき。

麓。

田畔ニ生ズル小草ニシテ叢生スル細葉ノ間ヨリ長サ四五寸ノ頗細キ數個ノ莖ヲ抽キ。莖頂ひでりこてんつきノ如クニ分岐シテ其端ニ長橢圓形ノ小穂ヲ附ス。小穂ヲナセル多數ノ苞ハ其先端尖銳ニシテ外向シ。毛茸狀ヲ呈スルノ特徴アリ。

(912) *Kyllingia brevifolia*, Rottb.

ひめくさ。

麓. バツカケ. 北山ノ和平.

地莖ヲ延キテ繁殖スル小草ナリ。夏秋ノ交。葉間ニ細キ花莖ヲ抽クコト四五寸乃至七八寸ニシテ頂ニ綠色球状ニシテ小金餅糖ノ如キ穂ヲ一個ヅ、ツク。且ツ穂ノ基部ヨリ通常大小不整ノ三小葉ヲ斜出ス。

(913) *Lipocarpa microcephala*, Kunth.

ひんじがしやつり.

麓. 大宮. 白糸. 入山瀬. 吉原. 御殿場.

高四五寸ヲ常トスレドマ、八九寸ニ達スルモノアリ八月頃花軸ノ頂端ニ小球状ノ三小穂ヲ密着シテ生ズルコト恰モ品字形ヲナス。

(914) *Mariscus Sieberianus* Nees

くぐ.

麓. 大宮新田.

元來ハ暖地ニ多キ草本ナリ。一見かやつりぐさノ如キ三稜形ヲ抽出スルコト一尺餘ニ至リ。頂ニ三個或ハ四個ノ葉ヲ斜出シテ其中央ヨリ長サ不整ニシテ比較的短キ梗ヲ出シテ五六ノ殆淡綠色ヲナセル穂ヲ岐出ス。小穂ハ略圓柱状ニシテ通常五六分ノ長アリ。かやつりぐさ等ニテハ小穂状花序ノ鱗片早落性ナルモ此屬ノモノハ脱落セズ。

(915) *Scirpus erectus*, Poir.

ほたるゐ.

麓.

畦畔又ハ山地ノ沼等ニ生ズル草本ニシテ莖ハ圓柱状ニテ高一二尺アリ。葉ハ基部ニ存スレド短クシテ殆ド認ムベカラズ。八九月頃莖ノ頂端ヨリ少シク下部ナル一節ヨリ卵形ヲナセル三四分許アル殆ド無梗ノ小穂二三個ヲ簇生ス。其狀莖ノ草ニトマレル如シ。

(916) *Scirpus concolor*, Mak.

あぶらがや.

麓. 権現モヤ.

水濕ノ地ニ生ズル草本ニシテ通常三四尺ノ莖ナレドマ、人ヲ凌グモノアリ。其狀硬直ニシテ平滑ナリ。葉ハ幅二三分ニシテ尖リ質厚クシテ光澤ヲ有シ。下部ハ管状ニ結合シテ莖ヲ圍メル葉鞘トナル。莖ニ明ニ四五寸ノ間節ヲナシテ各節ニ一葉ヲ互生ス。秋月葉腋ヨリ梗ヲ出シ分岐シテ茶褐色ノ小穂ヲ複繖状ニ綴ル。

(917) *Scleria tessellata*, Willd.

こしんじゆがや.

麓.

山麓ノ低原ニ生ズル草本ニシテ夏月莖ヲ抽クコト二尺ニ及ビ。鋭三稜ニシテ節々幅二分許ノ細葉ヲツク。莖生葉ハ其下部鞘状ヲナシテ莖ヲ包ミ。每葉腋ニ細長キ花莖ヲ抽出シ。分岐シテ疎ラナル種状ヲナシテ花果ヲ着ク。花ハ七八九月ノ候ニ開キ褐色ナリ。果實ハ小球状ニシテ殆ド眞珠ノ如クナレドモ果面ニ凹凸ヲ有シテ滑澤ナラズ。

Gramineae. 禾本科

(918) *Agropyrum semicostatum*, Nees.

かもじぐさ. ナツノチャヒキグサ.

カヅラ.

麓.

路傍等ニ普通ノ草本ニシテ其葉ノ叢生シテ冬月ヲ越ユルノ狀頗トむぎノ苗ニ類スレド長ズレバ莖稍ク紫色ヲ帯ビ葉ニ粉白色ヲ呈スルノ異アリ。種モ亦外觀ヤ、小麥ノモノニ似タレド頗ル粒粗ニシテ且ツ瘠セテ見エ。多少下垂

ス。長キ芒アリ。◎女兒嫩葉ヲトリかつらナツクリテ
玩ブ。

- (919) *Agrostis flaccida*, Hack.

みやまぬかぼ。ヒメコメス、キ。

麓。喬。灌。大宮口一合附近。中畑道一合ノ下。
吉田口五六七合七合ノ上。
須走口(1850m. - 2050m. - 2100m.)

高山ニ生ズル多年草ニシテ莖高五六寸ヨリ一尺許ニ達シ
通常叢生ス。葉ハ狭長ニシテ尖リ二三寸アリ。七八月頃
花アリ。細ク多岐シテ穂ヲ抽クコト長三四寸。ぬかぼニ
似テ更ニ繊細ナリ。又こめすくきニ似テ遙ニ繊細ナル故
ニひめこめすくきノ稱アリ。

- (920) *Agrostis perennans*, Tuck.

ぬかぼ。

麓。喬。天照教ノ上。細紺野。八幡堂。

高一尺餘ニ達スル草本ニシテ叢生ス。葉ハ細クシテ尖リ
五六月頃開ク。小穂花序ハ甚ダ小形ニシテ一個ノ糖状小
花ヨリ成リ。多岐シテ相集リ。淡褐色或ハ紫色ノ圓錐花
序ヲナスコト三四寸ニ至ル。

- (921) *Aira capillaris*, Host.

ぬかすゝき。

麓。草。細紺野。大宮口四合目。

舶來品ナリト云ヘド予ハ富士山ニ見タリ。葉細クシテ初
夏細長キ分岐セル圓錐花穂ヲ出シ。微小ナル花二個ヅ、
各枝端ニ綴ル。苞頭ハ著シク外殻ヨリ長大ニシテ外殻ニ
ハ芒ヲ具ヘ。二齒裂ヲナス。

- (922) *Alopecurus fulvus*, L.

すゞめのてつぼう。ヒヨヒヨグサ。

ヤリクサ。看麥娘。

麓。

高一尺前後ニ達スル雜草ニシテ早春ヨリ夏月ニ涉リ二三
寸ノ圓錐花序ヲナシテ花ヲ密生スルコトヤ、筆頭状ナリ

- (923) *Andropogon brevifolius*, Sw.

うしくさ。

麓。大宮。村山。

莖高三四寸乃至六七寸ノ一年草ニシテ通常叢生ス。莖極
メテ細クレドモ葉ハ線形ヲナシテヤ、廣ク。長サ一寸内
外アリ。八九月頃葉腋ヨリ繊細ナル花梗ヲ抽キテ其先キ
ニ一寸許ノ細キ芒アル花穂ヲ着ク。

- (924) *Andropogon micranthus*, Kunth. *genuinus* Mak.

ひめあぶらすゝき。コアブラス、キ。

麓。大宮。村山。山中村。

山中ニ生ズル草本ニシテ莖ノ下部ハ頗硬固ナリ。あぶら
すゝきヨリ莖小ナリ。葉モ較ク細短。八九月頃あぶら
すゝきヨリ小ナル花穂ヲ出ダス。其芒褐色ナリ。

- (925) *Andropogon Nardus*, L. var. *Georgii*, Hack.

をがるかや。イヌガルカヤ。

麓。大宮。村山。宮原。篠坂。

莖三四尺ノ宿根草。葉ハ細ク長クシテ尖ル。秋月莖ノ上
部ニ枝ヲ生ジテ多クノ下垂セル小穂花序ヲ着ク。をがる
かやニ似タレド穂ノ形小ク。苞ノ先端モ亦尖ラズ且ツ苞
葉ニ著毛ヲ生ズルコトナシ。

◎栽エテ觀賞シ又裁リテ活花トス。山民ハ根ヲトリテたわ
しノ材料トス。外國ニテハ蒸餾シテ香水ヲ作ルト云フ。

- (926) *Arthraxon ciliaris*, Beauv.

こぶなぐさ。ハチジャウガリヤス。

麓。大宮ノ上。細紺野。

山野ニ普キ越年草ニシテ細莖地ニ數キ。長一二尺ニ及ビ其末立チテ數個ニ分岐ス。葉ハ廣披針形或ハ長卵形ニシテ尖リ。基脚ハ心臟形ヲナシ長一寸内外アリ。九月頃枝毎梢ニ褐紫色。寸許ノ穗狀花序ヲナシ。花序ハ數個叢生シテ帶狀ヲ呈ス。

◎莖葉ヲ煎ジテ黄色ノ染料トナス。八丈島ニテハ今日尙此物ヲ用ヒテ黄八丈ノ染料トナスト云フ。

(927) *Arundinaria variabilis* Mak. var.

ねざさ。

麓。大宮口。

稈細クシテ通常めだけノ一枝ノ如シ。地面ヨリ叢生シ。高通常三四尺ナリ。節ハ凸起スルコト微ニシテ節間四五寸ヲ普通トシ。深綠色若クハヤ、紫暈ヲ帯ビ籜ハめだけト等ク久シク落チズ。葉ハ三四葉ヲ對スルモノ九拾葉ヲ附スルモノアリ。春ヨリ秋マデハ綠色ナレドモ冬ニ至リ霜ヲ受ケレバ乾枯シテ黄白色ニ變ズルノ特徴アリ。

(928) *Arundinella anomala* Steud.

とだしば。バレンシバ。

麓。大宮。細紺野。宮原。バツカケ。鈴ヶ原。須走ノ上。太郎坊ノ下。

草狀ちがやニ似テ遙ニ大ク。すゝきニ似タレド莖葉共ニ類白色ノ毛アリ。花ニ芒ナシ。八九月頃分岐多キ五七寸ノ圓錐花序ヲ莖頂ニ生ズ。同一穗狀花序ニ兩全花ノ外別ニ三雄蕊アル雄花ヲ混生ス。羽狀ヲ爲セル花柱ハ紅紫色ヲ帯ビ。葯ハヤ、紫褐色ナリ。◎牧草トス。

(929) *Asprella japonica* Hack.

いはたけさう。ミヤマカツラ。

麓。バツカケ。八幡堂ノ下。

山地ニ生ズル綠色草本ニシテ蠶花ハ二乃至數多ノ花ヨリ

成リ。苞穎ハ缺如ス。一見かもじぐさニ似タレド種ハ一層狹細ニシテ葉ノ幅廣シ。

(930) *Beckmannia erucaeformis* Host.

みのごめ。エツタゴメ。茵草。

麓。

廢田等ニ多キ一年草ニシテ苗初メ小麥ニ似タリ。

◎屠者種子ヲトリ飯ニ炊グ。ヨリテふつたごめノ名アリト云フ。

(931) *Brachypodium japonicum* Miq.

やまかもじぐさ。ヤマカツラ。

麓。細紺野。

高二尺許ニ達スル宿根草。葉ハ細ク硬クシテ一尺ニ過ギズ。叢生ス。葉面細毛アリテ粗糙ニ感ズ。六月頃莖ヲ抽キテかもじぐさニ似テ疎ニヤ、細キ種ナツク。花序ハ淡綠ニシテ外殼ノ芒長カラズ。

(932) *Bromus japonicus* Thunb.

すゞめのちやひき。雀麥。

麓。

一年草。葉ハ上葉長ク扁潤ニシテ縦皺ヲ有シ兩面トモ白キ柔毛ヲ存ス。からすむぎニ似タレド葉尖長ク。葉鞘特ニ茸毛多ク且ツ少シ開花遅シ。六月頃莖ヲ抽キ細梗ヲ分チテ其先端ニ一寸許ノ紡錘狀圓錐花序ヲ下垂シテ着ク。苞穎ニ芒ナシト雖外殼長芒ヲ有ス。◎家畜ノ飼料。

(933) *Bromus pauciflorus* Hack.

きつねがや。

麓。

莖葉共ニ細軟毛多クヤ、粗剛ナリ。七八月頃莖ヲ抽キ。疎ニ細梗ヲ分岐シテ初メ暗綠後色褐色ニ變ズル尖穎花ヲ綴レル花穂ヲ出ス。芒穎ナシト雖外殼ニ長芒アリ。

- (934)
- Brylkirnia caudata*
- , Fr. Schm.

ほがへりがや. ハジガへリ.

麓. 細紺野. 八幡堂ノ下.

莖高一尺餘ニ及ビ一見かもじぐさノ如シ。葉ハ細クシテ小ク。莖葉共ニ平滑ナリ。六七月頃花軸ヲ抽出シ短梗ノ小穂ヲ疎生シ。小穂ハ通常側方ニ向フ。蠶花ハ綠色尖銳下ニ向ヒ外殻ニ頗長キ二芒ヲ有ス。此類ノ各蠶花ハ一花ヨリ成リ四個ノ苞穎ヲ有ス。

- (935)
- Calamagrostis arundinacea*
- Roth. var.
- genuina*
- , Haek.

のがりやす.

喬. 麓. 細紺野. 八幡堂. 太郎坊ノ下. 三坂ノ上. 須走口 1950m.

頗さいどがやニ類スレド。ソレヨリハ穂モ細ク葉モ狭小ナリ。七八月頃莖ヲ抽クコト三四尺ニシテ多岐圓錐狀ノ疎ラナル淡黄色ノ花穂ヲ綴ル。

- (936)
- Calamagrostis arundinacea*
- Roth. var.
- seiuroides*
- Haek.

さいどがや.

麓. 萬農原. 札打. 天照教. 宮原. 八幡堂ノ下.

山野ニ多キ宿根草. 通常叢生ス。莖ハすくきヨリ細ク高三尺餘ニ達ス。秋月四五寸ノ長キ複穂ヲ抽キテ花アリ。花穂ハ通常淡紫色ヲ帶ブ。

- (937)
- Calamagrostis Epigeios*
- Roth.

やまあは.

麓. 村山ノ上. 一ノ澤. 篠坂. 大宮新道一合. 吉田口.

莖ハ細ニシテ三尺餘。葉ハ稍く長キ小舌ヲ具ヘ。前種ヨリヤ、細シ。八月花アリ。小穂花序ハ黄綠色或ハ帶紫色コシテ多數密集シテ長五六寸ノ圓錐花序ヲ成ス。甚々くさよし。ひえがへり等ノ花穂ニモ似タレド更ニ大ナリ。

- (938)
- Calamagrostis sachalinensis*
- Fr. Schm.

ひめのがりやす.

草. 麓. 須走口. 三坂峠. 吉田口五六七合及其上. 大宮新道一合半. 同一合. 鈴ヶ原.

高山ノ乾性地ニ生ズル多年草。のがりやすニ比スレバ莖殊ニ纖細ニシテ高二尺ニ及ブ。七八月梢上ニ細梗ヲ抽キテ穂ヲ出シ。淡黄綠色ヲ帶ブル細花ヲ縷ラニ着ク。

- (939)
- Calamagrostis villosa*
- Mut.

いはがりやす.

麓. 喬. 灌. 中畑道一合. 大宮口 (1600m.—1700m.) 大宮口三四合. 須走口一三合. 吉田口五六七合.

高山ニ普通。前者ヨリ長大。穂ハ饒山ニ小花集リテ紫色ヲ帯ビテ美麗ナリ。

- (940)
- Diarrhena japonica*
- F. et S.

たつのひげ.

麓. 細紺野. バツカケ 一ノ澤. 大宮新道. 吉田口.

莖長二尺餘。草狀かうやざさニ似タレド遙ニ大形。葉ハ長披針形。長五六寸幅四五分。薄クシテ尖レリ。六七月頃頗疎ラナル大ナル圓錐花ヲ抽出ス。此類ノ蠶花中最上方ノ空葦ノ殻ハ芒ヲ有スルコトナク且ツ其殻ハこめがやノ如クニ棍棒狀ヲナサズ。

- (941)
- Eleosine indica*
- Gaertn.

をひじは. チカラグサ.

麓. 大宮. 粟倉.

秋月莖上淡綠色ノ小穂ヲ併列セシ複總狀花序ヲ數個分岐射出ス。各岐梗めひじはニ比スレバ幅廣ク。小穂花密列ス。マタ頗しくくびにニ似タレド著シク小形ナリ。此類ノ蠶花ハ苞穎ヲ小梗上ニ殘シテ一部分脱落シ。苞穎ハ二個アリ。此種ハ根モ強ク延リテ容易ニ引キ抜キ難ク。莖葉共ニ強韌ナルニヨリちからぐさノ稱アリ。

(942) Eleusine coracana Gaertn.

しこくびえ、カモマタキビ、ノラビエ、
コウバウビエ。

麓、村山、栗倉(共ニ栽培)

草状をひじはニ類スレド更ニ肥大ニシテ一層強健ニテ拇
指大ノ太サニ達ス。穂状酷ガをひじはニ似タレド遙ニ大
ニシテ稈ノ脚ノ如シ。故ニかもまたきびノ稱アリ、種子
ハ粟粒ノ如ク、十月頃成熟ス。

◎子粒ヲ飯、糊ニツクリ又粉末ニシテ餅ヲツクリ或ハ一種
ノ酒ヲ醸スベシ。米國人ハ栽エテ觀賞ス。

(943) Eragrostis ferruginea Beauv.

かせくさ。

麓、大宮、上井出、山村。

秋月複雑分岐セル綠紫色ノ小穂花ヲ綴リテ長四五寸ノ疎
大ナル圓錐花序ヲツクル。莖花ハ互ニ密集セル數多ノ花
ヨリ成リ、花梗ハ柔軟、外殼ニ龍骨ヲ有ス。其花序ハ微
風ニモヨク動搖スルヨリかせくさノ稱アリ。

(944) Eriochloa villosa Kunth.

なるこびえ。

麓、大宮、大岩、村山、三坂ノ上。

六七月花莖ヲ抽キ、長一寸許ノ三四本ノ穂状花狀チ一
方ニ出ス。小穂花序ハ小形ニシテ一列兩性花ヨリ成リ且ツ
帶白色ノ長毛ヲ有シ、子粒ハ卵形ナリ。穂ノ概形すゞめ
のひえニ似タレド小梗チ一方ニ分岐スルコト、小梗上
下ニ子粒ヲ生ズルコト、子粒ノ基脚ニ白毛ヲ密生スル
コト等ニヨリテ彼ト區ツコトヲ得。

(945) Festuca ovina L.

うしのけぐさ。

麓、大宮口、須走口。

山地其他川原砂地等ニ廣ク分布スル多年草ニシテ莖高數
寸ヨリ一尺五六寸ニ及ブ。此種匍枝ヲ有スルコトナク、
多數ノ針狀葉ヲ叢生ス。五六七月ニ至リ針狀ノ莖ヲ叢生
シテ頂ニ淡綠色若クハ帶紫綠色ノ小穂ヲ綴レル疎ラナル
花穂ヲ着ク。外殼ニ短芒アリ。一見カハラいちごつなぎ
ノ穂ノ如シ。此種ノ高山頂ニ生ズルモノハ概矮小ニシテ
高一寸五分乃至四寸ヲ超ユルモノナシ。

(946) Glyceria acutiflora Torr.

むづおれぐさ。

麓

莖葉ハ柔弱。其水中ニ生ズルモノハ莖葉水面ニ偃臥シ、
節ニヨリテ根ヲ生ズルヲ常トス。花ハ四五月頃莖ヲ上ゲ
頂ニ疎穂ヲ抽キ、短梗ニシテ長一寸許ノ細キ淡綠色ノ小
穂ヲ互生ス。實ハ稍大形ニシテ長橢圓形ナリ。コノ種ハ
頗るどじょうつなぎニ似タレド葉ノ基部ニ毛ヲ有スルノ異
アリ。

(947) Glyceria tonglensis Clk.

どじやうつなぎ。

喬、麓、八幡堂、大宮。

溝邊ニ生シ莖葉共ニ平滑ニシテ柔ナリ。五六月頃莖上五
六寸ノ花穂ヲ抽キテ稍長梗ノ長サ三分以内ノ紡錘形ノ
小穂ヲ疎ニ着生ス。◎牧草トス。

(948) Hierochloa japonica Max.

たかねかうぼう。

麓、栗倉。

高山生ノ直立草本ニシテ高二尺。葉ハ披針形。莖葉共ニ
みやまかうぼうヨリ細シ。又かうぼうニ類スレド莖ハ遙
ニ長ク、花候モ遅クシテ七八月頃ナリ。花序ハ長サーニ

寸許ノ細長圓錐形ニシテ彼ノ如クニ短大ナラズ。

(949) *Imperata arundinacea* Cyr.

ちがや. ツバナ. 茅針. 白茅.

麓. 大宮口. 須走. 仁杉.

四五月頃宿根ヨリ發芽シ. 葉中ニ花穂ヲ包ミ細筆狀ヲナス。コレ即チつばなナリ。夏月其果ヲ熟スレバ白色ノ長毛ヲ有スル二三寸ノ穂トナル。コレ即チちがやナリ。地下莖ハ地中ヲ横行スルコト酷ク竹類ノソレニ似タリ。

◎果實ノ白毛ヲ火口ノ料トシ又絲ニ代ヘテ布團ニ入ル。葉ハ適良ノ馬料トナリ又苜蓿ハ糞ヲ編ムニ宜シ。つばなハ兒女トリテ生食ス。而メ地下莖ハ甘味ナルヲ以テ兒女喜ビテ之ヲ咬ム。

(950) *Isachne australis* R. Br.

ちござさ. ヤナギバザサ.

麓.

山村路傍ノ稍水濕アル地ニ簇生ス。莖ハ細ク。基部ハ臥地性ナレド。ソレヨリ上ハ直立シテ一ニ尺ニ達ス。葉身部ハ披針形ニシテ稍ク柳葉ニ似テ尖レリ。七八月頃多ク小梗ヲ分岐シテ小球狀ノ花ヲ稍ク疎ニ圓錐花序ニ綴ル。

(951) *Leersia oryzoides* Sw. var. *japonica* Hack

さやぬかぐさ.

麓. 栗倉.

水濕アル地ニ生ズ。秋月疎ナル淡綠色ノ穂ヲナシテ花アリ。概形ハねノ穂ニ似タレド小穂ハ稻ニ比スレバ較小クシテ細ク瘠セテ恰モねノ如クナルヨリ其名アリ。花ハ兩性。明瞭ナル苞穎ナシ。

(952) *Lophatherum gracile* Brongn. var. *elatum* Hack.

さくさ. ツユクサ. 淡竹葉.

陰地ニ生ズル一年草。高二三尺。葉ハ廣披針形ニシテ先

端尖リ幅七八分長五六寸ニ至リ。質薄クシテ竹葉ノ如シ故ニ其名アリ。果實ハヨク人衣ニ襲ク。

(953) *Milum effusum* L.

いぶきのかぼ.

喬. 麓. 八幡堂附近. 須走口一合半ノ上.
三坂ノ上.

高山ニ生ズル草本ニシテ高二三尺ニ達ス。夏月花アリ。節間ハ下脚一寸許ナルモ上方ニ至ルニ從ヒ次第ニ數寸ノ長サニ達シ。長披針形ニシテ三寸許ノ尖葉ヲ互生ス。花穂ハ六七寸アリテ微小ナル綠色ノ小穂ヲ疎ラニツケ。稍さやぬかぐさニ似タレド果實ハ小ナリ外殼ニ芒ナシ。

(954) *Miscanthus Ma'sumurae* Hack.

かりやすもごき.

喬. 麓. 灌. 大宮口一合. 中畑道一合. 水土野.
一ノ澤. 瀧ノ澤. 須走口 1200m. - 1440m.
1950m. - 2030m.)

高山ニ生ズル草本ニシテ七八月頃二三尺ニ達シテ頂上ニ白軟毛ヲ帯ベル三四寸ノ穂ヲ疎生ス。かりやすニ似タレド葉莖共ニ短ク。穂モ亦疎短ニシテ彼ニハ芒ナキモコノモノニハ五六分ノ褐色ノ芒アリ。又すくさニ類スレド高サ低ク且ツ花穂ノ分岐遙ニ少シ。

(955) *Miscanthus sinensis* Anders

すくさ. ツバナ. カヤ. 芒.

◎莖葉ヲ屋根ヲ葺クニ用ヒ又裁エテ觀賞ニ供ス。即秋ノ七草ノ一ナリ。

(956) *Miscanthus tinctorius* Hack.

かりやす. 青茅.

麓. 大宮新道大平. 鈴ヶ原. 山中村. 吉田.

山野ニ生ズル宿根草ニシテ高二三尺ニ達ス。葉ハ細長クシテ尖リ。全体略すくさニ似タレドモ。一節ニ細ク。又穂ハ三岐スルヲ常トシ多キモ四五岐ニ過ギズ。且ツ小穂

花序ハ全ク芒ヲ缺クカ或ハ甚ダ短キ芒ヲ有スルノ異アリ
八九月頃花アリ。

◎莖葉ヲ刈リトリ黄色ノ染料トス

(957) *Muehlenbergia japonica* Steud.

ねずみがや. ウシガヤ.

麓. 大宮新田.

莖ハ初メ多少地ニ傾臥シ. ソレヨリ分岐シテ七八寸乃至
一尺餘ノ細莖ヲ抽出シ. 九十月頃微花ヲ綴レル繊細ナル
二三寸ノ圓錐花穂ヲ出ダス. 花ハ多少紫色ヲ帯ビ. 二個
ノ鱗被ヲ有シ. 柔軟ナル長芒ヲ存ス. 葉ハ細ク. 長サ二
三寸幅二分内外ニシテ先端ハ鋭尖ナラズ。

(958) *Muehlenbergia japonica* Steud. var. *hakonensis* Hack.

たちねずみがや.

喬. 麓. 北山. 八幡堂ノ下. 須走口1370m.

山地ニ生ズル品種ニシテ前者ヨリモ遙ニ長大ニ. 莖ハ彼
ノ如クニ傾斜スルコトナシ. 穂モ亦著大ニシテ葉モ彼ヨ
リ長クシテ尖レリ。

(959) *Oplismenus undulatifolius*. Beauv.

ちぢみざさ. ケチ. ミザサ.

麓. 村山. マツカケ.

莖ハ臥地性ニシテ各節ヨリ根ヲ下ス. 葉ハ披針形ニシテ
尖リ. こぶなぐさニ似タレド稍糙澁ニシテ表面ニ縮ミヲ
有シ且ツ長毛アルヲ以テ區別セラル. 八九月頃一尺許ノ
莖ヲ臺ゲテ頂ニ穂ヲナシテ花アリ. 總梗ハ三稜ニシテ細
毛密生ス. 花穂ノ状態ハこぶなぐさノ花穂ニ比スレバ花
軸ノ周圍ニ小穂ヲツクルコト疎ナルト. 芒ノ極メテ長キ
等ニヨリテ區別スベシ。

(960) *Panicum acroanthum* Steud.

ぬかきび.

麓. 宮原.

莖高二三尺. 纖弱ニシテ多少物ニ依リテ斜上スルノ傾アリ.
八九月頃枝梢毎ニ疎ニ細梗ヲ岐シテ大形ノ花穂ヲ綴
ル. 花色淡綠若クハ紫黒ヲ帯ブ. 果實ハ外形ちこざさニ
似タレド彼ヨリハ軟ナリ。

(961) *Panicum Crus Galli* L. var. *frumentaceum* Hook. f.

ひえ. 稗.

麓. 大岩. 村山(共ニ栽培)

草狀のひえニ似タレド遙ニ長大ニ. 禾穀中最強健ナルモ
ノ一ナリ. ◎種子ヲトリ炊ギテ食料ニ充ツ。

(962) *Panicum Crus Galli* L. var. *genuinum* Hack.

みづびえ. イヌビエ. クマビエ.

麓. 高田.

葉ハ細長クシテ尖リ. 次ノのびえニ比スレバ遙ニ長大ナ
リ. 花ハ八九月頃紫黒色若クハ淡綠色ニ開キ. 極メテ長
キ芒ヲ殻ニ具ヘ. 圓錐花序ニ排列ス. ひえ類ノ原種ノ様
ニモ考ヘラル。

(963) *Panicum Crus Galli* L. var. *submuticum* Mey.

のびえ. イヌビエ. 稗.

麓. 高田.

通常ノひえニ比スレバ甚ダ小ク. 數個ノ小穂ヲ疎生スル
ニ過ギズ. 且ツ前者ノ如キ長芒ヲ有スルコトナク. 間々
無芒ノモノアリ。

(964) *Panicum indicum*, L.

はひぬめり. スメリグサ.

麓. 大宮. 村山.

葉莖共ニ柔滑ナリ. 秋月細長キ穂ヲ出ス. 穂ノ長サ二三
寸位ニ達シ稍々すすめのでつぼうノ穂ニ似タレド花穂ノ

太キト小穂花ノ稍々疎大ナルト屢々多少黒ミヲ帯アルト
ヲ以テ區別スベシ。

(965) *Panicum glabrum* Gaud.

あきめひじは。

麓。北山。

下記ノめひじはニ酷似スレド。全体稍々小ク。葉部ニ毛
ナキノ異アリ。

(966) *Panicum sanguinale* L. var. *ciliare* Doell.

めひじは。ケメヒジハ。ヤツマダグサ。

ハグサ。

麓。大宮。

通常根際ヨリ三四葉ヲ分チ各二三尺ニ達シ。或ハ地ニ敷
キ或ハ斜出ス。夏秋ノ候四五本ニ分岐シ各長サ數寸ノ穂
ヲ抽ク。前者ヨリハ草狀稍々粗大ニシテ葉鞘部ニ毛アル
ヲ以テ兩者ヲ區別スルコトヲ得。

(967) *Paspalum Thunbergii* Kunth.

すゞめのひえ。

麓。

莖高一二尺。叢生ス。葉ハ細長クシテ尖リ。莖ト共ニ著
シキ白軟毛アリ。八九月頃花莖ヲ抽キ數個ノ小梗ヲ生シ
各梗ニ多數ノ小花ヲ穂狀ニ着ク。小梗ノ小形小穂花ハ一
方ニ偏着シ。梗ノ長サなるこびえノ三倍ニ及ブ。花柱ニ
裂羽毛狀ニシテ濃紫色。子房ハ扁圓ニシテ平滑。果實ハ
熟スレバ一分位。◎家畜ノ飼料ニ供ス。

(968) *Pennisetum japonicum* Trin.

ちからしば。狼尾草。

麓。大宮。

莖ハ扁平滑澤。高二尺許ニ達シ。通常強大ナル株ヲナシ

テ莖葉ヲ叢生ス。葉長一尺餘。幅二分許ニシテ強壯ナリ
九十月頃葉間ヨリ莖ヲヌキテ其上部四五寸許。圓錐狀ノ
穂ヲナシテ花アリ。小穂花ハ黒褐色ニシテ其下ヨリ黒褐
色ノ長キ剛毛ヲ輪生スルヲ以テ全形ハ狼尾ノ如シ。

(969) *Phyllostachys aurea* Riv.

ほていちく。ゴサンチク。人面竹。

佛眼草。

麓。仁杉。茶黄澤。

暖地ニ生ズル竹類ニシテ高一丈餘ニ及ブ。地上莖ノ下部
ハ不規則ナル節ヲ有シテ凸凹ヲ呈シ。往々布袋ノ腹ノ如
クナルヨリ其名アリ。

◎植エテ觀賞ニ供シ又稈ヲ釣竿。杖。洋傘柄等トシ筒ヲ食
用トナス。

(970) *Phyllostachys puberula* Munro.

はちく。アハタケ。クレタケ。チンチク。

淡竹。

麓。

暖地ニ普通ナル竹類ノ一ニシテ苦竹ヨリヤ、細キヲ常ト
ス。葉ハまだけヨリ小ク。薄質ニシテ下面白色ナラズ。
苦竹ニ似タレド筒ヲ生ズルコト較々早ク。且ツ籜斑點ヲ
有スルコトナク毛ヲ帯ブ。籜頂ノ葉ハまだけヨリ短ク。
幅廣ク質硬シ。又籜ノ先端ニまだけノ如キ毛ヲ有セズ。
稈ノ外皮モ淡綠色ニシテ微白粉ヲ帯ブ。

◎筒ハ淡味ニシテ食用トナル。材質まだけヨリ強靱細緻ニ
シテ割リ易キヲ以テ簍。簾ヲミ其他精巧ナル細工ニ用
ヒラル。彼ノ駿河細工ノ如キ概コレナリ。又細キモノハ
笛。釣竿。杖。傘柄等ニ賞用セラル。籜ハ笠。草履等ノ
料トナル。又觀賞用。

(971) *Phalaris arundinacea* L. var. *genuina* Hack.

くさよし.

麓. 村山.

水邊ニ生ズル多年草ニシテ高三四尺アリ。草状ヤ、蘆ニ似テヤ、小ク。莖葉共ニ彼ノ如ク堅固ナラズ。花ニ芒ナシ。

(972) *Phragmites communis* Trin.

よし. アシ; 蘆.

麓. 白絲.

濕地或ハ淺水中ニ生ズル多年草ニシテ春月舊根ヨリ新苗ヲ生ジ。高五六尺乃至一丈餘ニ達フ。秋月莖頂ニ大ナル花莖ヲ抽キテ其上ニ多クノ小穗状花序相集リテ大ナル圓錐花序ヲ呈ス。花ハ鼠色ノ殻ヲ有シ。風媒ニヨリテ結實スレバ果實ハ白毛ニヨリテ散布ス。而メ此類ノ毛茸ハ蠶花ノ軸ノミニ生ズ。

◎莖ヲ葦簾^{ヨシダレ}ニ作り、筆鞘トシ或ハ松明トモナス。嫩筍ハトリテ食用トナスベク又此植物ヲ栽エテ堤防等ノ崩潰ヲ防グ。

(973) *Poa aeroleuca* Steud.

みぞいちごつなぎ. タマイチゴツナギ.

麓.

普通ナル多年草。草状すすめのかたびらヨリ遙ニ長大ニシテ屢々二三尺ニ達スルモノアリ。柔滑ナリ。五六月頃いちごつなぎニ似テヤ、長大ナル圓錐花序ヲナス。

◎此類ハ皆牧草ニ適ス。

(974) *Poa annua* L.

すすめのかたびら. ニラミグサ.

イチゴツナギ.

麓.

柔滑ナル二年草ニシテ概形みぞいちごつなぎニ似タレド

遙ニ小形ニシテ葉モ亦短クシテ鋭尖ナラズ。三四月頃花アリ。此種ハいちごつなぎ屬中最矮小ノ品ナリ。

(975) *Poa annua* L. fr. maxim Hack.

いちごつなぎ. ニラミグサ.

麓. 大宮口.

春ヨリ夏ノ始メニ涉リ最普通ナル草本。莖高一二尺。葉ハ幅二分餘ニシテ細長ク。莖葉共ニ柔滑ナリ。四五月頃盛ニ數多ノ纖細ナル分岐梗ニ淡綠色ノ小穗ヲ懸着ス。此類ハスベテ外殻ノ背面ニ著シキ龍骨ヲ具フ。

(976) *Poa nemoralis* L. var. *strictula* Hack.

かはらいちごつなぎ. ヤマイチゴツナギ.

麓. 大宮口. 吉田口御石茶屋.

葉頗細クシテ葉柄長シ。四五月頃莖頂ニ四五寸ノ圓錐花穗ヲ抽出シテ疎ニ淡綠色ノ細花ヲ綴ル。本種ハ前數者ニ似タレド。莖ヤ、堅直ニシテ穗モ亦比較的細小ナリ。

(977) *Pollinia imberbis* Nees, genuina Hack.

あしぼそ.

麓. 宮原.

長サ四五尺ニ達スルコトアレド莖ハ軟弱ナルガ故ニ地ニ臥スノ傾ヲ有シ。節々不定根ヲ出スノ性アリ。葉ハ軟弱平滑ニシテぬかきびノ葉ノ如クニ柳葉状ヲ呈ス。秋月梢上直立シテ通常二三岐セル綠色ノ穗ヲ出ダス。

(978) *Pollinia nuda* Trin.

ささがや.

麓. 大宮. 宮原.

莖細ク稍々地ニ臥シテ節々不定根ヲ生ズ。葉ハ廣披針形或ハ長卵形ニシテ寧ロ竹類ノ葉ニ似タリ。夏秋ノ候莖二尺内外ノ長ニ達シ。細長クシテ一寸餘ニ二乃至四岐セル

穂ヲ生ズ。穂状こぶなぐさニ似タレド、長クシテ分岐ノ
數少ク、さやのかぐさニ似タレド果實小ナリ。花穂ノ花
序ハ小形ニシテ細キ芒アリ。

(979) *Rottboellia compressa* L. var. *japonica* Hack.

うしのしつゝい。

麓 富士根村。

莖ハ強ク高二尺許ニ達シ、其下部ハ蔓延性ナリ。葉ハ細
長クシテ剛シ。七八月頃一方ニ曲リテヤ、羅刀状ヲナセ
ル花穂ヲ出ダス。草状ヤ、かものはしニ似タリ。

(980) *Rottboellia latifolia* Steud.

あいあし。

麓 原。

海岸ニ近キ水邊ニ生ズル多年草。高四五尺。莖葉共ニ堅
硬ナリ。葉ハ長クシテ尖リ、其幅七八分。小穂花序ハ多
數集リテ長キ穂状ヲナシ、數個ノ穂状花叢ハ莖ノ頂部ニ
着ク。六月頃花アリ。花ハ帶紫褐色、平滑ニシテ芒ヲ缺ク

981) *Sasa albo-marginata* Mak. et Shib.

くまざさ。ヤキバザサ。ヘリトリザサ。

山白竹。

麓。

短キ竹類ニシテ莖高三四尺、細長クシテ中空。葉ハ大ナル
廣披針形ニシテ帶白色ノ縁邊ヲ有ス。

◎莖ヲ籠等ヲツクル料ニ供シ、筍ヲ食トス。愛乃人ハうく
べト稱シ探リテ飯ニ混シ炊ギ食スト云フ。栽エテ觀賞ニ
供ス。

(982) *Sasa borealis* Mak. et Shib.

すゞたけ。ミスズタケ。ヤマタケ。筍竹。

麓 大宮新道 合ノ上。御石茶屋。

莖高通常七八尺。直径二三分。節低ク枝ハ肥大。葉ハ披

針形ニシテ割合ニ大ク、五七寸ヨリ九寸マテノ長サト七
分ヨリ二寸マテノ幅トヲ有ス。

◎籠。行李。帽子。數物等ノ料ニ供シ種子ヲ竹果ト稱シ食
料トス。

(983) *Setaria glauca* Beauv.

きんえのころ。

麓 大宮。札打。北山。白絲。上井出。

黄金色ノ芒狀剛毛アル花穂ヲ有スルヲ以テ同類ノ他品ト
區別セラル。子粒ハ普通ノ点のころさうノ者ヨリ粗大ナ
リ。

(984) *Setaria viridis* Beauv. var. *purpurescens* Max.

むらさきゑのころ。

麓 大宮。

原野ノ乾燥地ニ生ズ。ゑのころさうニ似タレド、穂ハヤ
、細ク瘠セタリ。秋月莖葉共ニ紫色ニ染ミ、芒エ亦紫褐
色ナリ。

(985) *Setaria viridis* Beauv.

ゑのころさう。エノコログサ。

エノコログサ。狗尾草。

麓 大宮。札打。北山。白絲。上井出。

莖高一二尺ノ一年草。苗穂共ニ粟ニ似テ遙ニ小ク 通常
七八月頃綠色芒狀ノ剛毛アル一ニ寸ノ花穂ヲ生ズ。

◎種子ヲあなやぎト稱シテ山民ノ食ニ充ツル事アリ。

(986) *Spodiopogon cotulifera* Hack

あぶらすゝき。チヨロガヤ。

麓 大岩。天照教。宮原。

高四五尺。葉ハ狭長ニシテ尖リ、莖ト共ニ硬剛ナリ。九
月頃莖頂ニ穂ヲ抽ク。莖ハ淡綠色ニシテ白毛ヲ有シ紫色

ノ長毛ヲ具ヘ。小穂花序ハ圓錐花序ニ排列シ。各圓錐花序ノ軸部ハ細長クシテ數個ヅ、輪生シ。多數ノ圓錐花序ハ又集リテ疎大ナル複圓錐花序ヲ成ス。

(987) *Spodiopogon sibiricus* Trin.

おほあぶらすゝき。

麓。大宮新田。山中。村山

地ニ生ズル多年草。葉ハ長大。軟◇細刺粗剛ナリ。八九月頃花アリ。花種ハ前種ノ如クニ散大垂下性ナラズ。小穂花序ハ白毛ヲ密生シ。比較的短キ芒ヲ具ヘ。圓錐花序ヲナス。果ハ前種ヨリ粗大ニシテ白線毛ヲ帶ブ。

(988) *Sporobulus elongatus* R. Br

ねすみのを。

麓。大宮。

一科ヨリ分岐叢生ス。莖葉共ニ細ク。高一二尺ノ間ニ昇降ス。九十月ノ候四五寸乃至七八寸アル鼠色ノ花穂ヲ生ズ。其穂ハ多數分岐セルモノナレドモ相密集シテ鼠尾ノ如シ。

(989) *Themeda Forskali* Hack. var. *japonica* Hack.

めがるかや。カルカヤ。

麓。大岩。

莖高三四尺。葉ハ細長シ。九月頃莖ノ上部ノ葉腋ニ小穂花序ヲ出シ更ニ集リテ圓錐花序ヲ呈ス。此種ノ諸品ニ在リテハ無柄ノ蠡花ハ兩性ニシテ一個ノ花ヲ有シ。有柄ノ蠡花ハ雄性ニシテ外殼ニ芒ナシ。

◎根ハ纖維狀ニ分岐シ強靱ナルヲ以テ東藁^{タワシ}。刷子等ニツクル。

(990) *Trisetum flavescens* Beauv. var

かにつりぐさ。

麓。大宮口。

莖高二尺餘ニ達ス。葉ハ細長クシテ尖リ。幅二分アリ。五六月頃長サ三四寸許ノ綠褐色ニシテ光澤アル圓錐花序ヲ出ダス。各花ノ外殼ニ長芒ナリ。◎牧草ニ佳適ス。

(991) *Zoysia pungens* Willd. var. *japonica* Hack.

しば。結縷草。

麓。大宮。小屋坂。札打。富岡。

莖ハ細ク匍匐性ニシテ節々地ニツキテ細根ヲ出シ又短キ地上莖ヲ出シ。廣ク地ヲ覆フニ足ル。葉ハ細長クシテ尖リ長三四寸。五六月頃花莖上ニ一寸餘ノ穗狀花序ヲ構成ス。

Hydrocharitaceae. 水鼈科

(992) *Blyxa caulescens* Max.

やなぎすぶた。

麓。大宮。

すぶたと同ク。普ク各地ノ水田池溝ノ淺キ水底ニ生ズル小草ニシテ全体水中ニ沈在ス。葉ハ無柄。披針形ニシテ上部ノ邊緣ニ細鋸齒アリ。幅ハすぶたヨリ細クシテ長シ莖ハ二三寸或ハ時ニ一尺ニ近キコトアリ。三寸ノ莖ヲ立テ、狭長ナル葉ヲ互生スルノ異アリ。

(993) *Hydrocharis Morsus-ranae* L. var. *asiatica* Mak.

ごちかごみ。水鼈。

麓。大宮。吉原

水面ニ浮生スル草本ニシテ葉ハ圓キ心臟形ヲ呈シ。厚クシテ光澤アリ。徑一二寸通常綠色ニシテ裏面ノ中央部ニ圓ク隆起セル氣囊ヲ有シ以テ水面ニ浮ブニ便ニス。八九月頃花莖ヲ抽キテ白色ニシテ徑五六分アル三瓣黄蕊ノ單性花ヲ異株ニ開ク。◎屢々盆愛セラレ。

(994) *Ottelia alismoides* Pers.

みづおほはご. ミヅアサガホ.

麓. 大宮.

根ヲ泥中ヲ有シ一葉數葉。形車前葉ニ似テ更ニ薄軟。形狀モ亦卵形。橢圓形或ハ心臟形等ニシテ時ニ大ナルモノハ葉面殆ド半紙半枚ニ超ユト雖。小ナルモノハ一ニ寸ニ過ギザルモノナキニアラズ。其葉ノ圓形ナル者ヲ丸葉ノ水車前ト稱スレドモ。モト同一ノ品種タルニ過ギズ。入九月頃數寸ノ花莖ヲ抽キテ水面ニ漏斗狀ノ一花ヲ開ク。花色通常白質ニ淡紅紫ヲ帶ブ。

Alismaceae. 澤瀉科

(995) *Alisma platago* L. var. *angustifolium* Kunth.

へらおもだか.

麓. 大宮.

根莖ハさじおもだかヨリ小ク 葉ハソレヨリ叢生シテ直上シ。下部鞘ヲ成セル長葉柄ヲ有ス。葉片ハ狭キ長橢圓形ニシテ上下漸殺シ。銳頭ノ末端ハ鈍尖ヲナス。葉ハ平滑。縱肋五條アリ。夏月花アリ。内花被ハ白色菲薄。圓形。外花被ヨリ長大ニシテ前端ノ邊緣齒痕アリ。一日ニシテ凋衰ス。◎有毒。

(996) *Sagittaria sagittifolia* L. var. *sinensis* Mak.

くわゐ. 慈姑.

麓. 大宮.

◎球莖ヲ食用トスルハ人ノ知ルトコロナルガ地上莖モ亦割リ乾シテ食料ニ充ツベシ。

Potamogetonaceae. 眼子菜科

(997) *Potamogeton crispus* L.

えびも.

麓. 大宮.

水流ニ隨ヒテ長二三尺ニモ及ブ。莖ハヤ、扁平ニシテ狭長ナル葉ヲ互生ス。葉ハ線狀ノ長橢圓。鈍頭ニシテ波狀ニ皺縮スル縁邊ヲ有ス。水中ノ葉ハ互生スト雖。花梗下ノ葉ハ對生狀ヲナスコトやなぎモニ於ケルガ如シ。夏月葉間ニ花穂ヲ出ス。

(998) *Potamogeton polygonifolius* Pour.

ひるむしろ. 眼子菜.

麓. 大宮. 吉原.

根ハ水底ニ入り莖葉水面ニ浮ブ。莖ハ細長シ。葉ハ橢圓ヤ、竹葉ニ似テ濶短。深綠色ニ褐ヲ帶ビ光澤ヲ有シ。背面紫色ヲ帶ブ。夏月葉腋ニ長二三ノ花軸ヲ抽キ小キ帶黃綠色ノ多花穂狀ニ集リテ殆ド筆頭狀ヲナス。

◎民間薬用ニ供ス。

(999) *Potamogeton oxyphyllus* Miq.

さゝも. ヤナギモ.

麓. 大宮.

水ノ流レニ從ヒテ長サ數尺ニ及ブ。莖細クシテ扁平。葉ハ狭長ニシテ幅一分餘。長二三寸。通常互生スト雖花梗ノモノニ限リ皆對生ス。夏月葉間ヨリ二寸許ノ扁莖ヲ出シテ頂ニ暗淡黃綠色ノ細毛ヲ攢簇シテ短穂狀ヲナシ。水面ニ立チテ開ク。

Sparganiaceae. 黒三稜科

(1000) *Sparganium longifolium* Turcz.

みくり. 黒三稜.

麓. 吉原. 大宮.

沼澤等ノ止水又ハ小流ノ中ニ生ズル多年草。葉ハ細長クシテ尖リ。蒲葉ニ似テ狭ク。多肉ニシテヤ、硬シ。三稜簇葉間ニ莖ヲ抽クコト二三尺。數葉ヲ互生シ。夏月梢頭穗状ヲナシテ類白色ノ細花ヲ綴ル。雌雄同株ニシテ共ニ頭状ニ集リ。雌花ノ花序ハ下部ニ位ス。花後果實ハ黒熟ス。

◎葉ヲ暑中ニトリ 陰乾シテ繩ヲ製ス。

Gymnospermae. 裸子植物

Pinaceae. 松杉科

(1001) *Abies brachyphylla* Max.

だけもみ. アヲボウモミ. ニレモミ.

ウラジロモミ. ニツクワウモミ.

喬. 八幡堂. 大宮口 (1300m.-1500m.) 1700m.-1800m.)

幼條ハ平滑淡黄色。針葉ハ他ノもみヨリ細短ニシテ先端針ノ如ク尖リ。裏面ハ白シ。毬果ハ圓柱状。縦ヨリハ細ク。長三寸乃至三寸七八分太サ一吋二三分ニ達シ。熟スル前ニ暗褐色ニテ全ク熟スレバ藍青色トナリ直立ス。果皮ハ脱落性。此屬ノ諸品ハ葉ハ扁平。中肋ハ表面ニ凹ミテ裏面ニ高ク。葉枕ヲ缺キ毬果ハ直立シ。熟スレバ鱗片脱落ス。以テたうひ屬ト區別スベシ。種子ハヤ、三角形ニシテ翼ヲ具フ。

◎邊材ハ帶褐白色。心材ハ淡褐色ニ暗紫色ヲ帯ビ。質略もみニ同ジク。板材トナシ。製紙ノ原料トナシ。日光ニテハ温泉用ノ下駄トナス。

(1002) *Abies firma* S. et Z.

もみ. 樅.

喬. 麓. 八幡堂ノ上. バツカケ 富岡. 須走口 (800m.-1350m.)

樹皮幼時ハ灰白色ニシテ滑ナレドモ老レバ黒褐色トナリテ龜裂ヲ生ズ。一年枝ハ黄綠色ニシテ褐色ノ微細毛アリ。葉ハ先端二分シ。鋭利ニシテ人ヲ殺ス。

◎材ハ白色輕軟。水濕ニ堪ヘ難シ。然レドモ茶箱。米櫃。襪箱。戸障子。板類其他ノ器具ヲ製シ。製紙ノ原料ニ供シ又裁エテ觀賞ニ供ス。其木炭ハ鍛冶用ニ使ヒ。枝條ヲ

編筏用ノ捨木ヲ作ルニ用フ。

(1003) *Abies Veitchii* Lindl.

しらべ. シラビ. リウセン. コリウセン.
シラビソ. シロツガ. アヲヒ. (白檜)

大宮口(1700m.以上一合マテ) 須走口(1300m.以上1800m.-1900m.ノ邊最多. 吉田口(馬返ノ上ヨリ生シ. 二合ノ上ニ著シク三四合. 四合ノ上ニ最著シ)

幼枝ハ灰褐色ニシテ褐色ノ絨毛密生ス。樹皮灰白色ヲ呈シ. 平滑ニシテ龜裂セズ。且ツ樹皮ノ處々ニ脂腺ヲ有シ膨起シテ小疣ヲナスノ特徴アリ。葉ハ尖端淺ク二裂シ. 下面著シク白ク 縦ノ葉ヨリヤ、柔ナリ。毬果ハ圓柱狀長二寸幅七八分ニシテ從屬中最小ク熟シテ暗青紫色トナル。此種ハ偃松ニツギテ高處ニ生ズ。

◎材ハ白色. もみヨリ更ニ輕軟 彈力アリ。篩ノ框 戸障子ノ框. 曲物. 菓子箱. 屋根板. 衣桁. 額縁. 經木等ニ製シ近年盛ニ製紙ノ原料ニ使用ス。

(1004) *Abies Veitchii* Lindl. var. *olivaeca* Shirasawa.

あをしらべ.

喬.

外形しらべニ似ルモ鱗果及ビ翅ノ色澤著シク異レリ。即チ鱗果ハオリーブ色. 翅ハ種子ニ接着セザル部分ノ濃紫色ヲ呈シ其他ハ灰黄色ヲ呈ス. 日光. 八ヶ岳ニモ生ズ

(1005) *Chamaecyparis obtusa* S. et Z.

ひのき. 扁柏. 檜.

麓. 喬. 大宮. 北山. 須走口1700m. 大宮新道一合. 萬濃.

葉ハ小鱗狀ヲナシテ莖ニ密着ス。葉ノ大サれずことさはらノ中間ニ位ス。鱗ノ角度大ニシテ九拾度以上ナリ。葉裏ハさはらノ如クニ白カラズト雖各葉ノ相接スル處ニ白條アリ。頂端鈍角。樹冠ハさはらノ圓錐形ナルニ似ズシ

テ鈍圓形ナルヲ以テ遠望スルモ兩者ヲ別ツベシ。但幼樹ノ樹冠ハ圓錐形ナリ。又れずニハ其葉鱗ハのきヨリ二倍大ナルヲ以テコレ亦容易ニ區別セラル。

◎材質緻密白色ニシテ少シク黄色ヲ帯ビ光澤アリ。伸縮反張スルコト少キヲ以テ建築用ノ良材タリ。又器具ノ材トナシ. 製紙原料トナシ. 材ノ埋木様ニナリシモノヲ神代杉ト稱シテ裝飾材トナス。樹皮ヲ以テ屋根ヲ葺キ或ハ火繩ヲ作り或ハ横肌ノ代用トス。枝條ヲ以テ洋傘ノ曲柄ヲツクリ. 葉ヨリ香油ヲ製ス。古來附木ノ用ニ供セリ。往々植エテ觀賞ス。

(1006) *Chamaecyparis pisifera* S. et Z.

さはら. 花柏. (榧)

喬. 須走口 大宮口. 大宮新道.

葉ハ小鱗狀ニシテ尖リ 開出シ. ひのきヨリ葉纖ク. 裏面ニ白斑アリ。果實ハ圓キ毬果ニシテ枝葉ノ狀頗ひのきニ似タレド. ヤ、柔ク且ツ密ニ. 葉ハひのきヨリモ尖リ其背著シク白ミヲ帯ビ. 毬果ハひのきヨリ微ニ小ク. 樹冠ハ圓錐形ヲナスノ異アリ。

◎材質輕軟ニシテ水ニ堪フルヲ以テ殊ニ桶類ヲ作ルニ適ス又天井板. 戸. 障子. 佛壇. 箆筒. 長持. 曲物. 飯櫃. 模型. 張板等トナス。植エテ觀賞ニ供ス。材ノ價格ハ扁柏ノ半ナリ。

(1007) *Chamaecyparis pisifera* S. et Z. var. *filifera* Mast.

えんかうひば. ヒヨクヒバ.

麓. 村山. 須走(共ニ人家)

さはらノ栽培變種ニシテ下垂スル細キ枝ヲ有ス。葉ハ小鱗狀ヲナシテ著シク尖リ. 甚ダさはらニ類シ. 下部ハ莖ニ密接シ上部ハ開出ス。白斑. 黄斑. 間ノ斑. 霜降斑等ノ諸品アリ。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

- (1008) *Chamaecyparis pisifera* S. et Z. var. *squarrosa* Mast.
ひむろ.

麓. 大宮. 村山. 宮原. 御殿場(共ニ人家)

さばらノ栽培變種ニシテ葉ハ原種ヨリ著シク長ク. 質軟ニシテ白色ノ下面ヲ有ス. 葉ヲ帯ビタル枝ハさばらニシテ背腹ノ二面ヲ有セズ.

◎觀賞ノ爲メニ栽培シ又材ヲ種々ノ用ニ供ス.

- (1009) *Cryptomeria japonica* Don.

すぎ. 杉.

麓. 大宮. 萬歳. 栗倉. 北山. 篠坂.

すぎハすぐノ義ニテ其幹ノ眞直ナルニヨルト云フ. 頗溪谷ノ陰地ニ適ス. 東洋ノ特産ニシテ支那ノ北部ト吾邦トニ産スルノミ.

◎材ハ紫紅色ニシテ用途廣ク 家屋建築用. 橋梁. 帆柱. 電柱. 京人形. 飯櫃. セメント樽等トナシ. 板ニ挽キテ箱桶等ニツクルニヨク水ニ堪フ. マタ曲物ニツクル. 酒樽トナセバ酒味ヲ美ニス. 樹皮ハ屋根ヲ葺クニ用ヒ. 藥トシテハ金創. 火傷其他ノ出血等ヲ治ス. 葉ハ線香. 抹香. 香油ヲ製スルニ用ヒラレ又蚊遣リニ使用セラル.

- (1010) *Juniperus nipponica* Max.

みやまねず. シンシウネズ.

草. 吉田口.

元來羽前羽後陸中信濃及ビ白山等ノ産ナリ. 葉ハ短針狀ヲナシ. 幅廣ク. 扁平ニシテ枝ニ密生ス. 雌雄異株.

- (1011) *Juniperus rigida* S. et Z.

ねず. ムロ. ネズミサシ. ヒムロ. 杜松.

麓. 富士根村.

雌雄異株ノ常綠喬木. 樹皮ハ帶灰赤黒色. 枝ハ針狀三角

チナシテ節多ク. 各節三四本ツツノ葉ヲ斜メニ上方ニ向ケテ輪生ス. 葉ハ細長クシテ針狀ヲナシ. 硬クシテ先端鋭ク尖リテ手ヲ刺ス. 之ヲ鼠ノ穴ニ挟ミオケバ再ビ穴ヲ穿ツコトナシ. ヨリテれずみさしト云フ.

◎邊材白色心材帶暗黄色ニシテ脂香アリ. 俗ニ和ノ白檀ト稱シ. ヨク水濕ニ耐ユ. 材ハ雅致アルヲ以テ床柱トナシ腐敗シ難キヲ以テ桶材トナシ其他床柱. 火鉢. 箸. 楊子. 天秤棒. 稻干竿. 櫛. 佛像等ニツクリ. 蚊遣火ニ用ヒ又生垣トナス. 果實ヨリ油ヲ搾リ藥用及燈用トス. 北海道ノ土人ハ此果ヲ食ヒ 西洋ニテハ利尿劑トナシ又酒ヲ製スルノ材トナス. 葉ハ鼠ノ穴ヲ塞グニ適ス. 屢々庭ニ栽エテ觀賞用トス.

- (1012) *Larix leptolepis* Gord.

からまつ. フジマツ. 日光マツ. 落葉松.

喬. 灌. 大宮口(1500m.—2600m.) 太郎坊.
須走口(1000m. 馬返1480m.) 同一二合.

樹皮ハ赤黒色ニシテ赤松ニ似ルガ故ニ日光ニテハあかまつト云フ. 一年生枝ニ褐色毛. 二年生枝ハ常ニ赤色. 粉白狀ヲ呈ス. 葉ハ淡綠. 年々落葉シ. 新葉ハ叢リテ茶筌狀ヲ呈スルノ特徴アリ.

◎邊材ハ帶褐白色. 心材ハ赤褐. 木理粗ニシテ彈力強シ. 工作ヲ施シ易カラズ. 脂氣アルヲ以テ水濕ニ堪ユ. 材ヲ柱. 長押. 床柱等ノ裝飾ヲ兼メル建築. 電柱及ビ船艦. 橋梁. 鐵道枕木等ニ使用シ或ハ彫刻ヲ加ヘテ茶盆烟草入等ニ造レバ大ニ雅致アリ. 栽培シテ觀賞ス. 此樹ニ生ズル菌ニふりこナルモノアリ. 山民用ヒテ腹痛. 食腸ノ藥トナシ又止血ニ用フ. 樹皮ハ染料トナル.

- (1013) *Picea Alecockiana* Carr.

いらもみ. マツハダ. イラマツ.

シロツガ(材名). トラノヲモミ.

喬 八幡堂ノ直後ヨリ現ル 須走口(1220m.—1360.等)
北山(人家). 吉田口.

富士及ビ男体山ニ多シ。樹皮ハ灰褐色ニシテ小鱗状ヲ呈シ。枝ハ纖長ニシテ四方ニ開展シ。一年生ノ枝ハ毛茸ヲ有シ。緒褐色ヲ呈スルノ特徴アリ。針葉ハ強質。線形ニシテ長三分乃至六分 微凹狀ノ尖頭ヲ具ヘ。扁キ四角形ヲナシ。横断面ハ菱形ナリ。六月頃開花シ十月頃果實ヲ熟ス。毬果ハ長楕圓形。大形ニシテ長三四寸直徑一寸二分許アリテ下方ヘ屈曲ス。其未熟ノ時ハ紫色ナルモ熟スレバ赤褐色トナル。鱗片ハ扁圓ニシテ基部ニ向ヒテ漸ク狹小トナリ。頂ニ不規則ナル細鋸齒ヲ存ス。此類ノ毬果ハ下垂シ其鱗片ハ脱落スルコトナシ。種子ハ翼ヲ有ス。だけもみノ上方。しらべノ下方ニ多シ。

◎邊材ハ白色。心材ハ稍淡赤ヲ帶ビ。質ハもみニ類シ微硬ニシテ彈力ヲ有シ脂氣多シ。材ヲ剥ギテ曲物及ビへぎヲ作り又建築。製紙ニ供スルコト樞ノ如シ。

(1014) *Picea hondocensis* Mayr.

たうひ。トラノヲモミ。シロツガ。シヤ
ラモミ。ニレモミ。ヤニギ。カラスギ。

灌 喬 大宮口1130m. 一合。四合。吉田口ニ三合
大宮新道一合半ト二合ノ間。

海拔三千尺以上ノ地ニ生ズ。樹皮淡黄褐色。七月開花。毬果ハもみノモノモノニ似テ細ク稍ク彎曲ス。樹形えぞまつニ似タレド其小枝ハ多ク淡赤色ヲ帶ビ且ツ葉モ短クシテ平均五六分ニ過ギズシテ稍彎曲シ鱗片薄ク。革質様ナリ。じやらもみトハさわらもみノ變音セル者ナリト云フ

◎邊材ハ白色。心材ハ赤色ヲ帶ビ。肌理細美ニシテ光澤アリ。材質柔軟ニシテ彈力ニ富ミ頗ヒのきニ類スルヨリたうひノ名アリ。材ハ曲物ニ適スルヲ以テ薄片トナシテ篩蒸桶ノ外圍ヲ作り。マタ屋根板。戸障子。土木用杭。船舶林。車軸材ニ用ヒ近頃ハ製紙ノ原料トス。栽エテ庭園

樹トナス。

(1015) *Picea polita* Carr

ばらもみ。ハリモミ。ツガモミ。トラノ
ヲモミ。クロモ 或ハ バラモ(富士)。

喬 八幡堂ノ上。御殿場ノ上。山中湖畔。

山中湖畔ニハ其單純林アリ。樹皮えぞまつニ類スルモ其針葉四角形ニシテ太ク 長サ五分乃至八分。稍上方ニ彎曲シ其上下ノ徑(厚サ)ハ横幅ヨリ大ク。葉質堅剛且ツ鋭尖ニシテ手ヲ觸ルベカラズ。唐檜屬中針葉ノ最強剛ナルモノ也。一年枝ハ鮮褐色ヲ呈シ平滑。花ハ六月末ニ開キ實ハ十月初旬ニ熟ス。毬果ハ長楕圓形初メハ黄綠色ナルモ熟スレバ淡褐色トナリ。長三寸餘。幅一寸乃至一寸五分種子ハたうひ屬中最大ノモノニシテ長二分五厘幅一分三厘許。翼ヲ合スレバ長七分六厘許アリ。

◎邊材ハ白色。心材ハ淡赤ヲ加ヘ。質柔軟ニシテ脂氣ニ富ム。唐檜ニ類ス。洋琴響板。曲物箱類。机。張板。製紙料トシ又建築ニモ用フ。

(1016) *Pinus densiflora* 聖S. et Z.

めまつ。アカマツ。赤松。

麓 篠坂。太郎坊。須走ノ上。鈴ヶ原。籠坂。

葉ハ黒松ヨリ細クシテ短ク且ツ較ク軟キヲ常トス。新芽及ビ幹皮ハ帶赤色ニシテ黒松ノ如クニ黒カラズ。毬果ハ黒松ヨリ小ク。生長モ亦黒松ヨリ遅シ。

◎邊材ハ白色。心材ハ微紅ヲ帶ブ。質稍ク軟ニシテ彈力ヲ有シ黒松ヨリ堅密ナリ。脂氣ニ富ミ保存期長シ。故ニ棟梁。數層。鴨居。床柱等ノ建築用材。土木工事ノ枕材トシテ用ヒ。其他机。椅子。佛壇。木馬。風呂桶。車輛材。燐寸箱。軸木材等トナシ 薪炭材トナス。枝ハ殊ニ瓦又ハ陶器ヲ燒クニ必用ナルコト。人ノヨク知ルトコロ也。

又此樹ハ他樹ノ生長シ能ハザル瘠地ヲ改良スル第一着ノ造林ニ適ス。又土砂杆止、風致林、防風林等ノ爲メニ植栽セラル。松脂ヲ工業用、藥用ニ供ス。其木炭ノ鍛冶炭トナシ。又材ヲ燃燒シテ煤煙ヲ採取シ、材ヲ薄ク剥ギテ繩ヲ製シ、錨及ビ釣瓶ノ綱トシ、葉ヨリ纖維ヲ製シ、綴通ヲ作り之ヲ紫織ト云フ。又庭中ニ栽エテ觀賞ス。

(1017) *Pinus Thunbergii* Parl.

をまつ、クロマツ、シロマツ、黒松。

麓、大宮、篠坂。

此種ハ前者ト異ニシテ四國、九州及ビ本土ノ南部ヲ限リ生ズ。好ミテ暖地ノ海岸近キトコロニ生育シ、ヨク潮風潮水ニ堪フ。幹モ亦赤松ヨリ大トナリ樹皮モ黒褐色ヲ呈シ葉ハ彼ヨリモ剛クシテ觸ルレバ鋭ク手ヲ刺ス。新芽ハ白色ヲ呈シ、毬果モ亦彼ヨリ大也。

◎邊材ハ白色、心材ハ稍黄色ヲ帶ブ。質軟ニシテ彈力强ク脂氣頗多ク、水濕ニ堪ユ。材ヲ橋梁、土杭、電柱、鐵道枕木等ニ用ヒ、薪材トシ、盆、茶托ノ如キ器物ヲ鑿作シ樹脂多キ部分ヲ炬ニ供ス。根ニ茯苓ヲ生ズ又樹下ニ麥蕈ヲ生ズ。海風、潮風ニ堪ユルヲ以テ防風林トナシ或ハ庭園又ハ行道ニ植ク。松脂ハ赤松ヨリ多量ニシテ藥用及ビ工業用トス。又材ヲ製紙(松皮紙)製繩等ニ用フ。

(1018) *Thujopsis dolabrata* S. et Z.

あすなろ、ヒバ、アスヒ、羅漢柏。

麓、二俣、富士根村、宮原、萬濃、御殿場。

吾邦内ニ普ク散布スル常綠喬木ニシテ陸奥ノ天然林ヲ最良トス。幹直立シテ圓錐形ヲナシ外觀極メテ美ナリ。樹狀ハのきニ似タレド成長ハ遅シ。樹皮帶褐赤黑色ニシテ始メハ滑平ナルモ後ニハ縱裂シテ通直ニ數丈ノ長サニ剥ギ得ル也。枝モ亦同色ニシテ下垂シ、黄褐色、葉鱗殘存

シテ附着ス。葉ハ扁柏ヨリ鱗片大ニシテ長ニ三分五ニ重リテ軍鷄足ノ皮ノ如ク、表面深綠色ニシテ裏面ハ白色ヲ帶ブ。毬果ハのきのヨリ稍大ク、四毬相對シ、鱗片ハ四又ハ五個ノ種子ヲ生ジ、種子ハ黄茶色ニシテ細小ナル翼ヲ具フ。

◎邊材ハ稍白ク心材ハ帶褐黄色ニシテのきのヨリハ緻密ニシテ較ク堅ク、飽削スレバ光澤ヲ生ズ。脂氣ノ芳烈ナルヨリくさまきの稱アリ。材ハ洋風建築、床柱、湯屋流シ佛壇佛具、車輛材、釣瓶、壺等トナシ近時之ヲ鐵道枕木ニ使用シ其保存期ノ永キヲ賞ス。又輪島能代等ニテハ之ヲ漆器材トス。又經木ニ用ヒ其他のきの代用トス。樹皮ヲ火繩トナシ或ハ横肌ノ代用トス。又樹エテ觀賞ス。

(1019) *Thuja orientalis* L.

このてがしは、側柏。

麓、宮原(人家)

支那ノ原産。ひばニ似タレド枝葉直上シテ恰モ掌ヲ合セタルガ如シ。のきの如キ面背ノ區別ヲ見ズ。冬月花アリ。雌雄同株。心皮ハ六乃至八個アリテ各二個ノ種子ヲ生ジ、其上方ノ二對ノミ結實ス。而シテ毬果ノ鱗片ノ先端ハ尖リテ卷曲セリ。

◎生垣トシ又庭園ニ栽ウ。種子ヲ柏子仁ト稱シテ藥用トス

(1020) *Tsuga sieboldi* Carr.

つが、トガ、栂。

灌、喬、大宮口ニ三四合、八幡堂ノ上、大宮新道一合ノ上、吉田口馬返ノ上ヨリ生ズ。同ニ三四合ノ間。

枝葉もひヨリモ軟弱ニシテ下垂スルコト、新葉ノ先端鈍圓ニシテ僅ニ二裂シテ稍ク矢筈狀ヲナスコト、果實ハ六七分ニシテ三四分ノ柄ヲ有シ且ツ懸垂シ、果鱗ノ宿存スルコト、葉一層小形ナルコト、一年生枝ノ無毛ナル

コト等ニヨリテ兩者ヲ區別スルコトヲ得。

●材ハ白色。輕軟ニシテ水濕ニ堪ユ。天井板。床柱。長押。戸障子。佛壇等ヲツクリ。茶盆。鑄型トナシ車輛材。經木材トナシ。ヴァイオリンノ甲板トナシ。枝條ヲ鍛冶炭トナス。其皮ヲ以テ漁網ヲ染メ近頃マタ材部ヲ製紙ノ原料トス。

(1021) *Tsuga diversifolia* Max.

こめつが。ベニツガ。クロツガ。

ヒメツガ。(米栂)

喬。

頗つがニ類スレド此モノハつがヨリハ深山ニ在リ。果實モ小ニシテ柄甚マ短ク。マタ新芽ノ軸ニ微カナル黒褐色ノ絨毛アルト葉ノヤ、小ナルトニヨリテつがヨリ區別スル事ヲ得。

●材質柔軟。茶盆。農具。御輿及ビ建築用トス。殊ニ庭園樹トシテハつがヨリモ寧ロ賞用セラル。

Taxaceae. 一位科

(1022) *Taxus cuspidata* S. et Z.

いちの。アララギ。スワウギ。オンコ(北海道)水松。紫杉。

麓。喬。須走。山中。

深山ニ生ズル常緑喬木。葉ハ細長クシテ尖リ。上面濃綠色。下面淡綠色。雌雄異株ニシテ一見榧木ニ似タリ。雌花ハ一個ノ胚珠ヲ有シ其下ニ杯狀ノ假種皮ヲ有ス。種子ハ堅果様ヲナシ。赤色肉質ノ假種皮ニヨリテ包マル。其大サ南天子大。

●材ハ淡紅色ヲ帯ビ質堅軟中ヲ得。彈力ナ有シ。開裂反張ノ患ナク且ツ濕氣ニ堪ユルヲ以テ建築ヲ始メ。木版。函類。机。杖。釣瓶。楊弓ノ矢等ニツクリ。飛驒位山ニテハ笏ヲ作り。木曾ニテハ阿六櫛ノ棟ヲ作り。加賀ニテハ牙枝ヲ作りテ各具名産タリ。又碁盤。菓子盆。菓子皿。短冊掛。巻煙草入等ヲ作レベシ。其老樹ノ心材ノ腐朽セルモノハ火鉢ノ胴トシテ頗ル雅適ス。

●觀賞ノ爲メ栽培シ又甘味アル赤褐ノ假種皮ヲ生食スベシ

(1023) *Torreya nucifera* S. et Z.

かや。ホンガヤ。カヘ(古名)榧。

麓。大宮。北山。入山瀬。仁杉。

樹皮灰白ニシテ老レバ綿ノ如キモノヲ生ズ。實葉共ニ固有ノ臭氣アリ。葉ハ線形。もみニ似タレド其尖矢筈狀ヲナスコトナクシテタマ一尖ナリ。花ハ單性。雌雄異株。雄花ハ通常四個ノ葯胞ヲ有シ。雌花ハ二個ノ胚珠ヲ有ス秋ニ至リ核果様ノ種子ヲ熟ス。

●邊材ハ帶褐白色。心材ハ黃色。質緻密ニシテ水濕ニ堪ユ之ヲ建築用トシ。碁盤其他算盤珠。洋傘ノ柄等ノ料トナシ。又床柱。橋梁。桶類。船舶材。彫刻材。櫛材トス種子ヲ食用ニ供シ或ハコレヨリ油ヲ搾リテ食用並ニ燈用トス。又栽エテ觀賞ニ供ス。而シテ材ハ蚊遣リニ用フルヨリかやノ稱ヲ得タルナリ。

(1024) *Cephalotaxus crupacea* S. et Z.

いぬがや。へボガヤ。アブラガヤ。

へーべ(イセ)。へボ(東京)。粗榧。

麓。大宮。阿幸地。北山。茶黄澤。

樹皮暗褐色ニシテ淺ク縦裂ス。雌雄異株。葉ハかやヨリ微大。ヤ、柔ク。色モヤ、淺ク葉面かやノ如キ光澤ナシ花ハ小ニシテ帶黄白色。三四月頃開ク。果實ハ核果様ヲ

呈シ。秋末熟シテ赤色。かやヨリ稍丸ク。長サ七八分アリ

◎材ハ床縁。碁盤及ビ諸種ノ鎌作用ニ供シ又牛ノ鼻線トナス。種子ヨリハ油ヲ搾リ。燈用又ハ髪油等ニ使用シ。樹ヲ栽エテ觀賞ス。

(1025) *Podocarpus macrophylla* Don.

まき。ホンマキ。イヌマキ。クサマキ。

羅漢松。

麓。大宮。

常緑喬木。樹皮灰白色ニシテ淺ク縦裂ス。葉ハ枝ノ周圍ニ互生シ。長サ三寸幅二分許。線形ニシテ一個ノ中肋ヲ有シ。革質ニシテ表面ハ綠色。裏面ハ青白ナリ。花ハ單性。雄花ハ集リテ穗狀ヲ呈ス。果實ハ二部ヨリ成リ。上部ハ種子ニシテヤ、圓ク。綠色ヲ呈シ。下部ハ肉質ノ花被ニシテ熟スレバ紅色ヲ呈シ。其狀恰モ羅漢ノ袈裟ヲ着ケタルガ如クナルヨリ羅漢松ノ稱アリ。

◎材ハ白色ニ淡黄ヲ帶ビ。質堅軟中ヲ得。肌理緻密ニシテ稍クかやニ類スルモ其重量輕ク。脂氣多クシテ水濕ニ耐エ且ツ飽ヲ旋シ易シ。家屋建築ノ用材トナシテ其勁剛力ノ點ヨリ稍ク杉ニ劣ルモ土中水中ニアリテハ保存期ノ永キヨリ昔ヨリ棺。水桶等ヲツクリ。又天井板。碁盤。床間ノ落シ掛。箱材。秤。栓等トナス。皮ハ繩トシテ水ノ洩リヲ防グニ用フ。コレチまき肌繩ト云フ。又樹ヲ庭園樹及ビ生垣ニ用フ。殊ニ海邊ノ生垣ニ適ス。

Selaginellaceae. 卷柏科

(1026) *Selaginella Kraussiana* A. Br.

くらまごけ。アタゴゴケ。エイザンゴケ。ヤウラクゴケ。地柏。

麓。村山。大宮。中畑。八幡堂ノ下。

陰地ニ生ズル多年草。莖ハ纖弱ニシテ地上ニ匍匐シ。處々ニ細根ヲ生ズ。葉ハ微小ニシテ鱗片ヲ呈シ。其上面ノ下部ニ小舌ヲ有ス。子囊ハヤ、方形ヲナセル特別ノ枝ニ集生シ。大小二種ノ孢子ヲ有ス。

◎觀賞用トシテ庭園ニ栽培ス。

(1027) *Selaginella involvens* Spring.

いはひば。イハマツ。卷柏。

麓。北山。細紺野。高田。中畑。

絶壁ノ地ニ生ズル多年生植物。莖ハ高通常數寸ナレドモ年ヲ經タルモノハ一ニ尺ニ及ブモノアリ。莖ノ基部ヨリ枝ヲ岐ツ。葉ハ小鱗狀ニシテ稍ひのきノ葉ニ類ス。而シテ葉形ニ二種アリ。一ハ比較的大ニシテ擴張シ一ハ小ニシテ莖枝ニ密接ス。前者ハ卵形厚質ニシテ密生シ。細鋸齒ヲ具ヘ。後者ハ不整齊ニシテ卵狀披針形ヲナス。苞片ハ三角形ニシテ細長ナル銳尖頂ヲ具フ。此草濕氣ヲ得レバ開展スレドモ乾ケバ卷緒シテ枝ヲ上内方ニ卷クノ性アリ。扁柏ノ枝葉ニ似テ薄ク且ツ互生ス。

◎庭中ニ植エテ觀賞ス。

Lycopodiaceae. 石松科

(1028) *Lycopodium clavatum* L.

ひかげのかづら。キツネノタスキ。

サガリゴケ。石松。

麓。大宮口。

常緑蔓狀ノ多年植物ニシテ莖ハ長ク地ニ匍匐シ。長數尺ニ達ス。葉ハ長キ小鱗狀ヲナシテ尖リ。莖ニ密生スルノ

状宛然杉ノ如シ。處々ニ分枝シテ繁茂ス。夏月其莖ヨリ細柄ヲ出スコト數寸ニシテ頂上ニ一寸餘ノ穗ヲ直立シ。其處ニ多クノ孢子ヲ存ス。而メ孢子ニ大小ノ別ナク。子囊ハ尖銳ナル鱗片ニテ抱擁セララル。

◎新年又ハ祭神ノ飾トナス。孢子ハ石松子ト稱セラレテ烟火用或ハ丸薬ノ衣トナシ又人体ノ糜爛スル局部ニ撒布ス

(1029) *Lycopodium cryptomerinum* Max.

すぎらん. イハスギ.

麓. 喬. 須走口(1070m.) 村山.

深山ノ樹上. 岩石上ニ生ズル多年生植物ニシテ一見ひかげのかづらニ似タリ。其葉細クナリテ莖ニ密生スル狀甚ダ杉ノ枝ニ似タリ。◎栽エテ觀賞ニ供ス。

(1030) *Lycopodium Selago* L. var. *Miyoshianum* Mak.

ひめすぎらん.

喬. 大宮新道二合.

すぎらんヨリ纖細ナリ。地下ニ多クノ分岐根ヲ出ス。莖ハ高サ三四寸ニシテ圓筒狀ヲナシ數回分叉シ淡綠色ヲ呈シ。下部ハ稍ク地ニ臥ス。葉ハ狹線形ニシテ長サ一二分アリテ上部少シク彎曲シ。其先ハ銳尖ナリ。莖ノ周圍ニ散生ス。孢子囊ハ枝梢上部ノ葉腋ニ單性シ。半月狀唇形ヲ爲シ兩端ハ鈍圓ナリ。孢子ハ小. 白黃色. 多數ニシテ扁壓セララル。◎植エテ觀賞ニ供ス。

(1031) *Lycopodium serratum* Thunb. var. *javanica* Mak.

たうげしば.

麓. 喬. 上井出. 須走口馬返.

莖高數寸時トシテハ一許ノ長サニ達スル林中ノ常綠草葉ハ細鋸齒アル小披針形ニシテ莖ニ密生ス。莖ハ屢ク其上方ニ於キテ數個ニ分枝ス。此種ハ孢子ノ外. 芽ノ脱落

ニヨリテモ蕃殖ヲ遂グ。◎往々觀賞ニ供ス。

(1032) *Lycopodium Sieboldi* Miq.

いはひも. ヒモラン.

喬. 草. 吉田口六七合.

深山ノ朽木等ニ蔓狀ヲナシテ下垂スル常綠草。莖ハ細長クシテ叉狀ニ分岐シ。長一尺餘ニ達ス。葉ハ短縮シテ鱗片狀ヲ呈シ。密ニ莖ヲ被ヒテ編紐ノ如シ。枝梢鱗葉ノ間ニ孢子ヲ藏ス。◎觀賞用。

Equisetaceae. 木賊科

(1033) *Equisetum arvense* L.

すぎな. ックシ. 問荆. 筆頭菜.

麓. 大宮.

地下ニ長キ根莖アリテソレヨリ實莖ト裸莖トナ地下ニ出ダス。甲ハ早春ニ出テ乙ハ夏月ニ盛ニ繁茂ス。甲ハ即つくしニシテ乙ハすぎなト呼ブ。◎つくしヲ食用ニ供ス。

(1034) *Equisetum hiemale* L. var. *japonicum* Milde.

とくさ. 木賊.

◎莖ハ頗佳酸ニ富ムガ故ニ唐木細工. 鼈甲細工ヲ始メ. スベテノ木材骨角等ヲ研磨スルニ使用セララル。栽エテ觀賞ニ供ス。

Ophioglossaceae. 瓶爾小草科

(1035) *Botrychium Lunaria* Sw.

へびのした. ヒメハナワラビ.

草. 大宮口四合目. 吉田口七合乃至七合半

多年生ノ高山植物ニシテ高三四寸ヨリ七八寸ニ至ル。一個ノ實莖ト裸落トナ有ス。裸葉ハ下部ヨリ生ジ一回羽狀複葉ヲナシ。各小葉扇狀ニ開張シテ左右ニ並列ス。實葉ハ上部ニ在リテ二回羽狀ヲナシ小葉ハ小形ニシテ球狀ノ子囊ヲ有ス。根ハ圓塊狀肉質ニシテ三四本ニ分レ長二三寸アリ稍黄色ヲ帯ブ。此種ハ山上向陽ノ斜面ニ生ズ。富士山大宮口ニテハ四合目ヲ少シク西ニ入レバちどりさうみやまはん。しょうづる等ト相混生シ。吉田口ニテハいはひげ。いはつめくさ。つがざくら。紅花一藥草等ト混生ス。此類子囊ハ無柄ニシテ。小穗面ニ二列シ。此小穗相集リテ重複セル圓錐狀ヲ呈ス。

◎盆養シテ愛観ニ供スベシト雖。排水ト日光トヲ忘ルベカラズ。

(1036) *Botrychium ternatum* Sw.

ふゆのはなわらび. シモワラビ

ヒカゲワラビ. 陰地蕨.

麓. 大宮口.

陰地ニ生ズル草本ニシテ秋月舊根ヨリ出ヅ。茎ハ數回羽狀ニ分裂シ。蕨ノ葉ノ如クニテ至リテ小ク。ヤ、厚ク深緑ナリ。通常 根一葉。肥エタルモノハ二葉ヲ生ズルコトアリ。且ツ別ニ一莖時トシテハ二莖ヲ抽クコト七八寸乃至一尺許ニシテ其梢ニ小枝ヲ分排シテ栗粒ノ如キモノヲ多ク綴ル。コレ即チ子囊群ニシテ初メ綠色ナルモ秋深クシテ黄色ニ變ジ以テ胞子ヲ散布ス。

◎山民採リテ油揚ト一處ニ煮又ハ吸物ノ中ニ入レ浮ベテ食フ。三河國北設樂邊ニテハ主トシテ粥ニ作リテ冷腹ノ藥トナス。好事家此植物ヲ盆愛ス。

(1037) *Botrychium strictum* Underw.

なつのはなわらび. 蕨纂.

麓.

春月舊根ヨリ苗ヲ生ジ。一根一莖高一尺餘ニ及ビ其梢ニ葉片アリ。其形重羽狀複葉ニシテ三角狀ヲ呈シ。小葉ハ披針形ニシテ羽狀ニ分裂ス。子囊ヲ生ズル葉ハ二部ヨリ成リ。下部ハ尋常葉ノ形態ヲ有シ。上部ハ總葉柄ノ頂ニ生ジテ球形ノ子囊ヨリ成レル小葉ヲ羽狀ニ着ケ。細長クナレリ。本種ハ前種ヨリ葉質薄クシテ形モ亦大ナリ。

Osmundaceae. 蕨 科

(1038) *Osmunda cinnamomea* L.

やまどりせんまい.

麓. 喬. 須走口馬返ノ上. 栗倉 札打.

多年生ノ羊齒ニシテ葉ニ二様アリ。尋常葉ハ稍々革質ニシテ直上スルコト二三尺ニ達シ一回羽狀複葉ヲナシ小葉ハ披針形ニシテ羽狀ニ深裂ス。葉柄ハ葉面ト殆ド等長ニシテ毛ナシ。而メ實葉ハ尋常葉ト分立シテ群衆相密生セル穗狀ヲ成シ。前者ヨリ小ク褐色ヲ呈ス。

(1039) *Osmunda regalis* L. var. *japonica* Milde.

せんまい. 蕨.

麓. 村山. 栗倉.

好ミテ山足水傍等ノ陰地ニ生ズ。裸葉ハ綠色ニシテ二回羽狀ノ複葉ヲナシ。微鋸齒アル長卵形ノ小葉ヨリ成リ。實葉ハ褐色ニシテ細長キ小葉ヨリ成リ。多數ノ子囊ヲ着ケ。其春時始メテ生ズルヤ形拳曲シテ綿毛之ヲ包ム。

◎嫩芽ト根莖ヨリ得タル澱粉トヲ食用ニ供シ。線狀ノ毛ヲ織物ノ料トス。又往々栽エテ觀賞ス。

Schizaeaceae. 海金砂科

(1040) *Lygodium japonicum* Sw.

つるしのぶ. カニクサ. スナクサ.

サミセンツル. 海金砂.

麓. 大岩. 上井出.

莖ハ細蔓チナシテ他物ニ纏繞ス。莖ノ中心ニハ堅韌ナル維管束アリ黄色ニシテ光アリ。恰モ三弦ノ線ノ如シ。葉ハ短キ枝頭ニ對生シ。再羽狀ニ分裂シ。基部ノ羽片ハ柄チ有シ。小裂片ハ齒牙チ有スル鈍鋸齒チナス。夏秋ノ際蔓ノ末ニ生ズル葉ハ甚ダ細ニシテ海洲骨碎補ノ葉ノ如クニテ大ニ脚葉ト同ジカラズ。コレ即チ子囊チ帶アル處ニシテ其葉背毎ニ縁ニ沿ヒテ高ク皺ミ卷キカヘシタル狀チ成シ。其中ニ多クノ子囊チ藏スル也。子囊ハ其一端ニ稍ク帽狀チ成セル彈性環チ具フ。

◎漢方ニテハ瘡毒・疥癬等ノ藥トナス。歐米人ハ好ミテ此植物チ盆愛ス。

Hymenophyllaceae. 苔葱科

(1041) *Hymenophyllum Wrightii* Bosch.

こけしのぶ.

喬. 八幡堂ノ上

通常大樹ノ外皮等ニ蘚苔類ト共ニ着生ス。根莖ハ纖維狀チナシテ長ク横走シテ其上ニ葉チ叢生ス。葉柄ハ細鬚狀ニシテ葉面ヨリ短ク。上部ニ狭翼アリ。葉面ハ長楕圓形或ハ卵狀長楕圓形ニシテ鈍頭ナリ。葉質薄クシテ兩面裸出シ。長サ一寸乃至一寸五分位。通常一回羽狀チナセド

モ時トシテハ略三羽狀ニ類スルコトアリ。子囊群ハ裂片ノ上縁最下ノ一裂片ノ頂ニ唯一個チ有スト雖亦一羽片上ニ二三個ツ、着ケルコトアリテ卵圓形ノ被包チ具フ。而メ葉ノ最末裂片ハ全邊ナリ。

(1042) *Hymenophyllum oligosorum* Mak.

きよすみこけしのぶ.

喬. 八幡堂ノ上.

根莖ハ鬚狀チナシテ横走シ。葉柄ハ線狀チナシテ根莖上ニ疎生シ。葉面ヨリ短ク。上半部ニ狭翼アリ。柄長二三分乃至六七分。葉面廣楕圓形乃至廣楕圓狀長楕圓ニシテ圓頂チ呈シ。子囊チ有スルモノハ突然斷止セリ。底部ハ通常略ク截狀心臟形チ呈シ。質薄クシテ硬シ。葉面ノ長五六分乃至一寸二分幅三四分乃至七分位。羽片ハ兩側各三乃至九アリテ相接近シ。開出シテ柄ナク。鈍頭卵形ニシテ底部ハ斜メニ廣楔形チ呈ス。其裂片ハ隣ト互ニ接近シテ鈍頭長楕圓形チ呈シ。殆ド全邊。而メ一脈アリ。葉ノ中軸ハ狭翼アリテ曲折シ。支脈開出シテ細脈ハ生時綠色ナリ。子囊群ハ少數ニシテ葉頂ニ生ジ。一葉只ク僅ニ二乃至拾個チ算ズルノミ。各個相接近シ圓形ナリ。總苞ニ片アリテ圓形チナシ。前縁略平截シテ齒痕アリ。

(1043) *Trichomanes parvulum* Peir.

うちはごけ. マルバホラゴケ.

喬. 大宮口.

頗小形ノ種ニシテ樹皮或ハ岩面ニ着生シ互ニ相密邇シテ座チ成ス。根莖ハ線狀チナシテ横行シ黒褐色チ呈ス。葉柄或ハ長ク或ハ短ク。葉面ハ扇形・腎形或ハ圓形ニシテ大ナルモノハ幅五至十許アリ。葉質薄シト雖硬ク。暗綠色ニシテ裸出シ。數片ニ深裂シ。裂片又更ニ長短ノ鈍頭小裂片トナル。一囊群ハ一葉面上ニ一乃至數個アリテ其頂

邊ニ位シ。側傍ノ裂片ヨリ低シ。總苞ハ筒狀ヲナシテ其口縁開張シ。床注ハ往々總苞ノ上ニ超出シ。下部ニ無柄ノ孢子囊ヲ着ク。

Polypodiaceae. 水龍骨科

(1044) *Adiantum pedatum* L.

くじやくした。クジヤクサウ。ヌリバシ。

喬。麓。村山。中畑。仁杉。須走。山中。鈴ヶ原。大宮新道一合。須走口(1550m—1800m.)

葉ハ全形扇狀ヲナシテ羽狀ニ小葉ヲ排列シ。宛然孔雀ノ尾ヲ擴ゲタルガ如シ。子囊群ハ小葉毎ニ一乃至數個ヲ着ケ。包被ノ葉頂ヨリ裏面ニ反折スルコトハこれしたノ如シ。◎栽エテ觀賞ニ供スレバ頗雅致アリ。

(1045) *Adiantum monochlamys* Eat.

はこねした。ハコネサウ。ヌリバシ。

ハコネグサ。オランダサウ。石長生。

麓。粟倉。白絲。榮黄澤。

山地殊ニ急崖ニ普キ羊齒ニシテ。春時ノ新葉ハ紅色ヲ帯ビテ頗雅致アリ。根莖ハ黒褐色ノ毛茸ヲ密生シ。斜ニ横臥シテ長カラズ。一科ニ數葉ヲ叢生シ。高一二尺アリ。全形卵狀披針形ヲナス。葉柄ハ帶紫黑色ニシテ漆ノ如ク光澤アリ。細長クシテ質硬シ。葉面ハ葉柄ヨリ長ク。羽狀ニ分岐セル支柄上ニ多クノ小葉ヲ排列ス。小葉ハヤ、歪ミタル倒心腎形ニシテ大サ三四分。稍いてふノ葉ニ似タル故ニ其名アリ。秋ニ至レバ葉背端ニ通常一個ノ子囊群ヲ着ケ。包被ハ葉頂ノ凹ミタル處ヨリ裏面ニ反折シテ生ジ。黒褐色ヲ呈ス。此草ハ元綠年間紅毛人箱根山ニトル。ソレヨリ和蘭草マタ箱根草ノ名アリ。

◎栽エテ觀賞ニ供ス。落葉セルモノハ枝ヲ連ネテ幕トナスヨリテたまはくキノ異名アリ。和蘭人ハ産前産後ニ特效アリト云ヘリ。

(1046) *Aspidium aculeatum* Doell. var. *japonicum* F. et S.

ゐので。毛蕨。

喬。麓。村山。白絲。狩休ノ上。大宮新道一合。

山野ノ陰地ニ生ズル大形ノ常綠草本ニシテ地下ノ根莖ヨリ葉ヲ叢生シ高一尺四五寸ヨリ二三尺ニ達ス。葉柄及ビ葉軸ニハ著シク褐色ノ鱗片ヲ有ス。葉面ノ全形略三角形ヲ呈スル二回羽狀複葉ニシテ各羽片ハ常ニ相互生シ。稍不正三角形ノ小葉ヲ密生シテ披針形ヲ呈シ。各小葉ハ縁邊微ニ鋸齒ヲ存シ且ツ葉面ニ極メテ微細ナル毛茸ヲ有スルヲ以テ多少粗糙ナリ。子囊群ハ各小葉殊ニ其上部ノ小葉ニ生ジ。暗褐色ニシテ小圓形ヲ呈ス。

◎庭中ニ栽エテ觀賞ス。

(1047) *Aspidium Forbesii* Hance.

ほそばいたちした。

麓。大宮口。

地下ニ根莖ヲ有シ。ソレヨリ葉ヲ叢生ス。葉ハいたちしたニ似テ遙ニ小ク。細長キ柄ヲ具フ。葉面ハ三回羽狀複葉ニシテ全長一二尺。葉柄ノ下部ニ黒褐色ノ鱗毛ヲ有シ。葉面ニ毛茸ヲ具ヘ。下面ニ褐色ノ子囊群ヲ有シ。圓形ノ包膜ヲ被リ。小葉ノ上下縁ニ排列ス。

(1048) *Aspidium japonicum* Mak.

はりがねわらび。

麓。三倉。

高サ數寸ノモノモアレドモ大ナルハ二尺ニ近キ者アリ。全形略三角形ヲナス。葉柄ハ細ク長クシテ通常赤褐又ハ

帯黒褐色ヲ呈シ微毛アリ。二回羽狀ニ分裂シ。小羽片ハ長楕圓形ヲナシテ正シク上下ニ排列シ。其縁邊略平滑ナリ。羽片ノ軸ハ綠白色ニシテ光澤ヲ有シ頗顯著ナルヲ以テ針金れらびノ稱アリ。子囊群ハ小羽片ノ基脚兩側ニ整裂シ。兩端相接スル鈎月形ノ被膜ヲ有シ。淡綠褐色ニシテ甚ダ著然タリ。

(1049) *Aspidium laxum* F. et S.

やはらした。

麓。バツカケ。

葉ハ長キ圓錐形乃至長キ三角形ヲ呈シ其上部頗尖長シ。二回羽狀ニ分裂シ一見はしごしたニ似タリ。サレド此モノ、葉ハ頗柔軟ナリ。子囊体ハ小クシテ葉ノ全裏面ニ存在ス。

(1050) *Aspidium Miquelianum* Max.

ならひした。

喬。大宮口。

地下ノ根莖ヨリ二三尺ノ葉ヲ出ダス。其柄ハ褐色ヲ帯ビテ毛少ク。葉片略三角形ヲ呈シ。三回羽狀複葉ニシテ質ヤ、薄ク。淡綠色ヲ呈ス。子囊群ハ茶褐色ニシテ葉裏ニ散在ス。此種ハ兩面したニ似タレド葉片横廣クシテ質薄ク。小羽狀更ニ纖細ナルノミナラズ。子囊群モ亦彼ノ如ク著大ナラズ。ぬりわらびニモ似タレド小羽片彼ヨリヨリハ小ナリ。

(1051) *Aspidium muticum* F. et S.

しのぶかぐま。ミヤマカナワラビ。

喬。八幡堂。

葉ハ根莖ヨリ通常叢生シ高二尺内外ニ達ス。葉柄ノ下部ニ帯黒褐色ノ稍大ナル鱗片ヲ密生シ。上部ニ至ルニ從ヒ

次第ニ絲狀ヲナセル黒褐色ノ毛茸ヲ生ズ。全葉面ハ略長三角形ヲ呈シ。三回或ハ二回羽狀複葉ヲナシ。最終ノ裂片ハ稍倒卵形ヲ呈シ。其縁邊ニ波狀ノ鈍鋸齒ヲ存ス。子囊群ハ圓形ノ被膜ヲ有シ。主トシテ上部ニ於ケル小羽片ノ縁邊ニ近ク其裏面ニ群在ス。

(1052) *Aspidium setigerum* Kuhn.

ひめわらび。

麓。大宮。粟倉。宮原。白絲。仁杉。

山地ノ陰地ニ普通ニシテ葉長三尺ニ達スルモノアリ。葉ハ三回羽狀ニ分裂シ小葉ハわらびノ小葉ヨリ細纖ニシテ且ツ柔軟ニ。色ハ淡綠ナリ。子囊群ハ甚ダ小ク。被膜頗薄クシテ黄褐色ヲ呈ス。

(1053) *Aspidium varium* Sw.

いたちした。

麓。大宮。北山。

隨處ノ陰地ニアリ。葉片ハ長三角形ヲ成シ。深綠色ニシテ光澤アリ。全長一尺ヨリ一尺五寸ニ至リ。二回羽狀複葉ニシテ葉質硬シ。葉柄及ビ中軸ニハ黒褐色ノ毛ヲ密生シ。葉柄ノ基部殊ニ著シ。子囊群ハ黒褐色ヲ呈シ。其被膜ハ割合ニ著シクシテ圓形ヲ呈ス。

(1054) *Asplenium incisum* Thunb.

とらのをしだ。

麓。大宮。大岩。北山。須走。

平滑ノ羊齒ニシテ全体ヤ、細長ク。一科ニ叢生スルノ特徴アリ。小ナルモノハ三四寸ヲ出テズト雖。大ナルモノハ一尺五六寸ニ至ルモノナキニアラズ。葉柄及ビ中軸ハ稍黒褐色ヲ帯ビ。葉質柔ニシテ鮮綠色ヲ呈シ。二回羽狀ニ分裂シ。小羽片ハ其形倒卵狀ヲ呈シ。先端ニ鋸齒狀缺刻ヲ有ス。子囊群ハ赤褐色ヲ呈ス。

◎栽エテ観賞ニ供スルモノアリ。又はこれしたノ如クニ産前産後ノ葉ニ供シテ著驗アリト云フ。

(1055) *Asplenium varians* Hook.

いはとらのを。

麓、大岩 白絲

山地ノ岩石等ニ附着ル小羊齒ニシテとらのをしたニモ似タレト遙ニ小形ニシテ四五寸ニ過ギズ。且小羽片モ狭小ニシテ頗こばのひのきしたニ類ス。サレド岩とらのをノ方ハ更ニ小形ニシテ羽片更ニ平開シ。裂片ノ幅稍短潤ニシテ其質薄シ。

(1056) *Athyrium Filix-foenina* Roth, var. *melanolepis* Mak

めした。オホイヌワラビ。

喬

地下莖ヨリ高二三尺ニ達セルニ回羽狀複葉ヲ叢生ス。葉ハ全体軟質ニシテ長キ葉柄ヲ有シ。葉柄ノ下端ニ黒褐色ノ鱗片アリ。羽片ハ細長クシテ四寸許ニ達シ更ニ小羽片ニ分レ。小羽片ハ其縁邊更ニ缺刻分裂シ。細鋸齒アリ。子囊群ハ裏面ニ散在ス。此種ハ顯著ナル一變種ニシテ葉形ハ歐洲産ノモノヨリ更ニ潤大ニシテ從ヒテ其羽片小羽片モ亦之ヨリ大ナリ。最終裂片ノ齒ハ鋭ナリ。

(1057) *Athyrium Filix-foemina* Roth, var. *nigropalaceum* Mak.

みやまめした。

喬 河口湖畔ノ山中。

深山ニ生ズル大形ノ羊齒ニシテ莖ハ直立シ。纖細ニシテ葉面ヨリ短ク。微細ノ鱗毛アリ基部ニ至ルニ從ヒテ密ナリ。鱗毛ハ暗褐黑色ニシテ光澤ヲ有シ。披針形ニシテ乾ケバ卷縮ス。葉面ハ長橢圓狀披針形。漸尖頭。長一尺二三寸乃至二尺。幅三寸乃至六寸。草質ナリ。羽片ハ開出

シ。狭披針形。小羽片ハ開出。無柄。幅七厘乃至二分缺刻裂片アリ。裂片ハ卵形又ハ橢圓形ニシテ通常小數ノ鋸齒アリ。子囊群ハ一裂片毎ニ一個乃至四個アリ。被膜ノ縁邊ハ絲狀ニ細裂ス。

◎信州ノ山民ハ此嫩芽ヲ蔬トナス。

(1058) *Athyrium lippincium*.

いぬわらび。

麓、喬 大宮、阿幸地、萬農、須走口(1000m.-1380m.等)

山野ニ普通。葉ハ草質ニシテ軟ク。長一尺四五寸ヨリ二尺許ニ達ス。疎ニニ回羽狀ニ分裂シ。先端ハ細ク尖リ。各羽片ノ小葉ハ鋸齒ヲ有ス。葉裏ノ側脈ニ沿ヒテ子囊群ヲ着ケ熟スレバ褐色ヲ呈ス。

(1059) *Athyrium regiscens* Mak.

たにいぬわらび。

喬 大宮新道一合半。

葉ハ卵狀披針形。質ヤ、硬ク。葉軸紫色ヲ帯ビ。其堆囊ノ狀頗こいぬわらびニ類スレド其羽片ハ更ニ之ヨリ鋭ナリ。

(1060) *Athyrium thelypteroides* Desv.

みやましけした。ハクマウキノデ。

麓、白絲、バツカケ、細紺野。

根莖ヨリ高一二尺ノ貳回羽狀複葉ヲ叢生ス。葉面ハ葉柄ヨリ通常短ク。披針形ヲ呈シ。全体稍軟質ナリ。裂片ハ廣橢圓形。全邊。しけしたニ似タレド葉柄及ビ葉軸ニ著シク淡褐色ノ毛ヲ帯ベリ。又はくもうゐのでト云ヘドモ通常ノゐるのでヨリハ質薄クシテ軟ク且ク彼ノ如クニ著毛ナラズ。タ、類白色ノ毛アルニヨリ其名アルノミ。

(1061) *Athyrium yokoscense* Mak.

へびのねござ. コイヌワラビ.

麓. 札打. バツカケ. 河口湖畔. 長坂ノ上.
大宮新道一合附近.

直立叢生ノ羊齒ニシテ一見いぬわらびノ如クナレド. 形稍小ク. 質割合ニ剛シ. 各羽片ハいぬわらびニ比スレバ稍接近シ. 中軸ニツキ上斜スルコト彼ノ如ク多カラズ. イ藁群モ亦稍疎大ナリ. 葉柄ハ葉面ト甚シク其長サヲ異ニスルコトナク. 小羽片ニハ微ニ鋸齒ヲ有シ. 葉柄ニハ褐色ノ鱗毛ヲ有ス.

(1062) *Blechnum Spicant* Roth. var. *substrata* Lowe.

しがしら. イハシボネ. ムカデグサ.

烏毛蕨草.

葉ハ根莖上ニ叢生シ. 著シク射出シテ直上スルコトナシ. 新葉ハヤ. 紅色ヲ呈ス. 長スレバ長楕圓狀ヲナシテ羽狀ニ深裂シ. 羽裂片ハ數多ク. 二拾内外ヨリ五拾双内外ヲ算シ. 整齊ニ横出シテヤ. 水平ニ排列ス. 但シ基脚ノモノハ其端却リテ下向ス. 又別ニ一尺許ノ實葉ヲ直上スルコトくさそてつニ於ケルガ如シト雖. 其羽片ハ彼ノ如クニ著シク斜上シテ互ニ密着スルコトナシ. 葉片ハ鱗ノ肉ヲ去リタルアトノ如キ觀アルニヨリいはしほれノ稱アリ. ◎往々觀賞用. 民間藥用トスレド毒アリト云フ.

(1063) *Coniogramme japonica* Diels.

いはがねさう. カナビキサウ. 蛇眼草.

常綠種ニシテ長二三尺ニ達スル二回羽狀複葉ニシテ柄身共ニ平滑ナリ. 小葉ハ披針形ニシテ先端尖リ. 長七八寸ニ達ス. 葉面ニモ斜上シニ細脉ヲ著ハス. 裏面ノ殆ド全部ニ淡褐色ノ子囊群ヲ斜メニ排列シ被膜ヲ有セズ. 此種頗いばがねまると似タレド. 彼ハ其葉ノ支脉中肋ヨリ出テ. 互ニ連合セズ. 全ク分離スト雖. 此種ハ其支脉中肋ノ附近ニ於キテ網眼狀ヲナシテ相連絡セリ. 又いは

がねぜんまいノ方ハ其散布廣シ. ◎觀賞ノ爲メ栽培ス.

(1064) *Cryptogramme japonica* Prantl.

たちしのぶ. イヌシノブ. フユシノブ.

麓. 大宮. 阿幸地. 北山

此種ハしのぶニ似タレド葉更ニ細長クシテ彼ノ如クニ懸垂ノ狀ヲナスコトナク. 好ミテ地上ニ直生ス. 且ツ冬月モ枯レ. コトナキニヨリ立しのぶ又ハ冬しのぶノ稱アリ. しのぶノ子囊群ハ多少圓形ナルモ此モノ. 子囊群ハ長線狀ニシテ縦ニ長床上ニ横ハリ被膜ハ葉ノ裂片ノ邊緣ト平行シテ線形ヲナシ且ツ兩々對向シテ子囊群ノ上ヲ壓迫ス.

(1065) *Davallia bullata* Wall.

しのぶ. 海州骨碎補.

麓. 粟倉.

樹上或ハ岩石上ニ匍匐スル長キ根莖ヲ有シ. 處々ニ葉ヲ散生ス. 根莖ニハ著シク褐色ノ毛狀鱗片ヲ密生ス. 葉ハ通常三回羽狀複葉ニシテ夏月其下面ノ縁邊ニ近ク褐色半コップ形ノ被膜ヲ有スル子囊群ヲ生ズ. 子囊ニハ柄アリ. たちしのぶニ類スレド彼ノ如クニ一處ヨリ多ク叢生スルコトナク且ツ冬期葉ヲ失フ.

◎地下莖ヲ球狀ニ丸メテ軒端ニツルヲナドシテ觀賞ニ供ス.

(1066) *Iplazium japonicum* Bedd.

しけしだ.

麓. 村山. 大宮. 萬濃.

陰濕ノ地ニ生ズル多年羊齒. 葉ハ通常一尺乃至一尺六七寸. 深綠色. 柔軟ナリ. 一回羽狀複葉ニシテ羽片モ亦稍羽狀ニ分裂シ. 各裂片ノ縁邊ハ僅ニ微細ノ齒牙ヲ存ス. 子囊群ハ各裂片ノ基部ニ生シ. 殆ドいぬわらびニ似タレド. 彼ヨリハ稍數少ク直線狀ニシテ被膜ヲ被リ. 初メ淡褐色ナルモ熟スレバ濃褐色トナル.

(1067) *Diplazium lancaum* Presl.

へらした. イハミノ.

麓 大宮. 栗倉. 白絲.

樹陰. 溪側等ニ生シ. 四時綠色ヲ呈ス. 根莖ハ細長ク横走シ. 暗黒色ノ鱗片ニテ被ハル. 葉ハ疎ニ地上ニ出テ柄ハ細長クシテ質稍堅ク. 通常葉身ヨリ短ク. 最モ長キモノニテモ五六寸ヲ出テズ. 葉身ハ狹長ナル披針形ニシテ兩端漸ク狹窄シ. 縁邊ニ波狀ノ鈍齒ヲ存シ. ヤ、厚クシテ四五寸乃至七八寸ヲ通常トス. 子囊群ハ葉ノ上部又ハ其全面ニ在リテ斜ニ相ナラビ. 線形ニシテ長サ二三分眞直又ハ僅ニ弓曲セリ. 此種ハ多ク岩石面ニ覆ヒカ、レル状ヨリシテいはみのノ稱アリ.

(1068) *Diplazium squanigerum* Christ.

きよたけした.

麓 喬. 村山. 八幡堂. 大宮新道一合半.

葉ハ往々三尺許ニ達ス. 葉柄ト葉軸トニハ黒褐色ノ鱗毛ヲ生シ. 小羽片ハ幅廣クシテ多少分裂シ. 縁邊ニ微細ノ鋸齒ヲ存ス.

(1069) *Drymoglossum microphyllum* C. Chr.

まめづた. 螺唇草.

麓 傳法. 大宮.

樹幹或ハ岩石上ニ着生スル多年羊齒ニシテ根莖ハ絲狀ナシテ幾々數尺ニ匍匐シ. 莖面ニハ暗褐色ノ鱗毛ヲ生シ且ツ諸處ヨリ根ヲ發ス. 葉ニ裸葉ト實葉ノ別アリテ裸葉ハ卵圓形又ハ圓形ニシテ厚ク. 大サ三四分. 綠色ニシテ光澤アリ. 其數多シ. 實葉ハ更ニ狹長ニシテ其數少ク. 表面ハ平滑ニシテ綠色ナルモ背面ニ子囊ヲ群生シテ赤褐色ヲ呈ス.

◎屢盆石ニ栽エ又ハ庭園ノ老樹等ニ這ハシメテ之ヲ觀賞ス

(1070) *Microlepia pilosella* Moore.

いぬした.

麓 大宮.

山野ノ陰地ニ生ズル小形ノ羊齒ニシテ葉ノ全体細長ク. 長サ五六寸ヨリ一尺餘ニ及ブ. 一回或ハ二回羽狀ニ分裂シ. 淡褐色ノ毛ヲ密生ス. 小羽片ノ縁邊ニ缺刻ヲ存ス. 而メ極メテ疎ニ褐色圓形ノ子囊群ヲ着生シ. 不規則ナル半コツブ狀ノ被膜ヲ具フ.

(1071) *Microlepia marginata* C. Chr.

ふもどした. ヤマクジヤクシダ.

麓 大宮口.

山麓向陽ノ地ニ普通ナリ. 葉ハ地下莖ヨリ出テ. 一回羽狀複葉ニシテ毛ヲ存シ. 長二三尺ニ達ス. 葉面ハ三角形ヲ呈シ. ヤ、革質ナリ. 小羽片 楕圓ニシテ縁邊ニ鋸齒アリ. 子囊群ハ同形ニシテ小羽片ノ縁邊ニ粗ニ着生シ. 半コツブ狀ノ被膜ヲ具フ.

(1072) *Microlepia Wilfordii* Moore.

わうれんした.

麓 喬. 北山. 白絲. 瀧ノ澤. 瀧ヶ原.
大宮口 1200m—1400m. 大宮新道一合.

山中ノ陰地ニ在リテ根莖ヨリ葉ヲ抽出ス. 全体山形ニシテ一尺内外ヲ普通トスト雖. 稀ニ一尺五寸位ノモノアリ. 葉身ハ細長クシテ三回羽狀ニ分裂シ. 大小ノ羽片ハ他ノ羊齒類ニ比スレバヤ、疎簡ナリ. 子囊群ハ小羽片ノ縁邊ニアリテ褐色ノ被膜ヲ有ス.

(1073) *Nephrodium decursivo-pinnatum* Bak.

げじげじした.

麓 萬濃.

陰地ニ普通ニシテ地下ニ莖アリ. 葉長通常一尺許ナルモ

時トシテハ一尺六七寸ニ至ル者アリ。葉柄、中軸共ニ褐色ノ毛茸アリ。葉身ノ全狀披針形ニシテ深ク羽狀ニ分裂シテ複葉ヲナス。各羽片ハ無柄ニシテ左右交々相連結シ、稍々斜上シテ中軸ニ互生シ。其中軸ニ相接スルトコロ、ソノ爲メニ翼狀ヲ成ス。其有毛ノ裂葉ノ互ニ葉軸ヨリ生ズル有様ヨリげじげじしたノ稱アリ。子囊群ハ圓形ニシテ葉ノ下ノ面ニ生ズ。

(1014) *Nephrodium dilatatum* Desv.

しらねわらび。

喬 入幡堂ノ上、雲切神社、河口湖畔。
喬 須走口ニ合半、吉田口ニ合ノ上。

地下ニ塊狀ノ莖アリテソレヨリ二三尺ノ葉ヲ生ズ。葉ハ卵狀披針形ニシテヤ、三角形ヲ呈シ通常三回羽狀複葉ヲ爲シ。葉柄長ク、其下部ニハ著シク淡褐色ノ鱗片ヲ有シ上部ニモ毛茸アリ。小葉ハ羽狀ニ分裂シ或ハ鋸齒ヲ有シ最後ノ裂片ハ稍々斜方形ヲ呈シ。其先端ニ鋭鋸齒ヲ存ス白根わらびト云ヘド通常ノわらびヨリハ質ヤ、軟ク、子囊群モわらびト異ニシテ葉裏ニ殆ド圓形ヲナシテ附着シ。圓キ腎臟形ノ被膜ヲ具フ。

(1075) *Nephrodium Filix-mas* Rich.

をしだ、メンマ、ミヤマキノデ。

喬 入幡堂ト大從トノ間、大宮新道一合ノ上。
喬 吉田口一合、須走口一合半ヨリ直下。

深山喬木帯ニ在ル多年生羊齒。大形ニシテ多葉叢生スル狀ルのでニ類スルヨリみやまゐのでノ一名アリ。葉長三四尺、二回羽狀ニ分裂シ。各小葉ハ先端ノ毛様ヲナセル微鋸齒ヲ有シ。葉柄及ビ中軸ニハ褐色ノ毛茸ヲ有シ殊ニ其基部ニ於キテ著シ。子囊群ハ小葉ノ背面ニ着生シ被膜ハ圓キ腎臟形ヲ呈ス。

◎地下莖ハ即チ綿馬根ニシテ條蟲ノ驅除ニ使用シ又屢々庭際ニ栽エテ觀賞ス。

(1076) *Nephrodium Filix-mas* Rich. var. *lacerum* Chr.

くまわらび。

喬 須走口(1400m.—1540w.) 萬濃。
喬 狩休ノ上。

一見いたちしだニ似タリ。葉ハ二回羽狀ニ分裂シ。各羽片ハ羽狀ニ深裂スト雖、先端ニ至ルニ從ヒ愈々途ニ淺ク鋸齒トナリ。各小羽片ニハ微鋸齒ヲ存ス。葉柄、中軸共ニ黒褐色ノ毛茸ヲ有ス。葉ハいたちしだノ如ク光澤ナク且ツ子囊群ハ葉ノ上部ノ背面ニノミ生ズ。

(1077) *Nephrodium erythroscrum* Hook.

べにしだ、ヤヨヒシダ。

麓 大宮、粟倉。

山足ニ普通ニシテ莖ハ地下ニ横ル。葉ハ簇生シ長サ二三尺ニ達シ卵狀披針形ヲナシ。二回羽狀複葉ヲナシ長柄ヲ有ス。各羽片ハ疎ニ中軸ニ互生シ。平開又ハ稍々斜上シテ着生ス。葉色淡ク、嫩葉ハ紅褐色ヲ呈ス。子囊群ハ圓クシテ葉ノ裏面ニ若キ間ハ紅色ナル圓キ腎臟形ノ被膜ニテ被ハレ頗美ナリ。

(1078) *Nephrodium Filix-mas* Rich. var. *Sabaei* Chr.

みやまいたちしだ。

喬 大宮口。

葉ハ概形ハたちしだニ似タリ。葉高二尺許。葉柄ノ下部ハ褐紫色ニシテ少數ノ鱗片ヲ有シ。羽片ハ更ニ小羽片ヲ分チ。小羽片ハ長卵形ニシテ縁邊稍々波狀ニ鈍鋸齒ヲ有ス。

(1079) *Nephrodium Filix-mas* Rich. var. *polylepis* Mak.

みやまくまわらび。

喬 大宮口(1300m.—1500m.) 大宮新道一合ノ上。

地下ノ根莖ヨリ二回羽狀ノ複葉ヲ叢生ス。葉長二尺許

葉片ハ葉柄ヨリ長クシテ披針形ヲ呈シ。葉柄及ビ葉軸ニハ著シク帶褐黑色ノ鱗毛ヲ具ヘ。殊ニ基部ニ在ル者ハ褐色ニシテ著大ナリ。小羽片ハ殆ド長方形ヲナシテ正シク排列シ。裏面ニ子囊群ヲ二列ニ附着ス。此種頗をしたニ類レド鱗片ノ黑色ナルヲ以テ識別スルコトヲ得。

(1080) *Nephrodium glanduliferum* Mak.

はしごした。

喬・麓・灌。大宮新田。八幡堂附近。
須走口一合。

地表ニ近ク根莖ヲ有シ。暗褐色ノ鱗毛ヲ密生ス。春ヨリ夏ニ涉リテ直立一ニ尺ノ葉ヲ生ズ。葉身ノ全形ヤ、細クシテ葉柄ヨリ微ク長ク。殆ド無毛ナリ。二回羽狀複葉ニシテ小羽狀ノ左右ニ排列スルノ狀ヨリはしごしたノ稱アリ。小羽狀ノ形狀脗わらびノモノニ似タリ。子囊群ハ微小ニシテ葉裏ニ散點ス。

(1081) *Nephrodium Maximowiczii* Bak.

なんたいした。

喬。八幡堂ト大從トノ間。狩休ノ上。
大宮新道二合目。雲切神社。

高山ノ樹陰ニ生ツ莖ハ地中ニ横ル。全葉わらびニ似タレド遙ニ小形ニシテ長柄アリ。葉柄モ細ク綠色乃至黒褐色ヲ帶ビ少數ノ鱗毛アリ。三回羽狀複葉ニシテ小葉ノ先端ニハ數個ノ鋸齒アリ。子囊群ハ葉裏ノ上端ノヤ、凹ミタル下ニヤ、圓形ヲナシテ附着シ。其數少ク。生時ニハ被膜ヲ存シテ著シク凸隆スルヲ以テ一見シテ本種タルコトヲ認メ得ベシ。

(1082) *Nephrodium Phegoteris* Baumg.

みやまわらび。

喬。大宮口。

深山ノ樹下ニ生ズル羊齒ニシテ根莖地下ニ横走シ。淡褐

色ノ鱗片ヲ具ヘ。ソレヨリ一尺餘ノ葉ヲ出ダス。葉片ハ通常葉柄ヨリ短ク。全形三角狀卵形ニシテ其質柔ク。羽狀複葉ニシテ深裂セル多數ノ小羽狀ヲナス。夏秋ノ交黄色ヲナシテ小羽片ノ縁邊ニ近ク子囊群ヲ並生ス。其形殆ド楕圓ニシテ被膜ヲ缺ク。

(1083) *Nephrodium prolixum* Desv.

いぶきした。

麓。大宮。

根莖ハ地中ニ存ス。葉長二三尺アリテ柄ハ刻合ニ長シ。葉面ハ圓錐形又ハ披針形ヲ呈シ一回羽狀複葉ニシテ小葉ハ對生或ハ互生シ。披針形ニシテ羽狀ニ分裂シ。柄ナシ小羽片ハ殆ド全邊ニシテ裏面ノ子囊群ハ圓キ腎形ノ被膜ヲ有シ比較的小ナリ。此種伊吹山ニ多ク産ズルヨリ其名アリ。

(1084) *Nephrodium Thelypteris* Desv.

ひめした。シヨクマ。

麓。

軟質ノ羊齒ニテ多少叢生ス。葉長一二尺直上ス。柄ハ細クシテ平滑。葉面ト其長サ相如ケリ。葉面ハ披針形ニシテ二回羽狀ヲナシ。羽片ハ狹長ニシテ横出シ。更ニ深裂シテ小羽片ヲナシ。正シク排列シテ鋸齒ヲ成ス。子囊群ハ小形ニシテ羽片中軸ノ左右ニ存ス。

(1085) *Niphobolus linearifolius* Hook.

よろひらす。ピラウドシダ。ミヤマイツマデグサ。

麓。バツカケ

山石ノ岩石又ハ樹上ヲ匍匐スル長莖ヲ有シ。茶褐色ノ鱗毛ヲ密生ス。而メ此莖ハ下方ニ細キ絲狀ノ根ヲ生ツ上方ニ長サ二三寸幅二分許ノ厚キ線形ノ葉ヲ疎生シ。其全面