

胎產新書

女科祕旨卷七目

產後類中風

產後汗

產後虛汗不止

產後盜汗

產後口渴或兼小便不利

產後遺尿

產後類痙

產後泄瀉

產後完穀不化

產後痢

產後積滯

滋榮活絡湯

天麻丸

麻黃根湯

止汗散

又方

生津止渴益水散

薛氏補脬飲

加減生化湯

芎歸活風湯

丹溪回生方

健脾利水生化湯

加減生化湯

加味生化湯

參芪生化湯

香連丸

補血消滯方

文科祕旨卷七

輪應禪師纂

仁和吳煜菴垞校訂

產後類中風

產後血氣暴虛百骸少血濡養率爾口噤牙緊手足筋脈攣搐症類中風類痙癇脈雖虛大虛火泛上有痰皆當以末治之母執偏門而用治風消痰之方以重虛產婦治法先當服生化湯以生旺新血如見危症三帖後加參益氣以救血脫也如有痰有火少佐橘紅炒黃芩之劑竹瀝薑汁亦可切忌黃連黃柏並用

產後血少口噤項強筋搐類中風

滋榮活絡湯

川芎

一錢
五分

當歸

三錢
各二錢

熟地

人參
各二錢

甘草

陳皮

羌活
各四分

黃芪

茯神
各四錢

天麻

麥冬

各一錢
一分

荆芥

防風
各四分

黃連

薑汁
八分

炒有痰

加半夏

細竹瀝

薑汁

渴加麥冬

葛根

產後中風恍惚語澁四肢不利

天麻丸

天麻

防風

各五錢
一分

茯神

棗仁

人參

遠志

山藥

柏子仁

門冬

各一兩

川芎

羌活

各七錢

細辛

四錢

南星

細辛

半夏

細辛

石

菖蒲

各八錢

當歸

二兩

共爲末蜜丸硃砂爲衣清湯

每服六七十丸

產後汗

凡分娩時汗出由勞傷脾驚傷心恐傷肝也內經云搖體勞苦汗出於脾驚而奪精汗出於心有所恐懼汗出於肝產婦多兼此三者而汗出不須卽加斂汗之劑能甯神而汗自止若血塊作痛芪术未可遽加宜服生化

湯二三帖以消痛隨服加參生化湯以止虛汗若分娩後倦甚濺濺然汗出形色又脫此亡陽脫汗也又當從權速灌加參生化湯倍用人參以救危急毋拘塊痛夫汗乃心之液榮於內爲血發於外爲汗值產婦亡血之後又多汗由勞驚恐懼所傷神虛而不能鎮守其液也治當健脾而斂水液之精歸脾益榮衛以噓血歸源灌漑四肢不使其妄行而爲外汗在雜症雖有自汗盜汗之分其當歸六黃湯不可以治產後之自汗並宜服加參生化湯又加味補中益氣湯若服參芪而汗不止及

頭出汗而不至腰足乃危惡之症必難療
產後虛汗不止

麻黃根湯

人參

當歸

各二錢

黃芪

一錢五分

白朮

麻黃根

牡礪

各一錢

桂枝

炙甘草

各五分

浮小麥

一撮

如

虛脫汗多手足冷加熟附子

一片

薑棗

四分

渴加

麥冬、五味子

各六分

肥白人產後多汗加竹瀝薑汁

以清痰火若惡風寒加防風

五分

血塊不痛加熟

地

三錢

暮服八味丸

六味加五味

子炙黃芪

凡產後汗不止由產亡陰血而陽氣偏盛故也內經云
陽加於陰則發汗因而遇風變爲瘓癰者有之矣其治
尤難是以產後多汗之家更宜謹避風寒也

產後盜汗

產後睡夢中汗多醒來卽止猶盜暎人睡而出盜謂之
盜汗此非自汗之比在襍症論云自汗陽虧盜汗陰虧
然當歸六黃湯又非產後盜汗方也治當兼血分藥品
調理之乃稱善耳

止汗散

人參二錢當歸三錢熟地一錢麻黃根

黃連

酒炒各五分浮小麥一大撮

又方

牡礪

煅研五分

小麥麵

炒黃研

產後口渴或兼小便不利

凡產後口燥咽乾而渴或兼小便不利由產時失血或汗多所致是無水也夫水穀入胃脾肺散精清氣爲津液其氣通心受火色變爲血下行膀胱爲小便值產亡血而又汗多且勞倦傷脾不能爲胃行其津液生化之

氣不運滲泄之令不行是以上無津液而有嗌乾燥渴
之症下氣不升而有胃腎閉關之候治法必當助脾益
肺升舉氣血則氣化流行陽升陰降水入經而爲血爲
液穀入胃而氣長脈行自然津液充而便利調矣若認
咽乾口燥爲火而用芩連梔柏以降之認小便閉澁爲
水滯而用五苓散以通之皆非也必因其勞損而溫之
益之因其渴燥而濡之行之量度病情而施治無失也

生津止渴益水散

人參

麥冬

生地

當歸

各三錢

五味子

十粒

黃芪

一錢五分

茯苓

八分

甘草

升麻各四分

葛根一錢

升麻各四分

葛根一錢

汗多加浮麥

麻黃根棗仁各一錢

如渴甚加生脈散

代茶不可疑而不用

產後遺尿

曾有接生者

以手入內探

扶小兒損傷

凡產後遺尿由氣血大虛不能約束宜用八珍湯加升麻柴胡甚者加熟附子一片

尿胞以致終身滲漏可不慎哉

又有生理不順誤損尿胞膀胱者用參芪爲君歸芎爲臣桃仁茯苓陳皮爲佐以猪羊尿胞煎湯煎藥須百服漸安

薛氏補脬飲

黃絲絹

一尺碎剪

白牡丹根皮

爲末

白芨末

各一錢

水煎

至絹爛如飴服之靜卧不可作聲如作聲則不效

產後類症

產後汗出多而變癰症口噤不開背強而直身反氣息
如絕宜速服下方

加減生化湯

川芎

麻黃根

各一錢

當歸

四錢

桂枝

防風

甘草

羌活

各五分

人參

二錢

附子

一片

羚羊角

天麻各八分

產後中風無汗類症

芎歸活風湯

川芎

當歸各三分

防風

羌活各五分

棗仁一錢

產後泄瀉

產後泄瀉非雜症有食泄洞泄濡泄溼泄各如註下之論大率屬氣虛食積與溼也氣虛宜補食積宜消溼則宜燥然惡露未淨遽難驟補驟消驟燥當先服生化湯二三帖以化舊生新內加茯苓以利水道俟血化生然

後補氣消食燥溼以分水道始無滯虛虛之失若產經旬日外方論様症猶量人虛實而施治也如痛下清水腹鳴米飲不化者以寒泄治如糞黃色赤色肛門作痛以熱泄治有因飲食過多傷脾成瀉噫氣臭如敗卵者以食積泄治又有脾氣久虛少食食下腸鳴腹急盡下所食之物方寬快者以虛寒泄治治法寒則溫之熱則清之脾傷食積分利健脾兼消補虛方謂善於調治而可無失也

產後虛泄眼昏不識人弱甚形脫必用下方

丹溪回生方 卽附子理中湯

白术

茯苓

各二錢 人參三錢 附子一錢

產後血塊未消患瀉

健脾利水生化湯

川芎

茯苓

各二錢

當歸

四錢 薑炭

蓮子

八粒 入粒

產後血塊已消患瀉

加減生化湯

川芎一錢 當歸

白术

各一錢

薑炭

炙甘草

各四茯苓一錢人參三錢肉果一個陳皮五分澤
瀉八分如寒泄痛加砂仁二錢熱泄加黃連炒一
分

五分人參

三錢肉果

一個陳皮

五分澤

瀉水腹痛米飲不化加砂仁山楂麥芽各二錢瀉有
噯酸臭氣加神曲砂仁山楂麥芽各一錢脾氣久虛
瀉出所食之物方寬快者以虛寒論加山楂砂仁
神曲麥芽各二錢瀉水者加蒼术一錢脾氣弱元氣

虛必須大補佐消食或清熱或祛寒治宜詳察加
減之再弱甚形氣脫必用丹溪回生方始可回生
若脈浮弦按之不鼓卽爲中寒此蓋陰先亡而陽

欲去也速宜以大補氣血藥中加附子炮薑以回元氣勿泛以尋常比也以上諸症俱加升麻酒炒三分

蓮子十粒

產後完穀不化

產後完穀不化由勞倦傷脾而輸化稽遲也內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱精氣四布五經并行是脾主爲胃行其精液者也今產後勞倦傷脾失輸轉之職致清和之氣不能化而令完物出焉名曰飧泄又有飲食太過腸

胃受傷亦致完穀不化俗呼爲水穀痢也然產方三日
內血塊未消患此脾衰胃弱之症未可遽加參芪白朮
且服生化湯加益智香砂少溫胃氣候塊消散可加參
芪白朮以補氣肉果木香砂仁益智以溫胃柴胡升麻
以升胃中清氣澤瀉茯苓陳皮以利水此上策焉
產後三日內完穀不化血塊未消

加味生化湯

川芎

益智

各一錢

當歸

四錢

炙甘草

薑炭

各五分

桃仁

十二粒

茯苓

五分

產後三日外血塊已消完穀不化此胎前素弱故患此症

參芪生化湯

川芎

茯苓

白芍

益智

各一錢

當歸

人參

白术

各二錢

炙甘草

炙薑

各五分

蓮子

入粒

肉果

一個

如瀉水多加澤瀉木通

各一分

腹痛

加砂仁

八分

渴加五味

麥冬

各七分

寒瀉加乾薑

一錢

木香

四分

產後瀉痢日久胃氣虛弱完穀不化宜溫補助胃氣用

六君子湯加木香

四分

肉果

一個
製

產後痢

產後七日內外患赤白痢後重腹痛前集祕要載治法此集不再入所遺方一症四茲補附焉

產痢無後重但日久不止宜六君子湯加木香肉果

產後赤白痢臍下痛宜用當歸厚朴黃連肉果甘草桃

仁川芎煎服

產後痢久色白屬血虛宜四物湯加荆芥人參

痢久而形色羸

血虛
白故屬

產後痢形體羸困心腹絞痛宜用薤白石榴皮當歸黃連地榆煎服如腹痛不止用溫湯布蘸緩腹則緩

噤口痢

古香連丸乃
黃連木香與

香連丸

此不同

黃連爲末 蓮肉 研粉

各半和勻或酒丸或酒調送

每服四錢

附產後積滯

產後滯下積滯雖腹痛至極不可用大黃等藥下之致傷胃氣遂不可救宜服下方

補血消滯湯

人參

芍藥

當歸

各二錢

紅粬一錢

升麻四分

益母草

二錢

加炙甘草

一錢

滑石二三錢

足矣若惡

露未淨兼用乳香沒藥

各二錢

砂仁末五分

足矣若惡

加阿膠

蛤粉炒二錢

久之自愈

女科祕旨卷八目

產後霍亂

產後嘔逆不食

產後口渴

產後水腫

產後怔忡驚悸

產後骨蒸

產後心痛

產後腹痛

產後小便痛

產後指節頭痛

產後偏身痛

產後腰痛

產後淋

產後小便數

產後流注

陰帥五疳

生化六和湯

附子散

溫中湯

加減生化湯

溫胃丁香散

石蓮散

生津益液湯

安神丸

清骨散

保真丸

加味大造丸

加味生化湯

加味生化湯

加減生化湯

元胡索散

猪腎參芪湯

通痛散

養榮壯腎湯

茅根湯

白茅湯

益智散

桑螵蛸散

參歸生化湯

葱熨法

千金陰蝕散

又方

又方

女科祕旨卷八

輪應禪師纂

仁和吳煜茶垞校訂

產後霍亂

此病多發於

夏秋之間若

吐瀉一齊俱

作爲真霍亂

必用附子理

中湯或轉筋

加木瓜緩治

則無救

產後霍亂由勞傷氣血臟腑虛損不能運化食物乃感風冷所致凡陰陽升降不順清濁亂於腸胃冷熱不調正邪相搏上吐下瀉名曰霍亂

產後塊痛未除患霍亂

生化六和湯

川芎二錢當歸四錢乾薑

甘草

陳皮

藿香各四分 砂仁六分 茯苓一錢 薑三片 煎服

產後霍亂吐瀉手足逆冷無塊痛

附子散

白术土人參各一錢 當歸二錢 陳皮

炮薑

丁香八分

甘草各四分

附子五分爲末粥飲調每服

二錢

產後霍亂吐瀉不止無塊痛

溫中湯

人參

白术

當歸

厚朴

各二錢

乾薑

八分

茯苓三錢 草豆蔻一錢 薑三片 煎服

產後嘔逆不食

人之胃腑爲水穀之海水穀化精以爲氣血榮潤臟腑
產後勞傷臟腑寒邪易乘於腸胃則氣逆嘔吐而不下
食也又有瘀血未淨而嘔者亦有痰氣入胃胃口不清
而嘔作醫者能隨症調治斯無失矣

產後嘔逆不食

加減生化湯

川芎

五分

當歸三錢

炮薑

炙草

各五分

砂仁

五分

淡竹葉

七片
薑汁二匙

產後七日外患嘔逆不食

溫胃丁香散

當歸

白术

各二錢

炙薑

丁香

陳皮

炙草

各四分

人參

一錢

前胡

藿香

各四分

薑三片

煎服

產後咳逆嘔吐心忡目眩

石蓮散

石蓮子

去壳一兩五錢

茯苓

一兩

丁香

五錢

爲末米飲下

二錢

產後口渴

產婦虛弱口渴氣少由產後血少汗多內煩不生津液

生津益液湯

人參

麥冬

茯苓

各二錢

大棗

二枚小麥

竹葉

各六分

玳蘿根

甘草

各一錢

如大渴不止加

蘆根

產後水腫

產後水氣手足浮腫皮膚閒光熒色乃脾虛不能制水

按之窩而不
起者氣也按
之無窩隨手
起者水也以
此分別乃要
訣耳

腎虛不能行水故也治必大補氣血爲主佐以蒼朮白
朮茯苓補脾如壅滿用半夏陳皮香附監之虛加人參
木通有熱加麥冬黃芩以清肺金

產後七日外水腫

健脾利水補中益氣湯

人參

二錢

白朮

三錢

茯苓

白芍

各一錢

陳皮

五分

木瓜

八分

紫蘇

木通

大腹皮

蒼朮

厚朴

各四分

如大便不通加郁李仁麻仁

各一錢

寒邪溼熱氣傷表無汗腫宜補氣血方中加薑皮半夏

紫蘇以表汗

產後風溼客傷脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫脹氣喘宜服五皮飲

產後怔忡驚悸

此由產中憂驚勞倦去血過多則心中躁動不甯謂之怔忡若惕惕然而驚中心怯怯如人將捕之之狀謂之驚悸治此二症惟調和脾胃補養心血使志定氣甯氣舒心安而病愈矣然在分娩後血塊未消宜服生化湯且大補以行血塊血旺則怔定驚平不必加定志安神

之藥如塊痛消止後患此症宜服下方

加減養榮湯

川芎

當歸

各二錢

茯神

棗仁

人參

麥冬

遠志肉

黃芪

白朮

各一錢

元眼

肉

八個陳皮

炙草

各四分

如虛煩加竹茹

一團

痰加竹瀝

薑汁

產後心血不甯驚悸不安

養心湯

黃芪

麥冬

棗仁

柏子仁

各二錢

茯神

川芎

遠志肉

各八分

當歸

二錢

五味

十粒

人參

一錢
五分

炙草

四分

薑

二分

煎服

兼服安神丸

安神丸

黃連

酒炒

生地

歸身

各三分

炙草

五分

爲末

蒸

餅糊丸如菜豆大硃砂

二錢

爲衣

每服四十九

產後骨蒸

產後骨蒸先用清骨散作湯藥服後以保真丸作湯藥服

清骨散

柴胡

前胡

黃連

烏梅

去核各二錢

猪脊

髓

一条

豬苦胆

一個

韭菜白

十寸許根各

右藥四味爲末將髓胆韭同搗成泥入童便一盞
熬稀糊入藥末搗爲丸如菉豆大名清骨丸每服
三四十九清湯下如上膈熱多食後服凡男女骨
蒸俱可服惟上症須作湯藥服效更速耳

保真丸

黃芪

川芎

地骨皮

各六分

人參

白朮

當歸

天冬

麥冬

白芍

枸杞

知母

生地

各二錢

茯苓

黃柏

炒各八分

甘草

五分

五味

十粒

此丸方上症加棗

三個

作煎藥服

骨蒸勞熱服清骨散作湯藥不應再服下方

加味大造丸

人參

當歸

山藥

枸杞

各二兩

一麥冬

石斛

酒蒸各八錢

銀柴胡

六分

生地

二兩

胡黃連

五錢

黃柏

酒炒七錢

另將門冬地黃先搗如泥加紫河車

一具

如係蒸熟者亦另搗然後入諸藥末和勻搗勻爲

丸若焙乾河車則爲末入藥搗勻蜜丸

產後心痛

車前子末大藥計口

心者君主之官痛則無救
凡俗名心痛皆胃脘氣痛也婦女最多甚至嘔逆發厥用胡索五靈脂丹參當歸名加味拈

產後心痛卽胃脘疼以胃脘在心之下因傷寒氣及冷物而作痛且氣近於心故俗呼爲心痛殊不知心爲君之官主血行氣統馭臟腑血氣盛則泰然安血不足則怔忡驚悸而不安心豈可痛乎若真心痛手足青黑色旦發夕死夕發旦死昔已論之詳矣治法當散胃中之寒氣消胃中之冷物必用生化湯爲主而以散寒消食佐之無有不安若綿綿而痛可按而止又無塊痛在腹則當論虛而加補也其產後心痛腹痛二症因寒食與

氣上攻於心則心痛下攻於腹則腹痛二症治法大約
相同均當用生化湯加肉桂吳茱萸等熱藥以溫散之
可也

加減生化湯

川芎一錢

當歸三錢

炙薑五分

肉桂

吳茱萸

砂仁各八分

如傷食作痛可照上傷食症條加減下

腹痛亦倣此

產後腹痛

凡產後腹痛先問血塊有無若無塊痛因遇風冷乘虛

入腹作痛宜服加味生化湯若有血塊痛只服生化湯

調元胡索末一錢塊痛消止

產後遇風寒乘虛入腹作痛

加味生化湯

川芎二錢

當歸四錢

炙甘草

炙薑各四分

桂枝

七分止痛去

防風七分

吳茱萸六分

白豆蔻五分

如服

之塊未消再煎一服送失笑散一錢

產後小腹痛

產後虛中感寒飲冷寒氣下攻則小腹作痛又有血塊

作痛者亦有產後血虛臍下痛者並宜加減生化湯治之

加減生化湯

川芎二錢

當歸三錢

乾薑

甘草各四分

桃仁十粒

有血塊痛本湯送元胡索散

一錢

亦治寒氣痛無

血塊痛但小腹痛又可按而少止者屬血虛上方

加熟地三錢

元胡索散

延胡索

肉桂各一錢

爲末

產後指節頭痛

凡產後虛勞指節疼頭痛汗不止

猪腎參芪湯

人參

黃芪

各二錢

生薑

一錢

淡豉

一錢

韭白

一錢

當歸

三錢

用猪腎

二個

先將腎煮熟取汁

二碗

煎

藥八分盞溫服

產後偏身痛

由產後百節開張血脈流散氣弱則經絡閒血多阻滯累日不散故筋骨急引諸節不利至腰背不能轉側手

足不能動履或身熱頭痛若誤作傷寒發表使汗出則筋脈動惕手足厥冷變症百出矣

通痛散

當歸三錢 甘草三分 黃芪 白朮 牛膝
獨活 肉桂各入分五根 薑三片

產後腰痛

凡婦人腎位繫胞腰爲腎府至產勞傷腎氣損動胞絡或虛未平復而風寒乘之二者皆至腰痛也
產後感風寒腰痛不可轉側

養榮壯腎湯

當歸二錢 獨活

桂心

川芎

杜仲

川斷各八分 防風四分 桑寄生二錢 生薑三片

兩帖

後痛未止屬腎虛加熟地三錢

產後日久氣虛腰疼腎弱服加味大造丸

產後淋

由產後氣弱熱客於脬中內虛則小便頻數熱則小便淋澁作痛名曰淋

產後冷熱膏石諸淋

茅根湯

白茅根 一兩

瞿麥

茯苓

各五錢

桃膠

人參

各一分

錢滑石

一錢

紫貝

二個

石首魚頭

四個

燈心

一團

先將石首魚頭研末藥熟入魚首末空

心服

產後淋小便痛及血淋

白茅湯

白茅根

瞿麥

車前子

冬葵子

各二錢

通草

七分

鯉魚齒

一百個

先將魚齒研末藥熟入末

空心服

產後小便數

由脬內宿有冷氣因產發動冷氣入脬致小便數也
小便數及遺尿

益智散

益智大者十個二爲末每服二錢米湯下

桑螵蛸散

桑螵蛸炒十個三

人參

黃芪

各三錢

鹿茸

牡礪

赤石脂各兩

一爲末每服二錢

空心下

產後流注

產後惡露流於腰臂腿足關節之處或漫腫或結塊久則腫起作痛肢體倦怠治法急用葱熨方以治外腫內服參歸生化湯以散滯血毋緩也

治流注已成自潰未成自消

參歸生化湯

川芎一錢當歸三錢
五分炙甘草五分人參二錢黃芪一錢
肉桂四分馬蹄香二錢
五分

葱熨法

生葱一握搗爛炙熟作餅敷腫處用厚布二三層

益上以熨斗微火熨之

流注漫腫微痛屬形氣病氣俱不足最難治若已成膿或未成膿或不潰此氣血虛也宜服人參湯如憎寒惡寒氣虛也宜十全大補湯如日晡內熱宜四物湯加人參白朮丹皮如嘔逆胃氣虛宜六君子湯加炮薑如食少體倦脾氣虛也宜補中益氣湯加倍升麻如四肢逆冷小便頻數腎氣虛也宜補中益氣湯加益智仁

陰蝕五疳

婦人陰戶中生瘡名曰匿瘡或痛或癢如蟲行狀濃汁
淋露陰蝕幾盡者心腎煩鬱腎氣虛弱致血氣留滯經
云諸痛瘡瘍皆屬於心治當補心養胃外以藥薰洗
千金陰蝕散

當歸

川芎

芍藥

地榆

甘草

各等

分用水五升煎至二升去渣薰洗日三次夜一次

又方

猪油十斤水一桶

煮極熟以汁浸瘡冷再易熱者
不過三五次可愈

又方

蝦蟆

兔屎

等分

爲末傅瘡亦良

兔屎別名望
月砂爲洗眼

要藥

女科祕旨卷八

女科旨要卷一目

婦女逐年經症

室女十三四歲經症

又十五六歲經症

婦女十七八歲經症

婦人十九二十歲經症

又二十一二十二歲經症

又二十三四歲經症

又二十五六歲經症

又二十七八經症

又二十九三十經症

又三十四五經症

又三十六七經症

又三十八九經症

又四十二三至五十一二經症

八物湯

和氣散

四物調經湯

和氣八物湯

柴胡湯

調經丸

烏金散

八物溫經湯

君子湯

加味四物湯

烏雞丸

止經湯

紅花當歸散

減味五積交加散

八珍散

加減莪术散

和經湯



女科旨要卷一

雪巖禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂

婦女逐年經症

室女十三四歲行經或行或痛或發熱身體不甯口苦面紅寒熱不定頭目暈花

八物湯

白芷

一錢

羌活

上部身體不痛不用

砂仁

桂枝

無寒不用

白术

各二錢

香附

二錢

分二帖加薑

三片

葱

三根

空

心熱服如有血氣攻心痛加乾漆元胡索

各三分

心熱服如有血氣攻心痛加乾漆元胡索

各三分

心熱服如有血氣攻心痛加乾漆元胡索

各三分

心熱服如有血氣攻心痛加乾漆元胡索

各三分

心熱服如有血氣攻心痛加乾漆元胡索

各三分

痰氣急加半夏桔梗杏仁五味各三分

和氣散

厚朴五分陳皮

藿香六分白术

延胡

枳壳

各三錢

香附

炒五錢

草果

熱不
用

甘草

砂仁

小茴

各二錢

木香

二錢

爲末

或丸或散

每服二錢

空

心下

室女十五六歲經水不通日夜寒熱手足麻痺頭痛惡心嘔吐腹中忽然結塊冲痛此因誤食生冷所致

四物調經湯

當歸

川芎

柴胡

黃芩

白芍

各三錢

分錢五香附

五錢

青皮

砂仁

甘草

各五分一錢

熟地

白术

陳皮

枳壳

小茴

炒各三錢

三稜

莪术

各一分錢

紅花

五分二錢

白芷

二錢五分肉桂

一錢

分四帖加薑

三片

葱

三根

空心煎服如

上部痛加

羌活

二錢二錢

各二錢

延胡乾漆

各二錢五分

寒熱瘧疾加常山草果香附

各三分

吐心悶加豆蔻粟壳木香

各三錢

婦女十七八歲經脈不通或阻半月或阻百日半年顏

色青黃飲食不思寒熱頭痛目暉肚中結塊煩悶嘔吐
膨脹此因脾胃虛弱氣血不行而致

和氣八物湯

人參

茯苓

熟地

小茴

各三錢

白朮

各一錢

川芎

各四錢

甘草

黃芩

柴胡

枳壳

各三片

錢當歸

白芍

香附

各六錢

分四帖加薑

各三片

燈心

一團

空心熱服如肚痛加延胡乾漆

各三錢

加延胡乾漆

各三錢

加延胡乾漆

各三錢

加延胡乾漆

各三分

吐惡心加良薑砂仁

各三錢

手足麻痺加肉桂

一錢

加肉桂

五分

咳嗽加杏仁

五味子

款冬花

各二錢

加款冬花

各二錢

柴胡湯

當歸五錢白芍

柴胡

黃芩

各三錢熟地

甘草各一錢半夏

川芎

各二錢

人參

麥冬各二錢

錢分四貼加薑三片

空心熱服如少睡加棗仁

三錢

吐加砂仁三錢白術

二錢分香附

三錢

嗽加杏仁

一錢

五分五味一錢蘇葉桔梗

各三分錢

調經丸

當歸二兩白术

厚朴

赤芍

米米

熟地

小茴枳壳

各二錢

陳皮

砂仁

三稜

乾漆

甘草

白芷

各二兩

青皮

陳艾

各二

錢粉草

五錢五兩

香附

醋製一兩

川芎

五錢五兩

爲末米醋糊丸

各二三

空心米湯下三四十九丸

婦人十九二十嫁出時但遇經脈動時偏身疼痛手足
麻痺或寒熱頭目昏眩或由感冒而致當急用烏金散
多二貼少一貼可愈

烏金散

厚朴

蒼朮

川芎

茯苓

當歸

半夏

白芍

羌活

獨活

牛膝

各三

錢陳皮

桔梗

白芷

枳壳

各五分

錢麻

黃

四分

甘草

五分

桂枝

一錢

分四帖

加薑

三片

葱

白

二個

空心熱服

嗽加杏仁

五味

各二錢

泄瀉加枳

壳豆蔻粟壳

各一分

錢一錢

婦人二十二經脈不調赤白帶或如梅汁或片或二

三月不行潮熱咳嗽飲食不思四肢困倦若此症日久

不治則成骨蒸癆急服八物溫經湯若帶如魚腦者冷

極須繼用烏金散

八物溫經湯

當歸

香附

鹿茸

醋炙如川芎
熱少用

熟地

白朮

山萸

小茴

各二錢

甘草

一錢

分四帖

加薑

三片

空心服

如盜汗

加棗仁

黃芪

各二錢

嗽加

杏仁

五味子

各二錢

潮熱加黃芩

柴胡

各三錢

婦人二十三四腹心脹滿氣升上隔飲食不思腹結塊成瘻此因經後潮熱誤食生冷聚成痰飲若不早治復成大患

君子湯

陳皮

茯苓

枳實

川芎

赤芍

蘇葉

檳榔

桔梗

白术

半夏

各二

錢當歸

香附

厚朴

各三錢

甘草

一錢

紅花

黃連

酒炒

柴胡

各一錢

砂仁

一分錢

分八貼加薑

三片空

心服如嗽加五味子

杏仁

各二錢

口渴潮熱加竹瀝

匙酒水各半煎

婦人二十五六血海虛冷經脈不調或時腹下疼痛或白帶或魚腦髓或米汁信期不定每日淋漓不止面色青黃四肢無力頭暈眼花此氣血兩虛之症

加味四物湯

當歸

鹿茸

白芍

香附
各三川芎

熟地

各二錢
五分

黃芪

白朮

茯苓

黃芩

陳皮

去白
砂仁

人參

阿膠

小茴

山萸

各二錢

沉香

粉草

各一

延胡

二錢

分四帖

加薑

三片
錢

煎空心服如渴嗽潮熱加五味子杏仁

各五分
竹瀝少許

烏雞丸

此方善調經如
有熱者忌用

人參

砂仁

各五
錢

白朮

川芎

熟地

當歸

厚朴

香附

各一
兩

海金砂

銀蠶

前卷烏雞丸

藥味純和與

廣東白鳳丸

同功乃婦科

良劑此九重

用金石豈可

常服若刪去

二砂爲八珍

加減亦可用

也

砂

柏葉各二兩

殭蚕

防風各五錢

粉草二分

錢五分

共爲末外用烏骨雄雞一隻

三年成者

用竹刀殺

留

下

之去毛血頭足肚襍洗淨用陳酒一大升將藥末

分三

以一分納雞肚內

留

下

分三分以一分納雞肚內

一分入湯內

一分留下

留

下

聽用文武火煮熟將雞骨拆開熬乾原汁取雞骨

肉藥末

晒乾爲細末

留

下

一分藥末和勻以米

飯爲丸每日空心酒下五十九

婦人二十七八身體困倦少食經水時時淋瀝不止或塊或片或流赤白黃水面色青黃眼花四肢酸痛將成

崩漏

止經湯

當歸五錢

白芍

川芎各四錢

阿膠炒

黃芩

蒲黃炒

柏葉鹽水

白朮各三錢

砂仁二錢

香附

熟地四錢

炙甘草一錢

分四帖加薑

三片如嗽加

五味子杏仁

各三錢

氣急加半夏蘇葉

各二錢

泄瀉加

豆蔻粟壳

各二錢

肚痛加枳壳延胡乾漆

各三錢

若虛

冷可服前補經湯或烏雞丸以補心血若口乾潮
熱不可用烏雞丸可服八珍散以扶脾胃切忌亂

服藥若已半年不調用調經散可治

婦人二十九三十連年生育氣散血虛經脈不和或二
三月不行不時腹痛結成血塊日倦夜熱飲食少思此
血虛胃熱抑或勞倦而致先服紅花當歸散後服八物
湯

紅花當歸散

當歸六錢

川芎

赤芍

熟地

黃芩

香附

延胡

厚朴

各四錢

小茴

柴胡

陳皮

莪朶

牛膝

各二錢

三稜

先服二錢

甘草

草五分紅花一錢先服分八帖少加薑水煎空心

服如惡心嘔吐加砂仁

一錢良薑一錢泄瀉加豆

蔻粟壳

各三分偏身痛加羌活獨活

各二錢

嗽氣急加

杏仁五味桔梗蘇葉

各一錢

婦人三十四五血氣脾胃俱虛或經水動時當風坐卧失避身入虛邪徧身麻痺經脈受風咳嗽有痰用減味五積交加散兼八物湯治之

減味五積交加散

羌活

五分當歸

川芎

獨活

二錢白芷

厚朴

蒼朮

枳壳

防風

陳皮

半夏

柴胡

桔梗

茯苓

各二錢 麻黃

桂枝

甘草

各五分

分四帖加薑

三片 連根葱白

五個

空心熱

服如不能

行動去柴

胡加殭蚕

烏梅

各五分

酒煎嗽加五味

杏仁

各三錢

婦人三十六七若行經太多此因血氣虛甚胃氣不足故血妄行宜補調氣血養脾胃庶年老可無血崩之患

八珍散

人參

茯苓

川芎

熟地

白芍

香附各三錢

白术

當歸各四錢

甘草一錢

分四劑

薑水煎服如肚痛加延胡三錢潮熱加黃芩柴胡

各三錢

婦人三十八九經水斷絕腹中有塊疼痛頭暈眼花飲食不思此氣血虛惡血不散急當散其瘀血溫調血脈以除後患

加減莪术散

當歸

莪术

延胡

熟地

枳壳

青皮

白术

黃芩

各二錢

川芎

三稜

小茴

砂仁

各三錢

乾漆

紅花

各一錢

香附

五錢

甘草

二錢

共爲末每日空心酒下三錢

婦人四十二三經水斷絕五十一二其經不定常常淋
瀝或塊或條或漏不止陰陽相反血氣妄行失其調理
最難得痊百中三五可治急服和經湯兼四物湯補經
湯或烏雞丸

和經湯

當歸

山藥

茯神

黃芩

香附

白术

各二兩

白芍

一兩

棗仁

炒蒲黃

炒阿

膠

白芷

陳皮

小茴

各六錢

甘草

三錢

和勻一兩三錢一帖加薑三片空心熱服若一二帖後不止卽去香附陳皮小茴一半

女科旨要卷一

女科旨要卷二目

診婦人有孕論

按月受胎形症

初月胎形

初月胎症

二月胎形

二月胎症

三月胎形

三月胎症

四月胎形

四月胎症

五月胎形

五月胎症

六月胎形

六月胎症

七月胎形

七月胎症

八月胎形

八月胎症

九月胎形

九月胎症

十月胎形

十月胎症

罩胎方

安胎和氣散

活胎和氣散

瘦胎飲

知母補胎飲

和氣平胃散

保生如聖散

活命無憂散

烏金丸

聖娟

苦命璫憂道

眼珠

平胃散

肺脾

平胃散

腎

平胃散

心

平胃散

肝

平胃散

脾

平胃散

膽

平胃散

大

平胃散

女科旨要卷二

雪岩禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂

診婦人有孕論

夫肝爲血兮肺爲氣血爲榮兮氣爲衛陰陽配偶不參差兩臟通知兩類例血衰氣旺定無孕血旺氣急應有體左疾爲男右疾爲女流利相通定來去兩指關脈大相應已形雙孕分男女左手帶縱兩個兒右手帶橫一雙女左手脈逆生三男右手脈順生三女一關風部皆相應一男一女分形証有將兒死母身存或卽母亡存

亦有虛弱孕婦三月之前不現於脈者然細診兩尺必有流利不絕之象若五月之後則洪滑等脈爲有餘沈細微等脈爲不足所以未產預分其吉凶也

子命往來三部通流利滑數相參皆勿替陽實陰虛脈得明遍滿胸堂皆逆氣左手太陽浮大男右手太陰沉細女指下分明長記取三部沉正等無絕尺而不止真胎矣夫乘妻兮縱氣露妻乘夫兮橫氣助子乘母兮逆氣參母乘子兮順氣護小兒日足胎成聚身熱脈亂無所苦汗出不食吐逆時精神結備其中住滑疾不散胎三月但疾不散五月母洪緊牢强滑各安沉細而微歸

泉路

按月受胎形症

初月胎形一點精華如草上露珠未有宮室在牝戶之處未入腹內其形或聚或散

初月胎症少婦初次懷胎一月滿足害羞不對人言時醫不識誤作阻經治致有頭暈惡心飲食少思腹內作痛六脈浮緊并婦人稟氣薄及病後受胎俱須用罩胎方保之若只氣不和可服安胎和氣散

罩胎方

當歸

白芍

各四錢

枳壳

三錢

砂仁

二錢

甘草

六分

分二帖空心溫服

安胎和氣散

藿香

陳皮

蒼朮

砂仁

黃芩

桔梗

益智仁

各二錢

厚朴

各一錢

甘草

紫蘇

各二錢

小茴

一分

分二帖加燈心

一團

枳壳

一錢

空心溫服

凡受孕一月之後不勞動者亦有惡阻輕者不必治重者只服藥數劑而已倘虛弱懷孕胎

二月胎形似花綻以受胎一月滿足已受血近陽形如桃花分枝葉在母陰戶內六七寸其胎入腹未入衣裹二月胎症貧寒之婦挑磚弄瓦移床運物傷觸胎氣致有頭暈目花惡心嘔吐不思飲食并虛弱婦胎氣不安

者必須大補
氣血庶根深
蒂固若和氣
散只可治惡

阻耳

俱宜安胎和氣散治之若慣墮胎者當一月內兩服安胎和氣散保過五個月身孕而止

三月胎形似蚕繭漸漸長形一頭大一頭小其頭尖圓未入宮室已至臍下漸有裏其形薄衣胞之

三月胎症虛弱之婦胎氣不和惡心嘔吐或觸動胎氣或秋天極寒極熱相蒸所染各症俱用前安胎和氣散加減如患瘧加青皮二錢草果三錢切忌潮熱加黃芩

柴胡各三錢嗽加杏仁五味子各二錢氣急加沉香五分磨沖

四月胎形已入子宮之室衣裹已至丹田之所忌食免

沉香重墜不
宜用

獐諸毒之物

四月胎症胎至四月能令孕婦身體困倦氣急發熱飲食無味貪眠頭暈四肢酸軟宜用活胎和氣散治之

活胎和氣散

枳壳

厚朴

香附

砂仁

蒼术

陳皮

去白各二錢

蘇葉

一錢

甘草

八分

小茴

一錢

分三

帖溫服

亦有至六七

月而半產小兒

五月胎形男女分定令胎母前行使女於後呼之左回頭是男右回頭是女思酸男思淡女此時已入宮室其

兒雖啼而不

青均因氣虛

不能繫胎血

弱不敷養胎

宜預爲調補

倘係跌損又

當別論

胎穩安也

五月胎症胎至是月若胎姪困弱能令胎母腹重貪眠
飲食無味肚中膨脹胎有些動可服瘦胎飲二三帖能
養聚胎氣而精神安好也

瘦胎飲

當歸三錢

澤瀉

白芍

益母草

枳壳

茯苓

各四錢

砂仁

香附

益智仁

各三錢

白术

二錢

甘草

柴胡

各一錢

分三帖空心服

六月胎形男左動女右動常在臍中漸漸浮如魚食水

一般

六月胎症胎至六月其婦瘦弱可服瘦胎飲二三帖護胎母之苦使臨產時脈調和且易生而無憂慮之患若壯健婦不必服藥

七月胎形男向左脅動女向右脅動七月已足亦有降生成人所以胎母至此行步艱難

七月胎症至七八月足其胎重如石行走甚艱脾胃虛弱或時氣急沖心胸前脹滿咳嗽若誤食熱毒物能令胎動不安名曰子懸俱用知母補胎飲治之

知母補胎飲

知母

蘇葉

各二錢

枳壳

四錢

益母草

黃芩

滑石

香附

各三錢

甘草

五分

分二帖空心服

八月胎形毛髮俱齊蓋以胎至是月而始生毛髮也

八月胎症胎兒長髮令母心煩悶躁多致思食而不知味四肢無力脾胃虛弱而不和溫熱相攻臟腑欠安或變癆疾或傷胎氣宜服和氣平胃散以安胎利氣

和氣平胃散

厚朴

黃連

猪苓

澤瀉

地榆

此方宜去升
柴則平穩可
用

蒼术

白术

白芍

各二錢

柴胡

升麻

各四升

分豆蔻

一錢

陳皮

三錢

甘草

一錢

分三帖

空心溫

服

九月胎形七情開竅眼有光鼻有氣耳有聞口有味各道俱全方能左右轉身大動胎母覺知憂悶煩也

九月胎症胎至九月如胎欲產急然肚痛先行漿水嬰兒不降速服保生如聖散

保生如聖散

柴胡二錢

益母草二兩

枳壳一兩

當歸四錢質弱
者可多用

砂仁

陳皮

益智仁二錢

去壳各

白芍四錢

甘

草一錢

蘇葉五錢

分二帖煎服之後胎猶未降用

活鯉魚一尾

加醋一匙

同上藥煎服外再服烏金

丸一粒

無不降矣

烏金丸具下條

其十月胎形受胎滿足必待胎母四肢交骨罅縫俱開
方許降生既生莫令嬰赤之兒下地恐賊風吹須人抱
接包裹至產母務謹慎調護庶母子兩保平安也
其十月胎症十月滿足臨產有橫逆之厄皆因恣情內

傷或潮熱所致或胎前任用熱毒之物瘀血相搏或七情怒氣所傷當此倉忙又不加謹輒使穩婆生生取出必至觸死胎兒在腹不能醫治今備妙方防之以濟此急惟服活命無憂散一二帖加烏金丸二枚可救

活命無憂散

益母草

二兩急性子

三錢

當歸

三兩枳壳

一兩生

川芎

地

蘇葉

白芍

各三錢

肉桂

陳皮

艾

各二兩

甘草

五分

小鯉魚

一尾

分二帖

水煎臨服加醋

一匙

入藥服再服烏金丸

一顆

倘

死胎不能猝下急取無根水再煎一服并送烏金丸
一顆無不效

烏金丸

所謂煉者炒研各藥成末

候午節角黍爲丸非煉丹之比

蛤粉炒阿膠

四兩

熟艾

一斤五月
五日收

穀芽

麥芽

敗筆

即蘇木

龍衣

即蛇脫
各二兩
要完全者

凡修煉此藥須擇

天月二德天醫吉日畫太極圖分兩儀定九宮而

生八卦忌婦人鷄犬聲至夜間寂靜齋戒至誠念

淨心淨口淨身淨天地咒咒畢發火煉藥口念咒

曰天精地精精靈靈左朝北斗右拱北辰人逢

此藥各保安甯急急如律令煉成包好候五月五
日五家角黍米同搗勻爲丸如桐子大硃砂爲衣
此藥產後胎前催生護生無不立效

文科旨要卷二

女科旨要卷三目

診產後証論

狂言亂語目見鬼神

發熱口乾作渴唇裂生瘡

發熱惡寒

遍身浮腫氣虛潮熱

語言恍惚顛倒錯亂

失音言不出口

痢疾裡急後重

四肢骨節遍身疼痛

下血成片似崩

嗽氣急痰涎多

嘔吐飲食不下腹脹

忽然中風不語

因取重物膀胱下垂不收

心氣攻痛

百日外面青浮腫唇白氣急

烏金散

逍遙散

烏金湯

加味八物湯

調經丸

四物補心湯

逐血補心湯

加減和胃湯

通芩散

正經四物湯

青龍湯

香砂養胃湯

續命湯

四物排風散

收胎散

七氣手拈散

大補湯

大解

余姐

命

萌

芥

血

膽

金

部

門

胃

心

肺

膽

火

女科旨要卷三

雪岩禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂

診產後証論

產後三四五日或半月之間忽然狂言亂語目見鬼神者何也因產後敗血虛弱邪氣乘虛入於臟腑血痰攻心所致

烏金散

川芎

當歸

遠志

杏仁

各二錢研

棗仁

白术

赤芍

香附

砂仁

研

羌活

熟地

防風

茯神

各二錢

半夏

三錢

全蝎

麥冬

人參

牛膝

天麻

各一錢

分二帖

姜

三片

葱

三根

水煎

磨金銀汁

和入藥內

不時服

產後發熱口乾作渴唇裂生瘡者何也因產後好食姜

椒蒜生鷄嫩鴨犬肉熱物過多血熱積於脾胃氣攻上

焦煩渴皆因此致

逍遙散

當歸

白芍

甘葛

各二錢

生地

一錢

川芎

二錢

五分

人參

五分

麥冬

九分

柴胡

二錢

烏梅

二個

甘草

六分分二帖空心服

產後發熱惡寒癟者何也敗血虛弱感冒風寒四肢酸痛頭暈目眩莫作時癟治此虛弱而致

烏金湯

厚朴

柴胡

黃芩

各二錢

麻黃

六分

陳皮

當歸

川芎

桔梗

各一錢

茯苓

五分

桂枝

蒼朮

白芷

枳壳

各一錢

羌活

各一分

草菓

半夏

各二錢

甘草

九分

白芍

各一分

熟地

各五分

錢

分二

帖加姜葱引如有汗倍用當歸川芎桂枝白芍熟

地脹倍用厚朴陳皮寒倍用半夏蒼朮草果桂枝
熱倍用柴胡黃芩痰倍半夏茯苓痢倍當歸去枳
壳甘草頭痛倍川芎白芷羌活餘血在腹成塊作
痛加三稜莪术元胡大茴遍身痛加獨活倍羌活
浮腫氣急泄瀉九死一生若單氣急加枳壳枳實
木香杏仁單泄瀉去枳壳加粟壳荳子豆蔻膈氣
急加杏仁蘇葉倍用桔梗枳實汗去麻黃加黃芪
嗽加杏仁渴加烏梅乾姜脹加砂仁香附

產後遍身浮腫氣虛潮熱蓋因脾胃虛弱血氣衰敗傷

風在裡若脈浮強大用藥可治如兼泄瀉氣急脈細者
難治

加味八物湯

人參

茯苓

熟地

小茴

各三錢

白术

川芎

各四錢

當歸

白芍

香附

各五錢

甘草

黃芩

柴胡

各三分錢

分六帖姜

三片

水煎服服盡

又用調經丸治之如肚痛加延胡乾漆枳壳

各三錢

嗽加五味麥冬欵冬花

各三錢

手足麻痺加肉桂

各五錢

調經丸

當歸

二錢

白术

厚朴

各七分

赤芍

熟地

各五分

小茴

枳壳

各七分

陳皮

砂仁

牛膝

元胡

各五分

莪术

醋炙

白芷

各五分

艾綿

一兩

粉草

三分

青皮

六分

川芎

七分

香附

醋炙

爲末

米糊丸

產後語言恍惚顛倒錯亂此血耗氣散本原不足腹內
空虛睡臥不安或邪不退之故

四物補心湯

當歸

五錢

川芎

生地

白术

白芍

茯神

半夏

桔梗

各四錢

陳皮

三錢

防風

五分

甘草一錢分五帖姜三片溫服如熱加黃連

酒炒三錢

產後失音言不出口因心肺二經被瘀血所侵孔竅皆閉或傷風所致宜逐血補心不可誤服他藥

逐血補心湯

紅花

赤芍

生地

桔梗

蘇葉

前胡

胆星

黃連

茯苓

防風

粉草一錢

分三帖姜

三片空心服

產後痢疾裡急後重因食熱毒太過後食生冷之物冷熱不和能成此症

加減和胃湯

厚朴五錢陳皮

猪苓

澤瀉

歸尾

黃連

白芍

黃芩

各三錢

地榆

豆蔻

各二

升麻

五分

甘草

二錢

分五帖

產後四肢骨節遍身疼痛蓋產育之時周身三百六十
骨節開張氣血俱虛勞傷坐臥又出房冒風所致用烏
金散治之

產後小便緊滯不通因血熱積於小腸經水道不利誤
將熱毒物食之卽成淋瀝

通芩散

赤芩

澤瀉

木通

黃連

猪芩

各三

錢白术

瞿麥

杞子

滑石

車前

各二錢

分四帖加姜

三片

燈心

十根

空心溫服

產後忽然下血成片相似血崩此因血氣大虛脾胃又弱以致榮衛衰敗

正經四物湯

當歸

白鷄冠花

各五錢

白芍

白术

香

附炒各

熟地

川芎

人參

阿膠

炒

茯苓

側柏葉炒

棗仁

陳皮去白炒蒲

黃

各二錢

炙甘草一錢

分六帖加姜

三片

產後嗽氣急痰涎多者因秋冬生產失於調理胎腹虛損肺經欠安所受風寒能致此症宜消風去痰

青龍湯

白茯苓

白芍

杏仁

半夏

各二錢

當歸

桔梗

各二錢五分

桂枝

川芎

五味

乾薑

陳皮

各二錢

麻黃一錢

細辛七分

甘草一錢

分四帖

加燈心一團

空心服如虛腫加大腹皮瞿麥

各二錢

一團

空心服如虛腫加大腹皮瞿麥

各二錢

一團

空心服如虛腫加大腹皮瞿麥

各二錢

嗽加蘇葉枳壳各三錢 四肢怕冷加川芎南星木香

各一錢 氣急加蘇葉枳壳各二錢

產後嘔吐飲食不下腹脹因產後敗血血氣攻於脾胃之間氣不順而致日久不療必成翻胃

香砂養胃湯

半夏四錢 白朮 陳皮 茯苓 厚朴

香附 藕香各三錢 砂仁 柴榔

甘草各一錢 分四帖加烏梅一個 乾姜一錢 温服

產後忽然中風不語因胎前先染風邪未發以致產後

中風或兼產難失於調理感冒轉成此症

續命湯

當歸

半夏

各五錢

川芎

麻黃

各四錢

防風

防已

白芍

各三錢

杏仁

羌活

各三錢

陳皮

茯苓

桂枝

各二錢

天麻

人參

各二錢

全蝎

殭蠶

各二錢

甘草

一錢

分四帖加姜

三片

同金銀器

煎服如化蘇合丸同服尤效若不能下藥用鵝毛

管插喉中漸漸灌之自甦甦後再服四物排風散

日二服如藥灌不下而唇青者必死

四物排風散

南星

半夏

各一錢

防風

人參

羌活

防已

牛膝

杏仁

草一錢

五味

當歸

各五錢

川芎

各六分

白芍

各八分

茯苓

各四分

棗仁

各四分

术

瞿麥

各六分

枳實

各三片

白芷

各四分

天麻

各五分

草

二錢

熟地

七錢

分三帖姜

三片

空心服如泄瀉

去枳實加豆蔻栗壳

各三錢

熱加黃芩柴胡

各五錢

怕

寒有汗加黃芪桂枝

各四錢

氣急加沉香

五分磨

腹脹

不思飲食加砂仁香附

各四錢

產後取重物忽然膀胱下垂不收者因產後勞傷太過拘重物用力太多又傷臟血氣弱血冷因而不收甚至有三五月不能還原者

收胎散

當歸

川芎

白芍

各四錢

升麻

一錢熟地

白术

枳壳

各三錢

人參

各二錢

陳皮

各二錢

沉香

五分

磨肉桂

吳萸

各二錢

甘草

九分

分四帖加姜

三分

空心熱服服後夜臥

產母原冷

將臍下四寸艾灸

七壯

產後心氣攻痛因產後心血虛弱不順七情怒氣諸風
沖心疼痛不可忍者宜和心臟之藥若使結久不散則
難治矣

七氣手拈散

元胡

小茴

白芍

乾姜各二錢

黃連

石菖蒲

香附

蘇葉

各一錢五分

枳實

壳

各三錢

乳香

沒藥

各一錢五分

甘草

六分

分二帖加

姜

三片

空心服

產後百日外面青浮腫唇白氣急此乃大虛之症有汗

當服下方

大補湯

瞿麥

大腹皮

當歸頭

川芎

白

木

茯苓

白芍

各三錢

人參

二錢

黃芪

厚朴

五味子

各二錢

熟地

甘草

各一錢

分二

帖加燈心

一團

煎服服後症不退

加川烏木香

各五錢

分如瀉加訶子肉豆蔻粟壳

各二錢

女科旨要卷四目

治十八般難產論

子死腹中

難產

胞衣不下

產後血暈起止不同眼目昏花

產後口乾心悶

產後乍寒乍熱如瘧

產後虛弱四肢浮腫

產後眼花口言鬼神顛狂

產後月內失音不語

產後腹內疼痛兼瀉

產後百節酸痛

產後血來成片塊頻下不淨

產後血崩

產後膈滿氣逆血氣不通咳嗽嘔吐

產後心痛寒熱不常

產後口鼻黑氣鼻衄一身班點透頂

產後喉中沙作蟬聲

產後中風眼目昏花腰骨疼甚如角弓形

硃砂丸

方症補遺

婦女月經不通

婦人經水重來

婦人經水過多

婦人月經不調

婦人漏下不止其色鮮紅

婦人帶下脈數虛而兼熱

婦人氣血俱損

婦人怯損

新產血氣傷五臟虛肢體羸瘦乏氣多汗
暑月產乳取涼多風冷積聚百病竟起

通經散

五靈丹

固經丸

調經散

歸芍二黃湯

千金散

加減八物湯

十全大補湯

理中丸

桃仁煎

附兒科問候

有藥無方

新產小兒遍體如金色

小兒面色青白不常

小兒上唇白點

小兒急慢驚風

小兒鵝掌癰

卷之三

七言詩

七言詩

七言詩

七言詩

七言詩

七言詩

七言詩

女科旨要卷四

雪岩禪師增廣

仁和吳煜茶垞校訂

治十八般難產論

子死腹中因姪婦熱旺不治過六七日經傳臟腑熱及其胎故死腹中墜在臍下宜保母命急服烏金散或烏金丸用車前子七分酒煎化服胎氣轉熱卽下

難產者因胎氣成全子食母血前一二月時胎形小而餘血多久而成塊俗呼兒枕產時兒枕雖破尙有裹其子者故難產耳用烏金丸將紅花枳壳益母草各三酒

煎磨服何懼橫逆難產之症

胞衣不下因分娩時母受其寒血入其中因寒寒則作
脹脹則胞不下令人脹悶湯水不欲到口服烏金丸用
葱頭三個當歸三錢酒煎化服胞衣遂下敗血淨盡

產後血暈起止不同眼目昏花凡總理一身者血氣血
氣未定還走五臟奔尅於肝故有此症俗呼暗風服烏
金散或烏金丸用白芍菊花各三錢酒煎化

產後口乾心悶因經絡未淨胃氣未正如食寒冷物應
有此症蓋敗血犯心包絡經故爲煩爲渴又呼胸膈壅

悶之至服烏金散或烏金丸用酒化服

產後乍寒乍熱如瘧者蓋寒熱虛瘧只是敗血入於心肺邪熱又入於脾胃故有寒熱而渴此非瘧也服烏金散或酒化烏金丸

產後虛弱四肢浮腫因敗血走五臟轉注四肢停留不行化作浮腫若水腫者氣閉小便澀也血腫者氣竭四肢冷也治血腫當服烏金散兼服硃砂丸以茯苓末三錢酒煎磨服可消另用煎藥治之

硃砂丸

益母草

沉香

小茴

白芍

香附

防風

五味子

各等分

白术

倍用

棗肉爲丸硃砂

爲衣

產後眼花口言鬼神顛狂因敗血熱極沖心非風邪所

侵服烏金丸用燈心湯煎黃連三分磨服或烏金散

產後月內失音不語蓋心有七孔三毛散血走迷孔口

竅不能通竅者音也故不言非脫陰陽之症服烏金散

或烏金丸用甘菊枳壳桔梗各三分煎湯化服

產後腹內疼痛兼瀉因胎母月內食酸冷堅硬之物血

氣不及不能尅化流入大腸作此瀉痢服烏金散兼用
止瀉調氣湯或烏金丸用神曲白豆蔻各三分煎湯化服

產後百節酸痛因產時百骨開張百筋用力新血未生
敗血停經聚滯不行故作此症亦非風邪所致服烏金
散或烏金丸用白芍當歸各三分酒煎化

產後血來成片塊頻下不淨因飲食前後惱怒食中鬱
怒之氣觸血敗血成聚而不淨服烏金丸用木通香附
各三分酒煎化服

產後血崩如產後三不節者應有此症調理飲食不節

寒熱不忌房事不謹此三者必崩漏身則潮熱筋則急
拘胸則煩悶服烏金散或烏金丸用川斷三分酒煎化
服

產後膈滿氣逆血氣不通咳嗽嘔吐此血入胃中脾氣
相沖遇食沖食遇氣上逆故作嘔脹而吐血服烏金散
或烏金丸用烏藥枳壳各二分煎湯化服

產後心痛寒熱不常此飲食不節食痰相結令人榮衛
不宣寒熱不常四肢冷熱心煩口燥睡夢多驚精神不
爽面常赤色若此者後必爲骨蒸之症不治用烏金散

或烏金丸以柴胡半夏各三分煎湯化服

產後口鼻黑氣及鼻衄并一身斑點遶項此敗血流入
於臟腑溢滿肌膚一身四肢不能回走故作熱結之症
其人面黃便結用烏金丸以羌活升麻各五分煎化服
三丸或可回生然此症十能救一

產後喉中沙作蟬聲此敗血走入孔竅轉入於臟腑肺
生氣氣生血氣血走臟竅敗血冲遇成塊入喉故作此
症急服烏金丸用山豆根歸尾錢各三分煎湯化服庶可回

生

產後中風或眼目昏花腰骨疼甚如角弓形蓋產後未
滿百日俱要調養身體若多勞房事及當風坐臥應有
此症其人身重不能轉側服烏金散或烏金丸用羌活

五靈脂

各三分

大生地

一錢

酒煎化服

方症補遺

婦人月經不通

通經散

川牛膝

當歸

劉寄奴

紅花

蘇

木

肉桂

白芷

急牲子

白芍

甘草各等分

爲末每服四錢酒下

婦人經水重來

五靈丹

蓮房

人髮

棕櫚

柏葉

各燒灰存性

黃芩

各等分

研末每服二錢米飲湯下一日一服五六服

卽愈

婦人經水過多

固經丸

黃柏

炒三錢

黃芩

龜板各一兩

白芍四錢

欒根皮

七錢香附童便浸一宿
二錢五分共爲末酒丸清湯下

婦人月經不調

調經散

三稜

小茴

白芍

香附

澤瀉

當歸

各一兩

蘇葉

紅花

青皮

生地

各五錢

錢枳壳

丹皮

各一兩

先用煎服分四帖後爲末

每服三錢酒下六七服見效若要溫經加人參麥

冬阿膠

各三錢

婦人漏下不止其色鮮紅先由勞役脾胃虛損氣短氣

逆自汗不止身體發熱大便泄瀉四肢無力不思飲食

歸芍二黃湯

黃芪一錢五分

白术

蒼术

當歸

白芍

陳皮

各二錢

熟地

五錢

生地

炙甘草

各三錢

柴胡

二錢

水煎服

婦人帶下脈數虛而兼熱

千金散

杞子一兩

生地五兩

酒一升

煎至三合服

婦人氣血俱損

加減八物湯

人參

當歸

黃芪

熟地

各三錢

白芍

川芎

白术

茯苓

各二錢

肉桂

甘草

各六錢

分大棗

三枚水煎溫服

婦人怯損

十全大補湯

沉香

三分

生地

熟地

當歸

各三錢

白芍

牛膝

藿香

川芎

各一錢

人參

五分

杞子

二錢

肚鴨

一隻

將上藥納鴨肚煮極熟去藥食鴨飲湯

連服數隻則身壯力健

婦人新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦乏氣多汗
理中丸

白术

人參

乾薑各五錢

甘草二兩爲末蜜

丸空心米湯下三錢自新產可服至百日

婦人暑月產乳因取涼太多得風冷腹中積聚百病竟
起迄至將死百藥不效惟服桃仁煎

桃仁煎

桃仁一千二
百粒

去皮尖共炒黃色研細末加好酒一斗

入桃仁研末分三四次入瓦瓶中密封口以麪封
固放熱湯中煮一日以瓶口有熱湯氣出爲度收

藏不時溫服

附兒科問候

新產小兒遍體如金色此乃母受熱而纏胎之故兒身
熱便閉口不吃乳啼叫不止用生地當歸白芍川芎花

粉各等分母子同服

小兒面色青白不常此乃胎中受寒生下感風四肢厥
冷大便青黑腹作盤腸之症用炒當歸炙黃芪細辛黃

初生小兒牙
床上下脣有

白點卽用銀

針挑破取出

白米拭淨惡

血再用百草

霜擦之俗名

馬牙臍米若

日久則挑之

不破而臍米

切不可吞下

倘落肚卽難

救矣

芩龍骨桂心白芍共爲末每服二錢以乳調服三服後
加減

小兒上唇白點者病與傷寒相似此變症之故用麻黃
去節

大黃杏仁

各一錢

燒灰存性爲末以滾湯調服服後

有微汗則身涼而愈

小兒急慢驚風用大蠶蛾一對大葱一條將蛾雌雄各

一納入葱管兩頭縛住令陰乾燒灰清湯調服

小兒鵝掌瘋用鵝掌黃皮不拘多少棉花子花椒共搗用火

籠於被下將上味藥入火內烘薰三五次愈

不疑而懼
日入暝其
風天輶未
震赫之谷
血百臤百
良木殊無
惟此題取
自謂相思
本上不胥
博之全賦

小良藥華藏眼藥掌黃皮木根肺葉甘草根
一撮大麥白朮頭縣生全蜀半載天目山陳頭
小兒急喉嚨風眼火靈芝一撮大棗一粒研細
有難子眼良方根細金
去附大黃杏仁各一撮細布包未以火燄開熱取
小良土參白朮苦甘草頭裏頭寒頭則出變宜之炒田芥苗
眼鏡

妇科旨要卷四