

08494

418.6
484

新撰)處方

日本黒田昌憲 本多芳太郎同編

國立北平圖書館

NATIONAL LIBRARY OF PEIPING
PEIPING

登記號 08494 書號
Acc. No.

418.6
484
Call No.

臨床必攜

新撰處方

日本 黑田昌惠 共編
本多芳太郎

重慶 牟鴻彝 譯
貴陽 孫孝寬 校



3 0529 4286 3

上海北新書局發行

例 言

- 一 本書爲臨床醫家處方之南針，又爲一小藥治學，專供日常座右便覽之用，故以實地應用及簡便爲旨，選錄各種藥劑皆係常用之有效藥品，各處方例，悉根據吾人實際上之經驗。

(1)

08494

- 一 摘錄有各藥劑之藥理，醫治效用，副作用，適應症，禁忌症，及調劑法等之大意，以備忘記時參考應用，又於各劑之末設有注意欄及備考欄，詳記緊要之事項。
- 一 各處方例僅揭其主要者，但附有應用配合藥品及其禁忌，可隨機配合。又於各劑之後，均附註原文，以期處方，藥名，及用量之正確，而便覽者對照，至於略省之原文，用有略點(。)標明之。
- 一 劇藥及毒藥名一一記入極量，更為便利記憶起見，特反覆記載，又於主要藥品之後，揭有小兒用量。
- 一 藥品數量等皆準據普通處方例，悉用米突法。
- 一 卷末揭載有第四改正日本藥局方毒藥劇藥極量表，藥室常備藥品表，及藥品貯藏法注意表。

編者識。

418·6
484

新撰處方目次

- 一 清凉劑(Temperantia).....1
- 二 飽和劑(Saturaciones)8
- 三 解熱劑(Antipyretica)13
- 四 強心劑(Caroliotonica)46
- 五 祛痰劑(Expectorantia).....66

六	肺癆劑(Antiphthiica)	82
七	吸入劑(Inhalans)	91
八	含嗽劑(Gargarisma, collutorium)	97
九	鎮痛劑(Analgetica, Anodyna)	100
一〇	鎮靜劑(Sedativa)	117
一一	催眠劑(Hypnotica)	127
一二	吸入麻醉劑(Narcotica)	137
一三	局部麻醉劑(Loca'raesthetica)	142
一四	注射劑(Injectiones)	152
一五	興奮劑(Excitantia, Analeptica)	161
一六	吐劑(Emetica)	167
一七	下劑(Cathartia, Aperitiva)	174
一八	利尿劑(Diuretica)	203
一九	尿防腐劑(Har. antiseptica)	221
二〇	發汗劑(Diaphoretica)	228
二一	止汗劑(Anidrotica)	333
二二	鎮吐劑(Antiemetica)	237
二三	止痢劑(Obstipantia, Antidiarrhoeica)	44
二四	止血劑(Haemostyptica)	59

二五	健胃劑 (Stomachica)	273
二六	強壯劑 (Roborantia)	295
二七	驅梅毒劑 (Antisyphilitica)	311
二八	驅蟲劑 (Anthelminthica)	327
二九	通利灌腸劑 (Clysmata evacuantia) ...	343
三〇	腸洗劑 (Enteroklyse)	346
三一	滋養灌腸劑 (Clysmata nutrientia) ...	349
三二	膀胱洗滌劑 (Lotiones vesic urin)	355
三三	眼科用藥 (Ophthalmica)	358
三四	婦人科用藥 (Gynaecologica)	367
三五	外科用藥 (Chirurgica)	375
三六	膏藥 (Unguenta)	379
三七	撒布藥 (Pulvis crinalis; adpersorii)	389
三八	塗布藥 (Guttae pro usum externum)	391
三九	粘膜塗布藥 (Frictiones mucosus) ...	393
四〇	坐藥 (Suppositoria)	396
四一	尿道洗滌藥 (Lotiones ure Thralos) ...	401

常用煎, 浸, 漿劑 (% 量)

第四改正 日本局方極量表 藥室常備藥品表

及貯藏注意法	1
配合禁忌一覽表	2
索引	

新撰處方

一、清凉劑

(Temperantia)

○清凉劑有清凉，止渴，消化之作用。

第一方(鹽酸清凉水)(稀鹽酸清凉水)

稀鹽酸 *Acidi hydrochlorici diluti* 0.8

紉糖漿 *Sirupi Simplicis* 10.0

溜水 *Aquae destillatae* 100.0

(1)



右爲一日量，三回分服。S. Taglich 3 mal zu nehmen.

此處方如稀鹽酸爲一·〇，則酸性過強。
(藥局方爲〇·五)。

稀鹽酸爲鹽酸一分，蒸溜水二分和成。

稀鹽酸使用豫先製成十倍用者爲便。

所謂清涼水 (Limonad) 者，即含有糖分之酸性飲料之通稱也。

純糖漿即六五分之白糖，溶解於三五分之熱蒸溜水內而成。

純糖漿先加蒸溜水稀釋後使用，較爲經濟。
(通常一比糖漿內，加入溜水一〇〇·〇)(夏季注意)

第二方 ($\frac{1}{2}$ 鹽酸清涼水) ($\frac{1}{2}$ 稀鹽酸清涼水)

稀鹽酸 Acid hydrochlorici diluti 0.4

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

溜水 Aq. destillat. 100.0

主用於小兒，視年齡之大小，而用以適量。

應用配合藥品 (第一方)

苦味醇 (Tinctura amara)

陪潑辛 (Pepsinum)

含糖陪潑辛 (Pepsinum saccharatum)

規那醇 (Tinctura chinae) (規那劑與醋酸鉀液, 硫酸鐵, 法列水兒, 禁忌配合。亦與赤酒禁忌, 但配以酸質, 則無防害。)

杏仁水 (極量一回二·〇, 一日六·〇)。
(Aq. pruni armeniacae) (Aqua Lauro-Cersi)

莨菪醇 (極量一回一·〇, 一日三·〇)。(Tinctura scopoliae)

莨菪膏 (Extractum Scopoliae) (極量一回〇·〇五, 一日〇·一五) (使用豫製成五倍用至十倍用之乾燥膏, 較為便利)。

硫酸鎂 (Magnesium Sul furium) (硫酸鎂與規那劑禁忌)

赤酒 (Vinum rubrum) (赤酒與規那劑禁忌; 但加酸配合, 即無防害。)

斯忒羅反忒斯醇 (Tinctura Strophanthi)

(極量一回〇・五,一日一・五)

狄乍林(Digalen)

巴克他耳(pangital)

狄吉他民(Digitamin)

番木鱧醇(極量一回一・〇,一日二・〇)

(Tinctura Strychni)

桂皮醇(Tinctura cinnamomi)

橙皮醇(Tinctura Aurantii corticis)

芳香醇(Tinctura aromatica)

薄荷水(Aqua menthae)

利鎖耳金(Resorcinum)

卡斯卡拉流動膏(Extractum cascarae se-
gradae fluidum)

麥角膏(極量一回〇・三,一日一・〇)

(Extractum Secalis cornuti)

阿片醇(極量一回一・五,一日五・〇)(Ti-
nctura Opii)

空杜蘭戈流動膏(Extractum condurango-
fluidum)

覆盆子糖漿 (Sirupus Rubi Ideai)

安替疋林 (Antipyrinum) (極量一回一。〇，
一日三。〇)

疋拉密洞 (極量一回〇。三，一日一。〇)
(Pyramidonum)

阿斯疋林 (Aspirin)

俄波疋林 (Opopirin)

鱗片醋基水楊酸 (Acidum acetylsalicylicum)

鹽酸規寧 (Chininum hydrochloricum) (須
多加純糖漿)

備考

碘化鉀，臭化鉀，醋酸鉀，水楊酸鈉，Brocin
大黃浸及大黃醇等，均與酸性配合禁忌。

稀鹽酸消化不良之際多常用之，一歲以下
之乳兒，不宜飲用此種酸味飲料，普通乳兒胃酸
充足者，亦不宜與以酸性劑，且須時而投以重
碳酸鈉水，(重曹水以〇。五至一。〇%為適
量)

其他各種清涼水 (Limonade)

○五。% 枸橼酸清涼水

○。五% 酒石酸清涼水

一% 稀磷酸清涼水

○。五% 稀硫酸清涼水 (有止血作用)

一% 乳酸清涼水 (對於下痢有制瀉作用)

稀磷酸 (磷酸一·· 蒸溜水一)

稀硫酸 (硫酸一·· 蒸溜水九)

次列處方亦可作清涼劑用

重酒石酸鉀 *Cremor Tartari* 15—50

純糖漿 *Sirup simplicis* 10.0

溜水 *Aq. destillatae* 100.0

右一日量, 三回分服, (用時振盪) S.

Taglich 3 mal zu nehmen.

應用配合藥品

苦味醇 (*Tinctura amara*)

狄吉他利斯劑 [狄吉他利斯醇 (*Tinctura Digitalis*) (極量一·回一·五, 一日五·○)]

醋酸鉀液 (*Liquor kalii acetici*)

芳香醇(Tinctura aromatica)

橙皮醇(Tinctura Aurantii corticis)

薄荷水(Aqua⁴ Menthae)

斯忒羅反忒斯醇(Tinctura Strophanthi)

(極量一回〇・五,一日一・五)

二，飽和劑 (Saturations)

○飽和劑有矯味，鎮吐，及利尿之作用，

第一方 (Selterswasser)

酒石酸	Acidi Tartarici	1.5
重碳酸鈉	Natrii bicarbonici	2.0
純糖漿	Sirup. simplicis	10.0

溜水 *Aquae destillatae* 100.0

右爲一日量，三回分服 *S. Taglich 3 mal zu nehmen.*

第二方(無糖漿 *Selterswasser*)

酒石酸 *Acidi tartarici* 1.5

重碳酸鈉 *Natrii bicarbonici* 2.0

溜水 *Aq. destillatae* 100.0

右爲一日量，三回分服 *S. Taglich 3 mal zu nehmen.*

第三方(美味 *Selterswasser*)

枸橼酸 *Acidi citrici* 1.8

重碳酸鈉 *Natrii bicarbonici* 2.0

純糖漿 *Sirup. simplicis* 10.0

溜水 *Aq. destillatas* 100.0

右爲一日量，三回分服，*S. Taglich 3 mal zu nehmen.*

各種 *Selterswasser* 對於小兒之用量，隨年齡大小而用適量。(重碳酸鈉多係結晶，可細挫後使用)

應用配合藥品 (第一方)

苦味醇(Tinctura amara)

鹽酸科卡印(極量一回〇・〇五,一日〇・
一五) (Cocainum hydrochloricum)

薄荷水(Aqua menthae)

毛地黃醇(極量一回一・五,一日五・〇)
(Tinctura Digitalis)

磷酸科亭(極量一回〇・一,一日〇・三)
(Codeinum Phosphoricum)

甘硝石精(Spiritus Aetheris nitrosi)

碘化鉀(Kalium jodatum)

碘化鈉(Natrium jodatum)

臭化鉀(Kalium bromatum)

臭化鈉(Natrium bromatum)

莨菪醇(極量一回一・〇,一日三・〇)
(Tinctura Scopoliae)

莨菪膏(極量一回〇・〇五,一日〇・一五)
(Extractum Scopoliae)

桂皮醇(Tinctura cinnamomi)

芳香醇(Tinctura aromatica)

橙皮醇(Tinctura Aurantii corticis)

備考

清涼水之簡易調製法：

薄荷油 Olei menthae 1.0

微溫蒸溜水 Aquae destillatae 500.0

右充分振盪混和後，用濾紙濾過。

小兒(尤以乳兒)使用酒精，醇劑，應盡力限制，因用後往往發腦症狀故也。

重碳酸鈉亦可用其結晶者。

日本藥局方制定飽和劑之處方如下：

第四方

枸橼酸 四分 Acidi citrici 4Teil

碳酸鈉 九分 Natrii carbonici 9 „

水 百九十分 Aquae 190 „

(須於臨用時調製)

注意

重碳酸鈉水或 Selterswasser 加入鹽酸科卡印時，則鹽酸科卡印分解而成結晶，析出於液

之上部。如服用時不稍加振盪，則僅將析出之科
卡印一時服用，故宜注意焉。

Selterswasser 之調製：先將重碳酸鈉及其
他諸種藥物溶解於多量水內，然後加入粉末之
酸，或將其兌為溶液後加入。

三 解 熱 劑

(Antipyretica.)

解熱藥慎勿濫用，尤以急性傳染病之初期爲然；如用之，則使熱型不規則，往往有誤診斷。故宜注意使用。

解熱藥適應症

(1) 發四十度以上之高熱，而有危險時。

- (2) 雖不及四十度以上之高熱，但熱候長久持續，因而發現食慾不振，體力消耗，精神過敏，及不眠症等障礙。此時如用解熱藥，解熱數時間，則可恢復氣力，增進食慾，催促睡眠，疾病之經過即可得良好之影響。
- (3) 因發熱而現皮膚灼熱，呼吸淺表，心悸亢進，頭痛，眩暈，及精神朦朧等苦惱時，如用少量之解熱劑，患者即覺快感，意識明瞭，並可使他覺的症狀，亦減輕快。

副作用及注意

- (1) 有用解熱劑後，與體溫下降同時發神經中樞及心臟麻痺，及起虛脫者。
- (2) 有因用解熱藥後却現惡寒，戰慄，發熱者，此所謂呈逆作用是也。
- (3) 有特異質之患者，用後能現皮膚發疹，痒感，口腔咽喉灼熱及腫脹，眼臉水腫，唾液分泌過多，乳房腫脹，口唇發赤腫脹及紫斑，陰囊及陰門浮腫，皮膚現暗黑色之

斑紋及疼痛性水疱形成，惡心，嘔吐，流汗，速脈，頭痛，及眩暈等狀。故通常初次只可試用少量，或先問診其既往，然後投以應用量為宜。

- (4) 有特異質者。對於安替正林，正拉密洞，米格烈林 (migranum)，飛那西汀等解熱藥，用時須加注意。
- (5) 尤以安替正林疹常發於特異質之患者，當熱性病時往往易誤為病的特異性發疹，即於皮膚發劇烈之麻疹樣或猩紅熱樣，紫斑病樣等之發疹，或發劇痛之水疱疹，且顏面，陰部，口唇等處浮腫，及現皮膚紫斑，結膜及鼻咽喉粘膜等續現發赤腫脹灼熱等狀。
- (6) 潛伏結核患者對於安替正林，正拉密洞，米格烈林等，雖多有特異質；然此等解熱藥對於結核熱仍為良好之解熱劑。
- (7) 因用大量(一日用一。〇以上)安替飛亭林所現之中毒症狀，即現口唇紫斑，嗜

眠，昏睡及速脈等。甚則陷於虛脫，如再連用則能崩解赤血球；遂現貧血及瘦削，故連用時務宜慎重，貧血患者及衰弱患者決對禁用，小兒用時亦當特別注意。

- (8) 規寧劑所謂原形質毒物也，對於微生物所致之疾病，有撲滅其病原之效力。故規寧為瘡疾之特效藥，於發熱前五—八鐘時內服，最為有效。分服少量，則有預防本病之效。又有一般解熱，鎮痛之作用。亦可作強壯藥使用，如病後之萎弱，貧血及食慾缺損時，均可用之。又可用以治百日咳，阿米巴赤痢，化膿性氣管枝炎，及陣痛微弱等。(陣痛微弱之際，特以用於胎兒生死不明時，視其反應如何，即可判斷胎兒之生死云，即生產已死之胎兒，多不發現陣痛是也)規寧劑為妊婦所禁忌。
- (9) 水楊酸劑為劇烈之解熱劑，故為不適當之解熱藥。凡一種解熱藥必須作用緩和，乃可使用；如其作用急劇，則因高熱過勞

之呼吸，心動及其他全身之機能，急速減少，屢屢伴以多量之發汗，遂陷於虛脫狀態，體溫急極下降，經時不久再現惡寒戰慄，體溫復急上昇，因而消耗患者之體力，則全身衰弱頓加，往往有頻於危險之慮。

- (10) 水楊酸劑除用以治癩麻質斯外，亦多用於皮膚疾患，又有解熱鎮痛之作用，對於結核性疾患，尤以肋膜炎腹膜炎等能奏卓效。
- (11) 規寧及水楊酸劑有時用後現嘔氣，重聽，耳鳴，弱視等狀。
- (12) 同時併用二種以上不同之解熱藥，通常能使其作用加強，而副作用減弱。

例如左(參看四五頁)

安替正林	Antipyrini	0.26
阿斯正林	Aspirini	0.26
乳糖(白糖)	Sacchar. Lact. (Sacchari albi)	0.5

右爲一包，頓服用 M. F. pulv. No. J.
S. Auf 1 mal z. n.

此處方如安替正林爲○·五，阿斯正林亦用○·五則其主作用強，副作用弱，（此處方帶有潮解性，須用石臘紙包之，）較薩利正林爲有效。

（13）有心臟衰弱之患者，用解熱劑時，同時與以毛地黃等強心劑，能促進其利尿作用，且可避免虛脫。

（14）規寧劑，水楊酸劑於藥物學上均屬於特殊消毒之部類。屬於特殊消毒藥者，即規寧劑，水楊酸劑，水銀劑，砒素劑，克遠瑣忒劑，大楓子油，及釀母等是。

（15）常用之普通解藥，揭之如左：

安替正林 (Antipyrinum) (極量一回一·〇，一日三·〇)

正拉密洞 (極量一回〇·三，一日一·〇)
(Pyramidonum) (小兒用之須注意)

安替飛字林 (Acetanilidum) (極量一回〇·三，一日一·〇) (小兒用時須注意)

飛那西汀 (極量一回一。〇, 一日三。〇)
(Phenacetinum)

鹽酸規寧 (Chininum hydrochloricum)

硫酸規寧 (Chininum Sulfuricum)

歐規寧 (Euchininum)

水楊酸鈉 (Natrium Salicylicum)

阿斯匹林 (Aspirin)

俄波匹林 (Opopirin)

鱗片醋基水楊酸 (Acidum acetylsalicylicum)

薩利匹林 (Salipyrin) (極量一回一。〇, 一日三。〇)

嗎賽汀 (Maretin)

厄耳邦 (Elbon)

鹽酸利米金 (Remijinum hydrochloricum)

第一方

安替匹林 Antipyrini 0.5

乳糖 Sacchari lactis 0.5

右爲一包頓服用 M. F. pulv. No. I.

S. Auf I mal z. n.

亦可加入咖啡鹼 (極量 一回0.5, 一日1.5)
(caffein)

第二方

安替正林 Antipyrini 3.0
(亞拉伯樹膠末) (Gummi arabic pulv.)
(q.s.)

龍膽膏 Extract. Gentianae q.s.

右爲30丸, 一日三回, 每回3-5丸 (一丸中含0.1) M. F. pil. No. 30. S. Täglich 3 mal 3—5 Zu nehmen.

第三方 (五〇%「安替正林」水)

安替正林 Antipyrini 5.0
蒸溜水 Aq. destillat. 10.0

右爲注射料, 一筒筋肉內注射。F.
Injections intramuscul. S. zur Einspritzung.
(通常注射後發現疼痛, 可加入鹽酸可卡音。)

第四方

安替疋林 Antipyrini 1.0

乳糖 Sacchar. lactis 1.0

右分三包，一日量，M. F. pulv. No.

III. S. Auf 3 mal Taglich z. n.

應用配合藥品 (第四方) (安替疋林散劑)

莨菪膏(極量一回〇・〇五，一日〇・一五)

(Extractum Scopoliae)

鹽酸黑羅英(極量一回〇・〇〇五，一日〇・〇一五) (Heroinum hydrochlorium)

鹽酸嗎啡(極量一回〇・〇三，一日〇・一) (Morphinum hydrochloricum)

磷酸科亭(極量一回〇・一，一日〇・三) (Codeinum Phosphoricum)

炭酸夸阿雅科耳(杜俄他耳) Guajacolum Carbonicum (Duotal)

咖啡鹼(極量一回〇・五，一日一・五) (Caffeinum)

精製樟腦(Camphora depurata)

乏戈耳(Fagol)

薩羅耳(Salolum) (Phenolum salicylicum)

安替飛孛林(極量一回〇・三,一日一・〇)
(Acetanilolum od. Antifebrinum)

飛那西汀(極量一回一・〇,一日三・〇)
(Phenacetinum)

正拉密洞(極量一回〇・三,一日一・〇)
(Pyramidonum) (Dimethylamidoantipyrin-
um)

白糖或 Amylin 可作乳糖之代用品

安替正林小兒用量(一回極量)

半歲——一歲……〇・〇五——〇・一

一歲——三歲……〇・一——〇・一五

四歲——五歲……〇・一五——〇・二

六歲——八歲……〇・二——〇・二五

一〇歲——一二歲……〇・三——〇・四

備考

安替正林之配合禁忌(日常應注意者)

一. 甘汞 Hydrargyrum chloratum (Cal-
omel, Calomelas)

二. 抱水克羅拉耳 (Chloralum hydratum)
(Chloralhydrat)

三. 水楊酸鈉 (作水劑用亦無差異, 如用爲散劑, 則生塊團) (Natrium salicylicum)

四. 午乏午耳西葉浸 (Infus. Fol. Uvae Ursi) (或煎劑)

○安替正林與阿斯正林合成之散劑, 易於潮解。

○安替正林之副作用與正拉密洞相同:

一. 內服後現惡心, 嘔吐。

二. 發現之藥疹多爲水疱疹 (有劇痛)。

三. 口腔粘膜之炎症。

四. 口腔炎症往往誤爲麻疹或猩紅熱口內炎。

五. 尿有時呈暗紅色。

第五方

安替正林 Antipyrini	1.0
純糖漿 Sirupi simplicis	15.0
溜水 Aq. destillat	100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal
zu nehmen.

應用配合藥品 (第五方) (安替尼林水劑)

臭化鉀 (Kalium bromatum)

臭化鈉 (Natrium bromatum)

苦味醇 (Tinctura amara)

杏仁水 (極量一回二・〇, 一日六・〇)

(Aqua pruni armeniacae) (Aq. Lauro-cerasi)

安息香酸鈉咖啡 (極量一回一・〇, 一日三
・〇) (Caffeino-Natrium benzoicum)

莨菪膏 (極量一回〇・〇五, 一日〇・一
五) (Extractum Scopoliae)

莨菪醇 (Tinctura Scopoliae) (極量一回一
・〇, 一日三・〇)

碘化鉀 (Kalium jodatum)

硫酸鎂 (Magnesium sulfuricum)

水楊酸鈉 (Natrium salicylicum)

纈草醇 (Tinctura Valerianae)

重碳酸鈉 (Natrium bicarbonicum)

咖啡醇 (極量一回〇・五, 一日一・五)
(Caffeinum) (難溶於水, 用時須振盪)

第六方

正拉密洞 Pyramidoni 0.2—0.3
乳糖 (白糖) Sacchari lactis (Sacchar.
albi) 0.5

右爲一包頓服用 M. F. pulv. No. I. S.
Auf I mal z. n.

第七方

正拉密洞 Pyramidoni
乳糖 (白糖) Sacchari lactis
右分三包, 一日量, 三回分服, M. F.
pulv. No. III. S. Auf 3 mal taglich z. n.

正拉密洞 (二甲完基碯基安替正林) (極量
一回〇・三, 一日一・〇) Pyramidonum (Dim
ethylamidoantipyrinum)

正拉密洞較安替正林之效力約強三倍, 故
僅用安替正林之 $\frac{1}{3}$ 量, 即可奏顯著之效力。其下
熱作緩和, 又能長久持續, 副作用亦少, 且於解

熱時併有鎮痛及鎮靜之效力。然虛脫時用之則宜注意。用於小兒老人及高熱稽留患者更宜注意。

應用配合藥品

與正拉密洞處方日常配合者如次：

重碳酸鈉(Natrium bicarbonicum)

龍膽根末(Pulvis Radicis Gentianae)

狄亞斯大斯(Diastase)

狄俄他耳(碳酸夸阿雅科耳) Duotalum
(Guajacolum carbonicum)

乏戈耳(Fagol)

第八方(正拉密洞極量一回0.3, 一日1.0)

正拉密洞 Pyramidomi 0.3—0.5

純糖漿 Sirupi simplicis 10.0

溜水 Aq. destillatæ 100.0

右一日量, 三回分服 S. Taglich 3 mal
zu nehmen

應用配合藥品

苦味醇(Tinctura amara)

水楊酸鈉 (Natrium Salicylicum)

第九方 (醋酸阿尼利德) (安替飛孛林) (極
量一回0.3, 一日1.0)

醋酸阿尼利德 Acetanilidi (Antifebrini)
(安替飛孛林) 0.25

乳糖 Sacchari lactis 0.5

右爲一包, 頓服用 M. F. Pulv. No. I.
S. Auf I mal z. n.

第十方

醋酸阿尼利德 Acetanilidi (Antifebrini)
(安替飛孛林) 3.0

亞拉伯樹膠末 Gummi arabici pulv. 1.0

白糖 Sacchari albi 1.0

右混和, (和入少量純糖漿) 爲30丸, 一
日三回, 每回二丸, M. F. Pil.No. 30. S. Taglich
3 mal 2 Pillen zu nehmen.

第十一方

醋酸阿尼利德 Antifebrini 0.5—0.6
(安替飛孛林)

乳糖 Sacchar. lact.

158

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Auf 3 mal tagl. z. n.

用配藥品 (第十一方)

莨菪膏(極量一回〇・〇五，一日〇・一五)
(Extractum Scopoliae)

狄俄大耳(碳酸夸阿雅科耳) Duotal (Gua-
jacolum carbonicum)

乏戈耳 (Fagol)

鹽酸黑羅英(極量一回〇・〇〇五，一日〇・
〇一五) (Hereinum hydrohloricum)

薄荷油糖(油糖類約製為五十倍) (Elaeos-
accharum Menthae) (參看四五頁)

精製樟腦 (Camphora depurata)

安替正林 (Antipyrinum) (極量一回一・
〇，一日三・〇)

阿斯正林 (Aspirin)

白糖或 Amylin 為乳糖之代用品

〇醋醱阿尼利德小兒用量(一日量)

(Pulvis opii)

甘草末 (Pulvis Liquiritiae)

○鹽酸規寧裝入膠囊內幼兒不能吞服，須兌為溶液而加以多量之純糖漿使之分服，或作灌腸劑用，本劑苦味甚強，且易害小兒之腸胃，故吾人對於小兒以使用毆規寧為佳，將其散劑混於牛乳內或羹汁內服用，其用量約用鹽酸規寧之倍量，(鹽酸規寧能溶解於三%之水內，硫酸規寧則難溶解)

鹽酸規寧小兒用量

○作解熱目的之用量(一回量)與百日咳相同

一歲以下.....〇〇三——〇〇五

一歲——二歲.....〇〇五——〇〇一

三歲——四歲.....〇〇一——〇〇一五

五歲——一〇歲...〇〇二——〇〇二五

○對於瘧疾之用量(一回量)

一歲以下.....〇〇八——〇〇一

一歲——二歲.....〇〇一——〇〇二

三歲——四歲.....〇〇二——〇〇三

五歲———〇歲…〇・三 ——〇・四
 --〇歲———五歲…〇・四 ——〇・五

〇坦寧酸規寧應用鹽酸規寧之倍量 (Chinin
 tannicum)

第十八方 (瘧疾注射劑)

鹽酸規寧 chinini hydrochlorici	3.0
安替疋林 Antipyrini	3.0
蒸溜水 Aq. destillatae	60.

右煮沸, 殺菌, 濾過; 用時加溫, 每次注射一筒。M. FIjectiones subcutaneS.
 Zur Einspritzung.

(加溫後能使其迅速吸收)

(加入安替疋林, 則可使其溶解性增大)

第十九方

鹽酸規甯 Chinini Pydrochlorici	1.0
食鹽 Naurati Chlorati	0.09
蒸溜水 Aq. destillatae	1.00

右煮沸, 殺菌, 濾過, 加溫後注入皮下或靜脈內 (用量一回5.0-10.0) S, Zur subcutanen

od. intravenösen Injektion.

第二十方

鹽酸規寧 Chinini hydrochlorici . 2.0

澱粉漿水 Mucilago Amyli 60.0

純阿片醇 Tincturae Opii simplicis 15gtt

右爲灌腸料(約60.0克) S. Klysma.

第二十一方(小兒瘧疾水劑)

鹽酸規寧 Chinini hydrochlorici 0.25

純糖漿 Sirupi simplicis 30.0

溜水 Aq. destillatae 40.0

右一日三回分服(二歲小兒瘧疾) S.

Taglich 3 mal zu nehmen.

備考

○鹽酸規寧之副作用

一, 規寧酩酊

二, 重聽, 耳鳴

三, 弱視

○規寧劑對於小兒腸胃之損害甚大, 須於食後內服, 有眼及耳疾患之際用之, 尤宜特別注

意。

○其他之規寧劑：

- 一、硫酸規寧 (Chininum sulfuricum)
二、醎規寧 (Euchinin) (乙完基碳酸規寧)
(Chininum aethylcarbonicum)

三、坦寧酸規寧 (Chininum tannicum)

○硫酸規寧約用鹽酸規寧之倍量。

○醎規寧適於小兒，但不與酸性溶液和用為佳，即用普通之散劑可也。

○坦寧酸規寧用鹽酸規寧之倍量，亦用其普通散劑。

○坦寧酸規寧應用於小兒百日咳之用量（一回量）

一歲——二歲……○。——○。二

三歲——五歲……○。三——○。五

五歲——一〇歲……○。五——○。七

——歲——五歲……一。○——一。五

附記 規寧對於惡性瘧疾及瘧疾惡液質之效力不定，此時可用否雷耳氏水或米替連青代之。

米替連青(甲完青)Methylenblau 0.1-0.2

右一回量,裝入膠囊服用,(一日數回服用) D. ad capsul. gelatinos. S. Auf einmal zu nehmen(Taglich 2-3 mrl)

米替連青 Methylenblau 0.1

肉荳蔻末 Pulveris Myristicae 0.1

右一日量,裝入膠囊服用, D. ad calatinos. S. Auf I mal z. n.

小兒百日咳之處方:

鹽酸規寧 Chinini hydrochlorici 0.1

安替正林 Antipyrini 0.1

吐根糖漿 Sirupi Ipecacuanhae 3.0

純糖漿 Sirupi simplicis 8.0

溜水 Aquae destillatae 40.0

右一日量,三回分服 S. Taglich 3 mal zu nehmen.

鹽酸規寧與稀鹽酸清涼水同時和用,其治療效力較爲優秀,但鹽酸規寧則不可與酸性液併用。

如用有苦味之規寧，可混於咖啡煎或柯柯脂，或加有純糖漿之芳香劑或水飴等，或將規寧作為舐劑。均可減輕苦味。

解熱劑少有用於乳兒，及幼兒者；然小兒如用解熱劑，則以規寧劑最為卓越，就中殊以嚴規寧無甚苦味，可與以散劑服用。

鹽酸規寧及硫酸規寧之水劑製法：先將規寧混和於賦形水內，次加以少許之酸類，使其易於溶解，（鹽酸規寧一〇〇，加稀鹽酸一〇滴，硫酸規寧一〇〇，加稀鹽酸二〇滴，則易溶解，）然後加入矯味藥及水。

第二十二方

水楊酸鈉（撒曹） *Natrii Salicylicae*
2.0—3.0

重碳酸鈉（重曹） *Natrii bicarbonici*
3.0—5.0

苦味醇 *Tincturae amarae* 2.0

溜水 *Aq. destillatae* 100.0

右一日量，三回分服，S. Taglich 3

mal zu nehmen

重碳酸鈉約用水楊酸鈉之倍量，五%以上之重碳酸鈉即難溶於水，故用大量時，須與以散劑。

第二十三方

水楊酸鈉 Natrii salicylici	2.0-3.0
苦味醇 Tincturae amaræ	2.0
薄荷水 Aq. menthae	10.0
溜水 Aq. destillatae	100.0

右一日量，三回分服 S. Taglich 3 mal zu nehmen.

○水楊酸鈉處方中不加用純糖漿，多配以重碳酸鈉，苦味醇，或薄荷水，服用時須行尿檢查，注意有無蛋白，血球等。

○水楊酸鈉之單味水劑，附加甘味者，易於內服，如再加以重碳酸鈉尤佳，因能防遏胃症狀，且可長久連用，(稍有變色，仍不失其效力)。

○水楊酸鈉小兒用量(一日量)

一歲——二歲……………○。五

二歲——六歲……………○。八

六歲——○歲……………。二

一〇歲——一五歲……………。五

注意 水楊酸鈉之配合禁忌及應用禁忌之主要者：

一， 碘化鉀(有與水楊酸鈉配合之處方例)

二， 與酸性禁忌

三， 腎臟炎禁忌水楊酸鈉

四， 有腸胃疾患或咯血及咯血之恐者，均當忌用。

應用配合藥品 (第二十三方)

重碳酸鈉(Natrium bicarbonicum)(內服水楊酸鈉後現胃痛等副作用者，可伍用大量之重碳酸鈉)

苦味醇(Tinctura amara)

薄荷水(Aqua menthae)

赤酒(Vinum rubrum)

橙皮醇(Tinctura Aurantii Corticis)

醋酸鉀液(醋剝液)(Liquor Kalii acetici)

臭化鉀 (Kalium bromatum) ;

臭化鈉 (Natrium bromatum)

安息香酸鈉咖啡鹼 (極量一回一。〇, 一日
三。〇) (Caffeino-Natrium benzoicum)

莨菪膏 (極量一回〇。〇五, 一日〇。一五)
(Extractum Scopoliae)

莨菪醇 (極量一回一。〇, 一日三。〇)
(Tinctura scopoliae)

氯化鈉 (食鹽) (Natrium chloratum)

桂皮醇 (Tinctura cinnamomi)

芳香醇 (Tinctura aromatica)

碘化鉀 (Kalium iodatum) (與水楊酸鈉應
禁忌, 但有處方例)

第二十四方

阿斯匹林 Aspirini (Acidi acetylsalicy-
lici) 0.3-0.5

芳香散 Pulv. aromatic. 1.0

右爲一包, 頓服用, M. F. pulv. No. L
S. Auf I mal z.n.

第二十五方

阿斯丕林 Aspirini	1.5
乳糖 (白糖) Sacchari lactis (Sacchar albi.)	1.0

右分三包，一日量，(食後服用) M. F.
pulv. No. III. S. Auf 3 mal tgl .z. n.

注意

阿斯丕林通過胃臟而至腸內始起分解，故對於胃不致損害，其作用緩和，且副作用亦少。本品不可同時配用重碳酸鈉及鹼性劑，蓋於胃內即有分解之恐故也；服用時可伍用鹽酸清涼水等酸劑。

連用酸味過強之阿斯丕林，能誘起胃加答兒症，此時須併用莨菪膏或 Diastase (頓服用，) 則可除去不快之副作用。

應用配合藥品 (第二十五方)

芳香散 (Pulvis aromaticus)

龍膽末 (Pulvis Radicis gentianae)

莨菪膏 (Extractum Scopoliae) (極量 一回)

〇・〇五,一日〇・一五)

陀肥耳氏散(極量一回一・〇,一日三・〇)
(Pulvis Doveri)

飛拉西汀(極量一回一・〇,一日三・〇)
Phenacetinum)

狄吉他利斯葉末(極量一回〇・二,一日一・〇)
〇) (Folia Digitalis Pulv.)

安息香酸鈉咖啡鹼(極量一回一・〇,一日三・〇)
(Caffeïno-Natrium benzoicum)

磷酸科亭(極量一回〇・一,一日〇・三)
(Codinum Phosphoricum)

坦那耳彬(坦寧酸蛋白素) (Tannalbuminum)
(Albuminum tannicum)

白糖末 (Saccharum Album)

備考 安替正林, 鹽酸規寧, Diastase 等與阿
斯正林配伍, 易於潮解。

阿斯正林小兒用量(一日量)

一歲以下……………〇・〇——〇・〇三

一歲——二歲…………〇・〇三——〇・〇六

三歲——五歲……〇・〇八——〇・一
 六歲——一〇歲……〇・一——〇・二
 一〇歲——一五歲……〇・一五——〇・三

第二十六方

阿斯匹林 Aspirini	1.5
稀鹽酸 Acidi hydrochlorici	0.8
純糖漿 Sirupi simplicis	10.0
溜水 Aq. destillatae	100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. D.

其他之醋撒酸劑(阿斯匹林劑)

- 一，俄波匹林(Opopirin)
- 二，可溶性阿斯匹林(Aspirin löslich)
- 三，鱗片醋基水楊酸(Acidum acetylsalicylicum)

阿斯匹林之應用：

- 一，急性及慢性風寒濕痺
- 二，神經痛
- 三，頭痛

四，肋膜炎

五，喉炎

備考

油糖由白糖五〇分中混和揮發油一〇而成，於必要時製造少量之油糖，可用白糖二〇，加入揮發性油即成。

薄荷油糖(白糖五〇・〇，薄荷油一〇・〇)
(Elaeosaccharum Menthae)

茴香油糖(白糖五〇・〇，茴香油一〇・〇)
(Elaeosaccharum Foeniculi)

橙皮油糖(白糖五〇・〇，橙皮油一〇・〇)
(Elaeosaccharum Aurantii Corticis)

安替正林，鹽酸規寧，Diastase 等與阿斯正林配合易於潮解，故投藥時與以頓服用或一日量為宜。(配伍乳糖須用極多量)

四，強心劑 (Cardiotonica.)

普通常用之強心劑如下：

I. 慢性心臟衰弱使用者：

△狄吉他利斯劑

一，狄吉他利葉(極量一回〇。二，一日一〇〇)
(Folia Digitalis)

- 二, 狄吉他利醇(極量一回一。五, 一日五。〇)
(Tinctura Digitalis)
- 三, 狄加林(Digalen)
- 四, 狄吉他民(Digitamin)
- 五, 盼吉他耳(Pangital)
- 六, 狄吉佛林(Digifolin)

△狄吉他利斯代用藥

- 一, 斯忒羅反忒醇(極量一回〇。五, 一日一。五)
(Tinctura Strophanthi)
- 二, 海葱醇(一日三。〇以內) (Tinctura Scillae)
- 三, 硫酸斯潑爾忒音(一〇。五以內) Sparteinum Sulfuricum)
- 四, 福壽草浸(一日二。〇乃至四。〇) (Adonis amurensis)

△咖啡鹼劑

- 一, 咖啡鹼(極量一回〇。五, 一日一。五)
(Caffeinum)
- 二, 安息香酸鈉咖啡鹼(極量一回一。〇, 一日

三。○)(Caffeīno-Natrium benzoīcum)

II. 急性心臟衰弱使用者：

△樟腦劑

一、精製樟腦(Camphora depurata)

二、樟腦油(Oleum Camphoratum)

腎上腺劑(Adrenalin)

氯化腎上腺鹼液(Solutio Adrenolini hydrochlorici)

(販賣者通常為千倍溶液)

狄吉他利斯劑多用以治慢性心臟衰弱

狄吉他利斯劑共有之缺點：

一、效用緩慢

二、蓄積作用

三、副作用

第一方(狄吉他利斯葉。極量一回0.2；一日1.0)

狄吉他利斯葉浸(0.5) Infus. F ol. Digitalis 100.0

(純糖漿)(Sirupi simpl.) (10.0)

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal
zu nehmen.

如連用則有蓄積作用，服至全量(四。○乃至五。○)即應中止，間歇一二週後始可續用。
(在全量二。○以內時既奏著明之藥效者，須常注意其脈搏及心音。)

應用配合藥品 (第一方)

斯忒羅反忒醇(極量一回○。五，一日一。五)
(Tinctura Strophanthi)

醋酸鉀液(Liquor Kalii acetici)

安息香酸鈉咖啡鹼(極量一回一。○，一日三。○)
(Caffeïno-Natrium benzoicum)

重酒石酸鉀(克利摩耳) Kalium bitartaricum
(Cremor Tartari) (精製酒石) (Tartarus depuratus)

苦味醇(Tinctura amara)

重碳酸鈉(與狄吉他利斯配伍能助成藥效，又可防其副作用發現)
(Natrium bicarbonicum)

硝酸鉀(Kalium nitricum)

狄午魯汀(水楊酸鈉可可鹽) Diuretinum
(Theobrominum natrio-salicylicum) (極量一回
一。〇, 一日三。〇)

安替疋林(Antipyrinum)

麥角膏(極量一回〇。三, 一日一。〇)
(Extractum Secalis Cornuti)

否雷耳氏水(極量一回〇。五, 一日一。五)
Liquor Fowleri (Liquor Kalii arsenicosi)

橙皮醇(Tinctura Aurantii Corticis)

杏仁水 Aqua Pruni armeniacaе (Aqua Lauro-cerasi) (極量一回二。〇, 一日六。〇)

赤酒(Vinum rubrum)

海葱醇(Tinctura Scillae)

阿片醇(極量一回一。五, 一日五。〇)
(Tinctura Opii)

鹽酸嗎啡(極量一回〇。〇三, 一日〇。一)
(Morphinum hydrochloricum)

含糖陪潑辛(Pepsinum Saccharatum)

鱈茴香精(Spiritus Ammoniae foenicul-

atus)

吐根糖漿 (Sirupus Ipecacuanhae).

注意 狄吉他利斯劑與碘化鉀配合禁忌

狄吉他利劑應用上之注意：

- 一、適應 有心臟瓣膜病之代償機能障礙，肺氣腫，肺鬱血，血管硬化症，及萎縮腎等所致之循環障礙時，又於急性熱性病之心臟衰弱時，均宜用之。
- 二、禁忌 代償機能無障礙時，脈搏緊張強大之際，或強度之脈管硬化，心筋變性，及萎縮等，皆宜注意使用。
- 三、內服後約一晝夜乃起作用，故欲求速效時，不宜內服。
- 四、連用狄吉他利劑，往往發現中毒症狀，脈搏極為緩徐，或反之，突然頻數，或呈不整，且體溫下降，而呈虛脫症狀。
- 五、服用狄吉他利斯劑，往往發現嘔吐或下痢，此時須用灌腸（即製成一%浸劑，一日二回灌腸，每回二〇・〇至三〇・〇，）或用皮

下或靜脈內注射劑代之。

- 六，狄吉他利斯之效力多不一定，如中止使用，而忽然再現心臟衰弱之際，須連用極少量（即一日〇。〇五乃至〇。一，）則可免除此弊，雖連用數月，亦無損害。
- 七，狄吉他利斯葉普通多用浸劑或煎劑，亦有以狄吉他利斯葉末作散劑用者。（浸煎劑易起變化，故至多不可投與二日量以上）

第二方

狄吉他利斯葉浸 Infusi Fol. Digitalis

(05.)		100.0
	醋酸鉀液 Liquoris Kalii acetici	10.0
	純糖漿 Sirupi simplicis	10.0
	安息香酸鈉咖啡鹼 Caffeïno-Notrii benzoïci	0.5
	斯忒羅反忒醇 Tincturae Strophanthi	1.0
	右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.	

第三方

(52)

狄吉他利藥末 Foliorum Digitalis Pulv.

0.5

乳糖 Sacchari lactis

2.0

右分三包, 一日量 M. F. Pulv. No. III

S. Auf 3 mal täglich z. n.

備用配合藥品 (第三方)

精製樟腦(Camphora clepurata)

大黃末(Pulvis Rhizom Rhei)

龍膽末(Pulvis Radicis Gentianae)

安息香酸鈉咖啡鹼(極量一回一。〇, 一日三。〇)(Caffeino-Natrium benzoicum)

雅拉伯根末(Pulvis Tuberae Jalapae)

甘汞 Hydrargyrum chloratum (calomelas)
(Hg_2Cl_2)

狄午雷汀(Diuretinum) (極量一回一。〇, 一日三。〇)

金硫黃(極量一回〇。二, 一日〇。六)
(Stibium sulfuratum aurantiacum) (舊藥局方)

咖啡鹼(極量一回〇。五, 一日一。五)

(Caffeinum)

鹽酸規寧 (Chininum hydrochloricum) (用少量鹽酸規寧能使心臟機能旺盛，故往往與狄吉他利斯葉末伍用)

第四方

狄吉他利斯葉末 Foliorum Digitalis	
Pulv.	0.1
樟腦 Camphorae	0.1
咖啡鹼 Caffeini	0.3
乳糖 Sacchari lactis	0.5

右爲一包，頓服用(心臟衰弱時每三小時服用一包) S. Auf einmal zu nehmen. (3 stündlich Pulv. bei Herzschwache.)

第五方

狄吉他利斯葉末 Foliorum Digitalis Pulv.	0.05
鹽酸規寧 chinini hydrochlorici	0.1
甘草末 Pulveris Radicis Liquiritiae	q. s.
甘草膏 Extracti Rad. Liquiritiae	q. s.

右一丸量，一日三回，每回2-3丸，M.F.
 Pill. No. L S. Täglich 3 mal 2-3 Pillen z. n.

狄吉他利斯葉(小兒用量)

(一回量)

(一日量)

一歲——二歲……〇・〇二 〇・〇五——〇・一
 三歲——四歲……〇・〇二 〇・一——〇・一二
 五歲——一〇歲……〇・〇三 〇・一五
 一〇歲——五歲……〇・〇四 〇・二——〇・三

第六方

狄吉他利斯醇	Tincturae Digitalis	1.5
純糖漿	Sirupi simplicis	10.0
溜水	Aq. destillatae	100.0

右一日量，三回分服 S. Taglich 3
 mal z. n.

應用配合藥品 (第六方)

攝耳特耳水(Selterswasser)

斯忒羅反忒斯醇(極量一回〇・五，一日
 一・五)(Tinctura Strophanth:)

海葱醇(一日三・〇以內)(Tinctura Scillae)

阿片醇 (極量一回一・五, 一日五・〇)
(Tinctura Opii)

杏仁水 (極量一回二・〇, 一日六・〇)
(Aq. pruni armeniacaе) (Aqua Lauro-ceasi)

△販賣之狹加林(Digalin) 狹吉他民(Digitamin) 盼吉他耳(Pangital)皆爲注射用, 使用小玻管者爲便。

第七方

斯忒羅反忒斯醇Tinct. Strophanthi 1.5

純糖漿Sirup simplicis 10.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右爲一日量, 三回分服S. Täglich 3
mal z. n.

應用配合藥品 (第七方)

苦味醇(Tinctura amara)

規那醇 (與硫酸鎂互相禁忌) Tincturachinae)

硫酸鎂 (與規那醇互相禁忌) (Magnesium Sulfuricum)

纈草醇(Tinctura Valerianae)

狄吉他利斯醇(極量一回一。五,一日五。)

○) (Tinctura Digitalis)

醋酸鉀液(Liquor Kalii aceticæ)

杏仁水(極量一回二。〇,一日六。〇)

Aq. Pruni armeniacae (Aq. Lauro-cerasi)

臭化鉀(Kalium bromatum)

臭化鈉(Natrium bromatum)

第八方

斯忒羅反忒斯醇 Tinct. Strophanthi 1.0

狄吉他利斯醇 Tinctur. Digitalis 1.0

杏仁水 Aq. Lauro-cerasi 3.0

純糖漿 Sirup. simpl 10.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量,三回分服,(心悸亢進症) S-
Täglich 3 mal z. n.

△斯忒羅反忒斯醇所顯之藥效時間短促,而
無持久性,故用後通常不現蓄積作用,

第九方(咖啡鹼極量一回0.5,一日1.5)

咖啡鹼 Caffeīni

乳糖 Sacchar. lact.

右分三包，一日三回分服 M. F. Pulv.

No. III. S. Auf 3 mal. tägl z. n.

注意

- 一，咖啡鹼難溶於水，故於臨床上用易溶性複鹽之安息香酸鈉咖啡鹼爲便。
- 二，咖啡鹼劑之作用顯於血管中樞，尤以能使內臟神經支配下之血管收縮；心臟之冠狀動脈擴張，而佳良心臟之榮養。
- 三，又能擴張腎臟血管，而增進利尿作用。
- 四，能刺戟大腦皮質，以致不眠及精神興奮等。

應用配合藥品 (第九方)(咖啡鹼)

樟腦(Campher)

安替正林(Antipyrinum)(極量一回一〇，
一日三〇)

配合禁忌 (咖啡鹼)

- 一，鹽類
- 二，鹼類

三、標準含有物

第十方 (安息香酸鈉咖啡鹼) (劑量一回
1.0, 一日3.0)

安息香酸鈉咖啡鹼 Caffeīno-Natrii ben-
zoīci 0.5

乳糖 Sacchar. lact. 2.0

右分三包, 一日三回分服 M. F. Pulv.
No. III. S. Auf 3 mal Tägl. z. n.

第十一方

安息香酸鈉咖啡鹼 Caffeīno-Natrii ben-
zoīci 0.3

純糖漿 Sirup. Simpl. 15.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal
z. n°

注意

一, 安息香酸鈉咖啡鹼雖有強心利尿之效, 但
多用爲利尿劑。

二, 其副作用雖少, 時而亦有催現嘔吐者。

- 三、小兒用量……………(一日量)(咖啡鹼)
- 一歲以下……………○。○——○。○五
- 一歲——三歲……○。○五——○。一五
- 四歲——一〇歲…○。一五——○。二
- 一〇歲——一五歲…○。二——○。二五
- 四、水楊酸鈉咖啡鹼之用法,用量,極量,皆與
安息香酸鈉咖啡鹼相同。

應用配合藥品 (第十一方)

- 醋酸鉀液(Liquor Kalii acetici)
- 苦味醇(Tinctura amara)
- 狄吉他利斯劑(Digitalis-Praeparate)
- 斯忒羅反斯醇(極量一回○。五,一日一。
- 五)(Tinctura Strophanthi)
- 安替疋林(Antipyrinum)
- 正拉密洞(Pyramidonum)
- 水楊酸鈉(Natrium Salicylicum)
- 含糖陪潑辛(Pepsinum Saccharatum)
- 橙皮醇(Tinctura Aurantii Corticis)
- 芳香醇(Tinctura aromatica)

第十二方

20% 安息香酸鈉咖啡鹼水 20% Caffeino-
Natrium benzoicum

右煮沸，殺菌，注射料，用法每二小時
注入皮下一筒。F. Nach Abkochen und Sterili-
eren zur subkutanen Injektion. S. 2 stündlich
eine volle spritze subkutan zu injizieren.

第十三方

樟腦 Camphora	0.3
乳糖 Sacchar. lact.	2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. Pulv.
No. III. S. Auf 3 mal tägl. z. n.

第十三方可加入安息香酸鈉咖啡鹼

第十四方

10% 樟腦橄欖油 10% Oleum Camphora-
tum

右1-2-3筒，皮下注射 S. Zur subkuta-
nen Injektion.

(每1-2小時注射一筒於皮下)(1-2stündlich

eine Spritze)

備考

一、樟腦加入微量之酒精或依脫，置乳鉢內研成細末，使用此種豫先製成之樟腦散，較為便利。

二、樟腦橄欖油之調製法：

先取精製樟腦置於乳鉢內，滴加酒精或醇精而研成細末後，乃漸漸加入少量之橄欖油，研和而使之完全溶解，再用以橄欖油透過之濾紙濾過，或以橄欖油濕潤之精製綿濾過，然後煮沸殺菌，以供注射之用，（此時加溫則易溶解。）

樟腦應用上之注意：

一、樟腦適用於急性心臟衰弱

二、有強心及興奮之作用

三、施行嗎啡禁止療法時，一日內服樟腦二至三次，每次〇・〇五，可使其症候緩和。

四、肺結核患者，可用少量之樟腦注射於皮下，（一日一回，每回〇・〇一至〇・〇二，無熱候者用〇・〇五乃至〇・一，連注五日，

須用軟一週間，)(如避注射部發現疼痛，可用灌腸代之。)

樟腦 Campher	0.5
卵黃 Eidotter	一個
阿片醇 Tincturae Opi	0.5
水 Wasser	200.0

調爲乳劑，灌腸料 F. Emulsio S. Zum Klystier.

五，又爲皮膚刺戟劑，神經痛，癱麻質斯，打撲症，凍傷等作軟膏(10%)外用。

六，Praevalidin 卽10%樟腦軟膏，用以塗擦肺結核患者，有強心祛痰之效，又能增進食慾，使睡眠佳良，且稍有解熱制汗之效，用法，每回塗擦須變更部位，連用五日後，間歇十日或十二日，以後再繼續反復使用。

七，樟腦劑對於急性心臟衰弱最有效力。如用狄吉他利斯劑，則須用狄加林，狄吉他民，盼吉他耳等以作皮下或靜脈內注射；此等狄吉他利斯劑如作內服，則無應急之效果。

鹽化腎上腺巰市上販賣者乃其千倍之溶液，其作用雖多，但不外刺戟交感神經末端，殊為有名之血管收縮劑及心臟興奮劑。

鹽化腎上腺巰作強心藥用，時對於因血管麻痺而致之血壓下降特為有效，以外急性傳染病殊以白喉，肺炎之經過中所現之心臟衰弱，亦適用之。

※鹽化腎上腺巰用於心臟衰弱，血壓沈降，血管運動不全症，心筋炎，及不整脈等。其注射部位：應選皮下及筋肉內為宜，蓋注入靜脈內（○。○二五至○。五）往往釀成危險故也。腎上腺巰對於腎臟疾患有害，又大量吸入能起急性中毒（心悸亢進，胸內苦悶，呼吸困難，震顫，惡寒），尤以老人用之，更當注意。

內服 各種內臟出血，以作止血劑用，日服數回，一回數滴。

皮下注射 喘息發作時用○。一至○。三注射，有鎮靜之效。其他內臟出血之際，用作皮下注射，奏效與否，倘未確定。

外用 喘息吸入稀釋十倍之千倍溶液，百日咳用十倍乃至百倍之稀釋液，其他事項詳論於止血劑條下，(參看二六六頁。)

※麥角劑亦可作強心劑使用(小兒亦可應用。)

※披士忒林 (Pituitrin) 亦為強心劑，又能治喘息發作。

※霍弗曼氏液(醇精精)或嗅入或與純糖漿和用，均有強心之效力。

※Epinephrin ciba 為化學合成之副腎成分，與天然腎上腺腺之生理的及治療的作用完全相同，惟其變性及變色之耐久性較腎上腺腺為強，應用，用法，及用量等仍與腎上腺腺無異。

五 祛痰劑

(Expectorantia.)

氣管及氣管枝內如有異常分泌物，則發咳嗽，而使之咯出；若其分泌物過多或粘稠時，則咳嗽頻發。祛痰劑即用以稀薄咯痰，喚起咳嗽，而使此種分泌物易於咯出之藥物也。

祛痰劑應用之時間

一、急性氣管枝炎之所謂乾性加答期，分泌物甚粘稠，不易咯出時，(粘稠咯出不能)宜用祛痰劑。

二、於加答兒之第二期，因分泌物增量過多，往往蓄積於管腔內，不能充分咯出時(分泌過多咯出不能)亦宜用之。

祛痰劑之種類：

I. Saponin 質(刺戟性祛痰劑)

一、西尼加根根

二、遠志根

Saponin 質作為祛痰劑，有空列兩種作用：

一、刺戟口腔，咽頭及氣道粘膜，亢進分泌作用，而喚起咳嗽。

二、因其催吐作用，而亢進氣道之分泌作用，使咯痰稀薄。

故 Saponin 劑對於乾性氣管枝加答兒，及急性症末期，慢性氣管枝加答兒，及肺炎之溶解期等，均適用之。

禁忌(Saponin質)

- 一、嗜血及有嗜血之疑者。
- 二、胃腸有損害時，則能被吸收而起中毒症狀之虞。
- 三、從前有高熱之患者，皆禁用本劑，然於學理上無所根據。

II. 銣劑(溶解性祛痰劑)

- 一、麝香草精
- 二、鹽化銣(鹼砂)(一日用量一·〇——三·〇)
銣劑之主要作用，使嗜痰溶解稀釋，又有祛痰，發汗，及利尿之作用。

與甘汞，酸性鹽類，碘化鉀禁忌。

與西尼加及吐根亦禁忌，但通常多配合使用。

銣劑之祛痰作用：

- 一、銣鹽一部變為碳酸鹽，由氣管枝粘膜分泌，因而使粘液增量稀釋，又因其鹼性反應，而使粘液溶解。
- 二、銣之濃厚液能使粘膜細胞之氈毛運動麻痺；但極稀薄時則可使之亢進，故有催進嗜

痰前送之效力。

III. 屬於吐劑之祛痰劑(惡心性祛痰劑)

催吐藥之祛痰作用：

用少量之催吐藥，即催吐以下之用量，僅使粘膜之分泌亢進，稀薄氣管枝內之粘液，因催吐藥用於氣管枝炎等喀痰濃厚粘稠之際，能使喀痰易於喀出，故乃用之以作祛痰藥。

屬於吐劑之祛痰劑：

- 一，吐根
- 二，吐酒石
- 三，金硫黃

用少量之催吐藥，有稀釋喀痰之效力，此種祛痰劑稱曰惡心性祛痰劑，蓋由嘔吐前驅期之惡心作用，以促氣管粘膜之分泌亢進，稀釋喀痰，使之容易喀出者也。

其他之祛痰劑：

- 一，礆鹽類
- 二，安息香酸(主於催咳)
- 三，糖類(由於接觸部惹起氣管之分泌促進)

四、李麗金

第一方

西尼加根浸 Infusi Radicis senogae(4.0)

100.0

(磷酸科亭)(Codein. Phosphorici) (0.1)

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. D.

西尼加劑應用上之注意:

遠志根爲西尼加根之代用品, 其效力無大差異, 均用浸劑或煎劑。

西尼加劑用於喀痰多量時, 能催起咳嗽, 充進氣管及氣管枝粘膜之分泌, 而使喀痰稀釋。

禁忌症

一、有胃腸障礙者

二、喀血患者

配合禁忌(西尼加劑)

一、酸類

二、銜含有物

(但麴茴香精於臨床上往往與之配合)

應用配合藥品 (第一方)

麴茴香精 (Spiritus Ammoniae foeniculatus) (其配合處方例甚多) (與稀鹽酸, 甘汞, 碘化鉀禁忌)

水楊酸鈉 (Natrium Salicylicum)

李羅金 (與酸性禁忌) (Brocin)

碘化鉀 (Kalium iodatum) (與鹽酸嗎啡, 杏仁水禁忌, 又有熱候之際, 亦不可用)

鹽酸黑羅英 (極量一回 0.005, 一日 0.015) (Heroinum hydrochloricum)

重碳酸鈉 (Natrium bicarbonicum)

鹽酸嗎啡 (極量一回 0.03, 一日 0.1) (Morphinum hydrochloricum)

磷酸科亨 (極量一回 0.1, 一日 0.3) (Codeinum Phosphoricum)

莨菪醇 (極量一回 1.0, 一日 3.0) (Tinctura Scopoliae)

莨菪膏 (極量一回 0.05, 一日 0.15)

(*Extractum scopoliae*)

阿片醇 (極量一回一。五, 一日五。〇)

(*Tinctura Opii*)

安替尼林(*Antipyrinum*) (極量一。〇, 一日三。〇)

狄俄寧(鹽酸完基嗎啡)*Dionin* (*Acetylmorphinum hydrochloricum*)

吐根糖漿(*Sirupus Ipecacuanhae*)

臭化鉀(*Kalium bromatum*)

臭化鈉(*Natrium bromatum*)

杏仁水(極量一回二。〇, 一日六。〇)(與
礮化鉀禁忌)(有謂與西尼加伍用能發生青酸,
然其配合之處方例甚多)(*Aqua Pruni armeniacae*) (*Aq. Lauro-cerasi*)

第二方

遠志根浸 *Infusi Radicis Polygalae* (4.0)

100.0

(杏仁水) (*Aq. Lauro-cerasi*) (4.0)

純糖漿 *Sirup. simplicis* 10.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

西尼加根浸 Infusi Rad. Senegae (2.0)
100.0

鉦茴香精 Spiriti Ammoniae foenicutati
0.5

右一日量, 六回分服(小兒用) S. Täglich
6 mal z. n. (für kinder)

第三方

吐根浸 Inf. Rad Ipecacuanhae (0.3) 100.0
(杏仁水) (Aq. Lauro-cerasi) (4.0)
(鹽酸嗎啡) (Morphini hydrochlorici)
(0.01)

純糖漿 Sirup. simplicis 10.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

吐根小兒用量, 祛痰劑用〇·二至〇·三%
之浸劑, 隨年齡之大小, 用以適量, 通常以吐劑
之一回極量作為祛痰劑之一日用量。

吐根作催吐劑之小兒用量：

	普通一回量	一回極量
一歲以下……	0.0二至0.0三	0.0五
一歲至二歲…	0.0三至0.0五	0.一
三歲至四歲…	0.0五至0.一	0.一
五歲至一〇歲	0.一至0.一五	0.一至0.二五
一〇歲至一五歲	0.一五至0.二	0.二至0.四

吐根劑應用上之注意：

- 一，吐根劑於乾性咳嗽（所謂乾咳），咳痰，粘稠，難於咯出時適用之。
- 二，用少量吐根以作祛痰劑，其作用和緩，且能持續。
- 三，適用於老人，小兒，及衰弱者。
- 四，咯血患者，食思不振者，及有腸胃疾患者均當禁忌。
- 五，不可於飲食之直前或直後服用。

應用配合藥品（第三方）（吐根浸）

鹽酸嗎啡（極量一回0.0三，一日0.一）
（與碘化鉀禁忌）（Morphinum hydrochloricum）

鹽酸黑羅英(極量一回〇・〇〇五,一日〇
〇一五)(Hercinum hydrochloricum)

磷酸科亭(極量一回〇・一,一日〇・三)
(Codeinum phosphricum)

臭化鈉(Natrium bromatum)

臭化鉀(Kalium bromatum)

狄吉他利斯劑(Digitalis-Praeparate)

鉦茴香精(藥效上與吐根無甚差異)(磷化
鉀,甘汞,稀鹽酸均與鉦茴香精禁忌)(Spiritus
Ammoniae foeniculatus)

鹽化鉦(礪砂)(Ammonium chloratum)

西尼加劑(Senega-Praeparate)

蕁蓉醇(極量一回一・〇,一日三・〇)
(Tinctura Scopoliae)

蕁蓉膏(極量一回〇・〇五,一日〇・一五)
(Extractum Scopoliae)

碘化鉀(與鹽酸嗎啡及杏仁水禁忌)(Kal-
ium iodatum)

杏仁水(極量一回二・〇,一日六・〇)

(與鹽化鉀禁忌) (Aq. Lauro-cerasi)

阿片醇 (極量一回一。五, 一日五。〇)

(Tinctura Opii)

安息香酸鈉咖啡鹼 (極量一回一。〇, 一日
三。〇) (Caffeino-Natrium benzoicum)

亞耳退亞糖漿 (Sirupus Althaeae)

吐根之配合禁忌:

- 一。坦寧酸含有物
- 二。鹼鹽 (碳酸鹼)
- 三。麝香香精 (但配合後藥效上仍無差異, 故臨
床上往往用其處方)

○吐根浸 Infusi Rad. Ipecacuanhae (0.1)
100.0

苦扁桃水 Aq. Amygdalarum amararum
0.5

亞耳退亞糖漿 Sirupi Althaeae 10.0

右一日量, 六回分服 (小兒用) S. Tägli-
ch 6 mal z. n. (für kinder)

第四方

吐根浸	Inf Rad. Ipecacuanhae	100.0
礮砂	Ammonii chlorati	15.0
西尼加糖漿	Sirupi Senegae	10.0
右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal		

Z. D.

礮砂(鹽化銻)有粘稠分泌物之氣管枝加答兒用○。三乃至一。○作為水劑, 一日數回分服, 但有熱候及胃腸障礙者, 則不可用。

第五方

吐根末	Pulv. Rad. Ipecacuanhae	0.1
金硫黃	Stibii Sulfurati aurantiae	0.1
乳糖	Sacchari lactis	1.5

右分三包, 一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Auf. 3 mal täglich zu nehmen.

金硫黃	Stibii Sulfurati aurantiaci	0.5
樹膠漿	Mucilag. Gummi arabici	25.0
溜水	Aq. destillatae	50.0
純糖漿	Sirup simplicis	25.0

右每一二小時，服用一匙(百日咳) S.
1-2 stündlich 1 Theelöffel (Bei keuchhusten)

第六方陀肥耳氏散(極量一回1.0,一日3.0)

<u>陀肥耳氏散</u> Pulv. Doveri	0.5
安替正林 Antipyrini	1.0
乳糖 Sacchar ^o lactis	1.0

右分三包，一日三回分服 M. F. Pulv.

No. III. S. Auf 3 mal tägl. z. n.

陀肥耳氏散 Pulv. Doveri

阿斯正林 Aspirini

乳糖 Sacchar. lactis

右分三包，一日三回分服 M. F. Pulv.

No. III. S. Auf 3 mal täglich z. n.

西尼加根及吐根以外之祛痰鎮咳劑

西尼加糖漿 Sirupus Senegae.

吐根糖漿 Sirupus Ipecacuanhae.) 由吐根
醇十分，純糖漿九十分和成)

鱈苗香精 Spiritus Ammonium foenicula-
tus.

抱水退耳品 *Terpinum hydratum*。

精製退雷彬汀油 *Oleum Terebinthinae rectificatum*。

碳酸銨 *Ammonium carbonicum*。

吐根醇 *Tinctura Ipecacuanhae*。

祕魯巴耳孫 *Balsamum Peruvianum*。

安息香酸 *Acidum benzoicum*。

陀肥耳散 *Pulvis Doveri* (極量一回一〇，
一日三〇) (往往起中毒作用，當注意使用)

孛羅金 *Brocin* (與酸性禁忌)

安替疋林 *Antipyrinum* (極量一回一〇，
一日三〇)

阿斯疋林 *Aspirin*。

乏安辛 (*Fatosin*)

金硫黃 (極量一回〇。二，一日〇。六)
(*Stibium Sulfuratum aurantiacum*) (舊藥局
方)

第七方

孛羅金 *Brocin*

2.0—3.0

苦味醇 Tinctur. amar. 2.0

溜水 Aq. destillat. 100.0

右一日量, 三回分服 S. Taglich 3 mal
zu nehmen.

李羅金應用上之注意

李羅金有制秘, 粘液溶解, 鎮咳 祛痰之效,
急性及慢性之呼吸器疾患, 而伴有咳嗽咯痰諸
症(氣管枝加答兒, 肺炎喘息, 百日咳)均可用之。

配合禁忌

酸類

李羅金之用量, 一日量, 大人二。〇——
三。〇——六。〇

小兒, 一歲以下 〇。三——〇。五——
一。〇——一歲以上一。〇乃至三。〇

李羅金多作水劑用, 調劑時須用溫湯溶解,
亦可作為散劑使用, (與酸類禁忌)

應用配合藥品(第七方)(李羅金)

苦味醇 Tinctura amara.

含糖陪潑辛 Pepsinum Saccharatum,

西尼加糖漿 *Sirupus senegae*.

杏仁水 (極量一回二・〇, 一日六・〇)

Aqua Lauro-cerasi

狄吉他利斯劑 *Digitalis-Praeparate*.

磷酸科亭 (極量一回〇・一, 一日〇・三)

Codeinum Phosphoricum.

水楊酸鈉 *Natrium Salicylicum*.

純糖漿 *Sirupus Simplex*.

六 肺 癆 劑

[Antiphthisica]

屬於特殊消毒藥之克遼瑣忒 (Kreolot) 及其製劑，為呼吸器慢性疾患殊以肺結核所廣用之藥品。用適量之克遼瑣忒劑，有催進胃腸之機能，及制腐之效力，而使消化及吸收作用佳良。

(所謂特殊消毒藥者，即規寧劑，水楊酸劑，水銀劑，砒素劑，克遼瑣劑等是也。

第一方(克遼瑣貳丸) Pitululae Kreosoti.

克遼瑣貳 Kreosoti	5.0
白糖 Sacchar. albi	2.0
甘油 Glycerini	0.7
甘草末 Pulv. Rad. Ligunitiae	8.3

右爲二百丸(一丸中含0.025) 每食後四丸，一日三回服用，M. F. Pil. No. 200 S. Taglich 3 mal je 4 Pillen nach der Mahlzeit.

(製法先將甘油與白糖兌爲純糖漿液，漸漸加克遼瑣貳作成乳劑，然後加以甘草末製爲丸) 克遼瑣貳丸有製就之成品。

克遼瑣貳(極量一回〇·五，一日一·五)

克遼瑣貳 Kreosoti 0.3-0.5

純糖漿 Sirupi simplicis 15.0

1% 薩潑粘漿 1% Mucilaginis Salep 100.0

右一日量，三回分服(食後)S. Taglich 3 mal z. n. (nach d. Mahlzeit)

克遠瓊貳 Kreosoti 1.0

肝油 Lebertran 150.0

右一三回，每回服一匙，（食後）S.

Taglich 3 mal 1 Essöffelvoll nachdermahlzeit.

z. n.

克遠瓊貳 Kreosoti 0.3

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右爲散劑，一日三回分服，裝入膠囊服用（食後）M. F. Pulv. No. III. S. Taglich 3 mal in Oblaten z. n.

第二方(Gurjacolum Carbonicum)

炭酸夸阿雅科耳(杜俄他耳) Duotali 0.5

乳糖 Sacchar. lactis 2.0

右分三包，一日三回分服，（食後）M. F. Pulv. No. III. S. Auf 3 mal tägl. z. n.

炭酸夸阿雅科耳(杜俄他耳)在腸內分解而變爲夸阿雅科耳，乃被吸收，故有腸內防腐之效，除治結核症外，又可用以治療腸內異常發酵，下痢，腸室扶斯等(一日量〇·五乃至一·〇)，

作散劑或作丸劑使用均可。

常用配合藥品 (第二方)

。 安替正林 Antipyrinum. (極量一回一。〇
一日三。〇)

阿斯正林 Aspirin.

正拉密洞 (極量一回〇。三, 一日一。〇)

Pyramidonum.

莨菪膏 (極量一回〇。〇五, 一日〇。一

五) Extractum Scopoliae.

鹽酸黑羅英(極量一回〇。〇〇五, 一日〇

。〇一五) Heroinum hydrochloricum

鹽酸嗎啡 (極量〇。〇三, 一日〇。一)

Morphinum hydrochloricum.

磷酸科亭(極量一回〇。一, 一日〇。三)

Codeinum phosphoricum.

次硝酸鉍 Bismutum subnitricum.

狄亞斯他斯 Diastase.

重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum.

煨製鎂 (重質) Magnesia usta (ponder-

osa).

龍膽末 Pulvis Rad. Gentianae.

安替飛亭林 (極量一回〇・三, 一日一〇)

○) Antifebrini (醋酸阿尼利德)

第三方

乏戈耳 Fagoli 0.5—1.0

乳糖 Sacchar lactis 2.0

右分三包, 一日三回分服, M. F. Pulv. No III. S. Auf 3 mal tägl. z. n.

乏戈耳爲碳酸夸阿雅科耳之代用品, 肺結核症一日量由〇・五起, 漸次增量至一・〇乃至一・五, 使之持長使用。慢性腸加答兒又可用之以作腸內防腐之目的, 本品達腸內徐徐分解。故無局所腐蝕性, 且其作用亦爲緩和, 故適於長久使用。(求防腐之目的以焦科耳爲佳, 其用量一日〇・五。)

僱用配合藥品 第三方

與碳酸夸阿雅科耳相同。

第四方

炭酸克遼瑣忒(克遼瑣他耳) Kreosotum
Carbonicum (Kreosotalum)

△炭酸克遼瑣忒爲克遼瑣忒之代用品，肺結核，氣管枝肺炎，百日咳，肺炎 麻疹，實扶的壁等均宜用之，本品爲糖漿樣之溶液，易於服用，又不害胃，混於牛乳，咖啡，肝油等服用，或作丸劑，乳劑，或裝入膠囊內服亦可，一日由〇・五起，漸次增量而達五・〇乃至一〇・〇，肺炎更可稍用多量，(一日數回二・〇至四・〇)，藥局現有製就之炭酸克遼瑣忒丸販賣。

第五方

炭酸克遼瑣忒 Kreosoti Carbonici 5.0
(克遼瑣他耳) (Kreosotali)

卵黃 Eidotter No. 1

桂皮水 Aquae Cinnamomi 70.0

右爲乳劑，一日三回，每回一食匙，
F. Emulsio. S. Täglich 3 mal 1 Esslöffelvoll ʒ

℞

第六方

碳酸克遼瑣忒 Kreosoti carbonici 14.0

肝油 Lebertran 150.0

右一日三回，每回一食匙，S. Täglich
3 mal 1 Esslöffelvoll z. n.

第七方

(10%碳酸克遼瑣忒乳劑，腺病質之小兒及
小兒氣管枝加答兒等多賞用之。)

○碳酸克遼瑣忒 Kreosoti Carbonici 10.0

亞拉伯樹膠 Gummi arabici 5.0

乳化水 Aquae Emulsionis 7.5

水全量 F. Emulsio 100.0

右爲乳劑，隨年齡之大小投以適量，
D. S. Für Kindesalter q. s.

應日配合藥品 (第七方)

薄荷水 Aqua Menthae.

橙皮糖漿 Sirupus Aurantii Corticis

桂皮水 Aqua cinnamomi.

△碳酸克遼瑣忒小兒用量(一日量)

一歲以下.....○。二五——一。○
 一歲——四歲.....一。○ ——二。○
 四歲——六歲.....二。○ ——三。○
 六歲——一〇歲.....三。○ ——四。○

△其他之結核劑。

- a. 焦科耳(Thiocol) 爲克遼瑣忒之良好代用品,係可溶性之粉末,與以散劑或水劑均可(用量一日量○。五——一。○——一。五)
- b. 西羅林(Sirolin) 卽克遼瑣忒十分,橙皮糖漿百分和成之液也,虛弱小兒之貧血結核等最適用之,混於牛乳或咖啡內,食後服用,小兒用量一回一。○乃至二。○,一日與以三回。
- c. 潑羅民(Pneumin) 爲克遼瑣忒之代用品,係不溶性之黃色粉末。與乏戈耳相類似,(用量,一日一。○——一。五)
- ã. 伊希焦耳(Ichthyol) (一日量○。一至○。二,一日服用數回,作成丸劑用)

- e. 氯化鈣 Calcium chloratum (Ca Cl_2)
(非氯素石灰)，刺戟胃爲其主要作用，
兌爲一%至二%至三%溶液，(用一%
溶液爲宜)，注入皮下或靜脈內，(皮下
注射有來壞疽之慮，故須特別注意。
- f. 碘化鈣(Calcium iodatum) 兌爲三%溶
液，藥店中有裝成玻管之製品，(須注意
其適應症)

七. 吸入劑

(Inhalationsmittel.) (Inhalans.)

吸入劑用以溶解氣道比較的深部所附着之結液，使其喀痰易於喀出者也，又可防止呼吸氣管之乾燥，或供消炎消毒之作用，或用以制限分泌，或鎮靜咳嗽，皆視其症狀之輕重，一日吸二三回，每回吸十至十五分鐘，漸次遞增。

吸入劑之種類 (普通所用吸入藥爲—%重碳酸鈉水,一至二%硼酸水,一%食鹽水等。)

一, 緩和劑

能使上氣道之粘膜溼潤, 溶解一部分粘液, 咽頭道之疼痛, 瘙痒用之有效。

a. 水蒸氣(Wasserdampf)

b. 六%甘油溶液(6% Glycerinlösung)

二, 溶解劑

溶解粘稠之分泌物, 使粘液腺之分泌亢進。

a. 重碳酸鈉水 (一至二%) (1—2% Natrium bicarbonicum)

b 食鹽水 (〇.五至一%) (0.5—1% Kochsalzlösung)

c. 重碳酸鈉食鹽水 (各〇.五至一.〇%)

三, 收斂劑

咽喉, 氣管之慢性加答兒於分泌過多時用之。

a. 明礬水(〇.二%)(0.2% Alaunwasser)

b. 坦甯酸水(〇・二%) (0.2% Acidum tannicum)

c. 硫酸鋅水(〇・二%) (0.2% Zincum sulfuricum)

四、消毒劑 分泌物腐敗，呼氣不快而有臭氣時用之。

a. 精製退雷彬汀油 (兌爲一%樹膠漿液) (Oleum Terehinthinae rectificatum)

b. 硼酸水(二%) (2% Acidum boricum)

c. 硼砂水(〇・五%) (Borax)

d. 氯酸鉀水(二・〇%) (Kalium chloricum) (Kclo₃)

五、麻醉劑

咳嗽刺戟強烈時用之。

a. 臭化鉀水(〇・二至〇・五%) (Kalium bromatum)

b. 鹽酸科卡音水(〇・一%) (Cocainum hydrochloricum)

- c. 阿片醇水(〇·五%)(Tinctura Opii)
- d. 杏仁水液(一至一·五%)(Aqua Lauro-Cerasi)

吸入劑僅能達氣管枝分岐點之稍下方，如使其達於更深之部位，非營深吸氣不可。

第一方(各1%重鹽水)

重碳酸鈉 Natrii bicarbonici	4.0
食鹽 Natrii chlorati	4.0
甘油 Glycerini	4.0
溜水 Aq. destillatae	400.0

右吸入料 S. Zur Inhalation.

有時可用各二%重鹽水，視症狀如何，可加以相當之藥品，如咳嗽刺戟劇烈時則加一〇至一五滴阿片醇，又如上氣道之充血劇甚時，則加數滴鹽化腎上腺鹼，吸入後即感爽快。(時有中毒之恐，須注意使用。)

△單用以作鎮咳及鎮靜之目的者如左：

- a. 一至一·五%杏仁水液(Aqua Lauro-Cerasi)

b. 〇·二至〇·五%阿片醇水 (Tinctura Opii)

c. 〇·五至——二%臭化鉀液 (Kalium bromatum)

以上均爲吸入料

第二方 (不用吸入器使之吸入)

a. 郁加列孛忒醇 (Tinctura Eucalypti)

b. 拉凡大油 (拉凡大精) (Oleum Lavandulae) (Spiritus Lavandulae).

右各滴一 至二滴於熱湯內，一日數回，用漏斗吸入。

(慢性氣管枝炎，腐敗性氣管枝炎，氣管枝擴張)

c. 退雷彬汀油 (Oleum Terbinthinae)

右朝夕二回，每回用 $\frac{1}{2}$ 咖啡匙加入熱湯內吸入。

注意

吸入後須洗拭顏面，特以小兒爲然；否則能誘起濕疹。

吸入時患者極爲苦悶，其用法須常臨機應變，應慎重而不可濫用，蓋能誘起上氣道之加答兒故也。

吸入液宜用微溫。

如患者不願吸入時，可使水蒸氣發散於病室內以代之。

八、含嗽劑

(Gurgelwasser, Gargarisma.)

含漱僅能使藥劑達於口腔及咽頭，非六歲以上之小兒難於使用，若幼兒於必要時，可用布片及毛筆拭拂或塗布口腔，或與以吸入劑，或用樹膠球洗滌口腔亦可。

含嗽劑之藥效作用現於局所，可除去菌

分泌物，又能清淨咽頭，口腔。

第一方

2% 硼酸水 2% Acidi borici 400.0

右合嗽料 S. Gurgelwasser.

(可稍加馬尾藻紅使著輕度之紅色)

第二方

(0.2% 明礬薄荷水)

明礬 Aluminis 0.8

薄荷水 Aq. Menthae 20.0

水 Aquae 400.0

右合嗽料 S. Gurgelwasser.

有消炎，收斂，防腐，及止血作用（急性炎症）

(可作輕度之馬尾藻紅著色)

第三方

2% 氯酸鉀 ($KClO_3$) 2% Kalii chlorici 400.0

右為含嗽料 S. Gurgelwasser.

(防腐，消毒) 治污穢之潰瘍宜用之。

其他之含嗽劑

- a. 三%過氧化氫 (H_2O_2) (怕希德羅耳 (Perhydrol) 一分, 加水二十分使用)
- b. 〇·一乃至〇·二%過錳酸鉀水 Kalium permanganicum.
- c. 一至三%重碳酸鈉水 Natrium bicarbonicum.
- d. 一至三%硼砂水 Borax (Natrium boricum) ($Na_2B_4O_7$)
- e. 沒藥醇 Tinctura Myrrhae. (五%液)
- f. 拉他尼阿醇 Tinctura Ratanhiae. (五%液)

九, 鎮痛劑

(Anodyna, Analgetica.)

鎮痛劑者, 使大腦灰白質之疼痛感受性起部分的麻痺之藥劑也。但麻醉藥之鎮痛作用, 非為部分的, 皆伴有大腦機能麻痺之作用。用少量之鎮痛劑, 亦有良好之催眠效力。

適應症

- 一，用局所麻醉劑或皮膚刺戟等，不易達鎮痛之目的時。
- 二，內臟現烈疼痛之際。
- 三，因疼痛而來不眠症及神經興奮等之際。

第一方 (鹽酸嗎啡極量一回0.03, 一日0.1)

鹽酸嗎啡 *Morphini hydrochlorici*

乳糖 *Sacchari lactis*

右爲一包，頓服用 *M. F. pulv. No. I.*
S. Auf einmal z. n.

調劑上所用鹽酸嗎啡，加以乳糖豫先製爲五十倍，或百倍，使用較爲便利(但須十分研和)

治療的作用 欲得鎮痛，鎮咳，呼吸鎮靜，催眠，腸運動靜止，及鎮吐等目的，均可用之。至於阿忒羅品中毒，腸出血，伴有疼痛之平滑筋痙攣，糖尿病，尿崩症，多尿，口渴等，亦宜應用。

副作用 縮瞳作用，嘔吐，膀胱括約筋痙攣，溫熱中樞麻痺，對於子宮收縮運動，用少量則充進，大量則麻痺，能使頭部，顏面之血管擴張，促

繼發汗。

鹽酸嗎啡即用少量(〇。〇三至〇。〇五)亦有中毒者,特以對於小兒極為銳敏,故能設法避用為佳。

如持久使用鹽酸嗎啡,則成慢性嗎啡中毒,若此時突然中止,則現不安,不眠,苦悶,欠伸,嘔氣,下痢,虛脫等類禁止現象。

鹽酸嗎啡對於疼痛,不論其種類如何,皆能奏效;但臨用時須十分慎重考慮,尤以老人,小兒,慢性消耗性疾患,衰弱患者,心臟腎疾患等,更當特別注意。

第二方

1% 鹽酸嗎啡水 1% Morphinum hydrochloricum

右注射料 (1.0cc中含00.1) S. Zur Injektion.

(此注射液應置於暗處,貯蓄至四週以上,則不可用),(一回量半筒至一筒)。

第五方

鹽酸嗎啡 Morphini hydrochlorici	0.05
阿片膏 Extracti Opii	0.15
黃芩膏 E. Xtracti scopoliae	0.2
可可脂 Oleum Cacao	7.5

右爲肛門坐藥五個 N. F. Suppositori[®]

D. No. V.

一日用一至二個(膀胱加答疼痛時兒用)

S. Täglich No. I—II z. n.

△鹽酸嗎啡小兒用量(一回極量)

一歲以下之小兒應嚴禁用(一歲以上者亦當注意)

一歲——二歲	…0.000三	——0.000五
二歲——四歲	…0.000五	——0.00一
四歲——六歲	…0.00一	——0.00二
六歲——八歲	…0.00二	——0.00三
八歲——一〇歲	…0.00三	——0.00四
一〇歲——一二歲	…0.00四	——0.00七
一二歲——一五歲	…0.00七	——0.0一

第六方 (磷酸科亭極量一回0.1; 一日0.3)

磷酸科亭 Codeīni phosphoricī 0.03

乳糖 Sacchdri lactis 0.5

右爲一包，頓服用，M. F. Pulv. No.

I. S. Auf cenmal z. n.

第七方

磷酸科亭 Codeīni phosphoricī 0.1

乳糖 Saccoari lactis 2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Auf 3 mal täglich z. n

劇烈咳嗽用磷酸科亭較鹽酸嗎啡更爲有效，而比較的無害，且連用之，亦少有現嗎啡中毒樣之症狀者。

調劑上使用豫先製爲十倍用者，較爲便利。

△磷酸科亭小兒用量(一回極量)

二歲——三歲.....○。○○一

四歲.....○。○○二

六歲.....○。○○五

八歲.....○。○一

一—二歲.....〇〇〇二

△又小兒用量(一日量)

一歲——四歲.....〇〇〇二

五歲——七歲.....〇〇〇八

八歲——一〇歲.....〇〇一五

磷酸科亭遇鉀鹽或鈉鹽時引起沈澱。

磷酸科亭之鎮咳作用優於鹽酸嗎啡，適於小兒使用。

磷酸科亭可作止痢劑用，又多尿症亦適用之。

第八方

磷酸科亭 Codeīni phosphorici 0.2

蒸溜水 Aquae destillatae 10.0

右皮下注射料 S. Zur subkutanen

Injektion.

第九方 狄俄寧(鹽酸乙完基嗎啡)(極量一

回00.3;一日0.1)

狄俄寧 Dionin.

狄俄寧之鎮痛，麻醉作用雖遜於鹽酸嗎啡。

但作鎮咳劑，較爲有力，其副作用弱，且習慣作用亦少。

或內服或作皮下注射。

△作鎮咳劑用之小兒用量(一回量)(狄俄寧)
(鹽酸乙完基嗎啡)

一歲——二歲...〇・〇・〇一

二歲——四歲...〇・〇・〇二

四歲——六歲...〇・〇・〇二至〇・〇・〇三

六歲——八歲...〇・〇・〇三至〇・〇・〇五

八歲——一〇歲...〇・〇・〇五至〇・〇・〇八

一〇歲——一五歲...〇・〇・〇八至〇・〇・〇一

第十方

盼妥烹 Pantopon

內用或皮下注射，(用玻管製就品)。

用量 用鹽酸嗎啡之倍量，有鎮痛，鎮靜，制瀉，鎮咳，催眠之作用，爲鹽酸嗎啡之代用品，頗有卓效，然不可濫用，否則易惹起盼妥烹中毒。

第十一方 (鹽酸黑羅英極量一回0.005;

一日0.015)

鹽酸黑羅英Heroini hydrochloric 0.003

乳糖 Sacchari lactis 0.5

右爲一包，頓服用 M. F. pulv No. I.

S. Auf einmal z. n.

第十二方

鹽酸黑羅英Heroini hydrochlorici 0.01

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. Pulv.

No. III. S. Auf 3 mal tägl. z. n.

鹽酸黑羅英以作鎮痙，鎮咳劑，使用其水劑或散劑，但不可與鹼劑，重碳酸鈉，銹苗香精，阿坡嗎小配合，小兒使用時須特別注意，加答兒性肺炎患者，寧以不用爲佳。

連用則起慢性中毒(黑羅英中毒)。

△鹽酸黑羅英小兒用量(一回量)(須特別注意)

一歲以下.....0.000——0.000三

二歲——四歲...0.000三——0.000五

五歲以上……………0.000 g → 0.001

調劑上鹽酸羅英作成十倍之豫製劑，使用時較爲便利，（但須充分混合）。

應用配合藥品（第十二方）

莨菪膏（極量一回0.05，一日0.15）
五）Extractum Scopoliae.

安替正林 Antipyrinum.（極量一回0.0，一日三.0）

阿斯正林 Aspirin.

碳酸夸乍科耳 Guajacolum carbonicum,
（杜俄他耳）(Duotalum)

乏戈耳 Fagol.

杏仁水（極量一回二.0，一日六.0）
Aqua Lauro-Cerasi.

第十三方

0.5% 鹽酸黑羅英水 0.5% Heroinum hydrochloricum.

注射料（半筒注射）S. Zur Injektion
($\frac{1}{2}$ Spritz) zu injiziren)

第十四方 (阿片末極量一回 0.15; 一日 0.5) (阿片膏極量一回 0.1; 一日 0.3)

阿片末 Pulveris Opii	0.15
乳糖 Sacchari lactis	2.0

右分三包, 一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Auf 3 mal tägl. z. n.

阿片之作用與鹽酸嗎啡略同, 但其作用較爲緩和。

阿片又可作爲制瀉劑用。

可用以使腸管達運動靜止之目的, (腸出血, 腸管穿孔, 腹膜炎, 盲腸炎之際)。

因腸閉塞, 鉛毒疝痛, 滯便等而起之便秘, 用阿片緩和腸壁之攣縮, 反可利便通者有之。

第十五方 (阿片醇極量一回 1.5; 一日 5.0)

阿片醇 Tincturae Opii	1.0
純糖漿 Sirupi simplicis	10.0
溜水 Aquae destillatae	100.0

右爲一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

應用配合藥品 (第十五方)

薩利潑粘漿劑加於阿片醇內，以作內服或灌腸劑用(Mueilago Salep)。此種灌腸劑大腸加蓋兒發現疼痛時賞用之。

鹽酸清涼水亦可加入阿片醇 Salzaure-Limonade.

著木龍醇 (極量 一〇，一日二〇)

○) Tinctura Strychni.

桂皮醇 Tinctura cinnamomi.

芳香醇 Tinctura aromatica.

纈草醇 Tinctura Valerianae.

△阿片醇可與乳糖混和作成散劑

△阿片醇小兒用量 (一日極量) (須注意使用)

一歲	〇・〇二五	至	〇・〇五
一歲	——	二歲	〇・〇五
		至	〇・一	
三歲	——	五歲	〇・一
		至	〇・二	
五歲	——	一〇歲	〇・二五
一〇歲	——	一五歲	〇・三
		至	〇・五	

第十六方 陀肥耳氏散，(極量一回1.0，
一日3.0)

陀肥耳氏散 Pulveris Dover 0.5
乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Auf 3 mal täglich z. n.

△陀肥耳散對於腸加答兒，止痢，鎮咳，鎮痛，發汗等均可使用。

△陀肥耳小兒用量(一回量)

一歲至二歲…〇・〇〇一至〇・〇〇三

三歲至四歲…〇・〇〇三至〇・〇〇五

五歲至一〇歲…〇・〇一至〇・〇二

一一歲至一五歲…〇・〇三

第十七方 (莨菪膏，極量一回0.05，一日
0.15)

莨菪膏 Extracti Scopoliae 0.02—0.03
乳糖 Sacchari lactis 0.5

右爲一包，頓服用 M. F. pulv No. I.

S. Auf 1 mad z. n.

第十八方

莨菪膏 Extracti Scopoliae 0.06

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Auf 3 mal täglich z n.

△莨菪膏使用其二倍用，五倍用，或十倍用之豫製劑，比較便利，（莨菪膏亦可作為水劑使用），（須充分研和）。

△莨菪膏小兒用量（一日量）

未滿半歲之小兒.....○。○○二五

一歲以下.....○。○○五

一歲以上.....()。○○七五

二歲.....○。○一

三歲.....○。○一二五

五歲.....○。○一五

用配合藥品（第十八方）

杜俄他耳 Duotal.

乏戈耳 Fagol.

安替正林 Antipyrinum. (極量一回一。)

○;一日三。○)

阿斯匹林 Aspirin.

醋酸阿尼利德(極量一回○。三,一日一

○) Acetanilidum.

水楊酸鈉 Natrium salicylicum.

重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum.

煨製鎂 Magnesia usta.

龍膽末 Pulvis Rad. Gentianae.

樟腦 Campher

其他之鎮痛劑

○莨菪醇(極量一回一。○;一日三。○)

○庶斯膏(極量一回○。一;一日○。三)

與莨菪膏相同,使用作為十倍用之豫製劑,
較為便利,(充分研和)。

庶斯膏 Extracti Hyoscyami 0.03

杏仁水 Aquae Lauro—Cerasi 1.5

糖水 Zuckerwasser 30.0

右頓服用 S. Auf einmal zu nehmen.

諾德Neulen。對於神經痛,筋肉痲痺質斯,肩張

等均能奏效，一回用一。〇，作皮下注射用。

○Panloid。有鎮痛，鎮咳之效力。

○Tetrodoxin。對於僂麻質斯有效。

○Narcopon。可作一般麻醉及鎮痛劑用，(內服，灌腸，坐藥，皮下注射)

內服，大人一回〇。〇三——〇。〇三克，一日〇。〇三——〇。〇六克(粉末)

皮下注射，大人一回量〇。六c.c. 或一。一c.c.，吸入一筒內注射。

○鹽酸西羅麥林 Sinomenium hydrochloricum，以治僂麻質斯及神經痛。

內服，大人一回量〇。〇三——〇。〇五克(一日三回)(水劑，散劑)

皮下注射，一回量一c.c. (含〇。〇三)，一日注射一至二回。

○阿妥反 Atophan., ($C_{16}H_{11}NO_2$) (Phenylchinolinolincarbonsäure) 爲細針狀之結晶，不溶於水，微有苦味，痛風，筋肉僂麻質，神經痛，淋疾性關節炎，偏頭痛，疝氣等，其他尿酸代謝

機能上，均可應用本品治療，用量，一日三——四回，每食後用少量之水服〇。一——〇。二克，(一錠——二錠)，服後乃飲用多量之水，同時再飲用鹼性飲料水，及清涼水等。

阿妥反黑耳 Atophanyl即Pohnylechinolinolincarbonsäure Natrium 與水楊酸鈉等量之二〇%之無菌性溶液也，每管內含五c.c.，其應用與阿妥反相同。(寒冷時能結晶，溫暖則溶解)，用法及用量，一回一管，(五c.c.)。注入靜脈內，或筋肉內，(臀肉)，一回增至三管 (一五c.c.)，亦無大礙，使用本品，須隨病之輕重，數回反覆，(德Schering製品)。

一〇，鎮靜劑

(Sedativa.)

減弱中樞神經系之興奮性所用之藥劑，是謂鎮靜藥。

適應症 知覺或運動中樞之異常興奮，即神經過敏症或痙攣等，均應用之。

溴素劑 (Brom—praeparate)

溴素劑之應用，用治癲癇，破傷風，小兒之瘳癲等，均能奏效，對於百日咳之發作，臟躁症，神經衰弱，神經及過敏症等，則有鎮靜之效，又對於不眠症，神經性嘔吐，妊婦惡阻，船暈等，亦有效力。

注意 應用溴素劑之際，則當減少普通之食鹽攝取量，乃有作用著明，效力持續之利，本劑於空腹時不可服用，又於服藥中須禁忌攝取酒性及酸性物。

使用溴素劑屢屢發現慢性中毒(溴素中毒)，此時須與以食鹽水，至於中止本劑之應用，固無論矣。

溴素中毒 發現全身倦怠，記憶力及思考力減退，頭痛，口蓋及咽頭之反射機能消失，陰萎，及溴素面皰等狀。

溴素劑之主要者：

- 一，溴化鉀 Kalium bromatum.
- 二，溴化鈉 Natrium bromatum.
- 三，溴化銨 Ammonium bromatum.

用量 通常一日內服三回，每回〇・五至一・〇，但此等溴素鹽類，往往損害胃臟，故須伍以重碳酸鈉等鹼劑，而溶解於多量之水內，又常與瀉草劑混合使用，有時用以大量，（一日一〇・〇以上），亦不呈其他副作用。

較近因欲避溴素慢性中毒起見，故有盛行用其有機性化合物之傾向，其效力雖較微弱，但對於上述無機化合物有特異質之際，甚適用之。

溴素有機化合物之溴化樟腦，其極量一回〇・三，一日一・〇。

溴化鈉適於持久服藥，及小兒使用。溴化鉀如小兒持續使用多量時，則現食慾不振，且其刺戟粘膜之作用，亦較溴化鈉為強。

溴化樟腦之應用，使用量等，均與溴化鈉相同，溴化鈉之鎮靜作用雖較溴化樟腦為強，但容易損害消化作用，溴化樟腦往往與鈉，鉀劑配合使用。

溴化鉀，溴化鈉，溴化銻等混於冷卻之乳汁，或 Seltrerswsser 內服用，可使其味矯正。

第一方

溴化鉀 <i>Kalii bromati</i>	2.0
苦味醇 <i>Tincturae amraae</i>	1.5
溜水 <i>Aq. destillatae</i>	100.0

右一日量，三回分服 *S. Täglich 3 mal zu nehmen.*

溴化鉀小兒用量(一回量)

一歲以下	○。一	—	○。二
一歲——二歲	○。二	—	○。三
三歲——四歲	○。三	—	○。五
五歲——一〇歲	○。五	—	一。〇
一〇歲——一五歲	一。〇	—	二。〇

有時可用其數倍量 (一般小兒對於溴素劑
堪用比較的大量)

溴化鉀與酸類配合禁忌，空腹時不宜服用，
於服藥期中。應減少食鹽之攝取，又須禁用酒精
類飲料。

用配合藥品 (第一方)(溴化鉀)

纈草醇 *Tinctura Valerianae.*

續草根浸 Infusum Rhizomae Valerianae.

碘化鉀 Kalium iodatum.

溴化鈉 Natrium bromatum.

溴化銨 Ammonium bromatum.

抱水克羅拉耳(極量一回二。〇, 一日六。〇) Chloralum hydratum.

安息香酸鈉咖啡蘇 Caffeïno—Natrium benzoicum. (極量一回一。〇; 一日三。〇)

重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum. (最好配合伍用)

攝爾德耳水 Selterswasser. (能防害胃)

否雷耳水 Liquor Fowleri. (能防臭素疹)

磷酸科亭 (極量一回〇。一; 一日〇。

三) Codeinum Phosphoricum.

安替疋林 Antipyrinum. (極量一回一。〇; 一日三。〇)

庶斯醇 (極量一回一。〇, 一日二。〇)
Tinctura Strychni.

苦味醇 Tinctura amara. 杏仁水 Aqua
Pruni armeniacae.

硫酸鎂 Magnesium sulfuricum.

龍膽醇 Tinctura Gentianae. 粗末大黃浸
Infusi Rhizom. Rhei.

孛盧金 Brocin

莨菪膏(極量一回〇・〇五,一日〇・一五)

Extractum Scopoliae.

莨菪醇(極量一回一・〇,一日三・〇)

Tinctura Scopoliae.

磷酸鈉 Natrium Phosphoricum.

狄吉他利斯劑 Digitalis—Praeparate.

斯忒羅皮忒醇(極量一回〇・五,一日一・〇)

五) Tinctura Strophaut.

第二方

溴化鉀 Kalii bromati	2.0
溴化鈉 Natrii bromati	2.0
溴化銹 Ammonii bromati	1.0
苦味醇 Tincturae amarae	2.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量，三回分服(癲癇)S. Täglich
3 mal z. n. (Epilepsie)。

第三方

溴化鈉 Kalii bromati 0.6

煨製鎂 Magnesiae ustae 1.5—2.0

右一日量，分三包，三回分服，M. F.
pulv. No. III s. auf 3 mal t. z. n.

◎續草及阿魏 (Rhizoma Valerianae et
Asa foetida)

爲有惡臭之藥劑，一般神經症廣用之，其所以有鎮靜之作用者，非藥被吸收而奏效，乃因其惡臭刺戟臭神經而起反射的機轉也。

用治臟燥症，舞蹈病，神經過敏症等均有效。

第四方

續草根浸 Infusi Rhiz. Valerianae(4.0)100.0

臭化鉀 Kalii bromati 2.0

龍膽醇 Tincturae Gentianae Scabrae 1.0

純醇漿 Sirup simplicis 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. D.

第五方

纈草醇 Tincturae Valerianae 2.0

菴藟醇 Tincturae Scop. liae 1.0

薄荷水 Aquae Menthae 4.0

純糖漿 Sirupi simplicis 10.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. D.

其他之鎮靜劑

溴素樟腦 Camphora m nobromata (C₁₀
G₁₅BrO) (極量一回0.3, 一日一〇〇)

孛羅摩科耳 Bromocoll.

阿他嗎 Adamon.

纈草酸鋅 Zincum Valerianicum

凡利多耳 Valid I.

加耳摩汀 Calmotin. (作鎮靜劑用, 一日量

○。四——○。六,分三回分服。)

亭羅凡林 Brovarin

薩亭羅民 Sabromin

亭隆拉耳 Bromural

亭羅米品 Bromipin

} 皆為溴素劑,其副作用比較少,適於其長時間持續使用。

阿魏醇 Tinctura Aes foetidae.

臭化氫酸斯科坡拉民 Scopolamimum
hydrobromicum. (極量一回○。○○○五。一
日○。○○—五)

臭化鈣 Calcium bromatum. (痙攣素質用
之有效)

氯化鈣 Calcium chloratum.

薩弗蘭(薩弗蘭醇一日數回,服用一。○至
一。五) Crocus. (Tinctura Croci)

歐拉汀 Eulatin.

備考 呼吸鎮靜劑

一, 杏仁水 Lauro-O-rasi

二, 苦扁桃水 Aq. amygdalarum amarar^u
um

(杏仁水苦扁桃水均與甘汞，碘化鉀禁忌併用。)

三。馬克菲拉水 *Aqua Pruni macrophyllae*.

四。羅比利阿醇 *Tinctura Lobeliae*.

一、催眠劑

(Hypnotica, Schlafmittel.)

所謂催眠劑，殆與吸入麻醉劑，為同一之作用，唯催眠劑，僅用以保持長時間之輕度麻醉狀態而已。

一般應用上之注意

適應症 主治真性不眠症

不眠症之種類：

一，真性不眠症，即由大腦皮質興奮性之亢進而致不眠者，（用催眠藥最有效力）。

二，由精神發揚而來者，（可用鎮靜藥）

三，由疼痛，咳嗽刺戟而來者，（可用嗎啡劑）。

（二）（三）兩種稱曰續發性不眠症

不眠症有（一）就眠困難（二）睡眠淺而不能熟睡兩種：前者應用吸收迅速而易分解或排泄者，後者則反是。

習慣 催眠劑易成習慣性，故不可連用同一之藥物，且對於心臟及血管均有損害，故有循環系疾病時使用之，應宜特別注意。

如薩耳佛那耳（Sulfonal）類之催眠藥，又能刺激腎臟。

溴素劑之副作用，能來發疹，反射機能減退，大腦機能之鈍麻等狀。

於使用催眠藥之前，須避除各種刺戟，（例如光線，音響，寒熱，饑餓，疼痛等），尚須查其

不眠之原因，性狀，程度，及素質等，而斟酌加減其用量。

併用異種催眠劑（二種以上），如能配合適當，則可增加其作用，而減少副作用。

小兒期使用催眠藥，應有一定之限制，必要時只可用抱水克羅拉耳，肥羅那耳，李羅摩科耳，肥羅那耳鈉，Medinal，忒來俄那耳，阿大林等。

第一方（抱水克羅拉耳極量一回2.0；一日6.0）

抱水克羅拉耳Chlorali hydrati	1.0
純糖漿 Sirupi Simplicis	3.0
溜水 Aq. destillatae	30.0

右頓服用 S. Auf einmal zu nehmen

抱水克羅拉耳小兒用量（一回量）（灌腸料）（參看後頁備考）

初生兒……………	○。○三——○。○六
哺乳兒……………	○。○六——○。一五
六歲……………	○。二五——○。三五
一〇歲——一二歲…	○。四五——一。○

時而可用其二倍量，作為純水劑。或混入牛

乳，或和入粘漿性液，以作灌腸用。

一回量（小兒內服量）

哺乳兒……………○。○三——○。一

三歲——四歲……○。一 ——○。二

五歲——九歲……○。二 ——○。四

右爲內服量（小兒）

應用上之注意（抱水克羅拉耳）

抱水克羅拉耳多用於就眠困難之際，亦可用以治疼痛，咳嗽等，但無著效，特異質者宜注意用之，如與嗎啡劑同時併用，則易發現中毒，故宜注意焉。

用量 通常用一。○至二。○溶解於多量之糖水內，食後內服，或混於牛乳或亞拉伯樹膠漿劑，以作內用或灌腸料。

適應症 除不眠症外，又可用其大量以作鎮靜劑，以治精神發揚，躁狂，酒客譫妄症。

禁忌 胃腸加答兒。心臟，肺臟及血管疾患。

△屬於小兒科之腦膜炎之刺戟症狀，殊以瘧變等，最賞用之。

□抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 1.0
樹膠漿 (局方, 約33%) Mucilaginis
Gummi Aarb. 30.0
右頓服用 (大人用) S. Auf einmal
zu nehmen.

□抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 1.0
溜水 Aq. destillatae 8.00
右每三小時服一茶匙 S. 3 stündlich
1 Theelöffel z. n.

(初生兒破傷風) (Tetanus neonato-
rum)

□抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 1.0
溴化鉀 K. bromati 1.0
(溴化鈉) (Nat. bromati) (1.0)
樹膠漿 Mucilag. Gum. Arab. 30.0
右頓服用 (大人用) S. Auf einmal
z. n.

□抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 2.0—3.0
純糖漿 Sirupi simplicis 1.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右每二小時服一茶匙 (小兒痙攣)

S. 2 Stündlich 1 Theelöffel (Krampf der Kinder).

□抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 0.25

溴化鉀 Kalii bromati 0.75

純糖漿 Sirupi simplicis 5.0

溜水 Aq. destillatae 35.0

右一日量, 三回分服 (二歲腦膜炎) (破傷風) S. Auf 3 mal täglich z. n. (Tetanus).

備考 破傷風療法, 除用抱水克羅拉耳, 臭化鉀, 薩耳佛那耳, 忒來俄那耳, 肥羅那耳, 克羅羅封, 鹽酸嗎啡, 破傷風血清等外, 最近美國醫生麥爾替爾氏謂用硫酸鎂之皮下注射有效, 頗為諸家所贊許, 其方法即用一〇%——二五%之硫酸鎂溶液持續注射, 一回注入 (靜脈或皮下) 五.〇至一〇.〇, 同時併用抱水克羅拉耳, 鹽酸嗎啡等藥劑, (體重一尅約用硫酸鎂〇二)。

□ 抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 3.0
 鹽酸嗎啡 Morphini hydrochlorici 0.20
 橙皮糖漿 Sirupi Aurantii Corticis 10.0
 溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量，三回分服（鎮靜精神）

S. Taglich Auf 3 mal z. n.

□ 抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati 2.0
 樹膠漿 Mucilaginis Gummi Arabic
 50.0

右爲灌腸料 S. Zum Klystier (eventuell Tinctur. Opii 10—15 Gtt.)

（可加入阿片醇10—15滴）

抱水克羅拉耳作爲灌腸料時，其用量稍較內服量增加，溶解於五〇〇乃至一〇〇〇粘滑液漿液，或牛乳（可加入卵黃）內，若於必要時，可加入一〇乃至一五滴阿片醇。

注意 一，抱水克羅拉耳作成水溶液，如貯藏過久，則徐徐分解。
 二，與安替尼林配合禁忌。

應用配合藥品 (第一方) (抱水克羅拉耳

溴素劑 Brom-präparate. 阿片醇 Tinctura Opii (極量一回一·五, 一日五·〇)

鹽酸嗎啡 Morphini hydrochlorici (極量一回〇·〇三, 一日〇·一)

馬前子醇(蕃木龍醇)(極量一回一·〇, 一日二·〇) Tinctura Vomicae(T. strychni)·

橙皮糖漿 Sirupus Corticis Aurantii.

第二方(薩耳佛那耳極量一回1.0;一日3.0)

薩耳佛那耳 Sulfonali 0.5—0.8

右溶解於多量溫湯內服用(頓服用)

S. in Warmem wasser gelsöt, Auf einmal
z. n.

(不發興奮作用, 於長時間內能催睡眠比較的深熟, (普通用量〇·六,) 於就眼前二小時溶解於多量之溫湯內服用)。

第三方(肥羅那耳極量一回0.5;一日1.0)

(Acidum diaethylbarbituricum)

肥羅那耳 Veronali 0.3—0.5

乳糖 Sacchari lactis 0.5

右頓服用 S. Auf einmal z. n.

(爲奏效確實之優良催眠藥，用量〇。二五——〇。五，不可連用一週以上)。

第四方

溴化鉀 Kalii bromati 1.0—1.5

煨製鎂 Magnesiae ustae 0.5

右爲一包，頓服用 S. Auf einmal z. n.

其他之催眠劑 (頓服量)

忒來俄那耳 (0.5—0.8) Trional. (極量一回一。〇，一日三。〇)。

阿大林 (0.3—1.0) Adalin.

諾伊羅那耳 (0.5) Neuronal.

孛隆拉耳 (0.3—6.0) Bromural.

孛羅凡林 (0.3—6.0) Brovarin.

狄阿耳 (0.1—0.15) Dial.

盧米那耳 (0.2—0.4) Luminal.

黑孛羅汀 (0.3—0.6) Hypnotin.

肥羅那耳鈉 Veronal—Natrium. (又可用

（爲皮下注射或作坐藥）

卡耳摩汀 (0.4—0.6) Calmotin.

備考

注腸用一〇。〇%抱水克羅拉耳溶液之小兒用量如左：（參看一二九頁）

（年齡）	（用量）
一至二月	〇。〇至二。〇（〇。一至〇。二）
三至四月	二。〇至三。〇（〇。二至〇。三）
五至六月	三。〇至四。〇（〇。三至〇。四）
七至十二月	五。〇至七。五（〇。五至〇。七五）
二歲	七。〇至一〇。〇（〇。七至一。〇）
三歲至六歲	一〇。〇至一五。〇（一。〇至一。五）
七歲至十四歲	一五。〇至二〇。〇（一。五至二。〇）


上表括弧內之數字，爲抱水克羅拉耳之含有量）

一二，吸入麻醉劑

(Inhalations-Anaestheica, Narcotica.)

吸入麻醉藥，爲有揮發性之藥品，吾人使用所選擇者，其麻醉作用自在中樞神經系，麻醉作用之順序：最初顯於大腦，次於脊髓，後乃麻醉延腦，而使呼吸運動制止。

傑姆賓氏之麻醉表



第一方

克羅羅封 Chloroformium

因吸入克羅羅封所起之現象，大別爲發揚期，興奮期，麻醉期，假死期等是。

於麻醉期內，如中止吸入，則漸次醒覺，通常發現輕微之頭痛，眩暈，嘔氣，嘔吐等狀，漸漸即恢復常態。

使用注意 用克羅羅封麻醉時間有來臨醉死者，欲豫防及救濟之，必先注意品質之純否，心臟疾患之有無，及醉醉之方法等項，（心臟病，動脈瘤，肺患者，嬰兒，老人，肥胖者，虛弱者等，應用麻醉時均當注意）

於克羅羅封吸入麻醉之前，先用斯科坡拉民嗎啡，Narcopon—Scopolaminum，或Pantopon—Scopolamin等皮下注射，則可使克羅羅封之用量節約，且因而得以減輕克羅羅封所致之惡影響也。

克羅羅封除用為吸入麻醉劑外，又可內服，以治條蟲驅除，嘔吐，胃痛等，亦可作為油劑外用，治療神經痛及癱瘓質斯等。

第二方

麻醉用醇精 Aether für Narkose

醇精之作用與克羅羅封之作用相類似，醇精比克羅羅封對於心臟，血管，及呼吸中樞之害，雖較微弱，但用醇精時，其發揚期劇烈，且不易達深麻醉之目的，又有刺戟氣道粘膜之缺點，

故通常併用兩種，而行混合麻醉，或與催眠劑併用，即可避免一切缺點。

為避除上述之缺點，特將主要之混合醉麻劑例左：

一，必耳羅忒氏 (Billroth) 合劑

克羅羅封 三分 Chloroformii 3 Teil

麻醉用醇精一分 Aether pro narcosi 1 Teil

無水酒精 一分 Alkohol. absolut. 1 Teil

右麻醉用 S. Zur Markose.

二，英法 合劑

無水酒精 一分 Alkohol. absolut. 1 Teil

克羅羅封 二分 Chloroformii 2 Teil

麻醉醇精 三分 Aether pro narcosi 3 Teil

豫先內服抱水克羅拉耳或肥羅那耳，或用 Pantopon—Scopolamin 皮下注射，然後施行混合麻醉，更可得優良之成績。

醇精除用為麻醉劑之外，又可內服或皮下注射以作興奮劑使用，對於胃痙攣惡心，嘔吐，亦可用之內服。

虛脫之際，可用醇精皮下注射。但不可注射於前膊，蓋能惹起醇精麻醉故也。

備考 解熱劑，催眠劑，麻醉劑，混合使用二種或二種以上之藥劑，則其主要作用益形顯著，而副作用減弱，故混合使用，最為便利。

一三，局所麻醉劑 (Lokalanaesthetica.)

局所麻醉劑用於施行外科手術之際。

局所麻醉藥應用之種類

- 一，寒冷麻醉
- 二，表面麻醉
- 三，浸潤麻醉

四，傳達麻醉

五，腰髓麻醉

◎鹽酸科卡音（極量一回〇。〇五，一日〇。一五）Cocainum hydrochloricum

鹽酸科卡音水溶液塗布於粘膜面或創面，則其作用顯於知覺神經之末端，而使痛覺及觸覺麻痺。

欲使其作用顯於皮膚之一局所，則不宜注射於皮下，應注入皮質內。

鹽酸科卡音雖用少量，有時亦能發現中毒症狀，有注射〇。〇一克，即起中毒者，本品對於個人尙有特異性，故宜注意使用，一般科卡音中毒，多來於使用其濃厚溶液之際，（且能頻發）；稀薄者，比較的得用大量。通常對於粘膜，則用濃厚溶液，施鼻腔手術時有用至二〇%者，然屢屢發生中毒症狀，（女子較男子爲多），又用於行齒手術時，（齶齒或拔齒之際），發現中毒症狀者，亦屢見不鮮。

科卡音急性中毒，於科卡音注射或塗布後，

不久即發顏而蒼白，冷汗，四肢厥冷，眩暈，心悸
亢進，脈搏細速，呼吸促迫或興奮，失神，及痙攣
等狀，輕度者即可恢復，重者能致死亡。

科卡音急性中毒療法 先使病人仰臥，與
以甘硝石精，或用亞硝酸阿邁耳二至五滴，滴於
布片或濾紙上，使之嗅入，或用亞硝酸阿邁耳一
至三滴和糖水內服用，（此時須用強心劑）。

□甘硝石精 Spiriti Aetheris nitterosi 0.5—1.0
水(糖水) Aqua (Sacchari) 20.0
右頓服用 S. Auf einmal z. n.

□亞硝酸阿邁耳 Amylii nitrosi 3.0
甘硝石精 Spiriti Aetheris nitrosi 3.0
在混合後滴 3—5 滴於布片上，嗅入 S°

Riechmitetl.

亞硝酸阿邁耳 Amylii nitrosi 2.0

□酒精 Alkohol. 8.0

右混和後，用3—5滴，滴於白糖內服用，
S. 2—5 Tropfen auf zucker z. n.

（甘硝石精（亞硝酸醇精精）嗅入後則

有類似亞硝酸阿邁耳之作用）】

科卡音中毒之豫防

- 一，務用稀薄溶液，
- 二，不可使用多量，
- 三，塗布範圍務宜狹小，
- 四，伍用腎上腺麻，俾科卡音之吸收緩徐，
（鹽酸科卡音液一〇・〇，應加入鹽化腎上腺麻液一滴）。

鹽酸科卡音用以塗佈粘膜，其效力之顯著，雖用諾服卡音濃厚液，亦難代用之也。

科卡音遇熱能起分解，故其消毒法，祇宜用一回短時間（五分鐘）之煮沸消毒，

應用 一，有疼痛，知覺刺戟之際。

粘膜塗布液（〇・五至三％）

鼻腔手術用（五至一〇乃至二〇％）（塗布用）。

二，肛門裂傷，裏急後重之際（〇・〇二至〇・〇五，作為坐藥）。

三，鼻加答兒（〇・一％液，撒霧）

四，點眼藥（○。五至一%）

五，當嘔吐，胃潰瘍，胃癌等發現疼痛時，用之內服。

六，齶齒，拔齒之際，（注射二%液於齒齦）（多起中毒，故宜注意），（通常用 $\frac{1}{4}$ m.m. 口徑之注射針，注入 $\frac{1}{4}$ 乃至 $\frac{1}{3}$ 筒即足矣）。

舍來黑氏浸潤麻醉液

共有三種，但吾人所常用者，爲其第二液。

第二液（舍來黑氏浸潤麻醉液）

鹽酸科卡音	Cocaini hydrochlorici	0.1
鹽酸嗎啡	Morphini hydrochlorici	00.2
食鹽	Natrii chlorati	0.2
蒸溜水	Aquae destillatae	100.9

近時改良者如左：

鹽酸科卡音	Cocaini hydrochlorici	0.05
阿來品	Alypini	0.05
食鹽	Natrii chlorati	0.2
蒸溜水	Aq. destillatae	100.0

此液一回用量在 50.0 以內，（浸潤麻醉法所麻醉之領域狹小，不出藥液浸潤部以外）。

◎諾服卡音（一回極量 0.6） Novocain。

諾服卡音爲白色有光澤之細小結晶，易溶於水，經熱不易分解，故可沸煮消毒，置於密閉之容器內，可久貯不壞。

據李勞恆 (Braun) 氏試驗，其毒力僅等於科卡音六分之一云。

科卡音用極量以內（0.1 至 0.2 五），即能起中毒作用；反之，諾服卡音雖用其大量（1.5），亦不發現何等之副作用。

諾服卡音伍用腎上腺鹽，亦能使其效力持續，（諾服卡音溶液 1.0，應加入鹽化腎上腺鹽一滴）。

粘膜塗布 10% 乃至 20% 之諾服卡音溶液，其效力終不及科卡音之顯著。

◎其他局所麻醉藥

一、鹽酸忒羅怕科卡音 Tropacocainum

(247)

hydrochloricum. (極量一回〇。一，
一日〇。三)

二，阿來品 Alypin.

三，鹽酸斯妥乏音 Stovainum hydrochloricum.

四，乙一殿卡音 Eucain. B.

五，阿羅卡音 Allocaïn S.

六，半卡音 Bancaïn

常用局所麻醉液

(一) 〇。五%鹽酸科卡音液 (0.5% Cocainum hydrochloricum) 一回用量，一〇c.c.以內，(用生理的食鹽水調製)

(二) 舍來黑氏浸潤麻醉液，第二液 (Schleichsche Lösung (No. II.) 一回用量，在五〇c.c.以內。

(三) 〇。五%諾服卡音液 (0.5 Novocain-Lösung) (或〇。五%半卡音液) 一回用量，一二〇c.c.以內 (用

生理的食鹽水調製)。

(四) 一%諾服卡音液 (1% Novocain-Lösung) (或一%半卡音液)

一回用量, 六〇 c.c. 以內, (用生理的食鹽水調製)。

(五) 二%鹽酸科卡音液 (2% Cocainum hydrochloricum)

一回用量, 半筒以內, (齒科用注射液) (參看一四八頁)

(用生理的食鹽水調製, 此液五。〇乃至一〇。〇, 應加入鹽化腎上腺腺一滴)

(六) 齒痛液

鹽酸科卡音 Cocaini hydrochlorici 1.0

鹽酸嗎啡 Morphini hydrochlorici 1.0

克達瑣忒 Kreosoti 10.0

右溶液用小綿球浸濕, 插入齲齒窩內,
(Zahncaries)

附記 其他之齒痛液

- 純石炭酸, (浸於小綿球插入齶齒窩,)
- 克遼瑣忒, (同上)
- { 克遼瑣忒 Kreosoti 1.0
石炭酸 Acidi carbolici 1.0
甘油 Glycerini 1.0

(同上) S. Bei zahncaries

- { 碘醑鉀 Tincturae jodi 1 Teil (1分)
樟腦 Camphor. q.s. (適宜)
酒精 Alkohol. 5 Teil (5分)

(同上,或塗布齒齶後,使之含嗽, Bei Zahnsmerzen)

- 克羅羅封 Chloroformii 1 Teil
- 醇精 Aetheris 1 Teil

右用一滴,塗布於鼻孔內,使之嗅入。

(用上述藥液浸於小棉球,而插入齶齒窩內,雖有鎮痛之效,但其效力甚為微弱,故可再用 Sandaraca 棉球包被之,如將已浸 Sandaraca 之小棉球,更附着少量之鹽酸科卡音末,則其奏效更為確實矣)。

○	}	亞砒酸	0.6	2.0	0.5
		鹽酸嗎啡	2.0	1.0	0.5
		石炭酸	1.0		
		克遜瑣忒	5.0	適宜	適宜

右浸於棉球使用（齒髓腐蝕藥）

（用鹽酸科卡音以代鹽酸嗎啡亦可）

○用重碳酸鈉插入齲齒窩內，亦有效果，

○一%半卡音液（1% Bancaïn）可作諾服卡音之代用品。

一四, 注射劑 (Injektionsmittel)

(凡屬注射劑均須無菌)

△醇精 Aether. 用純粹之醇精緩緩注射於皮下, 一回半筒乃至一筒, (興奮)

小兒使用不可注射於前膊皮下, 因能惹起醇精麻醉之慮, (往往發現劇痛)

△樟腦醇精 Campher-Aether. (—○%),
一回一至二筒, (興奮)

△樟腦橄欖油 Campher-Olivenol. (—%),
一回一至二筒, (興奮) (強心)

△—%鹽酸嗎啡水 Morphinum hydrochloricum. 一回半筒至一筒 (鎮痛) (鎮靜)

△阿忒羅品加嗎啡水 Atropin-Morphinlösung. 一回半筒至一筒 (鎮痛)

{ 鹽酸嗎啡 Morphini hydrochlorici 0.5
 硫酸阿忒羅品 Atropini sulfurici 0.025
 蒸溜水 Aq. destillatae 50.0

(—c.c.中含鹽酸嗎啡 0.01, 硫酸阿忒羅品 0.0005)

△〇。〇五%硫酸阿忒羅品水 Atropinum Sulfuricum. 一回一筒, (鎮痙, 鎮痛, 止汗 (一筒中含〇。〇〇〇五))

△蓬比隆氏愛耳戈汀 Ergotinum Bombelon. 一回〇。五乃至一。〇 (止血)

(臨用時用等量之蒸溜水或—%鹽酸嗎啡)

水稀釋後注射)

△一乃至二乃至三%氯化鈣液 Calcium chloratum。一回一〇。〇乃至二〇。〇乃至三〇。〇，注射於靜脈內，皮下注射能惹起劇痛，(一%溶液不發疼痛)，適應症各種神經痛，止血、肋膜之疼痛，筋痛，出血性素質，帝答尼(Tetanie)，癲癇，喘息，蟻麻疹，血清病，佝僂病，骨軟化症，Basedowii 氏病，碘中毒，碳酸中毒，(二——三%液之皮下注射；往往惹起壞疽)等，均適用之。

患者有時於注射鈣後，發現食慾不振，惡心，嘔吐，發熱，或現溫感快感，而恐以後發熱均不足虞，惟溫感爲其往往必發之自覺症狀。

△否雷耳氏水 Liquor Fowleri。販賣之否雷耳氏水一回用半筒乃至一筒，或以等量之蒸溜水稀釋後，行皮下注射，(乾癱，舞蹈病，神經病，喘息，神經性疾患。)

△鹽化腎上腺齶液 Solutio Adrenalini hydrochlorici 或用其原液，或用以等分之蒸溜水或生理的飲鹽水之稀釋液，一回用半筒至一筒，注射

於筋肉內，(止血，喘息，強心，及注射白喉血清時均適用之)，須注意勿注入靜脈內，恐釀成危險。

△二〇% 安息香酸鈉咖啡鹼水 Caffeino--
Natrium berzoicum. 一回半筒乃至一筒，(興奮，強心，偏頭痛)

△狄加林 Digalen 一回一筒(強心)

△狄吉他民 Digitamin 一回一筒(強心)

△盼吉他耳 Pangital 一回一筒(強心)

△Pantopon Roche 一回一筒(鎮痛，鎮靜)

△Pantopon—Scopolamin Rec'e 一回一筒
(鎮痛，鎮靜)

△五〇%安替正林水 Antipyrinum 一回一
乃至二筒(神經痛)

△五%正拉密洞水 Pyramidonum 一回一至
二筒(神經痛)

△諾倫 Ngulen 一回一筒(神經痛，癱麻質
斯，肩張)

△二%鹽酸派羅卡品水 Pilocarpinum hy-
drochloricum 一回 $\frac{1}{4}$ 乃至 $\frac{1}{3}$ 乃至 $\frac{1}{2}$ 筒(發汗，綠內

（注射於頸部）

△一乃至二%石炭酸水 *Acidum carbolicum* 一回一筒，（神經痛，肩張，局所消炎）

△一至%鹽酸阿坡嗎啡水 *Apomorphinum hydrochloricum*（吐劑）大人一回用 $\frac{1}{8}$ 乃至 $\frac{1}{4}$ 筒，小人 $\frac{1}{10}$ 乃至 $\frac{3}{10}$ 筒。

△一%鹽酸約款彬 *Yohimbinum hydrochloricum* 每日 $\frac{1}{4}$ 至 $\frac{1}{8}$ 乃至 $\frac{1}{2}$ 筒（陰萎）

△生理的食鹽水 *Physiologische Kochsalzlösung*（〇・八五%），加溫攝氏三十七度，大人用五〇〇・〇乃至一〇〇〇・〇，小人一〇〇・〇乃至三〇〇・〇，注射於肩胛間部，側胸部，或大腿內側皮下，注入時注入液不可冷卻至體溫以下。

△林該爾氏液 (*Liquor Ringeri*)

食鹽 <i>Natrii chlorati</i>	7.0
氯化鉀 <i>Kalii chlorati</i>	0.42
氯化鈣 <i>Calcii chlorati</i>	0.24
蒸溜水 <i>Aq. destillatae</i>	1000.0

(水分脫失之際)

{ 食鹽 Natrii Chlorati	6.0
{ 碳酸鈉 Natrii carbonici	2.0
{ 蒸溜水 Aq. destillatae	1000.0

(水分脫失之際)

△ 麥角膏水

{ 麥角膏 Extracti Secalis Cornuti	
{ 石炭酸 Acidi Carbolici	
{ 蒸溜水 Aq. destillatae	

右爲殺菌注射料 (一 c.c. 中含 0.1)

(止血) S. Zur Injektion.

△ 脫肛注射液

{ 麥角膏 (愛耳戈汀) Extracti Secalis Cornuti (Ergotin.)	0.5
{ 80% 酒精 80% Alkohol	1.5
{ 甘油 Glycerini	1.5
{ 鹽酸科卡音 (諾服卡音) Cocaini hydrochlor. (Novococain)	0.07

右殺菌濾過 (不濾過而用殺菌水亦可) F.

Sterilisiert, filtriert. S. zur Ijektion.

第一回, 上下各注射半筒。

第二回, 左右各注射半筒。

△森式痔核注射液

抱水克羅拉耳 Chlorali hydrati (3.0) 1.5

蒸溜水 Aq. dest. (1.0) 0.5

右裝入10.0克之量盃中, 而置於熱水內加溫, 使之溶解, 以便注射, 因抱水克羅拉耳放出結晶水, 則全液約為3.0, 而照森式治療法式注射。S. Injctio (Vor d. Gebrauch erwärmt.)

△昇汞食鹽水

昇汞 Hydrargyri bichlorati 0.1

食鹽 Natrii chlorati 0.1

蒸溜水 Aq. destillatae 10.0

右臀肉內注射 (梅毒) (隔日一回, 注入1.0cc.) S. Injektion (intramuskulär)

△盧愛斯汀 Luestin 一回一筒, 注射於臀肉內, (梅毒)

△依嗎米戈耳 Imamicol 一回一筒, 注入臀

肉內，（梅毒）

△各種血清類 Serum-Praeparate

△一〇%乃至一五%乃至二〇%乃至二五%硫酸鎂水Magnesium Sulfuricum 右殺菌後，注射於靜脈內或皮下，一回一〇c.c. S. sterilisiert; intraveose eod. Subkutane Injektion (bei tetanus)（體重—尅用硫酸鎂〇。二）與其他療法併用（破傷風）（參看一三七）

皮下注射應選四肢，胸部——尤以大胸筋之部位爲佳，先須嚴格消毒，注射後應長久摩擦，否則發生膿瘍，或局部浸潤。筋肉注射則以大腿筋或臀筋內爲宜。

△茄克羅民Jukuromin 爲含有二%氯化鈣及五%乃至一〇%溴化鈉之靜脈內注射液。對於濕疹之主要症候瘙癢，皮膚瘙癢症，蕁麻疹，紅色疥癩疹，其他一般瘙癢症，及各種內出血，均適用之，又能治療喘息。

用量，五至一〇%溶液，每日用五 c.c. 注入靜脈內一次，連續注射一週，亦不發現副作

用，（皮下注射能續發壞疽）

△羅白林 Lobelin 爲呼吸麻痺治療劑，而能興奮呼吸中樞之製劑也。

用治初生兒之假死，肺炎等用其他興奮劑無效時，白喉，流行性感胃，麻醉障礙，酸化炭素中毒等均能奏效，用量，小兒一回〇·〇〇三克注射於皮下或筋肉內，大人一回〇·〇一克注入皮下，靜脈內注射，一回用〇·〇〇三—〇·〇〇六，使用此等用量，不致發現何等之副作用，且於短時間內（二十分間）反覆注射，亦不呈蓄積作用；然用大量，則能起呼吸中樞之麻痺，故靜脈內注射時，須特別注意。

一五, 興 奮 劑

(Analeptica, Excitantia.)

興奮劑之作用,顯於中樞神經系,而使其機能亢進者也。適用於一,虛脫,二,震盪症,三,全身衰弱等。

第一方

酒精	Alkoholi	20.0
純糖漿	Sirupi simplicis	10.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量，數回分服 S. Täglich meh-
rmals z. n.

應用配合藥品 (第一方)

△規那醇 Tinctura Chinae.

△芳香醇 Tinctura aromatica.

△甘硝石精 Spiritus Aetheris nitrosi.

△苦味醇 Tinctura amara.

△赤酒 Vinum rubrum.

△橙皮醇 Tinctura Aurantii cortinis.

△卵黃二個 2 Eidotter.

◎酒精對於熱性病有興奮作用，且稍能補助營養，又可用於急性心臟衰弱，腦貧血，慢性疾患及恢復期等。

禁忌 血管硬化症，腎臟病，中樞神經系疾患。

第二方

葡萄酒 Vini rubri q. s. (適宜)

右單獨或稀釋後服用適量，普通多加

入鹽酸清涼水 S. Mehrmals z. n. (eventuell in Limonade)

第三方

樟腦 Camphor. 0.3

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包，一日三回分服，M. F. pulv.
No. III. S. Auf 3 mal täglich z. n.

應用配合藥品 (第三方)

△樟腦 Campher 可與各種處方配合

△安息香酸 Acidum benzoicum

△安息香酸鈉咖啡鹼(極量一回一。〇，一日三。〇) Caffeïno-Natrium benzoicum

第四方

10% 樟腦橄欖油 10% Campher-Olivenöl

右注射料，一回一至二% S. zur Injektion einmal 1—2 Spritze.

第五方

10% 樟腦醇精 10% Campher-Aether

右注射料，一回半筒乃至一筒 S. Zur

Injektion; einmal¹/₂—1 Spritze.

第六方

卵黃 (二個) 2 Eidotter

白蘭地 Branntwein 20.0

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量, 數回分服 S. Täglich

mehrmals z. u.

(白蘭地可用戈格拉克(法國火酒名), 葡萄酒, 或日本酒作其代用品)

其他之興奮劑

◎戈格拉克Cognac 爲葡萄酒製成之燒酒, 含純酒精約四〇%, 現虛脫症時用以和糖水內服, 小兒用量(一日量)

一月以內……………〇。二乃至一。五

二月……………一。五乃至二。五

一歲以內……………三。〇

二歲以內……………四。〇

◎葡萄酒Wein普通赤葡萄酒, 約含酒精一

%，和糖水服用，其用量等戈洛拉克之二乃至三倍。

○醇精精 Spiritus aethereus (Liquor Hoffmanni) (荷弗曼氏液)由醇精一分，酒精三分混合而成，適於小兒應用，嗅入用，內服用，或灌腸用均可，內服一回一〇乃至四〇滴，和於糖水內漸漸服用，(有內服困難者。)

□荷弗曼氏液 Liquor Hoffmanni 1.0-1.5

純糖漿 Sirupi simplicis 5.0

溜水 Aq. destillatae 30.8

右一日量，三回分服 (一歲至三歲)

S. Täglich 3 mal z. n.

(如作灌腸用，則混於灌腸液或純水內，而注入腸內。當用食鹽水皮下注入之際，亦適用之內服。)

○馬前子醇 (極量一回一〇，一日二〇)
Tinctura Vomicae.

○甘硝石精 Spiritus Aetheris nitrosi.

○日本酒 Vinum japonicum.

備考

所謂研末樟腦者，即精製樟腦以酒精或醇精潤濕而粉碎之也。

一六, 吐 劑

(Emetica, Brechmittel.)

發現嘔吐, 由嘔吐中樞之刺激與興奮而起。

一, 直接 (器械的, 化學的, 腦血行障礙)

二, 間接, 即反射的, (舌根, 咽頭, 胃, 腸, 腹膜, 及生殖器等等。)

嘔吐時常伴有惡心, 但小兒多缺如。

應用(吐劑)

一，有不消化物，或毒物停滯於胃內時。

二，有異物存在於食道或氣管，或使上氣道之黏膜等喀出，皆宜用之。

三，可用其少量以作驅痰之目的。

禁忌 動脈瘤，高度之血管硬化症，胃潰瘍，脫腸，妊婦末期，咯血患者，及衰弱者等。

第一方 (鹽酸阿坡嗎啡極量一回0.02)

1%鹽酸阿坡嗎啡液 1% Apomorphini hydrochlorici

右皮下注射料(大人 $\frac{1}{9}$ 筒乃至 $\frac{1}{2}$ 筒，小人 $\frac{1}{100}$ 乃至 $\frac{8}{100}$ 筒) S. Zur Subkutanen Injektion.

△鹽酸阿坡嗎啡用以皮下注射，其奏效之迅速，優於其他吐劑。

第二方 吐根 Radix Ipecacuanhae

△用為催吐劑一回0.5乃至1.0，或作散藥或浸劑使用。

△用為祛痰劑一回0.0一乃至0.0

五、一日服用數回，與以散末或浸劑。

○吐根浸 Infusi Ipecacuanhae (0.5—1.0)

100.0

純糖漿 Sirupi Simplicis 20.0

右每十分乃至十五分鐘服一小匙，至奏效時為止。（內服後少有十至十五分鐘即嘔吐者，通常須一鐘久）（除去木心） S. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ stündlich 1 Theelöffel z. n.

○吐根浸 Inf. Ipecacuanhae (0.5—1.0)

100.0

鉅茴香精 Spiriti Ammon. foenic. 5.0

純糖漿 Sirupi Simplicis 20.0

右每十乃至十五分鐘服一食匙，（至奏效時止） S. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ stündlich 1 Essloffel z. n.

○吐根末 Pulv. Ipecacuanhae 0.5—0.8

吐酒石 Tartari stibiati 0.03

乳糖 Sacchari lactis 0.5

右為一包量，每十五分鐘服一包，至奏效為止（一般老人，小兒不可用吐酒石）

F. Pulv No. I. S. $\frac{1}{4}$ stündlich 1 pulv. z. n.

△吐根作為吐劑用，其效力確實，較吐酒石之惡心輕微，且少有發現虛脫者，故適於小兒，老人之使用，其用量，一回〇。二乃至一。〇，或用散劑，或用浸劑，每十分鐘反覆內服一回至奏效為止，通例反覆服用二三回，即可見效，若其催吐作用過度時，應用坦寧劑解毒。

△吐根小兒用量（作催吐劑）

通常一回量	一回極量（等於祛痰劑一日極量）
一歲以下……0.02至0.03	0.05
一歲至二歲…0.03至0.05	0.1
三歲至四歲…0.05至0.1	0.1
五歲至十歲…0.1 至0.15	0.2
十歲至十五歲0.15至0.2	0.3

○吐酒石 Tartari Stibiati 0.03

吐根末 Pulveris Ipecacuanhae 1.0

溜水 Aq. destillatae 30.0

右每十分鐘服用一小兒匙，至奏效時

止，(反覆二三回) (可加入純糖漿或薄荷水)

S. $\frac{7}{8}$ stündlich I Kinderloffel bis zur Wirkung

z. n.

○吐酒石 Tartari Stibiati 0.1

亞拉伯樹膠 Gummi Arabici 20.0

純糖漿 Sirupi simplicis 20.0

溜水 Aq. destillatae 20.0

右每十五分鐘服一茶匙，至奏效爲止，

S. $\frac{1}{4}$ stündlich I Theeloffel z. n.

○吐酒石(極量一回○。一，一日○。三)，
作爲吐劑，其效力雖顯著，但其惡心甚劇，又易
起下痢，故僅適於強壯之大人使用，有胃腸病
者，應用上務宜慎重。

第三方

硫酸銅 Cupri sulfurici 1.0

純糖漿 Sirupi Simplicis 10.0

溜水 Aq. destillatae 30.0

右每十五分鐘服一茶匙，至奏效時止

S. $\frac{1}{2}$ stündlich I Theel'öffel z. n.

○硫酸銅適於老人，小兒以作吐劑，大人用爲催吐藥之頓服量一回極量一。○（近來屢屢有用殺鼠劑（磷劑）以求自殺之目的者，用吐劑治療最爲適當。）

其他之吐劑

- 一，吐酒石酒 Vinum Stibiatum.
- 二，吐根酒 Vinum Ipecacuanhae.
- 三，吐根醇 Tinctura Ipecacuanhae
- 四，吐根糖漿 Sirupns Ipecacuanhae.
- 五，鹽酸伊米汀 Emetinum hydrochloricum.（阿米巴赤痢）（極量一回〇・〇五，一日〇・一五）
- 六，金硫黃 Stibium sulfuratum aurantiacum.
- 七，硫酸鋅（催吐用頓服量，大人一回極量一。〇） Zincum sulfuricum

第四方

- 硫酸鋅 Zinc. sulfuric.
蒸溜水 Aq. destillat.

每5—10分鐘服一茶匙，至奏效爲止，
S. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{6}$ Stündlich I Theelöffel bis zur wir-
kung z. n.

一七， 下 劑

(Cathartica, Abführmittel.)

作用上之區別

一， 峻下劑

二， 緩下劑

現下痢時之腸管情形

一， 腸管吸收作用障礙

二，腸管運動異常亢進

三，腸管之炎症性疾患

下劑之應用

一，便秘（常習便秘）。

二，使腸內容物殊以有害物達排出之目的時，適用下劑。

三，尿閉及水腫，或炎症及鬱血等欲達誘導之目的，均適用之。

四，間有用爲催經之目的者。

便秘之原因

一，弛緩性便秘（蠕動不十分）

二，痙攣性便秘（此種用葷藥劑，阿忒羅品，阿片劑均能奏效）。

三，其他器械的原因，如由腸管被壓迫，或肛門部疼痛之際，而來反射的便秘。

下劑應用上之注意

（禁忌）腸，腹膜，或骨盆腔內臟器起充血或炎症劇甚之際，有腸出血，痔核出血之傾向時，又妊娠，月經期內，其他衰弱者，高齡者，及

貧血者等，均宜注意。

下劑之種類

A. 鹽類下劑

一，硫酸鎂 *Magnesium sulfuricum* (硫
苦) (主要作用，妨止腸之水分吸收。)

二，人造加耳斯泉鹽 *Sal carolinum facti-*
um。

三，煨製鎂 *Magnesia usta*。

四，碳酸鎂 *Magnesium Carbonicum*。

五，重酒石酸鉀 *Kalium bitartaricum*。

六，硫酸鈉 (芒硝) *Natrium Sulfuricum*。

七，賽尼埃忒鹽 (酒石酸鉀鈉) *Sal sei-*
gnetti。

B. 植物性下劑

一，蓖麻子油 *Oleum Ricini* (主要作用，
昂進小腸之蠕動)

二，雅拉怕根末 *Tubera Jalape* { 雅拉怕
脂 *Resina jalapae* (極量一回〇・五，一日一。
五)

- 三，巴豆油 *Oleum Crotonis* (極量一回○
 ○五，一日○·一五) }
 四，坡朵菲林脂 *Resina Podophylli* (極
 量一回○·一，一日○·三)
 五，藤黃 *Gutti* (極量○·三，一日一○
 ○) (舊藥局方)

C. 安忒拉克侖 (Anthrachinon) 誘導體

- | | |
|---|--|
| 一，先那葉 <i>Folia sennae.</i> | } 主要作用
在大腸壁
，使腸蠕
動昂進，
內服後三
四小時，
即可奏效 |
| 二，大黃 <i>Rhizoma Rhei.</i> | |
| 三，蘆薈 <i>Alcē.</i> | |
| 四，卡斯卡利拉流動膏 <i>Extra-</i>
<i>ctum Cascarae sagradae</i> | |
| <i>fluidum.</i> | |
| 五，伊斯替青 <i>Istizin.</i> | |

大黃下劑內服後，因尿中有 *Acidum chry-*
sophanicum，故尿呈黃色，加入鹼質，則變為紅
 色，又能分泌於乳汁中，故乳兒現下痢者有之。

(備考) ○移行於乳中之藥物：一，碘劑
 二，溴素劑 三，阿忒羅品 四，抱水克羅
 拉耳 五，薩耳乏散 六，水楊酸 ○由母體

移行於胎兒之藥物 一，克羅羅封 二，醇精
三，阿忒羅品 四，嗎啡 五，斯科坡拉民
(Scopolamin) 六，抱水克羅拉耳 七，水楊
酸 八，硫酸規寧 九，安息香酸 一〇，酒
精 一一，硝石 一二，尿素 一三，亞砷酸
一四，水銀 一五，碘化鉀 一六，溴化鉀
一七，米替連青等。

D. 一，斐諾耳弗他林 Phenolphthalein (浦
耳堇) (Purgen)

二，阿白里妥耳 Aperitol.

三，拉克薩妥耳 Laxatol.

E. 硫黃劑 Schwefel-*praeparate*.

F. 甘汞 Calomelas (在消化管中徐徐分
解，使大腸及小腸之蠕動亢進，內服甘汞後之
大便，所謂綠色甘汞便是也，蓋由綠色膽色素
(Biliprasin.) 未起變化而排泄故也。)

A. 鹽類下劑

作用 鹽類下劑難由腸粘膜吸收，保有溶
解水，且有奪取組織液之作用

○鹽類下劑之濃厚液用於浮腫，水腫之際，有脫水作用。

○用少量之鹽類下劑，有利尿之效。

○禁忌 盲腸周圍炎，腹膜炎，骨盤腔內炎症，腸傷寒，等均常忌用；但如能注意周到，隨其時期症狀，亦可隨機使用。

第一方

硫酸鎂 Magnesii sulfurici 5.0—8.0—
10.0—15.0
溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量，三回分服（空服時服用）

S. Täglich 3 mal z. n.

（硫酸鎂加以稀鹽酸，則易溶解，故便以溶解大量，又易飲用。）

應用配合藥品 第一方

○苦味醇 Tinctura amara.

○稀鹽酸 Acidum hydrochloricum dilutum.（藥效上無異）（易於服用）

○水楊酸鈉 Natrium Salicylicum.

- 薄荷水 *Aq. Menthae.*
- 午羅忒羅品 *Urotropinum* (一日用量一
○——二。○)
- 杏仁水 (極量一回二。○, 一日六。○)
Aqua Pruni Armeniaca (*Aq. Lauro—Cerasi.*)
- 斯忒羅反忒斯醇 *Tinctura Strophanthi.*
(極量一回○。五, 一日一。五)
- 重酒石酸鉀 *Kalium bitartaricum.*
- 馬前子醇 *Tinctura Vomicae.* (極量一回
一。○, 一日二。○)
- 狄吉他利斯劑 *Digitalis—Praeparate.*
- 酒石酸 *Acidum tartaricum*
- 桂皮水 *Aqua. Cinnamomi.*
- 安替足林 *Antipyrinum.* (極量一回一
○, 一日三。○)
- 溴化鉀 *Kalium bromatum.*
- 溴化鈉 *Natrium bromatum.*
- 醋酸鉀液 *Lizor Kalii acetici.*
- 芳香醇 *Tinctura aromatica.*

○橙皮醇 Tinctura Aurantii Corticis.

○重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum.

△硫酸鎂與規那劑禁忌

第二方

人造加耳斯泉鹽 Sal. Carolini factitii

5.0—10.0—15.0

溜水(冷水) Aq. destillatae 100.0

右一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

(用時可加溫服用,有催下,痢尿之效,又可用其少量,以治胃潰瘍及胃酸過多症。)

應用配合藥品 (第二方)

苦味醇 Tinctura amara.

大黃醇 Tinctura Rhei.

馬前子醇(極量一回一。〇,一日二。〇)

Tinctura Vomicae.

重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum.

硫酸鎂 Magnesium Sulfuricum.

莫礬膏(極量一回〇。〇五,一日〇。一)

五) *Extractum Scopoliae.*

黃蓉醇 (極量一回一。〇, 一日三。〇)

Tinctura Scopoliae.

橙皮糖漿 *Sirupus Aurantii corticis.*

大黃浸 *Infusum Rhizom. Rhei.*

◎人造加耳斯泉六。〇, 加水一〇〇〇。

〇, 與天然加耳斯泉水相等云。

◎人造加耳斯泉鹽一〇。〇, 溫水一〇〇

。〇, 晨早空腹時頓服用後, 更可與以大黃劑之水劑。

第三方

A) 重酒石酸鉀 <i>Kalii bitartrici</i>	10.0
精製硫黃 <i>Sulfur. depurati</i>	10.0
白糖 <i>Sacchar. albi</i>	10.0

右爲散劑, 朝夕一茶匙溶於水內服用,

(痔核) (可加以等分之煨製鎂, 先那末。)

*M. F. Pulv S. Morgens und abends in Wasser
I Teelöffel.*

B) 大黃末 *Pulveris Rhei* 5.0

沈降硫黃 Sulfur-Praecipitati 5.0

茴香油糖 Elaeosacchari Foenic. q. s.

右爲散劑，朝夕服用一茶匙，M. F. Pulv.

S. Morgens und abends I Teelöffel.

C) 重酒石酸鉀 Kalii bitartarici 15.0

苦味醇 Tinctura amaræ 1.0

純糖漿 Sirupi simplicis 10.0

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量，三回分服（有緩下，利尿，清涼，止渴之效。）S. Täglich 3 mal z. n.

應用配合藥品（第三方C）

狄吉他利斯劑 Digitalis-Praeparate.

斯忒羅反忒醇 Tinctura Strophanthi.（極量一回〇・五，一日一・五）

醋酸鉀液 Liquor kalii acetici.

俄里撒林 Oryzanin.

芳香醇 Tinctura aromatica.

橙皮醇 Tinctura Aurantii Corticis.

第四方

煨製鎂 *Magnesiae ustae* 2.0—5.0—10.0
(甘油) (*Glycerini*) (5.0—10.0)
油水 *Aq. destillat* 200.0

右爲振盪合劑，每五分十分乃至十五分鐘，服用半酒盃，(亞砒酸中毒，) (其他解毒劑)
S. Schüttelmixtur.

○煨製鎂之應用 {
◁ 作制酸之目的，用 0.2 乃至 0.5，一日數回服用。
◁ 作下劑之目的，用 1.0 乃至 3.0，一日數回服用。
◁ 酸中毒，砒酸中毒，重金屬鹽中毒，均用大量。

○煨製鎂 *Magnesiae ustae* 3.0
薄荷水 *Aquae Menthae* 10.0
溜水 *Aq. destillatae* 100.0

右一日量，三回分服。S. Täglich 3 mal
z. n.

○煨製鎂 *Magnisiae* 1.0—2.0—3.0

右分三包，一日三回分服 F. Pulv. No.
III. S. Auf 3 mal täglich z. n.

(用散劑時加入二三滴苦味醇或馬前子醇
與之混合，則可使其容積減小。)

(參看二七九頁)

應用配合藥品 (煨製鎂散劑)

薄荷油糖 *Elaeosaccharum Menthae*.

大黃末 *Pulv. Rhei*.

莨菪膏 *Extractum Scopoliae*. (極量一回

〇・〇五，一日〇・一五)

狄亞斯大斯 *Diastase*.

乏戈耳 *Fagol*.

茴香油糖 *Elaeosaccharum Foeniculi*.

◎其他之鹽類下劑

一，硫酸鈉 *Natrium sulfuricum* (芒硝) (一日用量一〇・〇乃至一五・〇乃至三〇・〇)(加以枸橼酸，則易飲用。又可用重碳酸鈉，大黃等加味，但小兒難於服用。)

二，緩下沸騰散

- a. { 酒石酸鉀鈉 Natrio
-kalii tartarici 七·五 } 爲一包
- { 重碳酸鈉 Natrii
bicarbonici 二·五 }
- b. { 酒石酸 Acidi
tartarici 二·〇 } 爲一包

右同時投入冷水或溫水內，於沸騰時內服。

三，酒石酸鉀鈉 Natrio-kalium tartaricum
(賽尼埃忒鹽) (Seignettesalz)

四，碳酸鎂 Magnesium Carbonicum.

五，曼那及曼那糖漿 Manna et Sirupus
Mannae.

◎B, 植物性下劑

作用 主要作用，刺戟小腸粘膜，而亢進其蠕動，又能使其分泌作用旺盛。

一般性質 在胃中不生變化，至腸管乃溶解由腸液或細菌等之作用，始顯其適當之刺戟性。

注意 生殖器疾患及妊婦等，須注意使用。

第一方

蓖麻子油 Olei Ricini 10.0—15.0—20.0

單糖漿 Sirupus simpl. 10.0

右頓服用 (用時須強力振盪) S. Auf
cinmal z. n.

應用配合藥品 (第一方)

薄荷水 Aqua Menthae.

橙皮糖漿 Sirupus Aurantii Corticis.

桂皮醇 Tinctura Cinnamomi.

純糖漿可用甘油, 肉蓯汁, 麥酒, 咖啡, 赤酒
等代之, 和入蓖麻油內服用。

第二方

蓖麻子油 Olei Ricini 30.0

亞拉伯樹膠 Gummi Arab. 15.0

乳化水 Aq. Emulsio. 22.5

(薄荷水) (Aq. menth.) (10.0)

純糖漿 Sirup. Simpl. 10.0

溜水加足全量 100.0 克 F. mit Aq. dest.

im Ganzen 100.0

右爲乳劑，一日三回分服，（可加入橙皮醇或桂皮醇）M. F. Emulsio. S. Taglich 3 mal z. n.

△調劑樹膠漿乳劑，所用油劑量應等亞拉伯樹膠之倍量。

△乳化水爲油劑量與樹膠量之和之半分量⁵

△乳劑內如加入卵黃，則油劑一〇〇，應加卵黃一箇。

乳劑內加用罐頭牛乳，其用量爲油劑之倍量，

◎蓖麻子油適用於一時性便秘，中毒，消化不良等之際，能使腸之內容物，根本掃出，其刺激性微弱，故腸有炎症時，亦可使用，服後少有特異質，但服用磷，散安紐，綿馬之際，則應避用之。

○消化不良，赤痢，疫痢等均賞用本品。

○內服後遇胃液不起變化，到腸內因腸液殊以胨液，遂被鹼化，則蓖麻子油酸遊離，而使腸蠕動亢進，乃呈緩下作用。本品之作用，始於腸

之上部，故適用以根本的掃出腸之內容，（服用蓖麻子油後，即食一梅子，則可免除飲用後所發現之不快感。）

○蓖麻子油作為下劑，最有效力，且如甘汞之無副作用。

○蓖麻子油之小兒用量（一回量）

一歲以下……………四。〇——一六。〇

二歲——五歲……………五。〇——一〇。〇

五歲——一〇歲一〇。〇——一五。〇

（亦可再用大量）

○小兒使用，應與以乳劑，乃不嫌惡。

○蓖麻子油 *Olei Ricini* 6.0

純糖漿 *Sirupi Simplicis* 3.0

（橙皮糖漿）（*Sirupi Aurantii Corticis*）

（3.0）

溜水 *Aq. dest* 20.0

右乳兒用，一日三回分服，用時須加振盪，*S. Täglich 3 mal z. n. (Urmgeschüttelt)*

○蓖麻子油 *Olei Ricini* 10.0

樹膠末 Pulveris Gummi	5.0
乳化水 Aq. Emulsio.	7.5
純糖漿 Sirup. Simpl.	5.0
溜水 Aq. dest.	15.0

右爲乳劑，- 日量，三回分服，（二至三歲小兒用） F. Emulsio. S. Taglich 3 mal z. n.

第三方

巴豆油（極量0.05—0.15） Olei Crotonis

右半滴或一滴混於蓖麻子油或橄欖油內

服用，（頑固之便秘用一滴） S. $\frac{1}{2}$ -1 Tropfen

mit Ol. Ricini z. n.

第四方

雅拉帕根末 Pulveris Tuberae Jalapae

0.5—1.0

乳糖 Sacchari lactis 0.5

右爲一包，頓服用， M. F. pulv. No. I.

S. Auf einmal z. n.

應急配合藥品 (第四方)

甘汞 Calomelas.

大黃末 Pulvis Rhei.

桂皮末 Pulvis Cinnomomi.

精製酒石 (重酒石酸鉀) (克遼摩耳)
Tartarus depuratus (Kalium bitartricum)
(Cremor tartari)

散妥紐 Santoninum. (極量--回〇。--，一
日〇。三) (注意中毒)

○雅拉怕由膽汁之作用而奏效，故有黃疸時用
之，則無效力。

○常習便秘長久用雅拉怕，亦不失其效力，用為
緩下之目的與以雅拉怕根末〇。五，如達峻
之下目的，則用一。〇頓服。

○注意 於月經妊娠期內使用，須特別注意。

○雅拉怕根末 Pulv. Tub. Jalapae 1.0

右為一包，頓服用 F. Pulv. S. Auf
einmal z. n°

○雅拉伯根末 Pulv. Tub. Jalapae }
 大黃末 Pulv. Rhei } aa 0.5

右爲一包，頓服用 F. Pulv. S. Auf
 einmai z. n.

◎◎。安忒拉克倫誘導體

其作用於大腸，常伴有輕微之腹痛，適於常
 習便秘，然授乳婦應慎重使用。

第一方

大黃 Rhizomac Rhei 1.0

右一包量，頓服用 F.pulv. S. Auf einml
 z. n.

○用少量大黃（一日〇。三乃至〇。九）則
 爲健胃腸劑；大量（一日一。〇乃至二。〇）
 則呈緩下作用，因其作用緩和，故適於小兒，衰
 弱者，及恢復期等。

○亂用大黃，往往惹起消化不良症。

○日本所謂鷓鴣菜或五香者，皆爲大黃之含
 有物。

第二方

大黃根末 Pulveris Rhizom. Rhei 0.5

雅拉怕根末 Pulveris Tuber. Jalapae. 0.5

右爲一包量，頓服用 F. Pulv. S. Auf
einmal z. n.

第三方

大黃根末 Pulveris Rhizom. Rhei. 10.0

甘油 Glycerini 5.0

右爲50丸，一回服用5—10丸，（一九含
0.2）M. F. Pil. No. 50. S. 5—10 Pillen auf
einmal z. n.

第四方

大黃根末 Pulv. Rhizom. Rhei. 1.5

重碳酸鈉 Natrii bicarbon. 3.0

右分三包，一日三回分服（可加用薄荷
油糖及茴香油糖）M. F. D. Pulv. No. III. S.
Auf 3 mal täglich z. n.

第五方

大黃根末 Pulv. Rhiz. Rhei — 1.5

煨製 漢 Magnesia ustae 1.5

薄荷油糖 Elaeo:acchari Menthae 0.5

右分三包，一日三回分服 M. F. D. Pulv

No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

第六方

粗末大黃根浸 Infusi Rhiz. Rhei (4.0)

100.0

重碳酸鈉 Natrii bicarbonici 3.0

(純糖漿) (Sirup. Simpl.) (10.0)

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

應用配合藥品 (第六方)

芳香醇 Tinctura aromatica.

薄荷水 Aqua Menthae.

利鎖耳金 Resorcinum.

苦味醇 Tinctura amara.

○粗末大黃浸小兒賞用其適量

第七方

水製大黃醇 Tincturae Rhei aquosi 5.0

重碳酸鈉 *Natrii bicarbonici* 3.0
溜水 *Aq. dest.* 100.0

右一日量, 三回分服 *S. Taglich 3 mal*

z. n.

應用配合藥品 (第七方)

芳香醇 *Tinctura cromatica.*

薄荷水 *Aqua Menthae.*

利鎖耳金 *Resorcinum.*

苦味醇 *Tinctura amara.*

第八方

苦土大黃散 (小兒散) *Pulv. Magnesiaie*
cum Rheo (Pulv infanti) 1.0

右爲一包, 頓服用 *F. Pulv No. S. Auf*
einmal zu enhmen.

○苦土大黃散 *Pulv. Magnesiaie Cum Rheo*
2.0

右分三包, 一日三回分服 *F. D. Pulv.*
No. III. S. S. Täglich 3 mal z. n.

第九方

卡斯卡拉流動膏 Extract. Cascar. Sagrad.	
fluid.	3.0
純糖漿 Sirup. simpl.	10.0
溜水 Aq. dest.	100.0
右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal	

Z. n.

卡斯卡拉流動膏爲良好之緩下劑, 適於常習便秘。

雜用配合藥品 (第九方)

大黃醇 Tinctura Rhei.	
稀鹽酸 Acidum hydrochloricum dilutum.	
橙皮糖漿 Sirupus Aurantii Corticis.	

第十方

先那葉煎 Deloct. Fol. Sennae(4.0)	100.0
純糖漿 Sirup. Simpl.	10.0
右一日量, 三回分服 (可加入硫酸鎂)	
S. Täglich 3 mal z. n.	

○先那對於有腸炎症者禁忌

○精製硫黃 Sulfur. purat. 1.0—1.5

先那葉末 Pulv. Fol. Sennae. 1.0—1.5

右混和，一日量，分三包，三回分服，

M. F. Pulv. No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

第十一方

蘆薈雅拉伯丸 (Pilulae Aloë, et Jalapae)

(局方一瓦中含主藥各0.05)

蘆薈 Aloë 5.0

雅拉伯石鹼 Sapo. Jalapini 3.0

酒精 Spiriti q. s.

右爲50丸，一回3—5丸 M. F. Pil. No.

L. S. Einmal 3-5 Pillen z. n.

○蘆薈之主要作用在大腸下部，一回內服○。二乃至○。五，則八至一五小時後，即可排出半軟之便。

△蘆薈又可作通經藥及苦味健胃劑使用。

△禁忌 妊娠，月經時，痔核，

第十二方

伊斯替青 Istizin (有錠劑) 一回服用

$\frac{1}{2}$ —1—2 錠 S. Einmal $\frac{1}{2}$ —2 Pastillen.

◎D. 一，斐諾耳弗他林（浦耳堇）Phenolphthalein (Purgen) $C_{20}H_{14}O_4$ 。 二，阿白里妥耳 Aperitol。 三，拉克薩妥耳 Laxatol（參看二〇二頁）

第一方

斐諾耳弗他林 Phenolphthalein. 0.1

右加入乳糖及樹膠漿作成丸，頓服用 F.
Pil cum Sacchar. lact et Mucilag. Gummi
arab. S. Auf einmal z. n.

（一回〇・〇五—〇・三）有緩下作用，通常〇・〇五之丸子內服一至三粒，則可奏效，適於小兒，老人，平臥患者及妊婦等。

第二方

阿白里妥耳錠劑 Aperito-Pastillae

用量，一回2-4錠 S. Einmal 2-4 Pastillen.

◎E. 硫黃劑 (Schwefel-Praeparate)

硫黃自己雖無瀉下之作用，但在腸內受還

元作用，而生成硫化水素，遂使腸之運動亢進。

一，昇華硫黃(硫黃華) (多作膏劑外用)

二，精製硫黃(作緩下劑用，一回一。○乃至五。○)

三，沈降硫黃(硫黃乳) (用爲緩下劑，一回一。○乃至二。○)

第一方

精製硫黃 Sulfur. depurati 3.0

右分三包，一日三回分服 F. Pulv. No.

III. S. Täglich 3 mal z. n.

應用配合藥品 [第一方]

重酒石酸鉀 Kalium bitartaricum.

煨製鎂 Magnesia usta.

先那葉末 Pulvis Foliae Sennae.

大黃末 Pulvi Rhizom. Rhei.

白糖 Saccharum album.

茴香油糖 Elaeosaccharum Foeniculi.

以上配合藥品，通常與精製硫黃用相等之量。

○精製硫黃 Sulfuris depurati —
重酒石酸鉀 Kalii bitartarici aa 2.0

右分三包，一日三回分服，（可用白糖或
茴香糖加味） M. F. Pulv. D. in tal. dos.
No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

○精製硫黃 Sulfur. depurati —
煨製鎂 Magnesiaë ustae aa 2.0 (各2.0)

右分三包，一日三回分服（用白糖或茴
香油糖加味） M. F. Pulv. S. Täglich 3 mal
z. n.

○精製硫黃 Sulfur. depurati —
先那葉末 Pulv. Fol. Sennae aa 1.0—1.5

右分三包，一日三回分服，（用白糖或茴
香油糖加味） M. F. Pulv. S. Täglich 3 mal
z. n.

○精製硫黃 Sulfur. depurati —
大黃末 Pulv. Rhei aa 2.2

右分三包，一日三回分服（用白糖或茴
香油糖加味） M. F. D. Pulv. No. III. cum

Sacchar. albi. S. Täglich 3 mal z. n.

○精製硫黃 Sulfur. depurati

煨製鎂 Maghesiae ustae

重酒石酸鉀 Kalii bitartarici

茴香油糖 Elaeosacchari Foeniculi aa 1.0
—1.5

右分三包，一日三回分服，和溫湯服用
M. F. Pulv. D. in tal. dos. No. IV. S. Täglich
3 mal mil mit. warmem Wasser z. n.

◎F. 甘汞

甘汞 Calomelanos aa 0.5

乳糖 Sacchari lactis

右一包量，頓服用 M. F. Pulv. S. Auf
einmal z. z. n.

與甘汞禁忌之藥品 安替正林，酸類，碘劑，嗎
啡含有物，硫黃，金硫黃，礪砂等。（參看二—八
頁）

備考

○乳兒之便秘 應與以蜂蜜液，水飴液，乳糖液

等。

○S鳥牌醫藥用之坦卡耳 (tenkal) 爲人造卡耳斯泉鹽之代用品，易於飲用。

○產褥婦禁用甘汞

○授乳婦不可使用屬於安忒拉克命誘導體之藥物，(大黃，先那，卡斯卡拉，蘆薈等，) 蓋能移行於乳汁中，對於乳兒有害故也。

○於妊娠中尿中發見蛋白質，且伴有浮腫者，則命患者安靜，攝取牛乳，下劑宜用硫酸鎂或煨製鎂之處方。

處方

拉克薩妥耳 Laxatoli 0.2—0.5

乳糖 S. lactis 0.5

右一包量，頓服用(大人) M. F. Pulv.

No. I. S. Auf einmal z. n.

一八，利尿劑

(Diuretica, Harntreibendes Mittel.)

尿之生理的意義

一，保持血液滲透壓之常態

二，排除新陳代謝之終末產物

三，排除體內之異常物質

故健能尿為代謝產物及異常物質之稀薄液

也。

尿分泌之生理由 Malpighii 氏小體 (腎臟血管毬) 內之濾過作用, 濾出稀薄之液體, 至細尿管再受二種主要作用, 即:

(1) 在直細尿管之吸收作用

(2) 在曲細尿管之分泌作用

由小體濾出之稀薄液, 經此二種作用後, 漸次濃厚而成常尿 [健康成人於二十四小時內之排出尿量平均一五〇〇。〇 cc, 其比重爲一。〇一五乃至一。〇二〇 (攝氏十五度)]。

利尿藥之作用

一, 亢進 Malpighii 氏小體內之血管毬之濾過作用。

二, 減退細尿管之吸收作用

三, 或兼有以上二種作用

利尿劑之種類

一, 擴大腎臟血管者:

(狄吉他利斯劑稍有血管擴大之作用, 但其利尿之主因乃由於強心作用)

A 浦林誘導體 Purinderivate

○咖啡鹼 (極量一回〇・五, 一日一・五)
Caffeinum.

○安息香酸鈉咖啡鹼 (極量一回一・〇, 一日三・〇) Caffeino-Natrium benzoicum.

○水楊酸鈉咖啡鹼 (極量一回一・〇, 一日三・〇) Caffeino-Natrium Salicylicum.

○可可鹼 Theobrominum.

○狄午雷汀 (水楊酸鈉可可鹼) (極量一回一・〇, 一日三・〇) Diuretin (Theobrominum natriosalicylicum)

○阿貴林 (用量一回〇・五乃至一・〇)
Agurin.

○替俄金 (茶鹼) (極量一回〇・五, 一日一・五) Theocin (Theophyllin.)

(此等藥物決不可於空腹時服用)

B 有揮發油之藥物

○抱水退耳品 Terpinum hydratum.

二, 恢復腎血行者 (強心劑):

○狄吉他利斯葉（極量一回〇。二，一日一
。〇）Folia Digitalis.

○狄吉他利斯醇（極量一回一。五，一日五
。〇）Tinctura Digitalis.

○斯忒羅反忒醇（極量一回〇。五，一日一
。五）Tinctura Strophanti.

○狄加林 Digalen.

○狄吉他民 Digilamin.

○盼吉他耳 Pangital.

三，起水利尿者：

○利尿茶劑

○炭酸水

四，鹽類利尿劑：

○醋酸鉀液（醋酸鉀）Liquor Kalii acetici
（Kalium aceticum）。

○硝酸鉀 Kalium nitricum.

五，甘汞利尿（參看二一七頁—至二一八頁）：

○甘汞作為下劑一回〇。三乃至一。〇；用
為利尿劑一日〇。二 適於肝臟及心臟性水

腫；如作驅梅毒劑，一日〇。〇二乃至〇。〇五，先天性梅毒一日〇。〇〇二乃至〇。〇二，但能發現下痢，須使用坦拉耳彬或阿片劑；又可外用作梅毒性潰瘍，及結膜疾患之撒布料（有腎臟疾患時禁用甘汞）

○利尿劑與強心劑併用，能互相助長其作用。

利尿劑之應用

一，欲防遏尿成分之沈滯，或有尿路炎症之際（水利尿）

二，排際毒物及病的產物（鹽類利尿劑）

三，現尿量減少及水腫等時

第一方

咖啡釀 Caffeini 0.3

乳糖 Sacchari lactis 1.5

右分三包，一日三回分服（食後） M.
F. D. Pulv. No. III. S. Täglich 3 mal nach
der Mahlzeit z. n.

應用配合藥品（第一方）

○樟腦 Kampher (Camphora)

○安替匹林 Antipyrinum (極量一回—。○，一日三。○)。

○飛拉西汀 Phenacetinum (極量一回—。○，一日三。○)。

◎樟腦 (極量一回○。五，一日一。五) 有強心，利尿之效力，但其利尿作用，如腎之血管毬有障礙，則不奏效。作強心劑用，一日一。○，數回服用，偏頭痛可與安替匹林，飛拉西汀伍用。樟腦難溶於水，故於臨床上，多賞用易溶性之安息香酸鈉咖啡鹼。

○樟腦劑有促食鹽等鹹鹽排泄之效力。

第二方

安息香酸鈉咖啡鹼 Caffeīno-Natrii benzocīci 0.5—0.8

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包，一日三回分服 (食後) M.
F. D. pulv. No. III. S. Auf 3 mal täglich z. n.

○安息香酸鈉咖啡鹼 (極量一回—。○，一

日三・〇)，其副作用雖少，但有時亦現惡心嘔吐。作為利尿劑，只用其少量足矣。

第三方

安息香酸鈉咖啡攪 Caffeino-Natrii benzoi	0.5
純糖漿 Sirupi Simplicis	15.0
溜水 Aquae destillatae	100.0
右一日量，三回分服（食後） S. täglich 3 mal z. r. (nach der Mahlzeit)	

應用配合藥品（第三方）

- 醋酸鉀液 Liquor Kali acetici,
- 狄吉他利斯劑 Digitalis-praeparate,
- 斯忒羅反忒醇（極量一回〇・五，一日一・五） Tinctura Strophanthi,
- 水楊酸鈉 Natrium Salicylicum,
- 安替正林 Antipyrinum,（極量一回一・〇，一日三・〇），
- 飛拉西汀 Phenacetinum,（極量一回一・〇，一日三・〇），

○吐根浸 Infus Radicis Ipecacuanhae,

○抱水克羅耳 (極量一回二。○, 一日六。

○) Chloralum hydratum (咖啡礮因有興奮中樞神經系, 而收縮全身血管之性質, 故有時無利尿之效, 此時可伍用抱水克羅拉耳。)

○重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum.

□20%安息香酸鈉咖啡礮水20% Caffeino-Natrium benzoicum,

右皮下注射料, 一回半管至一管, S.

subkutane Injektion; einmal $\frac{1}{2}$ -1 Spritze,

○小兒用量 (一日量) (安息香酸鈉咖啡礮)

一歲以下……………○。○五以下

一歲——三歲……………○。○五——○。二

四歲——一○歲……………○三——○。三

○水楊酸鈉咖啡礮與安息香酸鈉咖啡礮相同

(極量一回一。○, 一日三。○)

第四方 狄午雷汀 (極量一回1.0, 一日3.0)

狄午雷汀 Diuretini 2.5

薄荷水 Aq. menthae	5.0
純糖漿 Sirup. simpl.	10.0
溜水 Aq. dest.	100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

應用上之注意 狄午雷汀（水楊酸鈉可可鹼）爲白色之粉末，用爲水藥或作散劑，爲最有力之利尿劑也，用治慢性腎臟炎及心臟病之浮腫，或狹心症及血管硬化症所現之喘息，（尿中之蛋白量往往增加）。

禁忌 狄午雷汀及此類之製劑，不可與酸性和用。又與重碳酸鈉或硫酸鎂伍用，能生沈澱，

（血壓低降時，可併用狄吉他利斯劑）

副作用 用狄午雷汀而發現腦症狀者有之。

○小兒用量（一日量）（狄午雷汀）

二歲——五歲……○。三——○。八

五歲——一○歲……○。八——一。五

其他之浦林誘導體：

○茶鹼醋酸鈉（用量一回○。二乃至○。四

，一日〇・六乃至一・〇）（食後）Theophyllum natrio-aceticum,

○阿貴林（用量一回〇・五乃至一・〇，一日二・〇乃至三・〇）（食後服用）Agurin。

◎抱水退耳品 Terpinum hydratum 主用爲祛痰劑，服用多量，則起腎炎，適於氣枝膿漏，肺壞疽，百日咳等，與以丸劑，散劑，或水劑均可。作爲利尿之目的適用於心臟性水腫）一回〇二至〇・五，一日服用數回，）（用治百日咳之併發氣管枝加答兒者，能奏卓效，可與安替正林配用）（用其水劑，須加以酒精，乃易於溶解）。

○小兒用量（一日量）（抱水退耳品）

三歲——五歲……………〇・三

五歲以上……………一・〇

◎狄吉他利斯劑 Digitalis-präparate（腎血行恢復）

○狄吉他利斯葉（極量一回〇・二，一日一

・○)

○狄吉他利斯葉浸 Infusi Fol. Digitalis
(0.5) 100.0
硝酸鉀 Kalii nitrici 3.0
純糖漿 Sirupi Simplicis 10.0
右一日量, 三回分服 S. Täglich 3
mal z. n.

○狄吉他吉斯葉浸 Infusi Fol. Digitalis
(0.5) 100.0
醋酸鉀液 Liquor. Kalii acetici 10.0
純糖漿 Sirup. Simpl. 10.0
右一日量, 三回分服 S. täglich 3 mal
z. n.

○狄吉他利葉浸 Infusi Fol. Digitalis
(0.5) 100.0
重酒石酸鉀 Kalii bitarlarici 10.0
單糖漿 Sirupi simplicis 10.0
右一日量, 三回分服 (用時振盪) S.
täglich 3 mal z. n.

◎茶及咖啡等之利尿劑

其利尿作用，基於其中含有咖啡鹼與揮發油，而使大腦機能興奮，然如濫用，則發神經過敏及不眠等腦症狀。

○可可及其製品 chocolate 含有可可鹼及少量之咖啡鹼外，又含有脂肪及含水炭素等。

◎鹽類利尿劑

第五方

醋酸鉀液	Liquoris Kalii acetici	10.0
純糖漿	Sirupi simplicis	10.0
溜水	Aq. dest.	100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

應用配合藥品 (第五方) (醋酸鉀液)

- 苦味醇 Tinctura amara.
- 重酒石酸鉀 Kalium bitartaricum.
- 硝酸鉀 Kalium nitricum.
- 薄荷水 Aqua Menthae.
- 馬前子醇 Tinctura Vomicae. (極量一回)

二。〇，一日二。〇)

- 狄吉他利斯劑 Digitalis—praeparate,
- 斯忒羅反忒醇 Tinctura strophanthi
(極量一回〇。五，一日一。五)
- 安息香酸鈉咖啡鹼 Caf. (i o-Natrium benzoeicum (極量一回一。〇，一日三。〇)
- 橙皮醇 Tinctura Aurantii Corticis.
- 水楊酸鈉 Natriam Salicylicum.
- 碘化鉀 Kalium jodatum.
- 午羅忒羅品 Urotropinum ○尿素 Urea
 $\text{Co}(\text{NH}_2)_2$ (用量一日一〇。〇，一日二〇。〇)
- 黑耳米妥耳(新午羅忒羅品) Helmitolum
(Neu-urotropin) (用量一回一。〇)
- 狄午雷汀 Diuretinum (極量 一回一。〇，一日三。〇)
- 商陸膏 Extractum phytolaccae (用量一回〇。三，一日一。〇)

○硫酸鎂 *Magnesium sulfuricum.*

○午乏午耳西葉浸 *Infusum Foliae Uvae Ursi.* 處方

○午乏午耳西葉浸 *Infusi Fol. uvae ursi*
(5.0-10.0) 100.0

醋酸鉀液 *Liquoris Kalii acetici* 4.0

純糖漿 *Sirupi simplicis* 20.0

溜水 *Aquae destillatae* 80.0

右一日量, 三回分服 *S. täglich 3 mal*

z. n.

○醋酸鉀液 *Liquoris Kalii acetici* 10.0

硝酸鉀 *Kalii nitrici* 3.0

純糖漿 *Sirupi simplicis* 10.0

溜水 *Aquae aestillatae* 100.0

右一日量, 三回分服 *S. täglich 3 mal*

z. n.

(硝酸鉀通常與狄吉他利斯劑伍用)

○配合禁忌 (醋酸鉀)

一, 鏷酸類 *Mineralsäure.*

- 二，規林劑 Chin'in-praeparate。
- 三，抱水克羅拉耳 Chloral hydrat，
- 四，赤酒 Rotwein。

◎甘汞利尿（參看二〇六頁）

甘汞之利尿作用，其原理尚未闡明，用治心臟性浮腫，其效力往往優於狄吉他利斯劑。但對於腎臟，肝臟性水腫，多不奏效。有腎臟疾患即尿中證明有蛋白，圓球，血球，腎皮細胞等，則應禁用本品。利尿劑用甘汞處方，尚未起下痢之程度，即惹起劇烈之腸炎者有之，故宜注意使用。

第六方

甘汞 Calomelanos aa 0.5
 乳糖 Sacchar. lact.

右分三包，一日三回分服（二三日間服用）M. F. pulv. No. III S. Täglich 3 mal z. n°

○甘汞 Calomelanos
 阿片末 Pulveris Opii

右一包量，一日三回分服，三日間服用（無效時經一週後，應再試用） F. pulv. No. I Taglich 3 pulv. 3 Tage lang z. n.

○甘汞之配合禁忌（參看二〇一頁）

- 一、安替正林 Antipyrinum。
- 二、嗎啡劑 Morphin-*praeparat*ae。
- 三、碘劑 Jod-*praeparat*e。
- 四、炭酸類鹼 Kohlen \ddot{a} ure-Alkalien。
- 五、酸類 S \ddot{a} ure。
- 六、硫黃 Sulfur。
- 七、金硫黃 Stibium Sulfuratum aurantiae。

八、氯砂 Ammonium chloratum。

○其他之利尿劑

一、尿防腐劑

○多應用於淋疾，少有用為利尿藥者，腎臟有疾患者，嚴禁使用，當施導尿管插入時，作須豫防準備，之用。

○料派巴樹脂 Balsam. Copaivae 0.1

(右一回量) 裝入膠囊一個，一日服用
六回，D. t. d. No. VI. ad. caps. gelatinos
S. Täglich 6 Kapseln z. n.

○吐松實(子)浸 Inf. Fructus Juniperi
(5.0) 100.0
醋酸鉀液 Liquor. Kalii acetici 5.0
純糖漿 Sirupi simpl. 10.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal
z. n.

○午乏午耳西葉浸 Inf. Fol. uvae ursi
(5.0—10.0) 100.0
(純糖漿) (Sirup. Simpl.) (10.0)
(苦味醇) (Tinctura amarae) (2.0)

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal
z. n.

二，商陸膏(用量一回〇。三，一回一。
○) Extractum phytolaccae.

三，重酒石酸鉀三。〇 Kalii bitartarici
(Cremor tartari) 3.0

右分三包，一日分服（和於溫湯內服用，
有加用茴香油糖者） F. pulv. No III. S.
Taglich 3 mal z. n.

四，水楊酸鈉（肋膜炎） Natrium Sali-
cylicum.

（有腎臟疾患者須注意使用）

備考

- 午乏午耳西葉通常須細截後製為浸劑，（
或煎劑）。
- 午乏午耳西葉浸如加以水楊酸鈉，則析出
水楊酸，加以午羅忒羅品，安替正林，正拉
密洞，則生沈澱，加入阿片醇，則能迅速發
生沈澱。
- 時而用甲狀腺製劑亦尿有利之效，（腎性
水腫，妊娠腎性水腫）。
- 腎性水腫用其他種種方法無效時，使用大
量尿素（一回量二〇・〇）而得意外之效
果者有之。

一九， 尿防腐劑 (Harn—Antiseptica)

○所謂尿防腐藥者，即對於尿有防腐性之藥物也，有防止尿中之細菌發育，及制止尿起分解之效力，又能輕微刺戟腎臟，而來腎臟充血，故尿量亦因之增加。

○應用 主治尿路之細菌性疾患，特以淋疾

尤多用之。

○少有用爲利尿藥者，腎疾患亦須禁忌使用。

◎揮發油類（通常須於食後服用）

第一方

科派巴樹脂 Balsam.copaivae 0.5

左一回量。盛入膠囊內服用。一日與以三回。（每食後服一囊）（又可用丸劑或乳劑）D. t. d. No. III. ad Caps. gelatinos. S Täglich 3 mal z. n. (nach der Mahlzeit)

○適用於亞急性及慢性淋疾。用後有現嘔吐皮膚發疹。或蛋白尿。血尿等副作用者。

第二方

白檀油 Olei Santali 0.3—0.5

右一回量，裝入膠囊內服用，一日與以三回（食後服一粒）D. t. d. No. III. caps. gelatinos. S. Täglich 3 kapseln z. n. (nach der Mahlzeit)

其他之製品 （一回量）

一。 蔓橙茄膏 ○。六 Extractum

Cubeburum.

二, 戈諾羅耳 〇。三至〇。五 Gonorol
(santalol).

三, 薩羅耳白檀油 〇。五 Salosantal°

四, 戈諾散 〇。三 Gonosan.

五, 散替耳 二五滴 Santyl°

六, 吐松實 一〇。〇至二〇。〇

浸劑 Fructus juniperi.

七, 戈諾薩耳彬 〇。五 Gonosalbin.

◎六甲欠基化四氮(Hexamethylentetramin)

類(午羅忒羅品類)

○內服後在尿中分解而生蟻酸醛(Formaldehyde),故對於尿有防腐性。

○有利尿作用且不刺戟腎臟,故可數月間持續使用。

第三方

午羅忒羅品 Urotropini 1.5至2.0

乳糖 Sacchar. lactis 1.5

右分三包,一日量(可伍用重碳酸鈉)F.

Pulv. No° III. S. Täglich 3 mal z. n.

○午羅忒羅品 Urotropini 1·5
重碳酸鈉 Natr. Bicarbonici 3·0
溜水 Aq. dest.

右一日量 (每食後) 三回分服 S. Tägl.
ish 3 mal z. n.

(持續長久使用，其日用量不可超過一·

五，午羅忒羅品可與苦味醇或硫酸鏷伍
用) 。

○其他之製品 (一日量)

一，黑忒拉林 一·五——二·〇 He-
tralin (urotropium cum Resorcino)

二，波羅肥汀 一·〇——四·〇
Borovertin.

三，黑耳米妥耳 三·〇 Helmitol. (Neu-
urotropin)

四，黑克薩耳 三·〇——六·〇 Hexal.

◎第四方

午乏午耳西葉煎 Decoct. Fol. uvae ursi

(5.0-10.0) . 100.0
 (純糖漿) (S. simpl.) (10.0)
 (苦味醇) (Tinct. amarae) (2.0)
 右一日量, 三回分服。S. Täglich 3 mal

Z. D.

應用配合藥品 (第四方)(午乏午耳西葉煎)

- 苦味醇 Tinctura amarae,
- 薩羅耳 Salolum (振盪合劑)
- 午羅忒羅品 urotropinum. (發生沈澱但藥效上無差異)
- 醋酸鉀液 Liquor kalii acetici.
- 溴化鉀 Kalium bromatum.
- 莨菪膏 (極量一回〇・〇五, 一日〇・一五) (Extractum Scopoliae.
- 伊希焦耳 Ichthyolum.
- 馬前子醇 (極量一回一・〇一日二・〇) Tinctura vomicae.
- 波羅肥汀 Borovertinum.
- 纈草醇 Tinctura valerianae.

○重碳酸鈉 *Natrium bicarbonicum*。

◎第五方

薩羅耳 *Saloli*

乳糖 *S. lact*

右分三包一日三回分服（可加入次硝酸鈹）*F. pulv. No. III. S. Täglich 3 mal z. n.*

備考

○午乏午耳西葉煎劑與水楊酸鈉伍用，則析出水楊酸。與安替正林，正拉密洞配合，則生沉澱。

◎第六方

水楊酸鈉 *Nat. salicylici* 1.5-2.0

重碳酸鈉 *Nat. bicarbonici* 3.0-4.0

苦味醇 *Tinct. amarae* 2.0

溜水 *Aq. dest.* 100°0

右一日量，三分服 *S. Täglich auf 3 mal z. n. (n. d. mahlzeit.)*

○替飛拉民 *Typheramin* 爲四〇%六甲欠基化四氫溶酸 (*Nexamethylentetra-min*)

配合○。五%硫酸鎂 (Magnesiumsulfat) 之無色透明液也，呈弱鹼性反應，為靜脈內注射液，每日注射一次，一回注入五 c. c. (一管量)，連用一週以上，亦不發現副作用。

○午羅朵拉耳 Urodonal -- (法製品) 其主要成分為 methylglyoxaluridine, quinate de diéthylènediamine, Héxaméthylèntetramin 等，係白色顆粒狀品，有清之味，應用於一，關於尿酸之疾病，二，尿路防腐作用，三，使新陳代謝旺盛。一日服用三回，每回一茶匙，和入微溫湯內於飯時服用。

二〇, 發汗劑 (Diaphoretica)

一般注意

汗之通常主要任務, 雖為調節體溫, 但有時亦可排泄體內過量之水分, 食鹽及尿素等, 而代償腎之機能。

一般應用 (發汗劑)

- (A) 炎性滲出液, 水腫, 玻璃體瀰濁等症
 (B) 一般腎機能不全°
 (C) 水銀及鉛中毒, 急性傳染病, 及上氣道
 急性加答兒之初期。

發汗劑之種類

- 一, 中樞性發汗劑 (鈹劑)
 二, 末梢性發汗劑 (派羅卡品)

第一方

鹽酸派羅卡品 Pilocarpin hydrochlorici

0.2

蒸溜水 Aq. dest.

(卽 2%) 右 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ 筒, 皮下注射 S $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$
 spritze voll zur subkutanen Injektion.

(注射後服用溫牛乳或溫湯)

- 鹽酸派羅卡品 (極量一回 0.02, 一日 0.04)
 ○注意 其副作用能沈降血壓, 故有心臟病
 者禁忌使用, 又妊婦亦當禁用本品。
 ○鹽酸派羅卡品 小兒用量

(一回量) (一日量)

一歲——二歲……○·○○○五——○·○○○
 三歲——四歲……○·○○○——○·○○○二
 五歲——一○歲……○·○○○三——○·○○○五
 一一歲——四歲……○·○○○五——○·○○○

○鹽酸派羅卡品 pilocarpini hydrochlorici
 0.1

甘草末及膏 Pulv. et Extracti Liquirit
 iae q. s.

右爲十九丸，每丸一丸，M. F. pilulae No.
 X. S. I pile z. n.

○鹽酸派羅卡品 Pilocarpini hydrochlorici
 0.01

乳糖 S. lactis 0.5

右一包量，頓服用 F. pulv. No. I. S. Auf
 einmal z. n.

第二方

醋酸鋁液 Liquor Ammonii acetici (spir
 iti Mindereri) 10.0

接骨木花浸 Inf. Flores Sambuci (20.0) 100.0

橙皮糖漿 *Sirup. Cort. Aurantii* 10.0

右一日量，數回分服 S. Täglich mehrmals z. n.

第三方

卡半耳花 *Flo.: chamomillae* 0.0

右浸於二盃熱茶內服用 S. In 2 Wein—
Glas heißen (e) z. n.

第四方

水揚酸鈉 *Nat. salicyli* 3.0

薄荷水 *Aq. Menthae* 20.0

溜水 *Aq. dest.* 100.0

右一日量，數回分服(可伍用重碳酸鈉)
S. Täglich mehrmals z. n.

第五方

阿斯匹林 *Aspiriri* 0.5

乳糖 *S. lactis* 0.5

右一包量，頓服用 M. f. pulv. No. I.
S. Auf einmal zu nehmen.

第六方

陀肥耳氏散 (發汗散)

陀肥耳氏散 Pulv. Doveri 0.3-0.5

乳糖 S. lactis 0.5

右一包量,頓服用(全身温包)M. f.

pulv. No. L S. Auf einmal z. n.

二一、止汗劑

(Anidrotica.)

一般注意

○多汗症有局部症及全身症兩種。

○止汗劑分內用與外用兩種。

第一方 硫酸阿忒羅品 (極量一回0.001
一日0.003)

硫酸阿忒羅品 *Atropini Sulfurici* 0.05

甘草末及膏 *Pulv. et Succo Liquiritiae*

q. s.

右爲二十九，一回一丸，頓服用 *M. F.*
pilulae No. XX. S. 1 pille auf einmal. (一丸
中含0.0005)

(須於夜間就眼前約一小時，頓服用，其作用於副交感神經之末端，而制止汗腺之分泌，其副作用，患者屢屢訴其咽喉有乾燥之感)。

□ 0.05% 硫酸阿忒羅品水 (0.5% *Atropinum sulfuricum*)

右皮下注射料，一回一筒 *F. zur subkutanen Injektion S. 1 spritze voll Auf 1 mal.*

第二方(阿加利進極量一回0.1) (*Agaricinum*)

阿加利進 *Agaricini*

甘草末及膏 *Pulv. et Extracti Liquiritiae*

q. s.

右爲十九，一回頓服一丸 M. F. pil. No. X. s. I pille Auf einmal.

○阿加利進有汗腺分泌之抑制作用，但間有起下痢者，故可加用陀肥耳氏散（用量，一回○。○——○。○二，其作用持續之時間，較阿忒羅品爲長）

□阿加利進 Agaricini	— 0.1
陀肥耳散 pulv .Doveri	2.0
乳糖 S. lactis	3.0

右爲十包，就寢前頓服一至二包 M. F. pulv. No. X. S. vor dem Schlafengehen 1—2pulv. z. n.

第三方

樟腦酸 Acid. Camphoric.	1.0—2.0
----------------------	---------

右一回量，頓服用 F. pulv. No. I. S. Auf einmal z. n.

（結核之盜汗，晚間用1.0—2.0）

□坦雷酸規寧 Chinini Tarnici	0.2
乳糖 S. lac is	0.5

右一回量，頓服用 M. F. pulv. No. I.
S. Auf einmal z. n.

○外用汗劑

- 一，食醋Essig。(稀釋二至三倍，清拭用)
十倍之醋酸水，或三十倍之冰醋酸水
與之相同。
- 二，酒精Alkohol。(約稀釋二至五倍，用以
清拭)
- 三，亭蘭登(清拭)(又可用五。〇——
一〇。〇內服)
- 四，坦諾封Tannoform(撒布)
- 五，明礬末，滑石末等分Alaun-Talcum
(撒布)

備考

- 麥角膏(〇。一——〇。二)頓服用(多
作丸劑使用)
- 樟腦(〇。一——〇。二)頓服用

二二, 鎮吐劑

(Antiemetica)

第一方 鹽酸科卡音 (極量一回〇・〇
5, 一日〇・15)

鹽酸科卡音 *Cocaini hydrochlorici* 0.05

乳糖 *S. lactis*

右分三包, 一日三回分服 *M. F. pulv.*

No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

□鹽酸科卡音Cocaïni hydrochlorici 0.0.5

純糖漿Sirupi Simplicis 10.5

溜水Aq. dest. 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

(如加用重碳酸鈉, 臨用時須強力振盪)

□沸騰散(Pulvis aërophorus)

重碳酸鈉Natrii bicarbonici 2.0

酒石酸Acid. tartarici 1.5

溜水Aq. dest. 100.0

右臨用時調製, 乘沸騰時內服,

第二方

攝耳特耳水 Selterswasser

鹽酸科卡音 Cocaïni hydrochlorici

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

(單用無糖漿攝耳特耳水, 可加入苦味醇)

(其他可加用苦味醇橙皮醇, 或橙皮糖漿)

第三方 羥酸鋇 (極量一回0.3, -- 日1.0)

羥酸鋇 Cerium oxalici 0.2—0.3

煨製鎂 Magnesiae ustae 0.5

薄荷油糖, Elaeosacch. Menthae 1.0

右分三包, 一日量, M. F. pulv. No. III.

S. Taglich 3 mal z. u.

(可加用重碳酸鈉, 莨菪膏, 鹽酸科卡音等)。

第四方

薄荷腦 Mentholi 1.5

稀酒精 Spiriti Ailuti 30.0

右用十滴加於一杯葡萄酒內攪拌後內服

S. 10 tropfen in einem Becher Wein umgerührt z. n.

第五方

鹽酸嗎啡 Morphin. hydrochlorici 0.1

溜水 Aq. dest. 10.0

即%溶液, 一回用十滴和入糖水內服用

(一日可用數回) S. 10 Tropfen in

zuckerwasser auf einmal z. n.

第六方

碘醇Tincturae jodi

右用2滴滴於一食匙水內服用,服後即飲用少量牛乳(尿毒症之嘔吐及罣阻) S. 2 Tropfen in einem Esslöffel Voll Wasser mit Nachtrinken Von etwas Milch z. n.

□碘醇Tinct. Jodi 5滴

碘化鉀 Kalii Jodati 0.5—1.0

溜水Aq. dest. 100.0

右一日量,三回分服 S. Taglich 3 mal

z. n.

第七方

乳酸Acid. lactici 0.2—0.

純糖漿Sirup simpl. 20.0

溜水Aq. dest. 100.0

右每二小時服一食匙S. 2 stündlich 1 Esslöffel.

第八方

硫酸阿忒羅品 Atropini. Sulfurici 0.01
 蒸溜水 Aq. dest. 10.0

(即0.1%溶液) 右用半筒, 皮類注射
 (腹膜炎嘔吐) S. $\frac{1}{2}$ spritze zur subkutanen
 Injektion.

第九方

溴化鉀 Kalii bromati 3.0
 鹽酸科卡音 Cocaini hydrochlorici 0.06
 苦味醇 Tinct. amaræ 1.5
 溜水 Aq. dest. 100.0

右一日量. 六回分服 S. Täglich 6 mal

z. n.

第十方

半夏 4.0
 茯苓 2.0
 薑根 1.5
 溜水 100.0

右煎出後濾過, 一日三回分服 (須濃煎
 至 100.0 溫服用) (有加用純糖漿. 苦味醇, 薑

荷水者)

第十一方

克羅羅封	chloroformii	Gtt.6—7
重碳酸鈉	Natrii bicarbonici	3.0
苦味醇	Tinct. amaræ	1.0
溜水	Aq. dest.	100.0

右一日量, 三回分服S. Täglich 3 mal

z. n.

□重碳酸鈉	Natrii Bicarbonici	1.0
薄荷油糖	Elacosacchari Menthae	0.3

右一包量, 頓服用 F. pulv. No. I. S.

Auf einmal z. n.

備考

○乳兒嘔吐使用之藥劑:

一, 一%重碳酸鈉水 %Natrium bicarbonicum.

二, 阿內斯退章Anästhesin. (一日數回○。○五——○。一——○。二)。二%阿內斯退樹膠漿水, 於授乳前十五分鐘內服

五・〇。

三、阿來品Alypinum（一日數回，每回〇・〇五——〇・一）製成一至一二%溶液，於授乳前十五分鐘內服五・〇，（阿來品爲科卡音之代用品，其毒性約等於科卡音 $\frac{1}{2}$ ）。

○一般鎮吐劑可加入極少量之味之素。

二三， 止痢劑

(Antidiarrhoica, Obstipantia.)

一般應用上之注意 ○由食傷來之下痢，細菌性產物，或分解之食物殘渣存於腸內之際，須先用下劑排除之，然後投以止痢劑。急性下痢或急性腸加答兒，初用一二回蓖麻油或甘汞等下劑，至適用量時，不可即繼續引用次硝酸

罌及阿片等爲佳，却可用少量之焦科耳或科倫波根之散劑，浸劑，或煎劑代之，(但其苦味甚強，一般幼兒難於應用)，○腸管之潰瘍或腹膜之炎症發現下痢之際，則適用止痢劑之處方。

止痢劑之種類：

- 一，靜止腸管運動之藥物 (鎮靜劑)
- 二，腸粘膜收斂藥

◎第一靜止腸管運動之藥物

靜止腸管運動之藥物，主用者爲嗎啡劑及阿片劑，由迷走神經之刺激，而來之下痢及腸痙攣，則宜用阿忒羅品或莨菪劑，而腸管運動靜止藥，則阿片劑之效力優於啡嗎。

第一方 阿片末(極量一回○·一五，一日○·五)

阿片末	Pulv. Opii	0.1
乳糖	S. lactis	2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

鹽酸清涼水 Salz-äure—Limonade 100.0

阿片醇 Tinctur. Opii 1.0

右一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

重碳酸鈉 Natrii bicarbonici 3.0

阿片醇 Tinctn. Opii. 1.0

溜水 Aq. dest. 100.0

右一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

阿片醇 Tinctur. Opii 1.0

2%樹膠漿 2% Mucilag. Gummi arab.

100.0

右一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

阿片醇 Tincturae Opii 1.0

1%薩利潑漿 1% mucilag. Tub. salep.

100.0

右一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

□阿片醇 Tincturae Opii Gtt. ss.
糖水 Zuckerwasser 30.0

右頓服用 S. Anf einmal z. n.

○阿片醇 (極量一回一。五, 一日五。○)

○阿片醇之小兒用量 (小兒使用須特別注意)

用量 (一日量) 極量 (一日量)

一歲以下.....0.015 0.025

一歲至二歲.....0.02—0.05 0.05—0.1

三歲至五歲.....0.05—0.15 0.1—0.2

五歲至十歲.....0.15—0.2 0.2—0.3

十歲至十五歲...0.2—0.3 0.3—0.5

○阿片醇二濁約等○。一

第二方 陀肥耳散 (極量一回1.0, 一日
3.0)

陀肥耳氏散 Pulv. Doveri 1.0—1.5

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包, 一日量 M. F. pulv. No. III.

S. Täglich 3 mal z. n.

○陀肥耳散之小兒用量 (一回量)

一歲至二歲…○。○○一至○。○○三
 三歲至四歲…○。○○三至○。○○五
 五歲至十歲……○。○一至○。○二
 十一歲至十五歲…○。○三

應用配合藥品 (第二方) (陀肥耳氏散)

- 坦那耳彬 Tannalbinum.
- 科倫波 pulv. rad. Colombo.
- 阿片末 (極量一回○。一五,一日○。五)
pulv. Opii
- 次硝酸鉍 Bismutum. Subnitricum.
- 甘汞 Calomelas.

第三方

科倫波根末 Pulv. rad Colombo 1.0
 陀肥耳散 Pulv. Doveri 1.0

右分三包,一日三回分服(胃腸消化不良
 殊以伴有嘔吐,下痢者賞用之) M.F. pulv.
 No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

□科倫波根煎 Decoct. rad. Colombis (1.0)
 100.0

純糖漿 Sirupi Simplicis 10.0

右一日量，三回分服(有加用次硝酸銨或
磷酸科亭者) S. Täglich 3 mal z. n.

備考 阿片劑爲疼痛，咳嗽，蠕動亢進。糖尿病
等之重要藥品，如大量使用或長時連用，則現
副作用，多發胃症狀，如惡心，嘔吐，胃部膨
滿，胃病等是。阿片劑能增進胃酸之分泌，故
胃酸過多症，胃潰瘍等時須注意使用，以之上
不快胃症狀，只須服用鹼性劑，即可使之減
退。

對於毒素性下痢不可投與阿片劑。(食傷等
伴有著明疼痛之下痢時用之，却能增加身體
之違和；反之，如用下劑蓖麻子油，則奏良
效。)

阿片劑用爲便秘劑之價值，第一爲阿片，第二
聆妥烹，第三鹽酸嗎啡。但用鹽酸嗎啡與磷酸
科亭之合劑，其效力則駕乎純阿片之上，而磷
酸科亭則適用爲止痢劑。

阿片有促進腸粘膜吸收水分之作用，故滋養

愈腸加入阿片醇，不僅對於腸蠕動有關，且微有促進吸收之作用。

(阿片類之止痢作用，因其能使病的興奮之腸蠕動靜止故也。阿片，陀氏散，聆安烹等乳兒均不可用，即幼兒用之，亦宜限制)。

◎第二腸收斂藥

腸收斂藥分爲一，重金屬鹽類，二，鞣酸類，而常用爲止痢劑者。爲人工鞣酸化合物，即坦那耳彬，坦尼堇(Tannigen)，坦諾封(Tannofor-m)，坦利斯嗎忒(Tannismuth)等是，銻類則用次硝酸銻，必斯母妥舍(Bismutose)，必斯孟(Bismou.)等。

○銻劑在腸內與硫化水素結合，而抑制腸之蠕動，有收斂性作用，又能仰制胃之蠕動。

○鞣酸化合物至腸內即顯其作用。對於腸粘膜有收斂之性質。

(1)重金屬鹽類

第一方

次硝酸銻 Bismut. Subnitrici 2.0

乳糖 Sacchari lactis

1.5

右分三包，一日三次分服 F. pulv. No.

III. S. Täglich 3 mal z. n.

應用配合藥品

(第一方)

○重碳酸鈉 Natrium bicarbonicum.

○煨製鎂 Magnesia usta.

○龍膽末 Pulv. Gentianae.

○阿片末 (極量一回 〇・一五，一日 〇・五)

Pulvis Opii.

○黃礬膏 (極量一回 〇・〇五，一日 〇・一

五) Extractum Scopoliae.

○坦那耳彬 Tannalbinum

○鹽酸黑羅音 (極量一回 〇・〇〇五，一日 〇

・〇一五) Heroinum hydrochloricum.

○鹽酸嗎啡 (極量一回 〇・〇三，一日 〇・

二) Morphinum hydrochloricum.

○磷酸科亭 (極量一回 〇・一，一日 〇・三)

Codeinum Phosphoricum.

○陀肥耳氏散 (極量一回 一・〇，一日 三・〇)

○) Pulvis Doveri.

○薩羅耳Salolum.

○哥倫波末Pulvis radice Colombo.

○阿斯匹林Aspirin.

○安替匹林Antipyrinum(極量一回一。○,
一日三。○)

○乏戈耳Fagol.

□次硝酸鉍Bismut. subnitrici 1.0

坦那耳彬Tannalbin 1.0

重碳酸鈉Natrii bicarbonici 2.0

右分三包, 一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

□次硝酸鉍Bismut. subnitrici 2.0

2% 樹膠漿 2% mucilag. Gummi arab.

100.0

(純糖漿)(Sirup. Simpl.) (10.0)

右一日量, 回三分服, (與以振盪劑) S.

Taglich 3 mal z. n. (Schüttelmixtur)

第二方

次水楊酸銻 Bismut. Subsalylic. 3.0

乳糖 S. lactis 1.0

右分三包，一日量(腎疾患須注意) M. F.

pulv. No. III. S. Taglich 3 mal z. n.

應用配合藥品 與次硝酸銻相同

第三方

次沒食子酸銻 Bism. subgallic. (Derm-
atol.) 1.5

乳糖 S. lactis 1.5

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.

No. III. S. 3 mal taglich z. n.

其他重金屬鹽類

一，氧化鋅 Zincum Oxydatum (Flores
zinci)。

二，硝酸銀 Argentum nitricum。

三，錯酸鉛 Plumbum aceticum. (鉛糖)
(Bleizucker)。

四，必斯母妥舍 Bismutose。

五，必斯馬耳 Bismal。

六、必斯孟 Bismon.

第四方

	(2000倍)	(1000倍)	(500倍)		
硝酸銀 Argenti nitrici 0.05	}	}	}		
甘油 Glycerini 10.0				0.1	0.2
蒸溜水 Aq. dest. 100.0				10.0	10.0
		100.0	1000.0		

右一日量，三回分服（裝入墨色罇）S.
Tägich 3 mal z. n.

〔小兒用二千倍溶液，隨年齡之大小與以
適量（小兒下痢）〕

□ 0.2% 硝酸銀水 0.2% Argenti nitrici. q:s
樹膠漿（局方約 33%）Mucilag. Gummi
arab. p. s.

右灌腸用 S. zum Klystier.

(II.) 鞣酸類

第一方

坦寧酸 Acidi tannici	0.15
阿片末 Pulv. Opii	0.0
乳糖 Sacchari lactis	2.0

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv.
No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

□ 坦寧酸水 Acidum tannicum (0.3—0.5—
—1%) 200.0—300.0

《 右灌腸料(洗滌料) S. Zum Klystier
(Darmspülung)

應用配合藥品 (第一方)

- 食鹽 Natrium chloratum.
- 亞拉伯樹膠 Gummi arabicum.
- 阿片醇 Tinctura Opii

第二方

坦甯酸蛋白素 (坦那耳彬) Albumini ta-
nini (Tanalbini) 1.5—8.0
乳糖 S. lactis 2.0

右分三包，一日三回分服 F. pulv. No. III.
S. Täglich 3 mal z. n.

○ 坦甯酸製劑不溶解於水及胃液內，至腸管
乃徐徐分解，而折離其有效之鞣酸，對於全
腸管均有收斂作用之性質，故專應用於腸

之疾患。

應用配合藥品 (第二方)

○次硝酸鉍(臨床上可與配合) *Bismutum subnitricum*.

○阿片末 (極量一回〇・一五, 一日〇・五)

Pulvis Opii.

○阿斯匹林 *Aspirinum*.

○安替匹林 *Antipyrnum*.

○次水楊酸鉍 *Bismutum Subsaliicylicum*.

○迨馬妥耳 *Dematolum*.

○薩羅耳 *Salolum*.

○乏戈耳 *Fagolum*.

○莨菪膏 (極量一回〇・〇五, 一日〇・一

五) *Extractum Scopoliae*.

其他止痢劑

一, 乳酸清涼水 (〇・五至一%)

Milchsäure—Limonade (0.5—1%)

二, 五倍子醇 (一日數回, 〇・五至一・五)

Tinctura Gallarum.

三、阿片醇(一日數回, 〇・五至一・五)

Tinctura Catechu.

四、拉他尼阿醇(一日數回一・〇至二・〇)

Tinctura Ratanhiae

◎附記(粘滑劑)

○ 2%樹膠漿2% mucilag Gummi arab.

100.0

阿片醇Tincturae Opii

1.0

右一日量, 三回分服 (有加用次硝酸銻者) S. Täglich 3 mal z. n.

○ 1%薩利潑漿1% Muciag. Salep 100.0

阿片醇Tinctura Opii

1.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

○ 2%澱粉漿2% mucilag. Amyli 100.0

阿片醇Tincturae Opii

1.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

○ 1%薩利潑漿1% mucilag. Salep 200.0

—300.0

阿片醇Tincturae Opii

1.0

右灌腸料S. zum klystier z. R.

二四， 止血劑

(Haemostyptica, Blutstillendes Mittel)

止血劑之作用：

一，使血液之凝固性亢進，二，或直接使之凝固，三，使血管之收縮加強

止血劑之應用： 出血有內出血及外出血兩種，故止血劑或以內用或以外用。

(A)使血液凝固而奏止血作用之藥物。(一般爲使蛋白質凝固者)

一，醋酸鉛水 二，過氯化鐵液 三，坦寧酸 四，明礬 五，醋酸礬土 六，飛利正林(Ferripyrin)

第一方

醋酸鉛(鉛糖) Plumbi acetici	0.1—0.2
阿片末 Pulv. Opii	0.1
甘草末 Pulv. Liquiritiae	1.5

右分三包，一日三回分服(鹽酸嗎啡可作阿片末之代用品) M. F. pulv. No. III. S.
Täglich 3 mal z. n.

第二方

過氯化鐵液 Liq. Ferri Sesquichlorati	1.0
溜水 Aq. dest.	100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

應用配合藥品 (第二方)

○橙皮醇 Tinctura Corticis Aurantii.

○阿片酹 *Tinctura Opii*

○橙皮糖漿 *Sirupus Corticis Aurantii*

○亞拉伯樹膠漿 *Mucilago Gummi Arabici*

過氯化鐵液為有力之局所止血藥。但胃出血等用為內用止血劑，則其奏效不確。

[B] 血管收縮藥

為使血管收縮而奏止血之效者也，分為使全身血管收縮之麥角劑，及使局所血管收縮之腎上腺素劑兩種。

第三方 (麥角極量一回一。〇，一日五。)

○) 麥角浸 (3.0) *Inf. Secalis Cornuti* 100.0

右一日量，三回分服 *S. Täglich 3 mal z. n.*

麥角之應用

- 一，陣痛微弱 (在開口期禁忌)
- 二，後產期及分娩後之子宮收微弱
- 三，子宮內出血・子宮筋腫
- 四，脊髓疾患，尿崩症

麥角之急性中毒

煩渴，嘔吐，嘔心，下痢，眩暈，頭痛，痙攣發

作，虛脫。

麥角之慢性中毒

瘰癧，痙攣，流產等。

麥角多作浸煎劑使用，採取後經過一年以上，則其效力不確。(注意防濕，虫害)。

麥角之配合禁忌

- 一，碘化鉀
- 二，碳酸類礬
- 三，坦寧酸含有物
- 四，酒精含有物
- 五，重金屬鹽類(醋酸鉛)

麥角處方之應用配合藥品

- 稀鹽酸 Acidum hydrochloricum Dilutum.
- 苦味醇 Tinctura amara.
- 午乏午耳西葉煎 Decoct. Fol, Uvae ursi.
- 硫酸鎂 Magnesium. Sulfuricum.
- 阿片醇 (極量一回一。五，一日五。○)

Tinctura Opii.

- 血馬米利斯流動膏 (一日數回，用二○至

三〇滴) *Extractum Hamamelidis fluidi*.

● 續草醇 *Tinctura Valerianae*.

● 莨菪膏 (極量一回〇・〇五, 一日〇・一五) *Extractum Scopoliae*.

● 桂皮醇 *Tinctura Cinnamomi*.

● 芳香醇 *Tinctura Aromatica*.

● 橙皮醇 *Tinctura Aurantii Corticis*.

● 狄吉他利斯劑 *Digitalis-preparate*.

● 鹽酸黑羅音 (極量一回〇・〇〇五, 一日〇・〇一五) *Heroinum hydrochloricum*.

● 鹽酸嗎啡 (極量一回〇・〇三, 一日〇・二) *Morphinum hydrochlorium*.

● 磷酸科亭 (極量一回〇・一, 一日〇・三) *Codeinum Phosphoricum*.

● 杏仁水 (極量一回二・〇, 一日六・〇) *Agua Pruni armeniae*.

第四方 麥角膏 (極量一回〇・三, 一日一・〇)

麥角膏 *Extrat. Secalis Cornuti* 0.5

溫湯 Warmes Wasser 100.0

右一日量，三回分服 S. Taglich 3 mal

z. n.

應用配合藥品 同前

□ 麥角膏 Extracit. Secatis Cornuti 3.0

甘草末 Pulv. Liquiritiae q. s.

右爲30丸，一日三四回，每回一粒，(動脈硬化，心臟瓣膜病) (可加用狄吉他利斯末或龍膽末)

M. F. pill. No. xxx S. Taglich 3-4

mal No. L z. n.

第五方

波伯龍氏愛耳戈汀 Ergotini Bombelon

右注射料 S. Zur Injektien.

△一面量 〇。二——〇。五，注射時用等

分之殺菌蒸溜水或一%鹽酸嗎啡水稀釋

(吸入注射筒內)，注射於皮下或筋肉內。

△陣痛微弱每十分鐘內服五至一〇滴。

△子宮出血，一日數回每。回內用五至一〇

滴。

△小兒膀胱麻痺，一日數回，每回一至二滴。

△夜尿症亦可用之。

△其他各種出血用○。二至○。五注入皮下，(其效力不定)。

□麥角膏	Extract. Secalis Cornuti	1.0
石炭酸	Acidi Carbolici	0.1
蒸溜水	Aq. dest.	10.0

右殺菌注射料， $\frac{1}{2}$ —1筒皮下注射(胃潰瘍注射於心窩部)S. Sterilisiert für Injektion
($\frac{1}{2}$ —1 spritze subkutan)

其他之血管及子宮收縮藥

一，希朶拉斯替流動膏(一日數回，每回一五至二○滴) Extract. Hydrastis fluidum.

二，斯台潑妥耳(一日數回，每回○。○五) Styptol.

三，披大忒林(用○。五至一。○皮下注射) Pituitrin.

四，格布耳汀(Geburtin)

第六方

鹽化腎上腺素（千倍液） 0.1% Solutio
Adrenalini hydrochlorici

右注射料，一回用 $\frac{1}{2}$ 筒皮下注射S. $\frac{1}{2}$
spritze zur subkutanen Injektion.

△敗竇之鹽化腎上腺素一回用一。○以
下，（局所止血藥）

△施手術之際，可與鹽酸科卡音或諾服卡
音伍用，作局所麻醉劑

△咯血寧以禁忌為佳，因其對於肺之血管
（末梢）能走反射的擴張。

△喘息發作用腎上腺素，屢奏奇效，（可作
皮下注射）。

△子宮出血之際，用千倍液腎上腺素，注射
三分之一筒於子宮實質內，有奏著效者。

△用為強心劑殊以由血管麻痺而來之血壓
下降有效，又急性傳染病，尤以白喉及肺
炎來之心臟衰弱適用之，（一回○。二至
○。五），（皮下注射）。

△靜脈內注射時釀成危險者有之，所謂腎

上腺齷死是也，故宜注意使用。

△皮下注射時，亦須注意不可入於血管內。

△吸收大量能起急性中毒（心悸亢進，呼吸困難，急性貧血等，）用於老人小兒尤宜注意。

△連用過久，則來血管變性。

○嗜血習慣雖慣用麥角，愛耳戈汀，腎上腺齷等。然於藥理上為不合理之事實，故宜注意；反之，麥角劑對於子宮出血殊以後產期之無力性出血，則有確實之效力。

第七方

披大忒林Pituitrini 0.5—1.0

右注射於上膊之皮下，（靜脈內注射用0.

b）（為產科必須之用藥，通常多用玻璃管製品）

S. Für subkutanen Injektion.

〔C.〕亢進血液凝性之藥物

一，阿膠（麥爾克社及三共社製品）Gelatin.

二，血清（白喉血清）（全身止血劑）

Serum.

三， 陪潑通(五%)Pepton.

四， 石灰鹽類Kalksalze.

五， 斯他格林Stagnin.

六， 戈阿克來(用五乃至一〇%溶液，塗擦
創面或注入靜脈內)Coagulen.

七， 斯卡戈耳林(皮下注射)Secacornin.

第八方

氯化鈣Calcii chlorati	2.0
糖精(溶性)Saccharini(Solubile)	0.05
溜水Aq. dest.	100.0

右一日量， 三回分服 S.Taglich 3 mal

z. n.

注意 氯化鈣與氯化石灰不可混淆， 鈣鹽除催
進血液凝固外， 又有緻密血管壁之性質， 故
適用於出血性素因， 此緻密血管壁之故也。

應用 出血性素質， 蕁麻疹， 強心藥， 鎮痙藥， 血
清病， 喘息， 咯血， 結核性疾患， 腸出血， 痒
性皮膚病， 小兒痙攣， 帝答尼(Tetanie)等，

均適用之。

<input type="checkbox"/> 氯化鈣 <i>Calcii chlorati</i>	3.0—10.0
薄荷水 <i>Aq. Menthae</i>	10.0
溜水 <i>Aq. best.</i>	100.0

右一日量，數回分服 *S. Taglich mehrmals z. n.*

<input type="checkbox"/> 乳酸鈣 <i>Calcii lactici</i>	3.0—5.0
薄荷水 <i>Aq. Menthae</i>	10.0
溜水 <i>Aq. dest.</i>	100.0

右一日量，數回分服 *S. Täglich mehrmals z. n.*

○氯化鈣因能刺戟胃臟，多供注射使用，乳酸鈣多用爲內服（氯化鈣用爲皮下注射，必須用其1%溶液）

氯化鈣（1%溶液）*1% Calcium Chloratum*
右一回用35—50cc注入靜脈內，（皮下注射亦有效）*S. 35—50cc. auf einmal intravenös zu injizieren.*

氯化鈣（2至3至5%溶液）*2—3—5% Calci-*

um chloratum.

右20.cc靜脈內注入(喘息)S. 20.cc.int-raveös zu injizieren.

◎血清爲有效之全身止血劑，應急時用白喉血清，破傷風血清，或健康馬血清亦可，反覆注射於皮下或靜脈內，但須注意過敏症。

第九方

白阿膠Gelatinae albae	10.0
食鹽Natrii chlorati	2.0
溜水Aq. dest.	100.0

右加溫作成合劑，一日三回分服，(用時須再加溫)S. Täglich 3 mal erwärmt z. n.

△有加用阿片醇者，或加入果實汁，而加熱煮沸，俟其冷卻後，則成爲膠質狀態，然後服用亦可。

△內服用一〇%溶液，一日數回溫服。

△灌腸用一〇%溶液，一回五〇乃至一〇

〇.〇cc.加以阿片醇，此爲常用之灌料腸

△主治 各種出血，初生兒糜爛，血友病。

紫斑病，產後之出血等，均應用之。腸出血可用以皮下注射。

第十方

注射用威菌白 { 常用者為麥爾克社製品， }
阿膠 (10%) { 有10cc與40cc兩種 }

Gelatinae sterilisatae pro Iniectione Merck.

右皮下注射料，一回10cc至20cc至40cc

S. zur Subkutanen Injektion.

△通常注入右大腿一〇cc至二〇cc，左大腿一〇cc至二〇cc，或注入肩鉀間部之皮下組織中，先於刺入部施知覺麻醉法，注射時乃無疼痛，每日或隔日注射一次，止血後尚須反覆三日，效力乃為確實（一時注射四〇cc亦可）。

△動脈瘤一週注射一回。

（注射後二三小時，有發三八度——三九度之熱候者，但不足為慮，施以對症的處置，即可下降，又皮下注射部之疼痛，約經四日，則全消失）。

第十一方

10%食鹽水10%Kochsalzlösung 4.0—5.0

右殺菌，靜脈內注射S. sterilisiert intravenös zu injizieren.

第十二方

戈阿克來Coagulen

戈阿克來為血小板浸出物加入葡萄糖而成，臨用時作為五至一〇%溶液，數分間煮沸殺菌後使用，外科手術之際，用以吸入注射器，塗布於創面上，則能使血液迅速凝結。又血友病，出血性紫斑病，注入靜脈內，亦有效云。亦可內服用治胃腸出血。

第十三方

斯卡戈耳林Secacornin 0.5—1.0

右內服或皮下注射S. Innerlich od. subkutan.

二五， 健胃劑

(Stomachica,)

胃之機能：

- 一， 運動 ← 迷走神經(催進)
 交感神經(制止)
- 二， 分泌 (陪潑辛, 鹽酸, 凝集素)
- 三， 消化管之吸收作用, 其重要部分, 爲腸管

粘膜，胃粘膜僅有輕微之作用而已。（糖類，糊精，陪發通，酒精等）

健胃劑之應用：

- 一，使消化液分泌亢進。
- 二，亢進腸胃粘膜之吸收作用。
- 三，增加白血球之數。
- 四，使胃腸之蠕動亢進。

健胃劑之醫治效用：

- 一，除去消化不良
- 二，有酵制作用
- 三，有驅風之效
- 四，有助長下劑之效

健胃劑之分類：

(A) 酸類一，稀鹽酸(Acidum hydrochloricum dilutum)

二，阿西朵耳（鹽酸白他音）(Acidol)
(Betainum hydrochloricum)

三，卡斯德林(Gastelin)

(B) 鹼類一，重碳酸鈉(Natrium bicarbonicum)

- 二, 碳酸鈉 (Natrium carbonicum)
- 三, 碳酸鎂 (Magnesia Carbonica
oder Magnesia alba)
- 四, 煨製鎂 (Magnesia usta)
- C. 苦味劑 一, 龍膽末 (Pulvis gentianae scabrae)
- 二, 龍膽醇 (Tinctura Gentianae scabrae)
- 三, 龍膽膏 (Extractum Gentianae Scabrae)
- 四, 苦味醇 (Tinctura amara). 科倫波根. (Radix Colombo)
- 五, 空杜蘭戈流動膏 (Extractum Condurango fluidum).
- 六, 規那皮 (Cortex Chinae)
- 七, 規那醇 (Tinctura Chinae)
- 八, 蕃木髓醇 (極量一回一〇〇, 一日二〇〇) (Tinctura Strychni)
- 九, 蕃木髓膏 (極量一回〇〇五,

一日〇。一) (Extractum Stry-
chni)

苦味劑以外之食慾亢進劑:

- 一, 阿列克辛 (坦甯酸阿列克辛)
(Orexin) (Orexiunm tannicum)
- 二, 克遼瑣忒 (Kreosotum)
- 三, 酒精 (Alkohol)

芳香性苦味劑

- 一, 橙皮劑 (Aurantin-praeparate)
- 二, 桂皮劑 (Cinnamom-praeparate)
- 三, 茴香劑 (Fenchel-praeparate)

苛味性苦味劑

- 一, 芳香散 (Pulvis aromaticus)
- 二, 芳香醇 (Tinctura aromatica)

- D. 發酵素
- 一, 李替阿林 (Ptyatin)
 - 二, 陪潑辛 (Pepsin)
 - 三, 胰酵素 (Pankreatin)
 - 四, 盼克遼 (Pankreon)
 - 五, 怕怕沃汀 (Papayotin)

六, 怕怕晉 (Papain)

E. 與胃分泌有關係之藥物

○酸, 鹼, 酒精, 苦味劑, 阿列克辛等及下列藥品皆與胃分泌有關係。

一, 阿忒羅品 (Atropin)

二, 歐邁德林 (硝酸乙完基阿忒羅品)
(Eumydrin) (Atropinum
methylnitricum)

三, 派羅卡品 (Pilocarpin)

四, 嗎啡 (Morphin)

(A) 酸類

第一方

稀鹽酸	Acid. hydrochlorici diluti	0.8
純糖漿	Sirup. simplicis	10.0
溜水	Aquae destillatae	100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal z. n.

△稀鹽酸對於胃酸缺乏, 有助陪發辛消化之效。

△異常酸之醱酵時, 其原因多由於正規鹽酸

缺乏，故與以鹽酸，即能抑制其發酵。

△小兒之下痢用鹽酸或乳酸之所以奏效者，因其有消化催進及防腐之作用故也。

△應用 胃酸缺乏，小兒之下痢，熱性患者，磷酸鹽結石症，尿酸性分解等，均應用以內服。

應用配合藥品 (第一方)

- ① 苦味醇 Tinctura amara.
- ② 陪潑辛 Pepsinum.
- ③ 含糖陪潑辛 Pepsinum Saccharatum.
- ④ 規那醇 Tinctura Chinae.
- ⑤ 杏仁水 (極量一回二・〇，一日六・〇)
Aqua pruni armeniacae (Aqua Lauro-Cerasi)
- ⑥ 莨菪膏 (極量一回〇・〇五，一日〇・一五) Extractum Scopoliae.
- ⑦ 莨菪醇 (極量一回一・〇，一日三・〇)
Tinctura Scopoliae.
- ⑧ 硫酸鎂 (與規那劑互相禁忌) Magnesium

sulfuricum.

① 蕃木甃醇 (極量一回一。〇, 一日二。〇)

Tinctura Strychni.

② 橙皮醇 Tinctura Aurantii corticis.

③ 桂皮醇 Tinctura Cinnamomi.

④ 芳香醇 Tinctura aromatica,

⑤ 薄荷水 Aqua Menthae,

⑥ 利鎖耳金 Resorcium.

⑦ 卡斯卡拉薩格拉大流動膏 Extractum

Cascaræ sagradae fluidum.

⑧ 赤酒 Vinum rubrum.

⑨ 斯忒羅反忒醇 (極量一回〇。五, 一日一。

五) Tinctura Strophanthi.

⑩ 麥角膏 (極量一回〇。三, 一日一。〇)

Extractum Secalis Cornuti (極量一回

〇。三, 一日一。〇)

⑪ 阿片醇 (極量一回一。五, 一日五。〇)

Tinctura Opii

⑫ 空杜蘭戈流動膏 Extractum Condurango

fluidum.

- 覆盆子糖漿 *Sirupus Rubi*
- 安替正林 *Antipyrinum* (極量一回 -。
○,一日三。○)
- 正拉密洞 *Pyramidonum* (極量一回○。
三,一日一。○)
- 阿斯正林 *Aspirinum*.
- 鹽酸規甯 *Chininum hydrochloricum*.
- 安息香酸鈉咖啡蘇 (極量一回一。○,一
日三。○) *Caffeino-Natrium benzoicum*

備考 與酸性禁忌之重要藥物

- 一, 亨羅金 *Brocin*.
- 二, 醋酸鉀液 *Liquor Kalii acetici*
- 三, 溴化鉀 *Kalium bromatum*.
- 四, 碘化鉀 *Kalium jodatum*.
- 五, 午乏午耳西葉煎 *Decoctum
Foliorum Uvae Ursi*,
- 六, 大黃醇 *tinctura Rhei*,
- 七, 大黃根浸 *Infusum Rhizom*.

Rhei,

(B) 鹼劑

第二方

重碳酸鈉	Natrii bicarbonici	3.0
煨製鎊	Magnesiae ustae	1.5
莨菪膏	Extracti Scopoliae	0.06

右分三包，一日三回分服 M. F. pulv,
S. Täglich, 3 mal z. n.

△用小量之 (重碳酸鈉一。〇至二。〇)

鹼劑，起中和作用之後，則有亢進胃分泌之作用。使用大量，(重碳酸鈉五。〇以上) 尤以連用時，則能減弱胃液之酸度，又有制酸之作用。溶解於粘膜，能鎮靜刺戟狀態，輕減異常發酵。

應用配合藥品 (第二方)

- ⊙ 龍膽末 Pulvis Gentianae.
- ⊙ 大黃末 Pulvis. Rhei.
- ⊙ 次硝酸銻 Bismutum subnitricum.
- ⊙ 沈降碳酸 Calcium carbonicum præcipit-

atum.

- 薄荷油糖 *Elacosaccharum Menthae*.
- 坦那耳彬 *Tannalbinum*.
- 蕃木龍膏 (極量一回。○五, 一日○。一)
Extractum Strychni.
- 狄亞斯大斯 *Diastase*.
- 比阿肥耳民 *Biofermin*.
- 坦甯酸阿列克辛 *Orexinum tannicum*.
- 安替比林 (極量一回一。○, 一日三。○)
Antipyrinum.
- 薩羅耳 *Salolum*.
- 利鎖耳金 *Resorcinum*.
- 焦科耳 *Thiocolum*.
- 蓆酸鋇 (極量一回○。三一。一日一。○)
Cerium oxalicum.
- 乏戈耳 *Fagolum*.
- 阿片末 (極量一回○。一五, 一日○。五)
Pulvis Opii.
- 磷酸科亭 (極量一回○。一, 一日○。三)

Codeinum Phosphoricum.

●飛那西汀(極量一回一。〇, 一日三。〇)

Phenacetinum.

○陀勿耳氏散(極量一回一。〇, 一日三。

〇) Pulvis Doveri.

第三方

重碳酸鈉 Natrii bicarbonici 3.0

苦味醇 Tinctur. amaræ 1.5

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量三回分服 S. Täglich 3 mal
n.

應用配合藥品 (第三方)

●純糖漿 Sirupus simplex.

●溴化鉀 Kalium bromatum.

●薄荷水 Aqua Menthae.

●利鎖耳金 Resorcinnm.

●卡斯卡拉薩格拉大流動膏 Extractum

Cascaræ sagrade fluidum.

○硫酸鎂 Magnesium sulfurcum.

- 阿片醇 (極量一回一。五, 一日五。○)
Tinctura Opii.
- 大黃醇 Tinctura Rhei.
- ⊙莨菪醇 (極量一回一。○, 一日三。○)
Tinctura Scopoliae (Tr. Belladonnae)
- 蕃木籠醇 (極量一回一。○, 一日二。○)
Tinctura Strychni.
- 橙皮醇 Tincturae Aurantii corticis.
- 碘化鉀 Kalium jodatum,
- ⊙斯忒羅反忒醇 (極量一回○。五, 一日一。五)
(Tinctura Strophanthi,
- 狄吉他利斯劑 Digitalis-praeeparate.

第四方

煨製鎂 Magnesia ustae 0.6

狄亞斯大斯 Diastase, 0.5

右混合, 分三包, 一日三回分服 M. F.
pulv. No. III. S. 3 mal täglich z. n.

△煨製鎂一。五滴入苦味醇或蕃木籠醇一。

○, (一。五比一。○) 比與之混合, 可使

其容積減小。

第五方

煨製羨 *Magnesiae ustae* 0.6

乏戈耳 *Fagoli* 0.5

右混合,分三包,一日三回分服 M. F.

pulv. No. III. S. Täglich 3 mal 1 pulver.

煨製羨 *Magnesiae ustae* 0.6

薄荷油糖 *Elaeosacchari Menthae* 0.5

右混和,分三包,一日三回分服 M. F.

pulv. No. III. S. Täglich 3 mal 1 pulver.

(C) 苦味劑

△苦味劑爲健胃劑中最能亢進食慾,調節胃機能者。

第六方

規那醇 *Tinctur. Chinae* 2.0

苦味醇 *Tinctur. amarae* 1.0

溜水 *Aq. destillatae* 100.0

右一日量,三回分服

苦味醇 *Tinctura. amarae* 1.5

芳香醇 Tinctur. aromaticae 1.5

溜水 Aq. destillatae 100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

第七方

科倫波根煎 Deoct. radic. Colombo(1.5)

100.0

純糖漿 Sirup, simplicis 10.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

○科倫波根一回○。五至二。○，一日數回，
作浸劑，或煎劑，或散劑使用，作成粘滑性
苦味藥現嘔吐下痢者賞用之。

△與其配合禁忌主要者，爲碘化鉀及酸類，
(科倫波根煎劑。)

△用於慢性腸加答兒，赤痢之末期，及結核患
者之慢性下痢。

△急性下痢或急性腸加答兒時，初用蓖麻子
油或甘汞等下劑，一二回後，不繼續用次硝

· 酸鉍，阿片劑，而用科命波根煎之處方以代之亦可。

第八方

空杜蘭戈煎 (5.0) Decoct. Condurango

100.0

稀鹽酸 Acid. hydrochlor. diluti 1.0

純糖漿 Sirup. simplicis 10.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. D.

△有謂空杜蘭戈對於胃癌有效云者，實不過為苦味健胃劑而已。

應用配合藥品 (第八方)

○陪潑辛 (pepsinum)

○生薑糖漿 (Sirupus Zingiberis)

○蕃木髓膏 (極量一回 0.05, 一日 0.1)
一) (Extractum Strychni)

○利鎖耳金 (Resorcinum)

第九方

規那皮煎 (0.4) Decoct. cort. Chinæ

	100.0
稀鹽酸 Acid. hydrochlor, dilut,	1.0
純糖漿 Sirup. simplicis	10.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. B.

△苦味健胃劑稍有收斂性，故用治消化器之加答兒有效，同時又能節約蛋白質，故可作為健胃強壯劑，用於各種急性及慢性疾患之恢復期，貧血，食慾缺損等，但連用大量，則呈規甯之局所作用，却有害於胃，（伍用酸類，則可使其效力增加數倍。）

應用配合藥品（第九方）

- 陪潑辛 (Pepsinum.)
- 含糖陪潑辛 (Pepsinum Saccharatum)
- 苦味醇 (Tinctura amara)
- 杏仁水 (Aqua Pruni armeniacae)
- 礪砂(氯化銨) (Ammonium chloratum)
- 桂皮水 (Aqua Cinnamomi)

◎**配合禁忌**（規那劑）

- 一、醋酸鉀液 (Liquor Kalii acetici)
- 二、硫酸鎂 (Magnesium sulfuricum)
- 三、否雷耳水 (亞砒酸鉀液) (極量一回
〇・五, 一日一・五) (Liquor Fow-
eri) (Liquor kalii arsenicosi)
- 四、碘劑 (Jod-Praeparate)
- 五、鹼劑 (Alkalisches Mittel)
- 六、坦甯含有物 (Tannihaltiges Mittel)
- 七、赤葡萄酒 (但伍用酸劑, 則無差異)
(Vinum rubrum)
- 八、氯化鈣 (Calcium chloratum)
(chlorcalcium)
- 九、乳酸鈣 (Calcium lacticum)

第十方

規那醇 Tincturae Chinae	2.0
大黃醇 Tincturae Rhei	2.0
生薑醇 Tincturae Zingiberis	2.0
溜水 Aquae destillatae	100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

□ 規那醇 Tincturae Chinae 2.0

稀鹽酸 Acidi hydrochlorici diluti 1.0

溜水 Aque destillatae 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

□ 苦味醇 Tincturae amarae 2.0

稀鹽酸 Acidi hydrochlorici diluti 2.0

溜水 Aq. destillat. 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

第十一方

蕃木髓 Tincturae Strychni 1.0

龍膽醇 Tincturae Gentianae scabrae 1.0

桂皮水 Aque Cinnamomi 5.0

溜水 Aque destillatae 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. n.

△蕃木髓醇爲強苦味劑, 用治消化不良, 胃腸

弛緩，弱視，運動麻痺等均能奏效。

△注意 有蓄積作用，不可連用，即間歇使用，亦常發現中毒作用。

應用配合藥品 (第十方)

- 重碳酸鈉 (Natrium bicarbonicum)
- 溴化鈉 (Natrium bromatum)
- 利鎖耳金 (Resorcinum)
- 橙皮糖漿 (Sirupus Aurantii Corticis)
- 莨菪醇 (極量一回一。〇，一日三。〇)
(Tinctura Scopoliae)
- 大黃醇 (Tinctura Rhei)
- 硫酸鎂 (Magnesium sulfuricum)
- 水楊酸鈉 (Natrium Salicylicum)
- 否雷耳氏水 (極量一回〇。五，一日一。五。)
(Liquor Fowleri)

第十二方

重碳酸鈉 Natrii bicarbonici	3.0
大黃末 Pulveris Rhei	1.0
蕃木龍膏 Extracti Strychni	0.05

右分三包，一日三回分服 M. F. pu'v.
No. III. S. Täglich 3 mal z. n.

第十三方

坦甯酸阿列克辛 Orexini tannici 0.5
乳糖 Sacchari lactis 2.0

右分三包，一日三回各服一包。(食前一
至二小時內服) M. F. pulv. No. III. S.
Täglich 3 mal 1 Pulver (Vor der Mahlzeit)

◎鹽基性阿列克辛，鹽酸阿列克辛，坦寧酸阿列
克辛三種無大差異，殆其效力相等。

△坦甯酸阿列克辛之副作用少，故適於小兒
使用。

△作為健胃劑，用治貧血，神經衰弱，重病之
恢復期，結核，因胃無力而來之食慾不振
之際，日用一至二回，每回〇·五乃至一。

〇，與以散劑或丸劑，殆無味無臭，不溶於
水，但連用四，五日後，須一時中止

△胃潰瘍，胃酸過多症，須注意使用

◎拉克妥斯他斯一日數回，用〇·三乃至〇·

四。有制止腸內病原菌發育。及防蛋白醱酵之作用。故適用於醱酵下痢。腸加答兒。鼓腸。常習便秘。赤痢。腸扶質斯。巴拉質扶斯。虎列拉。黃疸等。其他因自家中毒而發之皮膚病。如濕疹。癩瘡等亦宜用之。

○拉克妥斯他斯 Lactostase	0.5—1.0
狄亞斯他斯 Diastase	0.3—0.5
乳糖 Sacchari lactis	2.0

右分三包，一日三回各服一包。 M. F.
pulv. No. III. S. Täglich 3 mal 1 pulver.

應用配合藥品 (拉克妥斯他斯)

- 含糖陪潑辛 (Pepsinum saccharatum)
 - 莨菪膏 (Extractum Scopoliae)
 - 煨製鎂 (Magnesia usta)
 - 小兒散 (Pulvis infantum)
 - 重碳酸鈉 (Natrium bicarbonicum)
 - 碳酸夸乍科耳 (Duotalum.)
 - 規那皮煎 (4.0) Decoct. Cort. Chinae
- 100.0

拉克麥斯他斯 Lactostase 1.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal
zu nehmer.

◎比那肥耳民 (Biofermin) (用量一日一。○
至三。○)

爲糖化菌含有乳酸菌之製劑，作腸制腐劑有效，又能促進澱粉消化。

適應症 一般腸疾患，小兒之腸疾患，青便，鼓腸，腎及肝之慢性疾患等。

最好與以單純之比阿肥耳民，(因與稀鹽酸，利鎖耳金，次硝酸鉍，乏戈耳，焦科耳等類配合，有效力減弱之弊。)

二六, 強壯劑

(Roborantia,)

強壯劑之種類

- 一, 苦味, 健胃, 消化, 滋養劑
- 二, 鐵劑
- 三, 規寧劑
- 四, 砒素劑

五、鐵劑

第一方

還元鐵(一回量) Ferri reducti 0.05—0.1

右一日服用數回,作成散劑,丸劑,或錠劑,食後內服 M. F. pulv. od. pilul. od. pastil
S. Täglich einige mal z. n.

□還元鐵 Ferri reducti	0.2
乳糖 Sacchari lactis	0.5

右分三包,一日三回,食後內服 M. F.
pulv. No. III. S. Täglich 3 mal der
mahlzeit.

□還元鐵 Ferri reducti	5.0
龍膽末 Pulv. Gentianae	1.0
龍膽膏 Extract. Gentianae	1.0

右爲50丸,一回1—2粒,食後分服 M.
F. pilul. No. L. S. Täglich 1—2 pillen nach
der Mahlzeit z. n.

鐵劑之種類:

一、鐵粉 Ferrum pulveratum (Fe).

- 二，還元鐵 Ferrum reductum. (用棧須密封蓋)
- 三，次碳酸鐵 Ferrum subcarbonicum.
- 四，溶性鐵糖 Ferrum oxydatum saccharatum solubum.
- 五，含糖碳酸鐵 Ferrum carbonicum saccharatum,
- 六，硫酸鐵 Ferrum sulfuricum.
- 七，乳酸鐵 Ferrum lacticum.
- 八，枸橼酸鐵 Ferrum citricum oxydatum.
- 九，錳化鐵陪潑通液 (李盧坦) Liquor Ferro-Mangani Peptonati (Blutan).
- 一〇，蛋白鐵液 Liquor Ferri albuminati.
- 一一，碘化鐵糖類 Sirupus Ferri jodati.
- 一二，林擒鉄醇 Tinctura Ferri pomati.
- 一三，碘化飛拉妥斯及砒素飛拉妥斯 Jod-Ferratose und Arsen-Ferratose.
- 一四，薩沃亭鉄 Essen-Sajodin.

一五，李盧安斯 Blutose。

注意（鐵劑）

△鐵劑無論其為有機化合物或無機化合物，皆由小腸吸收，與蛋白質結合，而成飛拉汀（Ferratine），失其毒性之依洪作用，乃貯蓄於肝臟內，漸次移行於血液中。

△鐵劑為血色素集成之一原素，又能刺戟血球新生機能，且可使代謝機能亢進。

△有收斂作用及局處的止血之效。

△內服適量，能制限腸之蠕動，微有止痢之效力。

▽對於萎黃病或十二指腸蟲病，貧血有特效，只須服用一二週間即能奏效。

△諸種之貧血，鐵劑與砒劑併用，均能奏效。

△使用鐵劑後，有損食慾而起消化不良者，此時伍用鹼劑，即可使之緩和，如再連用而來胃腸障礙（噯氣，惡心，嘔吐，胃痛，下痢等）者，則應中絕。

△鐵劑須於食後即服用，不可於空腹時內服。

△使用鐵劑時，禁用清涼水，果實，坦寧酸含有物，茶等爲佳。

○鐵劑禁忌症 熱性病者，血行器之器質的疾患，或有咯血之虞時均不可用。

□溶性鐵糖 Ferri oxydat. saccharat. solub. 6.0

右分三包，一日三回，每回一包， E. pulv. No. III. S. Täglich 3 mal 1 Pulv. z. n.

□含糖炭酸鐵 Ferri carbonici saccharati 6.0

右分三包，一日三回，每回一包， F. pulv. No. III. S. Täglich 3 mal 1 pulv. z. n.

第二方

碘化鐵糖漿 Sirupi Ferri jodati 5.0

純糖漿 Sirupi simplicis 10.0

溜水 Aquae destillatae 100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

○碘化鐵糖漿須漿貯於無色透明之罇內，而

置日光透射之所，其蒼黃色者，宜用日光晒之，欲防碘之遊離，可投鐵線於瓶內，但鐵線應沈沒於液中，不可與空氣接觸，（可與臭化鉀，氯化鈣，橙皮糖漿等配合）

○碘化鐵糖漿之小兒用量

	(一回量)	(一日量)
2 歲以下.....	1—2 滴	0.1—0.5
2 歲—5 歲以下.....	3—10 滴	0.5—1.0
5 歲—10 歲以下.....	10—15 滴	1.0—1.5
10 歲—15 歲以下.....	15—20 滴	1.5—2.0

第三方

碳酸石灰	<i>Calcariae carbonicae</i>	1.0
磷酸石灰	<i>Calcariae phosphoricae</i>	1.0
含糖碳酸鐵	<i>Ferri carbonici saccharati</i>	5.0

右爲一包，一日服用二回（骨軟化症）

M. F. pulv. No. I. S. Täglich 2 mal 1 pulv.

(*Osteomalacie*)

第四方

鹽酸規甯 Chinini muriatici 1.5

還元鐵 Ferri reducti 1.5

龍膽膏 Extracti Gentianae scabrae q.s.

右爲30丸，一日三回，每回一丸，M. F.
pilul. No. XXX. S. Täglich 3 mal 1 pille.

□克遠瑣忒 Creosoti 10.0

還元鐵 Ferri reducti 10.0

小麥粉 Weizenmehl 10.0

甘草末 Pulv. Liquirit. 23.0

純糖漿 Sirup. simplic. 15.0

右爲六百丸，六至十二丸，三回分服，M.
F. pilul. No. 600 S. Täglich 3 mal 6—12 pillen°

□硫酸規甯 Chinini sulfurici 1.5

還元鐵 Ferri reducti 5.0

龍膽末 pulv. Gentianae 0.5

龍膽膏 Extract. Gentianae 2.5

右爲50丸，一日四至六粒，每食後分服（
規鐵丸）M. F. pilul. No. L. S. Täglich 4—
6 pillen nach der Mahlzeit (Chinin-Eisenpille)

第五方

錳化鐵陪潑通液 Liquor. Ferro-Mangani

Peptonati (Blutan) 10.0

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

溜水 Aq. destillat. 100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. N.

△錳化鐵陪潑通液(李盧坦) (Blutan) 一日
用量10.0—15.0 (Liquor Ferro-Mangani
Peptonati)

△溴化李盧坦(Brom-Blutan)(含0.1%溴素)

△碘化李盧坦(Jod-Blutan) (含0.1%碘)

第六方

規那皮煎 (4.0) Decoct. Cort. Chinae
100.0

稀鹽酸 Acid. muriatici diluti 0.8

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. N.

應用上之注意 (第六方)

有苦味，健胃，又稍有收斂性，多應用於消化器之加答兒，同時又能節約蛋白質，故可作為健胃強壯劑，於諸種疾患恢復期之衰弱，貧血，食慾缺乏等，均宜用之，但連用大量，則現規寧之局所作用，却有害於胃，(佐用酸類，可使其效力增數倍)。

應用配合藥品 (第六方規那劑)

- 陪潑辛 (Pepsinum)
- 杏仁水 (極量一回二。〇，一日六。〇)
(Aqua Lauro-Cerasi)
- 礪砂 (氯化銻) (Ammonium chloratum)
- 桂皮水 (Aqua Cinnamomi)
- 苦味醇 (Tinctura amara)

配合禁忌 (第六方規那劑)

- 一，醋酸鉀液 (Liquor Kalii acetici)
- 二，硫酸鎂 (Magnesium sulfuricum)
- 三，亞砷酸鉀液 (否雷耳水) (Liquor kalli arsenicosi (Fowleri) (極量一回〇。〇)

五，一日一・五)

四，碘劑 (Jod-praeperate)

五，鹼劑 (Alkalische Mittel)

六，坦寧含有物 (Tanninhaltiges Mittel)

七，赤葡萄酒 (但伍以酸類則無差異)

(Vinum rubrum)

八，氯化鈣 (Chlocalcium)

九，乳酸鈣 (Calcium lactieum)

第七方 否雷耳氏水 (極量—0.5, 一日
1.5)

<u>否雷耳氏水</u> Liquor. Fowleri	1.0
苦味醇 Tincturae amarae	1.0
純糖漿 Sirup. Simplic.	10.0
溜水 Aquae destillatae	100.0

右一日量, 三回分服 S. Täglich 3 mal

Z. R.

應用上之注意 (第七方否雷耳氏水) (參看
三〇六頁)

一. 用爲補血藥對於萎黃病, 續發貧血, 伍以鐵

劑，能奏卓效。

□ <u>否雷耳水</u> Liquor. Fowleri	1.0
林擒鐵醇 Tinct. Ferri pomati	5.0
溜水 Aq. destillatae	100.0

右一日量，三回分服(每食後) S. Täglich 3 mal (nach der Mahlzeit)。

□ <u>還元鐵</u> Ferri reducti	5.0
亞砒酸 Acid. arsenicosi	0.2
龍膽末 Pulv. Gentianae	q. s

右爲百丸，一日二三回，每回一至二丸。
(食後) M. F. pilul. No C. S. Täglich einige mal 1-2 pillen. (n. der Mahlzeit)

二。用治結核，喘息，佝僂病，瘡疾，瘡疾怪患液質，皮膚病，神經病有效。

三。否雷耳氏水應於每食後內服，初宜用其少量，漸次增加，以後又漸次減少。

○否雷耳氏水小兒用量(一日量)(一。○等於一六滴，○。一等於二滴弱)

1 歲—— 2 歲………0.001——0.004

3 歲——4 歲……0.001——0.005

5 歲——10 歲……0.002——0.008

10 歲——15 歲……0.003——0.01

應用配合藥品 (第七方否雷耳水劑)

① 芳香醇 (Tinctura aromatica)

② 碘化鉀 (Kalium jodatum)

③ 溴化鉀 (Kalium bromatum)

④ 杏仁水 (Aqua Pruni armeniaca) (極量
一回二。〇,一日六。〇)

⑤ 桂皮水 (Aqua Cinnamomi)

⑥ 狄吉他利斯醇 (Tinctura Digitalis)

⑦ 橙皮水 (Aqua Corticis Aurantii)

⑧ 纈草醇 (Tinctura Valerianae)

⑨ 林檎鉄醇 (Tinctura Ferri Pomati)

⑩ 薄荷水 (Aqua Menthae)

⑪ 規那醇 (Tinctura Chinae)

○ **配合禁忌** (第七方否雷耳氏水劑)

一。煨製鎂 (Magnesia usta)

二。酸化鐵 (Ferrum oxydatum)

□否雷耳氏水丸

否雷耳水 Liquor. Fowleri 12.0

甘草末 Pulv. Liquirit. 7.0

甘草膏 Extract. Liquirit. 7.0

右爲百八十九，（一丸中含否雷耳氏水約一滴，即約〇・〇六） M. F. Pilul. No. Clxxx. (1 Pille=1 Gt v. Fowleri)

第方八

肝油 Lebertran 10.0—15.0

右一回量，一日服用二回 S. Auf einmal (Täglich 2 mal) z. n.

（可和於糖水，牛乳，茶，薄荷水，冷水，純糖漿，及曼那糖漿等內服用）

□肝油 Lebertran 10.0

樹膠末 Pulv. Gummi arab. 5.0

乳化水 Aqua. Emulsio. 7.5

純糖漿 Sirup. simpl. 10.0

溜水（全量） Aq. destillat. 100.0

右一日量，數回分服 S. Täglich mehrm-

als z. n.

- 乳劑之製法，亞拉伯樹膠末之用量等於油劑量之半，乳化水等於油劑量與樹膠末之和之半分量。
- 乳劑如加用卵黃，則油劑--○。○，應用卵黃一個。
- 如加用罐筒牛乳，則其用量為油劑量之倍量。

第九方

Malzextrakt (水胎)	50.0
肝油 Lebertran	30.0
橙皮糖漿 Sirup. Aurant. Corticis	20.0
亞拉伯樹膠漿 Mucilag. Gum. alab.	20.0
水 Aq.	20.0

右一日數回分服 S. Mehrmals täglich

z. n.

其他滋養製劑中之重要者列舉如左：

△鎖馬妥碎(可溶性蛋白製劑) (阿耳字摩碎
陪 激 通)

(Albumose)七八%) (Somatose)
(Pepton)三。四%

△勒斯忒萊小兒粉 (Nestlé Kindermehl)

△約估耳忒 (以約估耳忒釀母製成之酸乳)
(Yoghurt)

△忒羅烹 (含有動物性及植物性蛋白質)
(九〇%) (Tropon)

△努忒羅碎 (乾酪素鈉) (Nutrose)

△拉諾散乳 (含有蛋白質及石灰質) (Larosan-Milch)

△散拉安堇 (乾酪素及甘油磷酸鈉) (Sanatogen)

△阿羅伊羅那 (由小麥麩質製成) (Aleurc-nat)

△來規孟 (大豆中之蛋白質) (Legumon)

△阿法耳金 (Ovaltine)

△鎖克斯來忒氏滋養糖 (糊精 (Dextrin) 及
麥芽糖) (Soxhlets Nährzucker)

◎ Malzextrkt之主要成分為葡萄糖及糊精。

日本之水飴殆爲同一之物也。

應用 爲消化性滋養劑，適於恢復期患者，衰弱，小兒消化不良症等，或與以單純服用，或和溫湯，牛乳，俾酒，葡萄酒內服。

附 記

◎亞細亞丸 (Pilulae asiaticae)

亞砒酸	Acidi arsenicosi	0.06
黑胡椒末	Piperis nigri pulv.	1.5
甘草根末	Rad. Liquirit. pulv.	3.0
亞拉伯樹膠漿	Mucil. Gummi arab. q. s.	

石混合爲60丸一日2—3丸。(食後服)
漸次增量 M. F. pil. No. 60. S. 2—3 pillen
täglich allmählich ansteigend.

備考 施用鐵劑療法之時間，通常以六週爲一期，休養三至四週後，再行服用。

二七， 驅梅劑
(Antisymphilitica.)

驅梅劑之種類

- 一， 水銀劑（第二期最有效）
- 二， 砒素劑
- 三， 碘劑（第三期最有效）

◎第一水銀劑

應用 水銀劑作為驅梅毒藥對於第二期之效力，尤為顯著。其他亦可用為：

局所消毒藥（昇汞）

消炎劑（膏劑）

瀉下劑（甘汞）

利尿劑（甘汞）

水銀驅梅毒療法

○一。內服療法， 二。塗搽療法， 三。注射療法， 四。吸入療法。水銀劑之內服，主用其不溶解性之化合物，內服法雖較輕便，但其效力不及塗搽及注射療法，持續內服三週間，須休息三週，以後乃持續使用，如是反覆可也。

○使用水銀劑時，當注意口腔，直腸，腎臟之症狀，即尿中有蛋白之證明，或現下痢，血便，或發口腔炎時，則應中絕使用。

○乳兒先天性梅毒內服水銀劑中最少刺戟腸者，以黃色碘化汞為最佳，不致如甘汞之起下痢，（不可與磷化鉀同時服用）。

水銀中毒症狀（急性及慢性）

- 一，汞毒性口內炎
- 二，大腸炎
- 三，腎臟炎
- 四，皮膚發疹
- 五，發水銀性發揚及震顫等

禁忌症（水銀劑）

- 一，貧血患者
- 二，腎臟炎
- 三，非病毒性衰弱者
- 四，口內炎
- 五，腸加答兒

○常用之水銀劑，內服者為甘汞，黃色碘化汞，注射者為昇汞，塗搽者為灰白軟膏是也。

第一方 水楊酸汞（極量一回0.02，一日0.06）

水楊酸汞	Hydrargyri salicylici	0.2
甘草末	Pulv. Rad. Liquiritiae	2.0

甘草膏 *Extracti Rad. Liquiritiae* 1.8

右爲60丸(3丸中含0.01), 一日三回, 食後3丸(撒汞丸) *M. F. pil. No. LX.*
S. Nach den Mahlzeiten täglich 3 mal 3 pillen.

(製丸之成形材料有用水飴(飴糖)或麵粉餅者)

第二方 黃色碘化汞(極量一回0.03, 一日0.06)

黃色碘化汞(亞碘化汞)	<i>Hydrargyri jodati flavi</i>	0.03
乳糖	<i>Sacchar. lactis</i>	2.0

右分三包, 一日量, 每食後服用 *M. F. pulv Divide in dos. aeq. No. III. S. 3 pulver täglich nach der Mahlzeit.*

(因不刺戟腸, 故可用爲甘汞之代用品, 乳兒之先天梅毒費用之)。

第三方

甘汞	<i>Calomelanos</i>	0.01
----	--------------------	------

乳糖 Sacchari lactis 2.0

右一包量 M.F. pulv. 〇—

朝夕各服半包(1歲以下) S. Morgens und
abends $\frac{1}{2}$ pulver (unter 1. Lebensjahre)
朝夕各服一包(3歲以下) S. Morgens und
abends 1 pulver (unter 3. Lebensjahre)

○甘汞作為驅梅毒藥，不適於內用，通常用○。

〇—乃至〇。一，一日數回伍以坦拉耳彬
或阿片劑內服，又有為防止下痢而伍用乳
酸鐵者。

第四方

水銀灰白軟膏 Unguent. Hydrargyri
cinerei 3.0—5.0

右塗搽療法用，夜間就眼前使用(一回
量) S. Zur Schmierkur, nachts vor dem Schla-
fengehen.

○依一定之方式順序，每次應塗搽三〇分鐘
以上，持續二〇乃至四〇日間，於塗搽期
內，須常時檢尿，又應以消毒水瀕瀕含嗽。

○重症而有失明等之虞時。應一回用七。○
乃至一〇。〇。

○水銀之大部分由皮脂腺之開口部變成脂肪
酸水銀而被吸收，一部分變為蒸氣由肺吸
收，（塗搽療法）。

○乳兒塗搽之部位，不宜在大腿之內側。

○若皮膚健全而無糜爛，發疹等時，即可行灰
白軟膏之塗搽，然用下列軟膏，更為優良，
而無局部發生濕疹之慮。

◎希耳戈耳（可溶性水銀） Hyrgoli (Hyd-
rargyr. Colloid.) 1.0

羊毛脂 Lanolini 3.0

右為軟膏，分為十包，（用臘紙包）一日塗
搽一包 M. F. unguent. No. X. (mit paraffi-
npapier) S. Täglich, 1 pulver einzureiben.

第五方 德費氏昇汞水（1%） Sublim-
atlösung (Devy)

昇汞 Hydrargyri bichlorati (sublimat.)
0.3

食鹽 Natrii chlorati	1.0
蒸溜水 Aquae destillatae	30.0

右隔日注射一筒於臀筋內（持續20—40
 回）（其副作用即於注射部發劇痛及腫脹是也）
 S. Jeden 2 Tag 1 Pravazsche Spritze voll in
 Glutaealmuskeln zu injizieren.

□昇汞 Hydrargyri bichlorati	0.01
食鹽 Natrii chlorati	0.1
蒸溜水 Aq. dest.	10.0

右隔日或三日注射 $\frac{1}{2}$ — 1 筒於臀筋肉
 內，（小兒）S. Jeden zweiten od. dritten
 Tag $\frac{1}{2}$ — 1 Spritze zu injizieren（Glutaeal-
 muskel）（Für Kinder）

第六方 撒汞油（10%）

水楊酸汞 Hydrargyri salicylici	1.0
流動石臘（或橄欖油）Paraffini liquidi （od. Ol. Olivari）	10.0

S. Wöchentlich 2 mal eine $\frac{1}{2}$ Spritze
 zu injizieren.

○.1 右裝入廣口罇內，使用前須強振盪（用法，一週二回，每回用半筒注射臀筋內）

○對於注射療法之注意：各種注射療法，殆與塗搽法相等，亦有確效，但此等療法皆因其吸收不整，故往往有發現中毒之弊，然用不溶解性水銀筋肉內注射，實為簡便之法也。

第七方

昇汞浴 Sublimat-Bad.

溶解昇汞○。九至一。八於二斗五升乃至五斗之湯內，入浴八分至十分間，入浴時須注意浴水不可嚥下，（皮膚症狀顯著時，一日施用二萬倍昇汞浴二回，能奏顯著之效）。

其他之水銀注射劑：

- 一、盧愛斯汀 Luestin.
- 二、伊嗎米戈耳 Imamicol.
- 三、厄涅瑣耳 Enesol.
- 四、亞熱洛耳 Asurol.

五, 青酸酸化汞 Hydrargyrum oxycyan-
atum.

六, 諾乏熟洛耳 Novasurol, (利尿)

◎第二砒素劑

有機性砒素化合物對於皮膚病, 白血病, 佝
僂病, 貧血等均有效, 尤以對於 Trypanosoma
及螺旋菌病能奏特效。

○貧血併用砒素劑及鐵劑有效。

○驅梅療法行薩耳乏散療法與水銀劑之併用
有效。

○薩耳乏散主用於梅毒, 其他用治 Weillii 氏
病, 回歸熱, 瘧疾, 脾脫疽, 鼠咬症等亦可奏
效, (參看後頁備考)。

○當施薩耳乏散療法之際, 碘化鉀之內服, 須
一時中止。

第八方

靜脈內注入薩耳乏散劑 (Salvarsan)

○薩耳乏散 (六〇六號) (鹽酸二氫氧化二
磷基代砒輪質)

○新薩耳乏散 $[(C_6H_5AsOHNH_2)_2 \cdot 2HCl]$

○阿耳薩米羅耳 (Ar:aminol)

○新阿耳薩米羅耳

○愛拉米鎖耳 (Ehramisol)

○新愛拉米鎖耳

○坦凡耳散 (Tanvarsan)

○新坦凡耳散

○阿碎民 (Arsemin)

○新阿碎民

○新新阿碎民

以上各種薩耳乏散劑，其效力雖無大差異，但一般之效力強者，其副作用亦強，其他尚有種種之「新新——」等製劑，不克一一縷述。

◎薩耳乏散劑靜脈內注入關於技術上，應注意之事項，摘錄如左：（分濃厚液注射法。及稀薄液注射法兩種，須各依其所定之術式施行）。

△注入用具之消毒：於注入前數時間，將注入筒及注入用具浸於千倍之昇汞水中，（由

注入玻璃筒，樹膠管，及玻璃嘴管而成之連續裝置之內腔，充入昇汞水）然後再充入二十倍之石炭酸水消毒。

△注入前觀察注入玻璃筒，樹膠管，玻璃嘴管之連續裝置內之石炭酸水，使之由玻璃嘴管先端流出，再以注入用生理的食鹽水吸入注射筒內，丁寧反覆洗滌二三次。

△注射用之各種玻璃具，皆不宜塞用棉栓，容器可覆以玻璃蓋，於注射前用乾熱滅菌法消毒。（用具清洗後再用蒸氣消毒，極為安全）。

△使用之蒸溜水，必須新鮮而無菌者，（否則成愛爾里赫氏之所謂水禍，即於注射後發現惡寒戰慄，高熱，惡心，嘔吐等症狀）。

△稀釋及溶解所用之食鹽水，必須冷溫後使用，尤以夏季為然，至於注入新劑時，更須用其絕對冰冷者。注射後來不快之作用，不僅限於使用變質之藥品所致，或為使用溫度過高之食鹽水或蒸溜水，而使藥品起愈

速之變化，或因使用不新鮮之溶解水，所得之結果也。

△注射針用合金製者為宜，（鋼針易鏽，白金針價昂），其消毒法或於注射前煮沸，或於注入前數時間浸於二十倍之石炭酸水中，當使用時必須以導針通過內腔數回，使管腔內無有阻塞。

△開玻管之際，須先用酒精清拭之。

△將注入液濾過或加溫，不但無益，徒促其酸化，而增加毒力而已。故能發生危險。

△將溶解注入液吸入注射筒內，注入時須沿注射筒內壁徐徐使之流下。

△其他依一般法式施行

◎第三碘劑

第九方

碘化鉀	Kalii Jodati	0.5—1.0
苦味醇	Tinct. amaræ	2.0
溜水	Aq. dest.	100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

應用上之注意（碘劑）

碘化鉀之驅梅作用與水銀不同，對於病原無有影響，惟能使由梅毒性炎症發生之組織增殖，促其破壞吸收而已，故用治第一期症全然無效，而第二期之效力仍不及水銀劑，至第三期則其效力，遠駕乎水銀之上，而為不缺少之藥劑也。

應用 梅毒，甲狀腺肥大，腺病性諸症，慢性關節炎，漿液膜滲出，婦人之骨盤內滲出，肺氣管枝疾患，喘息，動脈硬化，動脈瘤，梅毒性及非梅毒性神經病，乾癬，放線狀菌病，水銀或鉛之慢性中毒等，均應用之。

○對於特異質之注意（碘劑）

○試用有機性碘劑，或持續與以少量之碘劑，並須加用重碳酸鈉，（發生碘水素酸）。

○一般梅毒患者多堪用大量之碘化鉀，故治療上亦可與以大量，且使用大量之碘化鉀，對於診斷上亦有價值焉。

- 醋酸鉀液 (Liquor Kalii acetici)
 - 溴化鉀 (Kalium bromatum)
 - 溴化鈉 (Natrium bromatum)
 - 杏仁水 (極量一回二。〇, 一日六。〇)
(Aqua Pruni armeniaca)
 - 斯忒羅反忒醇 (極量一回〇。五, 一日一。五) (Tinctura Strophanthi)
 - 蕃木鼈醇 (極量一回一。〇, 一日二。〇)
(Tinctura Strychni)
 - 錫耳德耳水 (Selterswasser)
 - 俄里撒林 (Oryzanin)
 - 空杜蘭戈流動膏 (Extractum Condurango fluidum)
 - 先那劑 (Senga-Praeparate)
 - 吐根劑 (Ipecacuanha-Praeparate)
 - 橙皮糖漿 (Sirupus Corticis Aurantii)
 - 比拉洞那膏 (莨菪) (Extractum Belladonnae) 極量一回〇。〇五, 一日〇。一五。
- 鹽化鉀丸

碘化鉀 Kalii Jodati	6.0
煨製鎂 Magnesiae ustae	15.0
樹膠末 Pulv. Gummi arab	2.0
溜水 Aq. destillatae	q. s.

右爲60丸，一日三回，服用三粒 M. F.
pilul. No. LX. S. Täglich 3 mal 3 pillen.

(有加用甘草末者)

□ 碘化鉀 Kalii jodati	0.5—1.0
碘化鈉 Natrii jodati	0.5—1.0
重碳酸鈉 Nat. bicarbon.	3.0
溜水 Aq. destillat.	100.0

右一日量，三回分服 S. Täglich 3 mal

z. n.

備考

○文生氏口峽炎及水瀉等用1%新薩耳乏散
甘油，或新薩耳乏散純糖漿浸於棉球，壓貼
於位局所，約十分間，處方如下：

△新薩耳乏散○。三溶於純糖漿三○。○

二八，驅蟲劑

(Anthelminthica,
Wurmabtreibendes Mittel.)

人腸主要寄生蟲類

一，條蟲類

- a. 有鈎條蟲——豚
- b. 無鈎條蟲——牛
- c. 裂頭條蟲——（日本最多）

d. nana 條蟲 e. Cucumerina 條蟲

二、圓蟲類

a. 蛔蟲

b. 十二指脂蟲

c. 蟯蟲

一般驅蟲療法

驅蟲劑之用法雖有種種，但通常所用者，多於前日服用下劑（大約用一五・〇乃至二〇・〇蓖麻油或硫酸鎂），翌晨空腹時或攝取少量之食物後，乃與以驅蟲劑，服藥後一至二小時，再與以下劑，但服用綿馬膏，石榴根皮之際，則禁忌使用蓖麻油以作下劑，其他用散妥紐時，亦可不用蓖麻油下劑。

要領 I 豫備療法，II 迷朦療法，III 排除療法，

驅蟲藥之種類

〔I〕驅除條蟲者（參看第一方以下）

一，卡馬拉末（Kamala）

二，石榴根皮（Cortex Radicis Gran-

ati)

三，坦寧酸陪來替厄林 (Pelletierinum
tannicum)

四，菲耳馬隆油 (Filmaronoel)

五，黑諾波第油 (Oleum Chenopodii)
(Nematol) (來馬以耳)

六，棉馬膏 (Extractum Filicis) (極
量一日一〇・〇)

○黑諾波第油及綿馬膏易起中毒小兒不
宜使用。

〔II〕驅除蛔蟲者 (參看第五方以下)

一，散妥紐 (極量一回〇・一，一日〇
・三) (Santoninum)

二，先那花 (Flores Cinae)

三，海仁草 (有狄格林 Digenin 之製劑)
(Digenia Simplex)

四，替摩耳 (Thymolum)

五，鎖肥蘭 (Sauveran)

○應用海仁草時，如同時併用散妥紐，則

可使其效果顯著。

〔Ⅲ〕驅除十二指腸蟲者（參看第七方以下）

- 一，替摩耳 (Tymolum)
 - 二，菲弗他林 (Naphthalinum)
 - 三，石榴根皮 (Cortex Radicis Granati)
 - 四，黑諾波第油 (Oleum Cheropodii)
- 黑諾波第油易於中毒，小兒不宜使用。

〔Ⅳ〕驅除蟻蟲者（參看第八方以下）

- 一，水銀軟膏(塗搽肛門) (Unguentum cinereum) (Anal-Einschmierung)
- 二，〇·五乃至一%鹽酸規寧水(注腸，)
(0.5—1% Chininum muriaticum)
(Klystier)
- 三，肝油(注腸) Lebertran(Klystier)
- 四，薄荷橄欖油 (〇·一比二〇·〇)
(注腸) Menthol-Olivenoel (0.1:
20.0) (Klystier)
- 五，食醋 (注腸) (一乃至二%)

(1—2% Essig) (Klystier)

六、蒜汁（注腸），Knoblauch-Decoct.
(Klystier)

○蒜汁用蒜二至五個剝去外包，而細剉之，加水一五〇〇・〇cc，用火煎煮，使其濃縮至一〇〇〇・〇；作為注腸料，使蒜汁約保留五分間於腸內，然後排出，再用一%食鹽水洗腸。

七、用純那弗他林內服，作為腸消毒藥，一日數回，每回與以〇・一乃至〇・五，作為驅蟲劑用〇・五乃至一・五，以治蕁蟲，蛔蟲，又可伍用替摩耳以治十二指腸蟲，與以散劑，容於膠囊內或藥包紙服用，（有時發現中毒作用，須注意使用）。

備考 一般驅蟲劑皆有不快之味，又於服用後發嘔氣嘔吐，因而不能達治療之目的者有之，此時宜用鹽酸科卡音塗布咽頭，或內服，有時服用驅蟲劑後，與以茶，咖啡等飲

料，則可使其嘔氣鎮靜。

〔1〕〔對於條蟲之處方〕

第一方 綿馬膏（極量一日10.0）

綿馬膏 Extract. Filicis 6.0—8.0—10.0

右容於8—10個膠囊內 F. No. VIII—X
ad. capsul. gelatinos. S. Innerhalb einer
Stunde in einige Mal, danach ein Abführm=
ittel.

（用法）應於一時間以內數回分服，全部
藥服完後約一時間即自然下痢，但通常多
與以下列下劑：

□先那葉煎 Infusi Fol. Sennae(4.0) 100.0
硫酸鎂 Magnes. Sulfur. 10.0
稀鹽酸 Acidi muriat. diluti 1.0

右三回分服（多於全部藥尚未服完時，
已達驅蟲之目的） S. Auf 3 mal z.n.

○綿馬膏之副作用

嘔氣，疝痛，下痢，蛋白尿，黃疸，眩暈，振
顫，弱視，黑內障等，甚而致於痙攣死者有

之。

- 中毒屢屢發於衰弱之患者，殊以失明多見於貧血者，故對於患者之體格，榮養，體質，肝臟心臟，等有無疾患，須先精密考查。
- 行豫備療法須於前日服用下劑，不必一定絕食，於服藥前攝取少量之食物亦可，（禁忌蓖麻油下劑）
- 用量不可過多（大人一〇。〇以下）
- 如用後不能達驅蟲之結果，不可繼續反復，應歇一二週，再行使用，乃為安全。
- 服用後發現嘔吐者，使病人平臥，與以咖啡，冰片，藥等，亦可用鹽酸科卡普使之內服。
- 禁忌（綿馬膏）
 - 一，胃腸有潰瘍者
 - 二，高齡者，衰弱，貧血者
 - 三，妊婦

第二方

綿馬膏 Extract. Filicis 6.0-8.0-10.0

甘草末 Pulv. Liquiritiae q.s.

右作丸6粒，三十分間以內，用溫湯（或茶，番茶，麥湯，咖啡等）內服（每五分鐘服一粒） M. F. pilul. No. VI. S. Innerhalb $\frac{1}{2}$ Stunde mit Warmen Wasser z. n. (danach ein Abführmittel)

（用藥後約一時間，即現自然下痢與驅蟲之效，但通常於一時間後再與以下列處方）

□先那葉浸 Infus. Fol. Sennae(4.0) 100.0

硫酸鎂 Magnes. sulfuric. 10.0

右三回分服 S. Auf 3 mal z. n.

第三方

綿馬根末 Pulv Rhizom Filicis

12.0—15.0

乳糖 Sacchar. lactis 5.0

右混合二回分服，一時間後應服用先那硫酸鎂之合劑 M. F. pulv No II. S. Auf 2 mal.

第四方

石榴根皮末 Pulv. Cort. Radicis Granati

40.0—50.0

右浸漬於四〇〇・〇CC 冷水內，經十二時間，再濃煎至二〇〇・〇CC，加入薄荷糖漿一〇・〇，於晨早分三至四次，一時間以內服用，一至一小時半之後，與以蓖麻子油或甘汞，（本劑之味不良，可用消息子導入飲用）。

其他之條蟲劑：

一。菲耳馬隆油 (Filmaronol)

即坊間販賣之 10 % 菲耳馬隆蓖麻子油，一回用一錢(10.0)。

先命病人前一二日祇攝取粥食，於早晨空腹時頓服用，服後一時間追服二〇・〇蓖麻油。

二。卡馬拉（赤色之粉末）五・〇(Kamala 5.0)

右爲一包量，與以二包 F. pulv. No. I. S. Morgens 2 pulver auf 2 mal z. n. 朝時三十分間分服二包，三十分後服用蓖麻子

油。

△卡馬拉同時有驅蟲，瀉下之作用，較其他條蟲藥緩和，故適於婦人小兒使用，坊間販賣者，往往為加有氧化鐵之贗品，購時務宜注意。

△用量，大人六。〇乃至一二。〇，小兒一。

〇乃至三。〇，與以散劑，或嚙劑。

〇卡馬拉 Kamala 10.0

他馬林妥果泥 pulp. Tamarind. q.s.

純糖漿 Sirup. simpl. q.s.

右作嚙劑，於30分至1時以內分二回服用。 M. F. electuarium No. II. S. Auf 2 mal innerhalb $\frac{1}{2}$ —1 Stunde z. n.

三。克羅羅封五滴至一〇滴 (Chloroformii Gtt V.—X)

右容於膠囊(空腹時頓服用) D. ad. capsul. gelatinos. S. Bei Hungerzeit auf eimml z. n.

〔2〕〔對於圓蟲類之處方〕

第五方 散安紐 (極量一回0.1,一日0.3)

散安紐 Santonin. 0.05-0.07--0.1

(甘汞) (Calomelanos) (0.3)—(0.5)

乳糖 Sacchar. lactis 0.5

右一包量,頓服用(蛔蟲) M. F.

pulv. No. I. S. Auf einmal z. n.

△散安紐使用以乳糖豫製為十倍用者較為便利, (須充分混合), 大人一日量, 用〇。二, 三回分服, 持續服用三, 四日。

△甘汞可以大黃, 雅拉怕未代用。

△散安紐為蛔蟲之特效藥, 應於食後內服, 空腹時易於中毒。

△中毒症狀——黃視症, 大量中毒則現吐瀉, 腹痛, 血尿, 失神, 震顫, 痙攣等。

△尿反應——內服散安紐後尿呈黃色, 如加以鹼質, 則變赤色。

○散安紐小兒用量 (一回極量)

一歲——二歲……………〇。〇〇四

三歲——四歲……………〇。〇一

以蓖麻子油) D. capsul. gelatinos. No. I.
S. Auf einmal (nace eirigen stunden Ol.
Ricini z. n.)

△黑諾波第油驅除蛔蟲，頗有卓效，但屢起中
毒，易浸及內耳，而來重聽，故使用之際務
須注意，用以驅除蛔蟲，及十二指腸蟲，但
幼兒不宜用之。

[3] 〔對於十二指腸蟲之處方〕

第七方

替摩耳 Thymoli 2.0—3.0

右容於膠囊或作藥包紙餅，頓服用，(或
隔一時間，二回分服) D. No. I.—II. ad.
capsul. gelatinos. s. oblat. S. Auf einmal,
oder zweimal z. n.

△空腹時服用，二三時間後，與以蓖麻子油，
以作下劑。

△替摩耳加入少量之乳糖，置乳鉢內粉碎後，
則不飛散，且易於包入藥包紙內。

△副作用一口腔，胃，腸之灼熱感，噁氣，惡心，

嘔吐，胃部膨滿，吞酸嘈噯，食慾不振，眩暈，步行蹣跚，神經昏聩，昏睡，或精神興奮，饒舌，呼吸體溫減少，替摩耳尿（呈暗綠色），或現虛脫，（替摩耳中毒時，不可用赤酒或酒精含有物）。

□替摩耳 Thymoli 2.0—3.0
那弗他林 Napnthalini 0.5

右容於六個膠囊內，用法，須於一二時間內分服 D. tal. dos. No. VI. ad. capsul. gelatinos. S. Innerhalb einigen Stunden auf 2-3 mal z. n

△那弗他林亦有起中毒者，用時宜注意。

[IV][對於蟯蟲之處方]

第八方

常醋（食醋） Essig 25.0
溜水 Aq. destillat. 25.0

右灌腸料 S. Zum Klystier.

第九方

1—3% 鹽酸規寧水適宜 1—3% Chininum

muriaticum

右灌腸料 S. Zum Klystier.

第十方

肝油 Lebertran 50.0

溜水 Aq. destillat. 120.0

右爲乳劑，作爲二回灌腸料，M.F. emulsio. No. II. S. Auf mal zum Klystier.

其他之蟻蟲驅除劑

一，大蒜煎汁灌腸 Knoblauch-Decoctum
-Klystier.

二，烟草煎灌腸 Tobacco-Decoctum-Klystier.

三，那弗他林 Naphthalini 0.1—0.4
乳糖 Sacchar. lactis 0.3

右爲一回量，一日內服二三回，（有起中毒者）M. F. pulv. No. I. S. Täglich einige Mal 1 pulver.

四，坦寧酸水（灌腸） Tanninlösung—Klystier.

五、醋酸鑾土水（灌腸） Essigsäures
Thonerde。

備考

- 幼兒施用蟻蟲療法不可用下列藥劑（一）昇汞水（二）石炭酸水
- 肛門搔痒用灰白軟膏塗搽於肛門之周圍，或肛門內插入灰白軟膏可可脂之坐藥（夜間一個）。

◎頭蟲藥

- △等分之石油及橄欖油，或水銀（灰白）軟膏。右就褥前處置，用繃帶包裹，翌日以石鹼清洗，反覆持續數日。
- △蟲卵用食醋或一%醋酸液梳於毛髮。

二九， 通利灌腸劑

(Eröffnende oder Entleerende
klystiere, Clysmata evacuantia.)

第一方

- 甘油 Glycerin. 10.0—20.0
右灌腸料一回用 S. Zum Klystier, auf
ainmal.
○甘油 Glycerin 10.0

水 Aq. 10.0

右灌腸料，一回用 S. Zum Klystier, auf einmal.

○橄欖油 Ol. Olivari 10.0—30.0

右灌腸料一回用 S. Zum Klystier, auf einmal.

第二方

1—2%藥用石鹼液 1—2% Sapo. Medicat.
300.0

右爲灌腸料（用溫湯製成） S. Zum Klystier (mit warmem Wasser)

△溶解藥用石鹼時，先加少量之甘油，而煮練之，然後加入溫湯，則可平均溶解。

第三方

0.5—1% 鉀石鹼液 0.5—1% Saponis Kalini 300.0

右灌腸料（用溫湯製成） S. Zum Klystier (in warmem Wasser gelöst)

○普通石鹼溶液 Seifenlösung 300.0

右灌腸料 S. Zum Klystier.

第四方

甘油坐藥 1 個 Supposit. Glycerin. No. I

右插入肛門 S. In Anus einzuführen.

(有大人用及小兒用二種)

第五方

1%食鹽水 1% Kochsalzlösung 300.0

右灌腸料 S. Zum Klystier.

三〇 腸洗劑

(Enteroklyse, Mittel zur
Darmspülung.)

- 一。溫水 (五〇〇・〇) 加入甘油 (二〇
・〇乃至三〇・〇〇)、用以灌腸、洗
腸 (手術前日) (Glycerinlösung)
- 二。微溫湯 三〇〇・〇 (Lauwarmes
Wasser)

- 三。食鹽水 (〇・五至一%) 三〇〇・〇
 (0.5—1% Kochsalzlösung)
- 四。明礬水 (〇・二%) 三〇〇・〇 (0.2%
 Alaunlösung)
- 五。坦寧酸水 (〇・二乃至〇・五%) 三
 〇〇・〇 (0.2—0.5% Tanninsäure-
 lösung)
- 六。坦那耳彬水 (〇・五%) 三〇〇・〇
 (0.5% Tannalbinlösung) (用時振盪)
- 七。坦甯酸食鹽水 (各〇・三乃至〇・五
 %) 三〇〇・〇 (Tanninsäure-Koch-
 salzlösung) (aa 0.3—0.5%)
- 八。重碳酸鈉水 (1%) 三〇〇・〇 (1%
 Nat. bicarb.-lösung)
- 九。硼酸水 (二%) 三〇〇・〇 (2%
 Borsäure-lösung)
- 一〇。攝耳德耳水 三〇〇・〇 (Selters-
 wasser)
- 一一。硝酸銀水 (〇・一乃至〇・二%)

三〇〇・〇 (0.1—0.2% Argent.
nitric.lösung)

一二。薩利潑粘漿 (1%) 三〇〇・〇
(1 % Mucilago Salep-lösung)

一三。亞拉伯樹膠漿三〇〇・〇 (Mucil-
ago Gummi Arabici-lösung)(5%)

備考

腸洗劑隨其應用之目的，臨機可用大量。有用
一〇〇〇・〇以上之大量，而反覆數回者，一
般注腸之際，不可使用暴力，須徐徐注入。

三一， 滋養灌腸劑

(Clysmata nutrientia, Nährklystiere.)

凡施滋養灌腸之先，須豫行腸洗滌（清水灌腸），清水灌腸用微溫湯或加入少許之石鹼，食鹽，甘油，蓖麻子油等，既用清水灌腸後約經一時間，用大內拉通氏導管塗以橄欖油，而深插入直腸內，然後注入滋養灌腸劑，一劑用量約

二五〇。〇，注入時宜用微溫者，腸蠕動亢進者應加以少量之阿片醇（七乃至八滴），加用阿片醇不僅能靜止腸蠕動，且有關於吸收之意義，稍有促進腸管吸收水分之作用，故行滋養灌腸時，往往加用阿片醇。

第一方

{	牛乳 Kuhmilch	200.0
	卵黃二個 2 Eigelb	
	食鹽 Kochsalz	3.0

右充分攪拌而混和之，加微溫後灌腸（先用清水灌腸）（合計 230 加路里）（亦可加用葡萄糖 15.0—20.0，阿片醇 7—8 滴，赤酒等）S.

Gut. gequirlt, gewärmt und gemischt, dann in Darm einzugiessen. (nach Reinigungsksma)

{	重湯或葛湯 Reiskrei od. Stärkebrei	200.0
	牛乳 Kuhmilch	100.0
	卵黃 1-2個 1-2 Eigelb	

(食鹽)(1茶匙)(Kochsalz)(1 Teelöffel)
 (赤酒)(1食匙)(Rotwein)(1 Esslöffel)

用法，同上 S. Wie oben.

○用單純牛乳，或牛乳內加用七至八滴阿片醇，亦可作滋養灌腸劑。

○乳兒只可用單純牛乳（禁忌阿片）

第二方

(波阿斯氏滋養灌腸液) (nach Boas)

牛乳 Kuhmilch	250.0
卵黃二個 2 Eigelb	
食鹽 Kochsalz	2.0—3.0
赤酒一食匙 Rotwein	1 Esslöffel
澱粉一食匙 Stärkemehl	1 Esslöffel

右充分攪拌而混合之，加微溫後灌腸（先行清洗灌腸）（合計300加路里） S. Wie oben.

○牛乳可用肉羔汁（Bouillon）作其代用品

○李蘭地（Branntwein）可作赤酒之代用品

○澱粉可作成澱粉漿使用。

第三方

(諾伯氏滋養灌腸液) (nach Leube)

(A) {	陪潑通 (A) Pepton	60.0
	牛乳 Kubmilch	300.0

(合計300—450加路里) (Im ganzen 300—450 Kalorie)

(B) {	牛乳 (B) Kuhmilch	300.0
	雞卵三個 3 Eier (Hühner)	
	食鹽 Kochsalz	3.0
	澱粉 Stärkemehl	40.0

(合計550加路里) (Im ganzen 550 Kalorie) S. Wie oben.

第四方

(愛瓦爾德氏滋養灌腸液) (nach Ewald)

甲 {	雞卵 2 個	攪拌 A {	2 Hühnereier
	冷水 1 食匙		Kaltes Wasser 1 Esslöffel
乙 {	20% 葡萄糖液 100.0	煮沸作	
	澱粉 一刀尖		成澱粉漿
B {	20% Traubenzuckerlösung	100.0	
	Stärkemehl	1 Messerspitze	

gekecht dann Rotwein zugesetzt, nach Abkühlen und nach Vereinigung von A und B. (A und B dann) dann pepton 1 Teelöffel. S. Wie oben (ca. 300 Kalorie)

加赤酒於乙液內，待其冷却未達蛋白凝固之程度時，而徐徐注入甲液（雞卵液）內而混合之，後再加入陪潑通一茶匙，但其全量不可超二五〇・〇，（約三〇〇加路里）

備考

△用雞卵時，須注意不可使蛋白凝固。

△用澱粉時，作成澱粉漿使用。

△赤酒可用李蘭地作其代用品。

△滋養灌腸通常須豫先施行腸洗滌（清水灌腸），灌注時須可能的徐徐注入。

△滋養灌腸料常加用阿片醇七至八滴，（小兒則不可用）

△滋養灌腸料應常為微溫（人體常溫）

△滋養灌腸液（例如牛乳）有混入荷弗曼

氏液五至一〇滴而行灌腸者，（腦膜炎等之末期）。

第五方

牛乳 Kuhmilch 200.0

滋養糖 Nährzucker 2.0

右滋養灌腸料 S. Zum Nährklystier.

三二， 膀胱洗滌劑

(Lotiones vesic: urin., Mittel
zur Blasenspülung)

○膀胱洗滌劑隨其病症強弱之程度，適用下列藥劑，（最初宜用最稀薄之溶液）。

一，二乃至四%硼酸水（2—4% Acidum boricum）

二，〇・一%石炭酸水（千倍液）（0.1%

Acidum carbolicum)

- 三, 一乃至二%水楊酸鈉水(1—2% Natrium salicylicum)
- 四, 〇·一乃至〇·三利鎖耳金水 (0.1—0.3% Resorcinum)
- 五, 〇·一乃至〇·三% 水楊酸水 (0.1—0.3% Acidum salicylicum)
- 六, 〇·〇一乃至〇·〇五%過錳酸鉀液 (0.01—0.05% Kalium permanganicum)
- 七, 〇·二乃至〇·五%坦甯酸水 (0.2—0.5% Acidum tannicum)
- 八, 〇·二乃至〇·五%明礬水 (0.2—0.5% Alumen)
- 九, 〇·一乃至〇·三%硫酸鋅水(0.1—0.3% Zincum sulfuricum)
- 一〇, 〇·〇三乃至〇·一%硝酸銀水 (0.03—0.1% Argentum nitrii)
- 一一, 〇·二乃至〇·五%蛋白銀水(0.2

—0.5% Protargolum)

二、〇。一乃至〇。三% 硫基石炭酸鋅
水(0.1—0.3% Zinum sulfophen-
ylicum)

○膀胱潰瘍或膀胱結核時可用下列油劑：

1. 夸乍科耳 Guajacol.	5.0
沃度封 Jodoform.	2.0
橄欖油 Ol. Olivar.	100.0

右混合，每日一回注入1.0—2.0於膀胱
內 M. S. Täglich einmal 1.0—2.0 in die
Blase einzuspritzen.

2. 殺菌橄欖油 Ol. Olivar.(desinfiziert)	5.0—10.0
------------------------------------	----------

右注入膀胱內(插入內拉通導管排尿，
用硼酸水洗滌後注入)(對於疼痛有著效)S。
In die Blase einzuspritzen.

三三, 眼科用藥

(Ophthalmica, Augenmittel.)

- (一) 硫酸鋅(〇。二五乃至〇。五%) *Zincum sulfuricum*. (0.25—0.5%)
右點眼用(結膜炎) S. Augentropfen
(*Gutta ophthalmica*) (用蒸溜水或1%
食鹽水溶解製成)

應用配合藥品 (硫酸鋅極量一回一。〇)

- ① 茴香水 (一〇乃至二〇%) (Aqua foeniculi)
 - ② 杏仁水 (一〇乃至二〇%) (Aqua prnui armeniaca)
 - ③ 鹽化腎上腺素 (五—10%) (Adrenalinum hydrochloricum)
 - ④ 鹽酸科卡音 (〇。三%) (Cocainum hydrochloricum)
 - ⑤ 阿片醇 (〇。五%) (Tinctura Opii)
 - ⑥ 食鹽 (一%) (1% Kochsalzlösung)
- (二) 硝酸銀液 (〇。三乃至〇。五乃至一% 乃至二%) (Argent. nitric.) (0.3—2%)
- 右點眼用 (急性結膜炎, 膿漏眼, 急性沙眼等)
- 用硝酸銀液滴眼後, 須即用一% 食鹽水洗滌。
 - 硝酸銀之稀釋液, 對於結膜有收斂性, 濃

厚液則有腐蝕性，但其腐蝕作用僅為表在的，點於結膜則與表層之蛋白結合，而生白色之薄膜，經一定時間後，則自脫落，此時表層之細菌及滲出物等均被除去，因而患者自覺輕快也。

- 因硝酸銀液之刺激性強，用以滴眼後，施行冷罨法為良。
- 因硝酸銀之刺激性強，故先用鹽酸科卡音水點眼者有之。
- 如用硝酸銀長時日點一眼，則沈著於結膜，而有起銀病之虞，故不宜長久使用。
- 硝酸銀滴眼通例一日一回，應於午前滴用，夜間殊以就眼前不宜應用，蓋滴眼後，其充血腫脹一時增加，自起分泌之亢進，因睡眠中瞼裂閉鎖，而使分泌物儘量停滯於結膜囊內，却有使症狀增惡之患故也。
- 硝酸銀液接觸日光易起化學的變化，而生溷濁沈澱等，且其濃度亦起變化，故必

須容於著色瓶內，以遮光線，又宜時時更換新鮮者。

○除去附着於皮膚或被服等之硝酸銀黑斑，其方法雖有種種，但以日本藥局方為簡便，即以酒精加於碘醇內稀釋二倍，滴於黑斑則變為褐色，放置約五分鐘後，用一〇%次亞硫酸鈉之溫液洗滌，再用水清洗。

□二%硝酸銀 (2% Argentum nitricum)
右以玻棒點滴於初生兒眼內，(初生兒膿漏眼之豫防) (Credé氏法)

□一乃至二%硝酸銀液用於急性結膜炎，膿漏眼，急性沙眼等，〇·三乃至〇·五%硝酸銀液用於炎症較輕之疾患。

(三) 蛋白銀 (Protargol) (二乃至三乃至五%)

(五%蛋白銀溶液略與一%硝酸銀溶液相當)

(四) 硫酸阿忒羅品液 (〇·五乃至一%)

- (Atropin. sulfurici,)(散瞳,昂進內壓)
- 散瞳之藥效,起於點眼後約十至十五分,約經一時間始達於極度,約持續三日間,乃漸次減退,經一週間始能恢復舊態。
 - 用治虹彩炎或虹彩毛樣體炎。能去虹彩之充血,豫防虹彩癒着。
 - 副作用 因能昂進內壓,故綠內障之患者,禁忌使用。
 - 硫酸阿忒羅品之內服極量一回○。○○一,一日○。○○三,一%硫酸阿忒羅品液一滴半約等○。○○一。點眼之際,須壓迫淚囊部,以防藥液流入鼻腔內,點眼後更施以溫罨法,則能助長散瞳之效。(用一%萇蓉膏液溫罨法更佳)。
 - 中毒症狀——咽喉部之乾燥感,顏面潮紅,脈搏頻數,惡心,嘔吐等是,其解毒法即行鹽酸嗎啡之皮下注射。
 - △使用硫酸阿忒羅品須製為○。五乃至一%液,昇汞水須製成一萬倍(○。○一

%)，硼酸水製成3%溶液；否則有起結膜紅斑及滲胞性結膜炎之虞。

(五) 水楊酸伊碎林液(1%) (Eserinum salicylicum)(縮瞳, 低下內壓)

○用伊碎林持續點眼, 則起所謂伊碎林加答兒, 其豫防法, 即用1%派羅品點眼。

(六) 鹽酸派羅卡品液(一至2%) (Pilocarpinum muriat.) 比伊碎林之效力為弱, 適於患者自用之點眼水。

(七) 弗耳俄來斯金(Fluorescin) (○·4%) 係鹼性水溶液(用2%重碳酸鈉水), 為角膜潰瘍之診斷液(綠色), 或用以檢查淚液排泄障礙之有無,(本品溶解於碳酸鈉水。)

(八) 狄俄甯液(5%) (Dionin)

(九) 鹽酸科卡音液(○·五至一至二至3% (Cocainum hydrochloricum) (角膜潰瘍禁忌) (可加用鹽化腎上腺癩或食鹽水。)

□手術用二乃至三%溶液，行普通手術時用三%液三至四回點眼，洗滌後再用一%阿來品(Alypinum)數回點眼，(沙眼搔爬等。)

□一%盼卡音液(Bancaïn)(行淚囊摘出，麥粒腫，霰粒腫等手術時注射用。)

□二%盼卡音液(眼球摘出之際，注射用。)

(十) 硫酸銅桿(Cuprum sulfuricum crystall. in bacil.)

(十一) 明礬桿(Alumen)

(十二) 硼酸水(一至二%)(Acidum boricum)
可加用一〇%茴香水(無刺激性點眼藥，點眼用。)

◎軟膏之部(眼用點)

A 黃降汞凡士林(一至二至三%)(Merc. oxydat. flav. et. Vaseline.)

爲治療外眼病不可一日缺少之藥劑也，用治各種角膜炎、眼瞼緣炎、水疱性結膜炎，亦能奏效，但以本劑外用治療眼病時，須禁

忌碘劑之內服；然用含量僅少之黃降汞凡士林及碘劑之際，有時不僅無害，却得良好之結果者有之，

本劑應常容於著色膏軟壺內，（黃降汞磨成粉末，須充分研和。）

B 狄俄寧，凡士林（二至五至一〇%）（Dionin et Vaseline）

為黃降汞凡士林之代用品（內服碘化鉀時）

C 伊希焦耳，凡士林一至二至三至五%（Ichthyol et Vaseline）

用以緩解沙眼盤奴斯（Pannus）及其他刺激症狀。

D 俄耳妥封，凡士林（二至五%至一〇%）（Orthorform et Vaseline）

與狄俄寧凡士林之使用相同

E 灰白軟膏凡士林（一〇%）（Unguentum Hydrargyri cinereum et Vaseline）

用於角膜溷濁，麥粒腫，霰粒腫等，其使用與二%黃降汞凡士林相同，又與狄俄寧凡

士林同樣使用。

F 硼眼凡士林(二至五至一〇%) (Acidum boricum et Vaselin)

◎洗眼器法劑 (Lotiones ophthalmicus)

(一)硼酸水(二至三%) (Acidum boricum)
可加用茴香水或杏仁水

(二)食鹽水(〇・八至〇・九%)(Kochsalzlösung)

(三)一萬倍昇汞水(〇・〇一%) (Sublimatlösung)

用馬尾燥紅著色

(四)硼砂水(一%) (Borax)
可加入重碳酸鈉及食鹽

(五)醋酸鉛水(〇・二乃至〇・五%)(Plumbum aceticum)

角膜有損傷時忌用

三四。 婦人科用藥

(Gynaekologisches Mittel.)

◎外陰部附近之消毒

先以石鹼及溫湯清拭後，乃用二乃至三%石炭酸水，或一%利鎖耳或利鎖封 (Lysoform) 消毒。

◎腔先滌液(灌洗具置三至四尺高)

- (一) 溫湯 (Lauwarmes Wasser)
- (二) 食鹽水(一至二%) (1—2% Kochsalz-lösung)
- (三) 重碳酸鈉水 (一至二%) (1—2% Natrium bicarbonicum)
- (四) 利鎖耳水 (〇·五至一%) ($1/2$ —1% Lysolum)
- (五) 利鎖封(〇·五至一%) (1% 1% Lysoform)
- (六) 硼酸水 (二至三%) (2—3% Acidum boricum)
- (七) 石炭酸水(一至二%) (1—2% Acidum carbolicum)
- (八) 過錳酸鉀液(〇·〇—%) (一萬倍)(0.01% Kalium Permanganicum)
- (九) 昇汞水(〇·一%) (千倍)(0.1% Sublimatlösung)
- (十) 醋酸鉛水 (〇·五至一%) (0.5—1% Plumbum aceticum)

(十一)醋酸礬土水(〇・一至五—%) (0.5—
1% Essigsaures—Thonerde)

(十二)坦寧酸水(〇・三至〇・五) (0.3—
0.5 Acidum tannicum)

(十三)明礬水(〇・二至〇・五%) (0.2—
0.5% Alumen)

(十四)硫酸鋅水(〇・二至〇・五%) (0.2
—0.5% Zincum sulfuricum)

(十五)碘醇水(〇・三至〇・五%) (0.3—
0.5% Tinctura jodi)

◎子宮洗滌液(灌洗具置一至二尺高,不可加用
高壓)

(一)食鹽水(--%) (1% Kochsalzlösung)

(二)重碳酸鈉水(一%) (1% Natrium bicar-
bonicum)

(三)醋酸礬土水(一%) (1% Essigsaures-Th-
onerde)

(四)硼酸水(三%) (3% Acidum boricum)

(五)利鎖耳水(一%) (1% Lysollösung)

- (六) 利鎖封水(一%) (1% Lysoformlösung)
- (七) 石炭酸水(二%) (2% Acidum carbolicum)
- (八) 五〇至七五 % 酒精加等分之三 % 石炭酸水 (50-75% Spiritus et 3% Acidum carbolicum aa)
- (九) 酒精 (五〇至七〇 %) (50-70% Spiritus)
- (十) 碘醇酒精 (酒精內加〇·五至一% 之碘醇) (Tinctura jodi et spiritus)
- (十一) 過錳酸鉀液 (〇·〇〇五—〇·〇一%) (二萬倍至一萬倍) (0.005—0.01% kalium permanganicum)

注意 子宮腔內洗滌, 絕對禁忌使用昇汞水

◎子宮腔部之塗布藥(緩和腐蝕藥) (用於有炎症糜爛出血等時)

(一) 碘醇 (Tinctura jodi)

(二) 過氯化鐵液 (純碎或少稀釋) (Liquor Ferri sepsuichlorati)

(三)酒精(純碎或五〇至七〇%) (Spiritus)

(四)硝酸銀水 (一至二至三至五至一〇%
至二〇%) (Argentum nitricum)

(五)蛋白銀液 (一至二至三至五%至一〇%
) (Protargolum)

◎子宮粘膜炎之塗布藥(緩和腐蝕藥)(用卷棉子
宮消息子塗布)

(一)碘醇(Tinctura jodi)

(二)過氧化鐵液(純碎或少稀釋 (Liquor Fe-
rri sesquichlorati)

(三)福爾買林水溶液或酒精溶液 (三〇至五
〇%) (Formalinlösung)

(四)硝酸銀水 (一至二至三至五%) (1—5
% Argentum nitricum)

(五)蛋白銀液 (一至二至三至五%) (1—5
% Protargolum)

(六)石炭酸酒精(3% Acidum carbolicum et
spiritus)

注意 子宮頸管內及子宮體腔內之洗滌及塗布

須注意行之。

◎臍棉球用藥〔棉球於特別情形之外，應於十二時間以內除去或交換之〕。

(一)伊希焦耳甘油液〔五至一〇%〕(5—10 % Ichthyo!-glycerin)

(二)焦羅耳水溶液或甘油液(五至一〇%)
(5—10% Thionol)

(三)碘化鉀水溶液或甘油液(五至一〇%)
(5-10% Kalium jodatam)

(四)明礬水溶液或甘油液(五至一〇%) (5-10% Alumen)

(五)坦寧酸水溶液或甘油液(五至一〇%)
(5-10% Acidum tannicum)

(六)甘油 (Glycerinum)

(七)蛋白銀液(一至二至三至五%) (1-5% Protargolum)

(八)盧果耳氏液 (Lugol'sche Lösung)

(九)可溶性銀液(五%)

△關於水溶液與甘油液之適應及優劣，有述叙

之必要，甘油爲脫水的，因能使粘膜之分泌充進，而妨混溶藥劑之吸收，故欲促其吸收時，則應混溶於水溶液內而不可混溶於甘油內。

◎粉末藥(棉球用)

- (一) 迨馬妥耳 (Dermatolum)
- (二) 阿伊羅耳 (Aiolum)
- (三) 社羅封 (Xeroform)
- (四) 坦寧酸迨馬妥耳等分 (Acidi tannicum et Dermatolum aa)
- (五) 硼酸末迨馬妥耳等分 (Acid. boricum et Dermatolum aa)
- (六) 沃度封 (Jodoformium)
- (七) 沃度封硼酸末等分 (Jodoform et acidi boricum aa)
- (八) 沃度封坦寧酸等分 (Jodoform et acid. tannicum aa)

◎臙球(臙坐藥)(參照坐藥部)(Vaginalkugeln)(Vaginalsuppositoria)

△一個臙球之可可脂量，普通爲三。〇

- (一)伊希焦耳球(含量〇。一五) (Ichthyolum)
- (二)焦羅耳球(含量〇。一五) (Thionolum)
- (三)莨菪膏伊希焦耳球(含量伊希焦耳〇。二——莨菪膏〇。〇三) (Extract. scopol. et Ichthyolum)
- (四)碘化鉀球(含量〇。二) (Kalium jodat-um)

三五、外科用藥

(Chirurgisches Mittel)

- 碘醇〔日本藥局方含碘三%〕(Tinctura Jodi)
- 稀釋碘醇〔碘醇一五・〇，酒精八五・〇〕
(Tinctura Jodi dilut.)(15%)
- 樟腦醇(一〇%)(Spiritus camphoratus)

(Spiritus camphorae)(Tinctura Camphorae)

- 碘醇樟腦 (碘醇一五。〇, 樟腦醇八五。〇)(Tinctura Jodi et Camphorae)
- 怕希德羅耳 (3%perhydrol). 阿克希浦耳 (三共) (Oxyful). 怕耳克希耳 (Perxyl) [友田]
- 沃度封(Jodoformium) (局方極量一回〇。二, 一日〇。六)
- 沃度封硼酸末 (Jodoformium et Acidum boricum)
- 迨馬妥耳 (Dermatolum)
- 迨馬妥耳硼酸末 (Dermatolum et Acidum Boricum)
- 硼酸末 (Acidum boricum)
- 克西羅封 (Xeroformium)
- 一%利鎖耳水 (1%Lysolum)
- 千倍昇汞水 (0.1%)(0.1%Hydiargyrum bichloratum)

○二至三至四至五%石炭酸水 (2-5% *Acidum carbolicum*)

○五%硝酸銀水 (5% *Argentum nitricum*)

○布勞氏液 (十倍用布勞氏液) (*Liquor Burowi*)

鉛糖 *Bleizucker* 5.0

明礬 *Alaun* 1.0

水 *Wasser* 100.0

右臨用時用強力振盪，稀釋十倍使用，
(器法用) (此液40.0水加足全量400.0) (可用馬
尾藻紅 *Fuchsin* 著色) *S. Stark umgeschüttelt*
äusserlich zu nehmen.

○巴耳刺水 (*Baelz-Wasser*)

苛性鉀 *Kalii caustici* 0.5-1.0

甘油 *Glycerini* 30.0

酒精 *Alcohol.* 30.0

水 *Aqua.* 40.0

右外用(可加入香水或香油一,二滴) *S.*
Acusserlich zu n.

- 三%硼酸水 (3% Acidum boricum)
- 碘彬進〔微量之碘溶於彬進〕 (Benzinum cum Jodi)
- 五〇%酒精 (50% Alcohol)
- 酒精 (Spiritus)
- 二%硼砂液(防鏽液) (2% Borax)

右以蒸溜水製成，用以防注射針，縫合針等之生鏽。

- 一%苛性鈉酒精(防鏽液) (1% Natrium causticum)

□前記巴耳刺水，視其應用部位及時間，可隨機適宜稀釋而使用之。

三六，膏 藥

(Unguenta; Salbenmittel.)

第一方 那薩氏泥膏 (彩膏) (Lassar' s
Pasta)

水楊酸	Acid. salicylic.	2.0
氧化鋅	Zinc. oxyd.	50.0
澱粉	Amyli	50.0

(379)

〔凡士林 Vaseline 100.0〕

(以豚脂, 橄欖油, 羊毛脂代用凡士林亦可) (Adipis suilli) S. Pasta. (Ol. Oliv, Lanolin)

△塗布膏藥後, 再用澱粉撒布, 則可省用繃帶。

△主治, 頭部濕疹, 急性濕疹, 膿痂性濕疹, 帶狀疱疹包皮灸。

第二方 土肥氏參硫膏 (Theerschwefelzinkpasta Dohi)

}	木參耳 Picis liquidae	10.0
	硫黃華 Sulfur. sublimati	10.0
	氧化鋅 Zinci oxydati	10.0
	豚脂 Adipis suilli	30.0

右外用 S. Kusselich.

△主治 木參耳有去皮膚充血, 炎症, 除濕潤, 減瘙癢之效, (急性及慢性濕疹, 汗疱, 慢性單純性苔癬, 疥癬, 頭部白癬, 頑癬, 疥癬)

第三方 擦劑 (液膏共濟(糊膏))

(Linimentum)

○基質 (比克氏擦劑) (Pick's Liniment)

{	忒拉加坎忒樹膠 Gummi Tragacanti	5.0
	甘油 Glycerini	3.0
	溜水 Aq. destillat	100.0

右溶解後用布片絞榨,使之濾過,通常加用1—2%之石炭酸。

○氧化鋅擦劑 (加用10%氧化鋅)

{	比克氏擦劑 Liniment. (Pick)	90.0
	氧化鋅 Zinci oxydati	10.0
	石炭酸 Acid. carbolic	1.0

右臨用時調和使用

□ 1%石炭酸氧化鋅糊膏(乾性濕疹)

{	忒拉加坎忒樹膠 Gummi Tragacanti	5.0
	甘油 Glycerini	3.0
	1%石炭酸水 1% Acid. carbolic	100.0
	氧化鋅 Zinci oxydati	10.0

○其他之擦劑基質

○布苔擦劑 (土肥)

○蕩弱粉擦劑 (同)

以上兩種擦劑之製法，先取布苔或蕩弱粉煎後之液汁而加以甘油及石炭酸，其配合量與比克氏擦劑基質之比例相同。

擦劑基質應用配合藥

○氧化鋅 *Zincum oxydatum*。

○澱粉 *Amylum*。

○硫黃華 *Sulfur sublimatum*。

○硼酸 *Acidum boricum*。

○薄荷腦 *Mentholum*。

△主治丘疹性濕疹，扁平及光圭濕疣，紅色苔癬，蕁麻疹，痒疹，多形滲出性紅斑，帶狀疱疹。

□山田氏糊劑

米粉 *Reismehl* 40.0—45.0

淨水 *Aq. destillat.* 500.0

水楊酸 *Acid. Salicylic.* 2.5

右藥沸成糊，外用 S. Aeusserlich Z. N.

常用配合藥品 (山田氏糊劑)

○氧化鋅 *Zincum oxydatum*。

○硫黃華 (加入硫黃者即山田博士之疥癬米糊) *Sulfur sublimatum*。

○硼酸末 *Acidum boricum*。

第四方 單軟膏 (Unguentum simplex)

黃臘 *Cerae flavae* 10.0

胡麻油 *Gomaöl* 20.0

(冬季須用胡麻油25.0)

第五方 硼酸軟膏 (Unguentum Acidi boric)

(單軟膏加 5%—10% 硼酸)

硼酸 *Acidum boricum* 0.5-1.0

單軟膏 (黃臘 1 / 胡麻油 2) *Ung. Simp.* 8.0

甘油 *Glycerini* 1.0

第六方 氧化鋅軟膏 (Unguentum Zinci oxydati)

氧化鋅 *Zincum oxydati* 1.0

單軟膏 *Unguent. Simple.* 9.0

(或豚脂) (Adipis suilli)

(可加用硼酸)

◎威爾松氏軟膏 (急性濕疹) (Unguentum
Wilsonii)

安息香酸 Acid. benzoic. 0.3

豚脂 Adipis Suilli 9.0

(可加用10—20%氧化鋅, 焦耳, 正替羅耳
等)

◎正替羅耳泥膏 (癢痒) (急性濕疹)

正替羅耳 Pityloli 2.0

澱粉或滑石 Amyl. od. Talc. 2.0

氧化鋅 Zinc. oxydat. 2.0

豚脂 Adipis suilli 4.0

(正替羅耳可用 Tameolum 代之)

其他之軟膏

(一) 伊希焦耳軟膏 Unguentum Ichthyoli.

(二) 莨菪膏軟膏 Unguentum Scopoliae. (日
本藥局方一〇%)

(三) 石炭酸軟膏 Unguentum Acidi carboli

ci.

(四) 追馬妥耳軟膏 Unguentum Dermatolii

(五) 沃度封軟膏 Unguentum Jodoformii.

(六) 赤降汞軟膏 Unguentum Hydrargyri
rubrum. (日本藥局方一〇%)

(七) 白降汞軟膏 Unguentum Hydrargyri
album. (日本藥局方一〇%)

(八) 黃降汞軟膏 Unguentum Hydrargyri
flavum. (日本藥局方一〇%)

(九) 水銀軟膏(灰白軟膏) Unguentum Hyd-
rargyri cinereum.

(一〇) 伊希焦耳蕒蓉軟膏 Unguentum Icht-
hyoli et Scopoliae.

第七方 單鉛硬膏(Emplastrum Litharg-
yri)

橄欖油 Ol. Olivari 5 分

豚脂 Adipis suilli 5 分

水 Aquao 1 分

氧化鉛 Plumbi Oxydati 5 分

第八方 水銀硬膏 (Emplastrum Hydrargyri)

(含20%水銀之單鉛硬膏)

第九方 比克氏硬膏 (水楊酸石鹼硬膏)
(Emplastrum nach Pick)

水楊酸 acid. salicylic.	10.0
單鉛硬膏 Emplastr. Lithargyri	70.0
黃臘 Cerae flavae	10.0
藥用石鹼末 pulv. sapon. medicat.	5.0
樟腦〔精製〕 Camphor. depurat.	1.0
橄欖油 Ol. Olivar.	1.0

△主治，多發性瘡腫，多發性膿瘍，毛囊炎。

△比克氏硬膏坊間有作展布硬膏販賣者，使用頗為便利。

第十方
禿髮膏

水楊酸 Acid. salicylic.	4.0
石炭酸 Acid. carbolic.	2.0
凡士林 Vaseline.	40.0

□ Square 軟膏爲水楊酸加以科利摩膏 (日本捕小鳥所用之膠質) 製成。

○絆創膏——展布硬膏類 *Emplastrum adhaesivum*,

(一) 英法絆創膏 *Emplastrum adhaesivum hanglicum*,

(二) 德國絆創膏 *Deutsches Pflaster*。

(三) 氧化鋅絆創膏 *Collempastrum Zinci oxydati*,

(四) 比克氏硬膏展布 *Pick's Pflaster*。

(五) 伊希焦耳絆創膏 *Collempastrum Ichthyoli*。

(六) 莨菪絆創膏 *Collempastrum Belladonnae*。

(七) 水銀絆創膏 *Collempastrum Hydrargyri*。

(八) 水楊酸絆創膏 *Collempastrum Acidi Salicylici*。

(九) 克利薩羅彬忒拉育馬金 *Chrysarobin*

um-traumatizin 五・〇乃至一〇% (寄生性病, 鱗屑疹, 頑癬)

(一〇) 派羅卡羅耳忒拉育馬金 Tyrogallol
um-traumatizin 五・〇乃至一〇%
〔寄生性病, 鱗屑疹, 頑癬〕

備考

- 忒拉育馬金 Traumatizin 者, Guttaperchae (一〇・〇), 溶解於克羅羅封 (一〇〇・〇) 製成之液汁也。
- 白降汞凡士林〔用治凍傷有效〕
- 銀蕒膏 (等分之灰白軟膏與蕒碧軟膏混合製成)
- 調製糊劑亦可用櫻糊及其他滅菌之漿糊。

三七，撒布藥

(Pulv's adpersorii s. crinalis;
Streupulver.)

- (一) 氧化鋅澱粉〔等分〕 *Zincum oxydatum et Amylum.*
- (二) 甘汞澱粉〔等分〕 *Calomelas et Amylum.*
- (三) 氧化鋅滑石澱粉(各等分) *Zinc. oxydatum, Talum et Amylum.*

- (四) 沃度封 Jodoformium。
(五) 迨馬妥耳 Dermatolum。
(六) 阿伊羅耳 Airolum。
(七) 沃度封硼酸末 Jodoformium et Acidum
boricum。
(八) 迨馬妥耳硼酸末 Dermatolum et Acidum
boricum。
(九) 硼酸末 Acidum boricum。
(一〇) 滑石 Talcum。

三八，塗布藥

(Bepinselungsmittel, Guttae
pro usum externum.)

- (一) 稀釋碘醇(碘醇一五·〇，酒精八五·〇)
15% Tinctura Jodi.
- (二) 樟腦醇(一·〇%) Tinctura Camphorae
(Spiritus camphoratus) (Spiritus Cam-
phorae)

- (三) 樟腦醇 (醇一五〇, 樟腦醇八五〇)
 ○) Tinctura Jodi et Camphorae
- (四) 伊希焦耳甘油 (一〇四) Ichthyol-Glycerin
 (1:4)
- (五) 伊希焦耳精 (一〇—二〇%) Ichthyol-
 Alkohol (10%—20%)
- (六) 純伊希焦耳 Ichthyolum。
- (七) 沃度封哥羅盾 (一比九) Jodoform—Coll-
 odium) (1:9)
- (八) 氧化鋅橄欖油 (等分) Oleum Olivarum
 et Zincum oxydatum(aa)
- (九) 薄荷精橄欖油 (3%) Spiritus Menthae
 et Oleum Olivarum(3%)

注意

□(五)及(七)之調劑。始加少量之醇精。使其
 易於溶解。

三九、 粘膜炎藥

(Bepinselungsmittel

der Schleimhäute, Frictiones mucosus)

○耳鼻科用藥

(一) 〇・五乃至一%鹽酸科卡音 (0.5—1%
Cocainum hydrochloricum) (小兒用〇

・五%大人用一%)

(二) 五千倍之鹽化腎上腺液及一%鹽酸科

卡音等分液(大人用)

(三)三乃至五%蛋白銀 (3-5% Protargolum)

(四)一乃至三%硝酸銀 (1-3% Argentum nitricum)

(五)盧戈耳氏液(Solutio Lugoti) (有種種之處方) (參看下頁)

碘 Jodati 0.2

碘化鉀 Kalii jodati 0.4

甘油 Glycerini 50.0

石炭酸 Acid. Carbolica. 0.2

薄荷油(薄荷腦) Ol. Menthae (Mentholi) 0.12(0.2)

(六)三%過氧化氫3%Wasserstoffsperoxyd (Hydrogenium peroxydatum (H₂O₂))

(七)一〇%薄荷腦橄欖油 Menthol-Oliveno^l.

(八)二乃至三%硼酸水 2-3% Acidum boricum.

(九)一〇%硼砂甘油 Borax- Glycerin.

(一〇)硼酸末 Acidum boricum.

(一一)一〇%硼砂蜜 Borax-Mel.

(一二)稀薄碘算 Tinct. Jodi dilut.

(一三)	{	重碳酸鈉 Nat. bicarb.	1.0
		甘油 Glycerini	5.0
		水 Aquae	10.0

右可嚙水或點耳水 S. Ceruminalwasser.

(一四)一%醋酸礬土水 Essigsäures-Thonerde.

(一五)伊希焦耳(五至一〇%)

(備考) ○咽頭粘膜塗布用之盧戈耳氏液有弱,中,強三種處方如左:

{	純碘 Jodi puri	0.08;0.5;0.75
	碘化鉀 Kalii jodati	0.5;2.5;2.5
	甘油 Glycerini	25.0

右咽頭塗布科(乾性咽頭炎) S. Zur.

Bepinselung (Bei Pharyngitis sicca)

四〇, 坐 藥

(Suppositoria.)

各種坐藥皆以可可脂製成

○肛門坐藥 (Anal-Suppositoria) (一個肛門坐藥之可可脂量。通常為二。〇)

(-) 莨菪膏坐藥 Extract. Scopoliae.

含量〇。〇五

處方 莨菪膏 Extract. Scopol. 0.05
 可可脂 Olei Cacao 2.5
 右作肛門坐藥一個，與以五個， M. F.
 suppositoria. D. No. V.

(二) 伊希焦耳坐藥 Ichthyolum.

含量 0.15

(三) 莨菪伊希焦耳坐藥 Scopolia et Ichthyolum

含量 (莨菪膏 0.05, 伊希焦耳 0.2)

(四) 沃度封坐藥 Jodoformium. 含量 0.2

(五) 鹽酸科卡音坐藥 Cocainum muriaticum
 含量 0.005

(六) 鹽酸嗎啡坐藥 Morphinum muriaticum.
 含量 0.005

(七) 片坐藥 Opium. 含量 0.03

(八) 阿片, 莨菪坐藥 Opium et Scopolia.
 含量各 0.02

(九) 硝酸銀坐藥 Argentum nitricum.
 含量 0.005

(一〇) 鞣酸坐藥 *Acedum tannicum*.

含量〇・〇五

(一一) 甘油坐藥 *Glycerinum*. (有大人用與
小兒用兩種) 含量三・〇

○ 臙球(臙坐藥) (*Vaginal-Kugeln*) (*Vaginal-Suppositoria*) (一個臙球之可可脂量普通爲
三・〇)

(一) 伊希焦耳球 *Ichthyolum*.

含量〇・一五

(二) 伊希焦耳銀球 *Ichthyol-Collargolum*.

含量(伊希焦耳〇・二, 可溶性銀〇・一)

(三) 莨菪球 *Extract. Scopoliae*.

含量〇・〇五

(四) 莨菪伊希焦耳球 *Scopoliae et Ichthyolum*.

含量(莨菪膏〇・〇五,

伊希焦耳〇・二)

(五) 碘莨球 *Kalium jodati et Scopoliae*.

含量(碘化鉀〇・二, 膏莨菪〇・〇五)

(六) 沃度封球 *Jodoformium*. 含量〇・二

(七) 坦甯酸球 *Acidum tannicum*。

含量 〇・〇五

(八) 克遼林球 *Creolinum*。含量 〇・〇六

(九) 鹽酸科卡音球 *Cocainum muriaticum*

含量 〇・〇〇五

○尿道坐藥 (*Urethral-Suppositoria*) (一個坐藥
之可可脂量普通爲 〇・四)

(一) 伊希焦耳尿道坐藥 *Ichthyolum*

含量 〇・一五

(二) 硫酸鋅尿道坐藥 *Zincum sulfuricum*。

含量 〇・〇〇五

(三) 沃度封尿道坐藥 *Jodoformium*

含量 〇・二

(四) 坦甯酸尿道坐藥 *Acid. tannicum*。

含量 〇・〇五

(五) 硝酸銀尿道坐藥 *Argentum nitricum*。

含量 〇・〇〇五

(六) 坡羅台英銀尿道坐藥 *Argentum protargi-*
natum (*protargolum*)

含量〇・〇五 = 〇・一

(七) Créde 氏銀尿道坐藥 Collargolum

含量〇・一

(八) 鹽酸可卡音尿道坐藥 Cocain m muria-
ticum 含量〇・〇〇五

備考 以上所載之含量，為一個坐藥之主藥含有量。

○製造坐藥，取可可稍加甘油或橄欖油，而搓捻均勻，乃加入主藥，次用酒井式坐藥調製器（三共發賣）製之，較為便利。

△波拉格羅耳 (Boraginol) (肛門坐藥)

四一，尿道洗滌藥

(Mittel zur Urethralspülung,
Lotiones urethrales.)

- (一) 硼酸水 Acidum boricum [二乃至三 %]
- (二) 蛋白銀水 Protargolum. (〇・二乃至〇・三乃至〇・五乃至一乃至二 %)
- (三) 硝酸銀水 Argentum nitricum (〇・〇

- 二五乃至〇。〇五乃至〇。一%)
- (四) 硫酸鋅水 *Zincum sulfuricum*。(〇。三
乃至〇。五%)
- (五) 硫基石炭酸鋅水 *Zincum sulfophenyli-*
cum。(〇。二乃至一。〇%)
- (六) 過錳酸鉀液 *Kalium Permanganicum*。
(〇。〇二乃至〇。一%)
- (七) 焦他耳港 *Tihotargan* (焦科耳銀液) (尿
道內注入用〇。二五——〇。五——〇
。七五——一%溶液, 尿道洗滌用〇。
〇五——〇。一%液)

◎常用之煎, 浸, 漿劑表(%量)

- (一) 規那皮煎……………(四%)
- (二) 午乏午耳西葉煎……………(五%)
- (三) 空杜蘭戈皮煎……………(七。五%)
- (四) 先那葉煎……………(四%)
- (五) 大麥煎……………(五%)
- (六) 狄吉他利斯葉浸…(〇。五%)

- (七) 西尼加根浸……………(四%)
- (八) 遠志根浸……………(四%)
- (九) 吐根浸……………(〇。三%)
- (十) 麥角浸……………(三%)
- (十一) 纈草浸……………(四%)
- (十二) 粗末大黃浸……………(二%)
- (十三) 薩利潑漿……………(一%)
- (十四) 澱粉漿……………(二%)
- (十五) 樹膠漿……………(五%)

○煎劑通常將切細之藥物，注以冷水，而攪伴之，於三十分間漸漸煎出。

○浸劑通常將細切之物藥，注以熱水，而攪伴之，於五分間漸漸浸出。

(1004)

附 錄

小兒藥物用量算出表

(高比斯氏法)

1歲以下	大人用量之 $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{12}$
1歲—2歲	$\frac{1}{10}$
2歲—3歲	$\frac{1}{8}$
3歲—4歲	$\frac{1}{6}$
4歲—7歲	$\frac{1}{4}$
7歲—14歲	$\frac{1}{3}$
14歲以上	$\frac{1}{2}$

○上法算出之用量，不過示其大要而已，因患兒之體質，體重，發育狀態，藥劑之種類等各有不同，用量之多少亦稍有差異，故與以較少量者有之，使用比較的大量者亦有之。

(大人普通用量之標準，多以一回極量作為一日之用量，一日之極量，作為二乃至三日之用量為當。)

附 錄

毒劇藥極量表 (依照第四改正日本藥局方)			
毒藥			
藥 品 名	一回極量	一日極量	
巴豆油	0.05	0.15	
磷	0.001	0.003	
硫酸阿忒羅品	0.001	0.003	
硫酸嗎啡	0.03	0.1	
硫酸菲鎖斯替杰民	0.001	0.003	
臭化氫酸洪馬忒羅品	0.001	0.003	
臭化氫酸斯科坡拉尼	0.0005	0.0015	改正
鹽酸阿坡嗎啡	0.02		改正
鹽酸嗎啡	0.03	0.1	

鹽酸伊米汀	0.05	0.15	新加
鹽酸派羅卡 品	0.02	0.04	改正
亞砷酸	0.005	0.015	
亞砷酸鉀液	0.5	1.5	
水楊酸汞	0.02	0.06	
水楊酸菲鎖 斯替杰民	0.001	0.003	
稀青酸	0.1	0.3	
昇汞	0.02	0.06	
硝酸蕃木鼈 藤	0.005	0.015	
赤色碘化汞及 黃色碘化汞	0.02	0.06	
劇藥			
藥品名	一回極量	一日極量	
印度大麻膏	0.1	0.3	

莨菪膏	0.05	0.15	
莨菪葉	0.15	0.5	新加
莨菪根	0.1	0.3	
莨菪醇	1.0	3.0	
羅比利阿草	0.1	0.3	
羅比利阿醇	1.0	3.0	
馬克羅菲拉 水	2.0	6.0	
麥角	1.0	5.0	
麥角膏	0.3	1.0	改正
番木鱉	0.1	0.2	
番木鱉膏	0.05	0.1	
番木鱉醇	1.0	2.0	
坡朵菲林脂	0.1	0.3	

芳香阿片酒	1.5	5.0	
抱水克羅拉耳	2.0	6.0	
吐酒石	0.1	0.3	
陀肥耳氏散	1.0	3.0	新加
二甲完基礪 基安替正林 (正拉密洞)	0.3	1.0	改正
二甲完基榲 檸檬酸尿素 (肥羅那耳)	0.5	1.0	新加
狄吉他利斯葉	0.2	1.0	
狄吉他利斯醇	1.5	5.0	
磷酸科亭	0.1	0.3	
硫酸銅(頓服量)	1.0		
硫酸鋅(頓服量)	1.0		
海葱	0.2	1.0	新加

樟腦	0.5	1.5	
坎他利斯 (Cantharides)	0.03	0.2	改正
坎他利斯醇	0.2	0.6	改正
碘	0.02	0.06	
沃度封	0.2	0.6	
碘醇	0.2	0.6	
乳酸基飛那 替亭(拉克 妥飛甯)	0.7	2.0	新加
枸橼酸咖啡 鹽安替正林 (米格列林) (Antipyrin- Caffeinum citricum)	1.0	3.0	新加
克遼瓊貳	0.5	1.5	
夸阿雅科耳	0.3	1.0	

雅拉怕脂	0.5	1.5	改正
曼陀羅葉	0.2	0.6	新加
飛拉西汀	1.0	3.0	
溴化樟腦	0.3	1.0	
科羅新醇 (T. colocy- nthidis)	1.0	3.0	
科羅新膏	0.05	0.15	
科耳吸肯醇	2.0	6.0	
科耳吸肯酒 (Vinum c. olchici)	2.0	6.0	
鹽酸科卡音	0.05	0.15	
鹽酸二醋酸 嗎啡 (鹽酸 黑羅音)	0.005	0.015	改正
鹽酸乙完基 嗎啡 (狄俄 寧)	0.03	0.1	新加

鹽酸忒羅伯 科卡音 (Tropacoc- ainum hy- drochloric- um)	0.1	0.3	新加
狄午雷汀 (水楊酸鈉 可可鹼)	0.5	1.5	新加
醋酸阿尼利 德(安替飛 孛林)	0.3	1.0	改正
阿加利進	0.1		
安替孛林	1.0	3.0	新加
安息香酸鈉 咖啡鹼	1.0	3.0	改正
阿片	0.15	0.5	
阿片膏	0.1	0.3	改正
阿片醇	1.5	5.0	
阿科諾替醇 (雙蘭菊醇)	0.5	1.5	新加

水楊酸安替 正林 (薩利 正林)	1.0	3.0	新加
水楊酸鈉可 可藤 (Diuretin)	1.0	3.0	新加
水楊酸鈉咖 啡藤	1.0	3.0	改正
醋酸鉛	0.1	0.3	
散妥奴	0.1	0.3	
杏仁水	2.0	6.0	
綿馬膏		10.0	
乙完基薩佛 那耳 (忒來 俄耳) Methylsul- fonatum (T- riohalum)	1.0	3.0	改正
碳酸鋁	0.3	1.0	
庶斯葉	0.3	1.0	

庶斯膏	0.1	0.3	
硝酸銀	0.03	0.1	
石炭酸	0.1	0.3	
薩耳佛那耳	1.0	3.0	改正
斯忒羅反忒醇	0.5	1.5	

藥局常應貯藏之藥品表 (藥室常備)

普通藥	鉍水	鹽酸規寧
醋基水楊酸	石炭酸水	規那皮
硼酸	蒸溜水	龍膽膏
稀鹽酸	科派巴巴耳孫	甘草膏
水楊酸	次硝酸鉍	還元鐵
坦甯酸	次水楊酸鉍	先那葉
酒石酸	煨製石炭	甘油
含水羊毛脂	煨製硫酸鈣	炭酸夸阿雅科
麻醉用醇精	精製樟腦	耳

亞拉伯樹膠
重酒石酸鉀
溴化鉀
過氯化鐵液
滅菌白阿膠液
醋酸鉀液
煨製鎂
硫酸鎂
重碳酸鈉
溴化鈉
氯化鈉
水楊酸鈉
可可脂
肝油
橄欖油
蓖麻子油
胡麻油
龍膽
甘草

大黃
乳糖
人工加耳斯泉
鹽
碘化鐵糖漿
純糖漿
酒精
苦味醇
橙皮醇
纈草醇
水銀軟膏
單軟膏
氧化鋅軟膏
黃色凡士林
劇毒
醋酸阿尼利德
石炭水
防疫用石炭水
安替丕林

馬克羅菲拉水
熔製硝酸銀
抱水克羅拉耳
麻醉用克羅羅
封
鹽酸科卡音
磷酸科亭
硫酸銅
鹽酸二醋酸嗎
啡
二甲完其礪基
安替丕林
萇蓉膏
麥角膏
狄吉他利斯葉
福爾買林
甘汞
沃度封
氯化鈣

碘化鉀	散妥緬	硫酸鋅
克遼瑣忒	白喉血清	<u>毒藥</u>
次醋酸鉛液	吐根醇	鹽酸阿坡嗎啡
阿片	碘醇	硫酸阿忒羅品
<u>陀肥耳氏散</u>	阿片醇	昇汞
吐根	斯忒羅反忒醇	亞砷酸鉀
雅拉怕脂	番木鱉醇	鹽酸嗎啡

藥品貯藏法注意表(藥室常備)

取扱藥品,除依照藥名箋括弧內之貯藏法外,又須注意下列事項:

- 一。記載有遮除光線之藥品,應選用黑色或黃褐色之玻璃罇貯藏之。
- 一。生藥雖有特別記載,應用其乾燥品,但烘乾時不可用四十度以上之溫度。
- 一。硬膏劑用籜或不透性紙包裹。如含有揮發性之藥物,尚須裝入鐵葉器中,而貯於冷乾所。

一。膏劑須密封於玻璃器或瓷器中，而置於冷乾所。

一。糖漿劑應完全盛滿於極乾燥之器內，貯於冷所，如有溼滓或醱酵者，則不可以供應用。

一。醇劑及酒精，宜貯於陰冷所。

一。軟膏劑不可貯藏多量，能速起分解者，應於臨用時調製，敗油性者，不可以供應用。

一。據經驗上，將易起變化之藥品，依其變化之狀態，區別如左：（○記為劇藥，◎記為毒藥。）

A應注意潮解者：

溴化鈉	碘化鈉	水楊酸鈉
碳酸鉀	硫化鉀	氯化鈣

○苛性拉忒弄 (Natron causticum)

○苛性鉀 ○氯化鋅 ○鹽酸派羅卡品

○抱水克羅拉耳 ◎硫酸菲瑣斯替杰民 (硫酸伊碎林)

B應注意，引濕，塊化，或軟化者：

蛋白銀	大黃膏	蘆薈膏
蘆薈末	阿仙藥粉末	甘草羔
亞爾拔耳肯(Albargin)		卡斯卡林末
○番木鱉膏	○雅拉怕脂	狄亞斯大斯
C應注意風化或酸炭吸收者		
煨製石灰	炭酸鈉	硫酸鈉
○醋酸鉛	次醋酸鉛液	石灰水
D應注意腐敗或醱酵者:		
盼克遼汀(Pankreatinum)		含糖陪潑辛
先那糖漿	大黃糖漿	氧化鋅軟膏
豚脂	麥角	
E應注意沈澱或沈滓者		
水液類	醇類	流動膏類
酒類	○福爾買林	○次醋酸鉛液
F應注意被黴者:		
蘆薈丸	蘆薈雅拉怕丸	複方大黃丸
甘草膏	弱發泡膏	○強發泡膏
○麥角膏		
G應注意變色者:		

- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 乳酸鐵 | 精製木醋 | 還元鐵 |
| 水楊酸鈉 | 硫酸亞酸化鐵 | 坦甯酸規甯 |
| 利鎖耳金 | 溴化銻 | 芳香銻精 |
| ○石化鉀 | ○石灰酸 | ○硝酸銀 |
| ○硝酸銀加硝石 | ○散妥級 | () 熔製硝酸銀 |
| ○甘汞 | ○夸阿雅科耳 | ○黃色碘化汞 |
| ○硫酸 | ⊗ 赤色碘化汞 | ○克遼鎖忒 |
| ⊗ 鹽酸阿坡嗎啡 | | |

H 應注意貯藏之期間者：

血清類 ○狄吉他利斯葉 ○結核菌素

I 應注意引濕黴臭者：

一般植物性粉末類

J 應注意蟲蝕者：

一般生藥類

一。主要之劇藥，其含量如在左列之量以下者，則可照普通藥取用。

醋酸阿尼利德製劑，一錠中含 0.1 以下者。

石炭酸製劑，含純石炭酸 5% 以下者。

安替尼林及其化合物之製劑，一丸或一錠中含三·〇以下者。

夸阿雅科耳製劑，一膠囊，一丸，或一錠中含純夸阿雅耳在〇·〇五克以下者。

沃度封十%以下，苛性鉀五%以下，氯酸鉀十%以下，碘化鉀十%以下，克遼鎖忒一膠囊，一丸，或一錠中含〇·〇五以下，飛那西汀製劑含〇·二五克以下。

吐根製劑一%以下，散妥級製劑一丸，或一錠中含〇·〇二克以下。

〔 倍 與 % 〕

〔倍〕	〔%〕	〔倍〕	〔%〕
二 倍	… 50%	九 十 倍	…1.1 %強
三 倍	… 33%強	百 倍	… 1 %
四 倍	… 25%	百 二 十 倍	…0.83%強
五 倍	… 20%	百 三 十 倍	…0.76%強
十 倍	… 10%	百 五 十 倍	…0.66%強
十 五 倍	…7.5%	二 百 倍	…0.5 %
二 十 倍	… 5%	二 百 五 十 倍	…0.4 %
二 十 五 倍	… 4%	三 百 倍	…0.33%強
三 十 倍	…3.3%強	五 百 倍	…0.2 %
四 十 倍	…2.5%	千 倍	…0.1 %
五 十 倍	… 2%	二 千 倍	…0.05%
六 十 倍	…1.7%弱	五 千 倍	…0.02%
七 十 倍	…1.4%強	一 萬 倍	…0.01%
八 十 倍	…1.2%強		

配合禁忌一覽表

(主藥)	(製劑)	(配合藥)	(理化學的變化)
亞砒酸	水劑	炭酸鈣	生難溶性之亞砒酸 鏷。 起不溶性之鹽類沈 澱。
		石灰水	
		酸化鐵	
鹽酸	水劑	鹼類	發生鹽類，各自失 其固有之效力。
		膏類	
硝酸	水劑	植物鹽基 有機酸鹽 類	多起分解而變性。 酸素游離，而失其 效力。
硫酸			
鞣酸 (坦甯酸)	水劑	蛋白質， 膠質，澱 粉，樹膠	生膠狀之物質。 發生難溶性之鹽， 且其金屬析出，而 呈著明變色。 初生灰白色，次暗 綠色，終則變為黑 色之沈澱。 初無色，次呈綠色， 終則變為黑色。
		金屬鹽類	
		石灰水	
		炭酸鹼	

蘆薈	丸劑	純鐵	漸漸抱合，各藥之效力減弱。
		(鐵粉或還元鐵)	
安替正林	水劑	水溶液	易與他鹽類發生複鹽，宜注意之。
	水劑	硫酸，鹽酸及其鹽類	生對應之銀鹽，而成白色之洗滌。
	水劑	醋酸，酒石酸，青酸及其鹽類，杏仁水	
硝酸銀	丸劑		銀還元而變黑色。
	散劑	碘，臭素及其鹽類	生對應之難溶解性銀鹽，起黃色之洗滌。
		植物鹽基，植物性粉末	生銀鹽或起分解，而銀析出。
	水劑	坦寧酸含有物	漸次分解，而帶黃白色。
次硝酸鉍	散劑	硫黃，硫化錒	漸漸化生硫化鉍。
		碘驗鹽	化生橙赤色之碘化鉍。
		酸類	起中和而生其酸之鹽類，〔生白堊或洗滌。〕

石灰水	水劑	炭酸鹽類 銨及其鹽類 金屬鹽類 植物鹽基 含有物 坦寧酸含 有物 昇汞	起交換分解，而生白泥。
			石灰沈澱 生水酸化金屬，起白色或變色之沈澱 使 Alkaloid 析出。 起分解，漸次變為藍色或黑色。 徐徐分解，而變黑色。

鹽酸規寧	丸劑 散劑	利鎖耳金 坦寧酸含 有物	分解發生一種化合物，研磨之則成粘稠性之物質。
			起分解而一分變成不溶性之坦寧酸規寧。 徐徐分解。

抱水克羅拉耳	水劑	水溶液 甘汞，硝酸 酸，亞酸 化汞 炭酸鹼及 有機酸之 鹼鹽類 銨鹽類	交換分解。
			分解而生克羅羅封。 分解。

鹽酸科卡音 水劑 { 坦寧酸含有物 鹼鹽類 碘化合物 } 化合而變色。科卡音游離，而生白涎。生碘化合物而變色。

咖啡藤 水劑 { 碘化合物 鹼鹽類 鞣酸含有物 } 生碘化合物。變色。生化合物，而起白涎。

狄吉他利斯葉 浸劑 { 酒精浸出液或其溶液加有溫稀鹽酸時 加溫之稀鑛酸類 礆及其鹽類，炭酸鹼，鉛糖，鉛醋坦寧酸， } 生有毒性之 Toxin 及結晶性之 Digitoxin，而起溷濁。分解而生葡萄糖及 Digitolen, Digitonin, Digitaliresin。均變質。

{ 醋酸鉀 鹼鹽類 } 生肉色絮狀之洗涎。植物性鹽基游離，而生灰色絮狀之洗澱。

規那皮	煎劑	碳酸鹼	} 植物性鹽基游離。而生灰色細微之沈澱。
		碘鹽類	
		硫酸鎂	} 生化合物。而生白塗。與規甯化合。而生純白塗。
		亞砷酸鉀液	
		次亞磷酸鹽類	} 因其中含有碳酸鹼。故生灰白色之沈澱。
		鞣酸及其含有物	
午芝 耳西葉	浸劑	赤酒。 Portwein	} 規那鹽基與酒中之鞣酸化合。而生灰白色之細微沈澱。但有酸類配伍時。則無變化。
		酸類	
		Alkaloid 含有物	} Arbutin 分解而成葡萄糖 Hydrochinon, 及 methyl-Hydrobbhinon。
		金屬鹽類	
		石灰水	} 析出Alkaloid 而瀾濁。其金屬析出。多變成帶褐灰色。漸漸變為黑色。

		蛋白質類	變成膠狀之塊。
		Hexamethylentetraminum	漸生沈澱。
亞拉伯樹膠	水劑	過氧化鐵 鉛鹽類	變成膠狀之凝塊。 分解。
		酒精製劑 及醇精製 醇	析出而成膠狀物。
		炭酸鹼及 坦寧酸	
		醋酸類	生其他之酸鹽類， 而醋酸游離。
醋酸鉀	水劑	規那及其 製劑	生肉色絮狀之沈 澱。
		抱水克羅 拉耳	分解而變質。
		赤酒, Por- twein	生灰紫色不明之沈 澱物。
		錳化鐵陪 潑通液	生赤褐色之沈澱。
		酸類及酸 性鹽類	析出亞酸化汞及金 屬水銀，而變為黑 色，特以鹽酸則變

爲猛毒之昇汞。

甘汞

水劑
散劑

炭酸鹼及
石灰水

化生亞酸化汞
鹽，而變爲黑色。

碘鹽類

生亞碘化汞而起
紅色之沈澱。

碘鹽類及
其製劑

化生碘化汞及昇
汞。

膏類

析出昇汞及水銀而
變爲黑色。

白糖，馬啡
含有物，及
其他還元
性之物質。

化生昇汞，析出水
銀，而變爲黑色。

銻鹽類

化生黑色之含碲亞
酸化汞。

亞酸化物，
氯化鐵
及碘化鐵

水銀還元。

青酸含有
物

起分解，鹽化汞化
生爲青酸汞。

銻及其鹽
類

銻起分解，易於爆
發，發生碘化窒素。

金屬及其

化生碘化合物，多

碘

水劑

- 鹽類 生黃色之沈澱。
- 澱粉及其含有物 化生碘化澱粉，而變為藍色。
- 脂肪油，揮發油，及炭酸鹼土類鹽 } 分解而起變化。
- 乳劑亞拉伯樹膠 分解而變為黑褐色。
- 酒精製鹼液 生黃色小葉狀之沃度封結晶，

碘化鉀

水劑

- 鑛酸類酸性劑類 碘游離而變為褐色。
- 硝酸銀 生黃色碘化銀之沈澱。
- 植物鹽基水銀及鉛鹽類 構成碘化合物而生變色之沈澱。化生對應之金屬化合物。
- 酸化鐵鹽，過硫酸鐵，過氯化鐵 } 碘游離。

{ 碘鹽類——構成化合物。

鹽酸嗎啡	水劑散劑	坦寧酸含有物	生白色之沈澱。
		重金屬鹽類	金屬還元，而變為灰褐色。
重碳酸鈉	水劑散劑	酸類及酸性鹽基	發生碳酸而構成其鹽類。
		植物鹽基含有物	析出 Alkaloid 而溷濁。
		坦寧酸及其含有物	分解。
		金屬鹽類	析出金屬而變色。
阿片	水劑散劑	碳酸鹼	析出植物鹽基，而生灰白色之溷濁或沈澱。
		金屬酸類	
		坦寧酸含有物	植物鹽基游離，而生灰色之溷濁。
		番木鱈及其製劑， 莨菪及其製劑	抱合而生不溶性之沈澱。
		樹膠及其含有物	

醋酸鉛	水劑	石灰水	生水酸化鉛，析出絮狀之沈澱。
		碳酸鹽類	生白色碳酸鉛之沈澱。
		坦甯酸含有物	生帶黃白色之沈澱。
		鎂酸類	化生乙酸之鉍鹽，生白色之沈澱而醋酸游離。
		碘及其鹽類	生黃色之碘化鉛
吐根	浸劑	鞣酸及其含有物，硝酸鹼，碳酸鹼，鹼鹽	皆使 Emetinum 游離，而生灰白色之沈澱。
		酸類	Senegin 及 Spaozin 分解成葡萄糖及 Sapogenin 化生為不明物質。 變為黃色
先那根	浸劑	錳含有物及其鹽類	
		鹼類	
番木鱉膏及醇	水劑散劑	碳酸鹼類	均析出植物鹽基，而生灰白色之沈澱
		碘化鉀 坦甯酸及	

其含有物
 金屬鹽類 { 生酸化金屬之沈澱
 或生複鹽而變色。

麥角	浸劑	碘化鉀及鹼鹽	起灰白色之愛耳戈汀沈澱。
		溫碳酸鹼	愛耳戈汀分解，而化生多量之 Trimethyl-amin, 發生一種臭氣。
		坦寧酸及其含有物	愛耳戈汀及 Acidum Sclerotium 沈澱。
		酒精含有物	使 Sclerotium 及 Sphacelinsäure 游離。
		重金屬鹽類	斯克來羅厄伊林游離析出，而生藍紫堇色之沈澱。
礞化鐵糖漿	水劑	坦寧酸含有物	分解而變為黑色。
		水溶液	漸漸分解而生黃色之沈澱。
鍾茴香精	水劑	甘汞，植物鹽基含有物	生昇汞及還元汞，變為黑色。使 Alkaloid 游離沈澱。

		酸類及鹼性鹽類 碘及其溶液	中和而失其效力。 生碘化室素而爆發。
昇汞	水劑	碳酸鹽類 植物鹽基 含有物	生鹼基性氯化汞或 酸性碳酸汞。
		石灰水	分解或構成複鹽。 分解而漸次變成黑色。
		鞣酸含有物	生鞣酸汞
		碘化鉀	生過碘化汞之猩紅色 沈澱，過剩者則 溶解。
		阿片……	分解而生複鹽。
過錳酸鉀	水劑	有機物	各自還元，有機物 酸化，變為褐色或 脫色。
		銻及其鹽類	生錳酸鉀及水酸化 錳之絮狀沈澱。
		有機酸及其鹽類	酸化而爆發點火。
科倫波根	煎劑	碘化鉀	分解而生碘化Ber- berin 之結晶性沈 澱。
		酸類	分解而生黃色之沈 澱。

乙完基炭酸規甯 (廠規甯) 水劑 酸類 生易溶於水之鹽。

鹽酸黑羅英 水劑 { 銻苗香精及銻含有物 碳酸銻 } 沈澱，其過剩者則溶解。
沈澱。

碘化 Feratose 及其他蛋白質化合物 水劑 酸類 分解。

六甲欠基化四氮 (午羅忒羅品) 水劑 { 坦甯酸及其含有物 } 生白色之沈澱。
酸類鹼類 分解。

醋基水楊酸 (阿斯正林) 水劑 散劑 { 鹼類 安替正林, 鹽酸規甯, 狄亞斯大斯, 安息香酸 鈉加啡鹼 } 易於潮解
分解。

水楊酸鈉 可可鹼 (狄午雷汀) 水劑 酸類 分解而析出水楊酸及可可鹼

蛋白質
(卵黃)

水劑

酒精
酸類
坦甯酸
昇汞

蛋白質不溶解。
有凝固蛋白質之性
質。
沈降蛋白
變質。

A

Acetanilidum (Antifebrinum) 18, 22, 27, 9
7, 86, 114.

Acidol (Betaïnium hydrochloricum) 276.

Acidum acetylsalicylicum s. Aspirin 5, 1
9, 44.

Acidum benzoicum 17, 163, 334.

Acidum boricum 93, 98, 347, 355, 324, 376,
332, 383, 389, 401.

Acidum camphoricum 235.

Acidum carbolicum 150, 156, 157, 265, 355,
370, 377, 381, 386, 394.

Acidum citricum 9, 11.

Acidum hydrochloricum dilutum 1, 44, 17
9, 196, 262, 274, 287, 288, 290, 302,
332.

Acidum lacticum 240.

Acidum salicylicum 356, 379, 382, 386, 386.

Acidum tannicum 93, 254, 255, 356, 372, 398.

Acidum tartaricum 180, 186, 238
Adalin 135.
Adamon 121.
Adipis suilli 380, 380, 384, 384, 385.
Adonis amurensis 42.
Adrenalin 359.
Adrenalinum hydrochloricum 393.
Aether 139, 150, 152.
Aether pro narcosi 140.
Agurin 205, 212.
Agaricinum 224.
Airolum 373, 390.
Alaum (Alumen) 92, 98, 347, 356, 377.
Albuminum tannicum s. Tannalbinum.
Alcohol 150, 157, 161, 236, 276, 378.
Alcohol absolutus 140.
Aleuronat. 309.
Alkalisches Mittel 289, 304.
Allocaïn S. 148.

- Aloë 177, 197.
 Alypinum 146, 148, 243.
 Amylum nitrosum 144.
 Amylum 379, 384, 382.
 Ammonium bromatum 118, 121, 122.
 Ammonium carbonicum 79.
 Ammonium chloratum 75, 77, 79, 288, 303.
 Analeptica (Excitantia) 161. Anæsthesin
 242.
 Anal-Suppositoria 396.
 Anibrotica 233.
 Anodyna (Analgetica) 100.
 Anthelminthica (Wurmtreibendes Mittel)
 327.
 Antidiarrhoica (Obstipantia) 244.
 Antiemetica 237.
 Antiphthisica 82.
 Antipyretica 13.
 Antipyrinum 5, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 34, 3

7, 43, 50, 58, 60, 72, 78, 79, 85, 109, 113, 121,
155, 180, 209, 218, 256, 280, 282,

Antisyphilitica 311.

Aperitol 178, 198.

Apomorphinum hydrochloricum 137, 149,
168.

Aqua Amygdalarum amararum 76, 125,

Aqua Cinnamomi 87, 88, 180, 288, 261, 303,
306.

Aqua Corticis Aurantii 306.

Aqua Emulsionis 88, 187, 190, 307.

Aqua Foeniculi 359.

Aqua Lauro-Cerasi (Aqua Pruni armeniac
ae) 3, 24, 50, 56, 57, 72, 73, 75, 81, 94, 103,
109, 114, 126, 180, 263, 278, 288, 303, 306,
325,

Aqua Menthae 4, 7, 10, 39, 40, 88, 98, 124, 180,
184, 187,

194, 195, 211, 214, 231, 296, 279, 283, 306,

Aqua pruni macrophyllae 126,
Argentum nitricum 253, 254, 374, 356, 3
59, 361, 371, 377, 394, 396, 397, 401,
Argentum proteinaturn S. Protargolum
Arsaminol 320,
Arsemin 320,
Arsen-Ferratose 297,
Asa foetida 123,
Aspirin 5, 17, 19, 28, 42, 44, 79, 85, 109,
114, 231, 252, 280,
Asurol 318,
Atophan 115 Atophanyl 116,
Atropin-Morphinlösung 153,
Atropinum sulfuricum 103, 153, 234, 241,
362, 361,
Aurantia-Praeparate 276,

BB

Baelz-Wasser 377,

© 5 13

Bancaïn 148, 151, 364.
Balsamum Copaivae 218, 222.
Balsamum Peruvianum 79.
Bepinselungsmitte 13, 91.
Biosermin 294.
Bismal 253.
Bismon 254.
Bismutose 253.
Bismutum subnitricum 85, 250, 253, 256.
Bismutum subsalicylicum 253, 256.
Bleizucker s. Plumbum aceticum
Borax (Natrium boricum) 93, 99, 366, 3
78,
Borax-Glycerin 394 Borraginol 400
Borax-Mel 395.
Borovertinum 224, 222.
Bouillon 351.
Branntwein 164, 351.
Brocin 71, 79, 122, 280.

Brom-Blutan 302.
Bromipin 125.
Bromocoll 124.
Brom-Präparate 117, 134.
Bromural 125, 135.
Bromarin 125, 135.

C

Caffeinum 21, 25, 47, 58, 205, 207, 208.
Caffeino-Natrium benzoicum 24, 61, 43,
47, 49, 52, 53, 59, 61, 76, 121, 163, 20
5, 208, 209, 210, 215, 280.
Caffeino-Natrium salicylicum 205.
Calcaria carbonica 300.
Calcaria phosphorica 300.
Calcium bromatum 125.
Calci. carbon. precipitatum 287.
Calcium chloratum 90, 125, 154, 156, 268
269, 289, 304.

Calcium iodatum 90.
Calcium lacticum 269, 289, 304,
Calmotin 124, 136.
Calomelas (Calomel) (Hydrargyrum chlo-
ratum) 22, 201, 206, 248, 314, 337
Calomelas et Amylum 389.
Camphora 54, 58, 61, 63, 114, 150, 163,
208.
Campher-Aether 153,
Campher-Olivenol 153, 163.
Camphora depurata 21, 28, 48, 386.
Camphora monobromata 124.
Cardiotonica 46.
Cathartica (Abfuhrmittel) 174.
Cera flava 383, 386.
Cerium oxalicum 289, 282.
Ceruminalwasser 395.
Chinin-Eisenpille 301.
Chinin-Praeparate 217.

Chininum hydrochloricum (Chininum muriaticum) 31, 32, 33, 330.
Chininum sulfuricum 19, 301.
Chininum tannicum 34, 36, 235.
Chirurgisches Mittel 375.
Chloralum hydratum 23, 129, 131,
Chloroformium 138, 150, 242, 336.
Chromsaure 276.
Cinnamom-Praeparate 276.
Clysmata evacuantia 343.
Clysmata nutrientia (Nahrklystiera) 349.
Coagulen 268, 272.
Cocainum hydrochloricum (Cocainum muriaticum) 10, 93, 143, 116, 149, 157, 237, 238, 241, 359, 363, 393, 397, 399,
Codeinum phosphoricum 10, 21, 30, 43, 71, 105, 75, 81, 85, 105, 106, 121, 251, 263, 282.
Cognac 164.

Collargolum (Credé) 400.
Collempastrum Acidi salicylici 387.
Collempastrum Belladonnae 387.
Collempastrum Ichthyoli 387.
Collempastrum Hydrargyri 387.
Collempastrum Zinci oxydati 387.
Cortex Chinae 275.
Cortex Radicis Granati 328, 330.
Cremor Tartari s. Kalium bitaricum 191.
Creolinum 252.
Creosotum s. Kreosotum.
Cuprum sulfuricum 171, 364.

D

Decoctum Condurango 287.
Decoctum Corticis Chinae 287, 293, 302.
Decoctum Foliorum Sennae 196.
Decoctum Foliarum Uvae Ursi 224, 280.
Decoctum Radicis Colombo 248, 286.

Dermatolum (Bismutum subgallicum) 253.
256, 373, 376, 390.
Dermatolum et Acidum boricum 376, 390.
Deutsches Pfiaster 387.
Dial 135.
Diaphoretica 228.
Diastase 26, 85, 185, 282, 284,
Digalen 329.
Digifolin 47.
Digitalis-Praeparate 48, 51, 75, 122, 180,
183, 209, 212, 215,
Digitamin 47, 56, 155, 206.
Dionin (Aethylmorphinum hydrochloricum
) 72, 106.
Diuretica (Harntreibendes Mittel) 203.
Diuretinum (Theobrominum natric=salic-
ylicum) 50, 53, 205, 210, 215.
Duotalum (Guajacolum carbonicum) 21,
26, 28, 84, 86, 109, 113.

EE

- Ehramisol 320.
Eier (Hühner) 352.
Eigelb (Eidotter) 87, 162, 164, 350,
Eisen-Sajodin 297.
Elaeosaccharum Foeniculi 45, 183, 185, 1
99, 201.
Elaeosaccharum Menthae 239, 242, 282,
285, 28, 232, 185, 45.
Elbon 19,
Emetica (Breachmittel) 167,
Emetinum hydrochloricum 172.
Emplastrum adhaesivum 387,
Emplastrum adhaesivum anglicum 387,
— Hydrargyri 386,
— nach Pick 386,
Enteroklyse 346.
Ergotinum 157, 264,
Ergotinum bombelon 163,

Essig 209, 236, 340,
Eserinum salicylicum 363,
Essigsures Thonerde 342, 395.
Eucain B. 148.
Euchininum 19, 36.
Eulatin 125.
Eumydrin (Atnopinum methylnitricum)
277.
Expectorantia 59.
Extractum Belladonnae s. Extr. Scopoliae
— Cascarae sagradae fluidum 4. 96. 17.
7, 279, 283.
— Condurango fluidum 4. 275, 279.
— Cubebærum 222.
— Filicis maris 329, 332, 333.
— Gentianæ scabrae 275, 270.
— Hamamelidis fluidum 362.
— Hydrastis fluidum 265.
Hyoseyami 114.

- Opii 104,
- Phytolaccae 215, 217.
- Radicis Gentianae 20, 32, 296, 301.
- Radicis Liquiritiae 32, 54, 314.
- Scopoliae (Extractum Belladonnae)
3, 10, 21, 24, 32, 41, 42, 71, 85, 109,
114, 122, 181, 185, 225,
- Secalis cornuti 4, 50, 157, 263, 36 ,
279.
- Strychni 274, 282, 287, 291.

H

- Faglum 21, 26, 28, 86, 109, 113, 185, 252,
256,
- Fatosin 79.
- Fenchel-Praeparate 277.
- Ferrum carbonicum sacchatum 297, 299,
300.
- Ferrum citricum oxydatum 297.

- lacticum 297.
- oxydatum 306.
- — saccharatum solubum 297, 299.
- pulveratum 29f.
- reductum 296, 300, 305.
- subcarbonicum 297.
- sulfuricum 297.
- Filmaroneel 229, 335.
- Flores Chamomillae 221.
- Cinae 329.
- Folia Digitalis 46, 206.
- — pulveratum 43, 52, 54.
- Sennae 177.
- Frictiones mucosus 393.
- Fructus Juniperi 219.

G

- Gargarisma (Gurgelwasser) 97.
- Gastelin 274.

Geburtin 265.
Gelatin 267.
Gelatina alba 270.
Gelatin sterilisatae Merck 271.
Glycerinum 83, 92, 94, 150, 157, 184, 193,
254, 343, 346, 383, 394, 384,
352.
Gomaöl 383.
Gonorol 223.
Gonosalpin 223,
Gonosan 223.
Guajacol 357.
Guajacolum carbonicum s. Duotalum.
Gummi arabicum (Gum Arabic) 88, 187,
255.
—— — pulveratum 20, 27.
—— Tragacantha 381,
Guttæ pro usum externum 391.
Gutti 177.

Gynækologisches Mittel 367.

III

Haemostyptica 259.

Harn-Antiseptica 291.

Helmitolum 215, 224.

Heroïnum hydrochloricum 21, 71, 75, 85,
108, 109, 251,

Hetralin 224.

Hexal 224.

Hydrargyrum chloratum s. Calomelas.

— bichloratum 158, 316, 317, 376.

— colloïdale 316.

— iodatum flavum 281.

— oxycyanatum 314.

— salicylicum 313. 317.

— proxydatum 394.

Hypnotin 135.

Hyrgolum 316.

II

Ichthyolum 89, 374, 392, 397, 398, 399.

Ichthyol-Alkohol 392.

Ichthyol-Collangolum 398.

Ichthyol-Glycerin 372, 390.

Imamicol 158, 318.

Infusum Flores Chamomillae 331.

— — Sambuci 230,

— Foliorum Digitalis 48, 82, 213, 196°

— — Sennae 332, 334.

— — Urae Ursi 23, 216, 219, 220.

— Fructus Juniperi 219.

— Radicis Ipecacuanhae 73, 77, 169,

10°

— — Polygalae 72,

— Rhizom Rhei 122, 182, 194, 282.

— Radicis Senegae 70, 73.

— Rhizom Velerianae 121, 123.

Infusum Seclis cornuti 261.

Inhalans 91.

Injektionsmittel (Injectiones) 152.

Ipecacuanha-Praeparate 325.

Istizin 177. 197.

J

Jod-Blutan 302.

Jod-Ferratoſe 297.

Jodoformium 357, 368, 373, 390, 397, 399,
9,

Jodeform-Collodium 392.

Jodoformium et Acidum boricum 376.

Jod-Praeparate 218, 289, 304.

Jodum 294, 395

K

Kalium aceticum 206.

— bitartaricum (Tartarus depuratus) (

Cremor Taatari) 6, 49, 176, 180, 182,

183, 191, 191,
— bromatum 10, 24, 30, 41, 57, 72, 75,
93, 95, 118, 120, 121, 131, 132, 193, 1
80, 225, 241, 280, 284,
— causticum 377.
— chloratum (KCl) 156.
— chloricum (KClO₃) 93, 98.
— jodatum 121, 115, 240, 284, 306,
322, 326,
— nitricum 49, 214, 213, 116, 32
4,
— permanganicum 356, 402.
Kalksalze 268.
Kamala 328, 335, 336,
Knoblauch-Decoct 331, 341.
Kochsalz s, Natrium chloratum
Kreosotum 83, 149, 150, 276, 301.
— carbonicum (Kreosotalum) 88.
Kuhmilch 350, 351,

IL

- Lactostase 292, 293.
Lanolinum 316,
Laxatol 178, 198, 202.
Laroson-Milch 309.
Lassar's Pasta 379.
Lebertran 307, 308, 341.
Legumon 309.
Limonade 6,
Linimentum 381.
Liquor Ammonii acetici 230.
—— Buronii 377.
—— Ferri albuminati 297.
—— Ferro-Mangani Peptonati (Blutan) 2
97, 302.
—— Hoffmanni 165.
—— Kalii acetici 108, 183, 206, 209, 21
3, 214, 216, 225.
—— Kalii arsenicosi (Kowleri) 302, 304,

307.

Lokalanæsthetica 142.

Lobelin 160.

Lotiones ophthalmicus 366.

— urethrales 401.

— vesic, urin 355.

Luestin 158, 318.

Luminalum 135.

Lysolum 269, 376.

M

Magnesia usta 85, 114, 123, 135, 176, 18
4,

Magnesium carbonicum 176, 186, 275.

— sulfuricum 176, 179, 181, 216,

Malzextrakt 308.

Manna 186°

Menthol-Olivenoel 330, 394.

Mentholum 239, 282, 394,

Mercurius oxydatus flavus 107. (VasMercurium
Methylenblau 37.)

364.

Milchsäure-Limonade 256.

Mineralsäure 216.

Morphin-Præparate 218.

Morphinum hydrochloricum (Morphinum
nuriaticum) 100, 102, 103, 277.

Mucilago Amyli 35, 257.

— Gummi Arobici 254, 255.

— Salep 257.

N

Naphthalinum 330, 340, 341.

Narcotica 137, Narcopon 115.

Natrio-Kalium tartaricum 186.

Natrium bicarbonicum 8, 9, 24, 26, 30, 3

8, 49, 49, 71, 92, 94, 92, 193, 194, 19

5, 224, 226, 238, 242, 246, 246, 274, 2

31, 283, 291, 326, 347, 395.
Natrium bromalum 118, 120, 131,
— carbonicum 11, 157, 275.
— chloratum 98, 156, 255, 270, 270,
317, 347, 350, 351, 352, 358,
— jodatum 326.
— phosphoricum 122,
— salicylicum 38, 220, 226, 231.
— sulfuricum 176, 185,
Nestle-Kindermehl 302.
Neulen 114, 155, Neosalvarsan 220, 326,
Neuronal 135.
Neu-urotoropin 215.
Novocain 147, 157. Navasnirol 319.
Nutrose 309.



Oleum Cacao 104, 396,
— camphoratum 48, 61.

- Chenopodii (Nematol) 329, 330, 338.
- Crotnis 177. 190.
- Lavandulae 95.
- Menthae 11.
- Olivarum 317, 344, 357, 383, 386.
- — (desinfiziert) 357.
- — et Zincum oxydatum 392.
- Riini 176, 187, 188, 189, 190.
- Santali 222.
- Terebinthinae 95.
- — rectificatum 79, 93.
- Ophthalmica 353.
- Opium 397.
- et Scopolia 397.
- Opopirin 5, 19, 44.
- Orexin 276.
- Orexinum tannicum 276, 292.
- Oryzanin 163, 325.
- Oxyfal 376. Ovaltin 309.

IP

- Pangital 4, 47, 56, 155, 206.
Pankreatin 248.
Pankreon 276.
Panloid 115.
Pantopon, "Roche" 107, 155.
Pantopon-Scopoiamic,, Roche 155.
Papaïnum 277.
Papayotinum 276.
Paraffinum liquidum 317.
Pelletierinum tannicum 329.
Pepsinum 3, 276, 278, 287, 288, 303.
—— saccharatum 3, 50, 60, 80, 278, 238,
293.
Peptonum 268, 352.
Perhydrol 376.
Perxyl 376.
Phenactinum 19, 22, 29, 43, 208, 209, 2

- Phenolphthalein (Purgen) 178, 198.
Physiologische Kochsalz'ösung 156.
Picea Liquidae 380.
Pick's Liniment 381
Pick's Pflaster 387.
Pikrinsäure-Alkohol 388.
Pilulae Aloes et Jalapae 197.
Pilulae asiaticae 310.
—— Kreosoti 83.
Pilocarpinum 277.
—— hydrochloricum 229, 230.
Piper nigrum 310.
Pituitrin 65, 265, 267.
Pitylol 384.
Pneuminum 89.
Protargolum 356, 361, 394, 399, 401.
Ptyalin 276.
Plumbum aceticum (Bleizucker) 253, 260,

366, 377.

- oxydatum 335.
- Pulvis adspersorii 389.
- aërophorus 238.
- aromaticus 41, 42, 276.
- cinnamomi 191.
- corticis Radicis Granati 335.
- crinalis 389.
- Doveri 43, 78, 79, 112, 232, 235, 247, 248.
- et Succus Liquiritiae 230, 234.
- Foliorum sennae 197, 199, 200.
- Gummi Arabici 309.
- Magnesia cum Rheo (Pulvis infantum) 195.
- Myristicae 37.
- Opii 110, 217, 215, 248, 251, 254, 286, 260, 252.
- Radicis Colombo 248, 252.

- Rhizom Filicis maris 334.
- Radicis Gentianae 26, 32, 42, 53, 1
14, 251, 281, 296, 301, 305.
- — — scabrae 275.
- — — Ipecacuanhae 77, 169, 170.
- Tuberae Jalapae 53, 190, 193.
- Radicis Liquiritiae 32, 54, 83, 360,
264, 301, 307, 313, 334.
- Rhizom Rhei 182, 193.
- saponatus medicatus 386.
- Tamarindo 336.
- Purinderivate 205.
- Pyramidonum 18, 22, 25, 60, 85,

R

- Radix Ipecacuanhae 168.
- Liquiritiae 310.
- Rhizoma Rhei 177.
- Reisbrei 350.

Reismehl 382.

Remijinum hydrochloricum 19.

Resina Jalapa 176.

Resina Podophylli 177.

Resorcinum 4, 195, 279, 282, 283, 287, 2
91, 294, 356.

Roborantia 295.

S

Sobromin 125.

Saccharinum 268.

Saccharum album 43, 83, 182, 199.

Safran 105.

Sal Carolinum factitium 176, 181.

Sal Seignetti 176.

Salipyrinum 18, 19,

Salolum 22, 30, 225, 226, 252, 256, 282.

Salosantalum 223.

Salvarsan 319.

Sana'ogen 209.
Santalum 222.
Santoninum 191, 329, 337.
Santyl 223,
Sapo jalapinus 197.
—— kalinus 344.
—— medicatus 344.
Saturationes 8.
Sauveran 329.
Scheichsche Lösung (No. 11) 148.
Schwefel-praeparte 178, 198.
Scopolaminum hydrobromicum 125.
Secacornin 268, 272.
Sedativa
Seifenlösung 344,
Selterswasser 8, 55, 121, 238, 325, 347.
Senega-Praeparate 75, 325.
Serum 159, 268, 270.
Sirolin 89.

- Sinomenium hydrochloricum 115.
- Sirupus Althaeae 76.
- Aurantii Corticis 88, 133, 134, 182,
187, 189, 196, 213, 261, 291, 308, 325.
- Ferri iodati 297, 299.
- Ipecacuanhae 37, 51, 72, 78.
- Mannae 186.
- Rubi Ideae 5, 280.
- Senegae 77, 78, 81.
- Simplex 283.
- Zingiberis 287.
- Solutio Adrenalini hydrochlorici 48, 154
266,
- Solutio Lugoli 294, 395.
- Soxhlets Nährzucker 309.
- Sparteinum sulfuricum 47.
- Spiritus aetherceus 165.
- Aetheris nitrosi 10, 162, 165.
- Ammoniae foeniculatus 50, 71, 73,

75.
— camphoratus (S.¹ spiritus Camphoræ)
375. 391.
— dilutus 239.
Stagnin 268.
Starkemehl 351, 352.
Stärkebrei 353.
Stibium sulfuratum aurantiacum 53. 77.
79, 172.
Stomachica 273.
Stovainum hydrochloricum 148.
Styptol 265.
Sublimat-Bad 318.
Sulfonalum 134.
Sulfur depuratum 182, 197, 199, 200, 201
— præcipitatum 183.
— sublimatum 380, 382, 383.
Suppositoria 396.
Suppositoria glycerini 345.

T

- Talcum 384, 390.
Tannalbinum 43, 248, 251, 252, 282,
Tanninhaltiges Mittel 289, 252.
Tanninlösung 341.
Tanninsäure-Kochsalzlosung 347.
Tannoform 236.
Tanvarsan 320.
Tartarus depuratus β . Kalium bitaricum
— stibiatus 169, 170,
Temperantia 1,
Terpinum hydratum 79, 205, 212,
Tetrodotoxin 115,
Theerschwefelzinkpasta "Dohi" 380,
Theobrominum 205,
Theocinum (Theophyllin) 205,
Theophyllinum natrio-aceticum 212,
Thiocolum 89, 282, Thiotargan 402,

- Thymolum 330, 339.
- Tinctura amara 275, 278, 283, 288, 290.
- aromatica 263, 276, 279, 286.
- 160, 163, 173, 174, 234, 248, 250, 256,
- Asae foetidae 125,
- Aurantii Corticis 4, 7, 11, 40, 50,
- 67, 162, 181, 183, 215, 260, 263, 279,
- 284.
- Camphorae 391,
- Catechu 257,
- Chinae 162, 275, 278, 285, 289.
- Cinnamomi 4, 10, 41, 111, 187, 263,
- 279,
- Colchici 224
- Digitalis 6, 10, 47, 55, 57, 206,
- Eucalypti 95,
- Ferri Pomati 297, 305, 306,
- Gallorum 256,
- Gentianae 122, 123, 290,

- — Scabrae 275,
- Ipecacuanhae 79, 172,
- Jodi 150, 213, 214, 328, 331, 347,
- — et Camphorae 376, 372,
- Lobeliae 126,
- Myrrhae 99,
- Opii 63, 72, 76, 94, 11, 133, 246, 247, 225, 257, 262, 279,
- Ratanhiae 99, 257,
- Rhei 181, 196, 280, 284, 289, 291,
- — aquosa 194,
- Scillae 47, 50, 55,
- Scopoliae 3, 10, 41, 71, 75, 114, 122, 124, 182, 278, 284, 291,
- Strophanthi 3, 7, 47, 43, 52, 56, 60, 122, 180, 183, 206, 209, 215, 279, 284, 325,
- Strychni (Tinctura Vomicae) 4, 111, 165, 180, 181, 214, 225, 275, 279, 284,

290, 325,
—— Valerianae 24, 57, 111, 120, 124, 2
25, 263,
—— Zingiberis 289,
Tobacco-Decoct 341,
Traubenzuckerlösung 352,
Trionalum 135,
Tropacocainum hydrochloricum 147,
Tropan 309, Tubera Jalapae 176,

U

Unguenta (Salbenmittel) 379,
Unguentum acidi borici 383,
—— — carbolicum 384,
—— Dermatoli 385,
—— Hydrargyri album 385,
—— — cinereum 315, 330, 385,
—— — flavum 385,
—— — rubrum 385,

— Ichthyoli 384,
— — et Scopoliae 385,
— Jodoformii 385,
— Scopoliae 384,
— simplex 383,
— Wilsonii 384,
— Zinci oxydati 383, Urea 215,
Urethral-Suppositoria 399,
Urotropinum 215, 223, 225,
Urodonal 227,

V

Valeriana officinalis 124,
Validolum 124,
Vaselinum 364, 380, 386,
Veronalum (Acidum diaethylbarbituricum)
134,
Veronal-Natrium 135,
Vinum Ipecacuanhae 172,

- — Japponicum 165,
— — Stibiatum 172,
— — Rubrum 3, 40, 50, 162, 217, 279, 2
89, 304, 351,
Vaginalkugel (Vaginal-Suppositoria) 389,

W

- Wasserstoffsperoxyd 394,
Weizenmehl 301,

Y

- Yoghurt 309,
Yohinbinum hydrochloricum 156,

Z

- Zincum chloratum (Chlorzink) 395,
— oxydatum 381, 382, 383, 384,
— — et Amylum 389,
— —, Talcum et Amylum 389,

— sulfuricum 93, 172, 356, 358, 399,
402,
— Valerian cum 124,
Zuckerwasser 247,

新撰處方勘誤表

頁數	行數	誤	正
3	10	Extrac Tum	Extractum
6	10	15—50	1.5—5.0
18	13	普通解藥	普通解熱藥
20	6	arabicipulv)	arabici pulv.)
64	4	作強心藥用,時對於	作強心藥用時,對於
68	9	便喀痰溶解稀釋,	使喀痰溶解稀釋,
74	9	咳痰,粘稠,	咳痰粘稠,
82	3	(Kre0iot)	(Kreosot)
84	4	nachdermahlzeit	nach der mahlzeit
93	8	Terehinthiae	Terebinthiae
95	3	C.○五至一一二%	C.○.五%——%一二%
98	14	(可作輕度	(可用輕度
99	4	Penma Ganicum	Penmanganicum
104	8	(膀胱加答疼痛時兒用)	(膀胱加答兒疼痛時用)
108	12	坡嗎小配合,	坡嗎啡配合,
112	8	發汗等均可使用。	發汗等用之。
144	15-16	亞硝酸阿邁耳	□亞硝酸阿邁耳
153	7	□酒精	酒精
154	7	阿忒羅品加嗎啡水 蟻麻疹	阿忒羅品嗎啡水 毒麻疹

156	4	△一至%鹽酸	△一%鹽酸
163	1-2	(eventuel- lin Limonade)	(eventuell in Limonade)
163	15-16	Inj- ektium einmali-2	Inj- ektion; einmal 1-2
165	1	%	○%
168	11	1/00乃至3/00筒)	1/10乃至3/10筒)
181	9	痢尿	利尿
184	4	油水	溜水
184	19	magnisiae	magnisiae ustae
195	18	No. III. S.S.Taghch	No. III. S. Taglich
207	11	排際毒物	排除毒物
212	10	水腫)一回○二至○.五。	水腫(一回○.二至○.五
226	3-4	薩羅耳Salol 乳糖S.lact	薩羅耳Salol 1.5-3.0 乳糖S.lact 1.5
227	9	有清之味,	有清涼之味,
227	10	用於一,	用於一,
238	2	0.0.5	0.05
238	3	10.5	10.0
239	11	Ailuti	diluti
239	13-14	umge rahrt	umge- rahrt
241	3	皮願注射	皮下注射

264	14	△一面量	△一回量
264	18	一日數回每。回	一日數回。每回
300	12	Phosporicae	Phosphoricae
328	4	十二指脂蟲	十二指腸蟲
331	12	以治毒蟲，	以治蟻蟲，
364	14	(眼用點)	(點眼用)
366	2	硼眼凡士林	硼酸凡士林
366	14-15	(Plum bum	(plum- bum
367	7	⊙腔先滌液	腔洗滌液
370	19	(Liquor Ferri sepsuichlorati	(Liquor Ferri sesquichlorati



POLYTAMIN

強滋補
壯養血

保利他民

包裝

二五〇〇瓦

保利他民之主成分、為經過人工消化之動物性蛋白質、即所謂蛋白質之精華阿米諾酸（亦譯稱基酸 Amino Acid）、服用以後、得無勞胃腸之重行消化、而即能製造新鮮血液、增進食慾營養、故雖病弱之體、亦可應用。又因兼能鼓勵全身精力、補助自然治癒、其於消耗旺盛之結核性疾患、尤為兼有治療作用之合理的滋養劑也。

〔主治〕 肺結核 貧血 病後恢復期 虛弱兒童 神經衰弱 產前產後 精力萎靡 消化器病

日本大阪市東區道修町

武田長兵衛商店有限公司

7.6.1930

30-537(N)

腸胃疾患之吸著療法劑

阿爾細林

(武田牌)

本劑爲銀炭末一分及鹽化銀硅酸四分配合而成。服用以後、在腸內不僅能吸著有害細菌及有機性毒物、且可制止菌之繁殖、亦有殺菌作用、故不拘腸加答兒及各種細菌性之下痢、均可達到根本治療目的。又本劑乃由特殊方法調製而成、其於消化上之必要酵素、幾可不致吸收、故同時且有無礙消化之便也。

〔主治〕 各種下痢 腸內異常發酵 急性慢性腸炎 胃潰瘍

〔種類〕 顆粒狀劑 五〇瓦 三五〇瓦 五〇〇瓦

糖衣片劑 二〇片 五〇片 一〇〇片

日本大阪市東區道修町 武田長兵衛商店總發行公司

ALSILIN

祛痰鎮咳劑

發多聲

本劑係醫學博士田口氏自東洋特產之臭漢藥草 *Araliaceae* 屬植物中新發見之祛痰鎮咳特效藥也。證之以化學的並藥物學的實驗、確證其為祛痰鎮咳藥中之最合理的藥品、並且本劑用量極小、絕無副作用、毫不呈不快之臭味、故婦人、老人、小兒等均易服用之、或作散劑、或作水劑用皆可、誠學理上實際上的理想的祛痰鎮咳藥也。

總發售處 日本大阪 益野義商店
銷售處 上海 重松大藥房

白帶病特效藥

安期福祿渦赫

本品以人工的方法、培養乳酸菌於體內、依其發生乳酸菌之力、以治療白帶病、實為空前之聖藥也。

因月經的疾患及全身的疾患（例如老年性瘰癧、腦神經疾患、內分泌機能障礙、熱性病等）所現之白帶及作為體內之生理的消毒劑等、奏神效。

總發售處 日本大阪 鹽野義商店
銷售處 上海 重松大藥房

EURO

皮膚病

特效新藥 汚癒露

本品乃克利沙羅賓 (Chrysarobin) 之改良
新製劑、具其特有之効能、毫無其可惡之
副作用、不刺蝕皮膚、不汚染衣服、價格
低廉、是其美點、舉凡一切之皮膚病、用
之無不立見特效而治癒。

裝包

拾瓦 一筒裝。
五十瓦 一筒裝。

總發行所 大野 鋪上 松重
發售處 大野 鋪上 松重
總發行所 大野 鋪上 松重
發售處 大野 鋪上 松重
總發行所 大野 鋪上 松重
發售處 大野 鋪上 松重

PARANUTRIN

VITAMIN-B

脚氣 治療特效新藥

巴拉努妥林

本品係維他命B之製劑、脚氣病的特效藥、
 無論大人小兒之各種脚氣症、用之無不治癒、
 亦為營養不良、食慾缺損之無上的良藥也。

製劑分 注射·液劑·粉末·片劑四種。

大坂市道修町

總發售處 塩野義商店
 銷售處 重松大藥房 上海



新整正腸止瀉劑 改兒便敵

本品乃酵母蛋白體與單寧酸之結合物、殆無味無臭須褐色之粉末也、本劑於胃中殆不呈變化、至腸中則其阿爾加里性而漸次分解、於茲則依單寧酸之收斂性與酵母成分之整腸作用、而發揮其優美之協同的治療效果者也。

總發售處 日本大阪 滋野 義商店
 銷售處 上海 重松 大藥房

GERBAMIN

BIOGENIN

最新理想的整腸劑

病根寧

本劑乃含有由純粹培養而得的一種之乳酸菌與蛋白消化菌，以待獨的方法，無菌的操作而製成之理想的整腸劑，對於腸內有害細菌，維持抗作用與消化蛋白作用者也。

粉末・片劑

批發售處 日本大阪 野義商店
銷售處上 海 重松大藥房

模範的強心藥

地 芝 他 民

製劑分注射用・內服液・粉末三種。
 注射用者乃以生理食鹽水溶解之
 最進步的新改良品也

本品乃將地芝他利斯藥中之總有效成分抽
 出製成之強心劑，每次必經動物試驗，待其
 効力一定後而始發售者也，故其効力準確，
 且無其他一切之副作用，是為本劑之特長，
 他家同種製劑無可與匹者。

大坂市道修町
 總發售處 盛野義商店
 銷售處
 重松大藥房
 上海

DIGITAMIN

MAGROL

嗎啡中毒

癮癩新治療劑

本品乃係硫酸鎂溶液、施嚴密滅菌法之注射劑也、對於
嗎啡中毒（戒癮）、子癇、妊娠浮腫、破傷風、痙攣等用
之奏靈効。

總發售處 日本大阪 塩野義商店
銷售處 上海 重松大藥房

嗎癩樂兒

POMPHOLIN

汗疱特效劑 瘡膚靈

本劑乃汗疱之根治劑，而其組成係以柳磺酸化合物為主之酒精性溶液也。富於滲透性，殺菌力極強，確能使頑固的汗疱根治，並不污染衣服，是為本劑之特長。

二〇〇五〇〇〇
五百〇〇 各一瓶裝

總發售處 日本大阪 道野義商店
銷售處 上海 重慶 松大藥房

EXIHOS

消炎退腫止痛特效藥

(新巴布劑)

碍疴好好司

本劑乃由純良高林 (Aspirin) 土·無水甘油·硼酸·薄荷油·冬青油等諸成分配合而成之最新無害巴布劑也。對於一切急性及亞急性炎症用之無不立癒

無錫分店 鹽野義商店
總發行所 上海 重松大藥房



催眠鎮靜劑 索睦那兒

本品乃有 **Meobrium**
Isovaleryani 尿素集成。
 白色無味無臭之結晶粉末
 也。作為催眠藥用時，一
 切之不眠症，均宜用之。
 作為鎮靜藥用時，神經衰
 弱、**Hysteria**、恐慌症、
 癩癩、干癩、舞踏病、夜
 間咳嗽發作、夜驚症、妊
 娠吐瀉、頭痛、頭暈、船
 暈等，均實用之。

種二期片 • 末粉

店商義野並 阪大木日 處售發總
 房藥大松重 館上 經售商

SOMNAL

CHINISOL

熱性疾患

靜脈注射新藥

希宜佐爾

本品乃鹽酸規尼涅 (Quinine) 2% 溶液、完全滅菌的靜脈注射藥也、對於瘧疾、流行性感冒、肺炎、結核熱、及他一般熱性病、較之內服、奏效迅速的確、又可免受其難堪之苦味、醫家甚愛用之

大坂市淺草町

總發售處 鹽野藥房
總發售處 重松大藥房

痔疾特效新藥

咯維道爾

本品乃類赤色之坐藥及軟膏也，含有主藥偽沃度、蒼鉛、鹽化銣 Perubalsam, Kawakawa 樹脂等。一般痔疾，特於痔核、痔出血、諸種之脫肛、肛門裂瘡、肛門周圍炎、其他直腸粘膜炎及肛門諸疾患等，均適用之。

總發售處 日本大阪 塩野義商店
銷售處 上海 重松大藥房

KAVIDOL



SOSYOL

疥癬特效新藥

掃洗汚兒

本品藥效迅速，輕者塗藥一回，二十四小時以內，即可全治，以本藥治療後，永不再發，殺虫力極強，塗藥後立去瘙癢及他不快感，並不汚染肉皮及衣服，且本藥對於疥癬以外之皮膚病例如汗癩、除菌、疥癬等，均奏確效。

包裝 二十五cc、百cc、五百cc各一瓶裝。

町株道市阪大

店商義野塩 處售發總

房藥大松重 處售銷

SINOMENINE
HYDROCHLORIDE

僂麻質斯·神經痛特效藥

鹽酸高挪美仁

本品乃現今中外馳名、有口皆碑之特效劑、對
於各種急慢性僂麻質斯·神經痛·肩痺·腰痛
等、百發百中、一經使用、咸驚其神、誠空前
的靈藥也。

製劑分 注射·片劑·粉末三種

店商義野塩 處售發總
房藥大松重 海上 處售銷

肺結核、肋(膈)膜炎注射藥

百克安兒

本品即沃度、Chininum 柳楊酸鈣等之無菌的注射液也。且爲無臭殆澄明之中性溶液。對於肺結核、肋膜炎、腹膜炎、急性癩麻質斯、鎂及柳楊酸之適應症等均奏神効。

二〇cc 六管 一瓿裝

總發售處 日本大阪 野義商店
銷售處 上海 重松大藥房

PECTOL

新緩下劑

兒叟沙克拉

本品之特長

- 一、用極少分量，即可奏效，無味無臭，雖婦人小兒，均易服用。
- 二、服用後毫無副作用，疝痛、瀉急後重等，決不發生。
- 三、反復服用，不成習慣，雖可漸次減量，尤為他品所不及。
- 四、即於過敏性病人，亦可使其無痛下便。
- 五、藥性溫和，服用後數小時，即可排出軟便。

製劑分片劑・粉末兩種。

大坂市道徳町

總發售處 株式會社 堀野義商店

銷唐處 上海 重松大藥房

LAXATOL

PANSEPTIN

淋疾

靜脈注射特效藥

滂濁噴清

本劑對於組織之滲透性特別強大、即其藥力乃係深達性無微不至、便可直搗淋菌之巢穴而清肅之、是之本劑之特長、兼係靜脈注射、見効尤速、絕非向來之姑息與頓挫療法所同日而語、無副作用毫無刺戟、價格低廉、尤其餘事、洵爲淋菌之勁敵、花柳界之福音劑也。

一〇cc 五管一匣
五cc 五管一匣

總發售處 日本大阪 野義商店
銷售處上 海重松大藥房

