


傷寒總病論 附札記

一





論 痘 總 寒 傷
記 札 附

(一)

撰 時 安 龐

啓久不爲問思企日深過辱存記遠枉書教具聞起居佳勝感慰兼集惠示傷寒論真得古聖賢救人之意豈獨爲傳世不朽之資蓋已義貫幽明矣謹當爲作題首一篇寄去方苦多事故未能便付去人然亦不久作也老倦甚矣秋初決當求去未知何日會見臨書惄惄惟万万以時自愛不宣再拜安常處士閣下

五月廿八日

又白

人生浮脆何者爲可恃如君能著書傳後有幾念此便當爲作數百字仍欲送杭州開板也知之知之

目錄

(以前原缺一葉半)

結胸證
大陷胸湯
小陷胸湯

大陷胸丸
三物白散方

心下痞證
半夏瀉心湯
生薑瀉心湯

大黃黃連瀉心湯
甘草瀉心湯

加附子瀉心湯

陽毒證
升麻湯

陰毒證
甘草湯
硫黃丸

反陰丹
附子飲子

狐惑證
赤小豆當歸散

百合證
百合知母湯

滑石代赭湯
百合湯
桔梗牡蠣散
百合雞子湯

瘡濕等證

瘡證
葛根麻黃湯

杏人薏苡湯
甘草附子湯

濕證
黃耆湯
桂枝附子湯

杏人薏苡湯
甘草附子湯

渴證
瓜蒂湯

小橘皮湯

發汗吐下後雜病證

暑病表證代葛根證

葛根麻黃證

大青消毒湯

代青龍證
葛粉散

素問載五種暑病無方

時行寒疫論

時行寒疫治法趙泉黃膏

雞子湯

麻黃葛根湯

蘆薈湯

葛根解肌湯

白薇散

烏頭赤散

班豆方論

溫病發班治法小兒證附

地黃膏

黃連

五香湯

葛金散

麻黃甘草湯

紫草湯

油飲子

梔子薤豉湯

黃牛麻黃湯

漏蘆湯

水解散

鱉甲湯

紅花湯

甘草湯

桔巴出定方

香豉石膏湯

槿皮飲子

葛根石膏湯

紅花澤飲子

甘草乾薑湯

犀角升麻湯

三豆飲子

崔文行解散

葛根湯

聖散子方并序

蘆薈湯

梔子散

第五卷

天行溫病論

辟溫疫方論屠蘇酒

四海神名

附子散

除疫術

研雄黃并嚏法

傷寒總病論 目錄

青筋牽證 柴胡地黃湯

石膏竹葉湯

赤脈攢證 石膏地黃湯

黃肉隨證 炙法附

玄參寒水石湯

白氣狸證 石膏杏人湯

石膏蕊白湯

黑骨溫證 炙法附

苦參石膏湯

知母解肌湯

溫病噦方論 茅根葛根湯

桔梗茅根湯

茅根橘皮湯

黃病證 髮煎
消石礬石散

瓜下散

傷寒感異氣成溫病壞後及瘧證 知母石膏湯

白虎加桂枝湯

石膏甘草散

敗壞別行方 附子鱉甲湯

木通桂枝湯
鱉甲犀角湯

鱉甲恒山湯

小兒傷寒證 葛根芍藥湯

風引加附子湯
蕩涎散

射干湯

阿膠方 伏龍肝散

黃耆人參湯

玄精石湯
朴消散

犀角五香湯

第六卷

傷寒雜方 時雨散

麻黃杏子湯

玄精石湯

瓜蒂牙消散

妊娠雜方

伏龍肝散

吞雞子法

阿膠散

陳皮枳實湯

鹿角屑湯
地黃生薑飲子

益母草飲子

大黃桃人湯

石膏桔梗湯

魚腥草

勞宮

曲池

手少陰

大杼

中院

肺俞

期門

傷寒暑病通用刺法

期門 開元

列缺 太淵

太白 復溜

商陽 天柱

涌泉 狹谿

丘墟 陷谷

大杼 手少陰

中院 大杼

肺俞 期門

開元 列缺

太淵 太白

復溜 商陽

天柱 涌泉

大杼 丘墟

手少陰 陷谷

大杼 丘墟

中院 大杼

肺俞 期門

開元 列缺

太淵 太白

復溜 商陽

天柱 涌泉

大杼 丘墟

手少陰 陷谷

大杼 丘墟

中院 大杼

肺俞 期門

傷寒死生候
傷寒死生候
熱病死生候
溫病死生候

天行差後禁忌

解仲景脈說半夏桂枝甘草湯

解華佗內外實說

辨論

與有位辨傷寒論書

惣論音訓

脩治藥法

傷寒總病論卷一

宋 軒水龐安時撰

敍 論

凡言龐曰。其下有
論注。皆安時言。

太陽證

陽明證

少陽證

太陰證

少陰證

厥陰證

兩感證

三陰三陽傳病證

敍論

龐曰。素問云。冬三月是謂閉藏。水冰也。地裂也。無擾乎陽。又云。彼春之暖爲夏之暑。彼秋之忿爲冬之怒。是以嚴寒冬令爲殺厲之氣也。故君子善知攝生。當嚴寒之時。周密居室而不犯寒毒。其有奔馳荷重勞房之人。皆辛苦之徒也。當陽氣閉藏。反擾動之令鬱發腠理。津液強瀆。爲寒所搏。膚湊反密。寒毒與榮衛相渾。當是之時。勇者氣行則已。怯者則著而成病矣。其卽時成病者。頭痛身疼。肌膚熱而惡寒。名曰傷寒。其不卽時成病。則寒毒藏於肌膚之間。至春夏陽氣發生。則寒毒與陽氣相搏於榮衛之間。其患與冬時卽

病候無異。因春溫氣而變。名曰溫病也。因夏暑氣而變。名曰熱病也。因八節虛風而變。名曰中風也。因暑濕而變。名曰濕病也。因氣運風熱相搏而變。名曰風溫也。其病本因冬時中寒。隨時有變病之形態爾。故大醫通謂之傷寒焉。其暑病濕溫風溫死生不同。形狀各異。治別有法。

龐曰。天寒之所折。則折陽氣。足太陽爲諸陽主氣。其經夾脊督。貫五臟六府之臍。上入腦。故始則太陽受病也。以其經貫五臟六府之臍。故病有臟府傳變之候。以其陽經先受病。故次第傳入陰經。以陽主生。故足太陽水傳足陽明土。土傳足少陽木。爲微邪。以陰主殺。故木傳足太陰土。土傳足少陰水。水傳足厥陰木。至第六七日。當傳足厥陰肝木。必移氣克於脾土。脾再受賊邪。則五臟六府皆危殆矣。榮衛不通耳聾。囊縮不知人。則死。速用承氣湯下之。方在可下 證中。則可保五死一生。勿從容拯溺。令病人水漿不入。湯液不下。無可柰何也。素問云。脾熱病則五臟危。又云。土敗木賊則死。若第六七日傳厥陰脈。得微緩微浮。其證寒熱似瘧。此爲必愈。宜桂枝麻黃各半湯和之。方在可汗 證中。微緩微浮爲脾胃脈也。故知脾氣全不再受克。邪無所容。否極泰來。榮衛將復。水升火降。則寒熱作而大汗解矣。人將大汗必冒昧者。若久旱天將時雨。六合皆至昏昧。雨降之後。草木皆蘇。庶物明淨。玉冊所謂換陽之吉證也。

王叔和云。土地溫涼高下不同。物性剛柔。餐居亦異。是以黃帝興四方之間。岐伯立四治之能。以訓後賢。開其未悟。臨病之工。宜兩審之。

龐曰叔和非醫之圓機孰能臻此也如桂枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗自江淮間地偏暖處唯冬及春可行之自春末及夏至以前桂枝麻黃青龍內宜黃芩也自夏至以後桂枝內故須隨證增知母大青石膏升麻輩取汗也若時行寒疫及病人素虛寒者正用古方不在加減矣夏至以後雖宜白虎詳白虎湯自非新中暎而變暑病乃汗後解表藥耳一白虎未能駈逐表邪故也或有冬及始春寒甚之時人患斯疾因汗下偶變狂躁不解須當作內熱治之不拘於時令也南方無霜雪之地不因寒氣中人地氣不藏蟲類泄毒嵐瘴間作不在此法治別有方也又一州之內有山居者爲居積陰之所盛夏冰雪其氣寒腠理閉難傷於邪其人壽其有病者多中風中寒之疾也有平居者爲居積陽之所嚴冬生草其氣溫腠理疎易傷於邪其人夭其有病者多中濕中暑之疾也凡人稟氣各有盛衰宿病各有寒熱因傷寒蒸起宿疾更不在感異氣而變者假令素有寒者多變陽虛陰盛之疾或變陰毒也素有熱者多變陽盛陰虛之疾或變陽毒也

龐曰四時之中有寒暑燥濕風火相搏喜變諸疾須預察之其飲食五味禽魚蟲菜果實之屬性偏有嗜者或金石草木藥素嘗有餌者人五臟有大小高下堅脆端正偏傾六府亦有大小長短厚薄緩急令人終身長有一病者貴者後賤富者乍貧有常貴有常富有暴富有暴貧有暴樂有暴苦有始樂後苦有離絕蘊結憂恐喜怒者夫常貴後賤名曰脫營常富後貧名曰失精暴樂暴苦始樂後苦精竭體沮脫勢侯

王精神內傷情慕尊貴妄爲喪志始富後貧焦皮蠻筋常富惡勞驕墮精消離間親愛者魂遊絕所懷者意喪所慮者神勞結怨恨者志苦憂愁者閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者蕩憚而不收喜樂者擇散而不藏此皆非外邪所中而得之於內也良工必預審問其由先知臟府經絡受病之所可舉萬全工不思曉令五臟六府血氣離守迨至不救又何言哉

龐曰陰陽虛盛者非謂分尺寸也榮衛者表陽也腸胃者裏陰也寒毒爭於榮衛之中必發熱惡寒尺寸俱浮大內必不甚躁設有微煩其人飲食欲溫而惡冷謂陽虛陰盛也可汗之則愈若誤下則死也若寒毒相薄於榮衛之內而陽勝陰衰極陰變陽寒盛生熱熱氣盛而入裏熱毒居腸胃之中水液爲之乾涸燥糞結聚其人外不惡寒必蒸蒸發熱而躁甚則讞語其脈浮滑而數或洪實或汗後脈雖遲按之有力外證已不惡寒腹滿而喘此皆爲陽盛陰虛當下之則愈若誤汗則死也仲景載三等陽明是陽盛陰虛證矣調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒以此別之若陰獨盛而陽氣暴絕必四肢逆冷臍築湊痛身疼如被杖面青或吐或利脈細欲絕名曰陰毒也須急灸臍下服以辛熱之藥令陽氣復生濶然汗出而解若陽獨盛而陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛身班班如錦文或下利赤黃脈洪實或滑促名曰陽毒也宜用針泄熱服以苦酢之藥令陰氣復生濶然汗出而解也

龐曰夫邪逆陰陽之氣非汗不能全其天眞素問云辛甘發散爲陽謂桂枝甘草細辛薑棗附子之類能

復陽氣也。酸苦湧泄爲陰。謂苦參、大青、葶藶、苦酒、艾之類。能復陰氣也。酸苦之藥既折熱復陰。亦當小汗而後利者。經云。身汗得而後利。則實者可活是也。

華佗治法云。傷寒病起自風寒入於腠理。與精氣分爭。榮衛否隔。周行不通。病一日至二日。氣在孔竅皮膚之間。故病者頭痛惡寒。身熱。腰背強重。此邪氣在表。隨證發汗則愈。

龐曰。凡發汗須如常覆腰以上。厚衣覆腰以下。以腰足難取汗故也。半身無汗。病終不解。凡發汗後。病證仍存。於三日內可二三發汗。令腰脚周遍爲度。若病不解。便可下之。設令下後不解。表裏邪亦衰矣。足觀脈證調治。七日內可期正汗爲善也。發汗後不可再行汗者。始發熱惡寒。今不惡寒。但倍發熱而躁。始脈浮大。今洪實。或沈細數。始惺靜。今狂語。此胃實陽盛。再行汗藥卽死。須當下之。有人始得病變陽盛之證。須便下之。不可拘日子深淺次第也。病三日以上。氣浮上部。填塞胸心。故頭痛胸中滿。或多痰涎。當吐之。則愈。

龐曰。若虛損及新產人。不能吐者。可服枳實散。枳實細末。米飲調貳。日可三四服。若有虛寒。手足冷及脈微弱者。枳實貳兩加桂枝壹兩。同末之。如前服。

病五六日以上。氣結在臟府。故腹滿身重。骨節煩疼。當下則愈。若小便少。手足心并腋下不滋潤。尙未可攻之。當消息其候。不可亂投湯藥。虛其胃氣也。以上解華佗治法。

太陽證

尺寸俱浮者。太陽受病也。一二日發。以上連風府。故頭項痛而腰脊強。

此是太陽膀胱經屬水。
病源云小腸者非也。

太陽病發熱。汗出惡風。其脈緩者。名爲中風。太陽病或已發熱。未發熱。必惡寒。體痛。脈陰陽俱緊者。名爲

傷寒。

傷寒一日。太陽受之。脈若靜者。爲不傳。頗欲吐。若煩躁。脈數急者。爲傳也。

傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。病發熱而惡寒。邪發於陽也。不熱而惡寒者。邪發於陰也。發

於陽者七日愈。發於陰者六日愈。陽數七。陰數六。故也。

發於陽者隨證用汗藥攻其外。
發於陰者用四逆輩溫其內。

太陽病頭痛至七日以上自愈者。其經竟故也。若欲作再經者。針足陽明使經不傳。

補足陽明土。
三里穴也。

風者解表而不了了者十二日愈。

方言曰南楚疾愈或謂之差或謂之了。

太陽病初服桂枝湯。反煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。

太陽病自汗。四支難以屈伸。若小便難者。可與陽旦證內加附子壹枚。炮去皮尖八破同煎服之。

陽旦即桂枝湯異名。

若小便數者。慎不可行此湯。宜用芍藥甘草湯。若誤行桂枝附子湯攻表。則咽乾煩躁厥逆嘔吐者。作甘

草乾薑湯與之。以復陽氣。若厥愈足溫。更與芍藥甘草湯。其脚卽伸。若胃氣不和。讞語者。少與調胃承氣

湯。微溏則讞語止。

芍藥甘草湯主脈浮而自汗。小便數。寸口脈浮大。浮爲風。大爲虛。風則生。出爲津液少。不可誤用桂枝湯。宜補虛退熱通治。誤服湯後。病證仍存者。合今升。秤則株兩。升合之分毫。難以從俗。莫若以古今升秤均等。而減半爲一劑。方云。一劑盡。病證猶在者。更作減半之劑。此古方一劑入加其半。庶可防病未盡而亦得。時後所謂或以壹分爲兩。或以貳株爲兩。以盡當升可也。貧家難辦。或臨時卦煎八分服之。有薑棗者。每服入薑三片。棗三枚。一日三服。未中病可六七服也。古方行之。凡湯一劑。有附子一枚。增半之劑。合用附子一枚半。古方不折枚者。具當一枚半。四錢以下者。可用兩枚爲准。一枚傷多不妨。仲景云。強人可加附子成兩枚。

微熱虛則兩脰攣小便數仍汙
按古之參兩·准今之壹兩·古之參
升·今之壹升·若以古方裁減·以
稍增其枚粒·乃便於俗爾·且仲景
而服之也·有不禁大湯劑者·再減半
撮皆可·龜末每抄五錢·水兩平蓋
·有不可作資散者·是病勢大·宜依
是枚力要完也·半兩以上·大附子可
杖是也·

芍藥

甘草半
各貢兩

細剉水壹升半煎七合半去滓溫溫分再服

甘草乾薑湯

甘草
• 貳兩

煎如前方

調胃承氣湯

大黃
• 熬兩

甘草
• 半兩

芒消合璧·大

細剉水壹升煎上二味至五合去滓下芒消烊化暖服壹盞微溏爲度如難利者再與一劑

太陽病汗證反下之遂利不止脈促表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之

黃芩 • 參錢

黃連 • 參兩

甘草 • 半兩

乾葛 • 貳兩

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目痛鼻乾不得臥此證惡寒可發汗若惡寒龍反自汗惡熱者爲胃家實屬正陽明宜

調胃承氣湯方在太陽證下

龜曰有三陽陽明者其太陽陽明本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥大便難也正陽陽明者病人本風盛氣實津液消鑠或始惡寒汗出多寒罷而反發熱或始得病便發熱狂言也

凡陽明證俱宜下唯中寒惡寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗

二陽合病脈必浮大而長外證必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也浮大者太陽受病也長者陽明也頭腰太陽也肌目鼻陽明也

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足繫繫汗出大便難而讌語者大承氣湯下之則愈

方在可下證中

二陽併病太陽初得時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明自微汗不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲逆如此者可小發其汗設面色正赤者陽氣怫鬱在表當解之蒸之若汗出不徹當短息不足言陽氣

怫鬱不得越。當汗出而不汗。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。宜麻黃湯。更發其汗。卽愈。何以知其汗不徹。其脈濫故知也。方在可汗證中。古本字多差誤。以從來所見病人證候中。符合如此。故改正。陽明病能食爲中風。不能食爲中寒。

陽明病中寒。脈浮無汗。其人必喘。發汗則愈。宜麻黃湯。方在可汗證中。

陽明病。脈遲。汗出多微。惡寒者。表未解。發汗則愈。宜桂枝湯。方在可汗證中。若不惡寒。爲外欲解。手足濶然汗出。

者。大便已鞭。宜大承氣湯。方在可汗證中。

陽明病有不可攻者。謂陽明病心下鞭滿者不可攻。攻之利不止者死。利止者愈。

陽明病或發汗或自汗。大便雖鞭。小便少者未可攻。津液恐還入胃。必先鞭後瀉也。小便自如。乃可攻之。
陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。其脈浮緊。若下之。則腹滿小便難也。此證必無汗。與後證相似。且亦不宜正與汗藥。別與消詳也。

陽明病脈浮而緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒而反惡熱。身重。若發汗。則煩躁憤憤。反讐語。若加溫針。必恍恍煩躁不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動鬲。心中懊惓。苔生舌上者。梔子香豉湯主之。

肥梔子一枚 香豉一合

水貳升。煮梔子減半。下豉再煮。剗合去滓。溫服壹盞。得快吐者。止後服。

脈浮緊。必無汗。而反有汗。咽燥。腹滿惡熱。法當下之。而又脈浮緊。不當下。此恐變風溫。宜細詳。

陽明病口鼻燥。但漱水而不欲嚥者。必衄。

少陽證

尺寸俱弦者。少陽受病也。當二三日發。以其脈上循脇絡於耳。故胸脇痛而聾。足少陽膽屬木。弦者。細長如琴弦狀。仲景云。脈浮而緊曰弦。非謂此弦脈也。凡傷寒脈浮緊相較。皆屬弦之類也。有屬太陽。有屬陽明者。少陽正得弦脈。體是小弦長大脈也。多宜和表。鮮有汗證。少陽之證。口苦咽乾目眩也。

此三陽經皆病未入於藏可汗而解。仲景少陽證唯小柴胡。乃和表藥耳。

弦細頭痛發熱屬少陽。宜小柴胡湯不可發汗。發汗則讞語。此屬胃。胃和則愈。不和則煩而躁。宜調胃承氣湯。此屬少陽陽明證也。方在太陽。證中。

本太陽病不解。轉入少陽者。脇下鞭滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未可吐下。脈緊者。小柴胡湯主之。加少少陽中風。兩耳微聞。目赤。胸中滿而煩。不可吐下。吐下則驚悸。小柴胡湯主之。

牡蠣

若已吐下發汗。溫針讞語。小柴胡湯證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。

知犯何逆者。犯四種溫病。壞候也。

少陽中風。兩耳微聞。目赤。胸中滿而煩。不可吐下。吐下則驚悸。小柴胡湯主之。方在和表。證中。

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠睡。合目則汗。不言弦者。隱於長大也。

三陽合病。面垢讞語。腹滿身重。不能轉側。遺尿。發汗則讞語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗者。宜白

虎湯方在厥陰體中

傷寒四五日或六七日無大熱其人躁悶此爲陽去入陰也

傷寒三四日陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也

病到陰必吐利

傷寒三日少陽脈小者欲愈也

小而平勻者也

太陰證

尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發其經布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾宜大承氣湯下之方在可下。太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭自利不渴者屬太陰其藏有寒故也。當溫之以四逆輩

傷寒三日太陽脈弱至四日太陰脈大脈大而胸滿多淡者宜吐之無此證者宜汗之傷寒脈浮緩亦大之類手足自溫者繫在太陰小便不利者必發黃五苓散加茵陳主之若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也橘皮湯主之

五苓散

以茵陳濃煎湯調五苓散貳錢服之日三四黃從小便下以小便清爲度

橘皮湯

橘皮 壹兩 生薑 貳兩

細剉水壹升半煎七合去滓分貳服稍熱呷未差再作服

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝芍藥湯主之

桂枝 壹兩 芍藥 參兩 甘草 壹兩 大棗 陸枚 生薑 壹兩

咬咀以水叁升煮取壹升半去滓每溫壹盞日叁服注云小建中湯不用飴糖故芍藥爲君止痛復利邪故也

少陰證

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其經貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴大承氣湯下之方在中可下證

少陰之爲病脈微細於寐也

少陰中風陽微陰浮爲欲愈也

凡少陰病四逆者宜溫之

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃細辛附子湯主之

麻黃 貳兩 細辛 貳兩 附子 壹枚

咬咀以水三升先煮麻黃十數沸去上沫內諸藥煮取壹升去滓每溫壹盞日三服

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微汗。以二三日無陽證。故微發汗也。

謂初得病二三日。當見少陰證。無陽者。須發小汗也。

麻黃

貳兩

甘草

貳兩

附子

壹枚

㕮咀以水一升。先煮麻黃十數沸去上沫。內諸藥煮取壹升半去滓。每溫一盞。日三服。

龐曰。少陰病脈沉。不知何沉也。且沉緊發汗則動經。沉數爲病在裏。不可發汗。詳此脈或沉而濡。或沉而微。是表中寒而裏不消。脈應裏而發熱在表。故以小辛之藥溫散而微微取汗也。

少陰病吐利手足不逆冷。發熱者不死。脈不至者。灸少陰七壯。太谿穴在內踝後跟骨上。動脈陷中。言發熱者。謂其身發熱也。

少陰病吐利煩躁四逆者死。煩躁者。內煩躁也。與茱萸湯。證宜細審其生死也。

少陰病惡寒而勑。居員切時時自煩。不欲厚衣。宜大柴胡湯。方在可下。證中。

少陰病四逆惡寒而自勑。脈不至而吐利煩躁者死。重詳定此。

少陰病下利。利止而眩。時自冒者死。此合是少陽冒昧。汗濶出。脈小浮者生。少陰無眩冒之證。

少陰病六七日息高者死。

少陰病脈微細沉。但欲臥。汗出不煩。自欲吐。至五六日自利。復煩躁不得臥寐者死。

少陰病得之二三日以上。心中煩不得臥。黃連阿膠湯主之。

黃連

壹兩

黃芩

壹分

芍藥

壹分

雞子黃 半枚

阿膠 炙 · 參分
爲末

以水貳升先煮三物取壹升去滓內阿膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫溫一盞日三四服少陰病下利清水色純清心下必痛口乾燥者大承氣湯下之方在可下證中

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者茱萸湯主之

茱萸 壹兩半 · 湯
洗三遍

人參 叁分

生薑 半 ·

大棗 叁個

以水叁勝半煮取壹勝半去滓每溫一盞日叁服

少陰病咽痛者桔梗甘草湯主之

桔梗 半兩

甘草 壹兩

細剉水壹勝煎半勝去滓作叁服細呷之

又半夏散亦主之

半夏 遍 · 湯洗七

桂枝 去皮

甘草 炙 ·

右各等分各別搗篩已合治之每服叁錢水壹盞半煎至八分溫冷少少嚥之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止

脈不出者通脈四逆湯主之。

甘草

壹兩

附子

大者半個·強人
入加半個·

乾薑

參分·強人
加壹兩半·

細剉水二升煎至一升去滓每溫服一盞日三四服未差急更作一劑不可作煮散其脈續續出者愈暴出者死面赤者加連須葱四莖去青腹痛去葱加芍藥壹兩嘔者加生薑壹兩咽痛者去芍藥加桔梗半兩利止脈不出者去桔梗加人參半兩病與方皆相應者乃與服之少陰病下利六七日歟而嘔渴心煩不得眠者宜豬苓湯

豬苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠

各半
兩·

咬咀以水貳升先煮四物取壹升去滓內阿膠末烊盡每溫一盞服

少陰病下利咽痛胸滿心煩豬膚湯主之

豬膚

半斤

以水五升煮取貳升半去滓加白蜜半升白粉貳合半熬香和令相得每溫服一盞日三四服少陰病四逆其人或歎或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

甘草

枳實

柴胡

芍藥

各伍分

擣篩爲細末白飲和服方寸匕日三服歎者加五味子乾薑炮各貳分半并主下利悸者加桂貳分

半小便不利者加赤茯苓貳分半腹痛者加附子壹箇炮去皮臍泄利下重者先以水叁升薤白湯升半煮取貳升去滓以散方寸匕用薤白湯一盞煎八分日三四服

厥陰證

尺寸俱微者厥陰受病他六七日發以其脈循陰而絡於肝故煩滿而囊縮

微緩者囊必不縮若外證發熱惡寒似瘧爲欲愈候宜桂枝麻黃湯

各半湯也若尺寸俱沉短者囊必縮宜承氣湯下之一方在可下證中

厥陰之爲病消渴氣上衝心中痛熱飢而不欲食食則吐衄下之利不止烏梅丸主之

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安者此藏厥非衄厥也衄厥者其人當吐衄令病者靜而復煩也此藏寒衄上入其鬲故煩須臾復止得食而嘔又煩者衄聞食臭卽出其人常自吐衄衄厥者烏梅丸主之又治久痢

藏厥宜四逆輩極冷服之

烏梅

壹百伍拾個

乾薑

伍兩

黃連

捌兩

當歸

貳兩

烏梅

壹百伍拾個

桂枝

附子

人參

黃芩

細辛

各叁兩

川椒

桂枝

附子

人參

黃芩

細辛

各叁兩

異擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之貳斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜再杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑臭食物等

厥陰中風脈微浮者爲欲愈不浮爲未愈

脈遲反以黃芩湯得微其熱腹中應冷當不得食今反能食此爲除中必死

先厥後發熱下利必自止而反汗出咽痛者其喉爲痺發熱無汗其利自止若不止必便膿血者其喉不痺

龐曰熱少微厥指頭寒嘿不欲食煩躁數日小便自如此熱除也宜乾薑甘草湯

方在太陽證中

龐曰手足逆冷皆屬厥陰不可下亦不可汗有須下證者謂手足雖逆冷或有溫時手足雖逆冷而手足掌心必煖非正厥也故可消息汗下也

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前發厥者後必發熱厥甚熱亦甚厥微熱亦微厥不過五日六日不厥者必愈若六日厥者必發熱愈甚仍下利也

龐曰寒熱而厥面色不澤冒昧者當用絲衣包手足令溫煖必大汗而解也有不因大汗下而兩手忽無脈謂之雙伏或一手無脈謂之單伏或利止如此必有正汗急用四逆輩溫之時有汗便安脈終不出者死下利先厥後發熱利必自止不爾咽中痛或喉痺若便膿血者其喉不痺

厥而下利者當不能食反能食者爲除中必死能食反發熱脈數者必發癰膿厥而嘔胸脇煩滿後必便膿血

病者手足冷小腹按之痛此結冷在膀胱關元也

當關元灸之

發熱下利厥逆躁不得臥者死

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩不能飲食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散凡病可吐者皆宜此方

瓜蒂 赤小豆 等分

細末別以香豉壹合熱湯叁盞煮作稀糜去滓取汁和散壹錢溫溫頓服不吐者少少加藥再服得吐快乃止諸亡血虛家不可與服有用丁香者吐之多霍媒人

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯次治其厥不爾水漬入胃必作利也茯苓甘草湯

茯苓 桂 各壹錢 生薑 壹兩半 甘草 半兩

細剉水貳升煎壹升溫飲壹盞悸止爲度

傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃湯有不因下而自利如衄血者永宜此方

麻黃 壹兩 升麻 當歸 各半兩 知母 黃芩

萎蕤 各叁錢 茯苓 天門冬 桂枝 茯苓

白朮 乾薑 各壹錢半

細剉水貳升半先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮壹升貳合去滓溫服一盞如人行七八里久進一

服以汗出卽住服。

乾薑。

黃芩。

黃連。

人參

各壹兩半

細剉水叁升煮取壹升半去滓溫服一盞。

下利微熱而渴脈弱者自愈脈數汗出亦然緊爲未解發熱而厥七日下利爲難治。

凡厥通用四逆湯。方在四逆證中。謂其脈浮遲或微或細或沉皆屬裏有寒也。

厥而脈滑者爲裏有熱白虎湯主之。

知母

石膏

捌兩

甘草

半兩

粳米

叁合

以水五升煮米熟湯成去滓溫服一盞日三服有渴加人參半兩。

龐曰三陽皆有合病凡合病者有十四證唯三陰無合病。

兩感證

龐曰素問載兩感於寒其脈應與其病形者一日則巨陽與少陰俱病頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病腹滿身熱不欲食讏語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入口不知人六日死言其六日死者是藏府榮衛或有所通行故四日少陰與太陽俱病五日與太陰與陽明俱病六日厥

陰與少陽俱病，是重傳得六日死矣。其有三日死者，素問謂陽明爲五藏十二經脈之長，其邪氣盛，故不知人。三日其氣乃絕，故死矣。夫邪氣盛則實，表裏邪實，併領血氣入胃，不通於榮衛氣血，故氣血隨邪而盡，則三日死矣。其脈候素問已脫，今詳之。凡沉者皆屬陰也。一日脈當沉而大沉者，少陰也。大者太陽也。二日脈當沉而長，三日脈當沉而弦，乃以合表裏之脈也。沉長沉弦，皆隱於沉大。凡陰不當合病，唯三陽可以合病。今三陰與三陽合病，故其脈似沉緊而大，似沉實而長，亦類革至之死脈也。

三陰三陽傳病證

龐曰：傷寒一日，巨陽受病。前所說膀胱詳矣。病源云：小腸雖則誤其標，本其手足陰陽，自有併病者，故素問云：六日三陰三陽五藏六府皆受病。榮衛不行，五藏不通，則死矣。是表裏次第傳不必兩感，亦有至六日傳偏五藏六府而死者也。素問云：諸浮不躁者，皆在陽，則爲熱；其有躁者，在手。假令第一日脈不躁，是足太陽膀胱脈先病，脈加躁者，又兼手太陽小腸也。又云：諸細而沉者，皆在陰，則爲骨痛；其有靜者，在足。假令第四日脈靜著，足太陰始傳病也。脈加數者，又兼手太陰病也。故六日亦能傳偏藏府也。躁謂脈數，靜謂脈不數。用藥則同，若用鍼，須取足與手之經也。

傷寒總病論卷二

可發汗證

不可發汗證

四逆證

和表證

可下證血證附

不可下證

可水不可水證

可吐不可吐證

可灸不可灸證

可火不可火證

可溫證

火邪證

可發汗證

大法春宜發汗

湯主之

桂枝

芍藥
生薑

各壹兩半

甘草

壹兩

大棗

陸個

咬咀

水參升半

微火煎取壹升

七合半

生布絞去滓

溫服一盞

須臾啜熱粥一椀

令助藥力

周覆一

時汗偏身濺濺者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差止後服不必盡劑也若不汗如前法更服半日許令三服若病重者一日一夜可盡一劑病證猶存者更作服若汗未出乃至二三劑忌生冷黏滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈按風池是少陽之經陽維之會不針天柱而取風池者陽維維諸陽巨陽與諸陽主氣故也

龐曰凡桂枝湯證病者常自汗出小便不數手足溫和或手足指梢露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又增寒始可行之若病者身無汗小便數或手足逆冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也
脈緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之桂枝湯內加附子壹枚炮去皮尖切片同煎如前小便確爲有津液可作汗若小便數不可誤認陽旦證也陽旦卽桂枝湯異名也

下後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之桂枝湯內去芍藥只用四味也芍藥味酸脈促胸滿恐同煎如前小便確爲有津液可作汗若小便數不可誤認陽旦證也陽旦卽桂枝湯異名也

太陽病項背強几几汗出惡風者桂枝加葛根貳兩添水成四升煎取貳升通治柔痓主之不用桂加水成四升取二升

太陽下之微喘者表未解也桂枝加杏人厚朴湯主之

桂枝內加厚朴壹兩杏人肆拾枚

此則中風自汗用桂枝湯證也

龐曰惡寒者不當風而憎寒惡風者當風而憎寒皆屬表證太陽病頭痛發熱身疼痛骨節煩疼惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃半兩

桂枝壹兩

甘草半兩

杏人個半

咬咀水貳升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮取壹升貳合半去滓每飲一盞續次服盡不用粥投溫覆如桂枝法將息未汗可再作二三劑

龐曰傷寒之脈緊盛而按之澀是也脈浮而緊浮爲風緊爲寒風傷衛寒傷榮榮衛俱病骨節煩疼外證必發熱無汗或喘其人但憎寒手足指末必微厥久而復溫掌心不厥此傷寒無汗用麻黃證凡脈浮數或浮緊無汗小便不數病雖十餘日尙宜麻黃湯也

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱自汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞶此爲逆也大青龍湯

麻黃參兩

桂枝

甘草

石膏各壹

兩

杏人貳拾個

棗伍枚

生薑

半兩

咬咀水五升煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮取二升每溫飲一盞微汗爲度若汗周身潤則止服未

周身潤可停待少時服盡不欲汗多亡陽故也。亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也。

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯主之。

桂枝證反無汗而脈緊似麻黃證反身不疼而脈浮緩

少陰當言太陰按太陰證內有脈浮緩手足溫者繁太陰太陰當發譯屬青龍陽似

太陽病項背几几無汗惡風葛根湯主之。

葛根 茯兩

麻黃 半兩

桂枝 壱兩

甘草 壱兩

芍藥 壱兩

大棗 陸枚

生薑 壱兩

咬咀水四升先煮麻黃葛根數沸去沫下諸藥煮取貳升半去滓每溫飲一盞日三服如桂枝湯將

息。

太陽與陽明合病必自下利者葛根湯主之。

太陽與陽明合病不利但嘔者葛根加半夏湯主之用前葛根湯內加半夏壹兩壹分湯洗十遍每個作四破。

羸曰脈浮緊無汗服湯未中病其人發煩目瞑極者必衄小衄而脈尚浮者宜麻黃湯衄後脈已微者不可再行也凡脈浮自汗服湯不中病桂枝證尚在必頭痛甚而致衄小衄而脈尚浮者再與桂枝湯衄後脈已微者不可再行也。

傷寒三日後與諸湯不差脈勢如數陽氣猶在經絡未入藏府宜桂枝石膏湯此方可夏至後代桂枝證用之若加麻黃壹兩可代麻黃青龍湯用之

石膏 參兩 桔子 貳拾肆個 生薑 壹兩 桂枝

黃芩

甘草 各壹兩

升麻

葛根 半 · 各壹兩

咬咀水五升煮取貳升半去滓溫飲一盞食頃再服若得汗即止後服
龐曰凡發汗以辛甘爲主復用此苦藥者何也然辛甘者折陰氣而助陽氣也今熱盛於表故加苦以發之素問云熱淫于內以苦發之故也

葛根龍膽湯療病四五日不差身體毒熱面赤兼治陽毒風溫

葛根 生者肆兩 · 者貳兩代 · 乾

生薑

升麻

大青

龍膽

桂枝

甘草

麻黃

芍藥 各半

萎蕤 壹兩

石膏 半 · 參兩

咬咀水四升半下麻黃煮數沸去上沫內諸藥煎貳升去滓溫飲一湯盞日三夜二凡葛根須用家園味
若誤用野葛多
吐 · 人轉增病

時行熱病六七日未得汗脈洪大或數面目赤身體大熱煩躁狂語欲走大渴甚又五六日以上不解熱在胃中口禁不能言爲壞傷寒醫所不能治如死人或精魂已竭心下緩緩發開其口嚦藥下咽卽活兼

治陽毒麥奴丸。

麻黃

參分

釜底煤

黃芩

龕底墨

梁上塵

小麥奴

龕中黃土

各壹分

芒消

大黃

各半兩

細末蜜丸彈子大。新汲水三合和一丸研服之。渴者但令冷水足意飲之。須臾當寒竟。汗出便差。若日移五尺不汗。依前法再服一丸。差即止。須微利。小麥奴乃小麥未熟時叢中黑麥。捻之成黑勃者是也。無即以小麥炒黑焦地上出火毒用之亦得。此藥須是病人大渴倍常躁盛。若小渴者強與之爲禍耳。強人每服半雞子大。亦治溫。

傷寒連服發汗湯七八劑。汗不出者死。如中風法蒸之。使溫熱之氣外迎。無不得汗也。古今用效薪火燒地。良久去火掃地。以水洒之。取蠶沙桃柏荆葉糠及麥麸皆可。同和鋪燒地上。可側手厚上鋪席。令病人臥席上。溫覆之。熱月只可夾被覆。其汗立出。後周身至腳心皆汗濺濺。乃用溫粉撲止。移之上牀即愈。無蠶沙。卽用麩糠之類鋪燒地上亦得。溫粉法：白朮、葛根、白芷各兩、英粉拾貳兩、共研末、和勻用之。無英粉以蠶粉代之。

傷寒差後。有不了了證者。謂至十日或半月二十日。終不惺惺。常昏沉以失精神。言語錯謬。或無寒熱。有似鬼祟。或朝夕潮熱。頰赤。或有寒熱如瘡狀。此乃發汗不盡。餘毒氣在心胞絡間所致也。宜知母麻黃湯。

知母

半兩

麻黃

壹兩

芍藥

黃芩

甘草

桂枝
各半

咬咀水貳升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥取壹升參合去滓每溫飲一大盞半日可相次三服溫覆令微汗若心煩欲水當稍與之令胃中和則愈未汗盡劑太陽病下之後氣上衝其脈必浮可依證發汗不與汗則成結胸也凡發汗脈浮大雖大便祕小便少者可發汗而解也合汗不汗諸毛孔閉塞悶絕而死

不可發汗證

脈浮緊法當身痛當以汗解假令尺中脈遲爲榮氣不足血少故也

前陽明病脈遲汗出多微惡寒宜桂枝湯不質榮不足蓋尺脈長大而遲也此若

軟緊而遲不可汗
宜小建中湯

小建中湯

桂枝
參分

生薑
參分

芍藥
壹兩

甘草
半兩

棗
陸枚

飴糖
半合

咬咀水貳升半煮取九合去滓方下飴糖煎令化每溫飲一湯盞日進二三服尺尙遲再作一劑入人參加半兩同煎最良舊有微溏或嘔者不用飴糖也兼治傷寒一二日胸中悸而煩及汗後身疼脈沉遲又治傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛先小建中湯不差與柴胡湯方在和表證中

龐曰、凡脈緊病必無汗唯濡而緊病必自汗勿誤行桂枝宜建中湯也。脈濡弱不可發汗汗則厥而煩躁不得眠。

諸動氣在心腹上下左右不可發汗。

龐曰、諸脈動數微弱不可發汗。以上並宜建中湯
煩躁者宜竹葉湯若

竹葉湯治虛煩病似傷寒身亦熱而煩躁頭不痛身不疼脈不數者兼治中喝渴吐逆而脈滑數者及傷寒解後虛羸少氣逆欲吐者並宜服之。

淡竹葉 半兩 牛把

石膏 肆兩 石膏

半夏 參分 半夏

人參 半兩 人參

甘草 半兩

麥門冬 貳兩 麥門冬

粳米 壹合 粳米

淘過

細剉以水伍升煎貳升半米熟去滓溫飲一盞日進三服夜二服嘔者加生薑一兩半不嘔不用虛煩或嘔吐脈弦細芤遲手足微寒胸滿者橘皮湯主之兼治暴煩下利方在太陰證中

四逆不可發汗發汗則聲嘶舌萎不得前言亂睛眩者命將難全。

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足不能自溫者乾薑甘草湯主之方在太陰證中

淋家不可發汗發汗必便血。

瘡家雖身痛不可發汗汗出則瘡。

以癰瘡家驗
血過多

動氣在右不可發汗。汗出則劇而渴心苦煩。飲則吐水。散三服。方在可水證中。次服竹葉湯。方在前。動氣在左不可發汗。發汗則頭眩。汗出則筋惕肉瞞。此爲逆難治。但先服防風白朮散。次防風白朮散。

防風 壹兩 牡蠣粉 半兩 白朮 叁分

細末溫米飲調下二錢。日二三服。汗出續與建中湯。

動氣在上不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。李根湯主之。

半夏 半兩 桂枝 當歸 芍藥 黃芩

甘草 各一分 人參 各壹分 茯苓 叁分

麴末每五錢水兩盞。薑三片。甘李根白皮一圍。如雞子黃大煎八分通口。日三五服。

動氣在下不可發汗。發汗則心中大煩骨節苦痛。目運惡寒。食則反吐穀不得前。先服大橘皮湯得吐止。

後服建中湯。

大橘皮湯 亦主手足冷嘔嘔。

橘皮 壹兩半 生薑 貳兩 薋 貳拾肆 甘草 半兩

人參 壹分 竹茹 半兩

咬咀水叁勝煎壹升半去滓溫服一盞。食頃再服。

不當汗而強汗之。則津液枯槁而死。

四逆證

四逆湯治病發熱頭痛脈反沉。若不差身體疼痛者脈浮遲表熱裏寒下利清穀者汗出熱不去內拘急支節疼四逆者下利厥逆惡寒者下利腹脹滿身疼脈浮者先用四逆溫裏得利止乃可隨證用藥攻表也。

甘草 壹兩

附子 半個

乾薑 參分

咬咀以水壹升半煮取陸合去滓溫分作貳服。
手足厥脈微欲絕者當歸四逆湯主之。

當歸

桂枝

芍藥

細辛 各壹兩

棗 叁拾陸

甘草

木通 各壹兩

咬咀以水四升半煮二升二合去滓每溫一盞服。

和表證

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而渴或渴或利或噎或小便難腹滿而喘者小青龍湯主之。

麻黃

芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝半兩 半夏一錢 半分

五倍子半兩

咬咀以水六升先煮麻黃數沸去上沫內諸藥煮一升去滓每溫服一盞若渴者去半夏加括樓根壹兩半若微利去麻黃加蕡花一雞子大炒赤若噎者去麻黃加附子一枚炮小便不利小腹滿者去麻黃加赤茯苓貳兩若喘去麻黃加杏仁壹兩壹分無蕡花以桃花壹鴨子大不炒代之太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒此陰陽俱虛不可更發汗吐下也面色反有熱色者未解也以其不能得小汗出其身必痒宜桂枝麻黃各半湯

桂枝湯末 麻黃湯末各三分

以水一升半聚三箇生薑三片煎減半去滓溫飲一盞未有小汗再服之

服桂枝湯大汗出脈洪證候不改者服桂枝湯如前法若形似瘧狀日再發者宜桂枝二麻黃一湯

桂枝湯末 豈兩 半兩

麻黃湯末 半兩

以水一升半薑三片聚三箇煎減半去滓溫飲一盞未有小汗再服之

服桂枝湯大汗出後大煩渴脈洪大者白虎湯加人參主之

方在厥陰證中

龐曰傷寒已得汗身和脈絃細讖語妄見此爲津液不和與小柴胡去仁參加桂枝湯服之津液和自愈

未差與調胃承氣湯下之。

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去柴胡桂枝湯主之兼治寒疝腹痛。

柴胡 壹兩

桂枝

黃芩

人參 各半兩

半夏 四錢

芍藥 半兩

甘草 一字錢

大棗 九枚

生薑 半兩

㕮咀以水三升半煮取一升七合半去滓溫飲一盞。

小柴胡湯治傷寒五六日中風往來寒熱胸脇滿嘿嘿不欲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身微熱或歟者。

柴胡 貳兩

甘草

黃芩

人參 各三分

半夏 陸錢一

生薑 三分

大棗 參枚

㕮咀以水六升煮取三升去滓再煎取一升半溫作三服若胸中煩而不嘔者去半夏人參加括樓

半箇若渴去半夏加人參成貳兩貳錢半括樓根貳兩若腹中痛去黃芩加芍藥壹兩半若脇下痞鞭去大棗加牡蠣貳兩若心下悸小便不利去黃芩加茯苓貳兩若不渴外有微熱去人參加桂枝壹兩半溫覆微汗愈若歟去人參大棗生薑加五味子壹兩壹分乾薑壹兩

傷寒中風有柴胡證但見一證不必悉具凡以柴胡證而下之與柴胡湯必蒸蒸而振却復發熱汗出而

解也

病十日以上脈浮細嗜臥者爲已安候小柴胡和之細而遲者勿與

婦人中風七八日續自寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讖語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣必自愈

先宜小柴胡湯
不愈可刺

期門

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀讖語此爲熱入血室也當刺期門隨其實取之

陽明病潮熱大便溏小便自如胸脇滿不去者小柴胡湯主之又不大便而嘔舌上白苔者亦宜服之上焦得通津液得下胃氣因和身濶然汗出而解

陽明中風脈浮弦大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時嘔耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯若不尿腹滿加嘔者不治

可下證血證附

大法秋宜下

陽明病發熱不惡寒汗多者急下之。

凡脈沉細數爲熱在裏又兼腹滿咽乾或口躁舌乾而渴者或六七日不大便小便自如或目中瞳子不明無外證者或汗後脈沉實者或下利三部脈皆平心下堅者或連發汗已不惡寒者或已經下其脈浮沉按之有力者宜大承氣湯。

大黃半兩 厚朴壹兩 枳實壹枚 朴消半兩

咬咀以水四升先煮厚朴枳實至叁升下大黃煮取壹升半去滓下朴消烊化每溫一盞服利即止後服如作羹散煎每服厚朴枳實末共叁錢水兩盞煎壹盞半下大黃末壹錢煎壹盞絞去滓下朴消末壹錢烊化服之。

陽明與少陽合病而利脈不負者爲順也負者失也互相克爲負也脈滑而數者有宿食當下之。宜大承氣湯陽明土其脈大少陽木其脈弦若合病土被木賊克更利爲胃已困若脈不弦爲土不負弦者爲土負必死

脈雙弦而遲心下堅或脈大而緊者陽中有陰可下之病者煩熱汗出如瘡狀日晡則發潮熱者屬陽明其脈必實當下之而愈。

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎宜下之。傷寒若吐下後不解不大便五六日以上至十餘日日晡則發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則

不識人。循衣妄撮。常見有此症空候，故改之。惕而不安。微喘直視。脈弦者生脈濁者死。微者但發熱譏語可下之一服利。止後服。

過經譏語者可下之。

病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時。此有燥屎。故不大便。可下之。

以上並宜大承氣湯。

太陽病未解。其脈陰陽俱停者。必先振慄。汗出而解。

陽微者先汗之所解。陰實者先下之而解。下之宜大柴胡湯。

柴胡

肆兩

黃芩

芍藥

各壹兩半

枳實

兩枚

生薑

貳兩半

半夏

壹兩半

大棗

陸個

大黃

壹兩

咬咀以水六升。煮取叁升去滓再煎。每溫一盞服。

因下之後。潮熱而微利者。此醫以丸藥下之。非其治也。而有表證仍胸滿而嘔者。先服小柴胡湯。後服

大柴胡湯。小柴胡湯在和表證中。

傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞭。嘔吐下利者。大柴胡湯主之。

傷寒十餘日。結熱在裏。往來寒熱者。宜大柴胡湯。

陽明病譏語發熱。脈滑疾者。小承氣湯主之。

大黃 貳兩 厚朴 壹兩 枳實 兩枚

咬咀水貳升半煎至八合去滓放溫時飲一盞以利爲度凡大便祕悶恐有表證者但少少飲之微下爲度不可飲多恐大泄利也虛弱人可作煮散煎服

太陽病若吐下發汗後微煩小便數大便難者與小承氣湯利之則愈此太陽陽明證也

下利订語者有燥屎也宜小承氣湯初一服订語止若更衣者停後服不爾盡與之

更衣卽登廁也非顏師古注漢書更衣之義集

驗方痔有更衣挺出頗妨於更衣更衣出清血故以知之

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

方在太陽證中

發汗後惡寒者虛也不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜調胃承氣湯

傷寒十三日過經订語者此有熱當以湯下之若小便利者大便當鞭反下利而脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者爲內實也宜調胃承氣湯

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩此時極吐下者與調胃承氣湯不爾可與之但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也屬調胃承氣湯

傷寒吐後腹脹滿者屬調胃承氣湯

茵陳湯治陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無汗劑頸而還小便不利渴而飲

水者以瘀熱在裏身必發黃。

茵陳蒿

參兩

大黃

壹兩半

梔子

貳拾個
者染枚

大

咬咀水貳升半先煮茵陳至貳升內二味煮取壹升貳合半去滓溫飲一盞日三服小便當利尿如皂角沫一宿腹減黃從小便出。

十棗湯治太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表和裏未和也。

芫花

甘遂

大戟

等分異杵篩秤末合之
入臼再杵二三百下

先以水壹升煮肥棗拾枚擘碎煮取半升去棗用煎湯少半調末一錢匕羸人半錢再單飲棗湯送之平旦服若下少而病不除明日加藥一錢半如前服之服之必利利後糜粥自養。

欬而脇下痛此爲有飲宜十棗湯。

調中湯治夏月及秋初忽有暴寒折於盛熱熱結四支則壯熱頭痛寒傷於胃下利或血或水或亦帶下壯熱且悶脈數宣下之久年腸風下之亦差。

大黃

參分

葛根

黃芩

芍藥

桔梗

茯苓

藁本

白朮

甘草

各半
兩

咬咀水吞升煎至貳升下大黃取壹升貳合去滓溫溫飲一盞移時勿爾食再服之得快下壯熱便歇其下利亦止凡秋夏早熱積日或有暴寒所折故也虛人亦不在壯熱但主利或霍亂不宜用此實人有服五石人喜壯熱與別藥下則加熱喜悶而死矣是以宜以此下和其胃氣調中湯又治陽病因下遂協熱利不止及傷寒不因成寒兩煎服之殊驗也殊驗也菌陳丸療瘴氣及黃病瘧瘧

菌陳

梔子

鼈甲

芒消

各壹兩

大黃

貳兩半兩

豉
貳合半兩

常山

杏仁

各壹兩半兩

巴豆

半兩

細末蜜丸梧桐子大初得時氣三日內平旦米飲服二丸如人行十里久或吐或利或汗出不爾更服一丸以熱粥投之老少以意加減丸數服若黃病瘧瘧時氣傷食瘧瘧小兒驚熱欲發癇服之無不差者療瘴神驗赤白痢服之亦效春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病有性殺藥者每眼

丸七九五

抵黨湯治太陽病六七日表證在脈微而沉反不結胸其人發狂者乃熱在下焦小腹當鞭滿小便反利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也小腹滿而小便不利者非血證不

水蛭
蟲枚各拾枚

桃仁

柒枚

大黃

壹兩

咬咀以水貳升半煮至壹升貳合半去滓溫溫分四服未下再服虛人只可作半料服之如作煮散每五錢水壹蓋半煎壹蓋去滓服之

桃人承氣湯治太陽病不解熱結在膀胱其人如狂血自下者乃愈其外不解者尙未可攻當先隨證行湯解外外已解但小腹急結者乃可攻之不惡寒爲外解

桃人貳拾肆個

大黃貳兩

甘草

桂枝

芒消各壹兩

咬咀以水叁升半煎取壹升半去滓內芒消烊化溫服壹蓋虛人減作半料亦可作煮散每伍錢水壹蓋半煎至壹蓋去滓下芒消壹錢半烊化服之

桃人承氣湯又治產後惡露不下喘脹欲死服之十差十

龐曰脈朝夕駛者實癥也可下之朝平夕駛者非癥也不可下駛謂數脈六七至者也若脈數一息八九至慎不可下若下之則煩躁下利不止而死凡數脈與皮毛相得亦不可下也合下不下令病人腹脹滿通身浮腫而死

不可下證

脈軟而弱反在關開下三寸口分也漏反在頰關上三寸分也微反在上尺部也澀反在下也微則陽不足澀則無血厥而且寒宜建中湯方在汗證中不可

陽微不可下下之則心下痞。

諸動氣在心腹上下左右俱不可下。

動氣在右不可下下之則津液內竭咽躁鼻乾頭眩心悸。

宣竹葉湯·方有不可汗證中·

動氣在左不可下下之則腹裏拘急不止動氣反劇身雖有熱反欲勑先服乾薑甘草湯·方在太陽證中。

後服建中湯·方在不可汗證中·

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身冷熱汗自泄欲水自灌竹葉湯主之。

方在不可汗證中·

動氣在下不可下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅半夏瀉心湯主之。

方在痞證中·

咽中閉塞不可下。

龐曰諸脈濡弱微虛細相搏俱不可下。

諸四逆不可下虛家亦然。

龐曰若下證悉具而見四逆者是失下後氣血不通使然但手足微厥掌心常溫時復指稍溫便下之不可拘忌也。

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也。

龐曰凡下證小便不利或尙少未可攻之也。

不當下而強下之令病人腸胃洞泄不禁而死。

可水不可水證

龐曰、凡病非大渴不可與冷水。若小渴口咽乾。小小呷滋潤之。若大渴煩躁甚。能飲一斗者與五升。能飲一升者與半升。若乃不與則乾燥無由作汗。煩喘而死者多矣。但勿令足意飲也。若大汗將來。躁渴甚者。但足意飲之勿疑。常人見因渴飲水而得汗。見小渴遂強與之。致停飲心下。滿結喘而死者亦多矣。其有熱脈數。尚可作汗而解者。出於天幸也。

五苓散治病人水藥入口則吐。或渴而嘔者。或汗後脈尚浮而煩渴者。或下利渴而小便不利者。或因渴停水心下。短息者難治。嘔而小便不利者皆主之。

豬苓 白朮 茯苓 桂枝 澤瀉各半兩

細末白飲調下貳錢。日參服。數飲緩水汗出效。

陽明病小便數者。大便即堅。不更衣。十日無所苦。欲得水。但與之。當以法救渴者。五苓散主之。

霍亂頭痛發熱。身體疼。發熱欲飲水。五苓散主之。若得病無熱。但狂言。煩躁不安。精采不與人相當。勿以火導之。但以豬苓散方寸匕服之。當逼飲新汲井水壹升。卽令指刺喉中吐去之。病隨手愈。若不能吐者。勿強與水。水停則結心下也。當以藥吐之。不爾。更致危病。若當吐不時。以豬苓散吐之。其死迨速矣。亦可針之尤佳。夫飲鬲實難治。此皆三死一生也。太陽病發汗後。大汗出。胃中乾燥。煩不得眠。其人欲飲水者。

但與之當稍稍飲之令胃和則愈。

可吐不可吐證

龐曰、胸鬲痞悶痰壅塞礙脈得浮或滑並宜瓜蒂散吐之。方在厥陰證中產後六七日內下瀉諸藥不効得此脈與吐之瀉立止。

下利日數十行其脈反遲寸口微滑吐之則止。

龐曰、虛家當吐而不敢吐之宜以枳實散壓氣毒痰水過日毒入胃乃可微下之也。

諸四逆脈微弱虛細或弦遲雖中滿悶不可吐宜橘皮湯枳實散之類。

橘皮湯在和表證中
枳實散在敍論中

不可吐而強吐之氣築心卽死矣。

可灸不可灸證

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貢豚氣從少腹上撞者灸其核上一壯與桂枝加桂湯。

桂枝湯內加桂

枝足成壹兩壹分
如前法煎之。

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死灸少陰七壯。

下利手足厥無脈灸之不緩反微喘者死。

傷寒脈促手足厥逆可灸之。

合灸不灸令病人冷結久而彌固氣衝心而死微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

脈浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從腰以下必當重而痺此爲火逆若欲自解當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脈浮故以知汗出而解脈浮熱甚而灸之此爲實實以虛治因火而動咽躁必睡血

不當灸而誤灸令火邪入腹干錯五藏重加煩而死

可火不可火證

下利穀道中痛當以熬鹽末熨之或炒枳實末溫熨二味相兼益佳若臍下冷結不可便熨冷氣攻心腹必死須先用藥溫之久而可熨凡臍下冷結成關陰大小便不通服藥雖多不見效以炒鹽熨臍下須臾卽通然開陰已服巴豆甘遂大黃輕粉之類太多卽暴通利而損人尤宜詳之也

可溫證

大法冬宜溫熱藥

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲若鬲上有寒飲乾嘔者不可吐宜四逆湯溫之方在四逆證中

下利其脈浮大此爲虛以強下之故也設脈浮大因爾腹鳴宜當歸四逆湯溫之。

火邪證

醫以火臥床下或週身用火追汗或取火或誤灸皆屬火邪也。

傷寒脈浮醫以火迫切之亡陽驚或狂起臥不安者宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯。

桂枝

壹兩半

蜀漆

壹兩半

甘草

壹兩半

龍骨

貳兩

牡蠣

貳兩半

生薑

壹兩半

大棗

陸枚半

以水陸升先煮蜀漆減壹升內諸藥煮取貳升去滓溫服壹盞無蜀漆以恆山代之火劫後脈浮當汗出而愈。

火邪下之因燒針煩躁者桂枝甘草湯主之。

桂枝

半兩半

甘草

各壹半

牡蠣

各壹半

龍骨

各壹半

以水二升煮一升去滓溫取一盞可代救逆湯使之。

龐曰灸及燒針後證似火劫者並宜火劫治之煩躁驚及狂用六石風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯亦通用。

病人因火劫至十五六日身黃下利狂欲走師脈之言當下清血如豚肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脈陽浮而陰濡弱陽浮爲風濡弱爲虛浮虛受風少血發熱惡寒洒淅項強頭眩醫以火熏鬱令汗

出惡寒遂甚客熱因火而發怫鬱蒸於肌膚自爲黃小便微難短氣鼻中出血而復下之胃無津液利遂不止熱瘀在膀胱畜結成積狀如豚肝當下不下心亂迷憤狂走赴水必不能自制蓄血若去目明心了此皆醫所爲輕者得愈極者不治

傷寒總病論卷三

結胸證

心下痞證

陽毒證

陰毒證

狐惑證

百合證

瘍濕渴證

瘧候

渴候

發汗吐下後雜病證

陰陽易證

傷寒勞復證

結胸證

病發於陽而反下之熱入內作結胸其病心下堅滿按之如石鞭而痛項強如柔瘡狀其脈寸口浮關上尺中皆沉或沉緊名曰結胸也下之則和宜大陷胸湯今作煮散煎之

大黃壹兩半

芒消壹兩捌錢半

甘遂末一臺字

異末先以水壹升半煎大黃半升絞去大黃滓下消末更煮一二沸內甘遂末和勻溫分二服一服快利止後服如作煮散卽先以水一盞煎大黃末肆錢匕至捌分下消末貳錢匕候化勻下甘遂末

半錢匕沸勻溫服之移時未利再煎一服快利爲度。

藏結如結胸狀飲食如故時時下利寸口脈浮關上脈小細沉緊名曰藏結舌上白苔生者難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上苔滑不可攻也。
結胸證其脈尺寸浮大者不可下下之則死復宜發汗也。

結胸證悉具煩躁甚者死。

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也。醫反下之動數變遲鬲內拒痛胃中空虛宿熱動鬲短氣煩躁心下懊憹陽氣內陷心下固鞭則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗餘處無汗剝頸而還小便不利身必發黃也。

結胸無大熱者此爲水結在胸脅也但頭微汗出者宜大陷胸湯。

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌躁而渴日晡則少有潮熱從心下至小腹滿而痛不可近者。

宜大陷胸湯。

虛弱家不耐大陷胸湯卽以大陷胸丸下之。

結胸者項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸。

大黃

肆兩

芩蘆子

壹兩

朴消

壹兩捌錢

杏仁

貳合

杵二味、內杏仁、朴消、合研如脂、丸如彈子大、抄甘遂末壹錢、白蜜貳合、水貳升、煮取壹升、溫頓服之。一宿乃下、不下更服。

小結胸正在心下、按之則痛、脈浮滑者、宜小陷胸湯。

半夏

陸錢半

黃連

一分

桔梗

壹錢四錢用

咬咀水參升煮桔梗至貳升、下諸藥、煮取壹升去滓、溫溫服一盞、食頃再服、一日盡劑、微解下黃涎即愈。

太陽病下之、脈促者不結胸、此爲欲解也、脈浮者必結胸、脈緊者必咽痛、脈弦者必兩脅拘急、脈細數者頭痛未止、脈沉緊者必欲嘔、脈沉滑者協熱而利、脈浮滑者必下血。

寒實結胸無熱證者、與三物白散方、小陷胸者非也

桔梗

三分

巴豆

壹錢分

貝母

三分

細末內巴豆研勻、白飲調下壹錢、蠶人減之、病在鬲上必吐、在鬲下必利、未利啜熱粥投之、利過不止、飲冷粥止之。

龐曰、近世治結胸多行針頭丸、用硫黃陽起石者、若病熱毒甚者必死、唯治冷結寒實耳。

心下痞證

病發於陰而反下之爲痞。發熱惡寒爲湯誤下則爲結胸無傷寒下之後若發熱汗出者爲欲解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也但滿而不痛此爲痞氣宜半夏瀉心湯

甘草

黃芩

乾薑

人參

各壹兩半

黃連

半兩

大棗

陸枚

半夏

壹兩壹分

咬咀水陸升瘡取叁升去滓再煎壹升半溫溫飲一盞日三夜二設下後津液入裏胃虛上逆塞結在心濕兼通心氣甘草力大故乾薑黃連不能相惡也

心下痞按之濡其脈關上浮者宜大黃黃連瀉心湯

大黃

壹兩

黃芩

各半兩

咬咀以鰯眼沸湯壹升漬之須臾絞去滓溫溫分四服得利止後服寒濕迫心氣不行
初作熱也心下痞悶而復惡寒汗出者大黃黃連瀉心湯內加附子主之附子壹枚炮去皮尖四破以水叁合煎服之與瀉心湯而痞不解其人渴而口乾燥小便不利者五苓散主之方在可水語中

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利宜生薑瀉心湯

生薑

貳兩

人參

半兩

甘草

黃芩

各壹兩半

半夏

壹兩半

大棗

陸枚

黃連

乾薑

各半兩

咬咀水伍升煑取叁升去滓再煎取壹升半溫作四服。胃中不和爲少陽木氣所制故用二薑之辛味。

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之。

甘草

貳兩

黃芩

乾薑

人參各半

半夏

壹兩

大棗

陸枚

黃連

半兩

咬咀水伍升煎至叁升去滓再煎取壹升半溫作四服。

胃虛故加甘味。

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解不可攻痞當先解表表解乃可攻痞攻痞宜大黃黃連瀉心湯加前

附子是汗出多而惡寒表將解而裏結未除故也此證是發後無汗惡寒故先須解表也。

傷寒發熱汗出不解心下痞鞭吐嘔下利者大柴胡湯主之。

汗出嘔吐下利是胃中津液燥裏有結實非胃虛也故以大柴胡湯下之。

病人脅下素有痞連臍傍引小腹入陰筋者此爲藏結死。

陽毒證

初得病一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒其病腰背痛煩悶不安狂言欲走或見鬼或下利其脈浮大而數面赤班班如錦紋咽喉痛吐下膿血五日可治七日不可治升麻湯主之。

不可作
責敗

升麻

當歸

甘草

各貳

雄黃

研壹分

桂枝 壹分

鼈甲 半兩

蜀椒 半分

咬咀水貳升煎壹升去滓溫服一盞食頃再服溫覆手足出汗汗出則解未解重作之得吐尤佳。

陽毒宜葛根龍膽湯

方在雜發
汗證中

陰毒證

初得病一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心堅強氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而緊仲景云陰毒之候如被杖喉咽痛五六日可治七日不可治甘草湯主之

不可作
煮散

甘草

鼈甲

升麻

當歸

桂枝 各貳分

蜀椒

壹分

雄黃

壹分

治陰毒反陰丹

硫黃

伍兩
研末

太陰玄精石

味醻者
研末

硝石

貳兩
研末

各

咬咀水參升煎取壹升去滓溫溫每飲一盞食頃再服溫覆中毒當汗吐之汗吐則愈不吐再服之。

用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間下硫黃又以硝石蓋硫黃都以玄精石蓋之用盞子合定令三斤炭火燒令得所勿以煙出多急取出以瓦盆合定地下四面灰擁勿令煙出直候冷

取細研蒸餅心丸豌豆大艾湯下十五丸病重加至二三十九此法甚驗喘促吐逆者人口便安服此藥三五服覺不退便於臍下一寸半灸之須是大炷百壯未愈可至二百壯若手足極冷小便澀小腹鞭汚痛囊縮卽須更於臍下四寸如前灸之乃與當歸四逆并反陰丹頻頻與服內外通逐方可解若稍緩卽死矣當歸四逆乃加吳茱萸生薑者是慎勿與尋常利小便藥此是陰毒氣結在小腹所致也有見小便不通便用炒鹽及裏熱藥熨臍下欲望小便通利其冷氣在小腹之間被熱物所熨無處通出卽奔上衝心其死速矣

又治陰毒硫黃丸

硫黃

貳兩

水銀

壹兩

同研入銚洒少醋慢火炒欲似煙出再出火洒醋如此三四遍地上放冷研之蒸餅丸梧桐子大每服二十三十九艾湯吞下日三服食前

陰毒脈沉微欲絕四支逆冷大躁而渴不止附子飲子

附子

壹枚半兩以上者
炮去皮尖四破

以水九升煎至三升去附子入瓶油單緊封沉井底候極冷取飲之仍下硫黃丸甚妙

陰毒之爲病因汗下藥性冷所變多在四五日也或素來陽氣虛冷始得病便成陰毒或始因傷風傷冷

物便成陰毒其病六日內可治過六日不可治。

狐惑證

狐惑之爲狀如傷寒或因傷寒變成斯疾其候默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面乍黑乍白上部則聲嗄甘草瀉心湯主之方在瘡證中 蝕於下部則咽乾蝕於肛門者燒雄黃薰之雄黃壹味燒薰下部 痘者脈數則熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日則兩目四眴周皆黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之 赤小豆壹升生芽曝乾浸一兩當歸一兩

細末漿水調下二錢日三服

百合證

龐曰百合病者百脈一宗悉致其病意欲食復不能食常默默欲臥復不能臥欲出行復不能行或有美食時或惡聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則增劇吐利者如有神祟者身形如和其脈微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺頭不痛漸然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或二十日或一月微見者隨證治之

治汗後百合病百合知母湯

百合 柑枚 知母 壹兩半

百合先洗漬一宿當白沫出去其漬水別以清泉水壹升半煮百合取壹升去滓又別以泉水壹升煮知母取半升去滓同百合湯煎至壹升溫分三服。

治下後百合病滑石代赭湯。

百合拾枚 滑石壹兩半 代赭半兩

先以水漬百合一宿當白沫出則去其水更以泉水壹升半煮取一升去滓別以泉水一升煮滑石代赭取半升去滓合和重煎至一升分溫三四服。

治吐後百合病百合雞子湯。

百合拾枚 雞子黃貳枚

先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水一升煮取一升去滓下雞子黃攪勻分溫三服治不經吐下發汗百合病形如初者百合地黃湯。

百合拾枚 地黃汁半升

先以百合水漬一宿有白沫出去其水更以泉水一升半煮取一升去滓內地黃汁再煮取一升二合溫溫分三服中病勿更服。

治百合病一月不解變成渴者百合湯洗之。

百合 一升·如煎洗·先瀆一宿
當白沫出·去其水·

更以水一斗煎數沸·洗周身·慎風·仍食白湯餅·但勿與鹽豉也·煮餅是切麵條湯·煮水淘過·熱湯漬食之。

渴不差·栝樓牡蠣散主之。

栝樓無黃脈者 牡蠣粉等分

細末水調方寸匕日三服。

治百合病變發熱·百合滑石散。

百合壹兩 滑石參兩

細末清飲調方寸匕日三服·當微利熱則除·已利勿服之。

百合病見於陰者·以陽法救之·見於陽者·以陰法救之·見陽攻陰·復發其汗·此爲逆·見陰攻陽·乃復下之·此亦爲逆。

瘡濕喝證

傷寒所至·太陽病瘡濕喝·此三種宜應別論·以爲傷寒相似·故此見之。

瘡

太陽病發熱無汗反不惡寒名曰柔瘡

太陽病微熱汗出不惡寒名曰剛瘡

病源云
惡寒

其證身熱足寒頭強項急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭搖卒口噤背反張者瘡病

太陽病發汗太過因致瘡

素問曰太陽所至爲癩汗瘡又云肺熱移於腎傳爲柔瘡始太陽中風發熱而故追

汗大多因而熟麻汗反爲冷濕

之氣復著太陽經故發瘡也

瘡病臥不着席小兒腰背去席二指大人側掌爲難

治療病脈弦直上下行

仲景云太陽病證其身脉几几然脈反沉遲者爲欲作瘡宜桂枝加栝樓湯

括樓不主中風強項几几其意治肺熱令不能移於脣也桂枝

湯內當加栝樓四兩瘡病不宜大發汗及針灸宜小汗之

柔瘡宜桂枝加葛根湯

葛根四兩桂枝湯內加

剛瘡宜葛根麻黃湯

方在解表證中

剛柔瘡加減葛根麻黃湯

葛根 麻黃

生薑

各壹兩

防風

芍藥

白朮 人參

芎藭

黃芩

防己

桂枝

甘草 各半
兩

附子 壓枚

咬咀水六升先煮麻黃葛根數沸去上沫內諸藥煮取二升去滓飲服一盞食頃再服日四五夜二三柔痓自汗者去麻黃加葛根成壹兩半

方在可下
門中

濕證

太陽病關節疼痛而煩脈沉緩濕痺之候其人小便不利大便反快只當利其小便宜五苓散

方在水
證中

濕家之爲病一身疼發熱身如熏黃仍治風濕脈浮身汗出惡風宜黃耆湯

黃耆

貳兩
半

防己 貳兩

甘草 壹兩

白朮

生薑

各壹兩
半

棗 拾陸個

咬咀水四升煎至二升去滓溫飲一盞食久再服喘者加麻黃壹兩胃中不和者加芍藥壹兩半氣上衝者加桂枝壹兩半下有陳寒者加細辛壹兩服後當如蟲行皮中從腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰以下令微汗出

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘔胸滿小便不利舌上如胎者此丹田有熱胸上有寒渴欲得水而不能飲口燥故也

濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止汗出已解身復痛何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈也若治風濕者發其汗但微似欲出汗者風濕俱去也

濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞細末瓜蒂含水畜少許鼻中則愈

濕家身煩痛可與麻黃湯內加白朮貳兩

麻黃湯在汗證中

病者一身盡疼發熱日晡則劇者此名風濕此病因傷於汗出當風或久傷於冷所致也可與杏仁薏苡湯

麻黃

壹兩半

杏仁

肆拾伍枚

薏苡仁

甘草半兩

㕮咀以水二升先煮麻黃一二十沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫二三服

傷寒八九日風濕相搏身體煩痛不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濶者宜桂枝附子湯此治大便自利小便不利者

桂枝

貳兩半

附子

肆枚半

生薑

壹兩半

大棗

貳拾枚

甘草

壹兩半

㕮咀以水三升煮取一升去滓分溫四服若大便堅小便自利者去桂枝加白朮貳兩煎如前法初

一二服身如痺。半日許服之都盡。其人如冒狀勿怪。此乃虎附并走皮膚逐水氣未得除故使之耳。風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之則極。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去被。或有微腫者。甘草附子湯主之。

附子 · 貳兩

白朮 · 貳兩

桂枝 · 參兩

甘草 · 貳兩

㕮咀水三升。煮取一升去滓。分溫三服。身腫者加防己貳兩。悸氣小便不利加茯苓壹兩半。溢水成四升。煎一升三合。

喝證

太陽中熱者。渴是也。其人汗出惡寒。身熱而渴。白虎湯加人參主之。方在厥陰證中。

太陽中暎者。身熱疼重而脈微。此夏月傷冷水。水行皮中所致也。瓜蒂湯主之。

瓜蒂 · 貳拾柒枚

水半升。煮取二合半去滓溫服。

太陽中暎。發熱惡寒。身重而疼痛。其脈弦而細。芤而遲。小便已。洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身卽熱。口前開板齒燥。若發其汗。則惡寒甚。加溫針。則反熱甚。下之則淋甚。宜大小橘皮湯。大橘皮湯在不可汗證中。小橘皮湯。主手

橘皮
貳兩

生薑
肆兩

㕮咀水三升煮取一升半去滓作四服稍熱呷之。

發汗吐下後雜病證

病人脈微而濇此乃醫所病大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其體所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃氣虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中躁熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知亡血也。此皆可治陽微惡寒四逆陰弱發熱爲內熱病宜苦酒艾之類

大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝湯主之

茯苓
肆兩

桂枝
貳兩

甘草
壹兩

大棗
捌個

㕮咀以甘爛水五升先煮茯苓減一升內下諸藥煮取一升半溫溫作三服。

作甘爛水法

取水貳升置大盆中以楊柏枝擊水上又有珠子五六千箇相逐取用之。發汗或下後痞滿或成寒實結胸氣塞不通宜檳榔散。

檳榔 貳個 · 一生

細末酒二盞煎二盞四分作兩服溫飲之兼治丸厥心腹刺痛南海本草治膀胱氣佳

龐曰因發汗時汗出如水漏下還復汗少喘促不止脈促而按之濡者合當汗而解脈促而按之實者死若脈浮手足微厥面垢脣青晝憒而喘者陰陽未和尙阻升降宜服順陰陽五味子湯

麻黃 半兩 人參 五味子 麥門冬

杏仁 橘皮 生薑 各一 分 聚 染枚

咬咀水二升煮七合去滓通口服一盞未差再作二三服手足厥甚者厚衣護其厥

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者宜乾薑附子湯不可作
散

乾薑 壹兩 附子 壹枚生

咬咀水一升半煎至半升時飲一小盞食久再服

傷寒著吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振振搖者宜茯苓白朮湯

茯苓 貳兩 桂枝 壹兩 白朮 甘草 各壹兩

咬咀水三升煮至一升半去滓分溫四服

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛倒心中懊惱晝夜梔子湯主之少氣者加甘草嘔者加生薑

梔子香豉湯

肥梔子 貳拾枚 香豉 兩合綿裹

水二升煎梔子至一升三合下豉取七合半去滓每進一盞得吐止後服。

梔子甘草湯前湯內加甘草壹兩同梔子煮後下豉如前法加水半升。

梔子生薑湯前方內加生薑貳兩半同梔子煮後下豉同前法加水半升。

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者欲解也屬梔子香豉湯主之。

下後腹煩滿起臥不安者梔子厚朴湯主之。

梔子 八個大者 厚朴 貳兩 枳實 二枚

咬咀水二升煮一升去滓溫飲一盞。

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩梔子乾薑湯主之。

肥梔子 八個 乾薑 壹兩

以水一升七合煮取八合去滓分溫三服。

凡用梔子湯得効卽止後服病人舊有微溏不可與之發汗若下之而煩熱胸中窒塞者梔子湯主之。

傷寒五六日已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。煩者。此表未解。柴胡桂枝乾薑湯主之。

桂枝 黃芩各壹兩半 柴胡肆兩 桔梗根貳兩

乾薑 甘草各壹兩半 牡蠣肆兩

㕮咀水六升煎至三升去滓再煎一升半溫溫時飲一盞食頃再服。

傷寒發汗若吐下解後心下痞鞭噦氣不除者。旋復花代赭湯主之。

旋復花 甘草各壹兩半 人參壹兩 生薑貳兩半

代赭朱半兩 薏苡三枚 半夏壹兩半

㕮咀水五升煎三升去滓再煎取一升半溫分四服。

傷寒若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩飲水至數升者白虎加

人參主之。證中 方在厥陰

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讝語身重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯主之。

柴胡貳兩

龍骨 黃芩

生薑

鉉丹

人參

桂枝 苓芩

牡蠣

各叁

半夏壹合

大黃
· 壓兩

棗
· 陸個

咬咀水六升煎取三升下大黃切如棗子塊更煎取貳升去滓溫飲一盞。

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中治中焦此利在下焦以赤石脂禹餘糧湯主之復不止當以五苓散利小便五苓散方在水證中。

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧各入兩

水四升煮取二升去滓溫飲一盞。

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之。

桂枝甘草各二兩白朮人參乾薑各一兩

咬咀水五升先煮四味取三升內桂更煮取一升去滓溫分三服。

發汗後腹脹滿者厚朴人參湯主之。

厚朴四兩

甘草壹兩

生薑四兩

半夏壹兩臺分

人參半兩

以水五升煮取一升半去滓溫分三服。

治頭痛壯熱心中煩黃芩梔子湯。

黃芩

梔子

石膏

乾葛

各壹兩

豉半兩

葱白

半斤寸切

傷寒發汗後或未發汗頭痛如破宜葱白湯。
咬咀水四升煮取一升半溫溫作三四服始得病便如前證亦可服治夏月傷暑毒殊驗。

連鬚葱白

半斤寸切

生薑

貳兩

水二升煮一升去滓溫溫作二三服。

服前湯頭痛未解宜葛根葱白湯。

葛根

壹兩

芍藥

芎藺

知母

各半兩

葱白

壹兩寸切

生薑

壹兩

咬咀水二升半煮取一升去滓溫溫分減服。

傷寒頭痛立効荆芥散

天南星

草烏頭

肉白者

荆芥穗

各半兩

石膏

壹兩

細末每服二錢半陳茶一錢薑汁半呷薄荷三葉水兩盞煎至八分溫溫相次三服。
傷寒嘔吐不止惡寒脈細或浮遲宜理中丸兼治霍亂吐利及傷寒後發熱水停喜睡者。

人參

乾薑

甘草

白朮

各等分

細末蜜丸雞子黃大每服一丸百沸湯一盞化令細煎三五沸溫服之霍亂臍上築者不宜朮可作湯去朮加桂一兩半水三升煎取八合稍熱服之吐甚去朮加生薑一兩半作湯煎如前法飲熱粥一椀微溫覆之勿發揭衣被有寒腹滿痛或四肢拘急或下利轉筋加生附子二枚作湯服之

治傷寒嘔吐欲死生薑半夏湯

半夏

壹兩半

生薑

叁兩

水三升半煮一升去滓溫溫分四服

治嘔吐發熱脈滑數或洪者茅根湯

茅根

半升

麥門冬

武合半

半夏

壹兩半

人參

半兩

茯苓

半兩

生薑

武兩

㕮咀水五升煎一升半去滓溫溫分減服

霍亂腹痛發熱身疼多飲水者宜五苓散

方在水證中

傷寒發熱自利脈浮大數及鼻血或嘔者宜黃芩芍藥湯

黃芩

壹兩半

芍藥

甘草

各壹兩

咬咀水五升煮取一升半去滓分四服。嘔者加半夏一兩一分生薑一兩半煎服。

治傷寒熱痢或兼腹痛黃連當歸丸。

黃連

當歸
各一兩

乾薑

赤石脂
各一兩

細末蜜丸梧桐子大米飲吞下二三十九日三夜二服。

傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之薤白梔子湯。

豉
綿裹半升

薤白
壹握

肥梔子
大者一粒個

水三升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升去滓下豉煮一升半溫溫分減服必解下惡積。

傷寒汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥伸吟錯誤不得臥此藥解熱毒除酷熱不必飲酒劇者療五日中神効黃連黃蘖湯。

黃連
壹兩半

黃芩

黃蘖
各一兩

肥梔子
拾貳個

咬咀水三升煎一升二合去滓溫溫分減服未差更作。

傷寒四日而大下熱利時作白通諸藥多不得止四順湯熱白通湯苦溫除熱止利莫若黃連熟艾湯。

黃連

黃蘖
各一兩

龍骨
壹兩

熟艾
兩雞子大

咬咀水四升煮一升二合去滓分減溫服。

龐曰。凡冷利皆宜四逆。冷利臍下必寒。水穀黃白色或青黑也。熱利臍下必熱。利黃赤色也。天行熱毒下利赤白。久下。膿血及下部毒氣當下。細蟲如布絲縷大或長四五寸。黑頭銳尾。宜麝香丸。

麝香 壹錢 附子 雄黃 丹砂 乾薑

巴豆 各貳分

巴豆 各貳分

此方本無巴豆。是古方脫去。服之不効。今增巴豆。試之甚驗。

傷寒後咳嗽肉豆蔻湯。

肉豆蔻 壹個

石蓮肉 炒

茴香 各壹分

丁香 半分

生薑

人參 各貳分

枇杷葉 伍片毛炙拭去

龐曰。傷寒汗後咳嗽不止。是陰陽氣升降欲作汗升之不上。降之不下。故胃氣上逆而咳嗽無休止者。宜良薑方。

橘皮

良薑

桂枝

當歸 各壹分

麻黃 半兩

檳榔 叁個

杏仁 貳拾個

甘草 壹分

生薑 壹分

大棗 拾個

咬咀水二升半煎至一升去滓下檳榔末又煎三沸去滓通口服一盞未已再一劑時行頭痛心如醉狀面愛向黑處不欲見人此爲壞熱不散速行大青湯與服不爾狂走趕人大青湯。

大青葉

秦艽

吳藍

升麻

薺草

栝樓根
各貳分

甘菊
壹分

石膏
叁分

竹瀝
貳合

朴消
三分

哎咀分二貼每服一貼水二升半煎至一升二合去滓下竹瀝朴消分溫四服肉色黃加茵陳六分面似火加梔子十四枚加水成三升煮取一升半溫飲一盞

七八日熱盛不解苦葶藶湯

苦酒
壹升

苦葶藶
壹合

生艾汁
半升

同煎至七合作二服此療內熱病有牛黃一刀圭尤良阮河南曰今諸療疾多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有必欲求之轉以失時而苦參青葙苦葶藶子艾之屬所在盡有之除熱解毒最勝向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但少促其聞耳無不解者

苦酒即米醋也

龐曰辛甜薑桂人參之屬是發散寒氣之藥其病未傳成內熱者爲調治之大要藥也決不可慮其酸苦之藥正治內熱病急要之藥也設當行辛甘而用酸苦設當行酸苦而用辛甘是昧於陰陽之用如此醫殺之耳其辛甘酸苦自是調治通行之要藥若論苦則忌甘論甘則忌苦雖有屢中誠爲粗工矣傷寒發黃者先用瓜蒂末內鼻中口含水搐鼻中去黃水用五苓散最良

時行一切不知身上疼痛不寒亦不熱沉沉似有所思順事多語此藏正傳熱麻人龍膽丸服此藥不死
大麻人 大黃各壹兩 柴胡 黃芩 白鮮皮
秦艽 赤芍藥 龍膽草各貳分 黃連壹分 桔子肆貳拾個

細末蜜丸如梧桐子大食後煎淡竹葉湯下三十九日與三服以大利爲度十日小差壹月平復
地黃湯療傷寒及溫病應發汗而不與發汗五內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內熱瘀血面黃大便黑者
此方主之消化瘀血甚良

生濕地黃肆兩

牡丹皮

芍

藥犀角屑

無以升麻代各半兩

咬咀水貳升煮取壹升去滓溫溫飲一盞喜忘如狂者加地黃黃芩各三分加水一升脈大來遲腹
不滿自言滿者爲無熱不用黃芩也

鼻衄或吐血下血黃芩湯

黃芩

肆兩

咬咀水三升煮一升半溫飲一盞兼治婦人漏下血不止

黃芩更佳

吐血百治不差此方療十差十大黃散

地黃汁半升

生大黃末七方寸

煎地黃汁三沸下大黃末調勻空腹服之每溫飲一小盞日三服血即止。熱病毒氣入眼赤痛生翳不見光明者大黃梔子湯。

生大黃壹兩 升麻半兩 瞿麥 甘草各壹分 梔子柒個

哎咀水二升煎至一升去滓溫作四服以利爲度難利者煎藥畢下朴消二分和服先煮諸藥至一升半乃下大黃大黃先以水漬和水下之則折熱易利。

治毒病入眼忽生赤翳或白或腫膚起或赤痛不得視光明入心肝或眼浮腫如吹汁出生膜覆珠子或內障不見物良由病後不慎酒麯炙燭五辛所致宜服此頻利之秦皮大黃湯。

秦皮 柴胡 常山 黃芩 升麻

芍藥 白斂 枳實 甘草各半兩 大黃參分

哎咀水叁升煮貳升下大黃再煎一升半去滓食後溫飲一盞熱盛者加焰消半兩湯成後下化服未差更作可至五七劑。

又方滴眼湯斑豆瘡不宣用

秦皮 升麻 黃連各半兩

細剉水二升煎至一升綿包筋頭搘湯滴入眼中頻頻用之。

下部瘡瘍雄黃散

雄黃 青葙子 苦參 黃連各分 桃仁壹分

爲散以艾汁和丸。棗核大，綿包內下部薦蓄汁更佳。冬月無艾，濃煎艾汁和爲丸，更以米飲調下。貳錢溫飲之，日二服。

治瘡瘍青黛丸

青黛 丁香 黃連等分

細末甘淀和丸。棗核大，口中含之咽汁。若下部有瘡，綿裹內下部，日含化五六十九差。牽馬丸治天行四五日下部生瘡，醫所不能治。此方主之。

附子壹分 薤蘆 桂枝 巴豆各半兩，去皮心，炒黑。

細末別研巴豆加蜜杵丸。梧桐子大，空心熱水下二丸。未知加三丸，熱在鬲上不下。飲熱湯半升，投吐之下部瘡自差。神良。

天行口瘡黃藥升麻湯

黃藥 升麻 甘草生各半兩。

咬咀水一升半煮半升，入地黃汁一合，煎半升，分二服。細呷之。

又方薔薇飲子

薔薇莖葉切一升

冬用根皮

水三升煮半升溫溫漬之去涎喉咽有瘡者嚥汁少許爲佳。

又方黃蘆飲子

黃蘆薄切小片蜜漬一宿嚼蘆汁漬瘡、

又方五倍子散

五倍子炒爲末傅之涎出吐去以差爲度。

傷寒喉中痛閉塞不通射干煎

生射干

豬脂各半斤

合煎令射干色微焦去滓取壹聚大綿裹含稍稍嚥之。

治喉咽痛塞鵬砂散

鵬砂

殭蠶

牙消

白礬

甘草

雄黃

各壹分

硝砂

半分

草烏頭尖

肆箇

細末米飲調一錢細細呷之。

古方黑龍煎治咽喉腫痛九種疾。

人參

半兩

甘草

壹兩

無灰酒

壹升

不艸皂角

肆拾條

水三升浸皂角一宿淨鎬內煎令水減半次下人參甘草細切又同煎三分耗二布絞去滓下酒更入釜煤一七半攪煎如餳稀入盃合內埋地中一宿若用時取一丸如雞頭大盃中以溫酒一呷化之先以水漱口以鵝毛點藥入喉中掃之有惡涎或自出或下腹可兩三度引藥方歇良久令吐候惡物出盡了令喫少許水浸蒸餅及軟飯粥壓之次含甘草一寸嚥汁忌炙燙胡餅豬肉淹藏等物如木舌難下藥以匙按舌用藥掃喉中

九般名

急喉閉

纏喉風

結喉

爛喉

重舌

木舌

遁蟲

艸喋

飛糸入喉

元祐五年自春至夏秋蘄黃二郡人患急喉閉十死八九速者半日一日而死黃州潘推官昌言親族中亦死數口後得黑龍膏救活者數十人

龐曰急切亦不候合此膏用古方以意處之但得不艸皂角一兩條槌碎水三升半浸少時揉汁去滓下草一分人參一分同煎作稀膏勿令太稠乃下後藥

霜梅上白鹽 硼砂 焰消 各等 分

三味生研用前膏斟酌和勻可以捕得爲度每以鵝毛搘少許如前法捕喉中甚効其將息次第亦如前法此膏得力尤速若日久膏乾以甘草水化之病差後胸喉外生瘡勿疑無鹽梅以白鹽代

天行手足腫疼痛欲脫者濃煎虎杖汁漬之

天行後毒氣手足腫痛欲脫必作癰膿升麻大黃湯

升麻 木通 白斂 各等 分 黃芩 荀藥 各一兩

甘草 大黃 半兩

咬咀水叁升煮二升半下大黃煮一升半溫溫飲一盞利下爲度

傷寒勞復證

病新差後氣血津液衰耗慎勿爲諸勞動事凡言語思慮勞神梳沐澡顙勞力則生熱而復病如初也又新差後精髓枯燥切不可爲房事犯房事勞復必死魏督郵顧子獻病差後華敷囑之慎勿爲勞事餘勞尚可女勞卽死此是女勞復非陰陽易也素問云病熱而有所遺者是新差後腸胃尚弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差強人足兩月虛弱人足百日則無復病矣

天行勞復頭痛四肢疼葱豉湯

葱白
豉
半升

水二升半煎葱爛去滓入雄鼠屎三七枚末之和勻分再服未差更作天行勞復作熱且至晚則腰背痛頭項強重葛根薑豉湯

芍藥
生薑各一兩
半
豉
葱白各二合
半
葛根
一兩

咬咀水三升煎二升下豉煎一升半去滓溫飲一盞

大病差後勞復枳實梔子湯

枳實
壹分
肥梔子
個
拾貳
香豉
半升

漿水三升煮枳實梔子二升下豉煮一升半去滓溫飲一盞溫覆微汗食復者加大黃茱子大七枚

同煎服之愈

療傷寒已差勞復如初脈浮無汗者桂枝梔子湯

自汗者去麻黃

梔子
個
拾貳
豉
半升
桂枝
麻黃各一兩

咬咀水三升煎至二升下豉取一升半去滓溫飲一盞溫覆取小汗差

療傷寒勞復如初自汗出者脈浮滑煩躁甚宜此方

梔子石膏香豉湯

梔子 拾陸 個

石膏 肆兩
· 純綿裹 ·

香豉 壓兩

水三升先煮二味至二升半下豉煮取一升半去滓溫飲一盞

一法湯成入雄鼠矢二七枚末良

病未平復後勞動致熱氣攻胸手足拘急搐搦如中風狀瓜蔞湯

瓜蔞根 肆兩無黃脈者 · 淡竹茹 半斤

水三升煮一升二合去滓日二三服溫與之

婦人病未平復因夫所動小腹篋中急痛腰胯疼四肢不任舉動無熱證者附子黃耆湯

白朮 白朮各半
當歸 · 黃耆 叢分
桂枝 生薑 壓兩
附子 甘草 芍藥

咬咀水四升煮至一升半去滓通口服一盞食久再服溫覆取小汗

男子勞房成復病鼠屎湯

薤根 壱升 獭鼠屎 貳拾壹個爲末 · 矢頭尖硬者是卽牡鼠也

水三升半煮薤根至一升半去滓下鼠矢末再煎三沸溫飲一盞相次三服衣覆必有黏汗爲効未

汗再作一劑兼治陰陽易神驗

男子房勞復發熱口噤臨死舌出數寸又始得病百節痛如被打渾身沉重恍惚失措脈促而絕不可治

或有吐涎不止。或有譫妄煩亂者。皆不可治。

天行差後勞復發熱。嘔吐食不下蘆根湯。

蘆根

半升

生薑

貳兩

橘皮

枇杷葉

各壹兩

㕮咀水三升煮一升半去滓溫飲一盞大故心煩躁加石膏貳兩加水一升煮二升。

陰陽易證

陰陽易病者。陰陽相感動。其毒氣着人如換易也。男子病新差。女子與之交。女子得病名曰陽易。女子病新差。男子與之交。男子得病名曰陰易。若二男二女則不相易。然女犯男得病鮮有死者。男犯女得病救稍緩。則十無一人得生者。若女犯男。男自發勞復。則女不病。男犯女。女自發勞復。則男得病亦輕。富貴之家。雖知其事。後生輕於自恣。犯之多致不救。田野之人。蒙昧只知傷寒能死人。因此病死者十有三四矣。皆不知其所犯之由深可傷也。男子女人陰陽易病。其狀身體疼痛。熱上衝胸頭重不能舉。眼內生眵。四肢拘急。小腹絞痛。手足拳則皆死。其亦有不卽死者。若小腹裏急。熱上衝胸頭重不欲舉。百節解離。經脈緩弱。血氣虛骨髓竭。便吸氣力轉少。着牀不得動。起止仰人引。歲月死宜此方。足甲棍灰散。
取交接婦人手足甲二十枚。棍近隱處一尺同燒灰燒。或米飲調下二錢。日三服。陰頭微腫。小便利爲愈。若未愈。灸陰頭一百壯。便差。陰頭在毛際間。提陰向上。當頭是穴。

女子陽易則取男子手足爪甲根近隱處。如前燒服之。可灸毛際橫空上。中央曲骨。一穴百壯。
男子陰易如前法灸。若陰卯縮未下。灸足大拇指旋毛上。小炷七壯。是大敦二穴。男女初得陰陽易
病。便服薤根鼠矢湯。出汗有驗。

傷寒口乾喜唾方

大棗肆拾枚。煮去皮尖。

烏梅肥者拾個去核爲末。

右以棗肉和爲丸。含化自然汁。

