

德

世醫得效方卷第十二

。小方科

火丹

瘰癧

平血飲治風熱積毒聚成發於頭面手足熱者如胭脂色其熱如火輕輕者手痛不可忍加紫草煎與犀角消毒飲相間服赤瘰癧紫瘰癧並治壯熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴消各半錢方見後瘰癧科諸瘰癧

因

紅內消

當歸

茹片

甘草節

羌活

黃芩

麝香

各半兩
半錢

右爲末每服一錢茹蒂煎湯調成或生地黄亦可

敗毒散 治瘰毒初發如白梅樣遊走遍身燥悶腹脹焦喘

每服貳錢水壹盞生薑亂片紫草少許煎溫服方見大方

通治平血散 與敗毒散合和生薑薄荷青蠶退去足翼防風

去蘆細切煎湯加天花粉少許

反方 角瘰遊走不定掀然赤腫疼痛用藥角歸手足上爲

妙後取碎

寒水石 石膏

黃連

黃柏各壹兩

右爲末水調刷

反方 青黛土朱爲末井水調入蜜數角亦可

反方 黃丹不拘多少磨刀水調刷

瘰毒腫痛如火用大黃末消爲末調塗腫處立效

苦生地黄松葉萍梳子皆可研爛水調傳

反方 用防風酸車草赤白龜心土煎水洗

反方 洗角後用小鷲圓壓邪大鷲圓鎮鷲方見前

鱗釘法 取碎用水蜚數條以青苔蓋覆或濕紙亦可去血

即消未消再用瘰毒滿身徧黑入腹入陰難治

諸疳

大艾神圓 治心疳面黃臉赤煩滿壯熱心燥口瘡虛驚

益黃散 治脾疳體黃肚大愛喫泥土脹滿氣壅利下酸臭

方見後

生熟地黃湯 治肝疳搖頭揉目白膜遮睛流汗合面而臥

肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦

生乾地黄洗熟地黄洗淨

川芎

半赤茯苓去穢

杏仁去皮尖川黃連去鬚

半夏麩天麻

地骨皮 甘草炙

當歸各式水半

右劉散每服貳錢生姜二片黑豆十五粒水煎臨卧服

清肺湯治肺癆咳嗽氣逆多喘揉鼻咬甲寒熱

桑白皮炒兩紫蘇

北前胡 黃芩

當歸去尾天門冬去心連翹

防風

赤茯苓 北梗

生乾地黄 甘草炙

散每服二錢水一盞煎溫服不拘候

治腎疝極瘦身有瘡疥寒熱作時頭暈熱物冷

生乾地黄切錢

乾山藥 山茱萸錢四

澤瀉 牡丹皮

白茯苓去皮

右為末煉密圓梧桐子大每用一二圓化開服

連圓治熱疝潮熱如火大便澀

胡黃連 川黃連各半朱砂壹錢半

右黃連為末和木砂入猪膽內繫定虛懸於錢巾煮一

炊入取出研蘆薈青黛乾各二錢半去足蝦蟇灰二錢

麝少許糗米飯圓麻子大每服十圓食後米飲下

五福散治熱疝肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米飲

化下方見則

至重寶 治冷痺時時油瀉虛汗不止

丁香

丁香皮 各壹錢

木香

紫厚朴

史君子肉 焙橘紅

肉豆蔻

各壹錢

右為末神麩糊圓麻子大每七圓食前米飲下

銅青散 走馬疳口内生瘡牙齦潰爛齒黑欲脫或

臭氣丈夫婦人同

川白芷

生 半兩

馬牙

硝 壹錢

銅青

壹分

右為末乾博口角及擦齒上妙仍服蛙酥圓效

圓活 蛔疳圓食肉太早或腸胃停蓄肥膩為蛔其

症嘔吐清沫腹痛脹滿唇口紫黑腸頭及齒痒

新白苦棟根皮

酒浸焙

綠色貫衆

木香

桃仁

浸去

燕美

各壹錢

雞心檳榔

錢

鶴虱

輕粉

半錢

乾蝦蚶

錢

史君子

錢

五十箇

右為末飛羅麩糊圓麻子大每二十圓天明清肉汁下

內加當歸川黃連各二錢半治脊疳兼疳疔可擇用

大蘆葍 治脊疳虫蝕脊脊身熱羸黃煩熱下痢脊骨如

鋸齒十指背瘡頰齒指甲

蘆葍

無美

木香

青黛

檳榔

川黃連

錢

蠅退

錢

麝香

胡黃連

右為末猪膽二箇取汁浸糕圓麻子大每服二十圓米

飲下

龍腦圓 治腦疳頭皮光急滿頭餅瘡腦熱髮結身汗顯腫
顯高

龍膽草 川升麻 苦楝根皮焙 防風

赤茯苓 蘆薈 油髮灰 青黛乾

黃連淨 各三錢

右為木猪膽汁浸糕糊圓麻子大每二十圓薄奇紫蘇
泡過下食後仍以蘆薈末入鼻

黃連去麩 治乾疳瘦悴少血舌乾目睛不轉乾啼身熱手足
皮燥大便乾結搭口癡眼乾渴

黃連去麩 白蟬頭 草龍膽去毒 青橘皮去穢

玉倍子 蟾頭 夜明砂炒 苦楝根

雄黃 麝香 青黛 天漿子

熊膽 蘆薈 胡黃連已上各壹分

石為末研令勻糯米糊和圓麻子大一歲兒每服一圓
不計時候米飲下日進三服尤佳一方有乾蝸牛微炒

白木散 又名**清靈散** 治疳渴煩燥引水乳食不進夜則渴

甚加烏梅陳米疳瀉停積宿滯水穀不聚頻泄不效加肉
豆蔻呵子方見前

木香圓 治疳痢冷熱不調五色雜下裏急外重

黃連淨 木香 紫厚朴去蘆皮

縮砂仁 夜明砂隔紙炒 訶子肉炒

右為末粳米飯圓麻子大每服十五圓乾艾葉生薑煎湯食前溫下

得圖 治疔腫脹因虛中有積腹肚緊脹頭面虛浮

蘿蔔子炒 陳皮 青皮 好檳榔

黑牽牛取仁半生半炒 北五靈脂 赤茯苓

蓬義木各半兩 木香各半兩

右為末飛羅麩糊圓黍豆大每服十五圓紫蘇桑白皮煎湯下

煎湯下

黃耆湯 治疔癆喘喘不定虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲

黃耆蜜炙 當歸 川芎 白芍藥

生乾地黄 蝦蟇去足炙焦 鱉甲醋炙焦 人參

白茯苓 橘皮 半夏麩 北柴胡

史君子各三錢 甘草各三錢

右劉散每服貳錢水一盞薑二片棗一枚煎食前服

散 治疔癆

人參半兩 川芎 蕪荑 北胡各三錢

史君子各三錢 胡黃連 川黃連各三兩

右用鱉血一盞吳茱萸一兩拌和二連淹一夜以早炒乾透出茱萸并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊圓麻子大每服二十圓食前熱水下

破圖 治腦後項邊有核如癰癧狀按之轉動軟而不疼

名無辜疔毒兼治諸疔一服虛熱退二服渴止三服瀉痢

住

蟾蜍 壹枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴者其身癩者名

右取糞虫壹杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走却將蟾蜍殺之頓在虫中任與虫食一日夜次以新布袋盡包繫定置之急浸一宿取出瓦上焙為末入麝一字糲飯揉圓麻子大每服二三十圓米飲下

一方白蕪美黃連胡黃連青代黑各半兩蚶殼一箇只用酒浸炙去骨為末麪糊圓粟米大每服三十圓食後服日米飲下日三服立效

治無辜疳

右以夜明砂炒為末入諸飲食中與之

通泄太過成疳 治諸疳殺虫止腹痛退虛熱大效

蟾酥 壹箇酥油炙去骨

切黃連

宣連 去鬚

龍膽草

陳皮

川練子 去核

木香

史君子 去殼

蕪荑 各壹兩

鹿麝 半錢

巴豆 貳粒去油

茴香 壹兩炒

右為末猪膽汁圓或糊圓青黛為衣常服蘇湯下

肥兒圓 治諸疳多因闕乳喫食太早或因久患臟腑胃虛

虫動日漸羸瘦腹大不能行髮敗發熱無精神

黃連

神麪 各壹兩

大麥蘖 半兩

木香 二錢

檳榔 二個不見火

史君子肉

肉豆蔻

麝 半兩

右為末麩糊圓羅蔔子六每服三四十圓量兒歲數加減熟水吞下

六神圓 捉疳止瀉

丁香

木香

火煨令熟 熟為度

訶子

史君子

麩膏

各壹兩 細研入

右為末棗肉圓麻子大每服五圓至七圓温米飲下乳食前服

五合圓 治疳傷肚大

青皮

去白 焦黃 乾薑 存洗

北五靈脂

蓬莪朮

各壹兩

右為末搜和秤藥末一兩用肥巴豆肉去油秤一錢研細拌和粳米飯圓麻子大每三五圓米湯不飢飽時下

連日膠圓 治諸疳作熱頻瀉每服二十圓米飲下

天方科 咳散類

疳疔不

右以肥兒圓每服十五圓用蘇合香圓一粒入朱砂五靈脂末各少許石菖蒲煎湯調開下

疳疔黃連圓 治疳疔首孩提至弱冠潮熱發瘡乃疳氣使

然疳虫食其肌膚空虛疳熱流注遍身熱瘡疥飲無已

蟾酥圓 相間服尤效

雄猪肚

壹具 淨洗

鷹爪黃連

去毒 七兩

右剉作小截少水和納猪肚中用線縫密頓在五升粳米上蒸十分爛取放臼中入此蒸飯搗千餘杵粘實得

所衆手捏圓如小菘豆大每服二十圓米飲下童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黃茯苓神與之調血清心熱多者間服生犀散方見前二十歲以上潮熱發瘡是為虛勞皆一種病也用藥同前凡兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣

洗方

右用大腹皮苦參川白芷為劉散煎湯淋洗妙

又方

甘草黃柏馬鞭草帶霜葱荊芥煎水洗後却用阿膠連肉核燒灰入麝香輕粉少許和勻傅瘡上效

傅藥

治疳後虛熱小便腫

右以韭菜地尤糞煨為末出火毒清油調傅

法

治無辜疳腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼

疳有虫如

米速烘之則虫隨熱氣流散

腫以致肢體作癰瘡便利膿血壯熱流瘦頭露骨高皆因氣血虛憊所致用針刺破以膏藥貼則愈或因溼淫兒衣露於疹下為雀鳥落羽所汚兒著此衣虫入皮毛亦致斯疾凡曬兒衣須微火烘之

丁突哺露

十全丹

治小兒手足極細項小骨高尻削體瘦腹大疳突

號哭胸陷或生穀癥是名丁突虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露二者皆因脾胃久虛不能消化水穀以榮血氣致肌肉銷鍊腎氣不足復為風冷所傷柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之

疾並難治宜服

青皮去穢

陳皮去白

蓬朮煨

北五靈脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

蘆薈各半兩

木香

史君子肉煨

蝦蟇灰各一錢

右為末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服二十圓米飲下

有熱薄苛湯下

疰病

龍騰膏

治孕婦被惡虫所道其腹中令兒病也其證下利寒

熱去來毫毛鬚髮不悅

及治婦人有兒未能行時復有

孕使兒飲此乳亦作此病

龍騰草

北柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

甘草炙

茯苓

蟻蝦去穢

大黃壹兩

右劉散以水壹升煮取五合為一劑十歲已下小兒皆

可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十五

日分一合半為三服生十六日至二十日分二合為三

服二十日至三十日四十日盡以五合為三服皆以得

下即止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者以次依

此為例必知客忤及有鬼氣可加人參當歸各二錢半

一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲兒加

半兩餘准此

積滯

葱湯圓治積神效

巴豆三十五粒用水浸去毒五更初去輕粉半錢

滑石五錢 鷹糞五錢

右為末研飯為圓如粟米大周歲以下每用三圓以上四圓未效再加圓數膈上有涎或吐亦無妨如有虫用苦棟皮少許甘草二寸煎湯五更初先將化虫藥服了後用此取下春季燈心湯下夏季蘇鹽湯下秋季蘇湯冬季葱白湯下初生兒以一粒放口中乳汁下

消積圓治乳積吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼哭未已以乳與兒停滯不化得之

丁香

烏梅取肉

巴豆十四粒去油壳 縮砂仁各五分

右為末麩糊圓每服七圓米飲下

化積圓治食積肚硬帶熱渴瀉或嘔皆因飲食無度多食過飽飽後即睡得之

烏梅取肉

巴豆十六粒去殼

青皮五分去核

陳皮五分去白

右為末米糊圓粟米大每服七圓米飲下化積亦消

疳積圓治食積面目腫黃肚熱脹痛覆腫

多困酷啼不食或大腸乾澀小便如澁或便利無禁糞白酸臭服之大效方見大方科諸積及痰瘰癧

蘇合圓治氣積腹痛啼叫利如蠟湯皆因觸忤其氣榮衛

不和淹涎日久得之蘇合香圓感應圓冬等分和圓如粟米大紫蘇湯下三十圓立效方見方科中氣諸類

異香散 取積後調理

石蓮肉壹兩 蓬義木 益智仁 京三棱

甘草各六兩 青皮去穢 陳皮各三兩 厚朴薑汁炒

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚鹽少許煎通口服鹽湯點鹽酒調亦可不拘時服

砂香附湯 平胃散 合和滋氣和胃消積每服一錢蘇

下多服尤妙方見大方

殺虫

口餅 治因喫食麤肥甘生熱肌瘦躰虛口吐清涎唇

腹中絞痛口鼻中出黑色虫不治

史君子四十箇 雷九半兩 定粉一分

輕粉半錢 青箱子 鶴虱壹分

為末用雞鴨卵和蒸為餅先將此藥隔日夜五更服將煎湯圓取方見前

子湯 每服二錢苦煉根少許煎湯調服近病亦效前

鱉圓

鶴虱云土 胡粉 檳榔 白礬半生

苦煉根皮各半兩 蕪美 黃連

酸石榴皮各壹分

右為末以糊圓如麻子大一歲兒三圓將水入香油三五滴下其虫小者化為水大者自下如雷丸或用猪瘦肉湯下

碧金散 治蛔虫寸白蟲

苦煉根 壹兩 鶴虱

檳榔 各半兩

猪牙皂角 三錢

史君子仁 半兩各

好青黛 半兩 麝香 壹分

右同研勻每服壹字用淡猪肉湯食前調

史事神效 治因喫物龐肌膚消瘦虫生腹中極痛不可忍

真胡粉 壹分 檳榔

川煉子 炒去核 鶴虱 各二兩

白礬 二錢半 生丹

右為末米飲調痛時服空心未洗面前服或圓如麻子

大小兒多有諸虫臟腑虛弱食肥甘則動腹痛叫哭到

身撲手嘔清水涎沫面色青黃飲食不進不生肌膚成

寒熱或沉沉嘿嘿其虫不療相生不已長一尺則能客

人一歲兒五圓温漿水入清油一二點打勻温米飲下

其虫小者化為水大者自下

敬馬吐 治吐如面色青霍香煎湯化開服 方見

疝疔 治吐并效 吐

硫黃 半兩 水銀 壹分

右同研無星黑色量大小一字至一錢已水小點以指

緩緩進湯添湯調方可服吐立止兼治大人反胃妙

冷吐 治脾胃冷作吐每服二錢水一匙生薑薑紅

東棗煎温服方見 **白** 亦效方見前

蒸吐治 蒸熟久傷臟腑作渴發吐每服一錢燈心
霍香葉煎溫服方見前

延生治 胸膈停痰作吐方見大方 一方單用半
夏泡七次為末薑湯下效亦能止瀉有熱者

柴胡湯方見大方 治脾胃停食不化所吐酸臭生薑烏梅
積吐治 脾胃停食不化所吐酸臭生薑烏梅

風吐治 胃脘生風嘔吐用黃利葉一皮煎湯化開
美成治 胃脘生風嘔吐用黃利葉一皮煎湯化開

半錢治 胃脘生風嘔吐用黃利葉一皮煎湯化開
吐乳

治吐乳兼下痢不止雪糕圓粟米大米飲下二十

方見大方

掌中圓治 藥物喫乳便吐下水乳不得飲食不下者

白豆蔻十四箇

甘草生半斤 縮砂拾肆箇

右為末逐旋安掌中与他乾噉牙兒乾搽口中

丁香散治 吐乳傷食

丁香 石蓮肉 枇杷葉生薑自然汁

右為末每服一錢米飲調下

治外感風寒濕作嘔每服二錢水一盞生薑

二片木瓜一片煎服效方見大方

濕熱不時暴嘔治 生薑二斤薑香少許煎方見大方

香薷散 治生時洗上牽延或嘔加半夏湯洗葱白生薑各
少許煎方見大方

交精吐涎 **四君子湯** 加藿香木瓜煎湯服又治經年吐涎
不停或成片段眼慢重多穢氣有筋膜迺父母交感時喫
乳所致方見后 **保嬰圓** 方見前 兼用

成脾風方

右以靈砂一粒青州白圓子三粒同研末米飲調下量
大小与之吐久虛甚者對用靈砂親試有效靈砂大方

青州白圓子方
見風科通治類

又方 蓮心二十一箇香附子三箇吳茱萸七箇丁香七箇

一麩新瓦上炒黃研為末以乳汁調付乳頭上令兒吮

食及養育有驗

霍亂

總說吐瀉起於脾胃不調陰陽不順清濁相干或感風冷

之氣傷於脾胃胃氣不調故嘔不食脾氣虛弱臟腑不
調故泄瀉有脾虛傷

熱嘔吐發瀉夏月嘔吐發瀉為霍亂因胃熱引飲停留

胃氣吐瀉發熱用香薷散大凡吐瀉不可便下止吐瀉

藥先調脾胃氣秋冬之間多是傷食生冷過度外感風寒

多瀉發熱當用醒脾散但吐不瀉因傷黏物滯脾有胃

熱嘔吐渴水不休有胃冷嘔吐面青白四肢逆冷大凡

吐瀉先調脾胃氣此大法也

白朮散治胃氣不和脾氣虛弱發為吐下每服一匙水

生薑二片烏梅半斤紅棗一枚蘇枳三寸煎溫服方見

治陰陽不調或感風邪暑毒霍亂嘔瀉不止每服

三匙蘇枳木瓜食鹽湯調服未效加生薑自然汁少許

用生薑自然汁為圓麻子大量兒大小米飲下效

治夏秋冬暑冷相搏嘔泄不止每服二匙水一匙

生薑二片木瓜一片煎溫服方見

治傷暑伏熱躁渴發熱頭目眩身熱煩滿嘔噦

惡心口苦舌乾肢躄困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

宜服方見治陰陽不和脾胃虛損吐下不止凡吐瀉五月內

九分下一分補八月內九分補而一分下有熱者先用補

脾後近世竹葉石膏湯王之次用水銀硫黃末王之生薑

水調下但霍亂一證吐利交作蓋由飲啖生冷或胃熱之

氣中腕節閉揮霍交亂用此能通暢三焦分理陰陽兼治

反胃嘔吐中暑方見最為切當方見石膏湯方見大方科方傷寒類

若因虛發熱必作慢脾風用米飲調下特效須多服若胃

氣已生則旋減命液却以方見加陳皮名異方散徐

徐調理方見大方異功散方見前

治霍亂

右以牛涎一合灌下立效陳大麥濃煎湯洗手足上

服濃汁一二合自愈

灸法 男左女右第二脚指上如菘豆大艾炷灸三壯即愈

泄瀉

鷲瀉 **安神圓** **小鷲因** **白木散** 治瀉下青色 方並見前

疳瀉 **白木散** **鹽酥圓** **史君餅** 治所瀉爛如泥肚緊 方並見前

精瀉 **神瀉圓** 治瀉下極臭 腹痛 方見 服後次用 **益黃散**

執瀉 **安瀉散** **縮瀉散** **香附湯** 補脾即安 方並見 脾胃類

二系並用燈心拾草市前草二根煎服

冷瀉方 治臟腑極冷瀉出如破水 **白木散** 欲變候用

白木散 治瀉下或脾氣虛 **益黃散** **五心散**

魚極黃錢或設服冷藥脾虛生風成慢驚 **生薑防**

服揚下瀉極用 **金夜** 為末陳米飲下立生 方並見前

懼中易 治冷瀉不止每服一錢麥湯或鹽湯 方見大方

虛瀉散 治腹痛瀉瀉腸胃虛冷

肉豆蔻 吉豆按刺壹小孔內滴 乳香白香薷麩果棧熱

右為末每服一錢米飲調下

冷熱不調瀉 **和**

木香 當歸 川芎 北前胡

柴胡 青皮 北梗 甘草炙

赤茯苓 冬等方

右判散每服一錢水一盞生薑二片棗一枚煎空心服

此散 治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮紅

養臟湯 治面黃肌瘦齒消脫骨力弱小腹痛泄多白膿

右用三圓為末火鐘乳粉半錢以炒破故紙一錢半生

肉豆蔻一錢大棗二枚煎取清汁乘熱調空心灌下

大方科痢冷類

梅月天時行瀉香葛湯每服生薑二片豆豉佳粒水壹盞

煎方見大方科傷寒類

下痢

治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮紅

地榆 甘草 各等分

呵子 甘草 各等分

為末每服一錢培粟湯調空腹服

又方

地榆 壹錢 甘草 二錢 芍藥 壹錢 當歸 貳錢

右剉散每服壹錢水壹盞煎溫服

小黃連阿膠圓

治腸胃有熱大便秘澀疼痛啼下痢赤

黃煩燥多渴腹痛小便不利乃積熱蘊毒為之圓如粟米

大方見大方科散類

嬰粟殼 去殼半生半炙

生薑 半生

黑豆 壹合 甘草 半生

右剉散每服貳錢熱煎溫服如嘔食不入加入參少許

天竺胡湯

治下痢古黃口燥胸滿作渴身熱腹脹譫語此

必有燥屎服此下之后與止藥

見方利湯定類

木香散

治白痢因腸胃虛弱受於寒氣所下不止腹痛不

食之效

木香

炮壹分

厚朴

薑汁炒

龍骨

當歸

洗淨

乾薑

炮

呵子肉

各壹分

右剉散每服貳錢水壹盞生薑二片棗一枚煎溫服量

大小加減

附子圓

治滑冷下痢不禁

厚朴

附子

乾薑

陳皮

各壹兩

右為末糊圓粟米大每服三十圓米飲下日二服

香蓮圓

治赤白痢皆氣血不和為寒濕所傷冷熱相乘

赤下白或赤白相雜

裏急后重圓如粟米大

卷臍湯

治同下方見大方

小駐車圓

治冷熱不調或乳哺失節

紅或赤多白少腹痛后重腸胃虛滑便

瀉痢並宜服之

方見大方科下痢類

栗飲

治赤白痢

木香

五斤

黃連

去鬚

粟殼

去殼

僵蚕

炒去絲

甘草

乙兩

右用生薑二兩切同炒為末每服壹錢米飲下

赤痢生地黄七寸白痢烏梅一錢並煎湯調下如有熱小柴

胡湯解之方見大方科傷寒類

四逆散治禁舌痢因服蒞住藥太過傷損胃氣聞食口閉四肢逆冷若穀道不閉黃汁長流不治

蓮肉法

右為末每服宣錢空腹米飲調服

白米散治禁口痢和胃進食或單用山藥細炒半生半熟為末米飲調服立效方見大方科脾胃類

當歸治溏瀉并一切瀉痢立效

當歸

硫黃

牡蠣各乙分木香半兩

右為末麩糊圓粟米大每服二七圓糯米飲入薑汁一二滴送下

駐軍圓治休息痢因腸胃虛弱紅白相雜兩三點

發下止方見大方科下痢類

炒休息痢及痔瀉日久不能安者

右用麥子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鎔以雞子拌和炒熟空心食之

咸雁圓治膿腫痢肚大喫食不成肌膚其下如濃粥汁青

白黑為冷黃赤為熱皆積聚所致方見大方科秘傳類

破圓即爛圓治積痢

乳湯治氣痢下如魚眼二方並見大方科下痢類

脾胃

白米散又名清濕散溫脾養胃正氣理泄瀉胃熱煩渴不

問陰湯虛實並宜服之或乳食不進羸困少力因而失治
變成風癰方見前為散紫蘇梗煎正脾生薑棗子虛實熱服
涼藥後不能食先用此生胃中津液後服生脾散退熱方
見前早涼夜熱不可下只用煎三升許頓服稍愈後再服
三升候不渴無涎又投生脾散二服即安白水煎亦可如
渴飲水多者多服無時盜汗虛汗亦用此藥止瀉治痰退
熱清神渴倍加白水渴甚者任意多飲

散 阿膠壹兩半麩炒鼠粘子壹分炒香馬兜鈴半
兩甘草一分杏仁柒箇去皮尖糯米壹兩為散每服二
錢用水煎服

正脾助胃

厚朴去麩皮 陳皮

甘草

呵子云核

史君子去殼

右為末煉蜜圓葉豆大每服三七圓
下 熱瀉加青黛米飲 冷瀉薑 中者瀉香需 時
行瀉桑葉 赤荆藍姑草 白荆烏梅 散瀉益姑草
已上並用米飲下 益姑草竹葉菜是也

六神 理脾胃虛止吐瀉進飲食養氣

嫩黃耆

白扁豆

白朮

白茯苓

粉草

各等分 或加黃連白朮亦可

右為不每服貳錢蘇頌湯下氣生薑棗子湯調下

黃散 治脾胃虛弱吐瀉及治脾疝腹大身瘦此藥補脾

調氣治冷腹痛久冷泄效

陳皮

青皮

呵子肉

甘草

丁香 伍錢

右對散每服貳錢水壹中盞生薑貳片煎如平腹服

人參

白朮

豆蔻

甘草

乾薑

藿香 各等分

右為末每服一錢或半錢薑湯下如醒脾胃冬瓜子入

米飲下

桔梗

甘草

乾薑

縮砂

益母草

茴香

藿香

右為末每服半錢水瀉此藥蘇水瓜前湯下調脾胃生薑

素子 前湯調服

治脾胃不和 方見前

腹痛

四順散 治挾熱作痛面赤壯熱四肢煩手足俱熱加

青皮枳殼去穢切片入 方見大方 枳殼熱痛

五氣湯 治挾冷作痛面色或白或青四肢冷甚

青皮

陳皮

桔梗

蓬莪朮

辣桂

藿香

益母草

香附子

甘草

加半夏

益母草

香附子

右劉散每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎不拘時服

蘇合香丸

與

七氣湯

兼服治證同上

方見大方科中氣類

枳殼桔梗湯

治邪正交爭冷熱不調作為腹痛嘔吐

枳殼去穢

桔梗去蘆

青皮去穢

陳皮去白

木香各五錢

當歸

粉草各五錢

右劉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

疝氣

金鈴散治疝氣作痛時先由腰啼哭眼中無淚脚冷唇乾

額上多汗或外腎釣上陰囊偏大

金鈴子法洗

言兩照

縮砂比木錢半

蘇合香

木香各五錢

右為末每服壹錢大者貳錢薑湯或好酒調服

治同上但小圓如粟米大每服二七粒金鈴子煎

湯下方見大方科痰虛類

續命圓

治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直

羌花醋浸炒

木香

檳榔

三稜各半兩

茯苓

青皮去白

全蝎

肉桂

附子炮

硃砂各五分

右為末將硃砂浸洗去土顯在湯瓶上候成膏子和糖

醋打麩糊圓如棗豆大每服三十圓空心溫酒送下未

效再服

又方金鈴子圓

治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直

木香

檳榔

三稜

蓬朮炮

青皮 去白

陳皮

川練肉

芫花 各半兩

辣桂

牽牛 生取上

川芎

白芍

右末麴糊圓麻子大每三圓空忘午前各一服薑湯下

結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉加

以風冷血水相聚水氣上乘於肺故先喘而後疝痛外腎

木硬肢下痛楚不可忍惟利二便則安以木通葱白茴香

全蠍煎湯調下得小便利為效 方見大方

治疝氣大疝秘小腹陰囊牽引撮聚痛甚

辣桂

牽牛

川芎

白芍

全蠍

木通

葱白

右末散每壹錢入蜜煎溫服以利大便利后以青皮

皮茯苓木香縮砂甘草為散生薑煎和胃唇青不治

治盤腸內釣腹中極痛乾嘔

明乳香

沒藥 別研

木香

薑黃 各半

木鱉子 去皮研細

右以木鱉子搜和四味末為圓櫻桃大煎釣藤湯化下

一歲可服半圓次魏香散

用蓬莪木半兩真阿魏一錢

先以溫水化開阿魏

浸莪木一日夜焙乾為末每服一字或半錢煎蘇葉

飲空心調下

吐衄

蒲黃散治吐血咯血

生蒲黃 油髮灰 等分

右研細每服一錢煖生地黄汁調下米飲亦可

生地黄汁方治血細血

生地黄汁取一合煖大半錢調分作兩服食后少頃

生蘿蔔汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

腫滿

五苓散 治伏暑感濕腫滿用生薑皮木瓜車前

草山茵陳煎方見大方

氣散 治腫脹作喘氣短而急

北樓 赤茯苓 陳皮 桑白皮

大腹皮 枳殼 半夏麴 白蘇子炒

紫蘇 甘草 各貳分 草果仁壹分

右劉散每服一錢水一盞生薑二片粟子一枚煎服

若臍心凸起者小兒飲之平背心平不治大喘氣後不

食乃食之亦無益上打便漫於肺亦不治

五苓散 治熱毒腫毒

治熱毒腫毒 煎人亂髮燒灰醋調傳熱毒處

黃連貼腫毒

右用大黃、柏黃連各等分為末攪猪膽汁調塗頭心

及脚心又方研石白麩等分研勻并水調睡時塗脚心效

單方 治脚氣腫痛及蠱腫

右商陸不以多少切碎酒煮熟候酒温連商陸飲喫腹肚蠱腫同米煮粥喫大人亦可服

盜汗

大散 **大神圓** **小驚圓** 牡蠣麻黃根煎湯下助益

治心腋汗大人小兒皆有之大人乃心血溢感面常

赤者是也小兒因驚得之有人常有盜汗不止氣弱體羸久醫不可乃心血溢感為汗非虛也宜用藥收斂心血

川當歸 人參 各半及

右剉散用猪心二箇可切三片桑赤分三服每服水一盞猪心一片煎服

黃耆 **中易** 治盜汗入米糖煎服效

治血虛自汗或病後氣虛津液不固自汗夜臥愈甚及不正則枯瘦短氣煩倦

治脚汗白粉乾身為散煎水洗效

治睡中汗出酌量入人參茯苓為細末米飲下半錢

瑣散

大杜 治風氣頸起軟頭不得正成土金煎或去后

蛇含石 用醋洗淨此藥水 川蘇合末 少許

右碾細又入鉢內研極細和煎藥末入少麝香和勻用

雪白末末飯圓龍服大每服一圓荆芥湯化下或又入

生薑汁一二滴或用金銀薄可湯早晨不拘時下風熱

項軟合用涼肝圓方見前

五加皮散 治頸軟

右用五加皮為末酒調塗傳頸骨上

生筋散 治受患痺疾體虛不食及諸病後天柱骨倒豎者不識謂之五軟

白僵蚕為末三歲兒半錢薄可酒調下後用生筋散貼

生筋散 治如前

木鱉子去殼黃麻子去殼

右研細先施起顯摩項上令熱津唾調貼之效又方用

附子生用去皮臍天南星切各等分生薑自然汁調貼

西華慶

語遲

真蒲圓 治受心其母卒有驚怖邪氣癡惑舌本不通四五歲長猶不能言

人參

石菖蒲

麥門冬

遠志

川芎

當歸

滴乳香

朱砂

右為末煉蜜圓麻子大每服十圓粳米米飲下

聾耳

明鑿散 治腎經有熱上衝於耳遂使津液壅滯為稠膿為

清汗耳內痛亦有沐浴水入耳中濕氣停滯為膿但不疼

二證久不瘥變成聾耳

明鑿散

龍骨

黃丹

胭脂

麝香少許

右為末先以綿被取去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加海螵蛸末亦好

胡粉和東方壁土為末傳

胡粉和東方壁土為末傳

蝦蟆燒灰存性搗為末和猪膏傳

蝦蟆燒灰存性搗為末和猪膏傳

重舌

法口重舌乃心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之脈絡出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根即重生一物形如舌而短小是也亦有者頰裏及上脘者曰重脘有者齒斷者曰重斷皆當刺去其血也用真蒲黃傳之或藥灰傳之或馬牙硝傳之或竹瀝浸黃柏點之酸消亦好

論並見大方利古病類

木舌

治木舌

治木舌舌過心之候脾之脈絡於舌

積熱氣土衝故令舌腫漸脹大塞滿口中是為木舌

若不急療必至害人每用一字研細竹瀝調下方見前

黃蜀葵花研細黃丹半之同研點七次

黃蜀葵花研細黃丹半之同研點七次

川朴消二分紫雪一分白鹽半分同研每半錢竹瀝

川朴消二分紫雪一分白鹽半分同研每半錢竹瀝

井水調傳

帶頤

治滯頤涎流出而潰於頤門也

治滯頤涎流出而潰於頤門也認者脾之液

脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏

木香

丁香

各半及

川白姜

生

右為末糕糊圓麻子大一歲十圓二歲二十圓米湯下

抗盜通心飲

方見前

只用猪爛方

髮灰為細末猪脂和傳熱窠泥亦好
咽疾

射干湯

治風熱腫痛

射干

川升麻

馬牙消

馬勃

各半及

右為末每服一錢水一盞煎食后溫服

喉痺腫痛方

蛇退

燒存母為去

右每服用半錢乳汁調下或用蜂房燒存性為末每服半錢乳汁調服

夜啼

治心燥啼面赤小便赤口中熱腹上亦熱或有汗仰身而啼至曉方息加黃芩煎未效

通心散

加麥門冬

煎前子燈心薄荷奇煎成用灯心燒灰塗乳上與兒飲亦效方並見前

治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷四腹而啼

或大便泄瀉青白糞及不吃乳

人參

山藥炒

白朮各半兩甘草半錢

白茯苓

白扁豆

炒

右為末每服一合薑二片棗二枚煎一方用當歸白芍藥人參各二錢半其早括梗陳皮各一錢為散每服二錢米煎時之半服

治冷證腹痛夜啼面青手足冷

大蒜一救慢火烘香熟取出細切

乳香半兩別研

古研勻圓如芥子大每服七粒乳空時服

治外客忤犯夜啼金銀湯化開服方見前

治小兒卒客忤

官地中黃土 並刻棗各等分

右研勻和水塗兒項上及五心良

治犯禁忌夜啼方服蘇合香圓以醋炭重及用方術嘔之

口到乳上便啼身額必微熱急看口內或痰或重者依前口瘡重舌類治之其啼自止

顛陷

單方治因臟腑有熱渴引水漿致成油利又則血氣虛弱

灸黃為末雞子清誥之傳月骨故顛陷如坑不得滿平宜用黃狗頭骨

顛真

集說顛真者顛門腫起也脾主肌肉乳食不常飢飽

或寒或熱乘於脾家致肚臍下調其氣上衝為之

脹顛突而高如物堆梁毛髮短黃自汗是兩若定氣止

衝則中鞭熱氣上衝則柔軟定者溫之熱者涼之劑量

輕重兼以調氣小兒肝盛風熱交攻亦然米易退差

解顛

地黃圓治年大小兒頭縫開解不合腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以腦顛開而不能合凡腦髓欠少如木無根不過千日終成廢人

大熟地黃洗焙

山茱萸

乾山藥焙

澤瀉壹錢

牡丹皮

白茯苓各壹錢半

石為末煨蜜圓梧桐子六每用一二圓溫水空心送下仍用大南星微炮為末米醋調傅於額上烘熱貼之

治頭骨應令不合頭骨開解名曰解顛

細辛

桂心各半兩

乾薑七錢半

右為末以乳汁和傅額上乾復傅之兒面赤即愈

又方蛇蛻炒焦為末用猪煩車中髓調傅頂上日三四度

有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良法也

又方驢頭骨不以多少燒灰研細以清油調敷頭縫中

手拳不展

意文圓治所受肝氣弱致兩脉緊縮兩手伸展無力

當歸焙乾

秦艽

薏苡仁

酸棗仁

防風

羌活各壹兩

右為末煉蜜圓雞頭大每一粒至二粒麝香京芥湯化

脚拳不展

治面黃腎氣不足血氣未榮脚指拳無力不

能伸展

海桐皮

牡丹皮

當歸

熟地黃

牛膝各壹斤 山茱萸

補骨脂各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

行遲

治氣血不充

骨髓不滿軟弱不能行或肝腎虛損

肝主筋筋弱不能束所致一方加川牛膝五加皮酒

皆妙方見前

又方

虎股骨酒炙 生乾地黃

酸棗仁酒浸去

白茯苓

辣桂

防風

當歸

川芎

牛膝

等分右為末煉蜜丸麻子大每五

五加皮酒洗 三歲不能行者

加皮分 牛膝

酸木瓜乾各半分

右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再調食前

服二劑

鶴節

治面黃瘦不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如

鶴之膝乃腎虛得之腎虛則精髓兩耗骨華不榮易為邪

氣所襲不日就枯痺其始鶴脚之節乎本方加鹿茸酥炙川

牛膝各一錢修合服餌並同三歲以下与十圓三歲以上

与十五圓方見前

龜胸

百金丹 胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒
麪無度或夏月熱煩乳與兒得之或乳母多食五辛而
亦成此疾

川大黃三分 天門冬去心 杏仁去皮炒 百合

木通 桑白皮炒 甜葶藶紙上爛 石膏煨

右為末煉蜜圓菴豆大每服五圓食后臨卧熟水化

龜背

松葉丹 治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之

或坐太早亦致偃僂背高如龜多成痼疾

松花 枳殼 防風 獨活各一兩

麻黃 川大黃 前胡 桂心各半兩

右為末蜜圓黍米大每服十粒粥飲下量兒加減

灸法 肺腧穴第三椎骨下兩傍各一寸半膈前穴第七椎

骨下兩傍各一寸半以小兒手中指中節為一寸文炷

如小麥大但三五壯而止

髮不生

夜交藤 治四稟受血氣不足不能榮於髮

當歸六尾 生乾地黄 肉蓯蓉酒洗 楊芍藥各一

胡粉五升

右為末煉蜜圓如黍米大每服十粒煎黑豆湯下兼磨
化塗抹頭上

齒不生

地黃散治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

川芎 乾地黃 當歸 山藥

白芍藥 各一 沉香 半兩 粉草 三兩

右為末溫益湯調服半錢用少許指齒脚亦佳

雄鼠糞一七粒兩頭尖者是每日用一粒指齒根上至二十一日當生

瘡毒

平血散合和敗毒散治諸般瘡毒生姜薄奇生乾地黃麥門冬去心煎服及人方見瘡腫科諸瘡類

角無毒瘡治同前方見前

五倍化毒丹小生黃圓小圓服治同上方見瘡腫科諸瘡類

角無毒瘡毒

右用黃連大拍為末芭蕉汁調敷角留口搽瘡加輕粉有汁加黃丹服麝香各少許和勻乾糝

諸般惡瘡

上煎麥 收皮焙乾為末別研入 不灰石雄黃

輕粉 水粉 蚌粉

右和勻先用鯽魚一箇入真清油內煎候熟去魚以曲攤冷調藥傳瘡三日后以葱湯遍身洗浴所穿衣服並脫去洗淨乳母仍忌油膩肥汁紅酒煎炙及熱物等立

效癩瘡用真米醋調傳立效

鯽魚方治小兒白禿瘡

鯽魚

一尾重三四兩者去腸肚以
出腹填滿溫布裹燒存性

雄黃 貳錢

右為末生清油調傳先以蠶水洗拭后用藥

如聖藥 治頭瘡久不瘥及白禿

豆豉 半升

龍膽草

蕪荑 各壹分

右一處用溫布裹盡泥固濟火服存性礮為末以生清

油半斤熬取四兩下藥急攪勻得所釐合收傳神效

丸人耳輪瘡極痒臨睡時傳一遍治白禿剝頭右一傳

癩瘡方治癩瘡得癩瘡

右用赤爛牛糞燒灰研細傳

胎毒瘡方治一歲二歲內滿頭及遍身生瘡皆因在胎中父母恣情交合所致名曰胎蛆經久不差先用化毒丹消毒飲服却用父小便以鴨翎刷洗瘡上青黛為細末乾搽效

即效方治頭上生瘡及肥疔瘡猪鬃骨中醋調輕粉早傳晚愈又用樹上乾桃燒灰清心調傳效暑毒軟節皆可
疔日瘡方治遍身如魚目無膿又名疔瘡瘡川升麻劉散煎百沸入蜜一二匙以磁器盛鴨翎蘸搽瘡上
諸惡瘡生頭面南星具母等分用湯泡七次研為細末入土朱少許乾則清油調搽濕則乾搽

口瘡

湯 治血盛將養過溫心有客熱熏發於上焦遂成瘡
右用黃連一兩去鬚或加腦子麝香鵬沙為末每服一
字溫水臨臥服

心 治心肺有熱瘡發斑駁如丹身軀有熱或熱瘡大
粟與食亦佳方見疹瘡類

心 治心熱煩渴作成口瘡每用一字乾糝兒口中嚼
喫亦無妨乳母同服尤妙方見大方科積毒類

傅 藥治滿口瘡爛
黃丹一兩好蜜一兩瓦盞盛甑上蒸一炊久取出以
翎刷瘡上效

貼 藥治瘡黃末醋調貼兩脚心後夜即愈藥性雖熱能引
熱就下至良

又 天南星家陀僧為末治口瘡不能吮乳醋調貼兩脚心
又 生硫黃為末新汲水調貼手心脚心效即洗去

又 治瘡癩愈而再作用野蜂房一二箇燒灰存性以
巴豆三七粒去殼煎清油三二沸去巴豆以油調藥敷

又 立效白礬搗為末清油調傅亦效此藥有驗人以荷

又 大蜈蚣一枚去穢令空地上磨令口平以稠麪糝搽
四唇露在瘡上自破膿溜出盡更無癩瘡

又 治軟癩瘡交丹作者
右用桑螵蛸燒炙存性以清油調傅

又方 鷄抱卵殼煨灰存性為末入輕粉少許清油調傅此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可

鷄抱卵方

白及

赤石脂

各錢 當歸 各錢

龍骨 少許

右為細末乾糝

脫肛

治大腸虛寒或因服涼藥過度或久痢後臍腹所

致圓如粟米大大者細嚼切桃溫酒送下小者木香湯下

方見大方科諸痔類

治初病脫肛并涼青脉唇白齒根焦黃久病兩頰先眉赤唇焦多啼哭

黃瓜羹

乙箇 白礬 半兩

右將白礬入瓜羹內固濟火煨為末末糊圓每服三十圓米湯送下

用煨脫肛果色在熱灰

右用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入并消少許洗軟用真清油點三滴放三角白礬煨過研爛真龍骨少許同研糝肛頭用芭蕉葉托上勿令便去出入令大兒抱定

龍骨散 治大腸虛肛門出

龍骨

訶子肉 炒各二分半

沒石子 大者

嬰粟殼

去類 赤石脂 各二分

右為末每服一錢米飲調下

洗方 香附子荆芥皂角煎水洗

又方 以葱湯洗令軟用芭蕉葉托上

又方 五倍子朴消大腹皮煎水洗以赤石脂末摻在芭蕉

葉上托入

貼方 單麻子四十九粒研爛水調作餅子貼腮頂上收上立有效

水聖散子 治脫肛不收

右用浮萍草不以多少杵為細末乾貼患處

紫龍膏 治臟熱肛門脫出

右用紫背蕪一大握又為魚腥草搗爛如泥先用朴消水洗參肛門用芭蕉托入却用藥於臀下貼坐自然

方 用新磚一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數重

壓定使熱氣上透不可過熱令病者以醫坐於布上如覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度

灸法 頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍中隨年壯

遺尿

雞腸散 治腎與膀胱俱虛冷氣乘之不能約制故遺尿不禁或睡重衣自出

辣桂

龍骨各錢

雞腸燒

牡礪灰

白茯苓

真桑螵蛸炒

各半兩

右劉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎服

又方

鷄胫脰壹具 鷄腸燒

猪胞炙焦

右為末每服一錢酒調下男用雌鷄女用雄鷄者

尿白痰散治乳哺失節有傷於脾致使清濁色白也久

而成疝亦心膈伏熱兼而得之

涼三稜

蓬莪不燥

縮砂仁

赤茯苓各半

青皮

陳皮

滑石

甘草各半

右為末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下

又方大甘草頭煎湯服

淋閉

公散治諸淋兼小便不通

葵子

車前子

木通

瞿麥

桑白皮炒

赤茯苓

山梔子仁

甘草各等分

右劉散每服一錢井水一小盞葱白二寸煎食前服

遺精散治血淋仍以米飲調油髮灰少許各等分 灌下方見

尿血方

生蒲黃

生地黄

赤茯苓

甘草各等分

右劉散每服一錢水一小盞煎調油髮灰少許食前服

順經散治十餘歲因驚之候心氣下行小便淋瀝日夕三

四十以漸覺黃瘦宜服

迷子炒

琥珀別研

益智去殼

金毛狗脊去

白茯苓去皮

石燕子火煨醋淬研

石常去殼

右為末每服一錢韭湯調日二服

大便秘

及寧散 治風與滯血留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥

大黃

枳殼炒

北梗各式

木香

甘草炙

右劉散每服一錢姜二片水一盞煎服

陰腫

三白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛式兩

桑白皮

白木

木通去節

陳皮去白

各半兩

右為末每服二錢姜湯調空心服

此疾

圓 治啼叫怒氣閉擊於下結聚不散水實

桃仁浸去皮

微炒

辣桂

牽牛炒

取仁

白疾藜炒香

搗去刺

牡丹皮

北大黃各

式

右為末煉蜜圓如麻子大每服五圓或七圓青皮木通

煎白蘆少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香圓下

蟬退散 治陰囊忽腫多坐地為風或虫蟻咬者

右用蟬退半兩水一椀煎湯洗腫處其痛立止腫亦消

再溫再洗洗后仍與五苓散加燈心煎服又方用葱園

內蚯蚓糞其草汁調塗

傳藥

地龍膏

治外腎腫硬或疝或風熱暴腫及陰瘡

乾地黄不以多少為未先以葱椒湯於避風處洗次用
津唾調傅其上外腎熱者雞子清調傅或加牡礪少許

又方地龍糞研生薄荷汗調傅

牡礪散治外腎腫太卒物通明

牡礪粉研極細先以津唾塗腫處次用糞傅

又方勿腫研桃仁唾調傅

馬心方治風熱外腎焮赤腫痛日夜啼叫不數日退皮如

鷄卵殼愈而復作用老杉木燒灰入膩粉清油調傅效

卒暴

捷方治卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸

并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯仍用酒和胡椒粉塗

其腹

又暴腹滿欲死半夏不以多少微火炮為末酒和為圓如

粟米大二三五粒淡薑湯或蜜湯下

又中惡暴死葱白納下部及鼻中立活或用菖蒲末著舌

底交吹入兩鼻兩耳中效

又中蠱欲死甘草濃煎湯服立驗

斷乳

養眉膏

梔子性存性雌黃

朱砂各少許

右為末入生清油輕粉少許調勻候兒睡著濃抹於兩
眉醒來自不喫乳未效再用即驗

氏小兒方卷第十二



德