

奇效良方卷之四十三

宿食內傷門

附論

夫脾胃者水穀之海也水穀入海而胃以納之脾以尅之脾胃氣旺則穀肉菓粟俱能消化為糟粕矣經云飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也蓋脾土宜暖而不宜生冷若人之原稟脾胃怯弱氣血虛憊兼以不善調攝或恣其飲食或寒溫不適飢飽失宜愈傷脾氣凡百飲食入於胃中不能尅消以致停蓄遂成宿滯交生諸疾東垣因以內傷論為證名也至若又謂榮氣穀氣元氣清氣運氣衝氣之六者斯皆胃氣之別名其實為一也且人身五臟皆稟於胃胃和則穀氣上升而穀氣者乃足少陽膽手少陽三焦元氣始發生長萬化之用者也胃傷則中氣不足中氣不足則不能滋養元氣

元氣不充則歲府真氣皆為不足而心火獨盛矣心火者陰火也起自下焦其繫於心心不自主相火代之相火者下焦心胞之火乃為元氣之賊也然火與元氣不兩立必一盛則一負矣而脾胃氣衰則下流於腎肝陰火得以乘其土位於是元氣受病繫於上焦心肺之氣蓋心主榮血肺主衛氣榮衛失守則諸病生焉夫人之真氣衰旺豈不由乎飲食之致然哉凡諸飲食所傷當各以消氣之藥以尅其所傷之物俾脾胃氣愈旺而五穀之精華上騰應乎天而為清氣也彼神氣強盛七神衛護生氣不乏增益大旺氣血周流百病不能侵矣雖有大風苛毒豈能為害耶是以易水張先生嘗戒停滯不可峻用利藥下咽少頃其藥味施化標皮之方始開便寬快及致所傷之物已去稍過兩三時辰其藥品盡化性味大作而其停滯雖去不知脾胃又傷矣脾胃一傷則真元之氣敗壞致生諸虛百疾而天人壽

此醫之過歟而東垣論其內傷皆由喜怒勞役飲食飢飽致傷脾胃而然也劉河澗又謂天真者為造化之元氣在人身得以執天機而行六氣分地紀而運五行是故人身也天地也一而二二而一者也若人調理適宜邪勿能傷而血脉壯盛精氣增益周身生化則一疾無矣或於憂愁思慮飢飽勞役大驚卒恐致真氣耗散血氣分離其五行六氣遂有愆隔則百病作矣故經曰飲食勞倦則傷脾形寒飲冷則傷肺也原夫宿食為病由歲氣虛弱寒在脾胃之間致穀食不能消化停積於中也且舊穀未消新穀又入脾胃已弱不復能尅而新舊相積故經宿不消則令人腹脹氣急噫氣醋心食臭惡心時復憎寒壯熱或頭痛似瘧也且噫氣醋心者由上焦有停痰積飲胃中有宿冷食積脾胃氣不能磨尅其食故腹脹而氣逆所以好噫氣吞酸氣息食臭也惡心者緣心下有停水積飲之故也而心主火脾主土

土性尅水今脾虛不能尅消水飲水飲不散上乘於心復令冷氣所加致令火氣不宣則心中淡淡然欲吐也其脉右寸浮而大按之反濇尺脉亦微而濇假若脾胃有伏熱亦因食積不消者身則發熱狀似傷寒惟身不痛為異也大抵宿食所傷則皆惡食然當分上中下三脘治之若物之停於中下脘者重則依仲景法大小承氣湯備急丹類用之輕則以東垣枳朮等丸消之在上脘而食物其氣反壅塞於上其脉氣口緊盛於人迎兩三倍者必以吐之經云上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死宜以瓜蒂散吐去其物若去不盡以消導藥磨之若物已去而脾胃元氣或被傷者以東垣內傷所論補益法中一氣湯等是有如先食熱物而不傷繼用寒物因後寒食致前食亦不消化而傷者當詢問其寒食熱食孰多孰少斟酌以藥如其寒物一分熱物二分則當以寒藥二分熱藥一分相合投之或先飲

酒而後食寒令及傷熱物冰水等物者當詢其次序多寡所傷量其寒熱之劑分散可也職於醫者宜臨證察脉看人虛實老幼以施治療庶不苟且切不可便用辛燥峻利等藥服之求愈而反為害也則當慎之

宿食內傷通治方

香蘇散 治宿食留飲積聚中脘噫臭腐氣心腹疼痛或臍臑

飧泄並皆治之

香附子 炒去毛 三錢 紫蘇 去根 蒼朮 米泔浸 切炒 陳皮 已上各 二錢 甘草 半錢

右作一服水二鍾生姜五片葱白三根煎至一鍾不拘時服如頭痛加川芎香白芷

硝砂香附湯 治噫宿腐氣心膨臍滿或時令冷疼

香附 炒去毛 十兩 烏藥 五兩 硝砂 去殼 粉草 炒各 二兩

右為細末每服二錢用紫蘇三葉鹽少許煎湯調下不拘時服大便秘用橘皮湯調下

穀神丸 消食健脾胃益氣進美飲食

人參

縮砂

神麴炒

香附子炒去毛

青皮

陳皮

麥蘖炒

枳殼去穢炒

三稜煨

蓬木煨各等分

右為細末粳米糊為丸如桐梧子大每服五十九空心用米飲送下鹽湯下亦可

三稜煎丸 治膨滿消食積氣塊及傷食夾臍痛甚

方見積聚門

紅丸子 磨化宿食止腹痛

荆三稜煨

蓬木煨

青皮去白

陳皮去白已上各五兩

胡椒

乾薑

右為細末米醋煮米粉糊為丸如梧桐子大礬石紅為衣每服五十九淡生薑送下或二陳湯下不拘時服

無九子

治中脘有宿食吞酸惡心口吐清水噫宿腐氣或心腹疼痛及中虛積聚飧泄赤白痢下並皆治之

烏梅肉七箇 百草霜三錢 巴豆去殼并油二枚 杏仁去皮尖另研三七枚

半夏

湯泡七次九枚 縮砂三七枚

右件為細末和勻薄糊為丸如黍米大每服十五丸加至二十九熟水送下薑湯亦得更看虛實增減丸數或因食生冷魚膾腥腐用治中湯送下亦可

如意丸

治虛中積冷氣弱有傷不能傳化心下堅痞兩脇脹

滿心腹疼痛噫宿腐氣及治霍亂吐瀉米穀不化久痢赤白膿血相雜久病黃色羸瘦及腹中一切食癥之疾

枳殼去穢炒

檳榔

橘紅

荆三稜

半夏 湯炮 乾薑 炮 黃連 去鬚 蓬朮 已上各

巴豆 三七枚 連殼

右件除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆餘藥焙乾為末薄糊為丸如菉豆大每服十九加至十五丸用茶清薑湯任下食後臨卧服孕婦不可服

阿魏丸 治脾胃怯弱食肉食麪或食生菓停滯中焦不能剋化致令脹滿肚腹疼痛嘔吐不食或利或秘

阿魏 酒浸化 官桂 不見 蓬朮 炮 蘿蔔子 炒

麥蘖 炒 神麴 炒 青皮 去白 乾薑 炮

白朮 已上各 百草霜 三錢 巴豆 去殼

右件為細末和勻薄糊為丸如菉豆大每服二十九用薑湯送下麪傷用麪湯送下傷生菓用麪香送下

丁香脾積丸 治食積心腹膨脹不得剋化

丁香 不見 木香 不見 巴豆 去殼 高良薑 米醋

蓬朮 三兩 三稜 二兩 青皮 一兩 皂角 三大枚

右入百草霜三匙同碾為末麪糊為丸如麻子大每服十九至二十九止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡薑湯下嘔吐藿香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯送下

感應丸 治男子婦人小兒停積宿食冷物不能剋化有傷脾胃或泄瀉臭如抱壞鷄子或下痢膿血並皆治之

杏仁 湯泡 百草霜 用鄉村人家鍋底上

巴豆 七枚 乾薑 炮 肉蓯蓉 二十

木香 二兩 丁香 半兩

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味杵為細末同研勻用蠟置先將蠟六兩溶化作汁以重綿濾滓更以好酒一

升於銀石器內煮蠟熔滾數沸頃出候酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用丸春夏修合清油一兩秋冬用清油一兩半於冷鉢內熬令香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥未成劑分作小錠子以油單紙裹衣旋丸服餌每服三十九空心生薑湯送下

五百丸

治宿食留飲積聚中脘喧臭吞酸心腹刺痛

丁香

砂仁

胡椒

烏梅取肉

巴豆

去皮心膜另研

右件各一百箇研為細末和勻蒸餅糊為丸如菉豆大每服五七丸食前用白湯送下

丁香爛飯丸

治食傷太陰及治卒心胃痛

丁香

廣茂炮

荆三稜炮

木香

已上各錢

甘松去上

益智仁

砂仁已上各錢

香附子

半箇

丁香皮

甘草炙各錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三十九不拘時用白湯送下或細嚼下亦可

木香枳木丸

治強飲食所傷心腹滿悶不快

木香

枳實

炒各一兩

白木二兩

右為細末荷葉煨飯為丸如梧桐子大每服五十九食遠白湯送下

麴蘗枳木丸

治強飲食心腹滿悶不快

神麴炒

麥蘗炒

枳實

已上各一兩

白木二兩

右為細末荷葉煨飯為丸如梧桐子大每服五十九食遠白湯送下

三黃枳木丸

治傷肉食溫麴辛辣味厚之物填塞悶亂不快

黃芩

二兩

黃連

酒洗

大黃

煨

神麴

炒

白木

橘皮一已上各

枳實半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九食遠白湯送下

葛花解醒湯

治飲酒太過嘔吐痰逆心神悶亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

葛花

白芷

砂仁五錢

乾生薑

青皮

白朮已上冬三錢

澤瀉

神麴炒各二錢

人參

白茯苓

猪苓

橘紅已上各一錢半

木香半錢

石為細末每服三錢食遠白湯調下得微汗酒病自去矣

大枳殼丸

治一切酒食傷胃膈痞悶疼痛飲食不消兩脇刺痛嘔逆惡心並皆治之

方見嘔吐門

集香丸

治傷生冷宿食不清

丁香

茴香

益智

荊三稜

青皮

蓬木

陳皮

川練子已上各一兩

巴豆

半兩和皮米炒焦黑色去米不用

右為細末醋糊為丸如菉豆大每服五七十九食前用生

薑湯送下

紫沉消積丸

治久積伏滯胃膈膨脹心腹刺痛飲食不化及治婦人血氣疼痛

沉香

阿魏醋化

巴豆

取霜各一兩研各四兩研細

同研用蜜一升酒二盞共熬成膏以磁盒貯之和藥

丹砂

硫黃研

青皮

良姜

枳殼

官桂去皮

人參

木香

胡椒

已上各四兩丁香

乾姜炮各二兩

右將前四味蜜酒熬成膏餘藥搗為細末以膏和搗千百
杵九如菘豆大每服五七丸不拘時溫橘皮湯送下如心
痛溫酒下婦人血氣當歸湯下一方有沒藥一兩

法製生薑散 治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心不欲飲食

生薑 十兩切片子用首鹽炒過兩白芍伴淨炒乾用之

官桂 去皮

青皮 去白

陳皮

半夏 姜製

白朮 已上各一兩

葶澄茄

丁香

木香 已上各二兩半

白芷

白茯苓

砂仁 已上各一兩半

甘草 炙各半兩

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

仙方內消丸 治酒食過傷脾胃等疾

方見積聚門

木香丸 治積聚氣解胃虛冷宿食不消心腹氣滯脹滿疼痛

木香

桂心

白朮

赤茯苓

人參 已上各三兩

乾薑 炮

桔梗 去薑

吳茱萸 湯炮

當歸 已上各半兩

大黃 炒

神麩 炒

訶梨勒 煨去核

陳皮 去白

麥蘖 炒

枳殼 已上各一兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵為丸如梧桐子大每服三

十九丸食前溫酒送下

小分氣丸 治久積氣塊宿食不消胃膈痞悶痰逆惡心不思

飲食臍腹刺痛醋心噎塞

木香

雄黃 研各一兩

青皮 去白

陳皮 去白

乾薑 炮

棟實 炒

枳殼 已上各半兩

巴豆 去皮心膜研出油

蓬朮 醋浸

半夏 湯炮

右為細末醋煮麩糊和丸如菘豆大每服五九加至七九

食後生薑湯送下

益智散 治脾胃虛冷積聚沉結宿食不化消

益智去皮 青皮去白 陳皮去白 荆三稜煨

白茯苓去皮 蓬朮煨已上各二兩厚朴去皮生薑汁塗

木香一分 人參 甘草炙各半兩

右為細末每服一錢入鹽少許用沸湯不拘特點服

快活散 治宿食不消致傷脾胃

大黃生用 檳榔 陳皮已上各二兩 青皮二兩

三稜醋炙 蘿蔔子炒 香附炒去毛 蓬朮已上各四兩

黑牽牛半斤 麥蘖半斤用巴豆三錢同炒黃色去巴豆

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服七丸食前用淡生

薑湯送下

破積導飲丸 治宿食不消心腹痞悶及治積塊堅硬

牽牛頭末 木香 檳榔 青皮去白

陳皮去白 枳殼炒 枳殼炒 荆三稜煨

蓬朮煨 半夏湯洗 茯苓去皮 乾生薑

神麴炒 麥蘖炒 澤瀉 甘草炙各半兩

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服二十九食

前用溫生薑湯送下

奇効良方卷之四十四

自汗盜汗門

附論

內經云汗者心之液又云陽加於陰謂之汗由此推之是陽熱加於陰血散於外而為汗也然有自汗盜汗之別焉成無已云自汗者不因發散而自汗出也盜汗者睡而汗出也因而息之自汗盜汗其一液也其出異也盜如盜竊之盜窺人息而潛出行於陰也自汗如自然之自居常有而明顯見於陽也皆陰腠理空疎衛護氣壘不能緻密收斂於表虛則陽熱泄焉陽主動而散津液走於肝若陽蒸陽分而液出者為自汗陽蒸陰分而液出者為盜汗由是內分陰陽之虛外閉腠理之氣乃得其源也皆由心腎俱虛以致此陰虛陽必湊發熱自汗陽虛陰必乘發厥而自汗陰陽偏勝有傷風中暑故經云風從外入令人江出頭痛身重惡寒天熱衣厚則為汗天寒衣薄則為弱病痺多

汗而濡者其濕甚也陰氣有餘為多汗身寒陽氣有餘為身熱無多勞則氣耗喘且汗出飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心待重遠行汗出於腎疾走恐汗出於肝搖體勞苦汗出於脾或人有熱飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或背或身其不循胃氣之道出此因傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之固不得循其常道此氣慄悍而出故不得從其道名曰漏泄驚怖房勞虛極痰飲亦成此證診法尺脉瀟滑謂之多汗男子平人脉虛細微者善盜汗也衾之表裏虛實之具其藥條例諸家方論者察其所宜而用之經言有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風長沙言太陽病頭痛發熱汗出惡風者太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者太陽中熱者膈是也汗出惡寒身熱而渴諸且太陽此五證全在乎醫於本經內藥治之常涼反熱當熱反涼醫之過歟金匱

要畧曰風濕脉浮身重汗出惡風者除濕固腠理為先東垣云飲食勞倦皆自汗當用甘温之劑滋溢皮毛之氣不合自汗損其元氣也暑邪干衛故身熱自汗當用清暑益氣治之試效方云濕熱大作汗出不休勝濕之劑最為穩當王海藏云太陽自汗桂枝湯陽明自汗白虎湯少陰自汗四逆湯陽明發熱自汗多者大承氣湯此皆內傷外感之邪干衛而出也北方論皆前人註立後之學者識經絡用之取効不明脈理錯認經絡用之反禍不輕其於盜汗非若自汗猶有實者此則陽熱侵行於蒸出陰液復越於表是陰虧而表亦虛也其汗因寢而至寢則衛氣亦行於裏覺則氣散於表而汗上矣故經曰太陽所至為寢汗東垣謂太陽老陽也太陽標有陽之名無陽之實以膀胱之真寒為純陰之氣也蘭室秘藏治療之證以黃連黃芪生地黃當歸之屬滋陰以制陽熱靜而汗止此其論也

自汗盜汗通治方

桂枝湯 治傷風脉浮自汗惡風

方見傷寒門

木附湯 治中濕脉細自汗體重

方見心痛門

黃芪建中湯 治男子血氣不足體常自汗

方見諸虛門

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸

黃蘗

生地黃

熟地黃

黃芩

黃連

黃芪

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

黃芪湯 治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或

盜汗不止並宜服之

黃芪

去蘆蜜

白茯苓

去皮

熟地黃

酒蒸

肉桂

不見

天門冬

麻黃根

龍骨

已上各

五味子

浮小麥

炒

防風

去芦各

當歸

去芦

甘草

七分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服發厥自汗

加熟附子發熱自汗加石斛

三建湯 治真氣不足上盛下虛面赤自汗小便頻數如汗不

飲加肉桂黃芪

方見諸虛門

建中湯

治表虛自汗

芍藥

五錢

官桂

甘草

炙各

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服本

方加黃芪二錢名黃芪建中湯治虛勞自汗加當歸名當

歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂一錢

熟附子半箇名桂枝附子湯煎空心服

防風散 治盜汗

防風 五錢 川芎 二錢 人參 一錢二分

右為細末每服二錢臨卧米飲調下

白朮散 治盜汗極驗

白朮 不拘多少對作塊或稍大 浮麥 一升

右用水煮乾如白朮尚硬又加水一二升煮軟取出去麥不用切作片焙乾研為細末每服二三錢不拘時另用浮

麥煎湯調服

麥煎散 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退面黃肌

瘦並皆治之

芫胡 去苗 秦苳 各二兩 鼈甲 二兩醋煮三五沸去襍欄再用醋炙黃

乾漆 炒炙 人參 茯苓 乾葛

川烏 炮去皮尖 玄參 已上各一兩

右為細末每服二錢先用小麥三七粒煎湯一盞去麥入

藥再煎三五沸食後服

大建中湯 治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸羸弱

口苦舌澁心怔短氣

綿黃芪 炙 遠志 燈心煮去心 當歸 酒洗 澤瀉 已上各二錢

白芍藥 龍骨 煨 人參 已上各一錢 甘草 炙

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服氣弱加炮附子二錢腰痛筋急加官桂去皮一錢

止汗溫粉

川芎 白芷 藁本 已上各一兩 米粉 三兩

右為末每用綿包裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣一名

赤石脂

龍骨各半

右為末以絹袋盛如撲粉用之

牡蠣白朮散 治漏風證飲酒中風汗多食則汗出如洗久不

治必為消渴

牡蠣錢三

白朮錢一兩二分 防風二兩

右剉碎每服五錢水二盞煎至七分食遠溫服惡風倍防風白朮汗多面腫倍牡蠣

芪附湯 治氣虛陽弱虛汗倦怠

黃芪蜜炙

附子炮去皮臍各二錢

右剉作一服水二盞生薑三片煎至七分去滓食遠服 撫芎湯 治自汗頭眩痰逆惡心

川芎

白朮炒

陳皮已上各二錢 甘草一錢

右剉作一服水二盞生薑三片煎至七分不拘時服

牡蠣散

治諸虛體常自汗驚惕不寧

左顧牡蠣用米泔水

黃芪蜜炙

麻黃已上各一兩

白朮半兩

甘草一分 小麥百餘粒

右剉每服三錢水三盞煎一盞半服一方為細末每服三錢入紅棗三枚同煎分三服

止自汗方

右用川鬱金研為細末臨臥以唾津調乳上

周衛方 治自汗

麻黃根

黃芪錢各

生甘草稍

當歸稍

生黃芩各半

生地黃

麥門冬各三分

五味子七箇

猪苓二分

羌活七分

蘇木

紅花各一分

右剉作一服水二盞煎至七分食前服

四白散

治男子婦人血虛發熱夜多汗羸瘦脚痛不能行

白木 白扁豆 藿香 益智

厚朴 黃芪 陳皮已上各一兩 白茯苓

人參 半夏 烏藥 白芷

甘草已上各半兩 芍藥 檀香 沉香各二錢半

右剉碎每服三錢水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去滓食前溫服

又方 治盜汗夜臥床席衣被並濕

麻黃根 牡蠣煨為粉各三錢 黃芪 人參各二兩

龍骨打碎 枸根上白皮各四兩 大棗七枚

右切以水六升煮取二升五合去滓分溫六服如人行八九里久中任食一日令盡忌蒜熱麪等物

止汗粉

麻黃根 牡蠣粉 敗扇灰 瓜蒌已上各三兩

白木 二兩 米粉 三升

右為末和粉攪勻以絹袋盛用粉身體日三兩度忌挑杏李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二七五七任意灸亦得汗即漸止

加腦子收陽粉 治一切虛汗盜汗自汗及漏風等證汗泄不禁服諸藥不能止者並宜用之

麻黃根 藁本 白芷 牡蠣煨

龍骨已上各半兩 米粉 二兩 腦子 半錢

右為細末研勻以紗帛包藥於汗處撲敷之汗止為度 椒目散 治盜汗日久不止

椒目 麻黃根各等分

右為細末每服一錢用無灰酒調食後服

團參湯 治大人小兒腋汗大人乃心血液盛面常發赤者是

也小兒因驚而得宜服珍珠散史丞相苦常盜汗不止氣弱躄羸治之不愈一日洪舍人相見一醫人云心血液盛亦為汗非虛也宜用藥收斂心經遂傳此方服之而愈

人參

新羅

川當歸

去芦焙各半兩

右咬咀用猪心一箇切作三片藥三分服每服用水一椀猪心一片煎至一盞去滓服食前二次服一方加黃芪

可効良方四十四卷終

奇効良方卷之四十五

痿門

附論

蓋人身之有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓而成其形内有肝心脾肺腎以主之若喜怒不節勞役兼致內之精血虛耗榮衛失調發為寒熱使皮骨筋骨肌肉痿弱無力以運動故致痿躄狀似柔風脚弱相類以脉證并所因別之不可混作柔風脚氣論此乃外所因凡痿躄乃內藏氣不足之所為也大抵痿弱之由因肺熱脾虛弱薄着足痿躄其色白而毛敗名皮痿曰肺熱葉焦曰五臟因肺熱發為痿躄也心火熱其膝樞紐如折去而不相提挈脛筋縱緩不能任地也色赤而絡脉溢名脉痿由悲哀太甚陽氣內傷發尿血曰大筋空虛發為肌痺傳為脉痿病肝熱口苦筋膜乾筋急而攣色蒼而爪枯曰筋痿由思慮無窮所願不得意淫於外勞太甚宗筋弛緩及為白淫曰筋痿者生於

弛尸緩力去誰也
弓解也

木
管
急

肝也病脾熱胃乾而渴肌肉不仁色黃而肉蠕動曰肉痿由漸
於濕地居處下澤濡漬痺而不仁曰肉痿也病腎熱腰脊不舉
骨枯髓減色黑齒槁曰骨痿因所遠行勞倦遇天熱而渴陽氣
內乏熱舍於腎致水不勝火則骨枯而髓虛故為之曰骨痿生
於大熱者也難經曰骨痿不能起於床者是也大抵諸痿生於
肺熱此一句便見治法大意經曰東方實西方虛瀉南方補北
方此因是就生就制而言補瀉大經大法不外於此東方木肝
也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二
腎雖有二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二
火理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居
中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡
子畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛意馳受熱則金失所
養火寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一
身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作瀉南方者則肺金清
而東方不實何脾傷之有補北方水則心火降而西方不虛何
肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法
無出於此

痿通治方

東垣清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪絕寒水生化
之源絕則腎虛痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動
履者宜服

方見濕門

藿香養胃湯 治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛
宗筋無所養遂成痿躄

藿香

白朮

神麴炒

白茯苓

烏藥

縮砂

半夏麴

薏苡仁

人參已上各錢半 華澄茄 甘草炒各錢

右作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾不拘時服

補肝湯 治前陰如冰冷并陰汗兩脚痿軟無力

黃芪去芦一錢半 人參去芦 乾葛 白茯苓去皮

猪苓 升麻已上各錢 苁胡去苗 當歸身

羌活 連翹 黃蘗炒 澤瀉

蒼朮 神麩 知母 防風

陳皮 甘草炙各半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心熱服忌酒濕麩

溫腎湯 治面色痿黃脚痿弱無力陰汗出

麻黃 芫胡各六 白朮 酒黃蘗

猪苓 白茯苓 升麻已上各錢 防風

蒼朮 澤瀉二錢

右作一服水二鍾煎至二鍾食前熱服候一時絕飲食

芎藭散 治四肢疼痛軟弱行步不便

川芎半一兩 桂心 乾薑炮 甘草炙各一兩

川烏頭八兩切作片水浸一宿切作筭子條更以米泔浸一宿不洗日乾炒微赤為度乾了秤

右為細末每服二錢溫鹽酒調下日進三服

加味四斤丸 治腎熱肝虛熱淫於內致筋骨痿弱自不勝持

起居須人扶足不能任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味

不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸 天麻 木瓜乾

鹿茸去毛 熟地黄 五味子酒浸 兔絲子酒浸

右為細末煉密和丸如梧桐子大每服五十九食前用溫

酒或米飲任下一方不用五味子有杜仲

藥角丸 治五癢皮緩毛痺血脉枯槁肌膚薄著筋骨羸弱飲

食不美庶事不興四肢無力不枯髮落眼昏唇燥疲憊不能支持

麋角酒浸一宿

大附子生去皮臍

熟地黄四兩

右用大麥米二升以一半籍底以一半在上以二布巾隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末浸藥酒清酒煮麥粉為糊搜和杵三千下丸如梧桐子大每服五十九食前用溫酒或米湯送下

健步丸 治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

酒防已一兩

澤瀉各三錢

川烏炮去

酒苦參各一錢

滑石炒

瓜蒌根酒洗

芫活

甘草各半錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九空心食前

溫酒送下

龍骨丸 治膀胱腎冷坐起欲倒目眩暈氣不足骨痿

龍骨

防風

乾地黄

甘草已上各五分

白石英

白茯苓

桂心

五味子

菴活

附子

山茱萸

玄參

芎藭已上各四分

杜仲

乾薑各八分

右為細末煉密為丸如桐梧子大每服三十九加至四十九空心用溫酒送下日二服

起痿丹 治諸痿法當養陽明與衝脈陽明主胃乃五臟六腑

之海主潤宗筋束骨之利機關衝脈者諸經之海主滲灌谿谷與陽明合養於宗筋會於氣衝屬於帶脉絡於督脉故陽明虛則宗筋縱弛不引故足痿不用也治之各補

其榮而通其輸調其虛和其逆順至筋脉骨肉各得其時病乃已矣腎經虛備遂成骨痿腰脚難舉日加困乏

附子炮去

沉香不見

硃砂別研

枸杞子去枝

母丁香

木香不見

陽起石煨

肉蓯蓉酒浸

熟地黄

麝香別研

天雄炮去皮

白丁香少許

官桂去粗

硫黃已上各

膩粉半兩

白丁香少許

右為細末煉蜜為丸如彈子大每用一九以薑汁火上入

藥熔化却用手點藥於腰眼上磨擦至藥盡用至二十九

大有神效若有他處癱瘓風疾加皂角一片去筋搥爛薑

汁浸一宿瓦上焙乾為末入前藥內依前法用

又方治筋痿兩手握固無力兩脚行動無力急飢食少此名筋

痿其證候口舌生瘡忽生痰涎忽然睡中涎溢身上躁熱

忽然增寒項頸強急小便赤白不定大腑忽冷忽熱不調

連翹

防風

荆芥穗

蔓荊子

羌活

獨活

牡丹皮

山茱子

秦艽

麻黃去根

木香略

右為細末每服一錢食後用白湯調下

金剛丸 治腎損骨痿不能起於床宜服此益精

萆薢

杜仲炒去

菴蓉酒浸

兔絲酒浸

右為細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十

丸空心用溫酒送下

牛膝丸 治腎肝損骨痿不能起於床筋弱不能收持宜益精

緩其中

牛膝酒浸

萆薢

杜仲炒去

白蒺藜

防風

兔絲子酒浸

菴蓉酒浸

官桂減半

右為細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十

丸空心用温酒送下

煨腎丸 治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀

牛膝

葶藶

杜仲炒去絲

白茯苓

防風

兔絲子

茯苓

葫蘆巴

破故紙

酒炒 官桂

減半

右為細末將猪腰子製如食法搗爛涼蜜和杵丸如梧桐子大每服五丸空心用温酒送下如腰痛不起甚効

奇效良方卷之四十六

怔忡健忘動悸門

附論

原病式曰夫怔忡為病躁擾動煩熱擾亂

之體也甚

於外則肢體躁擾甚於內則神志躁動返覆顛倒懊懷煩心不得眠或以煩心嘔噦而為胃冷心痰者非也故煩心心痛腹空熱亡而發得食熱退而減也或逆氣動躁者由水衰火旺而猶火之動也故心胃躁動謂之怔忡此心血不足也蓋心主血血乃心之主心乃形之主血富則心主自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意真血虛耗心主失輔漸成怔忡怔忡不已變生諸證舌強恍惚善憂悲少顏色青心病之候雜經云損其心者益其榮法當專補真血血若富心主有輔無不愈者又有風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡又有七情過傷加以協助飲所致遂成五飲停蓄壅塞中脘亦令人怔忡當隨其證施以

治法且如健忘者陡然而忘其事也皆主於主脾二經蓋心之官則思脾之官亦主思此由思慮過矣傷於心則血耗故神不守舍傷於脾則胃氣衰憊而慮愈深二者皆令人事則卒然而遂忘也蓋心主血因血少不能養其真臟或停飲而氣鬱以生痰氣既滯脾不得舒是病皆由此作然治之法必須養其心血理其脾土凝神定志之劑以調理亦當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂慮遠其六淫七情如此日漸安矣且天驚悸即動悸也動之為病惕然而驚悸之為病心下怯怯如人所捕皆心虛膽怯之所致也且心者君主之官神明出焉膽者中正之官決斷出焉心氣安逸膽氣不法決斷思慮得其所矣或因事有所大驚或聞虛響或見異相登高涉險驚悸心神氣與涎鬱遂使驚悸驚悸不已變生諸證或短氣悸乏或體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安皆心虛膽怯之候也人之所

主心心之所養血心血一虛神氣不守此駭馬氣之所肇端也曰驚曰悸其可無辭乎驚者恐怖之謂悸者忡忡之謂心虛而驚痰則或聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忡使人有惕惕之狀大則為驚即動悸也此則心虛而傷腎水則胸中滲瀉虛氣流動水既去心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為悸驚者去之豁痰定驚之劑悸者去之逐水消飲之劑所謂扶虛不過溫養心立和平心氣而已若一槩以剛燥用工或者心火自炎反助風熱之證可不慎乎且前人析為怔忡健忘驚悸三證各異病同此立方之法俾後之學者當循規守矩體前人之心須需之間不可造次致傷人命反此實醫之過歟

怔忡健忘動悸通治方

元益榮湯 治思慮過多耗傷心血心血既傷神無所守是以怔忡恍惚善忘憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸酒浸 黃芪去芦 小草 酸棗仁炒去

柏子仁炒 茯神去木 木香不見 麥門冬去心

白芍藥 人參去芦 紫石英煨研 甘草炙各

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

茯苓飲子 治痰飲蓄乎心胃怔忡不已

赤茯苓去皮 半夏湯泡 茯神去木 麥門冬去心

橘皮去白各 沉香不見 枳柳 甘草炙各

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

薑木湯 治虛器停飲怔忡

白薑生 白朮 茯苓去皮 半夏麩

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

五苓散 治水氣滲心下怔忡

方見暑門

龍齒丹 治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒 遠志去心 酸棗仁炒去 官桂去皮

當歸酒浸 琥珀 附子炮去皮 桂見皮

南星剉碎生 薑汁浸 沉香不見 木香不見

紫石英煨 熟地黄酒蒸 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十

丸不拘時用棗湯送下

參乳丸 治心氣不足怔忡自汗

人參去芦 乳香三錢 當歸二兩 右為細末研勻山藥煮糊和丸如梧桐子大每服三十九

食後棗湯送下

小定志丸 治心氣不足恍惚多忘常服安神定志

遠志去苗

菖蒲各一兩

人參去芦

白茯苓去皮各三兩

右為細末煉蜜為丸以硃砂為衣每服二十九食後用米飲送下

壽星丸

治心膽被驚神不守舍每痰迷心竅恍惚忘健

天南星一斤先用炭三十斤燒一地坑通紅去炭火以盆覆坑周圍用灰堆定坑內俟參泄下南星在坑內勿令走氣次日取出為末硃砂另研 琥珀另研

右各為細末和勻用生薑汁煮麩糊和丸知梧桐子大每服三十九加至五十九食後煎人參石菖蒲湯送下

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

人參去芦

木香各一錢

茯苓去皮

龍眼肉

黃芪去芦

酸棗仁

白木已上各一錢半 甘草炙半

寧志膏

治心神恍惚一時健忘

辰砂研細

乳香另研各半兩

酸棗仁炒去皮

人參各一兩

各一兩

右為末和勻煉蜜為丸如彈子大每服一九空心用溫酒或棗湯送下

人參遠志丸

治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

人參去芦

遠志去心

酸棗仁

黃芪已上各半兩

桔梗去芦

官桂去皮

丹砂已上各二錢半

天門冬去心

白茯苓去皮

菖蒲各七錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食遠用米湯送下

朱雀丸

治心神不定事多健忘心火不降腎水不升

沉香半兩

茯苓去皮木二兩

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服三十九食後用人參湯送下

二丹九 治健忘養神定志和血安神外華腠理

天門冬 去心 熟地黄 丹參 已上各一兩半 白茯苓 去皮

麥門冬 去心 甘草 已上各一兩 遠志 去心 人參 去芦各半兩

右為細末煉蜜和丸以硃砂半兩研極細為衣每服五十丸加至百丸空心煎愈風湯送下 愈風湯方見風門

芎藭益智丸 治善忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

芎藭 炒 遠志 去心薑汁煮炒 川牛膝 酒浸 桔梗 炒

人參 各三分 桂心 三錢 茯苓 一分 附子 去皮一分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食前用溫酒或米湯送下

加味茯苓湯 治痰迷心胞健忘失事言語如癡

白茯苓 去皮 陳皮 去白 半夏 湯泡 人參 去芦

香附子 炒去 益智 已上各一錢 甘草 錢一

右作一服水二鍾生薑三片烏梅一箇煎一鍾不拘時服

十味溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象感感遂致心驚氣鬱生痰涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安

半夏 湯泡 枳實 炒 陳皮 去白各 白茯苓 去皮一

酸棗仁 炒 遠志 去心 五味子 熟地黄 酒洗

人參 去芦各 粉草 錢半

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

溫膽湯 治痰涎氣搏觸事易驚或短氣悸之心虛不安

方見傷寒門 加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏 姜製二 厚朴 薑製 茯苓 去皮各 紫蘇葉

茯苓 去皮各 遠志 去心 石菖蒲 甘草 各半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

養心湯 治心虛血少驚惕不寧
黃芪炙 茯神去木 白茯苓去皮 半夏麩

當歸 川芎已上各錢半 遠志去心薑汁淹 酸棗仁去皮隔紙炒香

辣桂 柏子仁 五味子 人參已上各錢

甘草炙半錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

加檳榔赤茯苓治停水怔忡

茯苓甘草湯 治心下停水忪悸

茯苓去皮 桂枝各三錢 生薑半兩 甘草二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

寧志丸 治心虛血少多驚

人參去芦 茯神去木 白茯苓去皮 酸棗仁酒浸去核

柏子仁 遠志酒浸去心 當歸 琥珀已上各

石菖蒲 殊砂另研 乳香各半錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後用棗

湯送下

十四友丸 治心血俱虛怔忡驚惕

柏子仁研 遠志去心薑汁焙 紫石英煨 酸棗仁去皮隔紙炒

熟地黃 當歸去芦 白茯苓去皮 白茯苓去木

人參去芦 黃芪炙 阿膠炒 辣桂去皮

龍齒研各一兩 殊砂研各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後用棗

湯送下

遠志丸 治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神魂不安驚

悸恐怯

遠志

去心薑汁製

石菖蒲

各二茯神

去皮白茯苓

人參

去芦

龍齒

各兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂為衣每服七十九用白湯送下食後臨卧服

妙香散

治心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂恹戚虛煩少

睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩常服補益氣

血安神鎮心

方見心痛門

天地煎

治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小便黃

赤或生瘡瘍

天門冬

去心二兩熟地黄九蒸九

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸不拘時用

人參煎湯送下

治膽虛睡卧不安心多驚悸

酸棗仁

炒香一兩

右為細末每服二錢不拘時竹葉煎湯調服

秘傳酸棗仁湯

治心腎水火不交精血虛耗痰飲內蓄怔忡

恍惚夜卧不安

酸棗仁

去皮炒製

遠志

去心製黃芪

白茯苓

蓮肉

去心當歸

酒浸

人參

陳皮

粉草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚以瓦器煎

七分日二服臨卧一服

俞君士選奇方 治心常空行險懼往忘前失後不定

白檀香

白茯苓

桂心

上各二分石菖蒲

天竺黃

熟地黃

蘇合香

犀角

天門冬

遠志

人參

已上各

甘草

十分

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一九食後嚥化或米

飲嚥下

藥味丸 治心恙

猪心取一箇

靛花 一匙

硃砂為末

右先將青靛花暴乾次入猪心血同研爛次入硃砂末為

丸如梧桐子大每服二十九不拘時茶酒任下

鬱金丸 治失心及心恙風

蟬肚鬱金真川者

白礬三兩

右為細末薄糊為丸如梧桐子大每服六十九湯水任下

不拘時服有患顛狂數年者服之皆愈至人授此初服心

胃間有物脫去神氣洒然再服而甦此經憂感痰絡於心

竅所致也

朱雀湯 治心氣勞傷變生者疾

雄雀一隻取

赤小豆 一合

人參去芦

赤茯苓去黑皮

大棗去核

紫石英

小麥已上各

紫苑去土

遠志去心

丹參已上各

甘草炙

右細剉拌勻每服叁錢用水一盞煎六分去滓食遠温服

奇効良方四十六卷終

奇效良方卷之四十七

疝門一 附論

巢氏病源論疝者痛也其名曰厥曰癢曰寒曰盤曰氣曰附曰
狼此七者疝之名也其厥逆心痛足寒諸飲食吐不下曰厥疝
腹中氣乍滿心下盡痛氣積如腎曰癢疝因寒飲食即脇下腹
中盡痛曰寒疝腹中乍滿乍減而痛氣疝者腹中痛在臍旁曰
盤疝腹中臍下有積聚曰附疝小腹與陰相引而痛大便難曰
狼疝其證發則可驗又有石疝血疝陰疝妬疝氣疝此五者有
名而無形也外有心疝寒疝飢疝疝痺數者其名不同病則大
同小異世俗呼為小腸氣膀胱氣奔豚氣蟠腸氣橫弦豎弦偏
墜木腎腎餘陰腫由疝之為病其名別也至於張子和論七疝
曰寒疝水疝筋疝血疝狐疝氣疝癩疝名與諸論不同且如癩
疝者外腎堅腫也痛者為陰腫不痛者為木腎一邊墜下者為

偏墜疝名諸論立雖多且異靈樞經云邪在小腸連辜係屬腎貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也內經又云任脉為病男子內結七疝女子帶下瘦聚衝脉逆為氣裏急然則任脉雖稱病有七疝之名而無七疝之狀而任脉者是疝病之本源各經是病疝之支流也又云厥陰脉滑為孤疝少陽脉滑為肝風疝太陰脉滑為脾風疝少陰脉滑為心風疝太陽脉滑為腎風疝陽明脉滑為肺風疝此風非外入之風乃肝木陽截氣動之風也此六疝者應乎六經在於五藏何謂疝病皆屬肝病生於陰起於下陰者內之太陰脾厥陰肝少陰腎皆足之陰經也下者地之寒氣也足常履地蓋天之風寒皆入於地人之風濕皆從足起或因經虛聚於胞囊小腹兩陰相併二氣相搏則為疼痛矣或冷飲過情水洧歸腎或坐卧素溫寒搏留陰以寒攻陰則為疝痛經曰痛者通也疝氣亦痛宜通不宜塞宜溫不宜寒通謂瀉其實不瀉其虛塞謂補其虛不補其實實者邪氣也虛者正氣也若正氣虛極則先溫而後瀉若邪氣盛極則先瀉而後補溫者必無於氣瀉者必無於寒寒則入於經而導其邪溫則疎其氣養其正也大凡內外之氣交入於腎者為腎氣入於膀胱者為膀胱氣入於小腸者為小腸氣腎與膀胱為截府其氣相通運為外腎系於辜丸此三經乃相連相會者也其脉當以弦緊弦則為寒緊則為痛從寒則痛從溫則腫疝而不愈邪氣留滯結成積聚而為疼痛或脇左右如杯或臍上下如臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱嗜卧飲食不為肌膚腹滿嘔吐醫者當臨期審察若因七情而得者當調其氣安五藏外邪相干者散溫祛寒為先去邪之實補肝之虛則亦愈矣

疝氣通治方

聚香飲子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛痛引腰脇連背

不可使仰

方見氣門

鋪葱散

治男子脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹痛連胃脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

方見氣門

五積散

治體虛冷膀胱小腸氣作痛不可忍每服一兩入鹽炒吳茱萸茴香各一錢生薑三片葱白五寸煎空心熱服

方見寒門

桂枝烏頭湯

治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁身體疼痛風入腹五臟拘急不得轉側

大烏頭

甘草

桂枝

白芍藥

右作一服用水二鍾

薑七片紅棗二枚入蜜半匙同煎

至一鍾去滓食前服

益智仁湯

治疝痛連小腹掣搐叫呼不已診其脉沉緊是腎經有積冷所致

方見氣門

玄附湯

治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗

玄胡索

附子

木香

金鈴子散

治七疝寒注下焦小腹引外腎疼痛大便多閉

金鈴子

右為細末每服二錢空心用熱鹽酒調服

狼毒丸

治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛

狼毒

川烏

羌花

乾薑

乾漆

三稜

鼈甲

鹽一兩箇香一合同妙黃木香不見火破故紙一兩炒
色為度去鹽箇香不用
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九用鹽湯送
下甚者日進三次空心食前服

立効散 治疝氣

川芎

青皮去白

川練子

舶上茴香炒

桃人

黑牽牛炒各

右作一服水一鍾酒盞煎至一鍾空心服

三棗丸 治小腸氣痛外腎腫墜

山木萸去核 吳茱萸去梗 食茱萸去梗已上

川練子

一兩用磁瓶四十天類

破故紙一兩七

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九用桃仁十
五箇炒煎酒送下或茴香酒亦可空心服

葫蘆巴丸 治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰

腫小腸有形如卵上下走痛不可忍者

葫蘆巴炒 茴香去核 大巴戟炒 心川烏各三升

吳茱萸炒 五兩 七次

川練子

炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服十五粒空心溫酒
送下小兒服五九茴香湯下 牽牛二兩

海藻丸 治偏墜小腸氣

海藻

海帶已上

斑猫去足翅

巴豆二十八箇去

右斑猫巴豆一味作一處生絹袋盛用好醋一椀以瓦鉢
盛四味藥同煮將乾去斑猫巴豆不用只將海帶二味細
碾為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋略浸蒸碾為膏和
藥末為丸如梧桐子大每服用麝香少許珠砂三錢乳鉢
細碾却入麝香再碾勻為衣日乾以新瓦瓶收之初服七
粒二服十粒三服十五粒若未愈再進三兩服皆用十五

粒仍用鹽炒苗香細嚼酒吞下空心服忌食鴨子并鯨鱈
動氣之物

補腎湯 治寒疝入腹小腸疝痛時復泄瀉胃膈痞塞

沉香五分 人參 茯苓 附子炮乾

黃芪 白朮 木瓜已杜 羌活

芍藥 紫蘇 甘草炙 猪

右作一服水二鐘生薑三片紅棗一枚煎至一鐘食前服

嘔吐加半夏一錢生薑七片煎服

敷法 治腎囊偏墜

牡蠣煨 良薑各一

石為細末津唾調敷大便屢須更如火熱著痛即安

敵金丸 治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛逆腹寒

熱往來

荆三稜煨 蓬朮煨 猪苓 白附子

蘿藦子 赤芍藥 黑牽牛 川練子

山茵陳 青木香 陳橘皮 五靈脂

薑黃 小茴香 海藻酒浸 川山甲灰火

海浮石以醋浸火煨紅醋碎又煨紅 南木香五采

青陳去白二兩去頭足翅同少黃色去斑不用

丁香一分 香附子淨三兩去殼同炒色焦去巴豆不用

澤瀉半一兩

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐大每服三十九用溫

酒送下此藥能泄斟酌用之

海藻丸 治奔豚疝氣膀胱小腸氣瀕疝亦腎及小兒偏墜一

切腎氣等疾

海藻洗焙 木香 檳榔 川椒炒去屑

甘遂把兩上各川烏半兩沙兩小兩見兩去吳茱萸四錢炒
茴香炒猪苓去皮澤瀉三錢上各白牽牛二兩取

黑牽牛二兩取

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九加至百九
空心溫酒鹽湯任下利下黃涎是驗十五歲以下者服二
十五丸至五十九此藥不特利大便亦能利小便服藥後
忌甘草相反

茴香練子丸 治諸疝證

川練子三錢兩小茴香一兩兩吳茱萸二兩兩海藻酒洗

青皮略一兩木香澤瀉兩各半青鹽三錢

三稜醋炒蓬木醋炒各黑牽牛七錢一半炒熟

右將川練茴香茱萸用酒醋童子小便各浸半兩又用巴
豆去皮斑猫去翅足各二十五箇以川練茴香青皮共炒

色變去巴斑二藥研為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每
服五十九空心用溫酒送下

荔枝散 治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核燒十四箇新者沉香八角茴香炒

木香青鹽一已上各川練肉

小茴香各二錢

右為細末每服三錢空心用熱酒調服

安息香九陰丹治陰氣下墜腫脹如核偏火堅硬如石痛
不可忍

安息香阿魏硃砂已醋上各二錢半用酒沙

石再用酒醋各一盞青皮去白玄胡索微炒

海藻洗昆布洗茴香炒川練子去核

馬蘭花炒各木香半兩不見火大戟酒浸三錢另研各

麝香另研

右為細末研勻以前膏和丸如菟豆大每服十九至十五丸空心用綿子灰調酒送下

寸金丸 治奔豚諸疝作痛

富歸 玄胡索

舶上茴香炒 葫蘆巴各一已兩

桃仁焙去皮 桑螵蛸酒蒸 川練子取肉 川五靈脂另研

白芍藥各半 葶澄茄 木香各半 全蠍十個

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九用鹽湯送下有熱小便秘車前子赤茯苓煎湯送下

天雄沉香煎丸 治下元傷憊陽事不能或成下墜及小腸氣

痛腎臟風攻注脾胃不和腰脚重疼

天維生到 附子生到 草烏生到 漢椒四兩

防風生用 牛膝 黑豆取小者 天麻兩

朱以無灰好酒一斗於銀鍋內慢火煨下得令火沸酒盡為度焙令乾 肉蓯蓉酒浸

官桂去皮各 紫巴戟去心 沉香 丁香

木香 羌活 乾薑已

石為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心用溫

酒送下久服明目雄氣海駐容顏

廣茂煑散 治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪木煨 檳榔生到 官桂去粗 附子炮去

甘草生到 芎藭 白朮各三

右剉碎每服二錢水一盞煎至七分不拘時溫服

山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛

山茱萸 吳茱萸湯洗 川練實剉碎 馬蘭花

懷香子炒 青皮去白 陳皮去白 荆三稜煨

乾薑炮各 附子炮裂去皮

右為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服一十九空心用溫酒或鹽湯送下

不香丸 治卒疝腹痛不可忍

不香 官桂去粗 藿香子炒 蓬莪朮煨

桃仁去皮 檳榔各三分 青皮湯浸去白 萊菔子少冬

厚朴去粗皮生薑汁炙到一兩

右為細末入桃仁泥和勻酒煮麩糊為丸如梧桐子大每

服二十九食前用溫酒送下

四製茱萸香煉丹 治小腸疝氣陽事衰敗下元虛冷

吳茱萸浸一萬揀去梗方四分一 裝帶 酒

澤瀉四兩 枳殼去核 木香 茴香鹽炒 右首蒲炒

青皮 陳皮 三稜煨 白茯苓

檳榔 草薺 桃仁去皮

蓬朮煨 乳香另研 官桂二兩 荔枝核四枚

川練子筒四十九箇入已豆二十

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心用溫

酒或鹽湯送下常服疎利邪氣進美飲食專治腎經虛弱

寒腫痛諸種疝氣

木香湯 治寒疝攻注胃脇滿痛汗出

木香三分 檳榔 細辛去苗 赤茯苓去皮

人參去蘆 芍藥 當歸切焙 官桂去粗

前胡去蘆 青皮去白

石剉碎每服三錢水一盞煎七分去滓不拘時溫服

三增尚香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏留

不散臍腹痛陰核偏大膚囊墜腫重墜滋長有效行步癢

癢不止時以黃水浸成瘡瘍或長怪肉累治不痊致令腎

經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大皆由頻服熱藥內攻或因兜取以至如此用藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料藥

舶上茴香用鹽半兩同炒 川練子煨去核 沙參洗到 木香各一兩

右為細末水煮米粉稠糊為丸如梧桐子大每服二十九空心用溫酒或鹽湯送下日進三服小病此一料可安纏盡便可服第二料藥

第二料藥

加下項藥 葶撥一兩 檳榔半兩

右加入前藥內通共六味重五兩半為細末依前糊丸

數湯使亦如前若病未愈便服第三料藥

第三料藥

又加下項藥 白茯苓四兩緊小尖者去黑皮 黑附子半兩炮去皮臍

右通前八味重十兩並依前糊丸湯使丸數服加至三十丸新久大病不過三料可愈小腸氣發頻及三十年者寒疝氣至如拷栳大者皆可消散神效

吳茱萸丸 治寒疝心腹痛面目青黃不下飲食縱食嘔逆肌

體羸瘦

吳茱萸湯炮 乾薑炮 赤茯苓 甘草炙各半配

白朮 桂心 半夏湯泡 赤芍藥

前胡去蘆 當歸微炒 陳皮 川椒去目合口者炒出汗

附子炮去皮 人參去蘆 木香已上各

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服二十

九生薑湯送下日四五服

蜀椒散 治寒疝心痛如刺繞臍腹中疼痛自汗出氣欲絕

川椒一錢去目及合者微炒出汗

附子一個炮去皮臍 乾薑炮

半夏湯泡去滑 桂心

甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢以水一中盞入粳米半合生薑半分棗

三枚煎六分去滓不拘時稍熱服一方無粳米

芫花丸 治寒疝積聚動搖大者如鯿小者如杯米乍去在

於胃脘大腸不通感風寒則腸鳴心下寒氣上搶胃脇滿

芫花二刀醋拌炒 川椒炒

川大黃剉炒 川烏頭炮去皮臍

細辛

赤芍藥

桂心

赤茯苓

木香已土各一兩

吳茱萸湯泡

半夏湯泡

桔梗去薑各半兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服七丸

溫酒送下日三服當下如泥

昆布丸 治陰疝腫大偏墜

昆布洗去鹹炙

海藻洗去鹹炙

蕪荑仁炒

蒺藜子炒去角

檳榔剉各半兩

枳殼去殼炙

大麻子研各二兩

訶梨勒炮去核

黃底

木香已土各三分

陳皮去白

桃仁炒去皮尖

兔絲子酒浸一宿別研各一兩

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心

用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方 治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛者

雄黃研

甘草各一兩

白礬研二兩

右為細末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良久再煖

洗至冷候汗出差

治陰忽疼痛

桃仁湯浸去皮尖雙

苦練子

藜香子

沒藥

右為細末每服二錢食前熱酒調服

宣胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛 半生半熟取頭末一兩

青木香 一兩班貓七個同炒香用班貓五箇

川木通 一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸用溫酒或鹽湯送下

治鉉剗吹腎囊腫方

右用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處

神効方 治腎囊腫大

右用黑牽牛一兩淨炒黃色香熟為度次將船上硫黃研末拌牽牛須要入內不見硫黃將牽牛紙襯於地上一宿碾末用宿蒸餅糊為丸每服三十九丸空心鹽湯下

木香導氣丸

治男子小腸氣肚疼一功氣積以補下元虛冷

脾胃不和並宜服之有効

木香

乳香

川練子

八角茴香

丁香

香附子

破破紙

葫蘆巴

荆三稜

苧草

已上各杜仲半兩炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸加至五十丸空心用溫酒或鹽湯送下日進三服

加味通心飲

治諸疝脹痛及小便不利

木通

去皮

枳殼

黃芩

瞿麥穗

連翹

枳殼

川練子

去核

甘草

右咬咀每服五錢水一盞半丁香二十莖車前草五莖同煎七分空心溫服

喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲酥炙 葫蘆巴洗 蘇破故紙炒 小茴香鹽水浸

草薢已上各 胡桃仁研如泥

右為細末入胡椒肉和勻為丸如梧桐子大每服三十丸

或五十九丸空心用薑酒或鹽湯送下

一捻金散 治奔豚小腸諸氣痛不可忍

玄胡索 川練子炒 全蠍炒 舶上茴香炒

附子半兩生

右為細末每服二錢痛時熱調下甚者再服効

沉香內消丸 治小腸疝氣陰囊腫大或左右漏腎結核疼痛

難忍下元虛冷久不愈者並治之

沉香 不香各半 葫蘆巴酒浸 小茴香炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五七十九空

湯鹽酒任下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛膝下脹痛以致閉

亂及外腎腫硬日漸滋長陰間溫瘰扒之成癰瘡皆治之

吳茱萸醋一斤去枝梗淨四兩酒浸四兩 澤瀉二兩去灰土切作片

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九食前薑酒

或鹽湯送下馮仲柔苦奔豚寒氣攻衝小腹引痛一日只

一服截府微動痛若失去遂安

救痛散 治小腸疝氣築心疼痛不可忍者

肉苳蔻炒 木香煨 荆三稜煨 馬蘭花醋炒

金鈴子去核 茴香炒

右為細末每服一大錢痛時熱酒調下服之立効

尋氣丸 治小腸疝氣偏墜疼痛

甘遂炒 石鷲子雌雄 斑猫三個去

右為細末酒煮糊為丸如菘豆大每服三丸麝香温酒送下空心臨卧食前服忌熱物一時忌甘草一日

神効胡桃酒 治小腸氣

右以胡桃一枚火内燒成炭細研以熱酒調服絕妙

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼痛及治

婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷百節倦痛怯弱

傷勞滯痺久服盡除但婦人一切疾病宜服

川考 當歸 枳殼去穢 厚朴姜製

青皮 官桂去皮 乾薑炮 川練子炒

茴香炒 神麴炒 麥蘗炒 乾地黄

三稜煨 人參 茯苓 芍藥 芍藥

蓬朮醋浸 木香炮各 右為末每服三錢水一盞葱白二十煎七分入鹽少許熱心

茴香散 服如大便秘澀加大黃煎大便澹利加訶子煎食前服 治膀胱痛

茴香 蓬朮 荆三稜 金鈴子肉各一

甘草半兩 右為細末每服二錢熱酒調服又云每發痛甚連日只二

三服立定頃在微城歎尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍醫

者以剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶

予候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞

氣不得通為之柰何適有五苓散一兩許分三服用連鬚

葱一根茴香一撮鹽一錢水一盞半煎八分服中夜下小

便如墨汁者一二升臍下寬得睡翌日診之脉已平矣大

抵此疾因虛得之不可以虛而驟用補藥經云邪之所湊

其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所畜之邪然後

補之是以諸方多借巴豆氣者蓋謂此也

小腸氣方 治一切丈夫元陽虛弱小腸虛冷非時氣痛忽衝

心脇疼痛難忍宜服

益智去皮

蓬朮各半

茴香

山茱萸去核

牛膝

續斷

川芎

葫蘆巴

防風

牽牛炒熟

甘草已上各一分

右為細末每服三錢水一盞二分煎兩三沸空心連滓服

白湯調下二錢匕亦得

治奔豚氣

川山甲麩炒

破故紙麩炒

香附

去毛各五分

土狗

十箇去頭尾九箇去頭

海藻焙

茴香各一兩

全蠍

去毒十五箇

黑牽牛

頭末四兩

木香一兩

吳茱萸半一兩

右為細末用菜蕈一箇大者剉去心肉入茱萸在內用糯

米一攪同菜蕈煮熟飯爛為度以將菜蕈細切入米飯搗

細茱萸晒乾同前藥為末與菜蕈同搗丸如梧桐子大每

服二十九加至三十九食前鹽酒送下

代灸膏

治證同前

木香

附子

吳茱萸

蛇床子

馬蘭花

各等分

右為細末同薑搗熟麪攤開貼痛處

腰子散

治腎氣作痛

黑牽牛炒熟

白牽牛炒熟

右為細末每用三錢以猪腰一付薄切開縫入川椒五十

粒茴香一百粒以牽牛末徧搽丸腎中線繫溫紙數重裹

煨香熟出火氣燈后空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明

取下惡物即愈

腎氣疼痛方 治丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青唇黑發於不救丈夫則攻繫臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結為癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並宜服之神驗不可具述

當歸

芍藥

沒藥

其莽甲

蓬水

玄胡索

三稜

牽牛

木香半斤

芫花四斤

狼毒半斤 碎同芫花於瓦器內醋炒黃色

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭藥亦作一處研如飛塵所餘衆藥共作一處搗為細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相衮令勻更爛研子遍每服一錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不用飽食後喫也若是大腑秘熱出後不通唇皮焦赤口中涎溢喫此藥一盞見効

八仙丸

治育腸氣

木香

青皮白

高良薑

桃仁去皮尖

阿魏麩

脘肭臍酒炙 桂心各半

乾鰓一分

右為細末用醋浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十九食前以熱酒送下

桃仁丸

治育腸氣疼痛不可忍

桃仁湯浸去皮尖

木香各三

阿魏麩

乾鰓拌炒

芫花醋拌

苦練子

桂心已上各

攪榔一兩

右為細末以醋浸蒸餅和丸如梧桐大每服十九不拘時熱生薑酒送下

摘核丸

治四種癩病如核腫脹偏有大小或堅硬如石或引

臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則成癰潰爛

橘核炒

海藻洗

昆布洗

桃仁去皮炒

川練肉炒

海帶洗已上

厚朴薑炙

玄胡索炒

枳實炒

桂心不見火

木香不見火

木通已上各半兩

右為細末酒糊為也如梧桐子大每服六十九空心温酒
益湯任下虚寒者加川烏一兩腎腫久不消加硃砂二錢
醋煮旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩
療超越壘重卒得陰癰

地膚子

十分白木五分

桂心一分

右為細末以飲服一乃圭日三忌生葱桃李雀肉等物一

方用温酒調下

蜘蛛散

治陰狐癩氣偏有大小時時上下脹入

蜘蛛十四个

桂心半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九空心用米飲

送下為散取八分飲和服亦可

香附散

治癩疝脹及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒一盞入海藻一錢煎至

半盞先滂海藻嚼細用煎酒調香附末二錢服一方以海

藻為末以熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥末

秘傳茱萸內消丸

治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癰偏大或

生瘡出黃水

吳茱萸半兩

酒半醅浸

山茱萸蒸去核

馬蔴花醋浸

黑牽牛頭炒

胡索略炒

川練子蒸去皮

舶上茴香益沙

海藻洗去

橘皮

青皮去白

官桂已上各

桃仁炒

白蒺藜炒并

木香各半

右為細末酒煮稀糊為丸如梧桐子大每服四十九食前

用温酒或益湯送下

太醫院經驗奇效良方卷之四十七

太醫院經驗奇效良方卷之四十八

積熱門 附論

張子和云李屏山素飲酒一日得病醫用酒癥丸熱藥後目覩
天地但見紅色遂成龍火之證卒不能救崇漢李濟之常病目
及居省掾每服補肝散以致睛脹但見窓檻橫排幾至喪明令
涌泄五七次繼服涼劑方始如故丹霞朱僧人魯病三陽畜熱
常居靜室不敢見明明則頭疼如錐每置冰於頂上不能解其
熱歷諸醫莫能辨其病后治之七日而愈其用汗吐下三法而
已後用涼物清鎮之平復如故夫人陰平陽秘神氣以寧蓋昧
者徇情縱慾因致積熱之證非一朝一日故也皆出於心熱甚
則能傷血故出於心積熱者熱毒蘊積於內也或有躰氣素實
一時感觸熱毒之氣鬱積臟腑之間或在心肺之內令人口苦
咽乾涎唾稠粘眼澁多淚心氣通於舌脾氣通於口熱燥相合

無所受制故口舌上生瘡小便秘澁非傷寒之熱非風證之熱此乃積聚之熱也又有酒麪煎煉雄附峻補皆能有熱謂之積熱也何哉一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾若偏者皆致成疾過於熱者積溫成熱蘊積於內遂成前證經云偏勝則有偏害偏害則有偏絕不可不察也王安道曰人之所賴以生者氣也氣者何陰陽是也夫陰與陽可以和平可以乖而否善攝與否吉凶於是乎不能善者故偏寒偏熱之病莫逃乎乖否之餘雖然寒也熱也粗工為之不難設積熱良工猶弗能以為計且以積熱言之始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則枝窮矣王太僕故曰益火之源以消陰氣壯水之主以制陽光又曰取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒吁千言萬語之間殆猶和璧之在璞也積熱之病由此來矣人處中和偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷暖得中而已

矯枉過正識者憂焉治法以三黃丸凡熱皆出於心熱甚則能傷血或以洗心散四順清涼飲子之類此皆前人立論處方後之學者不可將陰陽虛盛之熱又有血分氣分之熱陰盛格陽之熱一例作積熱證治之反誤多矣今開積熱之方條具于後

積熱通治方

涼膈散

治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並皆治之

方見火門

洗心散

治風熱痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便赤澁

白朮 一錢

麻黃

當歸

荆芥穗

大黃 煨 暴

芍藥

甘草 各二錢

右作一服用水二鍾生薑三片薄荷少許同煎至一鍾不

拘時溫服

三黃湯 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃蓮去鬚

黃芩去蘆

大黃煨冬三錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

甘露飲 治胃中客熱牙宣齩腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經

受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼麩炒

石斛去蘆

枇杷葉去毛 熟地黄

黃芩

麥門冬去心 山茵陳

生地黄

天門冬去心

甘草炙各一錢半

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮頰結核

遍生瘡癩已潰未潰並宜服之

防風去苗一錢

鼠粘子炒三錢 荊芥穗二錢 甘草炙半錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

八正散 治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臟腑秘

結小便赤澀

方見淋門

荊黃湯 治風熱結滯或生瘡癩

荊芥四錢

大黃二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

清氣散 治風壅痰涎上膈煩熱

枳殼

川芎

羌活

前胡

茯苓

羌活

獨活

青皮

白朮

人參

甘草各一錢

右作一服用水一鍾煎至一鍾不拘時服

黃蓮解毒湯 治熱毒煩悶口燥呻吟畜熱內甚諸藥不能退

方見火門

人參瀉肺湯 治肺經積熱上喘咳嗽胃腸脹滿痰多大便澀

人參 黃芩 梔子 枳殼炒

薄荷 連翹 杏仁炒去皮 桑白皮炒

大黃 桔梗炒 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後通口服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀眠卧心躁

天門冬 大黃 升麻 桑白皮

枳殼 甘草各一錢二分 荆芥二分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

四順清涼飲子 治血熱蘊結壅滯

方見火門

黃芩湯 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便不利

黃芩 澤瀉 梔子仁 生乾地黄

木通 黃蓮去鬚 麥門冬去心 甘草炙各一錢二分

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前溫服

利膈湯 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

鷄蘇葉 荆芥穗 防風 桔梗

牛蒡子炒 人參 甘草各一兩

右為細末每服二錢不拘時沸湯點服如咽痛口瘡甚者

加殭蠶一兩

防風通聖散 治一切風熱疥癩等疾

方見風門

三黃丸 治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤

澀大便秘結

黃蓮去鬚 黃芩去蘆 大黃煨各十兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十九丸熱水送下
一方以腦麝為衣丸如大豆夜間含化一二丸亦可
薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷末一斤取頭末三兩半
縮砂末二兩取末二錢
川芎末二錢

片腦半錢 研 甘草二錢半 取末

右為細末和勻煉蜜成劑不拘時任意嚼嚥和劑和無片
腦有桔梗

天竺黃散 治臟腑積熱煩躁多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子 去殼 連翹各三錢 瓜蒌根一兩 雞冠雄黃半錢

欝金 用皂角水煮切 甘草三兩

右為細末每服一錢食後臨卧新汲水調服

龍腦鷄蘇丸 消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽唾血
鼻衄吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜臍疽

口若並宜服之。

芫胡 銀州者二兩和木通以湯半 生地黃六兩別

黃芪 去蘆 麥門冬 去心 木通 同芫胡 人參 去蘆

蒲黃 炒 阿膠 炒已上 鷄蘇淨葉 一斤即

甘草 炙一兩半

右除別碾藥外餘藥為細末用好蜜二斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪令勻取木通芫胡汁慢火熬成膏勿令焦然後入餘藥末同和為丸如豌豆大每服二十丸嚼破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟諸淋車前子煎湯下

噲化三黃丸

大黃 黃芩 黃連 各二兩 黃藥子

白藥子 各一兩半 黃藥 若參 山豆根

礪砂各一兩

京墨三錢

片腦半錢

麝香少許

右爲細末用猪膽汁調勻攤在椀內既上蒸三次露一宿後入腦麝礪砂爲丸如豆大每服一九食後噙化冬加知母一方有甘草

大金花丸

治中外諸熱寢汗咬牙聾語驚悸溺血淋閉咳衄

血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又名既濟解毒丸

方見火門

神芎丸

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽膈不利大小便閉澁一切風熱之證並宜服之

大黃

生用

黃芩

各二兩

牽牛

生用

滑石

各四兩

黃蓮

薄荷葉

川芎

各半兩

右爲細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九食後用温

水送下

牛黃涼膈丸

治上焦壅熱口乾咽痛煩躁涎潮

牛黃

片腦

麝香

各一分

紫石英

半兩

馬牙硝

寒水石

硬石膏

各二兩

牛膽南星

三分

甘草

一兩

右爲細末煉蜜爲丸每兩作四十九每服一九食後温薄

荷人參湯下

酒蒸黃連丸

治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連

半斤淨用酒二斤浸以瓦器置籠上累蒸至爛取出曬乾

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五十九食前用温

水送下

碧雪

治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩燥噉物妨悶

或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發強昏憤並皆治之

芒硝

青黛

石膏

寒水石

朴硝

硝石

馬牙硝

甘草

右將甘草煎湯二升去滓却入諸藥再煎用柳木篋不住

手攪令消熔得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝

成霜研為細末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅

塞不能嚥物者即用小竹筒吹藥入喉中即愈頻吹効

既濟清神散 益腎水降心火清上實下

桔梗

黃芩

川芎

山梔子

當歸

羌活

白朮

茯苓

知母

甘草

薄荷

茯苓

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓入蜜調服

玄明粉 治邪熱所干膈上氣滯五臟秘澀

右用朴硝煎過澄瀝五七遍至夜於月下露至天明自

然結成青白塊子用磁罐子按實於炭火內從慢至紫白

然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上

倒下用盆子合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入

生熟甘草末二兩一處攪勻臨卧斟量用之或一錢二錢

以桃花煎湯或葱白湯下此藥本性寒燒過性溫無毒

諸般魚及毒物等

地黃煎 治積熱

地黃汁

三升 茯苓

知母

萎蕤

桔萸根

五兩

生薑汁

生地骨皮

生麥門冬汁

白蜜

各二升

石膏

竹瀝

用竹葉

右咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝

地黃麥門冬汁慢火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取出六

升初服四合日三夜一加至五七合四五月作散服之

海仙丸

治諸伏熱頭目不清神志昏塞解諸大毒以取水之

精漬於船板木中累見風日久則日炙變為青色以取太陽之氣而熈曝中有陰陽之氣結而不散聚而成青服之分陰陽去邪熱調臟腑聖人處治以度物之氣味所用且如東壁墻土取之以新水調化取清水服之治臟腑不調謂脾主於土脾受濕濡瀉取以太陽真火其土引入於脾藉太陽真火之氣以除去濕而吐瀉得止又以魚骨入喉中肉內不出燒魚網灰新水調服其魚骨即時便出又有月蝕瘡不愈者令人燒救月鼓杖燒灰乾搽瘡上立已此聖人取其物類相感故也且船板青與上同意

船板青

五兩

酥油餅末

半一兩

右為細末稀麩糊和丸如梧桐子大每服四五丸不拘時溫酒送下

硃砂膏

治心臟驚熱至甚不省人事

硃砂

礪砂

燄硝

各半

金銀箔

各五片

腦子一字

寒水石

石膏

各半

粉草

三錢

右為細末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調下

大醫院經驗奇效良方卷之四十八