

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊三

5294

1156

部3





傷寒雜病論章句卷六

湘潭孫鼎宜撰

【天氣雜病溼病三】

【中溼】

摘出風溼餘依原次傷寒論出厥陰末溼後金匱出痙溼熱二脈經同

【論大陽中溼脈證一章】

大陽病

又見傷寒論厥陰末關節疼痛翼方作而心煩李益曰溼留關節故

煩尤云溼為六溼之一故其感人大陽之氣不宣故煩○痛心二風寒傷于肌腠而溼則流入關節柯云大陽之氣不宣故煩○痛心二風寒傷

口口脈沈而細者則金匱注細則一細傷上則浮傷下則脈沉當因證而合

而脈勿證脈名曰中溼大陽猶變證也此與傷脈沈細是大陽變脈沈細是

與外感證異也溼傷寒下與此名上溼同故下大陽○中溼為溼痹猶云

也即溼痹也與風寒溼三氣合至之痹別趙云痹痛溼痹之候小便不

利李益曰溼大便反快成云內經云但當利其小便成云宣泄腹中

附子湯五苓散小便利者尤附子湯柯云風溼相搏當發汗風去溼

傷寒雜病論章句卷六 天氣雜病溼 一 中華書局聚

風中溼者必先有內溼而後感外溼此其人平日土德必不及而溼動于中由是氣化不速而溼侵于外外邪故關節煩疼而又小便利大便反快也必先逐內溼而後除外溼東垣亦云治溼不利小便非也然此為脈沈而小便不利者設耳若風寒在表與溼相搏脈浮惡風身重疼汗為宜詳後○脈經無下節

右一章二節首言太陽經府病中溼定脈定證次言溼痺及

治法

【論二陽併病中溼一章】

〔溼家之為病〕

又見傷寒厥陰末

一身盡疼

徐彬曰此溼久而鬱為熱者若

痛不止關節是單溼為病也尤云溼外感者其陽必發熱徐彬云溼內鬱則發熱尤云口口作煩疼發熱久而鬱故

發熱身如熏黃也軌範云此黃與黃瘰別云熱與溼合交蒸互熱故

黃則黃而明所謂身黃如橘也陳云黃而有陰陽溼氣沈滯故也

氣蒸于皮毛故疼之所至即溼之所至即熱之所在也

痛也須五苓散以除溼不泄熱不溼越所則身黃傷寒發黃身

右言溼鬱化熱有發黃者

【論二陽中溼誤治轉兼少陰二章】

〔溼家其人〕

又見傷寒論出厥陰末

但頭汗出

汗出部上越過

之小證別

尤得泄與溼

居發黃陳云不得外通而但上越柯云若小便不利亦不

背疆強也

成非風

大陽之脈夾脊背強大陽客

欲得被覆向火

擬麻黃加尤湯成云此

寒溼表氣不利而背強也

寒溼以通其

陽謂宜○若下之蚤下

宜用麻黃加尤湯尤盛生寒也○寒溼無向火二字

△或匈滿

不噦者則匈

多涼益則噦轉兼少陰

經云陽氣吐義同

而

抑驟聚于上尤云或上

小便不利

利尤云或下焦之陽不化而為病也小便不利

謙曰誤入于中則胃不和而為噦入于上則肺氣逆

此為丹田有熱

成此非真熱

經無不字舌上如胎者滑而白似胎非胎

渴

成燥〔欲飲水〕

有熱而不能飲陳云胸中

則口燥煩也

擬四逆湯誤下傷津故云口喜

水而不能飲可辨其懊惱不可明言之意則燥為煩也

證同病別也

○渴似熱

無煩

傷寒雜病論章句

卷六 天氣雜病溼 一一中華書局聚

右言寒溼誤下轉爲亡陽證

〔溼家下之〕

又見傷寒論出厥陰末蒙上章省雍曰大便溼家不可

積成實未可

額上汗出

與上章但頭

微喘

水氣侵肺較上章曰滿加

是虛陽欲上脫

○小便不利者死

與上章不同既

其額汗出而小便主

死也○傷寒論無字方云溼當利小便

○若下利不止者

亦死

自下利則溼當愈今不愈而反下利不止是陰氣不脫而液脫也趙云

在也大便禁是雖利設無額汗與喘是陰之根猶在也程知

曰二便不瀉瀉下則直視失溼舌微喘是皆死也夫額上汗出小

便則驚癘瘕瀉下不得越故發黃此更微喘是水氣入肺當不能調水

道而小便反利是逆則驚癘瘕水本風溫證若中語柯注改爲風溼故

右言寒溼誤下陰脫陽亡之死證

傷寒上次

【寒溼中頭治法一章】

〔溼家病〕

又見傷寒論

身疼發熱面黃而喘

病溼之常○脈經

頭疼

鼻窒而煩此證之獨尤云焦毫上甚陳云其脈大陳云非沈自能飲食

陳云不腹中和陳云脾無病云非小便利大便反快之比病在

頭中寒溼病中去聲尤云是其頭故鼻窒明鼻窒內藥鼻中則愈內古通

用瓜蒂末含水搯少許于鼻中附載瓜蒂○執範云內鼻之藥金

置未載俟廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂○執範云內鼻之藥金

毋犯其腹內服也鄭重光云寒溼之屬使客于上焦當用上者因而不

### 右寒溼鼻中藥

### 【論寒溼在表宜汗忌火一章】

〔溼家〕身煩疼者尤云溼兼寒而在表陳云不發黃可知未鬱可與

麻黃加朮湯此方在麻黃輩○軌範云△發其汗為宜陳云覆取微汗

不宜大汗斟酌其適可者故與此湯尤云用麻黃湯以散寒并用白朮

行表裏之溼此法一味加入○慎不可以火攻之而反增發熱也

云溼與熱合致衄增黃

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三 中華書局聚

右一章二節言寒溼在表以麻黃加朮湯爲主方并用火之

禁

【風溼】金匱通在痙溼熱二今拆出水證言故易其名曰風水證無別因敘

【論風溼在表宜汗一章】

病者又見傷寒一身盡疼脈經作發熱溼在表曰風日晡所即劇者

陽明經王于申酉戌土惡溼今爲風溼日所干當其時邪正相搏則反

劇也尤云無來去而傷身有痛無止必風溼相搏而痛多在日晡時

發設若不更值陰雨是風溼與天氣合痛亦不止名曰風溼尤云雖在

其內下文云久傷家非冷不可知矣魏荔彤曰痙家非風一定之理汗出

當風錢天來云病入汗不出當以離經之液既不開當外則皮毛又

能內返經絡納于肌腠而欲出溼此汗不得外泄之肌或暑汗當

汗出骨節故一異也盡疼云或久傷謂傷取冷謂水



所致也柯云此雖傷于溼可與麻〔黃〕杏〔仁〕薏〔苡〕苳〔草〕湯方在

輦○尤云瘧非風不成溼非寒不作故以麻黃散寒薏苳除溼杏仁

其方也寒溼亦可用之上章麻黃加朮湯為大齊此方為小齊亦隨

右麻杏苳甘湯總證大陽

【論風溼當汗而不可大汗一章】

仍徐彬語

問曰又見傷寒論厥陰末風溼相搏痺云風在外溼在內陳云風勝為行身體

疼痛本風溼法當汗出而解張璐曰合用桂枝加值天陰句雨不止陰言

謂必俟天晴非汗之而其病不愈者何也答曰金匱作蓋陳云

用此法蓋不識王發汗汗大出者但風氣去溼氣在是故不愈也柯

風為陽邪其入淺溼為陰邪其入深風傷于上溼傷于下淺者若治

風溼者但微微似欲汗出則風溼俱去也徐彬曰風性急可驟驅溼

故風去而溼不去若微發汗則緩故風溼俱去也

右言風溼發表之定法大陽

【論風去溼在脈證一章】

〔風溼〕

溼即水也風水中脈浮風身重溼汗出風溼已不趙云汗出則知

故惡風也惟實惡風者上風衝及胃中不加減法有知陳寒有喘而氣防己黃

耆湯主之有方在防己輩○脈經脫○不尤云風者千在表仍當汗解而今自汗

出表尚未解而已虛則汗解之法不可守行矣故不用麻黃出之皮毛

之表而用防己驅之肌膚之裏服後如蟲行皮中及從要下如冰皆

溼下行之微也然非者尤甘草焉能使衛陽復振而驅溼此為虛邪

右防己黃耆湯定證

【論太陽風溼誤下轉兼少陰一章】

〔傷寒八九日〕

又見傷寒論太陽下傷寒謂即風章蒙上

唐云仲景書凡風寒二二有通稱不用此風溼是蓋外感或係寒隨風

至或係風挾寒來故二字往邪拘束故身疼風邪溼甚火則心煩不

體疼煩風○柯云表證陳云欲行而溼阻之故煩疼溼甚火則心煩不

入能掉動身故疼極重無頭轉側渴等證故雖浸淫于軀受之與風相搏止



減府之界也。○服經作疼痛而煩不能自轉側。則身重陳云邪在表徐云溼

外臺二引仲景作疼痛而煩不能自轉側。則身重陳云邪在表徐云溼

不能自不歐故水溼就下無上達之勢不渴兼喻寒○擬麻黃加尤湯而

下之誤治不下方則不成○虛也冒下二字據外○脈浮虛而瀦者轉兼少陰

虛者陽氣微瀦者正氣傷也據下節知此證小便必不利而大便溼

俱桂枝附子湯主之。以扶陽氣而寒溼自除。此風溼外去芍藥加附子

是從外驅○若其人金匱無其大便堅以腸內無溼故此大便不潤而所

邪之表劑。○若其人金匱無其大便堅以腸內無溼故此大便不潤而所

下利小便自利者。無道去桂枝桂枝能利小便。見此方內者方下

云併走皮內逐水氣。〔桂枝附子〕去桂。程林曰恐其大汗○方下

則仍小便利。加尤〔湯〕。尤能燥溼徐云。主之。此方在玄武輩○陳云

劑○金匱脈經及翼稱尤。△虛弱家及產婦宜減服。三枚二方言附子

故陰虛弱及產後。亡血者皆宜減服。右一章三節言太陽風溼誤下轉兼少陰有風溼平均相搏

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 五 中華書局聚

去桂加朮

【論大陽兼少陰病風溼證一章】

〔風溼相搏〕

又見傷寒論

骨節煩疼掣痛

之釋使各釋己也容掣制也制頓

痛溼也風溼

則掣溼溼則痛

四服拘急

不得屈伸

側柯云即上章不能轉

近之則痛劇

注漢書楊雄傳

汗出

溼

短氣

勝氣為風擾成云風

小便不利

成云溼勝則水氣不行洩也化

惡風不欲去衣

成云風或身微腫者

源不勝此言溼氣不得行洩也化惡風不欲去衣成云風或身微腫者

時浮腫邪外搏○微外臺引深師作悉甄權作流千金作頭面手時

職曰此證脈必而沈細若脈浮大則風多而水少附子當審之甘草附子

湯主之寒者在玄武風○陳云此情略備又云裏之劑徐云當散之在裏

也風溼當燥之治法不外此尤加此亦勝微之證助陽散溼之方

補虛者不可重汗則有防熱者不可實發其溼之法而白朮附子溫經

證較深使用藥大出而邪不盡附耳故減去一枚並去薑棗而甘溼未必

珍傲宋版印

君且以名方冠附子之上是仲景不獨審病有法處方有法附子湯  
及臚列之先後亦大有深義也○外臺十九引深師稱四物附子湯  
注仲景同千金同甄權作  
附子湯近效作尤附子湯

### 右風溼表裏兼治法以甘草附子湯為主方

【水腫】金匱脈經并稱水氣著腫  
病之源也今依軌範較顯

### 【論水腫脈證四章】

跌陽脈當伏趙云非謂跌陽胃氣之本脈也為水畜于內其氣伏故

陰部故其脈當伏按伏當作伏漢隸用伏字致誤跌陽在足背試診

說非也大為有今反緊陳云緊本自有寒句疝瘕腹中痛即本自有

此二者以例其醫反下之尤云寒則宜溫而則凶滿短氣陽氣下致決

瀆無權而陰氣日○跌陽脈當伏伏當今反數陳云數本自有熱尤

胃中消穀脈經注一作消渴按二小便數擬承氣輩此二者以例其餘

今反不利此欲作水尤云小便不利則水

### 右一章二節言水病之由有寒有熱診跌陽脈或緊或數即

可知寒由誤下熱由小便不利

〔寸口〕脈浮而遲浮脈熱遲脈潛熱潛相搏名曰沈尤云熱而潛則熱有內伏之勢

而無外發之機矣故曰沈徐彬曰潛者元氣潛于下也既見熱又見潛是熱為虛熱而潛為真潛矣言元氣沈而不舉非沈脈之沈也

○跌陽脈浮而數浮脈熱數脈止熱止相搏名曰伏尤云熱而止則熱有留滯之象

而無運行之道矣故曰伏徐彬曰數者衛氣止于下也既見熱又見止脈是客氣為熱而正氣為止言上出之衛氣伏而不升非伏脈

即元氣潛于下猶謂也○沈伏相搏名曰水尤云熱留于內而不行則水氣因之而畜徐彬曰從

久伏則旋運不能返而終沈矣息則陰水乘之也沈則絡脈虛留于內

則氣不來也寸口絡脈虛沈而息則絡脈陰虛精陽伏則小便難止于中

也則陽不正氣止而在下難徐彬曰小便是火者水道之所從出虛難相搏水

走皮膚則為水矣尤云此以不化之水而當行之氣則惟浸淫軀殼

其水者即身中之陰氣合水飲而橫溢也亂走邪運

右一章三節寸口跌陽合診以明水走皮膚由絡脈虛而小

便難徐彬曰此論正水所成之由按此當不拘

〔寸口〕脈〔弦而緊〕

陳云緊為寒

弦則衛氣不行

陳云為寒所結

〔衛氣不行〕

經脈

有此四字

即惡寒

衛氣為寒所阻失其衛外之常與其制水之性疑此句當作緊則惡寒

水不沾流走于腸

間○少陰〔脈緊而沈〕緊為痛沈為水小便即難

尤云此二條並陽衰陰勝之證寸口

主陽氣少陰主腎陽主陽氣者寒從外得而陽氣被抑主腎陽者寒自內生而氣化不速亦即所謂陽氣竭者水與寒積而不行者也

右一章二節寸口太谿合診以明水走腸間由衛氣不行而

小便難

〔師曰〕

脈經有二字

脈得諸沈者

總寸口跌陽大谿人迎言

當責有水

尤云水為陰陰盛故令脈沈水

行皮膚營衛被遏亦令脈沈

身體腫重

吳云水畜于裏故脈沈水溢于表故重

○〔水病〕脈出者死

吳云水病肉腫脈當沈伏今反出者是氣外散也尤云正氣反出邪水之上根本脫離而病氣獨勝故死出與浮迥異浮者盛于上而弱

于下絕無也

右一章二節言水病之常脈為沈水病之死脈為出

【論水腫脈色一章】

夫水病人

水一作未猶言平人也

目下有臥蠶

言微擁如蠶尤云目下微腫如蠶之臥經所謂水在腹者目下

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病淫

七

中華書局聚

腫面目鮮澤脈伏伏即沈也尤云陽氣被鬱而生熱此言其然也病水然也尤云因水而為病未腹大腹中積小便不利無水○其人消渴

出由脈沈絕者脈即伏上省文此為有水也○可下之擬承十棗五苓輩下

也陳云玄武湯然不道被下法尤云始因水病而甚故必承下其消渴而益

脈趙云內經曰色澤也腹病者至陰之居也故水在腹下胃之腫外也

靈樞曰水始起也目陰也腹者至陰之所居也故水在腹下胃之腫外也

化津液以成消也必多飲則積起則氣道不宣故脈伏矣

裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側有聲此其起也老蠶即治之須臾身

可體治也此病皆從虛損所致蓋抽繹此章之義

右一章三節首言病水之兆次言因飲水以增其病三總出

其治法為可下

【論水腫定證及自愈證一章】

問曰病下利後程林曰渴飲水程林曰小便不利程林曰腹滿

陳云水有入而因腫者水腫因腹滿下利後津液枯乾層層相不利因飲

無出積于腹中因腫者水腫因腹滿下利後津液枯乾層層相不利因飲



親切擬五苓散發汗利小便○因腫何也師曰〔此〕法當病水○若小  
脈經作陰程林曰腎主水故陰腫  
便自利尤云水及汗出者尤云水自當愈尤云水雖聚而旋行其所  
自行也豈辛散淡滲所能強責之哉按治溼之法不外汗與利小便  
此雖言自愈而治法亦不外此二大法門尤說非○千金二十一注  
一作滿  
月當愈

右因問詞以定水腫之證并言其有自愈者則由其汗能自

出與小便能自利以上六章依金匱脈經次

【論水腫治法大略一章】

〔師曰〕諸有水者冒下○要以下腫當利小便尤云要以下為陰

五苓猪苓等湯○要以上腫當發汗〔迺愈〕尤云要以上為陽易

勢而利道之也吳云越脾青龍等湯陳云治水者分其內外表裏而

治之不若分其上而下而治之尤為確切也沈自南曰利水發汗乃言

其常未及其變若欲汗者兼補陽而利小便必兼變法乃為第一義附子  
湯括萹瞿麥丸之類開腠通陽而利小便必兼變法乃為第一義附子

【論水腫挾氣治當先氣後水一章】

問曰病者苦水病苦猶也面目身體四肢因體字省皆腫此即水腫體也小便

不利內有師脈之不言水之意已見于言表反言匈中痛一氣

一章匈氣上衝咽二且〇不惟衝狀如炙肉三〇不惟衝咽且更結核

肉用半夏當微效喘五〇有此五證則水腫之挾氣自明故與水腫

證面有似留飲而實挾衝氣也〇脅審如師言其脈何類叩其氣分師

曰寸口脈沈而緊沈為水緊為寒沈緊相搏結在關元此即謂

在少陰沈為始時尚微陳水腫之始尚微也年盛不覺陳云邪不勝正

韻通此俗人妄改均也古陽衰之後營衛相干說文干犯也陳云營

衛相陽損陰盛陳云陽日就損陰日加盛按陰謂水氣內經年結寒

微動由年盛以迄無衰必于十年計也起居衰矣不得云加感咽喉塞噎

脅下急痛之動衝痛之法當漸愈〇急一作腎祛寒醫以為留飲陳云未得

源而大下之叶一誤〇下氣繫不去其病不除尤繫猶結也一定不移也

亦攻下必去之〇復重吐之再誤陳云過胃家煩虛除即吐虛古叶下咽燥欲



飲水吐此自誤先本病水因飲又增以助其邪陳云先下以傷其胃又

小便不利陳云火乘于瀆失職水穀不化陰威面目手足浮腫于外

○尤云胃氣重傷胃液因盡故咽燥欲飲水而不宜徑下其水穀

與葶藶圓方闕見以下其水三當時如小差水利化差古叶氣中有

差能進食也差食飲過度此自腫復如前聚尤云水雖下因飲多而水復

暫差而尋復如前也匈脅苦痛釋字以盡其證象若奔豚奔豚即衝氣之加其

水揚溢浮欬喘逆浮當作微字誤金○以下明當先攻擊陳云與桂

湯類甘草衝氣令止猶云使衝氣愈○後迺治陳云用茯苓甘草湯

止其喘自差尤云水聚于下其水揚溢上及肺位則後效且

氣可去水去則效與喘逆俱去矣先治新病謂衝病當在後謂水腫○差後古叶尤

治其水也陳云所當在後治雖然固不能驟除當先治衝氣效喘之

病之由來也痰飲嗽小青龍下加減五方當參看

右言少時水腫年老復挾衝氣第一久病之證歷敘來由及

三次誤治二次自誤食飲之變末言治法當先氣而後水

【論五臧病水之狀一章】金匱出氣十四水

心水者〔其人〕無二金二十身重身體腫而少氣困之其陽則弱故身

重而少氣也魏荔形不得臥程林曰內經曰諸有者不得臥處心屬

曰氣為水邪所阻不得臥火水在心故不得臥者水邪區處心神

安魂不煩而躁亂故煩躁其陰大腫于腎也○腫者氣隨入心陰腫下交

○肝水者〔其人〕二金無腹大不能自轉側尤在腹受肝病之喜歸脾行

故腹大不能轉側魏云少陽脅下腹中痛尤云肝之府在脅而氣連

兩脅時時津液微生小便續通尤云肝喜衝逆而主疎泄水液隨之

肝咽故時時津液微生小便續通而上下也便論不利者又續通此小便邪利

注如常魏注非吳○肺水者千金作〔其人〕二金無身腫一作而小便難化尤云肺主身氣

肺以其水行于身則腫無氣以化其水則小便難時時〔大便〕無二金

陳云肺主氣失其統御之權而治節不故也時時〔大便〕無二金

字鴨塘通水不得從小便出反從其合與糟粕混成鴨塘也尤云既不

澹如鴨之後水糞雜下也魏云  
小便難則清濁不分故鴨澹

○脾水者〔其人〕

二千金無

腹大四肢苦重

尤云脾主腹而氣行津液

不生但苦少氣

尤云津液生于穀穀氣也  
小便利難

○腎水者〔其人〕腹大齊腫要重痛

氣主無重字尤云半身以下腎

屬少陰陽虛

不得溺

互文難

陰下溼如牛鼻頭汗

以牛况之千金似汗故

上其足逆寒

尤云腎為陰水亦為陰兩陰相

面反瘦

面不腫反瘦尤

云面為陽陰盛于也

大便反堅

即陰結證也水病應面腫便澹今經六

卷及八卷無上

右五臧病水之狀

此章雖分五臧而要其治法仍不過發

萬緒雖在形體而實內連臧府不難愈亦復發所以

之證一愈可以隨時省察潛心調攝鮮有病證全者

【五水辨證】

水腫二出金匱水

【論水腫有五二章】

〔師曰〕

問詞脫

病有風水

吳邪云

按此有

水氣外感

有皮水

水在

有正水

臧腎

入正水

有石水

水病焦

有黃汗

程林曰

風水相類

但水皮水

惡風皮水

不惡風正

水

水自喘為異耳

右以水腫分立五名以為大綱

仍陳

風水

尤云水為風激

其脈自浮

陳云浮

外證骨節疼痛

尤云風傷皮

惡風

喻云傷風故惡風此皆表證表脈也

○皮水其脈亦浮

尤云水行皮中浮

外證附腫

千金亦腫也

按之沒指

不惡風

尤云兼風故不惡風

其腹如鼓

尤云堅之即內按之沒指

如一作不滿

故二義長以脈經水補不惡風

不渴

云吳病在皮膚故不渴

其故外有張形而內無滿喘喘據

當發汗

尤云水在皮膚故宜汗

同者以皮者不喘然喘字無着疑

當發汗

云與風水在皮膚故宜汗

其腹如鼓汗以散皮也邪行營衛

當發汗

云與風水在皮膚故宜汗

水言自下有文渴證水謂水氣阻其津液者亦自理之不渴也其在裏水內言則

經已意本謂其不渴而小便不利若小便者此亡津液故令渴文

○正水之尤正水腎臧其脈沈遲外證自喘尤云乘陽之虛侵及上

陽不脛腫上為喘呼子母兼病也陳云喘為正水定證至于目窠如

見石水之腹滿勢所必至也

○石水而云水之聚其脈自沈陳云中未虛冷外證腹滿之尤云因陰

少腹○千金注不喘喻云所主在腎不連肺而連肝經謂肝腎并沈

不及于上故腹滿不喘為石水定證其與正水同者不必言也

亦勢所必至不過以石上下分而異其稱曰正曰石耳

○黃汗之尤溼熱文病而溼居熱外其脈沈遲陳云水身體發熱邪鬱

故匈滿傷陳云熱四肢頭面腫陳云感于上而陽不行△久不愈必致

癰膿尤云久則浸及于裏而營不通則逆于肉理而為癰膿也

右分晰五水脈證仍陳注并及黃汗變證

【比較風水皮水黃汗與汗後虛極肺張五證不同一章】

大陽病脈浮而緊得大陽傷法當骨節疼痛應見此大陽傷寒○而

反不痛不痛則非傷寒矣風寒之甚耳身體反重而酸此即為風水

後反當作證但字誤○有蓋風與水合而成病其流注關節者則痛其

重由所傷之處不疼而酸其人不渴未入裏故不渴而汗出即愈此

當汗自愈證尤云風固此為風水○惡寒者非此汗後變證之惡寒此為

虛極謂附陽虛也此兼少陰證外不解者擬桂枝發汗得之誤在

不然則其表益虛風水雖解而惡寒轉甚○渴而不惡寒者此為皮

水在據皮中視風水亦為較深論中又非病風而渴謂腹如鼓而皮外

于風水之外感而末入裏猶可發汗也此所謂渴而皮內薄于肺故令人

惡寒知非病似風而獨以病水不身腫而冷狀如周痺自冷身腫發熱

云假令身腫而冷者蓋據身未發熱時言而寒溼其常冷水為水氣淫

于膚所以大略相此二句屬黃汗是也胸中窒不能食外云寒襲于

中張故不能食而反聚痛陳云窒而聚痛莫躁不得臥尤云熱為寒鬱于



暮為陰分明是水傷寒此為黃汗○痛在骨節即首節脈浮緊之骨

鬱其熱其證全在于匈同而于肺張申言之者以其狀又如腫故相提并論也尤云寒溼外

淫必流關節故曰此為黃汗痛在骨節按尤以此句專屬上節言誤

效而喘不渴者此為肺張趙注本誤作脾張注其狀如腫按魏荔形曰

未至陷而不起故曰如○發汗則愈此總言尤云水寒傷肺氣攻于

腫似腫而實非腫也○發汗則愈表有如腫病而實同皮水故發

汗則愈專△然諸病此者渴一而不利二小便數者三皆不可發汗

以三者皆為亡津液之徵也設其人大小便自可而不渴者皆當發

汗各依本方可知尤云仲景丁寧之意豈非慮人之津氣先亡邪

右一章七節首出大陽脈證分冒五項一風水二誤汗轉兼

少陰為陽虛三皮水四黃汗五肺張各為分別其證七節總

言治法當皆發汗又隨立忌汗之禁

【論風彊氣彊及風水黃汗與汗後虛極一章】

脈〔浮而洪〕

洪即大也今人強而二之失〔平脈篇略取前二節另編

應疹身體為痒痒者名泄風久為痲癩蓋即此章約文

然削去風強二字則疑癩疹諸證為風氣均平矣今不載

為氣差風氣定脈以下言其差強

○風氣相搏氣者謂即風強則為癩

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 十二 中華書局聚

疹身體為痒

釋名釋疾使人痒搔也其氣在皮中 痒者名泄風之癩疹中

名曰泄者謂其汗出也 久為痲癩後之一泄風

成云痲癩者眉少髮稀身中乾而腥 ○氣彊則為水此氣強也前第

五章所謂氣腫者乃對水腫立名與此 難以俛仰陳云水成則腫

風氣相擊論中搏用也身體洪腫此風大也一作浮 汗出迺愈此即為風

置後尤云風去水行 △惡風則虛此謂汗後而仍惡風者則為陽虛

尤云表虛 此為風水△不惡風者陳云表 小便通利黃汗病亦涉在

便通利 上焦有寒水寒因 其口多涎涎由 此為黃汗據此一則汗後惡風

為風水初起其脈亦浮不得泥于脈沈之說

右一章四節首言風氣相搏之脈次言風強則為癩疹諸證

三言氣強則為水四言風氣俱強則為風水復分二項以明

陽虛與黃汗之別

【總論諸水風水氣張與治水大法一章】

珍做宋版印



水之爲病尤云言腎水也其脈沈小屬少陰猶水病不離肺瘡之少陰者水臧也

尤云即石水△浮者爲風尤云即風水△無水虛張者虛脈經者作爲氣張也

按此當不拘○水疑脫發汗即已軌範云云發汗爲治水要

則爲氣病而非水病矣○水病字發汗即已訣尤云氣病不可發汗

通其肺按治水之法當利小便前已言之矣此專言其在表者故云

當發汗也汗之法亦有二兼裏者當加溫不兼裏△沈者謂少陰宜

麻〔黃〕附〔子〕甘草湯方在麻黃輩○名從經法也△浮者尤

浮謂風也宜麻〔黃〕杏〔仁〕甘〔草〕石〔膏〕湯方在越仁湯○金匱脈經

恐是麻黃杏仁甘草石右一章二節首總言諸水屬腎及風水與氣張之分次言治

水宜汗復就脈之浮沈以明有溫裏或清熱之別

【風水】水腫三金匱出水氣十四

【論風水大法一章】

〔寸口〕脈沈滑者據此知風水病久亦有沈脈趙云內經云脈沈曰

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 十三 中華書局聚

象者云風水其脈自浮此云沈中有水氣據脈面目腫大有熱三

寸口沈滑故以應其病之在面也浮程林曰趙曰面腫曰風風各曰風

水據證○視人之目窠上雅名之部位爾微擁如蠶一擁腫也如新臥起

狀也四亦謂微腫也人有臥出而目上微腫者不為病此藉以比喻之

是其頸脈動五○尤云頸間人迎脈時效六○尤云按其手足上此

有見腫者陷而不起七〔者風水〕之雖曰風水然五水之證可通以手

按而起如裹水之狀者不同蓋腹中氣大肢間氣細氣大一也

### 右一章二節以四診定風水之證

### 【防己黃耆湯證一章】

〔風水〕脈浮〔浮〕為在表〔其人〕能食頭痛汗出○趙云頭汗者風也

作其人表無他病謂無大病〔病者言〕深師無但下重此重謂即要

以下腫與滯故知要以上為和要以下當腫及陰難以屈伸趙云要

傷者水甚于風○此所謂防己黃耆湯主之方在防己輩據金匱附方

溼兼補

〔風水脈浮〕同上〔身重〕略不同〔汗出〕同上〔惡風〕

此證上〔防己黃耆湯主之〕△〔腹痛者〕即方下〔加芍藥〕因溼

章未敘尤云雖有風水風溼之異然水與溼非二也按風水與溼

實即一證前因溼病中兼有風者故正其名曰風溼此因敘五水辨

證故改其稱曰風水行文異而證治則同尤氏見仲景分立兩門遂

云有異又云非二不應游移其說○金匱存此章脈經八存上章而

以此存之注中稱一云

右言水多于風者之主方

〔風水〕惡風兼傷于風故惡風方此初起惡風自別子一身悉腫水氣

陳云風水身重則為溼脈浮此即論所謂風不渴趙云內無積熱在

多而此惡風則為風多脈浮水其脈論自浮風不渴液不耗陳云積熱在

表未入裏○脈續自汗出趙云風仍有時開中通用吳以爲先本無汗非

經注一作而渴續自汗出趙云風仍有時開中通用吳以爲先本無汗非

權一作欲自疑誤而無大熱者此謂發熱方內用石膏原謂風能越脾

自一作巨疑誤而無大熱者此謂發熱方內用石膏原謂風能越脾

湯主之軌範云越脾寒散之方也治風熱在表之證尤云此與上章

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

十四

中華書局聚

之實表增石膏之辛寒者以脈浮不渴或作脈浮而渴者熱之內  
熾汗為熱逼與表虛出汗不同故得以石膏清熱而黃散腫而無事  
兼固其表也  
越脾加朮湯亦主之據方下補方在越脾

右言風多于水者之主方

○以錄驗用此方

【皮水】

水腫四金匱  
出水氣十四

【防己茯苓湯證一章】

皮水之為病四肢腫

深師作皮  
水如腫

水氣在皮膚中

總身言一

【四肢】

蒙上省

聶動者

聶讀為桑爾雅楓桑淫四注善搖貌也深師氣作集相當是桑闕之

防己茯苓湯主之

云在防己輩○尤

得茯苓則不發也○外臺二十引深師稱木防己湯注本出仲景

防己茯苓湯主之

云在防己輩○尤

己茯苓之也○外臺二十引深師稱木防己湯注本出仲景

防己茯苓湯主之

右言皮水有當實皮驅水之法

【皮水與消渴比較三章】

【師曰裏水者】

裏當作皮聲誤于證脈沈頭面浮腫皆同更無可疑

者喻云謂軀壳之裏非臧府之一身面目洪腫洪注家望文生訓亦非

今依脈經〔其〕脈沈沈尤云裏水必從裏積與風水不同故其脈不浮而小

便不利此為主病若不便利成故令病水一證○假如小便自利利則皮水自愈

此亡津液自謂皮過甚之故上節也故令渴也此屬消渴○越脾加朮湯

主之其方在越脾輩○此倒筆法承故令病水言尤云是治其水非治

中有熱故取石膏之清熱與白朮之除溼不然則渴而小便利之水

顧可發汗哉或云此治小便利黃腫未去者之法越脾散肌表之水

白朮止渴生津也按此本為二證尤氏未悟而游移其說非也

〔裏水〕裏字誤外臺引甄〔越脾加朮湯主之〕即上章而略其藥證之文省

〔皮水〕一身面目悉腫外臺二十引范汪注仲景同甘草麻黃湯亦

主之方在麻黃輩○尤云內助右言皮水治法宜發汗有熱者用越脾加朮湯無熱者用甘

草麻黃湯又以明皮水之成由小便不利若過利則為渴病

〔蒲灰滑石散證一章〕

厥而皮水者水為陰四肢病水蒲灰滑石散主之方在五苓輩原本

傷寒雜病論章句卷六 天氣雜病證 五 中華書局聚

方僅二味今添吳云皮水浸淫日久潰爛出水宜用此外敷按此本  
 錢太醫說然據以黃連粉兩無之甘草湯卻治其厥少陰兼陽經篇曰  
 例則當有粉者宜先治水與茯苓甘草湯治之成于法疑大段胃  
 厥而心下悸者宜先治水與茯苓甘草湯治之成于法疑大段胃  
 必作利也此亦利水之方非治厥之先治之法疑大段胃  
 同尤云水氣外盛隔其身中治陽行四肢此厥之治法疑大段胃  
 水則厥愈不必以附子桂枝之屬助其內伏之陽也

右言厥而皮水者當治水而厥自愈

【黃汗】水腫五(金匱) 出水氣十四

【論黃汗之由一章】

問曰黃汗之為病身不黃與發黃證不同身體腫脹一服作身腫注發

熱汗出蒙首而渴寒其口多涎此為黃汗又論云身腫而冷狀如周

痺前云身腫發熱汗出甚辨之後又劇者不能食身重利後不侷者以新久微甚辨之蓋病初受未鬱為熱則身小

也按五水辨證內尤以熱甚則身熱而渴小便利也按五水辨證內尤以熱甚則身熱而渴小便利

黃汗前狀如風水汗沾衣色正黃如檠汁其脈自沈尤檠黃檠木與

風水相照後狀如風水汗沾衣色正黃如檠汁其脈自沈尤檠黃檠木與

其汗出黃則黃汗之脈浮而黃汗水為風氣外合水氣黃汗不為水氣內



過熱氣熱被水渴水與熱  
得交蒸互鬱汗液則黃  
**〔問曰黃汗之病〕** 脈經有  
此六從何得之

陳云以上詳其病也  
證因問其病源也  
師曰以汗出入水中浴  
李升璽曰汗出浴水亦是

脾胃溼久生熱積熱成黃溼熱交蒸而汗出矣  
當風所致者雖無外水而所出之汗因風內返亦是  
凡酒後汗出

可溼以汗久生熱成黃推之皆  
水從汗孔入〔得之〕  
出外臺四汗引仲景作外入

而得〔黃〕耆芍〔藥〕桂枝苦酒湯主之  
酒方在桂枝酒醋也去苦字則

與白酒混矣今不從據方下云服後當  
裏尤云黃耆桂芍行陽益陰得苦酒則氣益和而  
行益周蓋欲使

取衛通酸行而邪氣畢達耳按用苦酒者  
謂尤說非

### 右耆芍桂枝苦酒湯總證

### 〔論黃汗歷節勞汗及風強溼強五證一章〕

黃汗之病兩脛自冷  
據此知黃汗腳無熱者尤云陽被鬱而不  
下通故也陳云身熱脛冷此黃汗的證 ○假

令發熱此屬歷節  
據此知歷節無冷者以歷節之由亦汗出入水  
中浴水傷必歷節痛黃汗出故相提並論尤云水

汗本發熱此謂脛熱非謂身熱也歷節黃汗病  
相本發熱此謂脛熱非謂身熱也歷節黃汗病  
相似而歷節一身盡熱黃汗則身熱而脛冷也 ○食已汗出  
出于汗

晝又常莫臥盜汗者盜汗出于夜常此勞氣也  
此虛勞證汗不必黃

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 十六 中華書局聚

○勞金匱作營尤云營中之熱因改○若汗出已作已若後也○外臺四

反發熱者在汗出後不當復熱是熱與汗俱出于外△久久其身必甲

錯此即五水辨證內風強則為癩去而風熱尚鬱△發熱不止者必

生惡創此又甲錯後之變證投以桂枝免○若身重身重者汗出已猶已

後也汗出風略減而溼仍在尤△輒輕者久久必身潤潤肉顫也風

至故潤而不潤則胸中痛在胸中者尤溼所傷故爾此言溼之△又從要以

上汗出此出上身有汗故通而不通者下無汗此言溼之在下者下

半以者下溼中之也身要臈弛痛要以下無如有物在皮中狀謂也

有物作二蟲外△劇者承汗出已句不能食溼病所常有也尤云證則風

臺之劇而中經不得汗者則身疼重溼加甚也煩躁尤云鬱于

便不利于溼更無由泄尤云閉○此為黃汗此句回映首節言以為黃汗

副兼證總以名必黃○桂枝加黃耆湯主之上方在桂枝輩有汗出不治黃

而病源同者亦得通用尤云桂枝黃耆汗變證不散邪之方有汗不熱

粥取汗以發交鬱之邪也陳云此言黃汗變證不散邪之方有汗不熱



鬱病得汗不能透徹則鬱熱不能外達所以又出此一方也

右一章耑就汗出一項言其變證分爲六節一黃汗汗出色黃二歷節汗出或黃或不黃三勞氣晝夜常汗色不必黃四言病人汗後有復發熱證復分二項有身甲錯者有生惡創者其汗出之色黃與不黃勿得拘五言風溼身重有得汗後風溼仍在者復分輕劇二項輕項中又分二證一身瞶匈痛二腰臆弛痛或痒劇者致不能食其汗出色黃與否亦勿得拘末節乃總主以桂枝加黃耆湯

【氣分】

水腫六(金匱)在水氣十四今拆出另立一部此與五水辨證中氣強則爲水證不同彼氣字謂水中之氣對風疆立名此氣分謂寒氣凝結爲腹滿對血分立名猶之氣腫氣張與水腫水張亦各有異也

【論氣分病腹滿者之由一章】

【師曰】

脈經無二字

〔寸口〕脈〔遲而澹〕遲爲寒澹則血不足

脈經八腹滿內一條

與此大同末句作澹爲無血稍異

○跌陽〔脈微而遲〕微爲氣

尤云爲氣不足

遲爲寒

尤云該寸

口跌陽為言謂寒  
而氣血復不足也  
○寒氣相搏  
舊不足作寒  
正氣手足逆冷  
尤云手足無

手足逆冷則營衛不利  
○尤云由是臧府之中  
營衛無源而不利  
營衛不利則腹滿

寒腸鳴而相逐  
○勝云由是臧府之中  
營衛無源而不利  
營衛不利則腹滿

則身冷  
尤云遺溺之端也  
營衛俱勞  
云云因乏營竭而疲也  
○陽氣不足

同○陳云此陰  
陽各自為病也  
○陽氣前通則惡寒  
俱云則陰失行而陰與

通則痺不仁  
尤云陰先須也  
陳云此陰陽之行則相為病也  
○陰陽相得

其氣迺著不相失則上下通而邪氣不容  
○大氣一轉  
氣大

即正氣也  
續云邪乃著不相失則上下通而邪氣不容  
○大氣一轉  
氣大

△實則失氣  
前在腹中曰轉氣也  
虛則遺溺  
而散云程林遺溺謂必從前

後而去邪氣遺溺于前也  
名曰氣分  
而病云分者謂此氣乘陽之虛

寒氣內客之腹故曰氣分  
而病云分者謂此氣乘陽之虛

一腫與張雖分在內而其病相與節兩出其方可以尋繹其

而皆類于及之外也  
然曰水飲所非則水氣分似為水在所氣中因之病分

珍做宋版印

右一章六節首二節合診寸口跌陽以明氣分腹滿由血氣不足而為寒三節總敘其證四五節言陰陽虛各自為病與互相為病之證六節言氣機自轉迺愈又分虛實以明氣散有由前陰後陰之不同

【論氣分病凶滿者之證治二一章】

〔氣分〕

尤云即寒氣乘陽之虛而結于氣者

心下堅大如盤邊如旋盤

上章為氣分之腹滿此為氣分之

之胸滿摹寫其狀最明尤云其勢亦已甚矣○外臺七引張文仲作心下堅痛大如椀邊如旋盤名為氣分水飲所結方用枳實尤湯注梓音盤此仲景方脈經八作旋杯均謂其形正圓如杯盤之邊回旋也 水飲所作據脈經四字 桂枝去芍

藥一 加麻〔黃〕附〔子〕細辛湯主之

方在合方輦方名從脈經金匱稱桂甘薑棗麻辛附子湯外臺

八引深師作心下堅如盤無大字稱附子湯○尤云不直攻其氣而以辛甘溫藥行陽以化氣視後人之襲用枳樸香砂者工拙懸殊矣 按此方欲其從汗解與上章欲其從二陰散者不同故方下云當汗出如蠱行皮中即愈尤云蓋既結之陽復散行于周身故有是象

○〔心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作〕

袁本脈經無此四字與上節併是也外臺八引備

急用此湯深師用上方主治文同蓋一病而治法有二後人各有取舍吳云不滿不痛是為水氣虛結沈明宗曰當審虛實寒熱脈之浮

沈遲數大為異枳實尤湯亦主之方在治中輩亦字今添此消

同尤云水飲所作者以別于氣分無形所以辛散之水有氣言與

前章腹滿證欲其從二陰解者亦是分消其水之法尤注未瑩李

曰張元素治否用枳丸從此化出深義非漫無主張也趙云食積

胃上傷則用丸以消之入湯而不消必有其胃乃可消否故用枳尤逐

右言氣分凶滿之治有當汗解者用桂枝去芍加麻附細辛

湯有消補兼施者用枳尤湯

【血分】水腫七金匱出氣十四今拆出另立一部血分之腫實兼

分因腫在處隨結所聚則然也血分之腫及遍身則因婦人

便不利陰液停積致阻其血道運行之常而病及于血雖

論血分有由氣血虛弱一章

〔師曰寸口〕脈氣診之寸口〔沈而遲〕沈為水遲為寒寒水相搏

相搏則為水腫可知水○跌陽脈伏行陽脈當大今沈伏則失其運

口跌陽而知寒水勝而胃陽不行水穀不化陳云第不化有脾氣衰

則鴨漉尤云脾氣主裏衰則鴨漉胃氣衰則身腫尤云胃氣主

陳云胃不化則水雜于糞為鴨漉診少陽膽脈也即內經之上部天論中

形謨○少陰脈細少陰地也俱受氣于脾胃衰則生氣不營

地也○男子則小便不利精不化△婦人則經不通陳云血之化與

血質各不同水可化血又可成痰如汗不出則成瘀是也血不能化

哉尤為陰中之少陽氣不行陰氣乃結之故陳云左尺為陰中之少陰

若微小而不能細為真水之虛也按此當各經為血血不利則為水據此

乃病先絕後○名曰血分婦人經類重出注云一作水分非也知者

後經斷各水分可證尤云血分者謂雖病于水而實出于血也

右一章六節首四節言寸口跌陽少陽少陰四脈合診以明

血分由寒水相搏脾胃氣衰以成其腫五節復分男女申明

其由在便閉經斷水不得洩六節乃正其名曰血分

【論血分有由氣血鬱結一章】

〔師曰〕尤云此合診寸口跌陽少陰而知其〔寸口〕脈〔沈而數〕沈

為入數為出表入以出則為陽實陽即熱也尤云肺入則為陰結即

便堅證陳云水非謂斷絕陳云中○跌陽〔脈微而弦〕微則無胃氣由水邪所阻故也

傷土本弦則不得息尤云胃受制而氣不○少陰〔脈〕大〔沈而滑〕沈

為裏滑為實陳云裏沈滑相搏血結胞門陳云胞為血海男女皆有

之間指其臧不寫臧即結也金匱誤瘕尤云夫血結在陰惟陽可

結行其血謂腫病大作○擬抵當輩名曰血分云脈上經隸婦人篇尤

氣虛少而行之不利也此章之結為陰陽壅鬱而欲行不能也仲景

右寸口跌陽少陰三脈合診以明血分有由氣血鬱結結在

胞門者

【黃痺】出金匱黃痺十五雜出穀痺女勞酒痺次序紊亂脈經同蒙

【發黃初起證候二章】

黃汗次之趨云黃痺皆屬太陽陽明病○痺一作疸省文



〔師曰〕二脈字出寸口〔脈〕浮而緩〔浮為風緩為痺〕浮為風緩為痺痺非中風也

景自為上句之注脚言此黃病之為痺與中風之痺不同尤云脈浮為

中曰痺非四脈苦煩陳云風與溼合而為痺也然非風痺疼痛之謂故又

脾熱而發黃故熱行于表也也痲熱以行外行則體面目盡黃矣○必黃

風云性雖外感熱鬱于內而發黃之證其義不取風溼相搏之變證而已及鬱

之其久風性乃發挾其皮膚則色黃而見其煩瀆之象其脈以因風生

挾熱故浮因溼成痺故緩此而從小便出而表裏分消為有據也

右言黃病初起因于風溼其證先見于四肢為痺為煩為黃

而漸行周身

脈沈陳云凡病在裏則脈沈尤云熱難外泄渴欲飲水尤云渴飲之水與熱相得適足

飲小便不利者尤云熱下出陳云無出路則鬱于裏熱則渴欲皆發黃言皆

候之證也

右言黃病之源由飲水而小便不利

腹滿

由于小便不利可知

舌痿黃

尤云脾之脈絡連舌

本散舌下是

躁不得眠

尤云有熱陳云是胃有熱而屬黃家

徐彬曰

此發黃之漸故曰屬黃

不和

胃不和則臥不安也

右言黃病將成先見于舌

陳云欲人圖之于蚤不俟既成而藥之意在言外

【論黃瘧治法難易二章】

〔師曰〕黃瘧之病當以十八日為期

尤云土無定位寄于四季之末各十八日黃者土氣也內傷

于脾故即以上王之數為黃病之期蓋謂十八日

○治之十日以上

為差

謂黃病不能驟愈當俟之旬外乃漸差也尤云治之十日以上

也○反劇者為難治者也陳云土氣不能應期而王故難治

右言黃瘧之愈有定期當如期而使瘥勿過期而令劇

〔師曰黃瘧之病〕

四字據千金十下

瘧而渴者其瘧難治

尤云瘧而渴則熱方

熾而溼且日增○千

瘧而不渴者其瘧可治

尤云不渴則熱已

○發

于陰部〔其人〕必歐

尤云陰部者裏之臧府關于

發于陽部〔其人〕

珍做宋版印

振寒而發熱也尤云陽部者表之軀壳屬于形故振寒而發熱此陰

也陽黃在表故見表證陰黃在裏故見裏證

右一章二節首以渴不渴別治瘧之難易次以歐與寒熱辨

瘧之表裏仍吳注○以上五章依金匱次

〔凡黃〕候其寸口近掌無脈候猶診也口鼻冷者並不可治均陽亡之候也據脈

經八補

右黃病死候

【論治黃不外利水發汗四章】

〔師曰〕脈經有二字諸病黃家陳云概溼熱交鬱而成者言但利小便尤云小便利則

已故利小便為黃家通法○假令脈浮趙云溼不在裏而在表當以汗解仍表不出凡病桂枝

加黃耆湯主之方在桂枝輩千金云宜不稱主之○尤云桂枝發邪

邪也○尤又云黃瘧之病溼熱所鬱也故在表者宜汗以發之在裏

者宜攻而去之此大法也乃亦有不溼而燥者則變清利為潤導如

猪膏髮煎之法也其有兼證錯出者則先治兼證而後治本證如小建中之法也

夏及小柴胡之治是也仲景論黃瘰一證而于正變虛實之法詳盡  
 如論中治瘰之方用之或效或不效非若他證之方每發必中者蓋  
 瘰之重者有囊在腹中包裹黃水藥不得入非決破其囊或提其黃  
 水出淨未悟耳黃瘰當一病和平吐潤之方解諸法無一不備矣然水一  
 按徐自未悟耳黃瘰當一病和平吐潤之方解諸法無一不備矣然水一  
 證當用鍼治具溫補諸方皆輕淡之方假無能為力唐云便利小便人是  
 治黃正法汗下景之意以二語了之反知于治之而惟變證加詳焉讀恐不知  
 有別之意蓋仲景之意以為世多反知于治之而惟變證加詳焉讀恐不知  
 故凡正法每以一二語了之反知于治之而惟變證加詳焉讀恐不知  
 忽勿玩其所略也而

右一章二節首言治黃正法為利小便次言兼有表邪則改用汗法舉桂枝加黃耆湯以明其例

〔黃瘰〕麻黃醇酒湯亦主之方在麻黃輦○據金匱附方補今見外臺四引仲景亦字今添喻云表有水寒

入于營血閉而不散熱結為黃故用麻黃專力開結散邪加醇酒以行之也

右言太陽黃瘰有峻汗法舉麻黃醇酒湯以明其例

〔黃瘰〕小便不利五苓散主之據外臺四引仲景補

〔黃瘰病〕茵陳五苓散亦主之方在五苓輦亦字今添軌範云此利小便之法又云利小便為治黃總訣

尤云此正治溼熱成痺者之一云茵陳蒿湯主之方在〔五苓散

主之〕〔據金匱注補五苓散方蒙上省

右言太陽黃痺利水之法以茵陳五苓輩為主方

【論黃痺下法三章】

〔師曰病黃痺〕發熱一煩二喘三匈滿四口燥者五〇以上是二陽併病尙未成黃

以病發時火劫其汗陳云當用汗解之正法兩熱所得火與病氣爲兩熱也

然黃家所得〕五字疑衍從溼得之溼即汗也兩熱相搏自應汗孔又不

得內返此致一身盡發熱而黃至此黃病始成上言黃痺乃原始之

也也壯熱陳云視一身之熱爲尤甚由火劫故也熱在裏當下之此即所謂火逆下之也

推知〇壯一作腹

右言二陽併病誤火劫汗變成黃痺之當下

〔黃痺〕腹滿小便不利而赤尤云二證裏實自汗出尤云表和此爲表和裏實

當下之〕因下大黃〔黃〕檉梔〔子〕芒硝湯主之方在〔五苓散〕

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三一中華書局聚

黃硝石湯軌範注黃痺變腹滿者最多此方乃下法也尤  
云此亦下熱去實之法視梔子大黃及茵陳蒿湯較猛矣

右言黃痺有峻下法舉大黃檉梔芒硝湯以明其例

〔溼痺之為病〕痺皆係溼此溼而又成痲熱者〔始得之〕三字省對七八日後言 一身盡疼

發熱面色黑黃面黑為異餘並同上 七八日後壯熱較發熱加重 熱在裏有血當

下去之如豚肝血之狀也 其少腹滿者礬石滑石散主之方附梔子輩 ○亦

治一身盡黃目黃腹滿小便不利言不必黑黃又不必有血者始可用之也據千金十補

右言黑黃有去瘀法以礬石滑石散為主方末節言諸黃亦

得通用

【論黃痺有兼寒溼者之治法一章】

〔黃痺病〕小便色不變陳云有實熱則小便當短赤今此是無內熱確鑿可據 欲自利此言內

而大便自易動 腹滿千金作腹痛 而喘尤云便清自利內無熱是溼則腹滿非裏實

也證 不可攻熱謂外有微熱 ○熱除必噦誤下變證趙云熱除則胃噦者小

半夏湯主之此治噦之方非治黃痺也陳



右一章二節首言黃痺屬寒溼者不可攻熱之禁次言誤治變噦舉小半夏湯治噦以明見證施治之例

【論少陽黃痺兼歐當先治歐一章】

〔諸黃〕腹滿與上章同一作腹痛而歐者尤云病在少陽脾胃宜小柴胡湯小

據宋本逐證載方此下為小柴胡湯補程林曰歐而腹滿視其前後何部不利利之則愈今黃家腹痛而歐應用大柴胡湯以下之若小柴胡則可止嘔不可治腹痛也按方下明著腹痛去黃芩加芍藥程未檢及何耶尤云用以散邪氣止痛與歐非以小柴胡治諸黃也

右言黃痺治法當察其兼證依經以治舉少陽喜歐用小柴

胡以例其餘

【論一陽黃痺有補中法一章】

男子黃陳云單言男子者謂在婦人則血分小便自利利則傷津液

便利者不能發黃以熱從小便去也今小便利而黃不去知非熱病乃土虛而色外見宜補中而不可除熱也唐云女勞瘵亦小便自利然有勝胱急故與硝礬散此小當與小建中湯此治燥黃故用飴糖煎證矣無勝胱急則知為虛矣當與小建中湯若更甚者則猪膏載方以小金匱與下湯虛勞內已載之而此不復出故加此二字也逐證

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三三 中華書局聚

右小建中證

【論黃瘰有滋潤法一章】

諸黃豬膏髮煎主之

方附承氣輩趙云此治血燥者也尤云此治黃瘰不溼而燥者之法蓋溼熱經久變為堅燥譬

如盒麪熱久則溼去而乾也陳云髮灰主通小便本神農本草經

右豬膏髮煎證

【論陽明黃瘰有湧吐法一章】

〔諸黃〕

蒙上章省

瓜蒂赤〔小〕豆散亦主之

據金匱附方補原本不標赤小豆今添亦字今添用此以

吐其溼熱外臺引刪煩方云服訖吐出黃汁

右瓜蒂散證

【酒瘰】

舊在黃瘰中今拆出

【論酒瘰之候二章】

心中懊懣而熱

尤云懊懣鬱悶不寧之意陳云酒多不能食陳云熱溼而氣悍故傷在上焦心為酒困

時欲吐者

陳云熱上衝

名曰酒瘰

敘出不言發黃小便不利者以有下章

不能食

陳云熱內畜

〔酒瘰〕色黃心下結實而煩結實也○〔懊懣〕懣懣謂煩即

〔夫病酒黃瘰〕千金十五無黃字小便必不利喻云酒之行必積熱入膀胱

其候〕心中熱足下熱女勞瘰云手足心熱則積于手心焦則足下熱

是其證也

右酒瘰定證

【論酒瘰治法一章】

〔酒黃瘰者〕千金無黃字或無熱言發熱不清言了了喻云其無熱者則

也○脈無心熱而其言清朗也不傷腎則無足熱腹滿陳云熱去心作

少腹滿吳云溼欲吐陳云知為鼻燥酒氣上下欲吐可因其勢而越之

今既腹滿又欲吐則可下○其脈浮者先吐之猶速也詳大陽篇

亦可吐故必審其脈也先後治之誤尤云邪近○脈沈者沈

作致脈經八千先下之尤云邪近

右言酒瘰亦有無熱者當以脈之浮沈定吐下之治

【苦葠散證一章】

〔酒瘰〕心中熱欲吐者程林曰病屬上吐之愈此脈浮者苦葠散主

之方在瓜蒂輩○五

右酒瘰吐法

【梔子大黃湯證一章】

〔酒瘰病〕趙校本作心中懊懣即心中熱所為喻云此酒熱內結昏

非獨或熱痛者較欲吐吐加甚此梔子大黃湯主之方在梔子景稱○外

子枳實致大黃湯此脈沈者之治法也尤云梔子淡豉

右酒瘰下法

【酒瘰誤下變證一章】

〔酒瘰〕下之誤治據下文云久久為黑瘰與女勞瘰久病同其治法

黑為腎氣所發酒瘰之黑乃營血腐敗也必復其肺中清肅之氣乃

積漸而傷腎按色黑者因大目青面黑證陳云肝病目青腎病面黑

心中如噉蒜齏狀傷懊懣之狀也心之所曉口不能宣有如辛葷之氣所

作齏從非從次會意細切之物若牒為菹也大便正黑與女勞瘵同陳云

皮膚爪之不仁陳云血不其脈浮吐弱下雖黑微黃瘵然酒脈必浮

雖黑仍黃故知其為酒瘵也按女勞瘵亦僅頰黑酒瘵則身黑微黃故知之語意未了疑當作

### 右言酒瘵誤下變為黑瘵

【女勞瘵】舊在黃瘵中今拆出

### 【論女勞瘵之狀一章】

頰上黑謂身仍黃也脾病而黃色猶脾病而色黃也尤云腎勞而熱

也又云腎病者顛與顏黑陳云頰上心微汗出洩趙云頰為神熱不得

心部也趙注專指頰汗于此汗亦出手足中熱同陳云心也足心熱與酒瘵

此按心名湧泉屬腎腎虛也薄莫即發主腎虛則其熱以夜發膀胱急

尤云腎熱所迫陳云膀胱為小便自利陳云腎虛不能攝水按方下

大便秘正黑知兼有小便不利證自利乃為名曰女勞瘵陳云得之房勞

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三五 中華書局聚

○腹如水狀不治陳云腹滿脾腎兩敗

右女勞瘵總證

【論女勞瘵治法一章】

〔黃家〕日晡所所猶許也即上發熱不足而反惡寒尤云黃家日晡

瘵不惡熱而反惡寒者此為女勞瘵而腎深則外反惡寒也陳云日晡發

熱按此云陽明病今為少陰證少陰屬腎也〔此為女勞得之〕省六字膀胱

急方同上知由小便不利使然少腹滿少腹者正膀胱所居也千

身盡黃身與上黑雖上黃同陳云獨云黑足下熱與酒瘵同即上一身為足中

因作黑瘵中故見黑色用硝酒礬二石以正逐其敗血也恐其過峻

粥故以麥其腹張如水狀與上瘵同○外臺四千金狀大便必黑瘵同

時瘵此女勞之病非水也陳云非脾溼○腹滿者難治即上○章脈經如

可治作不○硝石礬石散主之方附梔子輩不分難通之主也尤云硝

清腎熱合用以○滑石石膏散亦主之據千九另方用以除熱養竅而已



無需消  
痰者也

# 右申明上證並列二方以備選用

二章依  
脈經次

【穀瘰】

今金匱在黃瘰十五部  
今拆出另立一部

## 【論穀瘰將成脈證一章】

陽明病脈遲

遲為寒胃氣虛可知不言腹滿者多則脈必數今有腹滿則知

弱胃食難用飽

謂飽則腹滿胃中寒故難飽則微煩此勝穀氣俗

名飯醉是也尤云

胃滿胃弱則于有寒故難飽則微煩此勝穀氣俗

柯云食入于胃濁氣歸心故煩○金匱作發煩脈經而熱一條又非胃發

寒頭眩云熱蒸溼而飽攻小便難眩云溼有熱上攻水道必大順陳

云胃中填塞清氣不升濁者必小故難眩云溼有熱上攻水道必大順陳

穀瘰丸柯云用五苓散成熱在胃不能發出反蒸食而發黃于○

雖下之耳然則誤勝在太蚤喻行溼脈遲自除胃實徒下糟粕反害之腹

滿如故云仍擬茵陳湯之有外邪乃使黃從小便去非峻攻之藥也

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

三六

中華書局聚

誤下而病不加劇也世有藥不誤而病證不能早遏者不得過為醫  
咎也一作如鼓則似有加劇意矣柯曰誤下則除中發噦此縱脈遲  
而仍有溼熱〔所以然者〕脈遲故也論云脈遲尚未可攻與此章同  
故不至是欲附發黃證而文勢不相  
出陽明篇類證方尤需參之以類文也  
接蓋類證類方尤需參之以類文也

### 右言穀瘕挾胃寒者不可蚤下

### 【論穀瘕已成脈證一章】

跌陽〔脈緊而數〕數為熱熱消穀尤云其熱在緊為寒食則滿尤云

脾故滿滿者必生溼胃熱而脾溼乃黃之原也軌範云脈尺〔脈〕  
緊而數是有寒有熱故用藥亦當寒熱兼顧古方可攷也○尺〔脈〕

浮為傷腎尤云風△跌陽〔脈〕緊為傷脾尤云沈胡以反浮蓋腎臧精而

精生于穀脾不運胃中穀氣入腎則精無裨而傷脾○風寒相搏尤云

得風而生黃瘕脾得寒而食穀即眩尤云溼熱相合歸于脾穀氣不消

胃中苦濁胃中故苦濁即悍氣常在濁氣下流小便不通悍氣下

膀胱之氣化其義亦通陰被其寒陰猶暗也猶言暗受其寒寒不消穀

非熱流膀胱腎熱移小府脾寒又塞住下焦身體盡黃名曰穀瘕尤云

痺雖始于風寒而實成于穀氣耳

右合診跌陽尺脈言穀痺由胃熱脾寒不能消磨水穀加以腎熱移府小便不利使然

【穀痺主方一章】

〔穀痺之為病〕

蒙上寒熱則此初病之狀即下章穀寒熱證也及其久

云寒熱止時即不食尤云穀壅而不利則溼熱痰鬱之證陽明既鬱

或用食為食即頭眩心不安尤云與酒入瘴則適中懊懣不同彼因心中

熱至即有無可奈何之象此言頭眩耳久發黃〔為穀痺〕茵陳蒿

湯主之方在梔子輦見云云小便秘不通泄此使溼熱從小便出徐彬云

必難乃陽明證因服遲挾虛以致頭眩此表證之問有者也若云

寒熱則非二三日之病不可知即頭眩此表證之問有者也若云

共出一腹減則必小便秘快而腹微張皆可宜開鬱解熱故亦以此為

右茵陳蒿湯總證

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三 中華書局聚

【穀寒熱】

脈經在黃痺中今拆出蒙穀痺次之

【論穀寒熱之由一章】

〔寸口〕脈〔微而弱〕微則惡寒弱則發熱太陽經證當發不發骨節疼

痛此謂醫家當發其汗而不發當煩不煩而極汗出秦策不可以

勞也是謂病人失于調養在平時過于安逸及至病時不當勞而

極汗則正氣已傷皆致寒熱之由較△跌陽〔脈〕緩而遲胃氣反

強脈象見風寒而△少陰〔脈微〕大微則傷精陰氣寒冷跌陽脈

大谿脈言其寒熱也○少陰不足穀氣反強少陰屬水穀氣屬脾

論云少陰負此義陽飽則煩滿煩熱也滿滿則發熱客熱消穀發已

腹飢此節與通明熱則腹滿滿如微則傷精胃熱穀強則瘦言穀

而人反羸瘦也與內經食依相似始即一證名曰穀寒熱也○〔據脈經八補〕

右寸口跌陽大谿合診以明穀寒熱由胃熱腎寒使然

【水飲】

金匱附痰飲嗽今拆出另立一部痰飲乃四飲之一水飲為總名不得以小冒大也

【論水飲脈證七章】

出金匱痰飲

夫病人下有金十八字飲水多病人則致停飲必暴喘滿尤云飲水過多

云此水停上焦

凡食少陳云食少則脾氣虛不能制水飲多陳云飲多則水停心下

○甚者悸尤云甚而悸○微者短氣微謂病之輕者也此水氣侵

短也趙云心火畏水甚則神不安為怔忡驚悸微者陽獨鬱而為短氣

右二章言水停有侵心侵肺之殊就中以侵心為甚小便少

腹裏急此水停下焦也太陽府病中已言故此不敘及

脈雙弦者寒也尤云兩手皆弦寒氣被體也按皆大下後裏虛括兩

手所主病證言誤下裏虛尤易生痰故雙弦為痰痰者飲之稠粘也

○脈偏弦者飲也按之效又無分其為雙為偏而總以弦為水飲義

與此同尤云一手獨弦飲氣偏注也

右以脈之雙弦偏弦定其為痰為飲

肺飲不弦

謂其脈為平李氏云曰弦為肝脈故肺飲不弦尤云論云效家

者木象也肺屬金而克木故肺之自病不當別論但苦喘短氣迫肺

初病亦不弦尤云病勢之未甚則然也二者自當別論

故見二證尤云病已 ○支飲亦喘而不能臥加短氣 尤云支飲上

著脈雖不弦可知為飲 ○其脈平也 謂不必弦吳云謂見肺之平脈

右一章二節言寒飲不能概以脈之必弦舉肺飲支飲有脈

不弦以盡其變 以匱上依

脈浮而細滑傷飲 滑者初病未久李氏曰水在肺義亦通尤云沈今反浮

過多也氣資于飲而飲多反傷氣謂飲水所傷乃客飲而非內飲也

脈弦數有寒飲冬夏難治 寒即痰也助其本脈益其見數則難治此

謂久病者尤云脈弦數而有寒飲則病與脈相左魏氏所謂脈數自

寒而脈自熱也夫相左者必有相持冬飲則時寒助脈相左以魏氏所謂脈數自

或甚夏則寒溫而消息之以陳云弦為寒陰主為礙數為陽主治熱腹在春云

可數觸弦者當下其寒矣



右二章依金匱次補出傷飲之脈不必弦有細滑者又有弦數者  
在冬夏為難治

寸口脈緊寒之實也寒在上焦胸中必滿而噫○跌陽脈浮胃氣

則虛○少陽脈緊頭角動脈心下必悸水氣侵凌上焦故何以言之寒

水相搏二氣相爭是以悸據脈經驚悸內補

右寸口跌陽少陽三脈合診以明寒水侵凌上焦則噫而悸

【論五臧水飲一章】

凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癩先寒即為虛先

熱即為實此即水在心之證也○出千金十八下接云故水在心云疑仲景脫文

故水在心故字據千金補也心下堅堅而不痛築築短氣尤云悸動有

然也水氣上逼則火氣不伸故短氣唐云堅築即堅實凝結惡水不

欲飲為水所困自厭惡之

○〔水〕在肺吐涎沫尤云水從氣泛也欲飲水尤云水獨聚肺而諸經

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 五 中華書局聚

○〔水〕在脾少氣

陳云中氣傷

自重

陳云淫肌肉故身重土本制水而水盛

反能制土也

○〔水〕在肝脅下支滿

有支讀曰搯託然也如

噎而痛

尤云肝脈布脅肋支

滿猶偏滿也噎則出于肺而肝脈上注肺故噎則引而痛也

○〔水〕在腎心下悸

云心腎心下悸交故腎病則心悸一齊下跳動甚則為心下悸○陳云四飲有偏虛之處則飲乘之可以

歷指其所在而義始備也○不言六府者以陽在

### 右五臧水飲之狀

#### 〔伏飲辨證一章〕

出金匱痰飲嗽十二

鬲上之病

句依脈經痰

匱

滿喘欬吐

程林曰痰

發則寒熱背痛要疼

程林曰痰飲發于外○

目眩

眩字據脈

淚自出

淚一作泣誤程林曰

出〔其人〕振振身瞶劇

劇謂肉顫不止也程林曰喘甚則肺葉舉而目

必有伏飲

尤云

就飲之伏而不覺也按此當之統伏而驟發也俗名哮喘當深表裏兼治小

青龍湯防己湯去石膏加芒硝茯苓主之唐云此乃有飲之常非  
久伏之飲所獨見之證也但新飲雖滿喘效不單指哮喘言按此既  
身有飲之常何必多立一名曰伏由不悟伏非潛匿乃即留著之謂  
也

### 右伏飲總證

#### 【論留飲證治六章】

出金匱痰飲  
嗽十二

夫心下有留飲

尤云留飲即痰飲之留而不  
去者也按此當統諸飲言而不

〔其人〕背寒冷如掌大

此飲在匈其氣浸淫于背背與匈原對面異稱耳背為陽虛故陰  
邪射之治宜去飲不可灸其背也尤云飲留之處陽氣所不入魏云  
一身皆動背獨常靜靜處陰邪常客之府以陰邪自外入多中于背  
陰寒自內生多踞于背陳云背為匈之府水留心下溢于匈中而偏  
著于背也○脈  
經八作大如手

○〔留飲者〕脅下痛引缺盆

云飲在脅而氣上衝于肩尤  
云飲留于肝而氣連于肺

效嗽則轉甚

助其氣逆故也脈經注一作轉甚亦通蓋即水流脅下效唾引痛之謂已者  
飲被氣擊而欲移一轉甚亦通蓋即水流脅下效唾引痛之謂已者

〔其人欬而〕不得臥引項上痛

氣衝  
更痛〔效者〕如小兒掣癎狀

十八連上為一章補  
此即轉甚之證也

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼

三 中華書局聚

○〔留飲〕形不發作無熱脈微三者恍如平人命煩滿滿讀不能

食二者亦不見痰飲之狀合上三證描

○〔胸中有留飲其人〕短氣尤云滯氣而渴尤云飲結者津

痛此飲在胸而流于經絡者也趙云飲即溼也溼

○脈沈〔者有留飲〕據此知留飲脈不必皆腫理可推也○千金另

條云沈滑者留飲滑本痰飲之脈也

右五章 依金匱次又依 留飲脈證

病者脈伏由沈而伏沈伏本相近也〔其人〕欲自利利反快快謂心下得舒尤云

也○外臺八引千金作雖利心下續堅滿續猶仍也先本心下堅滿

也心下此為留飲欲去故也欲者將然之詞亦非留飲自能除甘遂半

夏湯主之方在十棗輩○因其欲去順勢道之故不用硝黃尤云甘

相激而相成也芍藥白蜜不特安中抑緩藥毒耳

右一章甘遂半夏湯總證留飲之主方也

【微飲治法一章】

出金匱痰飲

夫短氣有微飲

尤云氣為飲而抑則短欲引其氣必蠲其飲陳云微者不顯之謂飲而曰微則非水非氣如陰霾四布阻塞

升降之路故為短氣也

當從小便去之

尤云飲水類也治

【茯苓桂枝】尤甘

【草】湯主之

以方在五苓尤云益土氣以行水陳云和

○腎氣圓主

之方在玄武

雖金匱餘處作八味腎氣圓小便則一也陳云是從府而

求之臧二方相為表裏

右言微飲有利小便法當分微甚以定求府求臧之治

【腸間水氣一章】

腹滿

李妙曰水

口舌乾燥

非大乾燥祇口舌不潤可知李

此腸間有

水氣也

李云前云水走腸間瀝瀝有聲為痰飲此即痰飲也尤云水既聚于下無復潤于上是腸間有水氣而口舌反乾燥也

後雖飲水祇足以益其下趨之勢口燥不除而腹滿益甚矣按方下云口中有津液渴者加芒硝知此亦有口舌不乾燥而但渴者

【防己椒目葶藶大黃圓主之】

方在防己證不必有水象也尤

云防己治水溼利大小便椒目去腹滿去十二種水氣葶藶大黃泄以去閉也吳云前後分攻則腹滿可除水化津生則口燥可滋矣○

陳云併下三章俱言水氣水即飲也飲之未聚為水水之既聚為飲又統言之以補上文所未備為

### 右己椒蘆黃圓總證

#### 【鬲間有水一章】

卒歐吐心下否

陳云歐吐之後邪從上也越心下應空爽乃仍然否者是鬲間停蓄有水也○外臺二引仲景作歐然心下

否堅鬲間有水

飲水即眩悸者吳云水阻外臺作頭眩于金作目眩不

半夏加茯苓湯主之

尤云飲氣逆于胃則夏吐澀于心則悸蔽于陽則眩半夏生薑止于歐降逆加茯苓

去水也

### 右小半夏加茯苓湯證

#### 【瘦人水氣一章】

假令瘦人

尤云瘦人不應有水而病實為水乃病機之變也齊下悸尤云水動于下吐涎沫尤云水中

而顛眩者

顛頂也尤云水且犯于上矣顛眩即頭眩也

水也

水即五苓散主之

#### 右五苓散證

上三章依金匱次

#### 【心悸治法一章】



心下悸者半夏麻黃圓主之方在趙云半夏輩非弦即範云此治飲在動而下

弱動為驚弱為悸別尤云妙在作圓緩以圖之則麻黃之辛不能

發越津氣而但升引陽氣即半夏之苦亦不特除飲氣而并和

養中氣非仲景神明變化孰能與于斯陳云悸有心虛者有痰飲所

致者此則別無虛證惟飲氣之

【心中無奈治法一章】

右半夏麻黃圓證

〔病人〕外臺二字引仲 胸中尤云寒邪搏飲結于入胸中而不得出似喘

非喘似歐非歐無二句形容 徹心中憤憤然無奈者尤云皆寒之飲與氣

飲水邪心陽藏也以水邪逼處心臧欲却不能受不可故一心中

憤憤然無奈也徐彬云徹通也沈明宗云即泛泛惡心之證○徹一

然字外臺作生薑有外臺下 半夏湯主之方在半夏輩○軌範云此治

無聊奈者乾薑溫氣生薑散飲不消故分四服使中邪氣徐徐

散也尤云即小半夏湯而生薑用汁則降逆之少而散之濁力多

乾薑之理中寒不嘔下利十七以似喘似歐無客類可歸也今核其因

為水飲所作  
改屬此篇

### 右生薑半夏湯證

先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏加茯苓湯主之  
中 舊有

### 【四飲辨證】

水飲二出金匱  
痰飲欬嗽十二

### 【論水飲有四一章】

問曰夫飲有四何謂也師曰有淡飲  
淡謂古痰字與濃對文淡謂其味

去水從廣作痰于濃去水從肉皆失其義金匱作  
痰今依脈經干金注一作留飲誤據下文自見  
有懸飲有溢飲有

支飲  
陳云今人于四飲之外加留飲而不飲而不知四飲證之病因多  
起于水留而不行甚者伏而不出亦何必另立病名乎唐云飲

者水也停茶停酒涎唾涕者皆為水腫四飲大略已眩  
飲合津液者為涎唾走皮膚者為水腫四飲大略已眩

### 右分別四飲之目

仍陳注

問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦  
痰飲病久一身水走腸間

瀝瀝有聲  
痰飲本飲之濃者故在水氣不寫得火上則熬而濃故也陳  
下則腸間有聲其源在水氣不寫得火上則熬而濃故也陳

云水順流則無聲有謂之淡飲尤云穀入于胃而散其精則化

所滯礙則瀝瀝有聲謂之淡飲為痰水入而脾胃不能輸其氣則凝

于飲而其平素飲食所化之精津凝結而布則為痰飲痰飲不復外充積

體而反走腸間矣按痰之與飲實即一類而立二名者以其稠清

不食也其源均由飲食所化之精血凝結而成人盡有之不能無也

飲食精液其清中之清者化為血其濁中之濁者為屎尿其清中

之濁者則為痰飲知此清則悟世人之欲盡除痰者非仲景立法中

散脾制其不為害耳無胃

○飲後痰飲此知變證乃水流在脅下外臺八流作留效唾引痛謂之懸飲不

者在胃而歸飲兩脅自視之處也尤云其流于脅下

者則為懸飲懸者自視之處也尤云其流于脅下

○飲水流行水多行飲歸於四臑當汗出而不汗吳云流

身體疼重謂之溢飲據此知溢飲之水即當出之汗汗當出而不

着為歷節為風溼也尤云其歸于四支者則為溢飲溢者溢于四旁

○欬逆倚息短氣

金匱無

不得臥其形如腫

陳云肺氣

謂之支飲

曰摺雙聲之轉爾雅釋言支載也說文摺柱底也內經支滿甲乙多

傷寒雜病論章句卷六天氣雜病溼

腫處如心之摺託然故曰心下支飲也痰飲而上附心者則為形之氣不見腫于外舊解多未瑩尤云其偏結而不上正中總之水積息不飲者如迫肺也李杲曰夫有飲而四而此獨以痰飲總之水積陰或為飲凝陽或為痰故分而言之飲有四合而言之總為痰飲而已

右分別四飲之證注仍陳

【淡飲】

水飲三出金匱痰飲嗽十二

【治痰大法一章】

病淡飲者當以溫藥和之

吳也云稠濁為痰陽之盛也稀清為飲陰之

當以熱藥治之若痰而兼飲者不可涼又不可純熱故當以溫藥和之趙云痰飲由水停也得寒則聚得溫則行溫藥能發越陽氣開腠理通水道也軌範云溫藥和之治飲後萬世治痰之法始備然

右明痰飲當以溫藥為主方

【茯苓桂枝朮甘草湯證一章】

【心下有淡飲】

支音措李杲曰痰飲停滯于中也

目眩

李云痰飲上阻

茯苓桂枝朮甘草湯主之

方在五苓小便則利尤云溫中去溼故

治痰飲之良劑是即所謂溫藥也蓋痰飲為結邪溫則易散內屬脾胃溫則能運耳○脈經八作甘草湯外臺八引千金同注本仲景

右明痰飲有利水之法上二章依金匱次

【茯苓飲證一章】

〔心胸中有停痰宿水〕蒙上章省自吐出水後此痰去而心胸間氣虛句

滿不能食滿讀曰憊○消痰飲令能食二句是功茯苓飲主之方在五苓輩○

陳云此痰飲善後最穩之方○據金匱附方補今見外臺八引延年注仲景同

右痰飲後善後之方

【懸飲】水飲四出金匱痰飲欬嗽十二

【論懸飲脈證治法二章】依金匱次

脈沈而弦者尤云飲氣內聚吳主飲懸飲內痛尤云飲內聚而

〔病懸飲者〕十棗湯主之李彭曰三物皆苦以洩之能直達水飲窠

甘以緩之且棗為脾果補土所以制水也吳云形氣實者宜之大棗之

懸飲為驟得之證若不用猛齊而喘急腫張諸證隨作恐滋蔓難圖也尤云蠲飲破癖其力頗猛三因方以

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 五 中華書局聚

右十棗湯總證

【溢飲】

水飲五出金匱痰飲效嗽十二

【論溢飲治法一章】

病溢飲者當發汗

軌範云水在中當利小便水在四肌當發汗此亦總訣

大青龍湯主之○小

青龍湯亦主之

尤云水氣流行四肌也水在陰者宜利在陽者宜痛謂之溢飲夫四肌陽也水在陰者宜利在陽者宜

汗故以大青龍發汗去水小青龍則兼內飲而治之者耳徐氏云大青龍合麻桂而去芍藥加石膏則水氣不甚而挾熱者宜之倘飲多

而寒伏則必小用青龍○外臺八引范汪用大青龍脈經千金用小青龍今依金匱兩存之

右明溢飲以大小青龍為主方

【論溢飲變證一章】

〔病人〕肩息上引

喘逆

此皆有溢飲在胸中

據此知溢飲不僅在四肌

久者缺

益滿馬刀腫有劇時

此由溢飲變癰疽證

此為氣飲所致也

擬十棗湯近時用子龍圓即三

因控涎丹從此套出也○據千金十八補

【支飲】

水飲六出金匱痰飲效嗽十二



【木】防己湯證一章

鬲間支飲

陳云鬲間比心下稍高有支飲極迫近于肺故喘鬲間清虛如天之空飲氣乘之故滿滿則連及心下而否堅也

〔其人〕喘滿心下否堅

尤云支飲上為喘滿且滯其胃矣 面色黧黑熱

尤云胃中成聚營衛不行

其脈沈緊

尤云裏實陳云因 得之數十日

醫吐之

陳云醫或吐之陳云醫或疑其在上下之陳云醫或疑其在下痰飲可吐而飲之在心下

者非吐 不愈

李陰陽之氣俱虛

〔木〕防己湯主之

云方在防己散飲尤云

防己桂枝行水而散結氣復益虛于法可謂密矣

無完氣故以石膏治熱人復益虛于法可謂密矣 ○吐下之餘定 ○虛

者即愈

李云虛者受補即愈尤云虛者外雖 ○實者三日復發李云

飲邪固結故復發嫌其涼也尤云實者中

實有物氣暫行而復聚故三日復發也 ○復與者○千金作發則

復○不愈者

此非姑試亦非藥誤乃由病勢

〔木〕防己去石膏加

茯苓

水利 〔芒〕硝堅 〔湯〕主之石膏加芒硝者以其既散復聚則有

堅定之物留作包囊故以堅投堅而即破也加茯苓者亦引飲下行之用耳

右言支飲病久誤治不變者法當清熱補虛利水散氣復言

人有虛實故愈有遲速藉以明熱勢既退即當破堅

珍做宋版印

【澤瀉尤湯證一章】

〔心下有支飲其人〕苦眩冒者支讀曰措外臺八引深師作澤瀉尤

湯主之括凡今歌括類多湊韻不通甚可厭也軌今添免人讀歌

之法也尤云水飲之邪上乘清陽之位則為眩冒者昏冒而神

尤補土氣以勝水也高鼓峯云目眩轉而有水

右言支飲有利小便法

【厚樸〔大〕黃枳〔實〕湯證一章】

〔支飲〕匈滿者厚樸〔大〕黃枳〔實〕湯主之專治在承氣輩○軌由支云

飲所致此正決其源也陳云匈樸枳實調上焦之漸高充滿于匈故亦

行也尤云匈疑作腹支飲多匈滿此何也獨支下厚樸大黃與小承氣

同設非腹中痛而閉者未可以此輕試也按支飲至于匈滿則瀰泛

右言支飲屬熱者有下法

高原極矣而不必破字其兼有腹滿便堅可知分推知不然亦不拘方與

【葶藶大棗寫肺湯證一章】

〔支飲〕不得息者軌範云肺病所以專葶藶大棗寫肺湯主之方在

輦○尤云葶藶入肺通閉泄治肺尤云肺滿氣閉

右言支飲氣閉者有瀉肺法依上四章

【十棗湯證一章】

〔夫有支飲家〕欬煩胸中痛者尤云胸中支飲擾亂清道趙氏所謂

結胸則痛不卒死卒音至百日或歲尤云營衛不愈絕神氣消亡為卒死矣

緩而正氣得持也可與十棗湯尤云以經久不去之病與以十棗攻之

其事敵以苟安不如背城之一戰也然亦危矣陳云單刀直入此不

恤名不避怨自盡其道然也若未百日及一歲更不待言矣按此

右言支飲頻危有峻攻法

歐家舊有本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

隸歐吐中

【效逆上氣】

效為肺病餘臧府雖各有效乃肺之兼證也金匱出肺痿肺癰效嗽上氣七及痰飲效嗽十二說者謂為以燥

【論內傷之效證脈一章】

溼分敘核其實未確且一證分立二篇與全書體例亦不合今統為一立二

〔寸口〕脈〔微而濇〕微者衛氣衰濇者營氣不足衛氣衰面色黃滯氣

而不運故黃王宇泰云子能令母虛營氣不足面色青血凝而不行

肺主氣氣虛則脾色見于面而黃營氣不足面色青故青王宇泰

云心主血血衰則營為根衛為葉營衛根葉以人應木也兩者缺一

肝色見于面而青營為根衛為葉營衛根葉以人應木也兩者缺一

旬營衛俱微則根葉枯槁成云營行脈中為根衛行脈外為而寒慄

一效逆二唾腥三吐涎沫也四脾此純為虛證與諸效別雖有水飲

愈亡腥血臭也此欲為吐血之兆其治法當於逆效則去病之間知所

【論久效後愈期一章】

右言效逆有氣血兩虛積久唾腥證

效而脈浮浮者病氣出也其人<sub>愈</sub>不效效已不食脾胃尚弱如是四十日<sub>已</sub>脾胃

氣復自能食也○〔據脈經八補〕原注一云三十日

### 右效後能食之期

### 【論久效當吐脈證二章】

夫久效爲水

五字據千金十八補

效而時發熱

似外感

脈卒弦者

非外感以弦爲飲之本脈

也○千金作脈在九菽者蓋謂其沈重按乃得

非虛也

弦必有力

此爲胸中寒實所致也當吐

之

〔據脈經八補〕

### 右效逆有當吐者

〔效家其脈弦〕

〔蒙上〕

〔欲行吐藥〕當相人彊弱而無熱者

〔熱謂內〕

下者

乃可吐之○其脈沈者

〔據後文擬〕

不可發汗

〔據脈經八補〕

右一章二節首言虛人脈弦病效逆者當慎其吐下節言脈

沈者復忌汗

〔上三章依脈經次〕

### 【效逆忌汗一章】

效而小便利 一若失小便 二

〔不可發汗〕

〔此肺病而兼太陽府證內經所謂膀胱之效效而遺〕

濁者也由下焦陽虛使然成  
云肺經虛冷上虛不能制下  
○發汗則厥逆郭雍曰宜甘草乾薑湯  
亡○出不  
可汗篇

### 右言肺兼膀胱病之效誤汗則厥逆

#### 【論效逆死證二章】

上氣面浮腫千金作肩息尤云氣但升而不其脈浮大不治與外感

別尤云陽有上越又加利尤甚與尋常之效而兼下利者亦殊此陰

陽離決故不治○出金匱肺痿肺癰效嗽上氣七

〔傷寒〕效逆上氣其脈散者死千金十八謂其形損故也出辨脈陰

柯云外寒傷形內熱傷氣效逆不止氣形氣而不相保耳成云散者心

之氣已絕原其效逆之故因于寒傷形氣而不相保耳成云散者心

脈火克金〔脈大而散者為氣實血虛名曰有表無裏〕表裏即謂氣血也○

章補或引之以訓此或仲景原有也

#### 【續命湯證一章】

珍做宋版印



〔欬逆上氣〕蒙上伏不得臥面目浮腫續命湯主之方在青龍輩內  
附方續命湯方下補

右外感寒熱之方

〔射干麻黃湯證一章〕

〔欬而上氣〕尤云肺有邪則氣喉中如水雞聲程林曰連連不絕之

作聲尤云肺中寒飲上入喉間為呼吸之氣所激則作聲如水雞聲

如字據外臺十引小品注本仲景補蘇頌圖經本草云水雞似蝦蟆

而背青綠色尖嘴細腹俗謂之青蛙亦有背作黃路者謂之金錢蠶

陶氏所謂土鴨爾雅在水曰鼃者是也俗名石鴨所謂蛤子即今水

右外感風寒之方

〔皂莢圓證一章〕

〔欬逆上氣〕時唾濁尤云濁痰也肺中之痰隨上氣而時出然但

坐不得眠此膠痰為病非陽氣不得入于陰但以眠則上氣愈劇唾

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三六 中華書局聚

皂莢圓主之

方附半夏輩○軌範云稠痰粘肺不能清滌非此不可

也魏云如今用皂莢澡浴以除垢膩即此理用上焦徐徐潤化自

右去膠痰之方

【厚樸麻黃湯證一章】

欬而脈浮者

軌範云脈浮風寒在表

厚樸麻黃湯主之

方在青龍輩○尤云此與小青龍加石膏湯大

同而散邪獨飲之力居多小麥所以安正氣也

右外感風寒之方

【澤漆湯證一章】

欬而脈沈者

軌範云脈沈伏飲在裏

澤漆湯主之

方附五苓輩○尤云二章俱不詳見證但以脈之浮沈而

異其治按此亦在表之證故用桂枝餘則消痰兼清熱也脈沈為水飲阻其正氣非謂在裏

右消痰水清熱之方

【麥蘗冬湯證一章】

火逆

誤治變證

上氣

或兼欬逆不拘陳誤

咽喉不利

虛火上炎

○止逆下氣

四字著麥藷冬湯主之方在白虎○人蔘生津補虛半夏者  
冬湯之功效葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清  
肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏湯

右治燥效之方以上五章出金匱肺痿肺癰嗽上氣七并依其次

【十棗湯證一章】

〔效家〕其脈弦為有水十棗湯主之魏云無外感之浮內虛之數此

言趙云脈經以弦為水氣為寒為飲必聲色灼然方知為水陳云效  
嗽證表裏寒熱虛實七情勞傷俱能致之最為虛損一大關頭然泛  
而求之條緒紛繁切而求之可以姑息養奸以至于死亦當知變計矣  
手後世畏其峻而不敢用乃姑息養奸以至於死亦當知變計矣

效而引脅下痛者懸飲〔十棗湯〕主之○其脈沈者不可發汗見

上第十○不能臥出者出謂行也起陰不受邪故也謂無厥冷為

以十棗證本有近于三陰之證故也○據外

右治懸飲效證利水之方

【乾棗湯證一章】

上氣汗出而效者屬飲家

〔夫上氣而欬者此為飲也〕

蒙上章省

乾棗湯主之

方在十

○并主腫

一及支滿二澀飲三○皆

○若下後裏不可與也

乾棗湯之禁○  
二章據千金十

補八

右欬逆利水之方并主兼治腫滿末節言下後乾棗之禁

【論久欬用藥次第加減法一章七節】

出金匱痰飲欬嗽十二

久欬數歲

尤云緣支飲漬肺而欬按此雖為支飲然久欬者亦不盡拘○冒下二證

○其脈弱者可治

陳云

退邪欲

○實大數者死

陳云邪日進尤云久欬者氣必虛而脈反實大數者則邪獨盛以久欬之氣必虛而脈反實大

能持

△其脈虛者

陳云正衰故邪亦衰尤云若脈虛者正氣固虛而飲氣亦衰故邪亦衰尤云謂弱也此承可治之證言

非分作

必苦冒

冒之治法見下二方尤云飲氣雖衰其人本有支飲而正不能禦之亦足以蔽清陽之氣

其人本有支飲

在胸中故也治屬飲家

尤云此病為支飲所致去其飲則病自愈陳云此治效必先飲治飲雖未定十棗之方總

不外十棗之意寓蠲飲于補養之中也按陳說非也此即下節小龍證停飲而兼有外感者與支飲內效煩胸中痛者不卒死至百

日或歲之證截然兩殊○金匱本段各節為一章注家皆誤拆今逐節以圈識之脈經僅錄此致一篇良法美意均失

右一節言支飲久欬當憑脈以定其死及可治

○效逆倚息尤云倚几而息能仰也吳云呼吸促也不得臥尤云肺居上焦而司呼吸

則效逆上氣甚則但坐不得眠小青龍湯主之尤云麻桂散外入之寒半夏消內積

入麻桂之性使入飲去邪也

右二節言支飲久效仍當以發散為主舉小青龍以明其例

○〔小青龍湯〕下已服下猶也多唾飲水口燥燥而散津液不能上行未寸沈尺

弱沈弱為本服手足厥逆似少氣從少腹上衝匈咽似奔手足不用而

痺皆水飲為之有此一證其面翕熱如醉狀未戴陽證而實即因復

下流陰股故此一證與陽越自別小便難難則水洩時復冒者水飲為

文其脈虛者必苦冒證與〔茯苓〕〔苓桂〕〔枝五〕〔味甘〕〔草〕湯並下五方通在五苓

治胃熱法在下文補出治其氣衝氣衝亦水飲為之也軌範云此方五味子不

必衝故專于斂肺也按此非謂誤治乃言水飲有

右第三節言支飲久效發散之後即當以利水為主舉苓桂

味甘湯以明其例

○氣衝卽低

低平也愈也故去桂枝桂枝可治

而反更效

更

者明其先有此證陳云下焦衝逆

〔用茯苓桂枝五味甘草湯〕去桂

加〔乾〕薑〔細〕辛治其效滿

陳云桂氣勝而主氣薑味勝而主形以

病重在形而不重在氣也

### 右第四節言支飲久效利水之後卽當以治效爲主

○效滿卽止

止猶愈也效滿此節後載方復列此二味者誤也今類

方中削或謂增人渴反止者用

而復更渴者以由口燥而加劇

〔衝氣

復發

者復用桂枝可證以〔乾〕薑〔細〕辛爲熱藥也

熱藥致渴本

證便爲水飲已去下文云若渴反止者則爲水飲復作可證然不致

有衝氣復發之理蓋薑辛二味原非香竄之品所能發動氣衝者也

〔服之當遂渴〕

即斥上證言省渴則寒飲去自能

宜于大

△若渴反止者

水飲在爲支飲〔也〕

支飲復作口支飲者法當

冒亦卽上文其脈

冒者必歐

水飲亦歐者復內半夏以去其水

內古與

味甘○此爲〔茯苓〕〔五〕

草半夏湯



右第五節言支飲久效服藥後有渴而即愈者論所謂先歐

後渴為欲解者是也有支飲復作而歐者則須加半夏

○水去歐止

歐止自去半夏方中復列之者誤也今削

其人形腫者

此氣腫也故杏仁可治尤云胃氣和而肺

氣未

加杏仁主之

此為茯苓五味甘草杏仁湯

△其證應內麻黃

方中細辛乾薑各三兩又加杏

杏仁治逆氣自足非謂

以其人遂痺

即上文手足不用而痺

故不內之

尤云血虛之人陽氣

無偶發之

△若逆而內之者必厥

此為誤汗轉兼少陰與上文手足最易厥脫

所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

擬玄武湯以既轉少陰自無復有胃熱上衝之

矣證

右第六節言久效形腫可杏仁而不可麻黃

○若面熱如醉

即上文其面熱如醉狀不言形腫已愈者可推知自不致再用杏仁也

此為胃熱上衝

薰其面

尤云胃熱隨經上行面故也

加大黃以利之

此總結第三節言後乃當治水飲此節言後乃當

胃層次井然方為合法也

○此為效嗽第一重證

其歷敘治法與少陰兼陽經病中證象桂枝陽旦二證隨機應變行文用意親切皆同

非身歷其境焉能有此近人謂傷寒論為仲景設想之書未曾體會

故也軌範云以上五方因證加減精義當細參

○此為茯苓五味甘

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

四

中華書局聚

〔草大〕黃湯舊本方中復腫消之後自無再用之理此本因變證雜出故  
熱上衝而又當歐止腫消之後自無再用之理此本因變證雜出故  
隨證加藥以治之非謂以藥疊相加入也賢如洄溪猶仍其誤足見  
五消腫六洩胃熱非謂以藥疊相加入也賢如洄溪猶仍其誤足見  
著書之難其于茯苓五味終始  
不去者以利水斂肺有專能也

### 右第七節言支飲久效有用大黃以清胃熱法

【肺張】

蒙上次之出金匱肺痿肺癰效嗽上氣七

### 【論肺張脈證并治二一章】

效而上氣肺張其脈沈者

略外臺沈作浮

心下有水氣也

八據脈經

注一云補今兩存之

### 右言肺張由於水氣

上氣喘而躁者

喘徐彬云喘為風之躁

屬肺張欲作風水

徐彬云其逆風

熱而為風水尤云激而性下風躁之

發汗則愈

如發汗之二方藥

是也尤云發汗所謂一舉兩得也尤注非陳云徐氏謂肺癰由風均性在表

故宜汗解所謂一舉兩得也尤注非陳云徐氏謂肺癰由風均性在表

合行之故可也分實不可也唐云肺癰肺痿無不氣此則專論上氣非肺意

癱痿肺也

右言肺張由於風水其治宜汗

【小青龍加石膏湯證一章】

〔肺張欬而上氣〕

蒙上章省

煩躁

煩躁餘皆小青龍證

而喘脈浮者

作沈

〔心

下有水氣〕

蒙上章省

小青龍加石膏湯主之

之軌主方

並下二方為治別

因當隨證加減也尤云此外邪內飲之證以其煩躁則挾有熱邪而心下寒飲又非溫藥不得開而去之故用小青龍加石膏溫寒並進于法熱尤密

右言治肺張當水熱兼除

【越脾加半夏湯證一章】

〔欬而上氣此為肺張〕

蒙上章省尤云外邪內飲填塞肺中

其人喘

軌範云肺張之喘最多知者絕少

目如脫狀

尤云目睛張突如欲脫出之狀壅氣使然也

脈浮大者

陳云浮為風挾水飲而則知其為風熱挾水飲而則

乘于

越脾加半夏湯主之

李必曰麻黃散逆下氣尤云清裏熱甘棗養

之力多而獨飲之力少故以半夏輔其未速不用小

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溫

三

中華書局聚



風溫陳云麻杏甘石湯猪苓梔子白虎黃連阿膠湯酌用程知曰青龍白虎推廣之可以應用無窮蓋溫病宜于發散中重加清涼

風溫不可于清涼中重加發散也

右一章二節首言大陽病溫次言誤汗加劇則成風溫

【風溫】

溫病二○溫有風溫有寒溫有溼溫有燥溫雖不出方各以意斟酌之可也

【姜蕤湯證一章】

風溫為病

出太陽上與上合二柯改為風溼誤

脈陰陽俱浮

尺寸俱浮為在表

自汗出

此二證與太陽

中風同○千金無自字身重多眠睡

證熱傷元氣也

鼻盛息

一出氣促也○

必

鼾

即感息也○

語言難出

元氣傷則證○

若

被下者

在太早誤

小便不利

與下句或失遺同為太陽氣絕于下言

或不利或甚則遺溺也汪云四字當在

若被下者之利者汗出多而津液耗也誤

直視

絕于上失溲絕不

○千金作則耳聾難言但吐下之則遺失便語

○若被火者

復分

微發黃色

柯云受火者

△劇則如驚癎時瘈瘲

云柯云受火氣之重者顧

案風溫得火若火熏之

即謂發黃之色若熏黑也成

○一逆尚引日

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溫

三

中華書局聚





時然後可名中喝與傷寒證別○柯改作中暑或因夜中暑夾寒有不  
 因乎浴水而因乎乘涼者或因暑動而得之湯東垣得之耳于古無微沿  
 于肌膚而來之說靜而傷心為中暑益氣湯為中熱于古無微沿  
 宋元以虛實不傷寒論汗出氣傷熱惡寒為白虎  
 其證雖有虛實不傷寒論汗出氣傷熱惡寒為白虎  
 同然難拆為二項不傷寒論汗出氣傷熱惡寒為白虎  
 尤所忌惡寒者熱氣入則皮膚緩腠理開則惡寒自解然亦須詳審有  
 不無表範云熱入則皮膚惡寒清熱無惡寒者解然亦須詳審有  
 出而誤認為寒用大順身熱而渴也津液則作熱蒸肌腠則身熱與傷  
 散相等熱齊則立危矣屬汗出多之病無惡寒者解然亦須詳審有  
 救于水○但傷寒初起無汗不渴也尤云表裏熱熾之胃陰待也求白虎  
 加人獲湯主之其氣不傷也故初起即惡寒而病又身為熱而渴也藥者以  
 清熱生陰為中暑而無溼者之法○脈經作白虎湯

右言大陽中熱得藉用陽明之方舉白虎證以例其餘

【論類中喝證一章】

〔大陽中喝〕

傷寒論出厥陰末不出方○此四字更屬王熙妄題說見下唐云上章是喝之正文此章非喝證也仲景恐人

誤認為喝故特辨之今人身熱重由冷水迫陽于外而脈微弱涼  
 創為陰暑之說反生葛藤

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病喝 醫中華書局聚

象之 ○此以夏月傷冷水 陳云推之夏月陽浮陰伏凡畏熱貪涼 水行

皮膚中所致也 此明身熱法月令曰土潤溽暑大雨時行故暑病多

兼溼者時令為之也 一物 猶言一味依前後方名瓜蒂湯主之 軌範云此方

按此絕非喝病不過因在夏月又外有身熱有類暑耳尤說非 法

右言夏月傷冷水迫陽於外發熱有類喝證者治宜去溼舉

瓜蒂湯以明其例 此設言水用上脘也若停在

【論中喝誤治變證一章】

〔大陽中喝〕 又見傷寒論厥陰末尤云傷大陽即發熱 即身 惡寒

身重而疼痛 並與上二章同省皆大陽 其脈弦細訖遲 成云中暑

四字不得連講 唐云此章以故細汗下温鍼為戒 小便已灑灑然

毛聳 即惡寒互上文俗謂為尿戰先本惡駒灑灑惡寒之象毛聳者

毫毛豎起也 尤云大陽主表內合膀胱 手足厥逆 亦祇謂小便後則

能宣達與少陰合下文觀之方可以定為中喝 大有勞 體虛不身即熱

一○先本發熱今口開二○張其前板齒燥三○有此三證故不曰

又因勞而加重八月時之生開口即見者也○冒下象形後○若發汗陳云

虎湯齒者七誤前板謂齦之當前者也○冒下象形後○若發汗陳云

傷則惡寒甚此擬誤四逆湯少○加温鍼為誤以逆冷則發熱甚助熱得火

擬承○數下之為誤以發熱則淋甚擬猪苓湯據此知先更有小便澹而難成

氣矣此東垣補中益氣湯去其重雜者亦東垣方也補

中不如改用清暑益氣湯去其重雜者亦東垣方也補

右虛人中喝脈證并汗下温鍼誤治之變傷

【天氣雜病寒熱病六】

【瘧】出金匱瘧病論曰瘧者由外邪伏于半表半裏入與陰爭則大寒出

與陽爭則熱故曰瘧脈往來弦正以數遲小緊浮大皆未可定要必帶

則無是理也故曰瘧脈往來弦正以數遲小緊浮大皆未可定要必帶

陽脈也少

【辨瘧病一章】

外臺十脈引仲景傷寒論有辨瘧又

瘧者病人形瘦

與瘧瘧消礫

皮上必粟起

即惡寒互文不言發熱可

傷寒論十五補千金十病源同

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病寒熱

聖

中華書局聚

右言瘧病以形瘦惡寒爲定證

【辨瘧脈一章】

〔師曰〕脈經無瘧脈自弦陳云五藏六府各有瘧病仲景獨取少陽爲主者示後人握要之圖耳一自字大有

分別見瘧證雖各不同而少陽脈證○弦數者多熱○弦遲者多寒此

句據脈以定病源五○弦小緊者下之差緊爲實陳云以○弦遲

者可溫之遲爲○弦緊者脈經作緊數陳云弦可發汗鍼灸也緊爲

爲熱或寒或熱故汗鍼灸○浮大者可吐之浮爲在上大則病實徐

之法各相其所宜而選用○浮大者可吐之浮爲在上大則病實徐

同義○以飲食消息止之總上文汗吐後各證言陳云末一句言治

法也喻云梨蔗汁生津止渴按此當不拘其病有熱多者有寒多者有

裏多而可下者有表多而可汗可吐者當隨其脈證而施治也

右言瘧病不離少陽故脈必帶弦各隨其兼見之脈以定其

爲風與寒熱及汗吐下鍼灸飲食之治

【久瘧兼否一章】

瘧歲歲發至三歲

至三歲之久猶未愈也

或連月發不解者

數月亦云久矣一作連日誤

以脅下有否也

雖未至結為癥瘕然否自足礙其營衛運行之次故與瘧母同也

不可攻否但虛津液

即少陰兼陽經病中大黃黃連寫心湯之成法宜桂枝湯攻否宜大黃黃連寫心湯之成法宜

先其時

未發瘧之時

當發汗

擬柴胡桂枝湯

服湯已先小寒者

微惡寒引衣

自覆

就溫以助藥力若先小熱者又無須衣覆矣

汗出小便利即愈

上焦得通津液得下先無汗小便不

利可推知也○據千金十補

右言久瘧者必有否當先解表乃可攻否

此表字對脅下之否言其實瘧病本

在半表半裏也

【瘧母治法一章】

問曰

外臺有二字

瘧以月一日發

謂計其受病之始與節氣言也勿以朔望拘

當以十五日愈

是謂一終一氣終也內經云五日謂之候三候謂之氣吳云

當月盡解

再過一氣

如期不差當云何

期舊作其師曰

八以上三十字脈經

結為癥瘕各曰瘧母瘧母者有即形可徵瘕者段也老子以為天下母注

鬼神之則邪當解也否則瘧三十一日天證人耳之氣再更而邪自不能留矣設

更不愈其邪必假血依痰僻下急治之三脈字無 驚甲煎圓主之

方在雜法頗多外臺無其峻一金匱云宜不稱主之急今從脈經尤云行氣

逐血之陳云治此言瘧之邪因若正氣先衰以消長也乘其未集而擊

息止也為久瘧之邪若瘧母先除瘵飲再培元氣切不可託食消

兩小可江釀成養奸之按此方岳治何瘵凡虛勞寒熱通飲亦當以節

【瘧瘧治法一章】

〔師曰〕瘧瘧者三千字作陰氣孤絕與陰爭之謂也非氣絕乃拒氣于陰入

不則專據于陽而無分消之地故陽氣獨發獨受其害故但熱則熱一

謂其內而少氣必二少氣熱傷源同也外金無則微三者其候煩冤云陰尤

虛者陽正氣必發則足旺以傷氣而耗神故少氣煩冤云陰尤

滿外臺同手足熱之四本陽威則手足者熱也而欲歐熱干胃云名曰瘧瘧



素問王注痺熱也〔若〕据千金但熱六不寒七陰故內經云其氣不及于

字邪氣內臧于心氣外在臺心臧邪外舍於分肉之間陽尤但熱不寒舊下邪為

外舍分肉而其臧令人消藥肌肉終有上七證以較下漸成其形瘦此原始瘦

氣則內通心臧陰陰亦受傷矣肌舊作脫從外臺改尤大肌肉白虎加桂枝湯主之

為則陰陽極則陰消也此與內經論痺瘧文大同唐時王燾所據本尚

不脫字據外臺引云此以連內經下章痺瘧皆主之略以肺素有熱而偶受風

寒內臧于心外舍分肉表則經而裏則用熱虎加桂枝湯清心救肺

故但熱而不作寒也師不出方余比例白虎氣內虛不能與陽爭

以除裏熱加桂枝調和營衛以驅外邪即先擬後審矣其云熱瘧者亦

當以白虎清其先桂枝却其後也陳氏所擬方審矣其云熱瘧者亦

內寒則不見內經云陰氣內寒則不見內經云陰氣

温瘧者但脈經作瘧但見熱者温瘧也病源其脈平平謂其脈數如平身

無寒時病六七日但見熱也三句內經以先熱後寒為温瘧但熱不

傷寒雜病論章句傷寒雜病論章句卷六天氣雜病寒熱 聖中華書局聚

言自金匱脫去六七日數不合骨節煩疼時歐未並致消燦肌肉尚朝發莫

解莫發朝解〔名曰温瘧〕之蒙上文省十二字據脈經補千金亦同有

度耳据此知温瘧初起無間也白虎加桂枝湯主之虎方在白○蜀漆散

亦主之方在瓜蒂輩清熱下補此即治牝瘧方但以驅痰之法行之○

時服為異

右言二陽温瘧有清熱解表法以白虎加桂枝湯為主方有

驅痰法以蜀漆散為主方蜀漆證為陽明府痰結之病

【牝瘧治法一章】

瘧多寒者尤云非真寒陽氣為痰〔名曰〕二脈經無牝瘧也寒陰也牝

名牝舊誤所過不得外出肌表蜀漆散主之方在瓜蒂輩○尤云

外臺五引仲景正千金十尚不誤蜀漆散主之蜀漆吐瘧痰去則

陽伸而寒愈以其上越之猛動心中之神與氣故用雲母龍骨也

雲氣乃升發陽氣之物龍骨屬陽能逐陰邪蜀漆常山之苗功專

取其功升○牡蠣湯亦主之補方在瓜蒂輩同略以有初感寒邪為異

于外結散陽通其病自愈尤云此較蜀漆散外攻之力較猛

右言牝瘧吐痰之法有吐欲兼斂者用蜀漆散有吐欲兼發

者用牡蠣湯此亦二陽證○以上五章依金匱次惟補入千金一章

【寒多治法一章】

瘧二證下△寒多微有熱△或但寒不熱○柴〔胡〕桂〔枝〕乾薑湯主

之方在柴胡輩○通治二證之方趙云此與牝瘧不相類而實非牝瘧

病伏于營血之中陽氣化熱血滯成痰遇衛氣行陽者亦不出而與陽

半爭之熱或無熱也是用柴胡為君發其鬱伏之陽黃芩為佐清其

痺和諸藥調陰陽也得以通肌表之痺括萋牡蠣除留熱消痰血甘

右大陽兼少陽瘧柴桂乾薑湯證

【發渴及勞瘧治法一章】

〔瘧〕發渴者多熱小柴胡去半夏惡其燥也加括萋根潤燥湯主之方在柴胡

云瘧謂少陽而兼他經者則有之謂他經而全不涉少陽則不成其

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病寒熱 吳一中華書局聚

攻補兼施故  
亦主勞瘧  
○亦治勞瘧  
勞則生熱有傷津液故亦主之○  
方據金匱附方載外臺引仲景補

珍傲宋版印

### 右少陽瘧小柴胡證

【寒熱】  
蒙瘧次之

### 【論寒熱由於誤治一章】

〔師曰〕  
問詞  
病人脈微而濇者  
陽濇則無血  
此為醫所病也大發其

汗又數大下之其人亡血  
亡血即亡津液互文  
病當惡寒  
先轉屬少陰  
後迺發

熱  
陽終不亡又能發熱而寒  
無休止時  
謂成其往來也  
一既非傷寒

正病故不傳經變證積年累月而又  
四時加減柴胡飲子及鼈甲煎圓  
○脈經七作為惡寒而發熱  
夏月盛

熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身  
有冬夏臘月之也  
郭雍曰謂暑月獨

見熱五月獨見寒也  
王肯堂曰非必遇夏乃寒  
遇冬乃熱也  
此但立

其例論其理耳  
柯云四句是寫寒熱發作時狀  
皆是設辭勿以此無休

止時作綿連冬夏解也  
程應旄曰欲著複衣欲裸其身  
是一時遞見

極言寒熱之盛如此  
所以然者陽微則惡寒  
明非外陰弱則發熱  
明非

內實此醫發其汗令陽氣微  
龐云宜四  
又大下之令陰氣弱  
龐云宜

之類誤吳云此即寒在骨髓熱在皮膚熱在骨髓寒在皮膚之病也按此本柯氏之言也柯云其證與骨髓寒熱同

時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月

之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身

十二句疑熙注文混入經中屠俊夫謂其偏謬已極亦為過激祇覺其重贅耳以陰脈遲澹陰脈尺脈也○

故知血亡也兩言亡血治法自見兩言胃中則其主病當重陽明可知曰陽內微曰陰內弱以見非陰陽離絕也顧云此證

陰陽兩傷而首末獨言亡血者下之亡陰不必言汗亦血類也○出辨脈篇

右一章可分四證寒熱往來不休如瘧為一證陽氣內微但

惡寒不發熱盛夏著複衣者為一證陰氣內弱但發熱不惡

寒隆冬裸身者為一證或其人綿連冬夏在夏惡寒在冬發

熱為一證各從元氣之厚薄而寒熱為之淺深仍柯注

【論寒熱有骨髓皮膚之殊一章】

病人身大熱出傷寒太陽上柯屬厥陰陳云身之反欲得近衣者熱

在皮膚寒在骨髓也顧云皮膚骨髓並屬于表但有淺深之別耳成注以表裏對言喻云此以互合之表裏言設合

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病寒熱 吳一中華書局聚

之臧府而統言  
○身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也柴胡

飲子鼈甲煎其久暫有歲月之異輕者有似感冒重者即變骨蒸所

以內或以後諸書有方論不入傷寒等法大段以清營中之熱為

脈證之外感亦不關七情熱在軀殼也涉府骨不犯經絡故皮膚六經

熱是指天時言兩身字言身當其時也風寒之邪得之于驟或內外皆

味或表裏俱熱此骨內之真陰真陽而漸使然故無定體法當以八味六

### 右一章二節言寒熱治法當順其所欲以別其真偽

#### 【柴胡飲子證一章】

五臧五臧者通稱非寒熱一作四時加減柴胡飲子主之方在柴胡

二字一作湯○據

右言寒熱以柴胡飲子為主而四時加減不同

傷寒雜病論章句卷六



傷寒雜病論章句卷七

湘潭孫鼎宜撰

【內傷雜病】

【宿食】【出金匱腹滿寒疝宿食病脈證治十并依其次】

【論宿食脈可下證三章】仍陳語

問曰〔人病有〕宿食何以別之陳云人病則食自少若誤認為宿食使然以櫛麩枳樸消導之藥投之則

中氣虛外邪乘而入裏故問以別而師曰寸〔口〕脈浮〔而〕大尤云浮大者穀氣多也

脾陳云宿食當于關上見其沈滑而患之久則按之反濇尺中亦微

而濇宿食在內阻其胃氣故也反濇尺中亦大有食經宿則脈濇矣尺

而反微濇此氣結不通之故尤云脾傷而滯血氣為之不利故濇中

氣阻滯水穀之精氣不能下逮故微濇也按微濇二字側看而字疑

衍尺中微而急故知有宿食蒙問當下之因有下省翼大承氣湯

主之脈經千金俱不出方

脈滑而數者尤云與浮大同李慈曰滑者水穀實也尤云穀氣之實

〔此有宿食〕蒙上文下之愈宜大承氣湯

則為微瀆若宿食之本脈則為數滑新舊殊反而病源則一謂診者當

以通義一病可見數脈一脈可主數病要在診者會法

下利不欲食者有宿食也吳云謂初下利也傷食久而致下利傷脾不能

曰傷食惡食故不欲食與不能食者自別下利也○欲一更無別當下之

本大黃所謂推陳致新〔宜大承氣湯〕蒙上句亦必因宿食之故陳云

脾胃者所以化水穀而行津氣不可或止者穀則化絕而生氣以全

而矣若氣漸日消磨豈徒無益而又害之醫者當知所返矣

右三章大承氣證首二章據脈言

〔論宿食可吐之證一章〕仍陳

〔宿食〕在本在上脘者方云上脘今胃之在上口脘也張志聰曰故上脘主納

吳云胃有三脘食在上脘者鬲間痛而吐亦可吐也

痛而不可吐也不當吐之宜瓜蒂赤〔小〕豆散原本八千金十五俱不

出方○成云食在下腕則當吐內經云高者因而越之是在上腕

### 右瓜蒂散證

### 【論緊脈主病一章】

〔寸口〕二脈經有脈緊如轉索左右無常者左脈經補〔有宿食也〕下

章省○尤云緊中兼有滑象不似風寒外感之緊以指轉索之狀故

寒氣所束者緊而不移食氣所發者乍緊乍滑如以指轉索之狀故

曰無常陳云上言浮大微瀦又言數滑皆在于無常二字以意候之非宿

食之定脈也緊亦為外感之定脈所異者在無常二字言忽而緊忽

而不緊也按二說非也據平脈篇轉索無常乃緊之本體非因宿食

變換緊為寒胃寒不能消穀致有停食庶為近之左右者言脈動時

左之左搏右手非謂病也

○〔寸口〕上脈經一章省合〔脈緊〕蒙省上即頭痛風寒一或腹中有宿

食不化也二感風寒也謂宿食不化仲景恐人誤以此為外感而發其汗故舉一

狀而實為積類傷寒也宿食不化意亦遠矣按此言緊脈主病凡有二證一

傷寒雜病論章句

卷七

內傷雜病

一一

中華書局聚

按內經所謂人迎是指結喉兩旁言

右言緊脈主病有二一外感風寒二腹中宿食上六章依金匱次

【論宿食有惡冷嗜熱不同一章】

胃中有澀

澀猶積也

食冷物即痛不能食

冷不能消故爾

有熱物即欲食

據千金

五上補下接大腸有宿食云云脈經在六卷中

右言宿食有惡冷愛熱之常

【論宿食發生病證一章】

〔寸口〕脈〔弱而緩〕

此同一息四至之濡之非陰

弱者陽氣不足

方云胃

氣不能消穀則緩者胃氣有餘

成云言胃中經有陳氣二穀物也張卿子云胃

氣不足則消穀則必指定未消

穀物說程郊倩曰食入于陰長氣于陽

陳氣不足則消穀則必指定未消

宿于胃是以陽氣之不足成其胃氣之有餘也方云言有所克化而食

斥陳

噫而吞酸

論云中焦不和使然此以消穀食之內傷言也

宿食卒不

食卒不

下宿

食留于胃中不能下入

大腸成

氣填于鬲上也

謂匈中煩懣也擬

下作

○跌陽〔脈緊而浮〕

論云跌陽當大

浮為氣

陳氣虛

緊為寒

緊為痛成云脾中寒浮為腹滿成有宿食自滿自痛緊為絞痛成云脾浮緊相搏

腸鳴而轉轉即氣動鬲氣迺下食留胃中氣填鬲上今始自○少陰

脈不出脈下利雖由脾胃然腎主下焦虛寒過甚故下利不禁也其陰腫大而

虛也誤陰後陰也此即脫肛之類成云下焦虛寒聚于陰器不得發洩

腫大內經所謂腎為胃關聚水而從其類也○出平脈篇

右一章三節合診寸口跌陽大谿以明脾胃虛寒宿食不化

出于上則為噫出于下則為屁久利腎衰則為脫肛

【驚發】西京賦獸不相發薛注發駭走也知此即驚駭之謂金匱大

不知實不侔也此王洙隨意比附非出仲景

論驚發四證一章

〔師曰〕問詞病有奔豚奔豚見氣血雜病有吐膿即吐膿血論所

驚怖見後有火邪見大陽誤火此四部病皆從驚發得之四者通擬桂

蠲湯亦不必皆從驚發而此所謂驚發又即斥加火而驚之證也○

傷寒雜病論章句 卷七 內傷雜病 二一中華書局聚

新亡財為縣官所捕迫從驚發者治用鴟頭鉛鞅復餘物未定王燾

注云千金翼有飛鴻鉛丹丸主顛癩瘖此意相鞅近鉛鞅一云角為

馬桃未即說文鑣馬銜也古者並以羴羊角為之說見桃未當作排洙

與捕迫證一因二故通能治之耳

### 右以驚發分為四部

### 【論驚駭脈證三章】

〔寸口〕脈李昉曰兼三部言〔動而弱〕動為驚徐彬云驚為外邪襲心故寸

弱為悸此悸由驚而然與水飲證別徐彬曰悸乃神不自主故寸口

尤云驚則氣亂故脈動悸屬裏虛故脈弱動則為驚悸者因弱而為悸病自內生驚悸並見○口

而外邪復干之也○〔出〕金匱驚悸十六脈經同

### 右言驚駭與悸主脈不同

跌陽〔脈微而浮〕浮則胃氣虛微則不能食此恐懼之脈憂迫所

作也出脈經八驚悸補

右言恐懼有胃虛不食證

珍做宋版印



驚生病者其脈止而復來必動弱微浮之變不目睛不轉不能呼氣

驚悸補

### 右驚發定脈定證

心下悸舊有者半夏麻黃丸主之隸水飲

【虛勞】火王吐血效嗽者正相反近日虛勞乃是血證與近日之陰虛

也按論中所敘陰虛亡血證亦多近日虛勞乃是血證其實非虛勞

### 論虛勞脈證八章

【男子】虛勞不必悉因房室然曰男子皆斥失精言逐章平人李

之如無病脈大為勞○極虛亦為勞陳云俱曰為邪氣盛也極虛者將成也

奪也以二句揭虛勞之總而未嘗言其在何經絡是醫者隨五

七傷之故而諦審之尤云陽氣者煩勞則張故脈大則氣耗故脈

極虛者勞之內衰者也喻云虛勞之脈皆不足之候為精氣內脫與邪

右總揭虛勞之脈為大為虛並下七章

〔男子〕面色薄者

字薄即謂白者

主渴

一及亡血

李二○無津液故也

為主血亡則精采奪也尤云渴者熱傷元氣亡血也卒喘

者猝然氣虛則喘血虛則悸卒

○其脈浮者裏虛故也

雖浮不得為表

病者即脈大云為勞之謂李廷謂重按必空濡即謂浮而大也

以裏虛之故

明其不據脈經補其

右一章二節首總揭虛勞之色次補出虛勞之脈為浮

〔男子〕脈虛沈弦

為一○即極虛

無寒熱

二○非

短氣

三○上

裏急

小便不利

云五○下焦病尤

面色白

六

時目瞑

七

〔其人〕喜衄

八○喜

作

兼尤云並

少腹滿

九○小便不利使然

此為勞使之然

故此先傷陽後傷陰

右言虛勞有陰陽俱傷者其脈為沈弦

〔男子〕

二脈經有

勞之為病

雖勞必因虛不虛

其脈浮大

此著其陽盛之

沈弦乃著其陰盛之脈而傷陽也極其久則兩傷矣李廷手足煩熱

李云四肢者裏虛而氣暴于外也尤云浮者勞而傷陰也李廷手足煩熱

所謂五心煩熱證以匈中並手足言也○熱字據脈經補俗春夏劇

秋冬差

徐彬曰春夏助其陽故劇秋冬助其陰故差李云凡勞傷多屬陰虛春夏木火之際氣浮于外則裏愈虛故劇秋冬金水

之候氣斂于內則不外擾故差

陰寒精自出

陽氣衰故陰寒即下章陰頭寒也尤云并傷其陽

足酸削不能

行遺精所不能起脘酸削不能起

〔少腹虛滿〕

四字據脈經補腹舊誤陰今正其證已見上章省陰

右言虛勞久病陽盛陰虛者一年之中秋冬較春夏為差

〔男子〕脈浮弱而濇

病源三及脈經俱作微弱

為無子

尤云精氣交虧而清冷不當温此得之天稟薄弱故當

無精氣清冷

言其所以無子之故

右言精冷之脈為浮弱而濇

夫失精家

勞互文

少腹弦急

程林曰腎主閉藏肝主疏泄太過故也

陰頭寒

陰頭陽物也

氣衰則寒程林曰真陽衰也

目眩

程曰目眩則精衰陳云肝主目眩

眶痛

二字據脈經補注一云目眩今

兩存

髮落

程曰髮落則血竭

右補出失精之證

脈極虛芤遲

尤云精失而虛及其氣程林曰虛主失精芤主亡血遲主下利清穀李妙曰芤者浮沈有中無似中空芤草

故名芤也以脈者血之府血虛則脈為清穀遲李妙曰大亡血芤失

亦虛○冒下三證極字統三脈言

為清穀遲李妙曰大亡血芤失

傷寒雜病論章句

卷七

內傷雜病

五

中華書局聚

精虛軌範云脈極虛芤遲乃陰虛之證與此相反誤投必斃

### 右言極虛芤遲三脈所主之病

脈沈小遲各脫氣死也尤云沈小遲皆陰象也三者並見陰盛而卒

乃亡矣故各脫氣徐彬曰脈全虧故名脫氣其人疾行則喘喝尤云

衰無疑况三脈並見是陽氣全虧故名脫氣其人疾行則喘喝尤云

而經作喘渴手足逆寒徐彬曰四腹滿中無陽曰腹甚則溏泄食不化

也擬四逆湯汗出而熱故渴也然其腹中陰氣自勝故兼見四逆清

### 右言虛勞中有亡陽而脈脫氣者

### 【桂枝加龍蠲湯天雄散任人選用一章】

脈得諸凡病源四字乾動微緊尤云陰陽並乖而傷及其神與精陳云

證二男子失精此虛勞子女子夢交此女子之虛勞桂枝加龍蠲骨牡蠣

湯主之方在桂枝輩尤云徐氏云桂枝湯外證得之能解肌去邪

其方精間似病非此不足收斂其浮也陳云此為陰虛者失精夢交為

承枝為大表藥龍螭為瀆齊妄測之高深皆不讀本間有沈弦自微緊者仍露  
出陽虛之象蓋以牡螭以根于陽陰病極則傷其陽也故以桂枝湯  
調陰陽加龍骨牡蠣以滋其陰可知極陰虛中又陰陽之分矣○天  
雄散亦主之見方在玄武六引范汪稱三金匱于前方無龍骨出此方補今  
少龍之臧佐以龍骨可穀以斂納散漫之健火而歸根也  
有陰之臧佐以龍骨可穀以斂納散漫之健火而歸根也

右言虛勞有補陽斂精之法

【旋覆華湯證一章】

〔寸口〕脈〔弦而大〕比脈原非極虛者陳云即輕按弦重按細之弦為減因

○滯而減此弦字即指緊脈之減弦大為乾出血則浮而緊按之反此為

本無虛力狀如葱管謂之芤減為寒寒氣減則衰故芤為虛陰虛此則

原始之也寒虛相搏此名曰革先本虛而堅也○革當將成凝滯故其

源作其脈為牢同避隋文諱相仍未改近人更強分而三之甚謬

虛外強中乾此名曰革又變革也陳云言陽虛者以沈緊弦細傷其

陰也○胃婦人則半產漏下或漏下也男子則亡血失精亦列證旋

傷寒雜病論章句 卷七 內傷雜病 六 中華書局聚

覆華湯主之方在雜法○病雖虛勞證有凝滯故用此以調氣行血

下陷焉有用旋覆下氣之理由未悟此○此章金匱及傷寒四見平

獨出其方無男子則亡  
血失精一句今併為一

右言虛勞有因凝滯而脈堅實者無分男女皆用調氣行血

之藥

【陽旦建中輩證二章】

〔虛勞〕裏急者陽旦湯主之方在桂枝輩 ○〔陽旦〕加飴糖〔湯〕亦主

之方在建中輩 ○若脈浮緊發熱者大傷寒不可與也據千金引甄權陽且外臺

減中補

右一章二節言虛勞有當徹熱者以陽旦湯為主方有當潤

燥者以陽旦加飴糖湯為主方末節舉太陽麻黃證以示禁

用

〔虛勞〕裏急魏云腹痛之謂尤云裏急者 諸不足尤云陰陽諸脈並

裏虛脈急腹中當引痛也



喝失精亡血之黃耆建中湯主之據三方下知兼有匈腹滿氣短肺虛  
證相因而至也黃耆建中湯主之據三方下知兼有匈腹滿氣短肺虛  
者補之以溫則黃耆有專長也吳仲景以齊陳云桂枝湯出入加減無  
往不利何後世一見即以爲傷寒發汗之齊陳云桂枝湯出入加減無  
證而推廣  
言而推廣  
○肺虛損者去棗加茯苓主之據本方下補

右黃耆建中湯證及去棗加茯苓證

〔虛勞〕裏急一悸二衄三腹中痛四夢失精五四肢酸疼六手足煩

熱七咽乾八口燥九燥乃津液少非有咽乾口小建中湯主之外臺今錄

驗庸醫誤用害人甚多治陰寒陽衰之虛勞與陰虛火生之道相

反與陽陰和平百病之生若陰病不能與陽和則以其熱獨行

陰裏急腹痛而實非陰之盛也病不能與陽和則以其熱獨行

爲裏急腹痛而實非陰之盛也病不能與陽和則以其熱獨行

寒熱內賊其病益甚惟以甘辛苦藥和合之使和則陽就于

寒而治寒以溫陰就于陽而熱以和之調以營衛而必建中何也

曰中者脾胃也營衛又生于四穀而轉輸于脾胃故中氣立則營  
衛流行而脾胃失其營衛又生于四穀而轉輸于脾胃故中氣立則營  
陰陽相循如環無端而極是求陰陽之與辛合而生氣求中氣之助  
而立必以建中徐彬云人身相和故變生諸氣熱則陽中又有陰熱  
陰感然非真盛也惟陰陽不能相和故變生諸氣熱則陽中又有陰熱

傷寒雜病論章句 卷七 內傷雜病 七 中華書局聚

之陰極寒熱互見醫者當知宜忌矣至於陰陽不能維陰虛陽虛皆有心腎之  
 者細虛者即知陽不勝陰虛勞中氣故仲景創出滋陰二大失正法豈  
 見至陰虛熱極而燥此虛勞中安腎分用之為恢恢遊也哉  
 則至陰虛熱極而燥此虛勞中安腎分用之為恢恢遊也哉  
 知仲景以行陽固陰為主而補之張景岳和之至為恢恢遊也哉  
 陳云陽虛陰虛之混薛立齋倡之張景岳和之至為恢恢遊也哉  
 可施者尤為陰虛斯道掃地矣  
 施地冬歸芍為陰虛斯道掃地矣

### 右小建中湯證

### 【酸棗仁湯證一章】

〔虛勞〕虛煩不得眠于李陽虛滿內熱入于陰氣不斂也內經云氣行

棗仁湯養血虛而斂陰氣也酸棗仁湯主之方在雜法○軌範云同當心煩不眠

虛外臺有乾薑者亦可採用尤云寤則魂寓于目寐則魂歸于肝

所由作也故又不能歸容于肝則必有痰火乘間而襲其舍者此煩之

宅求其魂也治而

### 右虛煩不眠主方

### 【腎氣圓證一章】

〔虛勞〕要痛

程林曰要者腎之外候少腹拘急二小便不利者  
程林

與膀胱為表裏不得三焦之陽氣以決瀆少陰腎氣也  
〔八味〕字

少腹拘急尤云三證皆由虛勞之人損傷少陰腎氣也  
〔八味〕字

依前後腎氣圓主之  
以方在玄武輩○徐云此方亦治脚氣乃驅邪水

又陽而火不升製方之妙固非一端但近人以生氣助陽之弱可以化水  
乃補下治下之良劑也陳云腎氣

右要痛主方

〔當〕歸〔生〕薑羊肉湯證一章

虛勞不足  
足血不也  
〔當〕歸〔生〕薑羊肉湯主之  
據本方方下補

右補血主方

〔薯蕷圓證一章〕

〔虛勞〕諸不足  
既曰虛勞則不能耐勞血氣多有不流通者故加

大半皆是  
○風氣百疾  
此虛勞之病也略加風氣故無大病而曰疾說

湯而用圓此必別是一證虛風不足亦得薯蕷圓主之  
此方在雜法用

傷寒雜病論章句 卷七 傷雜病 八 中華書局聚

熱不能飲食等證故方中用神麩黃卷而證最易生風大棗獨多者  
 以虛勞多見失精證也喻云虛勞見虛有挾風者正不獨此方除其  
 不除外證日見有餘中臧日虛勞多虛有挾風者正不獨此方除其  
 氣兼培補虛也尤云虛勞多虛有挾風者正不獨此方除其  
 不可着意去風柴胡八珍補氣血膠麥行氣芍藥益營衛而桔  
 梗杏仁桂枝防風故以八珍補氣血膠麥行氣芍藥益營衛而桔  
 以理而不寒不燥滑兼徐彬去風也陳云此為內外皆見不足  
 氣止而上節所謂傷風急不以為久則氣漸深亦或愈第恐既愈  
 不足凡初患傷風急不以為久則氣漸深亦或愈第恐既愈  
 不產之餘邪未盡與正氣混為一家或偶有蒂治者不可著意治虛  
 而滋弊惟去風氣味化兼施亦如神

右虛風主方

【灸甘草湯證一章】

〔虛勞不足〕此不足氣汗出而悶脈結代緩急而時止曰結代不拘行動如

常虛勞之常未必臥牀不起強健不出百日陳云俗呼危急者十一日死蓋

起代時灸甘草湯主之方在潤燥復脈之據方今人喜用膠棗而畏

氣薑桂陽非知陰凝燥

右治脈結代者之主方

【懶肝散證一章】

冷勞

兼勞必蟲

懶肝散主之

方在烏梅羣

○又主鬼疰

鬼亦陰

一門相染

相勞蟲

相染故可通治徐彬云勞無不熱而獨言冷者陰寒之氣與邪

相染故可通治徐彬云勞無不熱而獨言冷者陰寒之氣與邪

又邪氣

又邪氣依正氣而為病藥方不與易及故難愈懶者陰氣絕故無不邪

月而邪

月而邪氣依正氣而為病藥方不與易及故難愈懶者陰氣絕故無不邪

右勞蟲主方並治鬼疰

【百勞圓證一章】

一切勞瘵

俗以瘵即為勞

積滯

虛勞久

不經藥壞證者

未經

百勞圓

主之

方在抵當輩○據金匱衍義補注引許州陳大夫傳仲景方補

右積滯主方

【大黃廔蟲圓證一章】

五勞

陳云氣血肉骨筋

虛極

勞後更羸瘦

腹滿

不能飲食

不能飲食

三五

傷寒雜病論章句

卷七

內傷雜病

九中華書局聚

傷勞之證陳云 ○食傷 一 飲傷 二 飢傷 三 房室 四 憂 五 勞 六 ○前節此

又傷之五勞為 經絡營衛氣傷 七 傷之目 七 ○內有乾血 程林曰此單指

云乾血勞證即攻其瘀軌範云血乾則結而不散非草成肌膚甲錯此

木之品勞證下必用食血之蟲以化之陳云勞熱煎成肌膚甲錯此

血之外證程林曰血積則不能濡 面目黯黑 此血乾則不能營目林

肌肉之吳云肌膚不潤甲錯如鱗 面目黯黑 此血乾則不能營目林

作兩目一 ○緩中補虛 此著大黃廔蟲圓主之 軌在抵當專治 ○

云瘀血成勞之證瘀血不除則正氣滲灌不周故此方潤以濡其乾通也尤

【虛勞變證一章】

右乾血勞主方

年五六十 精氣衰 其病下 脈大者 勞首云 脈大者 證 ○痺俠背

行與黃耆桂枝湯此即陽血痹證 脈大者 勞首云 脈大者 證 ○痺俠背

也痺有行有著陳云 ○苦腸鳴 勞得之則脾胃不健也 擬治中湯 ○加

苦若 ○馬刀 ○俠瘦 屬云李氏云 勞得之則脾胃不健也 擬治中湯 ○加

作若 ○馬刀 ○俠瘦 屬云李氏云 勞得之則脾胃不健也 擬治中湯 ○加



者挾也癭一作纓謂發于結纓之處二創一在頸一在腋下常相聯絡故俗名癭串按太素注馬刀謂癰之不膿潰則似謂其堅長如蠟二蛤類馬刀之形亦有生此陰疽也此西  
△皆為勞得之所謂四證皆因虛勞思可證不必串合而生此陰疽也

右言虛勞變證有痹有腸鳴有癰疽或馬刀或俠纓四證

【汗】舊在虛勞今拆附之

【論亡陽自汗一章】

寸〔口脈〕微尺〔脈〕緊其人虛損互即虛勞文多汗知陰常在絕不見陽

也擬四逆湯成寸微為亡陽尺緊為陰勝陽微陰勝故云虛損又加多汗則愈損陽氣是陰常在絕不見陽也程知曰陰盛于內陽絕于外故為虛損多汗○出平脈篇依千金置汗內

【論虛勞盜汗一章】

〔男子〕平人尤云平人不病人也脈虛弱細微者虛損之象與陽明盜汗脈洪大者自別尤云陰陽俱不足

喜盜汗也病源三作皆為盜汗脈也謂四脈不必悉具尤云陽不足者不能固陰不足者不能守故盜汗○〔金匱〕出虛勞內

消渴屬虛勞以所言之者特虛勞中之雜證耳今依脈經數附虛勞後

傷寒雜病論章句 卷十七 內傷雜病 十一 中華書局聚

【論消渴有由虛勞而胃氣過盛者一章】

〔寸口〕脈〔浮而遲〕浮為虛

陳云浮不因表虛不斂而為虛

遲為勞

陳云遲不充

而為

虛則衛氣不足勞則營氣竭

陳云營衛者水穀之精悍氣也虛而且遲是水穀之氣不上充而內

鬱則胃熱矣故更診其跌陽也

○跌陽〔脈浮而數〕浮為氣

陳云熱氣

數則消穀而堅

尤

氣盛者非胃氣盛也胃中之火盛也火盛則水穀去而胃乃聚形誤被燒而堅如石也案堅謂大便堅也一作緊避隋諱一作聚形誤

氣盛則洩數洩數則便堅

二句補明便堅由洩數尤為火氣所迫而

留不堅數相搏則為消渴

擬白虎承氣輩尤云愈數愈堅愈

堅愈

右寸口跌陽合診以明消渴由虛勞而有熱

【論膀胱盛衰有消穀與消渴之分一章】

足大陽者是膀胱之府也

言足大陽經以膀胱為府

膀胱者是腎之府也

相與

者

○而小便數此為氣盛氣盛則消穀大便堅

小便數則大便堅

氣

○虛則為消渴也

上證消穀必兼口渴此則消渴必不能消穀也擬腎氣圓此章與上文同而義異○據外

臺十一引近效  
張仲景曰補

右以消穀為氣盛消渴而不消穀為氣虛

【腎氣圓證一章】

〔男子〕

沈明宗曰男子二字指

消渴

病源三消也者渴不止小便多也

小便反多

吳謙

云此名下消若小便少者惟下消寒熱兼之以上消也中消者是兼指消穀

便堅言上中二消屬熱惟下消寒熱兼之以上消也中消者是兼指消穀

制之說起于後代古名消渴未有小便多者此以真火不足不能

得乃水之精液灌漑周身而其所下出者

以飲一斗小便亦一斗

注上

腎氣圓主之

陰方復去邪水如補火正

右下消主方

【文蛤散證一章】

渴欲飲水 尤云渴欲飲水共五條用豚苓為小便不利者一用五

復傷也其水入則吐者亦用五苓為其熱消而水停也人渴不止者則

甚而津傷也此渴同源而異流治 不止者 尤云入不能消 文蛤散

主之 方附五苓輩○文蛤滋陰故能止渴也吳云人所食花蛤無可疑

傷寒雜病論章句

卷七

血氣雜病

十一

中華書局聚

證無不端而燥則非白虎證惟引水不止故以文蛤一味如何服五兩是也  
乃無不端而燥則非白虎證惟引水不止故以文蛤一味如何服五兩是也  
全不異治同蓋文蛤本食兩處通曰欲飲則原與大渴懸殊故得  
散證尤云蛤寒除熱之能潤下  
用通融也尤云蛤寒除熱之能潤下  
疾也

### 右滋陰主方

渴飲水入則吐者名曰水逆五苓散主之  
在大陽府病  
跌陽脈數即前條消穀便堅引證舊列淋病中疑誤  
數在陽明總

脈浮飲水不利微熱消渴宜利小便發汗五苓散主之  
渴飲水不利微熱消渴宜利小便發汗五苓散主之  
脈浮飲水不利微熱消渴宜利小便發汗五苓散主之

併病發熱渴則飲水小便不利者猪苓湯主之  
併病發熱渴則飲水小便不利者猪苓湯主之  
併病發熱渴則飲水小便不利者猪苓湯主之

師曰厥陰之為病消渴氣上衝心利字陳唐以爲迴殊故意欲吐下  
擊使別而不顧適形其隘也  
擊使別而不顧適形其隘也  
擊使別而不顧適形其隘也

### 【血氣雜病】

#### 【血痺】

千金匱脈經血痺虛勞同篇置虛勞前今改附虛勞後別  
千金匱脈經血痺虛勞同篇置虛勞前今改附虛勞後別  
千金匱脈經血痺虛勞同篇置虛勞前今改附虛勞後別

### 【論血痺其治宜鍼一章】

而不散痺為原也

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人樂而志苦形骨弱陳云志苦故肌膚

盛外雖感而中虛其氣血之不流通已可重因疲勞不耐勞○肌盛故

無重字因汗出膝小理開而汗出起臥不時不知動搖如被微風此言

容易受風而進髮任事之狀稍搖動其空中之氣遂如微風所吹遂得之陳云風與血相搏是為血痺但以其脈自微此統三部言也

在寸口寸為陽主營右寸故肺主衛關上小緊亦即微也為血滯緊則邪之徵也○千宜鍼引陽氣謂以鍼出氣如

後方擬令脈和脈和病自去宜治氣也緊去則愈陽氣俱去者省文

尤云血中之邪始以陽氣傷而得入中故必得陽氣通而後出血既以

風入而痺于外陽亦以血痺而止于中故必得陽氣通而後出血既以

去邪血分受痺不當獨治其痺矣

右言血痺因血滯而陽氣不伸者其治宜鍼

【黃耆桂枝五物湯證一章】

〔血痺陰陽俱微〕

陰陽以尺寸言即上章其脈自微義尤云該人迎跌陽大谿言

〔寸口關上微尺

傷寒雜病論章句 卷七 血氣雜病 十三 中華書局聚

中小緊

不言也義並同上省也尤云即統言此又分別為三部詳象

外證

對脈象稱故云外也身體不仁痛證如風痺狀尤云頑痺痛

也痒不覺如風痺狀而實非風黃耆桂枝五物湯主之方在桂枝明即

桂枝固湯以黃耆易甘草非桂枝湯加黃耆也軌範云此乃營虛衛弱

脈陰陽俱微故不可鍼而可證上探其源此明其證脈則同也鍼引

尤說非文

右申明上證補出藥方 上二章 依金匱脈經次

【桔甘湯證一章】

〔血痺〕桔〔梗〕甘〔草〕湯亦主之 甘草今添方在瓜蒂輩原本不成

痰之方用此升提其血使吐故方下云分溫再服則 吐膿血也○據金匱趙校本肺癰內桔梗湯方下補

右吐痰之方

【論血痺病久三部不歸各見變證一章】

〔寸口〕脈〔微而瀼〕微者衛氣不行 謂不足則能行矣 瀼者營氣不足



營衛不能相將詩猶扶木箋將三焦無所仰成云養三焦者血也護三

相將三焦無所依仰身體痺不仁營氣血不通身頑痺成云頑痺不行則為不仁○曰

此三句是總言下二項是于營衛之中△營氣不足則煩疼口難言

成云營為血不足甚而分敘其見證也△衛氣虛則惡寒數欠成云衛為陽陽

血屬心為血弱心虛則口難言△衛氣虛則惡寒數欠微則惡寒衛為

氣數欠○三焦不歸其部此一句是總言下三項是于三焦之中孰

則數欠○三焦不歸其部為不歸之甚而分敘其證也詩蟋蟀箋歸

依歸按無所依歸是三焦失職也成云因營衛△上焦不歸者噫而

不足無所依歸不能歸不至也△中焦不歸者不能消穀引食云引求也成

酢吞清上焦受氣于中焦而吞酸也酢當作酸字誤句與宿食內相映成

物未傳化故噫而酢吞△中焦不歸者不能消穀引食云引求也成

胃之中主腐熟水穀化則思食中焦之氣不至其部下焦則水穀不  
化故不引食按匈鬲至喉上焦也齊至鬲中焦也少腹下焦也主分別清  
之中訓均誤△下焦不歸者則遺洩成云小便下焦在膀胱上口主分別清

○跌陽脈沈而數

亦得也數者大故沈取之沈為實數消

○緊者病難治

數者大故沈取之沈為實數消

緊皆受氣于中焦得歸部上下二焦雖有病猶為熱也△緊者病難治

傷寒雜病論章句 卷七 血氣雜病 十三 中華書局聚

右一章三節首言寸口微瀦以成頑痺之由復以營虛衛虛各敘其兼有之證次節申言此證為三焦失職復平列三焦失職之甚者又各敘其兼有之證三節意在歸重中焦故合診跌陽以能食者為可治若無胃氣則脈緊為難治也

【失血】

金匱出驚悸吐衄下血匈滿瘀血十六今各分敘總以失血統之其於胸滿一證實即瘀血之兼見者也無須標出

【論失血脈候四章】

脈得諸瀦濡弱為亡血

此因亡血故有此脈候則日後必亡血也

脈有陰陽

陰陽謂尺寸也○原

跌陽

少陰

皆微

此亦謂血出過多之後心

不能生脾不能統故獨舉二經也

其人不吐下

謂歐吐及下利

必吐血

〔寸口〕脈微而弱氣血俱虛男子則吐血女子則下血

其男女互詳其證此亦

謂失血後之脈候應如是也

○歐吐汗出者為可治

失血後猶能歐吐汗出是精液未盡竭故為可治也

○一脫治字據袁校本補

病人身熱

陰虛陽萎于外與迴殊

脈小絕者

虛象與洪大者迴殊

吐血若下血婦

人亡經失血過多在此為寒不得為熱○脈遲者遲亦小絕之類也 匈上

有寒噫氣喜唾失血後之見證

右四章通言失血後主脈與其兼證據脈經八補

【察色診脈以辨吐衄下血之分一章】

病人面無血色尤云血脫者色白不澤無寒熱尤云病非外感 ○脈

沈弦者衄尤云衄因外感脈必浮大陽氣重也 衄因內傷脈當沈弦

○脈浮弱〔手〕按之絕者下血尤云字衍文過多陰脈即充也 ○煩效者

必吐血因效而吐血其勢便也尤云血從上溢而心所統當甘温補

脾與腎所以黃土湯為金

右言失血後可憑脈與證以辨其從何道出

【論三焦絕經血崩脈候一章】

〔寸口〕脈〔微而緩〕微者衛氣疎疎猶弱也 疎則其膚空成云衛氣弱者不能固密皮膚

緩者胃氣實張卿子云玩實字乃胃病也病則不能使氣血循 實則

傷寒雜病論章句 卷七 血氣雜病 十四 中華書局聚

穀消而水化也因穀消水化者過多也由所以擬承氣輩穀入于胃脈道迺行

水入于經其血迺成此四句乃承上文穀消而水化也○水精液言方

顧云王肯堂云而字乃承上文穀字言水亦在其中矣成注互文見

曰飲而液滲于絡合和于血是水入于經其血乃成也此是互文見

義若欠理會則血為水所化豈理也哉玩之和于三字則成氏之說

未瑩若魏伯卿云膚空衛疎外邪易入人知之矣抑知營血無所統攝

道而入于泄也三焦為氣之道乎何也衛氣充塞三焦之氣易泛濫不由經

而妄行矣營盛則其膚必疎愈衛多則氣愈少失其營盛則道

謂不能固其營非云營弱而衛強也三焦絕經者氣之經常也三焦

疎則氣不循常度也名曰血崩血崩者不拘從何道出之統名後世乃

血之崩者乃因胃氣之過強也方云陰血下而曰崩者

言其不能止如山壞然成云衛弱不能護其血○出平脈

右言血崩有由氣虛不能統者崩而不竭其所以能生血之

速則由胃氣過實使然

【吐衄】

【論外感吐衄一章】

大陽脈大而浮必吐衄血據脈經八補此即大陽

右擬麻桂輩以明吐衄有表散法

【論陽虛吐衄一章】

吐衄黃土湯主之方在雜法○據黃土湯下方補吐衄二字

右黃土湯證以明吐衄有溫瀼法舉此以例其餘

【論吐衄有宜寒涼者一章】

心氣不足吐衄血寫心湯主之此必兼有陽明證寫心方可用尤云心氣不足陽明證寫心方可用尤

也陰不足則陽獨盛血為熱迫而妄行不止矣以寫心湯邪熱因不

熱而血自寧寇氏云若心氣獨不足則當吐衄也乃邪熱因不

足而客之故令吐衄以苦寫其熱失其養故云不足其源則熱甚也

說亦通按心臧血吐衄過則心失其養故云不足其源則熱甚也

血熱則妄行非涼以折之

右寫心湯證以明吐衄有峻下法舉此以明其例

【吐血】

【論吐血有脈沈者一章】

脈沈爲在裏營衛內結匈滿必吐血據脈經八補此憑脈以知其  
也下血

【論吐血有由酒者一章】

夫酒家效者必致吐血尤云言當治其酒熱不當治其血也陳云此言酒客  
飲過度所致也吐尤云言當治其酒熱不當治其血也陳云此言酒客

飲過度所致也吐尤云言當治其酒熱不當治其血也陳云此言酒客

散可用○依金匱置此脈外臺八引千金作過多注本仲景句下又

有其脈虛者必冒六字

【論效血死證一章】

夫吐血一效逆八二〇千金十上氣而三〇陳云附麗其脈數而有熱燦

也肺金趙云陽獨勝不得臥者死趙云陰已絕也陰絕未可言死也陳云

是既耗之陰從獨勝所以主死不出方已之勢血欲潤恐孤陽暴脫欲

源中血隨氣爲運所主死不出方已之勢血欲潤恐孤陽暴脫欲

太虛竭其火獨上越則薰灼數身熱盜汗煩不歸根矣心不



也死何為按血之與氣猶燈火之于油必相附麗以行  
唐氏此注却精○依金匱置此脈經八隸效逆

【論吐血有宜溫降者一章】

吐血不止者柏葉湯主之

宣方在雜法○尤云仁齋直指云血遇熱則

陰陽不相為守營氣虛散血亦錯行者此乾薑艾葉之使所降馬通引  
既上溢其浮盛之勢又非溫藥所禦故以陳云凡吐血者熱傷陽  
之使下則妄行之血順而能損今吐血服藥不為熱所迫而自通故  
終當清其熱勞傷陽絡當理其損今吐血服藥不為熱所迫而自通故  
陰分無止法溫散之品宣發其熱則陰分歸經是第所以再換藥以  
吐血無止法溫散之品宣發其熱則陰分歸經是第所以再換藥以  
童便之柏葉湯者謂其病勢未艾也非謂仲景示人以再換藥以  
試之唐云柏葉湯者謂其病勢未艾也非謂仲景示人以再換藥以  
以見氣寒脫者當溫其氣與女子之血崩同氣實氣虛不熱血逆者  
當清其血與女子之血崩同氣實氣虛不熱血逆者  
奄奄欲息實者效逆噦滿

右柏葉湯證

【衄】

陳云衄為清道之血從督脈由風府貫項下鼻中

【論脈色以定止息一章】

問曰病衄連日不止其脈何類師曰脈來輕

輕即浮也浮脈不僅主表上身為病亦通主之

傷寒雜病論章句

卷七

血氣雜病

十六 中華書局聚

又主陽威陳云謂血隨火而輕在肌肉之此浮脈尺中自溢溢亦浮也

云尺脈浮○二十五字依本尺又作夫冒下二尺證○目睛暈黃云

肝有熱腎未止肝之火上衝也腎○暈黃去目睛慧了知衄自止尤云

肝熱除腎熱亦除矣

【論衄有四時之分一章】

〔師曰〕問詞脫金從春至夏衄者大陽吳云大陽主外從秋至冬衄

者陽明循鼻分故皆能致衄大陽行身之表經云大陽明手足四經皆

夏長陽氣在外有開之義故春有衄者大陽也秋陽明行身之裏經云

陽明為陰是秋斂冬藏陽氣在內有藏之義故秋冬明衄者陽明也尤

云血從陰經並衝任而出者則吐從大陽經並督脈而出者則為衄尤

故衄病皆在陽經但春夏陽氣浮則屬大陽秋冬陽氣伏則屬陽明尤

【論陽虛于上則為眩厥陽湊于上則為頭痛而衄一章】

寸脈〔微〕弱據下文微尺脈瀋弱則發熱瀋為無血冒下○其人

字疑衍

二證

火自陰中出非言衄自陰中來也此所謂大陽之所迫而然邪

開陽明為少陽之脈不入鼻類故不外主也前所謂尺脈浮者為

為異耳所以然者就陰陽言則陽主內就三陽言則太陽為

必厥

陽虛

厥證不獨三陽亦有

微

胃

○夫厥當眩

陽虛

不眩而反頭痛

此三陽之頭痛與

陰寒上衝者不同

痛為實

陽氣上湊于

下虛

謂

上實

頭痛必

衄也

此即陽氣重故也

擬麻

黃湯

○據脈經八補

右麻黃湯證

上三章依脈經次

【下血】

【論下血有由腎熱者一章】

男子盛大

謂肥盛人也

〔其〕脈陰陽微

陰陽以尺寸言原作

跌陽亦微

脾脈亦弱

獨少陰浮大

少陰大為腎熱也

必便血而失精△設言淋者當

小便不利

腎移熱于膀胱也如血淋是○據脈經八補

右寸口跌陽少陰合診以明胃弱腎熱有便血失精與淋閉

之分

【論下血有由脾熱者一章】

並上章依脈經次

跌陽脈弦

弦為肝脈肝移熱于脾也

必腸痔下血

痔者九竅通有今乃專屬之後陰即此所謂腸痔也九痔

均係濕熱腸痔所見  
為多○據脈經八補

【論下血有遠有近證二章】  
經次脈

下血先血後便  
趙云血聚大腸去血聚近指瘀滯言然下血者則

多新鮮也此  
此近血也尤云大腸傷于濕熱而血滲于赤〔小〕豆當

歸散主之  
方在當歸輩補瀋並用

右明近血有補瀋並用法舉赤豆當歸散以明其例

下血先便後血  
趙云胃必先便後血去肛門遠也此遠血也尤云脾虛

脾去肛門遠故曰遠血也  
黃土湯主之較方在雜法順而徐彬云此下血

不在氣也當責之內寒不能溫脾便後血足不能統血脾居中土自下

焦言之健脾為遠矣故以附子溫腎之陽又恐過燥阿膠地黃壯陰為

脾為類者引腎為入脾使天之本調則營衛相得鉅無妄出故又主吐

也鉅  
真神方也脾腎為先後天之本調則營衛相得鉅無妄出故又主吐

右明遠血有溫清同用法舉黃土湯以明其例

舊有

衄家不可汗汗出必額上陷脈緊急直視不能詢不得眠

亡血家不可發其表汗出即寒慄而振同在大陽經相搏此名曰革

婦人則半產漏下男子則亡血在虛勞

【瘀血】

【論瘀血與虛熱證相似一章】

〔病人〕四 匈滿一 瘀而氣不利尤云血 唇痿二 營于唇則枯萎尤云血不 舌青三 潤之色則失其紅

口燥四 〔其人〕但欲漱水陳云化液則 不欲咽五 燥而中無熱雖 無寒

熱六 病非外感尤云 脈微大來遲七 但欲嗽水二 定證其為上七項與虛熱相混若

亦為瘀者矣故必以腹之不足審定然則辨證確然可據當在皮膚何處

腹者不則腹滿一證仍不足審定然則辨證確然可據當在皮膚何處

則須此章所敘證如也下章而脈反見遲其皆一熱為陰伏是相

應斷其為瘀不然而縱有熱而脈反見遲其皆一熱為陰伏是相

故下章亦不提及腹滿一事可見也尤云就血積之腹則非若腫張之

○腹不滿見設脈于外故擬自醫者視之 以爲其腹不滿而自病人言之

傷寒雜病論章句

卷七

血氣雜病

六 中華書局聚

血擬抵當湯瘀血阻其津液故見上諸證

右言虛熱與瘀血見證多同必以脈反見遲又兼腹滿者而後瘀血證乃可定

【論瘀血有由汗結而成者一章】

當汗出謂大陽證或不出內結汗欲出或當風寒而內返則成瘀亦斥感夏時言

輒謂我未曾撲跌瘀何從亦為瘀血內經云奪血者無汗奪汗者無

來是不知汗血同源也不出而內結者即為瘀血○據脈經八補脈經總此三章為一

右言汗出當風不得出而內結即為瘀據瘀者在皮膚者言也

【論瘀血與實熱相似一章】

〔病者〕如有熱狀一無有字尤云即下文煩滿字口乾燥而渴陳

既見數大之熱脈其脈反無熱尤云為血數大也有熱證而無熱脈此應見數大之熱脈

為陰伏尤云陰伏者陰邪結而伏于內也陳云此非是瘀血也徐仲

景論婦人疑矣然上章言漱水不乾燥故知之則渴可謂唇痿口燥足證瘀血無疑矣然上章言漱水不乾燥故知之則渴可謂唇痿口燥足



漱水甚則有渴者蓋痰久而熱鬱也按此章辨證法與上章同上章  
以證見虛熱而脈見遲於以知其亦為陰伏是痰血法但此重而彼輕  
耳渴與不渴皆非痰血的證婦人篇唇口當下之吳云宜桃仁承  
乾燥亦屬訛字忠可反據之以訓此誤矣

右言實熱與痰血見證多同必以脈之見寒於以知其為陰

伏成痰為可下

【奔豚】

出金匱奔豚氣病證治八

【論奔豚總證一章】

【師曰】

脈經無二字

奔豚病者

外臺十二引小品作病如奔脈者誤金匱

按小品方十二卷陳延之撰念祖所云無據

從少腹起

尤本無起字

上衝咽喉

奔豚氣也腎

咽喉故病氣發作時欲死

一時無字

還復止

而欲死已則氣衰復還于

腎而皆從驚恐得之

張從政曰驚者為小下知也恐者為自故也六字

云驚傷心恐傷腎凡有所傷于心腎者皆不可作驚恐觀也蓋心腎之氣本自交通一受傷則無復限制矣

右以驚恐為奔豚之源

【奔豚湯證一章】

傷寒雜病論章句

卷七

血氣雜病

九一中華書局聚

所言奔豚者病人氣息逆喘迫上如豚奔走之狀

二句形容病狀尤明

奔豚湯

主之據脈經

補

〔奔豚〕

字脈經二作其

氣上衝匈

一

腹痛

二

上衝咽

即上章從少腹起

喉但較低耳

起

及往來寒

耳

熱者

三有邪通于少陽

○死

者為輕

據脈經

云肝臧

〔奔豚湯〕

主之

○方

在雜法

此治奔

豚

豚之兼有熱者

不相踰越也

唐云豚者江豚遇烈風暴雨則出此奔豚

與水而後成歟

證之亦必挾風與水而後成歟

右言奔豚有兼少陽者以奔豚湯為主方

發汗後舊有

燒鍼令其汗

鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上

至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之

此奔豚兼大陽經

發汗後齊下悸者欲作奔豚

茯苓桂枝甘草大棗湯主之

此奔豚

兼大陽府證者在太陽府

茯苓桂枝甘草大棗湯主之

此奔豚

兼大陽府證者在太陽府

〔短氣〕

金匱附函癉

今另立一部

跌陽〔脈微而緊〕緊為寒微為虛微緊相搏則為短氣

成云中虛且

寒氣自短矣

程知曰言跌陽微緊則中氣虛寒為短氣之證也○〔出平脈篇〕

右言短氣有屬脾胃虛寒者

平人素無疾無寒熱尤云言短氣李少云短氣與少氣不同少氣者

日乃復言者此氣奪也短氣者氣短不能相續似喘非不足以息者

喘若有氣上冲故似喘而短氣者知擬瓜蒂散尤云短氣有從素虛宿

實也曰不足息則有中自實可知擬瓜蒂散尤云短氣有從素虛宿疾而來者有從新邪暴過而得者而此則為裏實或痰或食礙

右言短氣有實證

其升降之氣而然也○出其金匱胸痹心痛此王熙與洙之失檢

【動氣】

而動蓋以齊為中中央以配脾且謂及四臧乃屬兼邪其實皆築然

說也動氣在腹容或有之何能界分即手足頭背皆論之止得柯屬

熱左寒上熱下寒言耳蓋不拘定腹中其聚訟如不

【論動氣不可發汗一章】

動氣不可發汗四冒下○在右則衄而渴心苦煩飲即吐水此虛熱證

有衄渴吐水三證故龐氏先以五苓散止○在左則頭眩汗不止筋

傷寒雜病論章句 卷七 身體雜病 二十 中華書局聚

惕肉瞶此虛寒證近亡陽矣擬玄武及温粉○在上則氣上衝正在心端此熱上衝常云可奔豚湯

○在下則無汗陰經不汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食即反吐穀

不得前脈經七注一云穀不消化失其韻矣此虛寒證也擬四逆輩○出不可汗篇

右動氣誤汗分左右上下各敘其變證

【論動氣不可下一章】

動氣下之四證○在右則津液內竭喉燥鼻乾一作咽頭眩心悸此虛熱證

龐云宜竹葉石膏湯○在左則腹裏拘急食不下動氣更劇一作劇身雖有熱此陰

經陽回之熱臥則欲蹇謂陽雖回仍惡寒之甚也龐常皆云○在上則掌

握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲水自灌此火盛格陰證龐○在下則

腹滿傷寒論作卒起頭眩食則下利清穀利字据趙校心下否堅堅

疊韻此陰威格陽證擬四逆湯○出不可下篇

右動氣誤下分左右上下各敘其變證

【身體雜病】

【頭痛】

【論外感頭痛脈象一章】

【寸口】脈浮而滑者頭中痛

據脈經八腹滿內補

【論頭痛不可誤治一章】

〔傷寒〕頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出

即桂枝證形象二字勿泥魏云似桂枝證○常

傷寒論作當

又自歐者

歐亦桂枝證擬用瓜蒂散也○桂枝湯四證傷寒論歐字誤壘爾

○下之益煩

成云邪熱乘虛流于胸中更甚耳

心中懊憹如飢郭雍云

湯心煩喜歐亦柴胡證按當用梔子豉輩不成結匈猶其輕焉者也

○發汗

汗不誤法則致瘳身疆難

以屈伸

成云發汗虛表熱歸經絡熱甚

○熏之則發黃不得小便擬

苓輩成云火熱相合消燥津液成黃○灸則發效唾成云火熱傷肺

茵陳蒿湯魏云若小便利則不成湯○高士宗曰汗下火熏施治各

痼損正則一故舉下之熏之與發汗而並論之也

脈經故不可下篇

右頭痛誤汗下熏灸四變

〔傷寒發熱但頭痛微汗出〕

即上章桂枝證但字據脈經七補吳云若不惡寒則為溫病為邪傳陽明○

下四

○或發汗則不識人

或字今添以別上章成為轉屬少陰也吳云

陽明熱甚神昏不識人

○熏之則喘不得小便心腹滿

氣成云火熱傷

蓋以為承氣輩證也

○熏之則喘不得小便心腹滿

氣成云火熱傷

湯不得裏實常云麻黃杏仁甘草石膏湯按當用大承氣

○下之則短

氣成云火熱傷

氣而腹滿小便難頭痛背強

外擬桂枝加葛根湯成云下之內虛津液

據脈經補○加溫鍼則必衄

火迫血上行程應旄曰此證近于溫有熱無寒汗

右申明上章汗下熏三項之變又加出溫鍼之禁

【咽喉痛】

【論咽中閉塞不可汗下二章】

咽中閉塞

此少陰經之咽痛與

發汗則吐血氣微欲絕

傷寒論無微

欲字補亡論引

手足冷逆欲得蹠臥不能自溫

龐云甘草乾薑湯以

于止厥逆欲絕則併腎中之微陽不能自存夫下厥上竭蹠臥厥冷在

于止厥逆欲絕則併腎中之微陽不能自存夫下厥上竭蹠臥厥冷在



少陰皆危證也程應旄曰汗齊為陽施于陰竭則逆咽中閉塞由腎液少腎氣不能上通也發少陰汗則下厥上竭故見證如此○出不汗可汗篇

### 右咽中閉塞誤汗變證

〔咽中閉塞〕蒙上下之則上輕下重水漿不下臥則欲蹠身體急痛

下利日數十行此亦少陰咽中閉塞下之陽氣益虛陰氣益甚故有上輕下重

諸證○出不可下篇

### 右咽中閉塞誤下變證

### 〔論喉痺刺法一章〕

傷寒喉痺刺手少陰衝心經也少陰在腕當小指後動脈是也鍼入

### 三分補之據服經

〔匈痺〕依金匱第九篇次惟短氣一章析出又補入四章○傷寒結匈與否有痛與不痛之分雜病匈痺則多兼心否言而心痛

短氣又其兼證也金匱經大題俱作匈痺心痛短氣而心否乃漏標出今依千金十三止題匈痺二字

### 〔論匈痺之由一章〕

〔師曰〕

問詞脫省夫脈當取大過陰

與不及

據脈微

○與字

陽微

不足也陰

弦尤云陰

即匈痹而痛

據下文知即謂心痛

尤云以心藏于

陰主閉

陽主閉

則

則

虛而陰干之即匈

所以然者

責其極虛也

無責猶知也

陳云極虛則

勝邪之本矣然

然

然

單虛不痛

今陽虛知在上焦

謂寸脈微

所以匈痹心痛者

蒙上

以其脈陰

陰

弦也

脈字據脈經補尤云夫上焦為陽之位而微脈為虛之甚故曰

責其極虛以虛陽而受陰邪之擊故為心痛也

陳云陰中寒邪

乘上焦之虛而為痹為痛是虛為致

邪之因而弦則露其襲虛之本象矣

邪

邪

右言匈痹有由陰盛而陽虛于上者

【治中湯證一章】

此溫寒方

〔匈痹〕治中湯主之

據外臺十二引張仲景補藥證而省其文也

痹二字疑即上章之證

而省其文也

標匈

標匈

標匈

【栝蘂白酒湯證一章】

此疎氣方

〔匈痹之病〕喘息欬逆

程林云諸陽受氣于匈而轉行于背氣

匈程林云諸陽受氣于匈而轉行于背氣

往來之路故也

背氣

背氣

背氣

痛

相牽引而痛及背也

○脈經八作匈

短氣

陳云阻其前

且後

陰

陽

息效唾而呼吸之間

寸

口脈

沈遲

陳云此一

條作其脈義同

關上

不相續而短氣矣

寸

口脈

沈遲

陳云此一

條作其脈義同

關上

關上

小緊數者于外臺一條作關關陽氣失權諸脈陳云此即陰法當通其由尺而上溢括

萸薤白白酒湯主之是方在薤白中外臺一條稱括薤白酒辛以

開痹温以行陽括薤實者以陽痹之處必有痰濁阻其間耳陳云凡

言凶痹皆當以此概之故揭為主證主方關居陰陽之界緣陰邪威

及于陰位由尺而溢于關上見之亦拘拘于首章太過也

【栝薤半夏白酒湯證一章】此疎氣而兼

【凶痹】謂諸證悉同前不得臥此證所獨入于陰故半夏法出內經痰飲阻其衛

援也陳云與心痛徹背者即上章之凶背痛而此較重故重言之陳

支飲證同云此為所獨誤尤氣閉而前後不通陳

栝【萸薤白】半夏白酒湯主之臺方在薤白仲景亦白標白截漿三補外

【枳薤桂枝湯人葎湯並列一章】

【凶痹】心中否堅此字據外臺十二引仲景及刪繁補○一作否氣

痹病更加留氣結在凶凶滿脅下逆氣外臺補搶心陳云是胸既不降

而且滿而又及于心中牽及脅下為留為結為枳實薤白桂枝

湯主之白方在薤○人葎湯亦主之即治中湯也○尤云是宜急通其

蓋久一暫與去邪之虛實即安正唐則養陽之虛即以逐陰是在審其病  
 夏添易一否滿則加枳實以泄均中氣添脅下氣逆搶心則加厚樸  
 以泄脅下之氣與上兩方又同矣凡腹滿均湯則為一兼見二  
 證故加此二味與上方不矣其並列人蔘均湯則為一兼見二  
 塞因塞用之變法此下否故用枳實者則用橘枳散烏頭赤石脂圓  
 薑枳實湯亦因有法心中否故用枳實者則用橘枳散烏頭赤石脂圓  
 證求已有別方遂通例可識矣心

右凶痺甚重之證出二方一散氣一補虛以聽擇用或先後

間服仍陳注

【茯苓杏仁湯橘枳生薑湯任人選用一章】

附一章

〔凶痺〕云外臺十二無二字吳中氣塞陳云因氣阻塞息之短氣陳

氣感于水則凶中氣塞陳云因氣阻塞息之短氣陳

下文列二方亦非分治唐云水化則為氣如以火煎水氣出則乾是

也氣化亦能為水觀時兩出雲可知是二方與〔茯苓杏仁〕甘草湯

主之氣方海有五苓輩外臺稱茯苓湯則化火水性開不病痺也若陰邪  
 性闔故令凶痺○橘〔皮〕枳〔實〕生薑湯亦主之云方在橘皮輩○陳

尤云此亦氣閉氣逆之證視前章為稍緩矣二方皆下氣散結之齊而有甘淡苦辛之異亦在酌其強弱而用之

右凶痺稍緩之證出二方一利水一順氣以聽擇用

〔凶痺之病〕凶中悞悞如滿噎塞

即上章氣塞

習習如痒喉中澹

澹即痒為之

唾燥沫是也

以上諸證通係痰飲使然及其積多亦有自行吐出者

〔橘皮枳實生薑湯主之〕

明此湯亦能治痰近世所謂治痰先順氣是也○據外臺十二引仲景補王洙殆以證與上同有所刪與

右明橘枳生薑湯能順氣亦能化痰

〔薏苡附子散證一章〕

〔凶痺〕

吳云此凶痺之重者

偏緩急者

偏字據外臺十二補李越曰緩急者或緩而痛暫止或急而痛復作

薏苡

附子散主之

方在四逆輩○薏苡逐水附子補陽亡陽挾飲之凶痺自除

右凶痺有兼少陰證者以補陽逐水為主方

〔桂薑枳實湯證一章〕

此疎氣溫寒之方

心中否

不言凶痺者以載在凶痺的證誤

諸逆

諸氣上逆尤云該痰飲客氣言程林云如

脅下逆氣

心懸痛

尤云言如懸物動搖而痛逆氣使然也程林曰邪

傷寒雜病論章句

大虛者桂心生桂〔枝生〕薑枳實湯主之  
主方在文桂枝名並同又十三  
珍做宋版印  
三稱桂心  
薑枳實湯主之

【烏頭赤石脂圓證一章】

心痛徹背背痛徹心  
心痛徹背是痛發於背而及於心背與第四同

是其痛往復不休與前證大別以心中痛足與此大陳云此亦為寒

氣使然故方用辛熱不言芎藭白以心平之齊治所能治連烏

痛徹背尚不休則為陰邪浸枯蕤光欲息非薤白之類所治連烏

頭赤石脂圓主之  
大方辛大四逆輒忘但逐陰邪李老云吳云在內

而徹背則達于外矣背痛在而徹心則入于內故有附子復

用烏頭乾薑大散其寒佐蜀椒下氣大開其鬱恐過陰寒之氣遍

陽位故前後牽引作痛沈收邪感心包心應外俞痛則心痛背邪

背背俞氣從內走則背痛徹心客于背俞相通內外之氣相引則心痛背邪

痛是也烏附椒薑所以振陽氣而逐  
陰邪取赤石脂者所以安心氣也  
右凶痺大辛大熱之方

【九痛圓證一章】



九種心痛

陳云痛雖有九而心痛不離于寒故以薑附為主而降濁去風逐滯補虛次之唐云腹滿中三物七物大柴胡等湯

均用大黃治熱痛可知痛不盡屬寒也誤信陳注則熱痛之證鮮不誤矣惟仲景毫無偏較學者當細察之

九痛圓主之

方在承氣輩○温下法寒實者宜之○兼治卒中惡腹張口不能言○又治連年積冷

流注

句

心匈痛△并冷衝上氣落馬墜車血疾等皆主之

據金匱附方補

右凶痺温下之方並詳其兼治之藥證

【論否堅脈候一章】

寸口脈雙緊即為入

緊為寒見于陽位即為否堅入謂病氣進于裏也

其氣不出

出謂病氣由內

之外

無表有裏心下否堅

據脈經補千金十五上亦載之出平脈篇

右言否堅為陰寒入于陽位

【脅下痛】

金匱脈經均隸腹滿內今拆出

【論脅痛脈候二一章】

寸口脈雙弦者

雙字據病源五補千金十六作右手寸口脈弦是又謂偏弦矣大約雙弦則兩脅痛單弦則脅下偏痛也

陳云微弦見于跌陽與見于寸口者不同以跌陽主胃病從內生寸口主營衛病從外至也

即兩脅拘急而痛

謂即痛也此必兼有腹滿等證陳云弦為寒主痛程林曰弦肝脈陰也肝脈循腹裏寒主收引故脅下拘急而痛以寒勝于內而陽氣不行于外故亦奮奮惡寒其人嗇嗇惡寒也擬小柴胡湯去黃芩○病源無而痛二字

右言陰邪見于陽部則脅痛故寸脈弦仲景以弦為陽屬七表

者不同

〔寸口〕脈〔弦而滑〕弦為痛滑為實痛為急實為踊踊當作踊急

相搏即匈脅搶急據脈經補千金十五亦載之

右言脅痛亦有弦而兼滑者則為實

【黃附細辛湯證一章】

脅下偏痛一邊不痛此亦必兼發熱上章云惡寒此云發熱亦是陽氣被

鬱所致○脈經無發熱二字〔其〕脈緊弦者尤云陰寒成聚偏着則為實熱云〔此〕寒也寒實

溫當以溫藥下之尤云陰寒成聚偏着則為實熱云〔大〕黃附〔子〕

細辛湯主之方在承氣輩○原本不標細辛今添尤云程氏云大黃

之性存也

右言脅下偏痛亦有弦而兼緊者法當温下

【腹滿】

匈脅寒疝腸鳴是其兼證出金匱腹滿寒疝宿食病脈證治十

【虛滿】

【論腹滿當與温藥二章】

跌陽〔脈〕微弦

吳云脾脈當和緩而今見弦是肝脈也肝脈見于跌陽是木盛土虛也陳云微弦為陰陰加于陽故腹滿

二〇冒下

○法當腹滿

此脾病實證擬承氣湯

○不滿者必便難

此脾病虛寒陰結證也擬治中

○湯脈明內有便難便可下者此則大腸無津液也

兩胠疼痛

陳云胠音區腋

注下脅一作脚

此虛寒從下上也

跌陽脈在上當以温藥服之

右以腹之滿不滿分寒熱舉不滿者雖便堅之當温則知滿

者之宜下矣

腹滿時減

尤云寒也

減復如故

尤云腹中寒氣得陽暫開得陰復合此亦寒從內生也

此為寒當與

温藥

與陽明篇腹滿不減減不足言當下其證略同而一陰一陽當善體會

右言虛滿有時減時劇之分

【柴胡桂枝湯證一章】

心腹卒中寒者其腹滿可知腹方在合方輩○此

滿也法當兼治故用此方  
○據金匱附方引外臺補

右言腹滿有大陽少陽病者即當用大少合病之方以明見

證施治之例

【大建中湯證一章】

心匈趙校本中大寒痛陳云心匈本陽氣用事今有大歐陳云寒氣

不能飲食與厚樸七物證飲食如故自不腹中滿滿一作寒上衝謂上衝有

謂各從其類也此亦寒疝之類皮起句出見有頭足猶言有頭尾

衝之動失之陳云凝成象腹中實象上下痛不可觸近者大建中湯

主之上下謂逆之陰以衝氣之頭足按之則痛尤云大建中臧之陽

右言腹滿有溫補兼潤之方

【附子粳米湯證一章】

附一兼粳米湯證當證

腹中寒氣陳云腹為下雷鳴陳云逆切痛陳云寒匈脅滿歐吐寒氣上攻

也尤云下焦陰濁之氣不特肆于陰部陳云陽位亦任其橫行而無

忘所謂腎虛則寒動于中也惟恐胃陽隨歐吐而脫故温煖胃陽兼

補腎附子粳米湯主之逆方在四逆輩○尤云附子厚而

右言腹滿有當用薑附者此即少

〔寸口脈遲而澹遲為寒澹則無血〕據脈經八腹滿補與氣分內

【實滿】

【腹滿先分虛實一章】

病者腹滿按之二冒下○不痛者為虛擬治中湯吳云厚樸生薑甘草

而不○痛者為實前章以腹滿不滿分虛實此又于腹滿之中以

實可下之謂按之痛者吳云大承氣湯○脈經作凡舌黃未下者下

之黃自去趙云胃實必熱熱蒸必舌黃去則黃亦去○千金十六已乎尤

二句屬腹滿不減

傷寒雜病論章句 卷七 身體雜病 三七 中華書局聚

右腹痛分虛實法舉實痛者之可下則知虛痛者之當温矣

【大承氣湯證二章】

前二章金匱在寒疝烏頭桂枝湯下依脈經置腹滿

夫脈數而緊

尤云數為陽緊弦為陰凝于陽非陽氣生熱之數也就寒疝

瘡言則弦反從數為風從熱發非

陰生寒之弦也○數脈經作浮

迺論也與平脈篇同○弦按之不移

不移

凡四句釋弦之狀乃泛論也與平脈篇同○弦按之不移○脈數

弦者

陳云數雖陽脈而見在陰病見陽故可下○當下其寒泥即謂

實也陳云大黃附子湯當不拘

右言腹滿見弦脈者為可下

脈雙弦而遲者

吳云雙弦謂兩手皆遲也左關弦肝木王也右關弦

緊大然與下節重今依傷寒可下篇

必心下堅

脈擬承氣湯已見二陽併病遲尚可下則數

之當下更無疑矣徐云木邪克土

○脈大而緊者陽中有陰也

陰陽俱實徐云大亦

即弦之狀也

可下之宜大承氣湯

五字據傷寒可下篇併

右申言腹滿脈弦兼有心下堅證



〔病腹中滿痛為實當下之〕  
〔據脈經八補與厚樸三物湯證同省〕

右言腹中滿痛之當下

〔厚樸七物湯證一章〕

〔病腹滿〕  
尤厚樸大黃枳實  
發熱數十日  
持桂枝陳云表裏之邪相脈浮

發而數  
云數為熱可下尤云表有邪陳  
飲食如故者  
利據方下知亦云

其胃未傷若無腹滿證為中風之能食者矣  
實厚樸七物湯主之  
在方

承氣輦○此太陽陽明合病之方與傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯治法有別者以此為表裏之邪俱熾也若大小便反清

則表證為重又當先表後裏用桂枝湯之成法矣吳云表裏均解腹滿發熱兩除此桂枝湯小承氣湯複方也○服經作厚樸三物湯治

裏而漏表矣此邪字誤也程林曰腹滿者在裏實熱也十日脈尚浮而

數浮為在表邪未已故發熱數為在裏實熱能消穀故飲食如故

與此方蕩腹滿而除表熱二表俱實當先解表乃可攻裏今表邪微而裏邪甚故用桂枝承氣二湯相合以和表裏如傷寒之用大柴

右言二陽併病腹滿發熱者法當表裏兩解

〔厚樸二物湯證二章〕

傷寒雜病論章句 卷七 身體雜病 天 中華書局聚

腹滿痛者外臺七引千金作腹滿厚樸七物湯主之方在承氣輩

以無發熱兼證知是厚樸三物湯證也

痛而閉者閉者塞也謂即便難行〔厚樸三物湯〕主之尤云方與小承

在蕩實故君大黃三物意在行氣故君厚樸陳云上用厚樸七物湯以其發熱尚有表邪也今腹痛而不發熱止是大便閉者為內實氣

滯滯一之邊故與此湯

右陽明府病腹滿痛或痛閉者攻下之方

【大柴胡湯證一章】

按之心下滿痛者由腹中滿痛而上至心下邪氣滲漲使然或兼有潮熱可推知不言腹痛者蒙上章不煩言尤云有

形之此為實也尤云實當下之宜大柴胡湯尤云與心下滿痛則結處

實邪此為實也則可下當下之宜大柴胡湯尚高與腹中滿痛不結處

故不宜大承氣而宜大柴胡以承氣獨主裏柴胡兼通陽痹也按此

右陽明少陽合病腹滿痛者法當兼治之方

【走馬湯證一章】

中惡心痛腹張大便不通者走馬湯主之方在承○通治飛尸鬼疰

據金匱附方引外臺補沈自南云中惡之候俗謂絞腸烏痧即臭穢惡毒之氣直從口鼻入于心胸胃臧府壅塞正氣不行故心痛腹張大便不通是為峻猛之非六淫侵入而有表裏虛實清瀆之分故用巴豆極熱大毒峻除則病得愈若緩須臾正氣不通營衛及陰中使邪從便出一掃盡也○外臺引文仲卒得諸疝少腹及陰中死是取通不一痛之義也○外臺引文仲卒得諸疝少腹及陰中若相引絞痛自汗出欲死方亦佳此名寒疝亦名陰疝七

右中惡腹痛峻攻之方

【水飲腹滿證一章】

腹滿口中苦乾燥水飲阻其津液不得腹間有水是飲據千金十

湯棗

右言腹滿有水飲證

腹滿舊有不減減不足言當下之宜大承氣湯在陽明府病者痿黃躁而不渴腹中寒實而利不止者死在下利內

〔寒疝〕金匱經均與腹滿同篇今拆附之吳云疝病犯寒即發故謂之寒疝

【論寒疝有因誤下者一章】

夫瘦人吳云形氣虛繞齊痛瘦人病此與陽必有風冷穀氣不行此

痛之由擬治中湯尤云瘦人減氣虛弱風冷易入則穀氣留滯不

行繞齊疼痛有似裏實而實為虛冷是宜溫藥以助脾之運行也

而反下之誤治○冒其氣上衝衝即寒疝也據千金十六此章屬

湯與大陽病下之氣上衝者可與桂枝湯及燒鍼令其汗必發證也

○不衝者心下則否不成否擬瀉心輩右言虛人中寒誤下變證有疝與否之分

【論寒疝脈證一章】

腹滿脈經作寸口〔寸口〕凡言脈者皆脈〔弦而緊〕尤云弦緊皆陰

內生緊之弦則衛氣不行即惡寒尤云陰出而陽緊則不欲食

陰從外得其胃之陽○千弦緊相搏胃陽並衰而外寒與內寒交感由是陰反

無畏而正相搏即為寒疝也即為寒疝起于寒者○跌陽〔脈

浮而遲〕浮為風虛遲為寒疝言寒疝之兼脈于風者此

右寸口跌陽合診以明寒疝由風寒使然

【大烏頭湯證二一章】

〔寒疝〕

脈經無二字 繞齊痛 此寒疝之常然與宿食相類

○若發則自

汗出

金匱者為虛汗也 誤尤云白汗亦通今依脈經不

手足厥冷

陽欲亡此

頭證之

其脈沈緊者

尤云皆寒○寒疝之證未瑩陳云沈為裏類

大烏頭

湯主之

方在建中輩○一稱大烏頭煎一日更服頭軌云大寒入裏

非大熱之藥不除吳云是專以破邪人治標為急

〔寒疝〕腹中絞痛

即繞齊

賊風攻入

上章專指陰寒此

五臧拘急

謂痛也較上章為重

不得轉側

轉側則五臧

發作有時

此寒疝

令人陰縮 寒入

〔手足厥逆〕

蒙上章省

者〔烏頭湯〕主之

即大烏頭湯也據金匱

右二章言寒疝有急當回陽之方

【烏頭桂枝湯證一章】

〔寒疝〕腹中痛

外臺七引仲

厥逆

烏頭尤云

手足不仁若身疼痛

桂枝

湯尤云陽寧于表○灸刺諸藥不能治者是或攻表而遺裏或治裏

外臺作若一身盡痛也服也〔抵當〕喻云抵正也謂正當也然則抵當二字猶云宜也原本逐

也〔抵當〕證載方下行方名祇稱烏頭桂枝湯可見陳云內外交迫

孰可抵鳥頭桂枝湯主之方在建中輦○尤云此為寒邪兼傷表也

【小柴胡湯證一章】

〔寒疝〕腹痛小柴胡湯主之據外臺引崔氏注胡洽云出仲景補但

改作小前胡湯改原注又云仲景方用柴胡今崔氏用胡此方治寒疝

腹痛恐性涼耳合用仲景柴胡桂枝乾薑湯不用前胡之未知其可

也蓋林億等不知此為兼少陽之寒疝也胡洽當有所本

【柴胡桂枝湯證一章】

〔寒疝〕心腹中卒痛者今外臺七引仲柴胡桂枝湯主之方在合方

景作腹中痛者外臺補方引

右言寒疝有兼大少病者即當用大少合病之方



【當歸生薑羊肉湯證一章】

〔寒疝〕腹中痛及脅痛裏急者仲景方下知兼引脅痛及腹裏急〔當

歸生〕薑羊肉湯主之方在當歸輦○徐云精不足者補之以味此

虛則脈不營寒多則脈細急也故腹脅痛而裏急也當歸生薑羊肉湯散

寒疝之補虛益血也陳云大烏頭煎祛寒則有餘也當歸生薑羊肉湯散

右言寒疝有補血緩筋之方

〔陰狐疝〕蒙上次之金匱出第

【蜘蛛散證一章】

陰狐疝氣者軌範云俗偏有小大而陳云大舉小也○偏左或偏右時時上

下尤云寒濕襲陰而舉丸受病或左或右時時上

下無時故名狐疝陳云發時則墜而下息則收而上趙云舉丸上

下有若狐之出入無時也李時曰偏有小大以舉丸言時時上

皆縮出入于其中也如狐之媚人能治女陰莖言囊既腫大莖時下

傷寒雜病論章句 卷七 身體雜病 三 中華書局聚

別于寒疝也尤云蜘蛛有毒服之利人桂枝不利人  
而逐其寒濕之氣也按蜘蛛以甜酒熬過並不利人

【淋】金匱出消渴小  
便不利淋十三

【論大谿脈數主陰創及氣淋證一章】

少陰脈數腎熱○胃○婦人則陰中生創○男子則氣淋據脈經

創氣淋互詳其證也非謂婦人無氣淋亦統諸淋言  
創也據婦人雜病陰創內可見氣淋

【論諸淋病狀一章】

淋之為病小便如粟狀粟當作粟如形誤謂小便時戰栗也若小便不能

該括少腹弦急陳云病在下焦及肝痛引齊中病在膀胱牽引腎脈

膀胱為病由腎虛而膀胱熱也膀胱通于陰者水液而下流之道也

又不宣石淋勞之淋血狀小便出少起多腹弦急痛之未備

跌陽脈數胃中有熱即消穀引飲大便必堅小便則數在陽明總

淋家不可發汗發汗則便血在大陽經病

【小便不利】金匱出消渴小  
便不利淋十三

【通治方二首一章】

小便不利 陳云不渴又無水氣其證不雜 蒲灰滑石散主之 滑石二字今添

並下三方通在五苓輩○尤云蒲香蒲也寧原云香 ○〔亂〕髮〔滑〕

石白魚散 原稱滑石白魚散不標髮字以方僅三味今添陳云若係

滋陰益氣以利小便者為 ○〔菴〕苓朮戎鹽湯並主之 原本不標

青鹽鹹寒入腎以潤下之性而就滲利之職為驅除陰分水溼之法

也

右為小便不利並出三方以聽人之隨證審用 仍尤

【栝萸瞿麥圓證一章】

〔小便不利〕 蒙上腹中冷者有水氣 腹中無所洩此理之常據方下補

其人苦渴 吳云水不化行津液也 栝萸瞿麥圓主之 方在五苓輩○

加泡附宣通陽氣腎氣丸之變制也李慈曰此方與五苓散同為利

水桂枝走表此用薯蕷即五苓用白朮之義但五苓兼外有微熱故

傷寒雜病論章句 卷七 身體雜病 三 中華書局聚

温爲知可推矣其人苦湯則是水氣偏結于下而燥火獨聚于上夫  
上浮之燄非滋不熄下積之陰非煖不消而寒潤辛温並行不悖此  
方爲良法也求變  
通者于此三復焉

珍做宋版印

### 右言利小便有補陽兼滋潤法

## 【脚氣】

### 【風引湯證一章】

脚氣風引湯主之

方附桂枝輩○據金匱歷節後附方風引湯下引巢源補此治風熱之脚氣也

### 右風熱脚氣之方

### 【烏頭湯證一章】

【脚氣】腹痛不可屈伸烏頭湯主之

方在建中輩○據歷節烏頭湯後附方補

### 右寒溼脚氣之方

温散並用者

### 【腎氣圓證一章】

【脚氣】上入少腹不仁【崔氏】八味圓主之

方在玄武輩○即腎氣圓也崔氏引用仲景方

與抑仲景引用崔氏方也依前後例當改稱腎氣圓

右言脚氣有補腎火兼瀉水法

此亦寒濕脚氣也

【礬石湯證一章】

脚氣衝心出金匱歷節附方據救急內治卒死礬石湯浸之方在陳

云此脚氣外治之方也脚氣至于衝心似難所以外法俾功然衝心是

腎水挾脚氣以凌心而礬能却水兼能護心所以為妙必以烏頭湯

右言脚氣有外治法

【轉筋】脈經與霍亂同篇然霍亂轉筋特其證中之一不能

【雞矢白散證一章】

轉筋之為病病源三陰霍亂而轉筋者由冷氣入于筋故也冷入于筋

隨冷所入之筋動其筋則轉轉者皆由〔其人〕臂脚直此言冷入者筋轉則

邪冷之氣擊動其筋而移轉也〔其人〕臂脚直此言冷入者筋轉則

失其屈伸之節轉者動也然風脈上下行微弦者即轉筋之狀入手上下行

之謂脈謂即筋也此非診之于寸口跌陽但憑其所轉之筋則如弓

風氣肝病生風則為轉筋入腹者隨其所過而深入也尤

傷寒雜病論章句

卷七

身體雜病

三

中華書局聚

云脾土虛而非雞矢白散主之方在雜法○雞屎當是燒存性或陳久

其矢反利脾氣故取治是病且徐類相求尤易入也陳云取其捷于一

去風下氣消積安脾先治其內徐治其外也軌範云轉筋之證不

有平時常轉筋者有霍亂而轉筋者并有轉筋入腹者當用木瓜吳

謂氣也陳久而積氣去者方可用則

【一臂不遂】  
右轉筋通治之方

【論一臂不遂有風有飲有微勞二證一章】

〔病人〕一臂不遂遂隨也千金時復轉移在一臂左病則右愈右

下二○其脈沈細者此非風也必有飲在上焦擬藜蘆甘草湯以

脈浮大者為風一證○其脈虛者為微勞言外自見脈之營衛氣不周故也

擬黃者桂枝五物湯營衛氣沈細者必兼實營衛氣不周故也

久字誤合為一也歲月既久營衛得復其常故自愈

【一手指臂腫動】金匱出第



【藜蘆甘草湯證一章】

病人常一手指臂腫動

則一舊作以聲誤今正陳云腫則知其為溼動

也〔其人〕身體瞶瞶者

手瞶瞶有肉顫其貌據此則不藜蘆甘草湯主

之

方闕附見瓜蒂輦○尤云溼痰凝滯關節則腫風邪襲傷絡則

方雖未見然大略是涌齊耳

右言一手腫動有由風涎者當用吐法

傷寒雜病論章句卷七



傷寒雜病論章句卷八

湘潭孫鼎宜撰

【臧府雜病】

【積聚】

依脈經八次繫氣癥瘕并附見金匱祇載前二章附五臧風寒積聚中今拆出另立一部

【論積聚繫氣三證之分一章】

問曰病有積有聚有繫氣何謂也

繫古穀字原注禾齊氏要術中猶明用之脈經云積者陰跡也病氣之屬

證俗解

師曰積者臧病也終不移

尤云徐彬云積者陰兩陰相得病氣之屬

不移者有專痛之處而無遷改也

○聚者府病也發作有時

尤云徐聚而已病氣之中

屬陽者也府屬陽兩陽相比則非如陰之凝

故寒氣盛則發否則已所謂有時也○積聚以臧府分蓋始自此內經則通曰積也自後則已

癥瘕名目百出不可詰究矣

△展轉痛移為可治

此謂其形此聚言上積者終不移

痛徐彬云既無定着則痛無常處故展轉痛移其根不深故也

○繫

氣者脅下痛按之則愈復發為繫氣

正其名曰繫氣則其治法與宿

氣也食積大陰敦阜之氣折遏肝氣其病在脅下按之則氣行而愈復發者飲食不節則其氣仍聚也

【王叔和曰】

四字

傷寒雜病論章句

卷八

臧府雜病

中華書局聚

據病源有十九補熙之注混入經

〔夫病已愈不得復發今病復發即為

槃氣也

不十顧與字見相脈倍上脈云經按注之則大小同致後人疑為經文而

全愈也復發者謂其撒手後即痛論也王熙不立說乃謂夫病已愈

為穀下文徐彬云此積非陰癥可知然必中形氣從陰結則大

著也下云積在喉中結陰癥按喉中積者亦能容有別名耳物耶大

以抵天言軌物皆在無中皆有形也氣則無形但有氣耳按積聚亦能拘

【諸積大法一章】

之耳類不能也以說未瑩癥聚皆有形也氣則無形但有氣耳按積聚亦能拘

諸積大法

此仲景自為標題也病源竟削此四字大法者謂其大略

○脈來細而附骨者迺積也

千脈金二注十八而作結按結亦謂云細也病源

骨謂細而沈之行而外達則其脈為細然者積而不移之處其氣血

脈出積之所決也○寸口金謂寸口獨結者千積在胸中△微出寸口

出者謂此沈之細上積在喉中較其積高△關上上結者關積在齊旁

正關主中焦也△上關上積在心上△微下關積

當中焦也△上關上積在心上△微下關積

在少腹

退下一步故其積亦較齊為低

△尺中

中千金作尺者

積在氣衝

氣衝街積在背

字衍也○以上皆據仰人言伏人可推知

○脈出左積在左△脈出右積在右△脈兩出

謂左右積在中央故脈云以中央有積其氣不能分布左右

○各以其

部處之

金匱作知之尤云謂各隨其積所在之處而分治之耳○李

右別積上病之所在皆指細而附骨之部分即內經前以候後以候

後上竟論診腹中有橫積脈法一章相聯今俱不載

右一章三節首言積脈為沈細次以脈之三部從人身豎說

而定其積之所在三節又以人身橫說憑脈而定其積之在

左右與中央

【論寸弦為疝瘕一章】

寸口脈弦

此寸口統三部言

腹中急痛要背相引腹中有寒疝瘕

並下十

經八補

【論寒痺癥瘕積聚之脈皆為弦緊隨三部而定其所在一章】

脈弦緊而微細癥也弦緊為主病之脈微細其兼見者也微細二字側看○夫寒痺癥瘕積

聚之脈皆弦緊由癥而類及之△若在心下卽寸弦緊△在胃脘卽關弦

緊△在齊下卽尺弦緊

【論積在齊旁則關脈弦長一章】

關脈弦長有積在齊左右上下也十五字據上章脈經注一曰云云補依千金二十八另列爲一章

章

【脈癥法一章】

又脈癥法題下事也左手脈橫癥在左有橫筋然也△右手脈橫

癥在右○脈頭大者在上△頭小者在下頭小卽尾大互文頭尾以寸尺言也

右一章二節首言弦脈以左應左以右應右次言大脈在上

應上在下應下

【脈積法二一章】

又法此以左右交互言與上章異橫脈見左積在右積與癥亦互文勿泥○△



在右積在左○偏得橫實而滑亦為積偏謂左右獨見也言弦脈亦有兼實滑者△弦

緊亦為積為寒痺為疝痛此言弦亦有兼緊者上章言寒痺積聚之脈為弦緊此言其並主疝痛

右一章二節首言弦脈主病有左右互易者次言弦脈有兼

滑實者有弦緊兼主痺及疝者

內有積不見脈難治○見一脈相應為易治△諸不相應為不治

右以積不見脈為難治及見脈又以相應不相應分生死

【論脈大隨左右而定其上病則在脅下病則在足一章】

左手脈大〔右手脈小〕四字可省上病在左脅下病在左足○右手脈

大〔左手脈小〕四字可省上病在右脅下病在右足大為邪實故也

【論癥脈為弦已兼見伏一章】

脈弦而伏者腹中有癥不可轉也轉謂移轉必死不治

【論癰腫伏梁為弦而兼沈細一章】

脈來細而沈時直者直即謂弦與橫同義身有癰腫此癰腫謂即疽也故其脈沈細○若腹



匈中之氣如匈滿噫氣亦用旋覆之例也新絳茜草  
所染用以破血正肝經血着要藥○脈經六不出方

### 右言肝着有由氣血鬱結而欲成瘀者

【腎着】金匱附五臧風寒積聚  
中今拆出另立一部

### 【腎着湯證一章】依金匱次

腎着之爲病尤云腎受冷身體重一要中冷如冰狀二○脈經六注

一作如坐水中形如水狀古今錄驗又作要以反不渴三○尤云若

下冷○尤云皆冷溼着腎而陽氣不化之徵飲食如故五○非病證謂其

液則當口渴小便自利四○尤云寒在下飲食如故五○非病證謂其

耳尤云胃無病人【是其證也】四○尤云寒在下病屬下焦明○與脈中無四焦無

身勞汗出之○脈經也衣裏冷溼溼即汗也汗出汗出就下換衣

歸屬下焦○脈【故】久久得之于脈經有故字衍尤云清之溼臧虛病起

之外府故其治法不在溫腎以散寒而在燠土以勝水

右言腎着之證常身重而要冷腎着之原由汗出而衣溼

【腎着之爲病】脈經有此五要以下【冷】痛冷字衍文上節未著其

痛字疑脫要腹重腹當此復出脈經上句止著要痛未著要如帶五千

錢酌其輕重云爾以一錢五銖二十四銖為一兩計之共重六腎着

湯主之金匱引古今錄驗稱甘草湯注經心錄同

右申言腎着之證為下身冷而重痛

【肝傷】

肝傷者脫肉瘦如久臥謂不能起舊口欲得張張口以時時手

足青肝病及脾故四目瞑瞳人痛肝病也此為肝臧傷所致也據脈

補千金十同

【肺傷】

肺傷者勞倦則效唾血二字因其脈細緊浮數皆吐血言四脈

而吐血則一此為躁擾嗔怒得之此致病之由千金十肺傷氣壅所

致也據脈經

【心傷】

金匱附五臧風寒積聚中今拆出另立一部

心傷者陳云心內傷勞倦即頭面赤而下重尤云心虛者下必無氣也

心中痛徹背徹背二字據脈中寒證大同自煩發熱尤云心虛于

中也○千金十當齊跳謂齊旁脈動應手也尤云心虛于上而腎動

三作自發煩熱挑其脈弦尤云心脈如貫珠直如勁彊之形矣陳云弦是變溫潤此為心

臧傷所致也

【心虛】金匱附五臧風寒積聚今拆出另立一部

邪哭吳云傷之使魂魄不安者血氣少也尤云悲傷哭泣如邪所

濁火之殊而其本則皆心虛而血氣少也于是寤寐血氣少者屬于

心氣虛者陳云血從氣生其人則畏脈經六注合目欲眠夢遠行

而精神離散魂魄妄行二冒下○陰氣衰者即為顛○陽氣衰者即為

狂邪併于陰則陰衰邪併于陽則陽衰與內經重陰者顛重陽者狂

御之後邪入言其為病之故此則言其致病之內原也陳云顛重陽者狂

以寒熱分陰陽此以氣血分陰傷寒雜病論章句卷八臧府雜病五中華書局聚

右言心虛之極為顛狂

〔五藏者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五藏空

虛也即邪神居之神靈所使

以神魂不安謬

〔醫反下之〕

心氣虛不當下

與鬼病者亦不當下同均宜充其神而已○舊作鬼而下之蒙魂魄字致誤也

〔脈短而微〕

此誤下之變證〔其

藏不足則魂魄不安魂屬于肝魄屬于肺肺主津液即為涕泣〕

千金十三泣下有出字

〔肺氣衰者即為涕泣出〕

涕字據上文補

〔肝氣衰者魂不

得安肝主善怒其聲為呼〕

據脈經連上章補疑熙注文釋魂魄不安之義

【臧府氣絕】

絕者隔絕不通非脫五藏之死證但須善法以通之耳故六府不言氣絕于內五藏不言氣絕于外喻云是皆以

厥而且利為虛寒之極所以反能食者則反發熱者則利七病則反是按喻注意謂此為厥少二陰之病〔出金匱〕吐下利七

夫六府氣絕于外者

夫字千金凡手足寒

陳云六府之氣陽也手足寒則覺寒上氣

陳云匈中無陽以禦下焦上逆脚縮即足陽氣也手足運而寒故蹠臥陳云則歐吐噦之類皆是陰氣上逆脚縮即足陽氣也手足運而寒故蹠臥陳云

脚縮

即足陽氣也手足運而寒故蹠臥陳云

引而為縮○尤云六府為陽者主外陽絕不通于

○五藏氣絕于

內者下利不禁甚者

脈經八下利者手足不仁

內陰絕不守于內則下



衆利不禁甚者不交于陽而隧道痺閉為手足不仁也沈自南云胃為  
軀按內外以  
軀壳言

### 右一章二節分敘臧府陽氣隔絕之證

【二焦竭】金匱附五臧風寒積聚今另立一部

問曰三焦竭部傷雜病發中亦曰此四部病知仲景編集傷寒亦

仍其舊不曰類而曰部也陳云三焦氣上焦竭善噫何謂也噫為脾

虛不歸其部謬○脈經也部字作者誤中焦未和中焦二字據傷不能

以問故師曰上焦受中焦氣中焦未和中焦二字據傷不能

消穀故善噫耳吳云穀氣鬱而不宣尤云上焦不能消穀則上焦所受

者非精微之氣而為陳滯之下焦竭即遺溺失便釋下焦也尤云

下焦在膀胱上口其治在齊○其氣不和斥中不能自禁制明噫與

由上焦兩焦均無權惟不須治謂不須治上下兩焦陳云止久自愈

宜治中焦也擬治中輩不須治以補脾胃治其中焦也

噫與失便皆愈  
右言上下兩焦之竭皆由中焦不和當統以中焦為治仍陳

【三焦熱】金匱附五藏風寒積聚中今另立一部

〔師曰〕問脫省詞熱在上焦者因欬為肺痿尤云熱在上焦者肺受之欬

傷而痿也○〔熱〕在中焦〔者〕則為堅中堅者大便閉結也尤云熱所

以化水穀而行陰陽者也胃熱則實而堅脾熱則實而閉皆為堅也

也○〔熱〕在下焦者則溺血亦令人淋閉不通尤云膀胱受熱者大

閉結也承上文言故曰亦金匱作秘誤脈經六暨八卷均無末句外

亦令人淋閉不通正作閉字

### 右言三焦之熱各有病證

【大小腸寒熱宿食】大小腸寒熱金匱附五藏風寒積聚中

大腸有寒多驚漉吳云即下利瀉△有熱者便腸垢唐云腸垢是粘膩

○尤云驚漉如驚之後水糞雜下大腸有寒也

○小腸有寒下重便血據此不知下重便血均有寒證下重者尿欲

經十三血上有心下重脈△有熱者必痔據此知痔病不當專責之○大腸陳

下重謂腹中重而下墜小腸有寒者能腐而不能化故下重陽不化則陰下溜故便血其有熱則下注大腸而為痔痔熱疾也

### 右大小腸寒熱

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘡狀千金二十五上作大腹無○小

腸有宿食常莫發熱明日復止亦如瘡也○據脈經六補千金十

### 右大小腸宿食

### 【肺痿肺癰肺冷總敘】

### 【論肺痿肺癰之分二章】

問曰寸口脈數陳云數為熱其人欬效者肺口中反有濁唾涎沫出

者出字據千補何也尤云肺虛且熱則為痿而反有濁唾涎沫者以肺

則飲食游溢之精氣不能分師曰此為肺痿之病也○若口中辟辟

燥句絕莊子田子方云是肺痿已成火熱之毒出見于口欬則心中

隱隱痛聲不效也周揚俊云可知脈反滑數者言實者可知推知不為

肺癰李杲曰潘碩甫云痿屬肺氣虛雖有熱在上焦其脈皆數皆效亡津液

傷寒雜病論章句 卷八 臧府雜病 七 中華書局聚

應有瀆滯而涎沫故脈兼見虛也癰則氣壅血凝尤實熱津液亡矣  
 涎沫肺癰則口中多唾涎沫燥則二證似當同惟分則然肺癰條內亦云其  
 人涎救咽燥不渴多唾涎沫燥則二證似當同惟分則然肺癰條內亦云其  
 肺癰所獨也按中肺之膿血是總括癰痿二證可知專屬肺癰非是  
 蓋有二虛實此其可得而辨別之也  
 象蓋有二虛實此其可得而辨別之也

右言肺痿肺癰之分在口中乾溼

效唾膿血二胃下○脈數虛者為肺痿虛非極虛較肺○脈數實者為

肺癰實非極實較肺痿而邪盛下條言微而數者癰耳陳云實即伏二說相為表裏也○成

尤云比而論之痿者萎也如草木之萎而榮為津燥而肺焦也癰者壅也如土之壅而不通為熱聚而肺癢也故其脈有虛實不同而

為其數則依脈經八折上

右申言肺痿肺癰以口中乾溼分以同故不若以脈之虛

實分重者膿血已聚必得清火消毒提膿外科保肺等藥方能挽

回否則不治所以金匱云始萌可救膿成則死也

【論肺痿肺冷之分二章】

效而口中自有津液舌上胎滑者此為肺寒非肺痿也補依千經八

十七連上章次之○上章言肺痿口中論之肺癰口中乾燥極劇效嗽則痰涎有加而舌胎更滑也此而論之肺癰口中乾燥極劇效

痰次之肺寒而效則不渴也層層分清病情顯著津液謂痰涎也

右言肺寒而效較肺痿口中津液更足而舌胎白滑

肺痿月肺痿者仍流俗稱猶治婦人云妊娠三吐涎沫有津液口中自

滑乃寒病之常也○外臺而不效者謂不能效而病源八云肺痿其

十引仲景沫下有唾字人不渴有寒自必遺溺小便數尤云肺金不用而氣化無權也以上虛

不能制下故也制上虛謂小便秘不能此為肺中冷即上文必眩尤云經

眩則〔多涎唾〕臺十字衍文千金十七外證甘草乾薑湯主之○方在四逆輩

主之金匱主字作溫脈經八作以溫其臧謂肺也軌範云此治肺冷之方非肺痿之方也肺痿生薑不可輕用○若服湯

渴者屬消渴渴者是上焦已愈而下焦虛寒未除仲景所謂若渴而小便衰

則為消渴也此消渴病之常非先以甘草乾薑為嘗試屬消渴者謂消渴中之腎氣圓○脈經無此八字

右申言肺痿肺寒以津液舌苔分不若以不渴與遺溺分以肺

痿則渴而小便不利故也末節以服藥後陽回為病愈之常

【肺痿】出金匱第七篇

【論肺痿多因誤治二章】

問曰〔熱在上焦者因欬為肺痿〕二語見三焦熱內省尤云蓋師有是語而因之以為問也肺痿

之病從何得之師曰或從汗出一或從歐吐二或從消渴小便利〔

數〕三〇外臺十無數字或從便難被快藥下利四〇脈經八快字作駛千重

亡津液故得之四者有其一已足亡津液非謂悉具也尤云四者皆亡津液而生燥熱肺虛則熱則為痿矣

右言肺痿之由因亡津液

寸口脈不出謂脈沈也沈為在裏而反發汗誤治陽脈蚤索索枯索也誤汗傷其津液陰脈

不瀼謂洪大也熱流下焦故便膿血三焦蹠入而不出出入以脈象言〔陰脈不瀼〕據外

臺十無此四字知衍身體反冷其內反煩陰煩多唾唇燥小便反難津液已竭此為

肺痿傷于津液便如爛瓜亦如豚啮但坐發汗故也據此知肺痿有兼便膿血

證坐猶因也與二陽併病內句法一律〇〔據脈經八補〕



右專言肺痿由誤汗得者

【論肺痿久暫病證一章】

〔肺痿〕千金十六無二字欲效不得效效則出乾沫非涎久久小便不利

甚則脈浮弱據脈經八補千金十六末句作其脈平外臺所引又同脈經知今本千金誤

右申言肺痿總證以上三章依脈經次

【論肺痿有自愈有短氣一章】

〔師曰〕問詞脫〔肺痿〕效唾咽燥肺痿之常欲飲水者自愈津液將生求救于水之意

○自張口者短氣也效傷則短氣張口以便呼吸此望法也○據脈經八補

【桂枝去芍藥加皂莢湯證一章】

肺痿吐涎沫桂枝去芍〔藥〕加皂莢湯主之方在桂枝輩○據金匱附方引千金補

右去痰之方

【生薑甘草湯證一章】

〔肺痿〕效唾涎沫不止咽燥而渴渴故用人葷○外臺注一云不渴生薑甘草湯主

傷寒雜病論章句 卷八 臧府雜病 九 中華書局聚

之方在甘草輩○據金匱附方引千金補外臺十引  
集驗稱生薑人蔘甘草大棗湯注仲景傷寒論同

### 右生津之方

### 【炙甘草湯證一章】

〔肺痿〕涎唾多心中温温温通作也欲液液者液者蓋動炙甘草

湯主之方在甘草輩○據金匱附方引外臺補外臺十引張仲景傷寒論正同

○甘草湯亦主之六字據金匱附方引千金補○蓋謂虛之甚者用

尤云諸方皆辛甘温藥以肺既枯萎非温齊可滋者必生氣行氣以  
致其津蓋津生于氣氣至則津亦至也又方下俱云吐涎沫則非無  
津液乃有津液而不能收攝分布也故非  
辛甘温藥不可加皂莢者兼有濁痰也

### 右補虛之方

【肺癰】金匱出第七篇

### 【論肺癰多因風熱一章】

問曰病效逆脈之何以知為肺癰當有膿血吐之則死〔後竟吐膿

死〕脈經八有〔其脈何類〕師曰〔寸口〕脈〔微而數〕微為風風脈

此云微者蓋風舍于肺數為熱微則汗出之風常數則惡寒則外惡寒

尤云陰反在外是也○喻云肺癰已成其脈滑數此云微數者初起之脈也其已成則必滑實而數據上文可知也風中于衛

呼氣不入尤云氣作吸然疑與下句吸字互誤脈熱過于營吸而不出

尤云血得熱而壅風傷皮毛熱傷血脈此道風傷衛之常風舍于肺陳云

肺之合也風從衛其人則效病源三十三口乾喘滿尤云肺咽燥不

入營而舍于肺渴尤云熱在多唾涎沫此謂始萌時也及其久則渴而無津時時振

寒陳云熱感于裏熱之所過血為凝滯成膿蓄結癰膿吐如米粥陳

結于肺葉之間始萌可救膿成則死陳云肺腐軌範云肺癰之疾膿成亦有

耳

### 右言肺癰治法當在膿未成之時

### 【論寒熱效證與肺癰之分一章】

寸口脈數數為熱○跌陽脈緊緊為寒熱相搏故振寒而效此

感初起之效也○跌陽脈浮緩跌陽當大今浮緩者是胃氣如經

傷寒雜病論章句 卷八 臧府雜病 十一 中華書局聚

者胃脈無病病專在肺故曰如經經常也

此為肺癰據脈經八補脈經誤分兩章今併

珍傲宋版印

右寸口跌陽合診以明寒熱相搏之脈為欬逆若寸口獨熱

則為肺癰

【論肺癰之歐須膿盡則愈一章】

〔肺癰有膿而歐者不須治其歐膿止自愈〕

據病源三十三補與歐吐內歐家有癰膿

不可治歐膿盡自愈義同省但此專屬肺癰言

【憑脈以定肺癰有膿與無膿之法一章】

問曰振寒發熱〔寸口〕脈滑而數

已見前篇

飲食起居如故者

此謂初起時則

然耳此為癰腫病

證似外感而飲食起居如故知為癰然此統諸癰疽言而答詞始專屬肺癰言也腫謂癰之腫起

者醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何

以別知其處

據答詞乃以痛之所在也師曰假令痛在胸中者為肺

癰外臺十無痛字千其人脈數欬唾有膿血

外臺無有膿血三字○冒下二證

○

設膿未成其脈緊數○緊去但數膿為已成也

據脈經八補

【治肺癰未成法二章】

〔肺癰〕喘不得臥陳云肺癰將成未成葶藶大棗寫肺湯主之尤云喘不

得臥則肺氣被迫亦已甚矣故須峻藥頓服以逐其邪葶藶大棗寫肺

氣加大棗以和藥力猶已甚矣故須峻藥頓服以逐其邪葶藶大棗寫肺

嗽緊之方也肺中生癰不寫何待恐日久癰膿已成寫之况喘不得臥

不亦甚乎  
〔肺癰〕匈脅滿張引一○脅字據外臺十一身面目浮腫二鼻塞三清

涕出四不聞香臭酸辛此即鼻塞注文效逆上氣五喘鳴迫塞者六

吳云以上皆邪氣外塞皮毛內壅  
〔葶藶大棗寫肺湯〕主之方在十

肺氣比之喘不得臥殆有甚焉  
〔葶藶大棗寫肺湯〕主之方在十

膿未成故也  
○先服小青龍湯一齊乃進尤云寫肺湯原治肺癰不

右葶藶大棗寫肺湯證

【治肺癰已成法二章】

效而匈滿一振寒二○病源三十二云肺癰之脈數三咽乾四不渴

傷寒雜病論章句 卷八 臧府雜病 十一 中華書局聚

稠也脈經八米上有梗之字尤云此條見證具如前乃肺癰之本證也此為肺癰桔梗甘草湯主之

此吐血之方在瓜蒂輩原不標甘草今添尤云風熱所壅故以桔

梗開之熱聚成毒故以甘草緩之意者癰膿已成而不死者之方未成膿

非峻齊所可用葶歷之劑以云此治肺成膿為虛邪故不用桔梗之苦甘草

為實邪故用葶歷之劑以云此治肺成膿為虛邪故不用桔梗之苦甘草

排之甘解也肺毒○桔梗據三方稱省病白散亦主之方在陷匈輩○七

外臺八引仲景又引集驗注云此本仲景主治文並同意者仲景本

藥不能為功是在審其虛實緩急耳

右舉桔梗湯及白散藥證一輕一峻以聽人之選用

肺癰效有微熱煩滿音匈中甲錯同是癰身之錯肺癰匈中甲錯

是為肺癰葦莖湯主之方在瓜蒂輩○據肺癰二方引葦一升注

仲景傷寒論葦莖湯主之方在瓜蒂輩○據肺癰二方引葦一升注

此方具下熱散結通瘀之升而重原有此方也徐云此方最穩尤云

之偏亦良法也○尤云肺癰諸方各有專長葶歷大棗治癰之始萌

而未成者所乘其未集而擊之也葦莖湯則因其亂而逐之者耳

桔梗湯者所乘其未集而擊之也葦莖湯則因其亂而逐之者耳

堅之銳師也比而行觀之意審而行庶幾各當而無誤矣搗



右葦莖湯證方名葦莖而云

【腸癰】蒙肺癰次之依金匱第十篇創說大小腸分治誤也

【治腸中癰膿法一章】

腸癰之為病身體甲錯生一○尤云肌皮乾起如鱗甲之交錯○金匱

置作其身甲錯千金二腹皮急按之濡

無按之濡○千金如腫狀有膿也注云瀉而未盡千金下云其脈數者小

下二十六字脈經以腹無積聚雖四○言非他積聚陳云其外身無熱○五

據則熱退○初起則寒熱往來膿已脈數身六○與肺癰脈法同陳云此

為腸內有癰膿也尤云積聚張之根脈數為身熱之候今腹內

無熱內有膿也脈經一本作脈數四字【葦】苳附【子】敗醬散主之

腫破血為臣附子則假其辛熱以行鬱滯之一氣爾○脈經散字作湯

右【葦】苳附【子】敗醬散證

【腸癰膿未成而已有瘀血治法一章】

非謂腸癰初起便用

〔腸癰者〕之金匱作腫癰誤尤在云腫癰疑今據脈經之在下者蓋前少腹

腫否○膿未成熱正熾較上章勢重故腫否也按之則痛其按則壓痛小

便數如淋○句依脈經尤云而實非即痛如淋小便自調時發熱亦

未成熱正熾之二字○自汗出復惡寒此亦與肺癰證同飲食起居當

二○證下○〔其〕脈遲緊者癰未成而與洪數相類邪氣暴渴之應也遲

此為瘀血○千金作未可下之當有血乘其未溢而導之藥即斥大

黃牡三字據○脈經補甚者腹張腫否矣腹大轉側聞水聲水即膿已或

遶齊生創○創見于外或膿從齊中出或大便出膿血膿成自溢十

七字據○脈洪數者而營氣腐膿已成不可下也下膿已傷氣血不可再

謂雖下之○大黃牡丹湯主之熱桃仁行瘀丹皮逐血去芒硝泄

亦不能消○大黃牡丹湯主之熱桃仁行瘀丹皮逐血去芒硝泄

火瓜子主潰膿血尤云腸癰已成未成皆得主之故方下云有膿當

去其膿若自溢出者用之徒虛虛耳

右一章四節首言腸癰初起之證二三節以脈辨其膿之已

成未成以定可下與不可下四節乃出大黃牡丹湯

【憑脈申言腸癰有膿及為瘀血法一章】

問曰官羽林婦病官其姓羽林蓋其名也醫脈之何以知為腸中有膿下之

則愈此亦謂膿而未溢出者而師曰「寸口」脈「滑而數」滑為實實血實數為熱熱氣

滑為營數為衛言血實而氣熱也兩句不能包括故長言之衛數下降營滑上升營衛

相干血為濁敗少腹否堅見前小便或瀦即前小便數如淋或時汗出見前

金二十三時字作復或復惡寒見前膿為已成成而未溢故下之則愈○設脈遲緊即為

瘀血亦即前章膿未成證○下之則愈此總言○據脈經八補

右總言腸癰有膿及為瘀血者皆當下

【鼠乳】蒙肺癰次之鼠乳病詳見病源

跌陽脈千金肺臧脈論作大陽脈浮緩○少陰微緊微為血虛緊為微寒此為

鼠乳其病屬肺據脈經六補

右跌陽太谿合診以明鼠乳之法

【癰創雜病】

【癰腫】蒙腸癰次之 [金匱出第十八篇]

【論腫初起有膿無膿看法五章】

依脈經次脈

諸脈

統寸口人迎少陰言

浮數

○浮數為熱八脈象主病之常

應當發熱而〔反〕

灑淅惡寒

謂癰證初起有似

○金匱無大

陽麻黃證也辨脈篇無應字依脈經

應當發熱而〔反〕

兩存之反字據

若有痛處

與偏身一處痛此同成云其

當發其癰揚

俊曰氣行乃發為癰

是所謂營氣不從逆于肉理乃生癰疽陽氣有餘言

當發其癰揚

消之散也○辨

飲食如常者

言不飲傷寒也

畜積有膿也

則寒熱退故飲

食如常傷寒將成必由氣血有以提化故以飲食為

畜積有膿也

辨也程應旄曰飲食證似傷寒設不於若有氣血處飲食如常故以證參酌

發癰均膿也○辨脈篇有之

右言癰證初起有似傷寒但以痛着一處為異下節言飲食

如常者為膿已成

脈微而遲必發熱若不發熱則為病弱而數為振寒初起脈證均

似大陽此言證似大陽而脈亦有時不當發癰腫據脈經

右言癰證初起又有證似傷寒而脈不應者

脈浮而數似太陽傷寒身體無熱非太陽證矣其形默默胸中微躁千金十二作

胃中不知痛處當發癰腫據脈經

右言癰證初起又有無熱而微躁并不知痛處者

脈滑而數滑為實數為熱滑為營數為衛四句與腸營衛相逆

逆脈經作逢張柏枝云金匱作逆按今本金匱無此條又按脈經

八目錄下柏枝云此卷並出金匱要略而今不見金匱者甚多柏

校甚精當有所本也則結為癰熱之所過則為癰膿據脈經八補千金

右言癰證初起由血實氣熱而相逆癰之化膿則必得熱而

後成

〔師曰〕問詞諸癰腫欲知有膿與無膿○以手掩腫上掩猶按也○

傷寒雜病論章句 卷八 癰創雜病 古一中華書局聚

△熱者

尤云毒已聚

為有膿△不熱者

尤云毒不聚

為無膿也

周揚俊曰師之所以言此者蓋

已成欲托之起也

### 右專辨癰膿有無之法

### 【枳實芍藥散證一章】

癰膿枳〔實〕芍〔藥〕散主之

方在治中輩○據金匱產後本方方下補用以破血中氣滯

### 右排膿之方

【浸淫創】

金匱出第十八篇

### 【論浸淫創生死法一章】

浸淫創

尤云創之浸淫不已者外臺所謂轉廣有汗流遠周身者也○冒下二證

○從口起

起字據脈經八補口當作

中退然注中身也

流向四服者可治

謂從身起浸淫及四

○從四

肌流來入口者不可治

從四肌起浸淫及身者為重謂其毒歸心腹也

### 【浸淫創外摻法一章】

〔浸淫創〕黃連粉主之

下方闕○不曰散而稱粉者據王不流方尤散云下云小創即粉之可知此為外摻方



即取黃連一味為粉粉之苦以燥溼寒  
以除熱也陳云甚者亦可內服之亦通

### 右黃連粉證

〔金創〕〔金匱〕出創癰腸癰浸淫十八今另立一部

問曰〔寸口〕脈微而濇氣血俱衰之候○法當亡血此亡血謂若汗

出汗亦津液也謂微濇主病應是二證必居其一設不汗出者云何不言設不亡血者正師

曰若身有創被刀器所傷金匱器作斧器亡血故也陳云血與汗皆陰也微

而氣無輔故微而又濇也且奪血者無汗此脈浮而不汗出之故也

### 右言金創有寸口微濇者由其病重

跌陽〔脈〕〔頤〕曰跌陽衝陽穴之用〔滑而緊〕滑者胃氣實緊者脾氣

彊言脾胃均無病成云跌陽之脈以侯脾胃滑則穀氣實是為胃實

緊非為持實擊彊擊猶搏也即實彊相搏互文謂如以堅痛還自傷

也言竟有痛處者則必所謂不外內因故曰痛還自傷謂即金創以手

把刀坐作創也把猶持也坐猶因也此言初病若日久則微濇也

傷寒雜病論章句 卷八 癰創雜病 五 中華書局聚

右言金創有跌陽滑緊如平人者由其病輕

〔病金創〕王不流行散主之

方在雜法○此即上證而出其方治也

概治金創也誤尤云此行氣血和陰陽之良齊按方下

○排膿散附

治中

及湯蒂鞏瓜

并主之

八字據此二方迺金創後欲須提膿者

右平列金創三方一王不流行散二排膿散三排膿湯

〔跌蹶〕

金匱出第十九篇

〔師曰〕

問詞

病跌蹶

陳云因

但能前不能卻者

陳云但能前曲也謂

能伸而不能屈內筋刺入二寸

刺入二寸

刺之筋所聚也

後卻按卻猶曲也謂

云禁不可刺也尤云人身經絡陽明行身之後大陽足傷

刺入二寸

刺之筋所聚也

後卻按卻猶曲也謂

也然大陽經甚多而必刺陽承筋間故刺之使大陽明大氣血相貫

刺入二寸

刺之筋所聚也

後卻按卻猶曲也謂

則前後

此大陽經傷也

右言跌蹶傷足足能伸不能屈者之刺

〔陽毒〕

出金匱陰陽毒二而陽毒實居前今依其次

【升麻鼈甲湯證一章】

陽毒之為病身重一要背痛  
二無要字煩悶不安三狂言或走或見

鬼四或吐血下利五其脈浮大數六面赤斑斑如錦紋七

咽喉痛八唾膿血九  
也注家多誤近世傷寒發斑證若色青黑便即陰毒

粒之大小者曰豆次曰麻謂其命似大麻子紋也次五日可治至七日不

可治也雖麻豆日數類以三發熱三日可出齊至三日收若至七日

而尙未透者是其人元氣已敗故主死也麻豆亦有一二日即收

見義非謂陽毒赤斑不見則身上已欲收矣皆有傷寒一二日便成陽

毒或服藥吐下後變成者言變成者由藥誤變成者有不由藥升麻

鼈甲湯主之方在雜法本此此升提之藥使斑透外臺引甄權名同麻

經而方中有梔子金匱原注甘草後湯無雄黃

【陰毒】出金匱陰陽毒

【升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒證一章】

陰毒之為病身重陽毒一同背疆痛陰毒背強腹中絞痛毒三所無咽喉

不利毒四即陽毒氣攻心心下堅疆煩悶不安短氣不得息陽毒六

則狂歐逆吐膿血脣青面黑八不赤僅發斑四肢厥冷九陽毒

其脈沈細緊數其脈浮大數以上無毒凝于內不能見出之候有似

少陰兼陽經病○金匱自身重以下四十一字甄權同身如被打

險惡矣○金匱作身痛如被杖咽以痛打傷上青也較陽毒為五日可

治五脈經作至七日不可治也此同或傷寒一二日便成陰毒或服藥

亦謂六七日以上至十日變成者此同陽毒○以上二升麻鼈甲湯

去雄黃蜀椒主之方在雜法此亦辛溫升散之齊去雄黃蜀椒

【蟲病】

【狐惑】出金匱仲景所言乃次狐惑通作狐蠶長者為蠶短者為狐惑

之亦名蠱者自殊不過借狐惑之名以嚴上下之辨耳尤云即

狐惑之為病病源二三病狀如傷寒字經八狀或因傷寒變成斯病字

據病默默欲眠目不得閉復與不能合證欲臥臥起不安尤云其躁擾之

陰熱證而實為蠶之亂其心也陳云蝕于咽喉為感蝕于肛陰為狐

蟲亂其情識而生疑惑望其文生訓陋蝕于咽喉為感蝕于肛陰為狐

字匱無咽並不欲飲食並字經補惡聞食臭尤云有似陽明實證而實也

為蟲之擾則其胃也陳云蟲聞食其面目乍赤乍白乍黑非傷寒矣然

變所蝕必者脈亦大且無定也軌云蟲之皆傷寒餘毒所結溼熱

時食于肛矣非也○外臺無目得字據下章疑脫病源三作字通作

### 右狐惑總證

### 【狐惑分治法一章】

蝕于上部其聲喝庚金匱原注喝崔注喝啞也廣蒼喝聲之幽也莊子桑

音沙去聲蓋同一聲變也所嫁切甘草寫心湯主之寒熱中氣運而也溼尤

熱自化又苦辛雜用足勝殺蟲之任陳云烏梅圓亦可消息用之○

脈經稱寫心湯疑是欲利其溼熱從大便出與猪苓散利其溼熱從

傷寒雜病論章句卷八 蟲病 七 中華書局聚

下而衝上按曰上節云蝕于肛外則知此就開闢而但以上下為界限  
咽喉肛陰而曰上節云蝕于肛外則知此就開闢而但以上下為界限  
各立一名故苦葎湯淹洗之在淹浸也○方蝕于肛外者一字雄黃

散熏之宜方在為梅輩○三方一服不宜于惑則一熏互詳其治非謂狐病不  
用雄黃三片稍置瓦瓶中炭火燒向肛熏之并服湯也按湯當即謂  
甘草寫心也尤云苦葎雄黃皆瀆燥殺蟲之品洗之熏之皆就其近

而治之耳○病源不出方  
結云此皆溼毒氣所為也

右言甘草寫心湯以治惑 苦葎洗雄黃熏以治狐

【狐惑膿成合治法一章】

其人章其人斥病狐惑者之入也金匱百合狐惑陰陽毒三證同篇此  
著落脈經分篇同但首陰陽毒次百合病次狐惑此章脈數無熱云

置篇末顯然屬狐惑言○外臺二引仲景亦作其人章脈數無熱云

無熱汗出微煩然病與脈不相應也默默欲臥尤云以上汗出△初得之  
病不在表微煩然病與脈不相應也默默欲臥尤云以上汗出△初得之

外臺無三四日目赤如鳩眼而無乍變之色△得之七八日目四皆  
初字無三四日目赤如鳩眼而無乍變之色△得之七八日目四皆

黃黑黃一字無○若能食者能前云不欲食今此膿已成也生肌又有餘熱  
故成膿李杲曰膿成何處是大率在喉與陰肛赤〔小〕豆當歸散主之

蓋積熱生蟲亦積熱成膿是亦惡創之類也赤〔小〕豆當歸散主之



方在當歸輩○此用以呼膿生肌與用治  
下血方同義異唐云赤豆發芽則能排膿

### 右赤〔小〕豆當歸散證

### 【狐惑浸淫合治法一章】

病人先有溼熱或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰李彬曰竅陰者關此則謂

所通津液滋潤之處故蟲每蝕于此○按上章乃內生之蟲此則謂  
外來之微蟲也但以從呼吸入者食其咽從下焦入者蝕其肛各隨

溼熱之所聚○蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之方在五

趙云以利溼熱也○〔此章  
據金匱衍義引脈經補〕

### 右猪苓散證以上四章 脈經次同

【蚘蟲】金匱出第十九  
篇并依其次

### 【蚘病脈法一章】

問曰〔病〕腹痛有蟲其脈何以別之師曰腹痛其脈當沈若弦句謂

多屬虛寒寒則脈沈虛則脾胃弱而肝木有時起時止者不同沈則弦若

有實熱而痛者則皆驟然而起與蟲病之時起時止者不同自不在  
此例而反洪大證與厥陰故知有蚘也實熱腹痛兼下章諸證如吐涎

傷寒雜病論章句 卷八 蟲病 六八 中華書局聚

心痛發作有時乃能無疑耳尤怡說

### 【甘草粉蜜湯證一章】

蚘蟲之為病令人吐涎尤云吐出清水也李杲曰靈樞云蚘心痛云

痛如咬也時上下故云痛發作有時尤云求食則痛復發徐彬曰發作

有時謂不恆痛也則與虛毒藥不能止者此不必先以別項殺蟲藥攻

寒藥逐積之藥俱治不應矣甘草粉蜜湯主之方在烏梅輩之尤云折

食甘味既盡毒性能殺三蟲而雜于甘草白蜜之中誘使蟲

### 右殺蟲之方

蚘厥者舊有人當吐蚘今病者靜而復時煩此為臧寒蚘上入鬲故煩

須臾復止得食而歐又煩者蚘聞食臭出其人自當吐蚘蚘厥者烏

梅丸主之在厥陰中

### 傷寒雜病論章句卷八

珍做宋版印