





	一	二	三	四	漢書門
	八	六	二	九	
冊	架	函	號	類	

庫	文	閣	內
函	三	四	漢
七	八	九	書
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12439	
冊數	18	(8)
函號	301	.	48





百合病

似寒無寒似熱不熱欲食不食欲臥不臥欲行不行嘿嘿不知所苦如見鬼狀

小便赤病後失調攻下非法故成百合病通用小柴胡湯加百合而

陰陽易

男病新瘥女與之交曰陽易女病新瘥男與之交曰陰易細考之即女勞復也

有謂男病愈後因交而女病女病愈後因交而男病于理未然古今未嘗見此證也證狀體重

少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上冲通散取女入視襠近隱處剪燒灰水新瘥後大虛

調方寸七日三服女病用男視因交復作垂死獨參湯調燒視散多有古用鼠

糞寒者當歸白朮湯

醫宗必讀 卷之五 三十 傷寒

勞復

非但強力持重若梳洗
微勞及七情皆復也
脈虛者補中益氣湯麥門冬

挾外證者則謂之復非為也

食復

新瘥胃虛食稍多則
復羊肉及酒尤忌
腹滿脈實煩熱便秘

過經不解

十二日當愈不愈
則再傳是為過經潮熱者實也
消導後熱不退補中益氣湯

汗後不解

或表邪未盡或邪傳
裏或邪氣乘虛內客
汗後脈大如瘧

狀再汗之

麻黃湯
汗後心下痞鞭嘔吐不和大柴胡湯

大汗大渴煩而脈大白虎加人參湯汗後惡熱脈實調承氣湯

汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯

少與之若脈浮小便不利微熱消渴五苓散汗後

脈洪數煩渴五苓散汗後脹滿厚朴生薑人參湯汗過多

心悸發顫桂枝甘草湯汗後惡寒表虛也脈細神倦

附子湯芍藥甘草湯太陽汗出不解發熱心悸肉瞤真武湯

汗後身痛脈沉桂枝加芍藥人參湯汗後熱不去內拘急

四肢疼下利惡寒四逆湯汗後臍下悸欲作奔豚

桂枝其草
大棗湯

下後不解

下後熱不去心中結痛梔子下後心

煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯太陽桂枝證誤下之

利不止脉促喘而汗出表未解葛根湯黃芩湯陽明

下之心下懊憹梔子豉湯有燥屎大承氣湯太陽下後脉

促胸滿桂枝芍藥湯大下後脉沉遲厥逆下利咽喉

不利吐膿血難治麻黃升麻湯

合病

兩經三經齊病不傳者為合病三陽合病腹滿身重口中

不和譫語遺尿不可汗下白虎湯太陽陽明合病

脉浮長太便秘小便利脾約丸惡寒者不惡寒

反惡熱大便秘通者白虎湯大便喘而胸滿不可

下脉黃嘔不下利葛根加半夏湯太陽少陽合病脉浮

弦脇下鞭往來寒熱小柴胡湯自下利者黃芩湯嘔者

黃芩加半夏生薑湯少陽陽明合病脉弦長因發汗因利

小便胃中燥實調胃承氣湯脉長自利者為順滑而

數者為負有宿食大承氣湯負者尅賊也

併病

二經先病未盡又過一經之傳者為併病

或始則二陽合病後則一陽病衰一陽邪盛歸併于一經

太陽陽明併病太陽病發汗不

徹轉屬陽明續自微汗出不惡寒若面色怫鬱
痛無常處是陽明復併歸太陽當再汗之麻黃湯

太陽證未罷桂枝麻黃各半湯太陽證罷但見陽明證

者下之太陽氣湯太陽少陽併病頭痛眩胃心下

痞當刺肺俞肝俞大椎慎勿下太陽不勝陽明不負不

相尅為順少陽脉勝陽明脉負鬼賊相尅為

逆

兩感日傳二經陰陽俱病也表裏不可東垣以

氣實而感之淺者猶或可治本卷活湯

舌胎邪在表者舌上無胎半表半裏白胎而陽

明病勝下鞭滿而喘發熱汗出不大便而嘔舌

上白胎者小柴胡脉陰陽俱緊舌上滑胎小柴胡

加人參括蕪湯熱聚于胃則舌黃承氣湯舌純黑

有二種皆死證也有火極似水者為熱極大承氣湯

有水來尅火者為寒極脉證必寒附子理中湯七八

日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風舌燥欲

飲水數升白虎湯

瘧後昏沉因發汗不透餘毒在心胞絡也發汗出時蓋覆不周

則汗出不均腰背手足搐搦或冷或熱牛旁瘡根散後腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散


摘陶氏十法

發狂難制以醋炭氣入鼻即定方可察其陰陽初病起頭痛發熱傳裏時熱極發狂當下之初病起頭不痛身微熱面赤煩躁欲坐臥涼水中陰極似陽當溫之須察脉來有力無力此為良法

腹中痛甚將凉水一碗與病人飲之其痛稍減

者屬熱當涼之涼之不愈渴而大便實者下之若小腹痛大便黑小便利身目黃者畜血也行血藥下之若飲水痛增者屬寒當溫之須察脉來有力無力此為良法

寒證脉伏或吐瀉脫而無脉以薑汁好酒各半盞與病人服脉出者生不出者死更覆手取之而無脉則絕矣舌上有胎不拘何色用井水浸新青布拭淨後用生薑浸水刮之或以薄荷為末入蜜少許



刷牙擦之 若發黃者生薑渣周身擦之即退

鼻衄不止山梔炒黑為末吹入鼻中外用濕草紙搭于鼻冲其血自止

熱邪傳裏服藥後將鹽炒麩皮一升絹包于病人腹上熨之藥氣得熱則行大便易通

吐血不止韭汁磨墨呷之如無韭汁鷄子清亦可赤屬火黑屬水有相制之理也

陰毒昏不知人四肢如冰唇青甲黑藥不得入

將葱一握束縛切去根葉置白三寸如餅先

將麝香半分填于臍內後加葱餅于上以火

熨之爛即易約三餅後稍醒先灌薑汁後服

薑附湯如不醒再灸關元穴三十壯不醒者

必死

熱邪亢極黃連一兩煎水一碗放井中待冷浸

新青布搭胸上稍熱即易熱勢稍減即止夏

月方用此法

服藥即吐者將生薑汁半盞熱飲吐即止大

抵服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑温飲

傷寒死候 陽證見陰脉者死 陰陽毒過六七日

日者死 脉浮而滑身汗如油水漿不入喘息

不休身體不仁者死 咳逆上氣脉散者死

陽反獨雷體如烟薰直視搖頭心絕 汗出髮

潤而喘肺絕 唇吻反青四肢汗出肝絕 環

口黧黑虛寒發黃脾絕 脉緊盛汗出不解者

死 尺寸俱虛熱不止者死 身熱喘急脉陽

而躁者死 大發濕家汗則瘥熱而瘥者死

發少陽汗則譫語發少陰汗則動血謂之下厥

上竭者死 發動氣汗者死 發風温汗者死

發濕温汗曰重暍死 汗後不為汗衰謂之

陰陽交者死 不得汗者死 發熱脉躁疾狂

言不能食謂之三死 咳逆不止者死 藏結

者死 結胸證舌有白胎也 舌卷囊縮者死 脉代者死

少陰吐利煩躁四逆者死 結胸證悉具煩躁

者死 發厥至七八且膚冷而躁無時暫安曰

藏厥死 少陽與陽明合病脉長大而弦曰負

者死。陰陽易病，頭重眼花，四肢拘急，小腹絞痛，手足攣痛，離經脉見者死。厥而下利，當不能食，反能食者，除中死。少陰病，厥逆，無脉與白通，猪胆湯，脉暴出者死。脉陰陽俱虛，熱不止者死。七八日以上，大發熱者死。

脉候 浮濇而緊為傷寒。浮而緊者，表實可汗。

浮而緩弱者，表虛宜救。沉數或疾滑或沉實

裏實可下。沉細微遲軟裏虛可溫。中候而

數為胃實。中候而遲為胃虛。寸口沉細無

力為陽中伏陰。尺部沉數有力為陰中伏陽。

寸部數大有力為重陽。尺部遲細無力為

重陰。寸脉微細為脫陽。尺部無力為脫陰。

寸脉弱者忌吐。尺脉弱者忌下。純弦之

脉名曰負死脉也。陰病見陽脉者生。浮數動


陽病見陰脉者死。沉濇弱弦微結促濡
緩緊遲芤散革代

醫案

社友韓茂遠傷寒九日以來，口不能言，目不能視，體不能動，四肢俱冷，衆皆曰陰證。比余診之

六脉皆無以手按腹兩手護之眉皺作楚按其
跌陽大而有力乃知腹有燥屎也欲與大承氣
湯病家惶懼不敢進余曰吾郡能辨是證者惟
施笠澤耳延至診之與余言若合符節遂下之
得燥屎六七枚口能言體能動矣故按手不及
足者何以救此垂絕之證耶
休寧吳文哉傷寒煩躁面赤昏亂悶絕時索冷
水其弟日休乞余決死期手揚足擲難以候脉
五六人制之方得就診洪大無倫按之如絲余

曰浮大沉小陰證似陽也與附子理中湯當有
生理日休駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則
曰竹葉石膏今反用熱劑身乎敢余曰溫劑猶
生涼劑立斃矣日休上之吉遂用理中湯加人
參四錢附子一錢煎成入井冰冷與飲甫及一
時狂躁定矣再劑而神爽服參至五劑而安文
哉遺以書曰弟為俗子所誤既登鬼錄矣而兄
翁拯全之大奇亦大幸也方弟躁熱之時醫以
三黃湯入牛黃服之轉加悶絕舉室哀號惟是




沿終其候目瞑而已不意兄翁毅然以為可活
參附一投陰霜見現荆妻稚子含淚歡呼一日
即甦經年乃復嗚呼父母生乏兄翁再生之吳
天罔極莫可云喻敢誌巔末今附案帙俾天下
萬世知藥不可以浪投命不可以輕弃何莫非
大仁人回春之澤哉

同社王月懷傷寒至五日下利不止懊懣目脹
諸藥不效有以山藥茯苓與之慮其瀉脫也余
診之六脉沉數按其臍則痛此協熱自利中有

結糞小承氣倍大黃服之果得結糞數枚利遂
止懊懣遂安

婁水張爾和傷寒第二日頭痛發熱正在太陽
余日方今正月天令猶寒必服麻黃兩日愈矣
若服冲和湯不惟不得汗即使得汗必致傳經
遂以麻黃湯熱飲之更以滾水入浴桶置床下
薰之得汗如雨密覆半日易被神已爽矣至晚
索粥家人不與余曰邪已解矣必不傳裏食粥
何妨至明日果愈不以麻黃汗之傳變深重非



半月不安也

光祿卿吳玄水太楊歸頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語言謔妄有云表裏俱有邪宜以大柴胡下之余曰此三陽合病也誤下之決不可救乃以白虎湯連進兩服諸證漸減更加天花粉麥門冬二劑而安

縣學師楊龍友如夫人發熱頭疼六日後忽見紅癩衆皆以爲發斑用升麻犀角等湯凡五日不效余視之曰此癩也非斑也斑爲陽明火毒

癩爲太陰風熱一表一裏如天與淵乃用防風二錢黃芩一錢甘草五分薄荷桔梗蟬殼各一錢四劑霍然矣

儒者吳君明傷寒六日譫語狂笑頭痛有汗大便不通小便自利衆議承氣湯下之余診其脉浮而大因思仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱小便清知不在裏仍在表也方今仲冬宜與桂枝湯衆皆咋舌掩口謗之甚力以譫狂爲陽盛桂枝入口必斃矣余曰汗多神昏故發譫

妄雖不大便腹無所苦和其營衛必自愈耳遂
違眾用之及夜而笑語皆止明日大便自通故
夫病變多端不可膠執向使狐疑而用下藥其
可活乎
內戚顧淡之勞神之後煩躁大熱頭痛時作時
止醫者禁其飲食與之解表見四日熱不退欲
與攻裏余診之曰脉不浮緊安得表耶又不沉
實安得裏耶惟心部大而濇此勞心而虛煩乃
類傷寒非真傷寒也若禁飲食即餓絕矣便以

粥與之兼進歸脾湯五日而安

傷寒諸劑

麻黃湯 治太陽經脉浮緊頭痛身疼發熱惡

寒無汗而喘

麻黃 二錢 去根節 桂枝 一錢 甘草 五分

杏仁 八枚 去皮尖炒

水盞半加生薑三片棗一枚煎八分熱服

桂枝湯 治太陽中風發熱汗出鼻鳴乾嘔

桂枝 一錢 芍藥 一錢 甘草 一錢

水盞半生薑五片大棗三枚煎八分温服

大青龍湯 治傷寒中風頭痛發熱無汗煩躁

麻黃 三錢 去節 桂枝 一錢 杏仁 五枚 去皮尖炒

甘草 四錢 石膏 三錢

水鍾半生薑一錢棗一枚煎八分温服

小青龍湯 治表不解有水氣發熱嘔欬或渴

或利或小便利小腹滿而喘

麻黃 桂枝 芍藥 各一錢

甘草 五分 乾薑 細辛 各五分

五味子 十粒 半夏 一錢 煎

水二鍾煎八分服

桂枝麻黃各半湯 治太陽脉浮緩無汗身疼

桂枝 五錢 芍藥 甘草

麻黃 各三錢 杏仁 三十個 去皮尖

水四鍾生薑三錢大棗四枚煎二鍾分三服

麻黃升麻湯 治太陽後脉沉遲尺脉不至咽喉不利厥逆泄利不止

麻黃 八錢 升麻 當歸 各四錢

知母 去毛 黃芩 炒 萎蕤 各二錢

石膏 白朮炒黃 芍藥

天門冬去心 桂枝 茯苓去皮

甘草 乾薑各一錢

水四鍾煎二鍾分三服

麻黃連翹赤小豆湯治疹熱在裏身目發黃中濕身痛

麻黃去根 連翹 甘草各四錢

栳白皮蜜炙 赤豆各一兩二錢 杏仁三十個

水四鍾生薑七錢大棗八枚煎二鍾分三服

桂枝甘草湯治發汗過多入于胃心下悸欲得按

桂枝三錢 甘草一錢

水一鍾煎八分服

桂枝芍藥湯治脉浮腹痛

桂枝湯加芍藥一倍

桂枝附子湯治風濕身疼脉浮虛澹

桂枝湯加附子一錢

葛根湯治太陽無汗惡風太陽陽明合病

葛根一錢五分 麻黃一錢 桂枝

芍藥 甘草各六分

水二鍾生薑五片大棗二枚煎一鍾服

葛根葱白湯 治已汗未汗頭痛

葛根芍藥 知母 去毛

川芎 各一錢 生薑 二錢 葱白 五個

水二鍾煎一鍾熱服

葛根半夏湯

葛根湯加半夏 水煎服

小柴胡湯

治傷寒四五日往來寒熱胸滿心煩喜嘔少陽經發熱及風溫濕熱

柴胡 三錢 黃芩 炒 人參 去蘆

半夏 各一錢 甘草 五分

水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾熱服

柴胡桂枝湯

治風溫汗後身熱心下煩熱妨悶動氣

柴胡 二錢 桂枝 一錢 甘草 七分

人參 一錢 半夏 熟 芍藥 各七分

黃芩 一錢 生薑 五片

水二鍾棗二枚煎一杯溫服

柴胡桂枝乾薑湯

治往來寒熱胸脇滿小使不利嘔而不渴

柴胡 一錢 黃芩 桂枝

乾薑各八分 甘草五分 牡蠣七分

括蕪根一錢

水二鍾煎二鍾溫服

柴苓湯 治小便難微熱腹滿

小柴胡湯加茯苓水煎服

柴胡加桂湯 治身熱欲近衣身熱不渴

柴胡 黃芩 半夏各一錢 枳實一錢 芍藥一錢 甘草五分

肉桂各五分

水二鍾生薑三片大棗一枚煎二鍾服

五苓散 治小便不利而渴中暑煩躁霍亂

猪苓 澤瀉 白朮炒

茯苓各一錢 肉桂五分

右為細末每服二錢白湯調下

辰砂五苓散 治表裏未解頭痛發熱心胸鬱悶唇口乾焦任言見鬼小便閉

五苓散加辰砂研細水飛 白湯調服

小建中湯 傷寒三四日心悸而煩少陰惡寒手足踈而濕

桂枝一錢 芍藥二錢 甘草六分 生薑五片 大棗一枚

錫糖三匙

水鍾半煎入分納錫令化温服

黃耆建中湯 傷寒身痛汗後身痛脉弱宜服

小黃耆 一錢五分 芍藥 二錢 肉桂 一錢 去皮

甘草 六分 生薑 五片 棗 二枚

水二鍾煎一鍾去渣入錫一大匙煎一沸服

若微瀉利或嘔者不用錫

大柴胡湯 治身熱不惡寒反惡熱大便秘

柴胡 一錢二分 黃芩 各一錢

半夏 八分 大黃 七分 枳實 四分

水二鍾生薑三片棗一枚煎一鍾熱服

大承氣湯 治五六日不大便腹脹滿潮熱

水大黃 五錢 芒硝 四錢 厚朴 二錢 炒

枳實 一錢 炒

水二鍾先煎枳實至鍾半投大黃煎至一鍾

去渣納芒硝一沸熱服

小承氣湯 六七日不大便腹脹滿潮熱

大黃 四錢 厚朴 二錢 炒 枳實 一錢 炒

水二鍾煎一鍾熱服

調胃承氣湯

太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘澀語嘔逆宜服

大黃 六錢

酒洗

芒硝 四錢

各一錢

甘草 一錢

水鍾半煎八分去渣入硝一沸服

桃仁承氣湯

小腹急大便黑小便不利中焦積血也

桃仁 十箇

肉桂 去皮

甘草 各一錢

大黃 二錢

五分

芒硝 一錢

五分

水二鍾煎一鍾去渣入硝煎一沸熱服

梔子豉湯

治吐下後心中懊憹太下後身熱不去心中痛

肥梔子 四枚

香豉 五錢

水二鍾煎梔子至一鍾入豉煎至七分服

梔子厚朴湯

太陽下後腹痛起臥不安

梔子 五枚

厚朴 三錢

枳實 一錢

水二鍾煎一鍾溫服

猪苓湯

治嘔而渴心煩不得眠熱在下焦小便不利

猪苓 三錢

澤瀉 三錢

滑石 三錢

茯苓 三錢

阿膠 各一錢

五分

水二鍾煎一鍾入阿膠煎鎔溫服

黃芩湯

太陽少陽合病協熱下利



醫宗必讀 卷之五

黃芩 三錢 芍藥 各一錢 甘草 各一錢

水鍾半棗二枚煎一鍾熱服

黃芩芍藥湯 衄後脉微

黃芩湯 去大棗

黃芩半夏生薑湯 治乾嘔而利

水黃芩湯 加半夏生薑

黃連湯 治腹滿痛大便秘胸

黃連 甘草 乾薑 各五分

芍藥 各一錢 人參 半夏 各五分

大棗 一枚 桂 五分

水一鍾煎一鍾服

黃連阿膠湯 一名黃連雞子湯治温毒下利膿血少陰煩躁不得臥

黃連 二錢 阿膠 一錢 黃芩 一錢

芍藥 各一錢 雞子黃 一枚

水二鍾煎三物至一鍾去渣入膠煎一沸入

雞子黃勻服

黃連犀角湯 治狐惑

犀角 三錢 黃連 二錢 烏梅 四箇

醫宗必讀 卷之五 四八 傷寒

木香 三分 磨

水鍾半煎八分入犀角木香汁勻服

黃連解毒湯 治大熱乾嘔譫語呻吟不眠

黃連 三錢

黃芩

黃柏

梔子 各一錢

水二鍾煎一鍾熱服

黃連瀉心湯

黃連

生地

甘草 五分

知母 各一錢 五分

水鍾半煎八分服

升麻湯 治無汗而喘小便不利而煩渴

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃 各一錢

黃芩

大青 各七分

石膏 一錢

淡竹葉 十片

水二鍾煎一鍾熱服

升麻葛根湯 治無汗惡寒發斑小兒瘡疹疫癘通用

升麻

葛根

芍藥

甘草 等分

水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多温服

升麻六物湯 治赤班口瘡赤爛

升麻 各一錢 大青 五分

水杏仁 黃芩 各錢

水鍾半葱白三莖煎八分温服

陽毒升麻湯 治陽毒赤班狂言吐膿血

升麻 一錢 犀角 磨 射干

黃芩 人參 甘草 各八分

水鍾半煎八分入犀角汁服

玄參升麻湯 治咽痛發班

玄參 升麻 各一錢 甘草 八分

水鍾半煎八分温服

白虎湯 治汗後脉洪大而渴虛煩中暈

知母 三錢 石膏 五錢 甘草 一錢

粳米 一撮

水二鍾煎一鍾温服

白虎人參湯 治赤班口燥煩渴中暈

白虎湯 加入人參

竹葉石膏湯

治陽明汗多而渴，身熱而渴，欲飲水，水入即吐，瘧後渴多。

竹葉

十四片

麥門冬

人參

各一錢

甘草

四分

石膏

半夏

八分

粳米

一担

水二鍾煎一鍾去渣入生薑汁一匙服

茵陳湯

治頭汗出欲發黃

茵陳蒿

二錢

大黃

二錢

梔子

三枚

水二鍾煎一鍾服

茵陳五苓散

頭汗出發黃，秋疫癘及黃疸

茵陳

三錢

五苓散

二錢

每服二錢米湯調服

茵陳四逆湯

治陰黃四肢厥冷

茵陳

一錢

甘草

炙一錢五分

附子

一錢

乾薑

炮一錢五分

水煎溫服

大陷胸湯

治大結胸，手不可按，此藥極峻，不可輕用。

大黃

四錢

芒硝

三錢

甘遂末

二錢

水二鍾煎一鍾入硝煎一沸入甘遂末服

小陷胸湯 治小結胸

黃連 一錢 半夏 三錢

水二鍾煎一鍾服

抵當湯 治血結胸 腹滿 欲飲 水不欲飲

水蛭 各十枚 蟅蟲 各十枚

大黃 八錢

水二鍾煎一鍾熱服

小半夏湯 治水結胸

半夏 四錢 白茯苓 二錢

括蕓實 二錢

桃仁 十枚

水二鍾煎一鍾入薑汁熱服

半夏瀉心湯

半夏 一錢 黃連 五分 人參

甘草 乾薑 各

水鍾半薑五片棗五枚煎入分溫服

半夏生薑湯 治欬逆水穀不下而嘔吐

半夏 五錢 生薑 一兩 水煎服

半夏桂枝湯 治非時暴寒伏于少陰脈 微弱次必下利一名腎寒

半夏 桂枝 甘草 各三錢

水鍾半生薑五片煎八分服

厚朴半夏甘草人參湯

厚朴

半夏

各一錢

甘草

人參

各五分

水鍾半薑五片煎八分服

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

加甘草

生薑瀉心湯

治下痢心下痞腹中雷鳴

甘草瀉心湯

減甘草一兩加生薑一倍

赤茯苓湯

治厥陰消渴氣上冲吐下後身振搖肉惕

赤茯苓

陳皮

人參

各一錢

白朮

川芎

半夏

各六分

水鍾半煎八分溫服

茯苓甘草湯

茯苓三錢

桂枝

各二錢

甘草

一錢

水鍾半生薑五片煎八分服

茯苓桂枝白朮湯

茯苓三錢

桂枝

各一錢五分

甘草

白朮 各一錢

水二鍾煎一鍾温服

四逆湯 治太陰自利不渴 陰證脉沉身痛

附子 三錢

甘草

乾薑 各一錢五分

水鍾半煎八分服

當歸 四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛 各一錢

甘草

通草 各七分

水鍾半大棗三枚煎七分服

通脉四逆湯 厥逆下利脉不至

四逆湯 加甘草一倍

真武湯 治陰證脉沉身痛少 陰腹痛小便不利

附子 三錢

生薑 五錢

白朮 一錢

茯苓 各一錢

芍藥 各一錢

水三鍾煎鍾半分二服

附子湯 治陰證脉沉身痛少 陰背惡寒口中和

附子 二錢

人參

白朮

茯苓 各一錢

芍藥 各一錢

水二鍾煎一鍾分二服

甘草附子湯 風濕小便不利大便反快

甘草 炙 附子 各一錢 白朮

桂枝 各一錢 五分

水二鍾煎一鍾溫服

甘草乾薑湯 少陰小便色白吐逆而渴動氣 下之反刺身雖有熱反欲蹶臥

甘草 二錢 乾薑 一錢 水煎服

理中湯 治大陰自利不渴痰多而嘔腹痛霍亂

人參 白朮 乾薑 各一錢

甘草 八分

水二鍾煎一鍾服腹痛甚加附子寒而吐者

加生薑小便不利加茯苓腎氣動者去朮

附子防風湯

附子 防風 柴胡 各八分

白朮 一錢 桂心 茯苓

乾薑 各五分 五味子 甘草 四分

生薑 五片

水鍾半煎八分服

芍藥甘草附子湯 汗下後惡寒

芍藥 甘草 附子 各二錢

水二鍾煎八分服

霹靂散 陰盛陽身冷脉浮煩躁欲水

附子 一隻 用冷灰埋之取出細研入真臘

茶一錢同研分二服每服水一鍾煎六分入

蜜一匙冷服

白通湯 少陰下利

葱白 二莖 附子 三錢 乾薑 一錢五分

水鍾半煎七分服

正陽散 陰毒面青四肢厥冷

乾薑 五分 附子 一錢 甘草 五分

木麝 一分 皂莢 一分

為細末水一鍾煎五分服

枳實理中丸 治寒實結胸

枳實 十六枚 乾薑 白朮

甘草 人參 茯苓 各一兩

為末蜜丸彈子大熱湯化下連進二三服

乾薑附子湯 正後復發汗晝夜不得眠無表證脉微

乾薑 二錢 附子 三錢 水煎服

乾薑黃芩黃連人參湯 寒氣內格食入即吐

乾薑 黃芩 黃連 人參 等分

水鍾半煎八分服

脾約丸 津少大便秘

大黃 枳實 厚朴 水白芍藥 各五錢 麻子仁 一兩 杏仁 三錢

為末蜜丸桐子大每服三十丸溫水下

金匱風引湯 大黃 乾薑 龍骨 各二兩 桂枝 甘草 牡蠣 各一兩 凝水石 滑石 赤石脂 白石脂 石膏 紫石英 各三兩

為粗末以麝盛之取三指一撮井水二鍾煎一鍾去渣服

百合地黄湯 治百合病

百合 七枚

生地黄汁 一鍾

先以水洗百合漬一宿洗去白沫別以水二

鍾煎取一鍾入地黄汁下沸分二服

犀角地黄湯 蚘後脉微發狂發黃失汗成癩血大便黑漱水不欲嚥

犀角 一錢
生地黄 四錢
牡丹皮

芍藥 各一錢

水鍾半煎八分入犀角服

大青四物湯 一名阿膠 治赤斑

大青
阿膠
甘草 各一錢

豉 三錢

水鍾半煎八分入阿膠候鎔溫服

黑膏 治溫毒發斑嘔逆使毒從皮中出

生地黄 二兩 好豉 一兩

猪膏十兩合露之煎令三分減絞去渣入

雄黃麝香如豆大攪和分三服忌蕪荑

紫雪 脚氣及暑中三陽所患必熱煩躁發斑

升麻 六錢
黃金 十兩
寒水石

石膏 各四兩
犀角 各一兩
羚羊角 各一兩

傷寒

玄參 一兩 六錢 沉香 木香

丁香 各五錢 甘草 八錢

水五鍾煮金至三鍾去金入諸藥再煎至一碗去渣投朴硝三兩二錢微火煎柳條勿停手攪候欲凝入盆中更下硃砂麝香各三錢急攪令勻候冷凝成雪每服一錢細細嚙之吳茱萸湯 嘔胸滿吐利手足厥冷煩躁欲死 吳茱萸 生薑 各三錢 人參 一錢 水鍾半棗一枚煎一鍾服

甘桔湯 少陰咽痛

桔梗 三錢 甘草 二錢

水鍾半煎八分服

枳桔湯 痞證胸滿不痛

枳殼 各三錢 水煎熱服

防風白朮牡蠣散

防風 白朮 牡蠣 等分

為末每服二錢米飲調服汗出服小建中湯

五積散 治感冒脚氣食積心腹滿痛嘔吐背項拘急

川芎 蒼朮 桔梗

橘皮 枳殼 白芷

官桂 人參 厚朴

芍藥 茯苓 當歸

乾薑 麻黃 半夏

甘草 炙五分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分服

十棗湯 痞硬脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒

芫花 甘遂 大戟 各等分

水鍾半先煎大棗十枚取八分入藥末七分

平且溫服若病不除再服五分

桃花湯 少陰下利膿血并溫青下利

赤石脂 糯米 三合

乾薑 三錢

水二鍾煮米令熟去渣溫服一鍾入赤石脂

末方寸七日三服愈止服

冲和湯 即丸味羌活湯治傷寒兩感

羌活 防風 蒼朮 各一錢

甘草

白芷

川芎

生地黄

黃芩

細辛

水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾熱服取汗有

汗者去蒼朮加白朮渴加葛根石膏

柿蒂湯

柿蒂

丁香

水鍾半薑五片煎八分服

烏梅丸 治蛇厥

烏梅

細辛

附子

人參

栢皮

桂枝

乾薑

黃連

蜀椒

當歸

此十味各搗末以苦酒漬烏梅一宿去核薰之
五升米飯在下飯熟搗梅成泥和勻諸藥蜜
丸桐子大米飲下十九漸加至二十九忌生

冷滑物

牛旁根湯

汗不流是汗出時蓋覆
不密故腰背手足搖擻

牛旁根

麻黃

牛膝

天南星 各六錢

為未好酒一升同研以新布濾取汁用炭火半秤燒一地坑通赤去火令淨投藥汁在坑內燒令黑色取出細研每酒調服五分且三服

地榆散 傷寒熱毒不解晚即壯熱腹痛便膿血

地榆 犀角 黃連

茜根 黃芩 梔子仁 各八分

水二鍾韭白五莖煎一鍾服

酸棗仁湯 汗下後晝夜不得眠

酸棗仁 炒 甘草 知母

麥門冬 各一錢 茯苓 川芎 各六分

大麥乾薑 三分 水煎服

茅花湯 臭血不止

茅花 一握無葉 水三鍾煎鍾半分一服

栝皮湯 熱毒入深吐血

栝皮 三錢 黃連 黃芩 各一錢一分

水二鍾煎一鍾去渣入阿膠候饒服

麥門冬湯

麥門冬

甘草 各二錢 五分

粳米湯 鍾半 棗二枚 竹葉十五片 煎八分服

小續命湯

方見中風

黑錫丹

方見眩暈

大秦芫湯

方見中風

補中益氣湯

方見類中風

藿香正氣散

方見類中風

萎蕤湯

治風溫冬溫春月傷寒

萎蕤

石膏 各一錢

麻黃

白薇

羌活

杏仁

甘草

川芎

各六分

青木香

五分

乾葛

一錢

水煎服

牡蠣澤瀉湯

瘥後從股以下有水氣

牡蠣

澤瀉

蜀漆

商陸

葶藶

海藻

瓜蒌根

各等分

為末米飲調服

猪膚湯

少陰下利咽痛胸滿而煩

猪膚 五兩

水四鍾煎一錢加白蜜十匙白粉二合蒸香和令得所分二服

猪膽鷄子湯 傷寒五六日出班

猪膽 二三箇 鷄子 一枚 苦酒 十匙

和勻煎三沸服

驚甲散 傷寒八九日不瘥諸藥不效各壞傷寒

驚甲 升麻 前胡

烏梅 黃芩 犀角

枳實 各七分 生地黄 一錢 甘草 五分

水鍾半煎八分服

白頭翁湯 協熱而利渴而下利

白頭翁 黃栢 秦皮

黃連 各一錢五分

水鍾半煎八分服

赤石脂禹餘糧湯 痞而下利不止當治下焦

赤石脂 禹餘糧 各三錢 水煎服

葶藶苦酒湯 發狂煩躁面赤咽痛

葶藶 苦酒 大下傷血發熱脉澀

葶藶散 五錢 苦酒 一碗半 艾汁 半碗

煎取七分作三服

治蟹桃仁湯 傷寒失汗變成狐惑唇口生瘡聲啞不出

桃仁 槐子 艾 各三錢

水二鍾棗十箇煎一鍾分一服

雄黃銳散 狐惑唇瘡聲啞

雄黃 桃仁 苦參

青箱子 黃連 等分

為末艾汁為丸如小指尖大綿裹內下部中

猴鼠糞湯 男女陰陽易

韭根 猴鼠糞 十四枚兩頭尖者是

水鍾半煎七分去渣再煎一二沸溫服

安神丸 方見驚悸

瓜蒂散 寸脈大胸滿多痰有涎病頭痛

瓜蒂 赤小豆 各等分

二味別搗篩為末合和以水二鍾煮香豉一

合作稀粥去渣取三分之一和散一錢頓服

之如未吐少少又加



大羌活湯 治兩感元氣實感之輕者可活

防風 羌活 獨活

防已 黃芩 黃連

蒼朮 白朮 甘草

細辛 知母 川芎

生地黄

每服五錢水二鍾煎一鍾熟飲之未愈連服

三四劑若有他證遵仲景法

辟邪丸 服此雖與病人同床合被亦不能傳染也

雄黃 一兩 丹參 鬼箭羽

赤小豆 各二兩

右爲末蜜丸桐子大空心溫水下五丸

大...

...

...

...

...

...

次... 未... 大...

...

...

...

...

陸...

