

醫方類聚卷之五十

傷寒門 二十四

聖惠方 五

治傷寒陰陽易諸方

夫傷寒後有陰易陽易病者皆是病新差未  
 滿百日體力尚虛乖於將攝女人即名為陰  
 易丈夫即名為陽易筋脉拘急手足  
 皆拳若得斯疾即須急治若稍失治當為必  
 烈之病也



治傷寒病差後陰陽易勞復如初宜服葛根散方

葛根一兩生乾地黄一兩生薑一兩麥門冬一兩

去一兩心葱白二七豉二合勞水五升此水以約

水曰勞

右件藥細剉和勻每服半兩以勞水一大  
煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後陰陽易病乍寒乍熱發作有時宜服地骨皮散方

地骨皮半兩知母三分冬二分淡竹瀝半合

白蜜兩半

右件藥細剉用水二大盞半煎至一盞半  
去滓入蜜竹瀝攪令勻分爲五服不計時  
候溫服

治傷寒後未平復陰陽交合變成易病身體  
大熱氣衝胃背手足拳攣方

乾薑壹兩炮丹參壹兩甘草壹兩炙

右件藥搗篩爲散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後陰陽易小腹硬卵縮疔痛宜服知母散方

知母三分柴胡三分麥門冬一兩去心焙二木

香一分甘草一分微赤判

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一中

盞煎至五分去滓入生地黄汁少半合更

煎一兩沸不計時候溫服

治傷寒後未平復合陰陽為易病氣欲絕宜

服荆芥散方

荆芥一分雞臍脰一分桑螵蛸二十枚葱白七

薑一分鼠一枚燒為灰別細研薤白二法薑半性白

宜右件藥細判和勻分為五服每服以水一

命大盞煎至五分去滓入鼠灰末半錢攪令

勻不計時候溫服

治傷寒後氣血未平復合陰陽成陰陽易病

者即小腹拘急陰腫身體熱毒氣衝心胃頭

重不能舉宜服葳蕤散方

歲蕤一兩桂心半兩木香分雄鼠糞叁枚荊芥

兩半

右件藥剉和勻分爲五服每服以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後陰陽易小腹急痛陰腫四肢乏力

宜服附子散方

附子一兩炮裂細辛叁分乾薑半兩炮裂白朮

半兩甘草半兩炙藁香子半兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後未平復合陰陽爲易病小腹裏急

疝痛溺血氣力乏劣宜服當歸散方

當歸一兩剉梔子一兩木香半兩犀角屑半兩

豉一分黃耆剉枳殼半兩麩炒

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞

入生薑半分葱白三莖煎至五分去滓不

計時候溫服

治傷寒後真氣尚虛因合陰陽致小腹拘急  
便溺澀痛宜服大腹子散方

大腹子兩壹木香兩壹當歸半兩剉芎藭兩半蘆

麥兩半柴胡兩壹去苗

右件藥搗篩為散每服四錢用水一中盞  
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫  
服

治傷寒後陰陽易頭重百節解痛翕翕氣劣  
着牀不能起動甚者手足拳卵腫疼痛宜服

薤根散方

薤根兩二菰蘆根兩二青竹茹兩半乾薑兩半炮裂

右件藥細剉和勻分作八服每服以水一  
大盞煎至五分去滓入鼠糞末一字攪令  
勻不計時候溫服

治傷寒後味平復交合感陰陽易壯熱頭疼  
或鼻中出血宜服犀角散方

犀角屑兩一石膏兩三竹茹兩一葛根兩一丹參兩一  
右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後陰陽易壯熱心躁鼻衄不止生乾

地黃散方

生乾地黃兩二地骨皮兩半甘草叁分炙伏龍

肝兩一川朴兩半

若將藥擣麤羅為散每服五錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒後陰陽易小腹急脹卵縮小便不通

宜服柴胡散方

柴胡三分木香兩半當歸兩半木通叁分

紫蘇莖葉兩半竹茹兩半黃耆叁分

右件藥擣篩為散每服五錢用水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後百日内未平復合陰陽遂成陰陽

易病四肢厥冷心痛煩悶手足拘拳皆為難

治宜服附子散方

附子一兩炮裂乾薑兩半炮吳茱萸兩半

七遍焙桂心叁分白朮叁分細辛叁分木香叁分甘

草非兩炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒後陰陽易頭痛鼻衄不止宜服竹茹

散方

竹茹壹兩犀角屑叁分生乾地黄二兩甘草半兩

赤剉伏龍肝壹兩川朴消壹兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫溫頻服以

差為度

治傷寒後陰陽易四肢或寒或熱宜服白薇

丸方

白薇壹兩知母兩地骨皮兩生乾地黄兩麥

門冬一兩半焙甘草半兩炙蜀漆兩葳蕤兩

陳橘皮壹兩湯浸去白鄭焙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以粥飲下二十九

治傷寒病後陰易方

韭把一雄鼠糞七

七件藥以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服厚蓋汗出便愈

治傷寒後陰陽易陰腫腹中疔痛痛不可忍方

青竹茹兩一

右以水大盞煮取五分去滓不計時候熱服○王氏集驗方傷寒陽易方刮青竹皮一升水二升煮五沸去滓頓服

治傷寒後陰陽易陰腫腹中疔痛方

菡萏根兩一

右擣碎以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服得小便利為效

又方右剪女人手足爪二十枚燒灰研為末不計時候以溫酒服之差用粥飲調下亦得

治傷寒後陰陽易及勞復方

鼓一兩塗醋炙枳殼一兩麩炒



右件藥搗篩爲散每服五錢以水一中盞  
入牛薑半分煎至五分去滓不計時候熱  
服

治時氣一日諸方

夫時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首  
而主於頭項故得病一日頭項腰脊皆痛也  
治時氣一日頭痛壯熱四肢煩疼宜服解肌  
散方

麻黃一兩去根節 川升麻一兩 赤芍藥一兩 石膏一兩

貝齒三枚 甘草半兩炙 杏仁一兩湯浸去皮  
黃微赤剉 人尖雙 麩炒微

右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大  
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不  
計時候熱服衣覆取汗

治時氣一日頭痛壯熱骨節疼痛宜服桂枝  
散方

桂枝一分 黃芩一分 麻黃一分 石膏一分  
右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大

蓋人生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗

治時氣一日頭項腰脊痛惡寒宜服解表石膏散方

石膏二兩 豉二合 麻黃一兩去根節 葛根二兩 白朮

二兩 桂心一兩 白芷一兩 芎藭壹兩 當歸壹兩 炒

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

治時氣一日壯熱心神煩躁頭痛四肢不利宜服葛根散方

葛根壹兩 赤芍藥壹兩 麻黃壹兩去根節 大青半兩

甘草半兩炙 黃芩壹兩 石膏壹兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

治時氣一日頭痛壯熱方右取生葛根淨洗搗取汁一大盞內豉一合煎至六分去豉

本草綱目卷之五十一

九

頁卷五十一

不計時候分爲二服有汗卽差未得汗卽

再服若心中熱加梔子人十枚內葛根汁

中同煎去滓服之衛生易簡方同

治時氣一日初覺便宜發汗方

麻黃二兩去根節

右以水三大盞煮麻黃去沫取汁一盞牛

去滓後入米一匙豉汁二合煮爲稀粥不

計時候頓服衣覆取汗

治時氣二日諸方

夫時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脉

絡於鼻入於目故得病二日肉熱鼻乾不得

眠也夫諸陽在表表始受病故可摩膏火灸

發汗而愈也

治時氣二日頭痛壯熱宜服水解散方

麻黃二兩去根節 川大黃一兩剉微炒 黃芩一兩 桂心

一甘草一兩炙 赤芍藥一兩

右件藥擣細羅爲散每服不計時候以温

水調下二錢良久再服未服藥前先用熱

湯淋浴後便服此藥衣蓋取汗

治時氣二日壯熱頭疼宜服此方

甘草一兩炙生薑一分藟藟一顆大者取藟去子於椀內盛

右先將生薑甘草用無灰酒一大盞煎取六分去滓熱入藟藟椀中絞取汁不計時候分溫二服

治時氣二日壯熱增寒頭疼腰脊強重宜服

柴胡散方

柴胡一兩麻黃一分葛根一分桂心一分

甘草一分炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入豉五十粒薄荷二七葉煎至六分去滓不計時候先喫粥少許後以熱水淋浴然後服此藥衣覆取汗

治時氣二日頭痛背強身熱惡寒宜服梔子散方

梔子一兩黃芩一分石膏一分杏仁一分

人麩炒 葛根一兩 甘草半兩炙  
微黃 剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大  
盞入葱白一莖豉五十粒煎至五分去滓  
不計時候熱服衣覆取汗

治時氣二日頭痛背強心煩壯熱宜服葛根

散方

葛根壹兩 麻黃一兩 犀角屑壹兩  
根節 去

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候熱服

治時氣三日諸方

夫時氣病三日少陽受病少陽脉循於脇上  
於頸耳故得病三日胃脇熱而耳聾也三陽  
經絡始相傳病未入於藏故可汗而愈也  
治時氣三日頭疼壯熱心神煩壅胃膈 利

宜服柴胡散方

柴胡壹兩 甘草半兩炙 人參一兩 犀角壹兩  
去 蘆頭 去 麩 剉 麥門冬壹兩 半夏半兩 湯洗  
去滑

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計  
時候溫服

治時氣三日頭痛壯熱宜服葛根散方

葛根壹兩半剉麻黃壹兩半去根節赤芍藥壹兩黃芩壹兩  
石膏二兩桂心壹兩甘草壹兩炙杏仁壹兩湯  
尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候熱服衣覆取汗

治時氣三日表不解熱毒相傳或嘔或嗽解  
肌麻黃散方

黃麻一兩去根節赤芍藥壹兩桂心半兩甘草半兩  
剉細辛半兩杏仁參分湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
煎至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗

治時氣三日未解四肢疼痛心膈煩熱龜甲  
散方

類聚五十一  
十四

龜甲一兩塗醋炙麻黃一兩去根節桂心一兩赤

芍藥壹兩甘草壹兩炙葛根一兩剉枳殼一兩麩炒

微黃厚朴一兩去麩皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥都擣麤羅為散每服五錢以水一

中盞入豉五十粒煎至五分去滓不計時

候熟服續以葱粥投之汗出便愈若未汗

再服

治時氣三日頭痛煩熱宜服大黃散方

川大黃一兩剉秦艽一兩去苗桂心一兩石膏二兩

柴胡一兩甘草半兩炙

右件藥都擣麤羅為散每服四錢以水一

中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時

候溫服

又方右以皂莢燒作灰研羅為散每服不計

時候以新汲水一中盞生薑汁蜜各少許

相和調兩錢服之先用暖水淋浴後服此

藥須臾汗出愈

治時氣四日諸方

夫時氣病四日太陰受病太陰為三陰之首  
三日已後諸陽受病訖即傳之於陰太陰之  
脈主於喉咽故得病四日腹滿而咽乾其病  
在胃膈故可吐而愈也

治時氣四日身體壯熱四肢疼痛胃滿心煩  
宜服苦參湯吐之方

苦參一兩 烏梅七顆 鷄子壹枚  
梘碎 取清  
右二味先以醎醋一大盞煮至五分去滓  
下鷄子清攪令勻不計時候溫溫去沫服

之當吐出毒熱氣即愈

治時氣四日胃中痰壅增寒壯熱頭痛宜服  
桃柳心湯吐之方

桃心一握 柳心一握 甘草叁分 生烏梅五顆 梘  
子人叁分 用梘

右件藥以淡漿水一大盞煎至六分去滓  
不計時候溫服良久當吐未吐再服

治時氣四日胃膈煩滿壯熱宜吐之方

苦參壹兩



右以醋一大盞煎至五分去滓不計時候

温服良久當吐即愈備預百要方同○肘後方治

天行病王氏集驗方傷寒四五日結胃滿痛壯熱

身體熱衛生易簡方壯熱狂言苦參一兩易簡方剉

以醋二升煮取一升二合盡飲之當吐即

愈天行毒病非苦參醋藥不解及温覆取

汗愈

治時氣四日胃膈滿悶或時吐逆宜服葛根

散方

葛根壹兩剉甘草壹分炙川大黃半兩剉麥

門冬壹兩半去心人參壹兩去蘆頭

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候温服

治時氣四日曾經發汗不解寒熱無恒心中

躁悶宜服犀角散方

犀角屑壹兩麻黃半兩去根節木通半兩剉桂心半兩

川升麻半兩葛根半兩剉枳殼半兩微黃去瓢黃芩

兩柴胡壹兩去苗桃人半兩湯浸去皮尖甘草

類聚五十一

十一

半兩炙  
微赤判

右件藥搗篩為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣四日熱渴不已往來寒熱不能飲食宜服知母散方

知母壹兩枳實一兩炒微黃柴胡壹兩去苗兩梔子人壹兩

麥門冬壹兩地骨皮壹兩甘草半兩炙微赤判

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣五日諸方

夫時氣五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱舌乾渴而欲飲其病在腸巢氏病源在腹故可下而愈也

治時氣五日大熱三部脉悉洪數者可下之宜服大黃飲子方

川大黃壹兩半兩剉碎梔子人叁分枳殼半兩炙微黃

黃芩壹兩川朴壹兩甘草半兩炙微赤判

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大

類聚五十一

藥類全錄 卷之五十一

十一

蒸煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣五日熱毒不除心神煩悶大小腸秘

澀或時頭痛宜服柴胡散方

柴胡壹兩枳殼壹兩梔子壹兩黃芩壹兩

石膏壹兩大青壹兩麥門冬壹兩川芒消壹兩

川大黃壹兩甘草半兩

右件藥搗碎微炒為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣五日心腹壅悶骨節疼痛背膊煩熱

不下飲食宜服黃芩散方

黃芩壹兩梔子壹兩犀角屑壹兩赤芍藥壹兩柴

胡壹兩枳殼壹兩檳榔壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣五日頭痛壯食則嘔逆宜服竹茹飲

子方

竹茹半兩人參半兩蘆頭去蘆根半兩黃芩半兩梔子

人半兩

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大  
盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候  
温服

治時氣五日胃中壅悶或時譫語爲腸胃中  
有結燥宜服承氣湯方

川大黃一斤剉枳實半兩麩炒川朴消一厚

朴半兩去麩皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中  
盞煎取六分去滓不計時候温服以利爲

度

治時氣五日未解壯熱心穢煩躁宜服消毒  
散方

大青一斤梔子人兩葛根一兩川朴消一兩

右件藥搗麤羅爲散每服五錢用水一大  
盞入豉五十粒煎至五分去滓下地黃汁  
半合更煎三兩沸不計時候温服

治時氣六日諸方

夫時氣六日厥陰受病厥陰脉循陰絡於肝

類聚五十一  
二十一

故得病六日煩躁巢氏病源煩滿而陰縮也此為三陰三陽俱受其病毒氣入於腸胃故可下而愈也

治時氣六日壯熱骨節煩疼頭痛目眩心脇氣脹急硬不能飲食恐變為黃宜服柴胡散方

柴胡壹兩枳實壹兩黃芩壹兩芍藥壹兩甘草壹兩梔子壹兩茵陳壹兩白鮮皮壹兩川大黃壹兩煎至五分去滓不計時候溫服

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣六日熱毒不退心胃煩躁大小腸祕

澀不得眠臥宜服白鮮皮散方

白鮮皮壹兩黃芩壹兩柴胡壹兩大青壹兩麥門冬壹兩梔子壹兩羚羊角屑半兩川大黃二兩煎至五分去滓不計時候溫服

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

頁五十一  
二十一

類聚五十一

三十一

治時氣六日煩躁頭痛小便赤澀壅熱不退  
宜服粘羊角散方

粘羊角屑參分 川升麻參分 秦艽參分 木通參分

剉白鮮皮參分 檳榔壹兩 黃芩參分 麥門冬壹兩

焙川大黃壹兩 甘草半兩

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣六日頭痛壯熱心神煩亂積熱不散

或狂走不定宜服大青散方

大青壹兩 藍葉參分 川升麻參分 秦艽壹兩 菰蘆

根壹兩 川芒消壹兩 茵陳參分 梔子人兩 甘草

半兩炙 微赤剉

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至五分去滓入竹瀝半合不計時候

溫服

治時氣六日心胃結硬嘔吐不下飲食宜服

人參飲子方

人參壹兩 去蘆頭剉 生薑汁壹合 川芒消壹分 蜜壹合

頁五十一

右件藥以水一大盞先煎人參取汁五分  
去滓下鷄子清一枚及芒消薑汁蜜等攪  
令勻不計時候分温二服

治時氣七日諸方

夫時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸  
經傳病終故也今病不除者欲為再經病也  
再經病者謂經絡重受病也

治時氣七日心神恍惚煩躁壯熱不得眠卧  
宜服羚羊角散方

羚羊角屑半兩旋復花半兩枳殼半兩麩半兩炒前

胡蘆頭半兩去半兩川升麻半兩玄參半兩麥門冬半兩去心

焙赤芍藥半兩黃芩半兩地骨皮半兩茯苓半兩分甘

草半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中  
盞煎至六分去滓不計時候温服

治時氣七日有熱結在內雖得汗不解腹滿  
煩躁讖語宜服麥門冬散方

麥門冬二兩去心川升麻一兩地骨皮壹兩川大黃

類聚 卷之十 五十九

壹兩剉黃芩一兩前胡一兩去蘆頭赤茯苓壹兩陳

橘皮半兩湯浸去白枳殼半兩麩炒微黃去瓢

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣七日往來寒熱胃脇逆滿大腸祕澀

宜服大黃散方

川大黃壹兩剉甘草一兩炙赤剉川芒消壹兩桂

心壹兩桃人壹兩湯浸去皮麻黃壹兩去

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候  
溫服以利為度

治時氣七日心神煩熱胃膈不利目赤不得

睡固宜服羚羊角丸方

羚羊角屑壹兩黃芩壹兩梔子人壹兩黃連壹兩去鬚

川升麻壹兩枳殼壹兩麩炒微黃去瓢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以竹葉湯下三十九

治時氣八九日已上諸方



夫時氣病八九日已上不解者或是諸經絡重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未便相傳致使停滯累日病證不改皆當察其證候而治之也治時氣八九日不解心腹堅滿身體疼痛內外有熱煩嘔不安宜服前胡散方

前胡一兩去半夏壹兩湯洗枳殼叁分炒

去赤芍藥叁黃芩叁麥門冬一心

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣八九日煩躁壅悶喘麤方

桔梗壹兩去甘草叁分炙麻黃壹兩去

人壹兩湯浸去黃芩叁分麥門冬壹兩去

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣八九日骨熱四肢煩疼背膊勞悶手足無力不能飲食宜服柴胡散方

藥譜五十一

三十五

柴胡一兩黃耆一兩赤茯苓三分秦艽半兩

地骨皮半兩黃連三分葛根半兩枳殼半兩

微黃川大黃碎微炒甘草半兩鼈甲一兩

半塗醋炙  
黃去裙襴

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣八九日肢節疼痛熱毒不止乍寒乍

熱乍劇乍差發動如瘧宜服鼈甲散方

鼈甲二兩塗醋炙知母一兩黃芩一兩烏梅肉一兩

微黃去裙襴

一兩柴胡壹兩恒山一兩地骨皮一兩赤芍藥

壹兩牛膝壹兩甘草半兩炙微赤

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣八九日已後口乾狂言唯飲冷水宜

服黑奴丸方

麻黃一兩去川大黃碎微炒川朴消壹兩梁

上塵壹兩竈突墨壹兩釜底墨壹兩小麥壹兩令黃色

右件藥搗羅為散鍊蜜和丸如彈子大每

頭卷五十一

三十五

服不計時候以新汲水研下一丸服後更與新汲水任意飲之汗出爲效

### 時氣頭痛諸方

夫時氣三陽受病猶在於表邪毒之氣攻注於外循於風府而入於腦故令壯熱頭痛胃膈壅滯其脉浮數者可發汗及吐即愈也

治時氣頭痛壯熱宜服葛根散方

葛根

一兩

石膏

二兩

梔子

人兩

柴胡

壹兩

芍藥

一兩

甘草

半兩

炙

微赤

剉

散

右件藥搗篩爲散每服五錢以水一大盞入淡竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣頭痛不可忍者宜服淋頂湯方

石膏

十兩

梔子

人兩

竹葉

青握

甘菊花

參兩

心

參合

葱白

十四切

右件藥以水六大椀煮取三椀去滓內有甬瓶中稍熱淋注頂上

治時氣頭痛壯熱絕甚者宜服此方

類聚五十五

三

類聚五十一

三十一

石膏二兩 薺芫一兩 木通一兩 犀角屑壹兩 甘草半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣壯熱頭痛嘔吐不能飲食宜服前胡散方

前胡壹兩 去蘆頭 知母一兩 犀角屑一兩 葛根一兩 赤芍藥一兩 石膏二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片生薑半分葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣頭痛至甚及百骨節疼痛宜服菊花散方

甘菊花一兩 去根 麻黃一兩 去根 葛根一兩 黃芩一兩 羚羊角屑叁兩 玄參叁分 梔人子叁分 赤芍藥叁分 甘草叁分 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣二三日壯頭痛甚者宜服此方右以  
不艸阜莢一挺去皮子以濕紙裹煨令焦  
黑搗細羅爲散每服二錢以熱酒調下衣  
覆取汗仍先以白礬湯密室中浴後服之  
治時氣頭痛不止方

川朴消

二兩

右搗細羅爲散用生油調塗於頂上

又方右以梔子人搗羅爲散每服一錢以溫

水調下

又方右以冬瓜爛搗搗於疼痛處神效

又方石膏

五兩

右搗細羅爲散研令極細每服不計時候  
以臘面茶調下二錢

治時氣譫言諸方

夫時氣熱毒攻心則心神煩亂陽氣大盛遂  
則譫言目赤心煩不得睡臥精神驚悸言語  
失常毒氣不除腸中結燥其脉洪數者是其

候也

治時氣熱毒躁悶譫言口舌乾渴不止宜服

秦艽散方

秦艽三分 黃芩三分 木通三分 犀角屑三分 麥

門冬三分 玄參三分 赤芍藥一分 桔梗一分 蘆頭一分

藍葉三分 梔子人分 甘草一分 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣大熱悶亂譫語宜服白鮮皮散方

白鮮皮兩 犀角屑兩 川升麻兩 大青兩 甘

草壹兩 微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣譫語欲走方

生雞子白壹枚 川芒消壹兩 生甘草末壹錢

右件藥以井華水一中盞攪令勻吹去沫

不計時候服之

治時氣心膈大熱煩悶言語失度宜服生地

黃飲子方

生地黄

參兩

玄參

壹兩

赤茯苓

兩

麥門冬

二兩 去心

犀角屑

壹兩

甘草

半兩 炙 微赤判

右件藥都細判和勻每服半兩以水一大

盞煎至五分去滓不計時候温服

治時氣煩熱如火譫言欲走方

人參

壹兩 去蘆頭

打遂

壹兩 微黃

右件藥擣細羅為散每服一錢以新及水

調服須臾令病人多飲冷水得吐之為效

治時氣但譫言煩躁不安宜服猪苓散方

猪苓

叁分 去黑皮

白鮮皮

叁分

澤瀉

叁分

赤茯苓

叁分

人青

叁分

麥門冬

壹兩

心焙

川大黃

叁分

甘草

半兩

炙微赤判

右件藥擣細羅為散每服不計時候以新

汲水調下三錢

治時氣熱毒在藏譫語口乾煩躁宜服犀角

光方

犀角屑

一兩

梔子人

壹兩

川大黃

壹兩

判 微炒

甘草

參分大鐵粉壹兩馬牙消壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以溫竹葉湯下三十九

治時氣大熱不退譫語大便難大黃丸方

川大黃二兩到黃芩一兩犀角屑壹兩猪苓壹兩

去黑川朴消壹兩枳殼壹兩麩壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以麥門冬湯

溫溫下三十九

治時氣發狂諸方

夫時氣發狂者由熱毒氣盛則棄衣而走登

高而歌或不食數日踰垣上屋非是素所能

也病反能也皆陰陽氣爭外并於陽四肢者

諸陽之本也熱盛則四肢實實則能登高而

歌熱盛於身故棄衣而走狂言妄見妄聞皆

熱毒氣所為也

治時氣熱毒攻心面目俱赤發狂不識人宜

服梔子散方



梔子人壹兩 歲蕤壹兩 扶神壹兩 麥門冬壹兩 心壹兩 川

升麻壹兩 知母壹兩 犀角屑壹兩 沙參壹兩 頭壹兩 黃

芩壹兩 川大黃壹兩 碎壹兩 甘草壹兩 微赤壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣心神狂躁言語無度宜服此方

鷄子二枚 白蜜半合 生地黃汁壹合 川大黃兩半

判碎微炒 杵末

右件藥相和令勻頓服之以利為度

治時氣大熱心狂欲走宜服白鮮皮散方

白鮮皮一兩 大青三分 羚羊角屑三分 玄參三分

梔子人三分 子芩三分 川大黃三分 地骨皮三分

參甘草三分 微赤三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

又方麥門冬三兩 杏人二兩 湯浸去皮 炙廿

草一兩 赤白鮮皮二兩 生乾地黃二兩 黃芩壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒攻心言語不定心狂煩亂不得睡臥宜服犀角散方

犀角屑一兩龍齒壹兩子芩兩沙參壹兩蘆頭去枳

殼三分麩炒蕨蕤一兩麥門冬壹兩川升麻

微黃去赤茯苓一兩赤芍藥一兩大青叁分甘草叁分

兩杏仁壹兩湯浸去尖剉雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣發狂叫呼不識人宜服此方

黃連一兩秦艽壹兩梔子兩鐵粉二兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以新

汲水調下二錢

又方梔子半兩豉壹合葱白五莖

右件藥以水三大盞煎至一盞去滓分溫

二服

治時氣發狂方

寒水石兩一馬牙消兩壹

右件藥細研如麵不計時候以新汲水調

下一錢

又方秦艽半兩去苗大青半兩甘草半兩炙

右件藥擣細羅為散不計時候以生地黃

汁調下二錢

治時氣熱盛癩狂或時昏沉方

寒水石兩半朱砂壹分鈆霜壹分

右件藥都研如粉以軟飯和丸如梧桐子

大每服不計時候以溫水下十九

治時氣得汗後心神狂亂方

鐵粉兩半野豬糞兩半生地黃兩二燒灰

右件藥都細研為末以粟米飯和丸如梧

桐子大不計時候以人參湯下二十九

治時氣已得汗熱毒不解心煩躁悶言語不

定小便赤澀大便不通狂亂欲走宜服大黃

丸方

川大黃二兩剉碎黃芩半兩梔子人壹兩大

青兩龍膽一兩去蘆頭苦參壹兩川朴消兩

右件藥搗羅為末入朴消研勻鍊蜜和搗

三五百杵丸如梧桐子大不計時候以麥

門冬湯下三十九

治時氣熱毒心神煩躁狂亂欲走宜服鐵粉

丸方

鐵粉壹兩犀角屑兩朱砂半兩甘草一兩

用苦參壹兩川朴消壹兩

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大不計時候以人參湯下三

十九

又方右以藍靛半大匙衛生易簡方以新汲

水一盞調令勻頓服肘後方同

時氣發斑諸方

夫時氣在表已發汗未解或吐下後熱毒氣

不散煩躁謬語此為表虛裏實熱氣躁於外

故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥

令瘡開泄更增斑爛表虛故也

治時氣表裏不解熱毒在藏致發斑瘡宜服  
升麻散方

川升麻壹兩犀角屑一兩玄參壹兩秦艽兩子

芩一兩柴胡壹兩杏人一兩湯浸去尖甘草壹兩

草一兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

又方玄參壹兩川升麻壹兩甘草壹兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣壅毒不退發斑徧身煩熱大小便不

利直服羚羊角散方

羚羊角屑壹兩梔子一兩麥門冬一兩川升

麻一兩川大黃壹兩剉微炒玄參壹兩黃耆壹兩甘

草壹兩剉微赤赤芍藥壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治冬溫未即為病至夏得熱其冬溫毒氣始

出肌中斑爛瘰癧如錦文喘欬心悶嘔吐清涎宜服葛根散方

葛根壹兩 陳橘皮一兩湯浸 麻黃壹兩去根節

知母兩 黃芩兩 甘草壹兩炙 杏仁壹兩湯浸去皮

尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣赤斑瘡出後胃中惡熱瘡盛分

鷄子二兩 醖醋二合 猪膽汁壹合

右件藥相和煎十餘沸放溫不計時候分為三服

治時氣熱毒在藏腑欲發赤斑宜服此方

生地黄汁五合 鼓二合 麝香壹錢細研

右件藥於鍋中以成鍊了猪脂半斤相和

煎十餘沸濾去滓入麝香攪令勻每服二

合盡服之毒當從皮中汗出便愈

又方右以生蝦蟆一枚去腸肚爛研以水

大蓋絞取汁頓服之或五月五日午時收者燒灰細研冷水調服益佳

治時氣發豌豆瘡諸方

夫時氣豌豆瘡者是熱毒氣攻於藏腑餘氣流於肌肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘡其瘡所出如豌豆顆因以名之但以解熱毒之藥其瘡即止脉洪數者是其候也

治時氣發豌豆瘡瘡出後疼痛心神煩悶宜服犀角散方

犀角屑兩半丁香兩半薰陸香兩半木香兩半玄參壹兩升麻兩壹麝香一分

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中盞煎至五分不計時候和滓溫服

又方黃連

右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣發豌豆瘡如爪甲大赤黑色者宜用此方

羊膽

七枚取汁 羊脂 三兩

右二味相和於銀鍋中煎五七沸待冷摩傳瘡上日四五用之

又方川芒消

二兩細研

右以猪膽汁和塗於瘡上勿令動著直候痂落

治時氣熱毒攻表發豌豆瘡方

苦參

二兩

右細剉以水二大盞煎至一盞去滓分爲

三服日三四服

又方青黛

半兩細研

右以新汲水調服之日三四服

又方木香

壹兩

右搗碎以水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣口瘡諸方

夫時氣發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未散攻於心脾上焦熱躁故口舌

巢氏病源喉口生瘡也



治時氣熱盛口中生瘡宜服升麻散方

川升麻二兩木通二兩射干二兩羚羊角屑壹兩

麥門冬二兩蘆根二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣咽喉痛口瘡煩躁頭重宜服大青散方

大青壹兩黃芩壹兩川升麻壹兩麥門冬壹兩心焙去

梔子人一兩甘草一兩微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣熱盛昏昏如醉及腹脇痛百節痠疼

舌裂生瘡宜服麥門冬散方

麥門冬壹兩川升麻三兩柴胡壹兩赤芍藥

三分石膏二兩苦竹葉二分甘草三分豉二分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣心脾藏熱毒舌裂滿口生瘡宜服此方

川升麻壹兩黃蘗半兩苦竹葉半兩射干叁分大

青半兩龍膽半兩去頭玄參半兩生乾地黃半兩

右件藥搗篩為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓入蜜半合攪令勻不計時候徐徐含嚥之

治時氣心脾藏熱毒上衝徧口生瘡宜服犀角散方

犀角屑一兩玄參一兩胡黃連半兩川升麻叁分甘

草叁分大青半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣兼口舌瘡生宜服黃連散方

黃連壹兩川大黃叁分大青叁分川升麻

叁分黃芩叁分甘草叁分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣壅熱口内生瘡方

黃連一兩半 甘草壹兩 麥門冬壹兩 玄參壹兩

生對 柴胡壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

時氣結胃諸方

夫時氣結胃者謂熱毒氣結聚於心胃也此  
由病發於陽而下之早熱毒之氣乘虛而痞  
結按之乃痛其寸口脉浮關上

脉大不可下下之即死脉沉

之為逆

若陽脉浮關上沉緊者名

病舌上白

苔滑者為難治不往來寒

人反靜舌苔

滑者不可攻之也

治時氣結胃心下堅實滿痛宜服桂心散方

桂心一兩 甘遂半兩 煨人參一兩 菰蘆一枚

取子

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣結胃心下滿實煩悶宜服猪苓散方

猪苓

一兩去黑皮

澤瀉

壹兩

桂心

半兩

赤茯苓

叁分

朴消

叁兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治時氣結胃心下堅按之即痛其脉沉滑宜

服陷胃湯方

薤白

壹兩取子

黃連

一兩去鬚

半夏

壹兩湯洗

七遍去滑

右件藥搗篩為散每服五錢以小一大盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣結胃煩悶喘急宜服檳榔丸方

檳榔

半兩

馬蘭花

一分

甜葶藶

半兩

隔紙炒

猪

牙皂

半兩去皮

炙令黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以竹葉湯下二十丸

治時氣結胃熱毒在內宜服苦參丸方

苦參

半兩

黃連

一兩去鬚

黃芩

壹兩

梔子

半兩

大黃 一兩 剉碎 微炒

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹葉湯下二十九

治時氣結胃熱實在內其脉沉堅心下痛滿按之如石宜服陷胃丸方

川大黃 二兩 剉碎 微炒 甜葶藶 一兩 隔紙炒 令紫色 川芒消

二杏人 二兩 湯浸 去皮尖 雙人 麩炒 微黃

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸用甘遂末半錢蜜一小匙水一中

蓋同煎至七分溫溫化丸藥不計時候服之以利爲度

治時氣熱毒結在胃膈六七日垂死者宜服此方

苦參 一兩 剉

右搗碎以酒二大盞煎取一盞去滓看冷暖得所不計時候都爲一服服後當聞苦參氣卽吐毒如羊膽汁便愈

時氣欬嗽諸方

夫時氣欬嗽者由熱邪客於肺則上膈有熱  
心胃煩躁乾頭痛其人必飲水水停心下  
則上乘於肺故上氣欬嗽也其脉洪數者是  
其候也

治時氣心胃痰嘔虛煩欬嗽時時氣促宜服  
麥門冬散方

麥門冬壹兩 人參叁分去 葛根壹兩 桔梗  
三分去 前胡叁分去 半夏叁分湯洗 貝母  
蘆頭壹兩 甘草叁分炙  
微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫  
服

治時氣欬嗽咽喉不利心胃煩悶宜服木通  
散方

木通一兩 桑根白皮一兩 葛根三分 射干  
參紫苑叁分去 半夏七遍去滑 馬兜零兩  
右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣肺虛熱壅氣喘欬嗽宜服天門冬散

方

天門冬參分去心紫苑參分去苗土赤茯苓參分麻黃

牛兩去根節甘草參分炙陳橘皮參分湯浸去白瓢焙桑

根白皮參分剉人參參分去蘆頭杏仁參分湯浸去皮尖雙

人是炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣發熱欬嗽煩躁或時氣喘宜服欬冬

花散方

欬冬花附一兩天門冬參分去心黃耆一兩石膏一兩

半紫苑一兩去苗土杏仁一兩湯浸去皮尖甘

草參分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣頭痛欬嗽煩悶宜服麻黃散方

麻黃壹兩去根節 黃耆壹兩剉 石膏壹兩半 天門冬

叁分 人參壹兩去蘆頭 杏仁壹兩湯浸去皮尖生用 甘草

叁分剉生用

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣壯熱欬嗽頭痛心悶宜服前胡散方

前胡二兩去蘆頭 川升麻二兩 百合一兩 貝母壹兩

半煨令 紫苑壹兩半 桔梗壹兩半 石膏叁兩

微黃 麥門冬二兩 甘草半兩 杏仁壹兩湯浸

人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治時氣壯熱頭痛欬嗽石膏散方

石膏六兩 葛根壹兩剉 百合二兩 赤芍藥二兩 貝母

二兩 煨桔梗二兩去蘆頭 川升麻二兩 梔子人兩



菰藪根二兩

右件藥搗籠羅為散每服五錢以水一大盞入葱白二莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣腴熱欬嗽喉中生瘡宜服生乾地黄散方

生乾地黄二兩 川升麻二兩 玄參二兩 赤芍藥二兩

紫苑二兩去苗土 柴胡二兩去苗 貝母一兩半煨 天

門冬一兩去心 麥門冬二兩去心

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜半匙更煎一兩沸不計時候溫服

治時氣欬嗽宜服紫苑散方

紫苑壹兩半 貝母壹兩煨 甘草一兩炙 桑

根白皮壹兩 麥門冬壹兩去心 人參一兩去 陳

橘皮半兩湯浸 杏仁一兩半湯浸 去皮

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱勢未退壅滯虛羸欬嗽宜服柴胡散方

柴胡壹兩去苗 黃芩一兩 桔梗一兩去蘆頭 玄參一兩 麥

門冬一兩半去心焙 地骨皮一兩 赤茯苓半兩 人參半兩

去蘆頭 紫苑半兩去苗土 甘草一分炙

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣肺熱膈壅滯欬嗽不止方

貝母一兩微炙 紫苑三分去苗土 甘草一分炙

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣口乾諸方

夫時氣熱毒攻於心肺則膈上壅躁若胃中有熱則津液竭少咽喉不利頭痛心煩毒熱未除故口乾也

治時氣經下後未退頭疼口乾煩燥恍惚宜服葛根散方

葛根壹兩 麥門冬壹兩去心 黃芩一兩 川升麻壹兩

石膏 壹兩 甘草 壹兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣胃熱口乾煩躁渴不止宜服赤茯苓

散方

赤茯苓 一兩 菰蘆根 一兩 知母 半兩 麥門冬 壹兩

生乾地黄 壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入小麥五十粒淡竹葉三七片煎至五分

去滓不計時候溫服

治時氣口乾宜服蘆根散方

蘆根 二兩 麥門冬 壹兩 黃芩 一兩 菰蘆根 一兩

甘草 半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫

服

又方石膏 二兩 葛根 壹兩 人參 二兩 去蘆頭 麥門冬

一兩 去心

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心脾壅熱煩悶口乾宜服菰蘆根散方

菰蘆根叁分犀角屑叁分川升麻叁分麥門冬叁分

夫葛根三分甘草叁分梔子叁分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣口乾舌縮心神煩躁不得睡臥宜服此方

菰蘆壹枚開竅留蓋白蜜壹合竹瀝壹合酥壹合

生藕汁壹合

右件藥相和內於菰蘆中以麵裹煑火燒候麵黃熟即傾入器中放溫每服半合不計時候服

治時氣煩熱口乾宜服黃連丸方

黃連壹兩去鬚菰蘆根一兩麥門冬二兩知母去心焙

壹兩赤茯苓壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以牛乳下三十九

治時氣口乾喜唾方

乾棗二十枚烏梅肉十枚甘草炙微赤剉

右件藥入少蜜合搗令熟常含如杏核大

燕津

治時氣熱毒攻咽喉諸方

夫時氣熱毒在藏陰陽隔絕邪熱客於足少

陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故令腫痛或生瘡也

治時氣熱毒上攻咽喉疼痛宜服射干散方

射干三分川升麻三分馬藺根半兩麥門冬三分

甘草微赤剉犀角屑三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒上攻咽喉不利宜服前胡散方

前胡一兩去蘆頭天門冬半兩川升麻壹兩赤茯苓

苓三分桔梗半兩去盧頭絡石半兩射干半兩犀角屑

兩赤芍藥兩杏仁雙參分湯浸去皮尖甘草

兩赤芍藥兩杏仁雙參分湯浸去皮尖甘草

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣毒氣攻咽喉疼痛妨悶方

半夏半兩湯洗滑射干半兩甘草半兩

赤麥門冬去心黃藥兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉二七片煎至五分去滓不計時溫服

治時氣熱毒攻咽喉腫塞不通宜服升麻散

方

川升麻壹兩木通壹兩射干壹兩赤芍藥壹兩羚羊

羊角屑壹兩馬蘭根壹兩甘草壹兩杏仁壹兩

湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒上攻咽喉噎塞腫痛宜服玄參散方

玄參三分射干三分三川升麻三分百合三分前胡三分  
去蘆頭白茯苓三分犀角一分枳殼三分微黃一分甘草一分杏仁一分雙人參一分麥門冬一分桔梗三分木通三分右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒上攻咽喉噎塞不能下食宜服

此方

射干壹兩川升麻壹兩人參壹兩去蘆頭去甘草壹兩  
赤陳楠皮一兩湯浸半夏壹兩湯洗右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒攻咽喉宜服含化太陰玄精丸方

太陰玄精半兩細研川升麻兩玄參兩射干半

寒水石半兩研甘草半兩炙馬牙消兩

右件藥擣羅爲末都研令勻鍊蜜和丸如

小彈子大常含一丸嚙津

治時氣熱毒上攻咽喉疼痛閉塞宜服含化

升麻丸方

川升麻一分玄參一分射干一分百合一分馬蘭根

一分甘草微赤馬牙消兩

右件藥擣羅爲末用牛蒡根擣汁和丸如

櫻桃大常含一丸嚙津

治時氣毒氣攻咽喉閉塞不通方

生烏扇半斤猪脂半斤

右件藥相和煎五六沸絞去滓候冷常取

如棗大含嚙之

治時氣熱毒攻咽喉腫痛方右以商陸根切

擣令爛炒熱以手怕下裏熨咽喉腫處冷

卽復換○肘後方毒病攻喉咽腫痛方切

當陸灸令熱以布藉喉以熨布上冷復易

治時氣嘔逆諸方



夫時氣胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔逆也或吐下後飲水巢氏病源飲食過多胃氣虛冷亦為嘔逆也

治時氣惡寒壯熱食則嘔逆宜服前胡散方

前胡壹兩去蘆頭麥門冬壹兩去心生乾地黃壹兩陳

橘皮牛兩湯浸去白瓢焙甘草牛兩炙微赤剉葛根一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣大下後胃氣虛冷嘔逆不止宜服人

參散方

人參壹兩去蘆頭麥門冬一兩去心陳橘皮半兩湯浸去白

煎煎黃耆半兩剉甘草半兩炙微赤剉草薺壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣煩熱嘔逆不止宜服麥門冬散方

麥門冬二兩去心蘆根二兩剉人參二兩去蘆頭葛根

二兩剉陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣腹脇虛脹心膈壅滯嘔逆不能食宜服半夏散方

半夏一兩湯洗柴胡一兩黃耆壹兩赤芍壹兩藥壹兩人參兩去頭桂心兩陳橘皮一兩湯大腹皮壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞以生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣心胃妨悶嘔逆不下食宜服此方

人參壹兩去前胡一兩去甘草壹兩黃芩壹兩赤茯苓兩一兩蘆根壹兩枳實半兩木通半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生蘆根半兩煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣頭痛壯熱食即嘔逆宜服枇杷葉散

方

批杷葉

半兩試去

人參

半兩去

陳橋皮

半兩

湯浸去

黃芩

半兩

梔子

半兩

石膏

半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣壯熱嘔逆不下食宜服陳橋皮散方

陳橋皮

壹兩湯浸

麥門冬

壹兩

人參

壹兩

頭甘草

壹兩

葛根

壹兩

微炒

生

生

方

治時氣壯熱頭痛嘔逆不能食宜服前胡散

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計  
時候溫服

前胡

壹兩去

蘆根

壹兩

犀角屑

壹兩

葛根

壹兩

麥門冬

壹兩

石膏

壹兩

人參

壹兩

陳橋

壹兩

皮

壹兩

甘草

壹兩

微炒

生

生

生

右件藥搗羅為散每服五錢以水一大

蒸入竹葉二七片生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

治時氣心胃妨悶嘔逆不下食宜服蘆根散

蘆根一握 前胡半兩去蘆頭 甘草半兩炙 人參

二兩去 桔梗壹兩去蘆頭 枇杷葉半兩拭去毛炙 黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉二七片煎至五分去滓不計時候

温服

治時氣十日已上時有嘔逆欲得飲水此胃

中伏熱不散宜服犀角散方

犀角屑 麥門冬一兩半 黃芩一兩 石膏二

川朴消兩 蘆根壹兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞入青竹茹一分生薑半分煎至六分去

滓不計時候温服

治時氣神巧萬全方 嘔逆不下食方

生薑汁半盞 蜜壹

右件藥相和令勻不計時候頻服

治時氣嘔逆不下食方

半夏半兩湯洗七遍去滑生薑壹斤

右件藥剉碎以水一大盞煎至六分去滓

分爲二服不計時候溫服神巧萬全方肘後方壽域神方

同

又方右以臘月兔頭并皮毛燒令煙盡擣細

羅爲散每服以粥飲調下一錢不計時候

頻服

又方枇杷葉一兩試去毛炙微黃

右件藥擣羅爲末每服二錢以水一盞

煎至五分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

治時氣心腹痞滿諸方

夫時氣太陽少陰并病脉浮緊而下之緊反

入裏則作痞痞者心下滿也病發於陰者不

可下之下之則心下痞按之自軟但氣痞爾

不可復下也若熱毒氣乘心則心下痞滿面

赤目黃狂言恍惚者此爲有實宜吐下之

治時氣熱毒不退大便秘澀心腹痞滿食飲  
不下精神昏亂恍惚狂言脉候洪數宜服鼈  
甲散方

鼈甲一兩塗醋炙赤茯苓壹兩桔梗一兩去

人參一兩去檳榔一兩陳橘皮半兩湯浸

鮮皮一兩麥門冬一兩去心枳殼半兩麩炒茵陳

兩川大黃碎微炒甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣心下痞滿胃膈不利宜服前胡散方

前胡一兩去赤芍藥壹兩木香一兩青橘皮一

湯浸去白瓢焙檳榔壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞  
煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣若吐下發汗後心下痞滿氣上衝

起卽頭眩脉沉緊者宜服半夏散方

半夏一兩湯洗白朮壹兩甘草一兩炙赤茯苓

苓一兩桂心一兩人參壹兩去蘆頭壹兩訶梨勒壹兩用皮前

右件藥擣篩為散每服五錢以水一中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候溫服

治時氣心腹痞滿身體疼痛煩熱嘔逆宜服

前胡散方

前胡壹兩去蘆頭半夏一兩湯洗七遍枳殼壹兩炒微黃  
去赤芍藥半兩黃芩壹兩人參壹兩去蘆頭半甘草半兩

赤微桔梗壹兩去蘆頭壹兩檳榔壹兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一中盞  
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計  
時候溫服

治時氣已汗下後脾胃氣虛心下痞滿腹中

雷鳴宜服陳橘皮散方

陳橘皮二兩湯浸去白瓢壹兩焙甘草壹兩炙人參  
頭乾薑一兩炮半夏一兩湯洗赤茯苓一兩  
桔梗壹兩去蘆頭白朮壹兩木香壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣心腹痞滿氣喘痰涎不絕宜服桔梗散方

桔梗參分去蘆頭前胡壹兩去蘆頭半夏參分湯洗

旋復花兩大腹皮半兩枳殼半兩麩炒赤

茯苓半兩赤芍藥參分甘草半兩炙微赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治時氣氣壅上衝心腹痞滿坐臥不安宜服赤茯苓散方

赤茯苓參分赤芍藥參分枳殼半兩麩炒大腹

皮半兩百合壹兩紫蘇莖葉二分甘草半兩炙

郁李人皮壹兩湯浸去微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣喫水過多水結心下痞滿喘急方



川大黃一兩到碎微炒甘遂壹錢煨川朴消兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

水調下一錢以利為度

治時氣飲水過多心下痞硬痛方

芫花斤半

右以醋拌令勻浥浥以慢火炒熟用帛裏熨之冷即更炒以效為度

治時氣後宿食不消諸方

夫時氣吐下之後或病新差脾胃氣皆虛不

能化於水穀致有宿食難消頭目多疼時發寒熱或心腹煩滿大腸結躁此皆是其候也治時氣後脾胃氣虛心腹虛脹喫食不消宜服枳實散方

枳實一兩麩炒人參壹兩去蘆頭乾薑半兩炮

白朮參分桂心參分甘草半兩炙半夏半兩湯洗七遍

去桔梗參分去蘆頭木香兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前

溫服

治時氣後宿食不消可思飲食宜服麥蘖散方

麥蘖

壹兩

前胡

壹兩去蘆頭

甘草

半兩炙

白朮

一兩 檳榔

兩 人參

壹兩去蘆頭

厚朴

壹兩去麩皮

塗生薑汁

炙

熟令香

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服之治時氣後胃虛心膈壅悶時有寒熱宿食不

消宜服人參散方

人參

二兩去蘆頭

大腹皮

一兩剉

枳實

壹兩炒

赤

茯苓

一兩

麥門冬

一兩半去心焙

甘草

半兩炙

訶梨

勒青用皮

白朮

壹兩

桔梗

壹兩去蘆頭

右件藥搗羅羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

治時氣後胃虛宿食不消心膈壅悶乍寒乍熱宜服白朮散方

白朮

半兩 人參

半兩 蘆頭

陳橘皮

半兩湯浸

去白

熟焙

大

腹皮半兩黃耆半兩枳殼半兩甘草半兩

牛兩炙訶梨勒一兩沉香一兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓食前溫服

治時氣後宿食不消大腸祕澀宜服大黃散

方

川大黃壹兩檳榔半兩郁李人一兩枳殼

厚朴一兩薑汁一兩去麤皮塗生木香半兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓食前溫服

治時氣後腸胃虛冷食不消化宜服厚朴丸

方

厚朴壹兩去麤皮塗生乾薑一兩白朮

人參壹兩薑汁一兩去麤皮塗生枳殼壹兩

食茱萸三分桂心一分神麴壹兩大麥

杏仁一兩湯浸去皮尖

右件藥搗羅為散鍊蜜印丸如梧桐子大

每服食前以棗湯下三十丸

治時氣後脾胃氣冷食不消化宜服白苳蔻  
凡方

白苳蔻 參分 草苳蔻 參分 食茱萸 參分 白朮

參分 人參 參分 去 參分 陳橘皮 參分 白麵 參分 桂心 參分

乾薑 半兩 炮 半兩 甘草 半兩 炙 半兩 神麴 參分 炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服食前以薑棗湯下三十丸

治時氣後脾胃虛冷宿食不消宜服木香丸  
方

木香 參分 人參 一兩 去 一兩 白朮 半兩 甘草 半兩

赤枳殼 壹兩 麩炒 壹兩 乾薑 參分 炮 壹兩 麥蘗 壹兩 炒

熟檳榔 壹兩 黃 壹兩

右件藥搗羅為散鍊蜜和丸如梧桐子大

每服食前以薑棗湯下三十丸

治時氣煩躁諸方

夫時氣病煩躁者由陰氣少陽氣多故身熱而煩躁也其毒氣在於心而煩躁者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥結巢氏病源燥糞而煩

躁者或則謬語時遶臍痛其腹脹滿皆當察其證候而治之也

治時氣表裏未解煩躁不可忍者宜服竹葉湯方

竹葉二兩石膏二兩麥門冬半兩半夏半兩

滑石半兩人參半兩甘草一分東橘皮湯壹分

去白生薑半兩煎微赤剉湯壹分

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣頭目煩疼心神躁壅大小便不利宜服犀角散方

犀角屑半兩防風半兩川升麻一兩秦艽一兩

去木通一兩白鮮皮一兩甘草半兩檳榔一兩

一兩芒消二兩右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣表裏如火煩躁欲死宜服大黃散方

川大黃半兩碎微炒寒水石半兩川芒消半兩石膏

兩半兩升麻兩日草半兩葛根兩

右件藥搗細羅為散每服一錢計時候以新

汲水調下二錢

治時氣煩躁頭痛壯熱宜服水解散方

麻黃兩根節川人黃一兩碎微炒黃芩兩桂心

一甘草壹兩赤芍藥兩

右件藥搗細羅為散患者先以生熟湯浴

後以暖水調下二錢厚蓋取汗如人行五

里未汗再服

治時氣頭痛壯熱不解心神煩躁宜服大黃

散方

川大黃半兩碎微炒黃連半兩去鬚麥門冬壹兩去心梔

子人半兩柴胡一兩去苗甘草半兩微赤剉

右件藥搗節為散每服五錢以水一大盞

入豉少半合葱白二莖煎至五分去滓不

計時候溫服

治時氣壯熱不解心神煩悶毒氣在胃膈宜

類聚 五十一 七十一

服苦參散方

苦參

二兩

黃芩

一兩

川升麻

一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服頻服當吐為效

治時氣已五六日心神煩躁不解方

竹瀝

半小盞

新汲水

半小盞

右件藥相和攪令勻不計時候頓服

又方大地龍

二條

破腹泥細切

右以小便一中盞煮令熟去滓不計時候溫服

又方雞子清

壹枚

芒消末

一錢

右件藥都以新汲水半盞調服

治時氣煩渴諸方

夫時氣煩渴者此由熱氣入於腎藏故也腎惡燥今熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也治時氣頭痛骨肉煩疼口燥心悶外寒內熱已自下利由有虛熱未退煩渴不止宜服知

母散方

知母一兩 人參壹兩 去地骨皮一兩 葛根一兩

石膏三兩 甘草一兩 炙苾苾根二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣數日不解心躁渴小腹脹急臍下悶

痛宜服赤芍藥散方

赤芍藥參分 知母參分 黃芩參分 玄參參分 麥門冬

參分 柴胡參分 石膏二兩 甘草參分 炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分竹葉三七片煎至六分去滓

不計時候溫服

治時氣心神壅悶煩渴不止宜服柴胡散方

柴胡一兩 川升麻參分 黃芩參分 石膏二兩 麥門

冬一兩 犀角屑參分 葛根參分 甘草參分 炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入葱白二葦竹葉二七片煎至五分去滓



不計時候溫服

治時氣頭痛雖自時時有汗煩渴不止宜服

赤茯苓散方

赤茯苓二兩 甘草一兩炙 澤瀉一兩 桂心一兩 石

膏二兩 葛根一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣發熱煩渴欲飲水小便不利宜服猪

苓散方

猪苓一兩去黑皮 赤茯苓一兩 澤瀉一兩 阿膠一兩

炒令黃燥 滑石一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣壯熱煩渴麥門冬散方

麥門冬一兩去心 五味子一兩 人參一兩 蘆頭一兩 去甘草

一兩炙 石膏二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣大熱心胃煩渴土瓜根飲子方

土瓜根半兩乾棗五枚麥門冬半兩甘草叁分

赤鼓半合

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣煩渴不止方

地骨皮半兩阿膠半兩擣碎葱白叁莖

右件藥細剉和勻每服半兩以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣煩渴身體痠疼頭痛嘔逆不能下食

宜服此方

柴胡二兩半赤茯苓二兩枳殼二兩麩炒

門冬二兩甘草壹兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治時氣下後煩渴不止升麻散方

川升麻叁分知母叁分甘草叁分石膏壹兩

葛根壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片粳米一百粒煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣煩渴飲水即嘔吐心胃不利宜服葛根散方

葛根壹兩 猪苓壹兩 赤茯苓壹兩 桂心壹兩

白朮壹兩 澤瀉壹兩 蘇蘆根壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

水調服二錢令極飲水小便利者汗出便愈

又方黃連壹兩 蘇蘆根壹兩

右件藥搗細羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候煎大麥飲放溫下三十丸

治時氣煩渴不止方

葛根二兩 葱白五莖

右件藥以水二大盞煎至一大盞去滓內

白粳米半合豉半合以生絹裏煎良久候爛去米豉放冷不計時候服

治時氣煩渴不止方右取生藕搗絞取汁一中盞入生蜜一合攪令勻不計時候分爲二服肘後方衛生易簡方同

治時氣鼻衄諸方

夫時氣衄血者由五藏熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從鼻中出也

治時氣鼻衄煩躁不止頭痛氣逆宜服石膏飲子方

石膏二兩甘草半兩炙赤芍藥一兩黃芩一兩

柴胡兩桂心半兩生地黄三兩竹茹二兩

右件藥細剉和勻每服半兩先以水一大盞半浸伏龍肝二兩澄取清一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣心肺中熱鼻衄不止方

胡粉炒令黑細研乾薑炮裂剉杵爲末亂髮灰細研釜底

墨研細伏龍肝研細

右件藥但得一味吹於鼻中便止若各吹一大豆許更效

治時氣鼻衄心膈躁悶面赤目黃起卧不定方

烏賊魚骨二兩刺薊二兩蒲黃二兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以冷粥飲調下二錢頻服以定為度

治時氣鼻衄諸藥無效者宜用此方

白馬通七枚絞取濃汁阿膠半兩杵碎炒令黃燥為末

右件藥相和熟攪以滴鼻中仍用新汲水微浸足即止

治時氣鼻衄日夜不止面色如金黃方右取

韭根一握擣取汁瓶中盛以索懸於井中浸良久急取出滴二七滴於鼻中即止

治時氣卒鼻衄不止方右以鬱金擣羅為末每服不計時候以冷水調下二錢以定為

度

又方熟艾壹雞子大牛皮膠一片如手大杵碎炒令黃燥

右件藥以豉汁二大盞煎取一大盞去滓分溫二服

治時氣熱毒攻眼諸方

夫肝開竅於目肝氣虛熱毒氣則乘虛上衝於目故赤疼痛或生赤翳白膜瘰肉及瘡也治時氣熱毒攻於肝藏目赤澀痛宜服升麻散方

川升麻兩半地骨皮兩半玄參兩半甘草兩半微赤剉

黃芩兩半赤茯苓兩半梔子人兩半防風兩半頭兩半去

羌活兩半桑根白皮兩半决明子兩半石膏兩半

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片黑豆五斗粒煎至五分去滓食後溫服

治時氣熱毒未除心胃煩悶毒氣上攻兩眼赤腫宜服梔子散方

梔子人兩半黃連兩半去鬚枳殼兩半微黃去瓢龍膽

半兩去薦頭兩半赤芍藥兩半甘草兩半微赤剉川大黃兩半

剉碎  
微炒

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
煎至三分去滓食後溫服

治時氣肝藏虛熱眼昏赤痛宜服羚羊角散  
方

羚羊角屑兩半 赤茯苓兩半 防風兩半 盧頭兩半 去麥門

冬半兩 甘草半兩 微赤剉地骨皮兩半 枳殼兩半 麩炒

微黃去 麩人兩半

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓入蜜一茶匙更煎一兩沸  
食後溫服

治時氣熱毒攻眼疼痛心中躁悶宜服地骨  
皮散方

地骨皮壹兩 防風兩半 去赤芍藥兩壹 葛根兩一

剉羚羊角屑兩一 川大黃兩一 剉兩一 碎微炒

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入豉五十粒葱白二莖煎至五分去滓食  
後溫服

治時氣熱毒攻眼不見物方

川升麻一斤 决明子一斤 細辛半兩 蕤人兩 黃連

壹兩 犀角屑兩半

右件藥持細羅爲散每服食後以溫漿水

調下二錢

治時氣目赤疼痛及痒不可忍宜服洗眼竹

葉湯方

竹葉一百 秦皮三分 防風三分 甘菊花三分 蕤

蕤人三分 甘草三分 生用

右件藥都細剉以水二大盞煎取一盞以

絲濾去滓避風處洗眼日三五度差

治時氣熱毒攻眼中有努肉臉裏有瘡日夜

下淚全不見物獐猪膽點眼方

獐猪膽壹枚 川朴消各人大 黃連末半錢 龍

腦壹豆大 研令細

右件藥都研與猪膽相和浸一宿晝夜點

眼若熱淚至多當時便差

治時氣熱毒攻眼腫痛不可忍洗眼方右以



水煮蜂窠洗之日六七度甚效

治時氣後因喫葵蒜熱麪損眼暗不見物晝夜疼痛不可忍宜用獾猪肝貼眼方右以獾猪肝一具薄切以清水浸淘如法貼眼臉上乾卽換之連日及夜貼之重者不過二日效

治時氣餘熱不退諸方

夫時氣病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脉洪大實數腸胃脹滿小便赤黃大便

難或煩或渴面色變赤此爲腑藏有結熱故也

治時氣餘熱不退發歇躁悶宜服大黃散方

川大黃一兩到 梔子人兩 犀角屑一兩 麥門

冬一兩 黃連一兩 地骨皮一兩 甘草壹兩炙

黃芩兩 柴胡壹兩 白鮮皮兩

右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣餘熱不退心膈時發煩躁宜服麥門

冬散方

麥門冬去心 犀角屑兩 竹茹兩 黃芩兩 石

膏壹兩 川大黃碎微炒 川朴消兩 甘草壹兩

赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣五七日頭痛餘熱不解宜服解肌散方

葛根壹兩 柴胡壹兩 麻黃二分 赤芍藥

剉 去苗 根節 去

半兩黃芩兩 甘草半兩 桂心半兩 石膏二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣三五日餘熱不解心躁煩渴宜服知母散方

知母參分 川升麻參分 鈞藤壹兩 地骨皮參分 赤茯苓參分

麥門冬參分 石膏一分 甘草壹分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候  
溫服

治時氣餘熱不解心煩躁渴表實裏虛宜服  
犀角散方

犀角屑一兩 葛根壹兩 麻黃根節一兩 去去 黃芩分  
甘草半兩 炙微赤 剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣餘熱不解身體疼痛宜服麻黃散方

麻黃分 去去 柴胡壹兩 赤茯苓分 地骨皮分  
人參一兩 去去 赤芍藥分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
煎六分去滓不計時候溫服

治時氣餘熱不解心膈壅悶四肢煩熱宜服  
麥門冬散方

麥門一兩 半去心 梔子人參 枳殼分 麩分 麩分 炒炒 黃去 瓠瓠 黃去 瓠瓠

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉七片煎至五分去滓不計時候溫服

又方大青參分剉枳殼參分微黃去甘草一分

赤川升麻兩壹黃芩參分川朴消兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣餘熱不解頭重宜服葛根散方

葛根壹兩剉赤芍藥兩一黃芩兩一梔子人兩豉

合二

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣經十數日餘熱不解或時發寒熱宜服此方

葳蕤兩一柴胡兩一羚羊角屑三分石膏兩一

黃芩兩壹甘草兩半微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣餘熱不退發作有時宜服菰蘆根散  
方

菰蘆根 一兩 柴胡 去苗 地骨皮 壹兩 枳殼 半兩

微黃 赤茯苓 壹兩 龍甲 壹兩 塗醋炙

白件藥 搗篩為散 每服四錢 以水一中盞

煎至五分 去滓 入生地黃汁半合 更煎一

兩沸 不計時候 溫服

治時氣餘熱不退發歇不定 大便秘澀 宜服

大黃丸方

川入黃 二兩 到 碎微炒 柴胡 壹兩 黃芩 壹兩 黃連 壹兩

去 白鮮皮 壹兩 梔子 壹兩 秦艽 壹兩 龍膽 壹兩

去 蘆 赤芍藥 壹兩 大麻人 壹兩 研如膏

右件藥 搗羅為末 鍊蜜和丸 如梧桐子大

每服不計時候 以竹葉湯下 三十九 以利

為度

治時氣餘熱不退 煩躁發歇 四肢無力 不能

食飲 柴胡丸方

柴胡 壹兩 桔梗 壹兩 子芩 壹兩 赤芍藥 壹兩

黃耆壹兩 枳殼一兩 麩炒 鼈甲一兩 塗醋

裙人參 壹兩 去 甘草半兩 炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下三十九

又方右以牛蒡根搗絞取汁每服不計時候服一小盞

治時氣發黃諸方

夫時氣病者因濕毒氣盛積於脾胃有熱則新穀爵蒸不能消化大小便結澀故令身面

變黃或如橘色或如桃枝色也

治時氣壯熱腹滿心下硬不能食發黃宜服

秦艽散方

秦艽一兩 去苗 柴胡一兩 去苗 芎藭壹兩 桔梗壹兩 去

葛根兩 黃芩兩 甘草一兩 炙 川大黃壹兩 剉碎

微 桑根白皮兩

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣五六日壯熱骨節煩疼連心兩肋氣

脹急硬痛不能食變為黃宜服柴胡散方

柴胡一兩枳實壹兩麩炒壹兩蘇軀根壹兩黃芩壹兩

梔子壹兩茵陳壹兩龍膽壹兩法川大黃壹兩

碎微炒甘草半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣三日外若忽覺心滿堅硬脚手心熱

則變為黃不療殺人宜服梔子散方

梔子壹兩紫草壹兩白鮮皮壹兩黃芩壹兩秦艽壹兩

去苗甘草壹兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒不解心胃躁悶變為黃宜服茵

陳九方

茵陳壹兩川大黃壹兩碎壹兩豉壹兩梔子壹兩龍

甲壹兩塗醋炙壹兩川芒消壹兩杏仁壹兩湯浸壹兩

人麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以竹葉湯下三十丸以利為度

治時氣遍身發黃心膈煩熱宜服大黃丸方

川大黃一兩到碎微炒黃連一兩去鬚黃芩兩黃蘗兩壹

到麴衣兩梔子人壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下三十丸

治時氣發黃宜服此方

甜葶藶二兩隔紙炒令紫色川大黃二兩到碎微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下二十丸以利為度

又方右以生小麥苗搗絞取汁每服一小盞

日三四服即愈

治時氣三月外若忽覺心滿堅硬脚手心熱則變為黃不治殺人宜服此方

瓜蒂七枚神功萬全方增赤小豆七粒秫米七粒

右搗羅為末用一大豆許吹鼻兩孔中令



黃水出殘末水調服之得吐黃水一二升  
即差

又方右以萱草根苗搗絞取汁二小盞分爲  
三服以利爲度

治時氣毒氣攻手足諸方

夫時氣毒氣從藏腑中出攻於手足手足則  
炊熱亦腫疼痛也人五藏六腑并榮輸皆出  
於手足指故毒氣從內出而攻於手足也  
治時氣毒攻手足赤腫疼痛欲斷方

豉半斤羊肉一斤

右以木一斗同煮候肉熟以汁看冷暖得  
所以漬手足日三度

又方右掘地作坵子深三尺大小容兩足燒  
中令熱以酒灌坵中著屐踞坵上衣履毒  
神方以衣履同蓋覆蒸之勿令泄氣日再作之用後方同生易簡方

又方右以羊肉桃葉煮取汁漬之加鹽少許  
尤佳

治時氣熱毒攻手足腫熱疼痛欲脫方

虎杖二斤

右以水三斗煮取二斗去滓溫漬手足日三度

又方苦參壹斤右以酒一斗煮五七沸去滓

溫溫漬之日三四度

治時氣熱毒攻手足炊熱疼痛方右煮馬通汁漬之日三度

又方不以猪膏和馬通塗之亦佳

治時氣熱毒攻手足腫痛似脫不可忍方右

以猪蹄一具去毛淨洗剉碎葱白一握切

以水一斗煮五七沸去猪蹄等稍熱漬之

又方黃蘗半斤右以水三斗煮十沸用漬手足差

足差

治時氣毒攻手足腫痛欲脫剉後方右以

生牛肉裹之腫消痛止

治時氣下痢諸方

夫時氣吐下之後表裏俱虛熱毒乘虛入於

腸胃則下痢黃赤或下膿血徧身壯熱臍腹  
疔痛其脉弱者自愈脉沉弦者必下重脉大  
者為未止此皆熱毒氣所為也

治時氣熱毒攻於腸胃下痢不止宜服升麻  
散方

川升麻半兩 當歸半兩 微炒  
桂心半兩 赤芍藥半兩 黃連半兩 微炒  
黃蘗半兩 甘草半兩 微炒  
右件藥搗篩為散每服半匙以水一大盞  
煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣諸痢不止宜服龍骨散方

龍骨二兩 黃連二兩 去髮微炒  
黃蘗二兩 微炒  
當歸二兩  
阿膠二兩 炒令黃燥

右件藥搗羅為散每服五錢以水一大  
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣大腸積熱下血不止臍下疔痛宜服  
槲葉散方

槲葉一兩 地榆三分 木賊三分 當歸三分 赤  
芍藥三分 伏龍肝三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治時氣四五日大熱下痢宜服黃連散方

黃連一兩去鬚微炒黃蘗一兩微炒龍骨二兩艾葉一兩

微炒黃芩一兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治時氣熱毒痢膿血腹中疼痛宜服木香散方

木香半兩黃連一兩去鬚微炒青橘皮半兩湯浸去白瓢焙梔

子人一分地榆半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治時氣熱每痢宜服黃連丸方

黃連二兩去鬚微炒當歸一兩微炒黃芩兩赤石脂

二兩音骨一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十九

治時氣下痢不能食方

烏梅肉十枚黃連二兩去

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸

治時氣熱毒下痢方

當歸二兩到黃連三兩去黃蘗二兩

右件藥搗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入蜜一茶匙再煎一兩沸放溫不計時候服

治時氣赤白痢方

鼈甲二兩塗醋炙阿膠一兩搗碎赤小豆一合

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下三錢

治時氣下部膿瘡諸方

夫時氣下部膿瘡者由毒熱結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作求食蝕人五藏多令洩痢下部生瘡痒不暫止若唇内生瘡但欲寐

者此蟲蝕下部也重者則虹爛傷於五藏即死也

治時氣蠶蝕下部生瘡宜服雄黃散方

雄黃十兩青箱子二兩苦參三兩黃連三分

改少杏人雙一人麩湯浸去皮尖

右件藥搗細羅為散每服食前以粥飲調

下二錢

又方青箱子一兩藿蘆一兩狼牙三分陳橘皮三分

去白扁竹三分

右件藥搗細羅為散每服食前以粥飲調下三錢

治時氣下部蠶瘡疼痛方

桂心二兩藍葉二兩

右件藥搗羅為末分為三服每服以生豬肝半斤去膜細切拌藥一服入五味同食每日早晨一服當於下部中出蟲如髮一合已來便差

治時氣痢膿血下部生蠶瘡蟲方

黃連

參分去鬚微炒 臘一兩

烏梅肉

壹兩微炒

右件藥搗羅為末化臘和蜜為丸如梧桐子大每服食前以粥飲下三十九晚再服之

治時氣下部蠶瘡方

馬蹄燒為灰

右件藥搗羅為末以豬脂和塗之一日可五六遍即差

治時氣病下部蠶瘡疼痛不止方右濃煮桃

皮取汁煎如稠餈以通下部中若口中生瘡含之差

治時氣大便不通諸方

夫時氣大便不通者由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃中乾燥結熱在內則大便不通也

治時氣熱毒在藏大腸不通宜服羚羊角散方

羚羊角屑

壹兩

麥門冬

二兩

大腹皮

壹兩

川

大黃壹兩判川升麻壹兩柴胡壹兩甘草半

炙微赤判

右件藥擣篩為散每服三錢水一中盞煎

至六分去滓入玄明粉一錢攪令勻不計

時溫服

治時氣十日已上腹微滿而喘臍下疔痛大

便不通宜服大黃散方

川大黃二兩判羚羊角屑一枳實壹兩

川芒消二兩桑根白皮一兩

煎至五分去滓不計時候溫服以利為度

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服以利為度

治時氣惡寒頭痛壯熱大便不通宜服柴胡

散方

柴胡一兩茵陳一兩木通一兩上瓜根一兩白鮮

皮一兩梔子一兩川大黃二兩川芒消二兩

右件藥擣細羅為散不計時候以溫水調

服三錢少時當利一兩行利弱者煮葱豉稀

粥食之如熱未歇再服



治時氣胃中壅熱大便不通宜服大麻人丸方

大麻人二兩郁李人壹兩湯浸去皮尖研入犀角屑

一兩川大黃二兩川朴消一兩枳殼一兩麩炒木

通一兩

右件藥搗細羅為末入大麻人等令勻鍊

蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以温

水下二十九

治時氣十餘日不大便調氣丸方

川芒消二兩枳實壹兩麩炒壹兩川大黃二兩碎二兩炒杏

人二兩湯浸壹兩尖雙壹兩人壹兩微炒壹兩黃研如膏

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

不計時候以温水下三十九如未利再服

治時氣熱毒在胃大便不通方

川大黃壹兩碎壹兩炒壹兩川芒消壹兩

右件藥細剉以水一大盞浸一宿明早煎

五七沸絲濾取汁不計時候温温頓服良

久下惡滯物

治時氣小便不通諸方

夫小腸者心之腑也心與小腸為表裏心藏  
壅熱久而不除汗後津液虛少不能灌溉而  
熱毒之氣流注小腸故令不通也

治時氣有時寒熱四肢沉重口不知味胃中  
噎塞小便不通宜服赤茯苓散方

赤茯苓一兩前胡一分去蘆頭 白鮮皮一分 蘧麥一分  
子芩兩半 梔子兩半 滑石兩二 川升麻一分 木通一分  
壹兩 半剉

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞煎  
至六分去滓不計時候溫服

治時氣熱毒流注小腸小便不通宜服貝齒  
散方

貝齒四十九枚 白鮮皮壹兩 豬苓 黑皮兩去 川大黃  
一兩剉 蘧麥壹兩 碎微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫  
水一中盞蜜半匙調下三錢良久再服以  
得通為度

治時氣四五日寒熱不解頭痛心腹煩悶小便不通宜服犀角散方

犀角屑一兩柴胡一兩赤芍藥一兩蘧麥壹兩黃

芩一兩川大黃二兩碎微炒滑石一兩知母一兩木通

一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服以得通為度

治時氣惡寒壯熱頭痛小便不通宜服柴胡

散方

柴胡壹兩茵陳一兩川大黃一兩碎微炒黃芩壹兩

木通壹兩川升麻一兩梔子一兩川芒消一兩

茅根一兩

右件藥搗羅為散每服五錢以水一大溫煎至五分去滓不計時候溫服以得通

利為度

治時氣壅毒心腹脹滿小便不通方

滑石二兩甜葶藶一兩隔紙炒令紫色

右件藥擣篩以水二大盞煎至一盞去滓  
不計時候溫服以得通為度

治時氣令不相染易諸方

夫時氣病者此皆因歲時不和溫涼失節人  
感乖候之氣而生病者多相染易故預服藥  
乃為方法以防之也

治時氣相染易者即須迴避將息飯食之間  
不得傳喫但一人受病全家不安有此相染  
宜服麻黃散方

麻黃	<small>三分去根節</small>	桔梗	<small>三分去蘆頭</small>	川烏頭	<small>一分去裂皮</small>
人參	<small>三分去蘆頭</small>	細辛	<small>三分</small>	白朮	<small>三分</small>
薑	<small>三分炮裂剉</small>	防風	<small>三分去蘆頭</small>	吳茱萸	<small>七分湯浸去</small>
微川椒	<small>壹分去口者微炒</small>	及閉	川大黃	<small>壹分剉碎微炒</small>	

右件藥擣細羅為散每服空心以溫酒調  
下二錢

治時氣轉相染易不止宜服烏頭散方

川烏頭	<small>一分去皮</small>	炮裂	川升麻	<small>三分</small>	川大黃	<small>三分剉碎</small>
微獺肝	<small>一分浸微炙</small>	龍腦	<small>半兩研細</small>	柴胡	<small>壹分去苗</small>	川朴

消參分  
細研

右件藥搗細羅為散入龍腦朴消同研令  
勻每服空心以溫酒調下一錢

治時氣病轉相染易乃至滅門傍至外人無  
有不著者宜服雄黃丸方

雄黃壹兩赤小豆二兩丹參二兩鬼箭羽二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服空心以溫水下五丸可與病人同牀  
傳衣不相染也

治時氣轉相染著延及外人人不敢視者朱  
砂丸方

朱砂二兩飛過細研人參一兩去盧頭鬼箭羽二兩雄

黃二兩細研赤小豆二兩炒熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每  
服空心以溫水下五丸可與病人同牀傳  
衣不相染也

治時氣熱毒令不相染易方

豆豉壹斤伏龍肝參兩童子小便壹中

石件藥相和煎取一中蒸半去滓分爲三服每平旦一服令人不著瘴疫  
治時氣溫毒令不相染易方石於正月取東行桑根麓如指者長七寸以朱砂塗之懸於門上又令人帶之

醫方類聚卷之五十