



孫直人備急千金要方卷之三十一

天津圖

西華

磨一

宋朝奉節守太黃少卿光祿閣校理林億等校正

傷寒方

發汗圓第六方

神丹圓治傷寒赤瀉惡寒發熱體疼者方

附子

烏頭各四兩

人參

茯苓

半夏各五兩

朱砂一兩

右六味末之蜜圓以真丹為色先食服如大豆二圓生薑湯

下日三須更進熱粥二升許重覆汗出止若不得汗汗少不

解復服如前法若得汗足應解而不解者當服桂枝湯此藥

多毒熱者令飲水寒者溫飲解之治瘧先發服二圓受略用細辛不

小丘山房

全方卷三十一

一

喬氏世定刻行

用人參別有射干棗大一枚名赤圓主寒氣厥逆

麥奴圓治傷寒五六日以上不解熱在胸中口禁不能言惟飲

飲水為壞傷寒醫所不能治為成死人精魂已竭心下纒盈以

杖發其口開灌藥咽中藥得下則愈麥如圓一曰黑奴圓二曰

水解圓

釜底墨

竈突墨

梁上墨

麥奴

黃芩

大黃

砒硝各一兩

麻黃二兩

右八味末之蜜圓如彈子大以新汲水五合研一圓破漬置

水中當藥消盡服之病者渴欲水極意不問升數欲止復強

飲能多飲為善不欲飲水當強飲之服藥須更當寒寒竟汗



出便解若服藥日移五尺許不汗復服如前法不過再三服佳
小麥黑勃名麥奴

宜吐第七例 證

例月大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必盡劑也

病如桂枝證頭不痛項不强而脉寸口浮胃中鞭滿氣上衝喉
因不得息者此以內有久痰宜吐之

病胃上諸寒胃中鬱鬱而痛不能食欲得使人按之按之反有
涎出不利日十餘行而其人脉遲寸脉微滑者此宜吐之吐之

利即止少陰病飲食入口即吐心中温温然欲吐復不能吐者
宜吐之宿食在上管宜吐之

小丘山房

全方卷二二

二

喬氏世定刻行

以病在胃中宜吐之

瓜蒂散病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胃中痞堅氣上
撞咽喉不得息者此為胃有寒也宜吐之

瓜蒂

赤小豆各一兩

右二味治下篩取一錢匕香豉一合熟湯七合煮作稀粥去
滓取汁和散温頓服之不吐者少少加得快吐乃止

張文仲以白湯

三合和服

水瀉散治時氣病煩熱如火狂言妄語欲以走方

甘遂兩半

白芷兩

大黃四兩

厚朴八兩

枳實五枚

砒硝

右六味以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃

煎取二升去滓下芒消更煎一兩滯分再服得快利止
抵覺圓下血方

水蛭

蜜蟲各三枚

桃仁二十枚

大黃三兩

右四味為末蜜和合分為四丸以水一升煮一丸取七合頓服之晡時當下血不下更服

抵虎湯治同前

水蛭

蜜蟲各三枚

桃仁二十枚

大黃三兩

右四味咬咀以水五升煮取三升去滓服一升不下更服

承氣湯方

小丘山房

千金卷二十一

三

喬氏世定刻行

枳實五枚

礞石半

大黃四兩

甘草二兩

右四味咬咀以水五升煮取三升去滓適寒溫分三服如人行五里進一服取下利為度若不得和盡服之

生地黃湯治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃三斤

大黃四兩

甘草一兩

礞石半

大棗三十枚

右五味合搗令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服

大柴胡湯類知母湯治傷寒七八日不解默默心煩腹中有乾

屎澱語方

柴胡斤半

萎蕤

知母

大黃

甘草各二兩

人參

黃芩

芍藥各三兩

生薑五兩

半夏升半

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓服一升日三即下為

效集驗用枳實四枚不用芍藥

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛方

柴胡

梔子仁

芍藥

知母各四兩

升麻

黃芩

大青

杏仁各三兩

石膏兩

香豉升一

金卷三二一

四

喬氏世定刻行

右十味咬咀以水九升煮取二升七分溫三服若熱感如

大黃四兩

馱豉圓治傷寒留飲宿食不消方

豆豉升一

巴豆去油三百枚今用二百枚

杏仁升半

黃芩

黃連

大黃

麻黃各四兩

硝磺

甘遂各三兩

右九味為末以蜜和丸如大豆服二丸不得下者增之

崔氏云此

黃素

發汗吐下後第九

脉證

方

傷寒已解半日許復心煩熱其脉浮數者可更發汗宜桂枝湯

凡發汗後飲水者必喘宜慎也

竹葉湯治發汗後表裏虛煩不可攻者但當與此方

竹葉二把

半夏升

麥門冬升

人參

甘草略二

生薑四兩

石膏升

右七味咬咀以水一斗煮取六升去滓內粳米半升米熟去之分服一升日三用生薑張文仲不用

桂枝麻黃湯服桂枝湯大汗後脉洪大者與桂枝湯若形如瘡

一日再發汗出便解者屬桂枝二麻黃一湯方

桂枝七兩十銖

麻黃十六銖

芍藥

生薑各一兩六銖

甘草一兩

杏仁十六枚

小丘山房

全金卷三十一

五

喬氏世定刻行

大棗五枚

右七味咬咀以水五升煮麻黃再沸去沫內諸藥煮取二升

適寒溫分再服取微汗而已

小青龍湯治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或

利或噎或小便不利小腹滿或喘者方

桂心

麻黃

甘草

乾薑

芍藥

細辛各三兩

五味子

半夏各半升

右八味咬咀以水一斗煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取

三升分三服相去十里頃復服之若渴者去半夏加栝蒌根

三兩若微利去麻黃加芫花如一雞子大熬令赤色若噎加

附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升數用神效

四物甘草湯治傷寒發汗出而喘無大熱與此方

甘草二兩

麻黃四兩

石膏半斤

杏仁五十枚

右四味以水七升先煮麻黃令減二升內諸藥煎取三升分三服

梔子湯治發汗若下後煩熱胃中空氣逆搶心者方

梔子十四枚

香豉兩合

右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮取一升半分二服溫進一服得快吐止後服

小丘山方

千金卷三十一

六 喬氏世定刻行

厚朴湯治發汗後腹脹滿方

厚朴兩

人參兩

甘草兩

生薑兩

半夏半升

右五味以水一斗煮取三升分三服

玄武湯治太陽病發汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身

暈動振振欲擗地方

茯苓

芍藥

生薑各三兩

白朮兩

附子一枚

右五味以水八升煮取三升溫服七合

葛根黃芩湯治太陽病反下之利遂不止脉促者表未解喘而

汗出者方

黃根餅

黃連

黃芩各三兩

甘草兩

右四味咀咬以水八升先煮黃根減二升次內諸藥煮取三升去滓分再服

茯苓湯治傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝胃起即頭眩其脈沈緊發汗則動經身為振振搖者方

茯苓兩

白朮

桂心各三兩

甘草兩

右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分三服

凡寸口脈浮關上自沈為結胃巢源作沈細

凡傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胃大陷胃圓治結胃

小丘山房

千金卷三十一

七

香氏世定刻行

病項赤癰如柔瘰狀下之即和方

大黃兩

硃硝

杏仁

葶藶各五兩

右四味擣篩大黃葶藶餘二味別研如脂和散取如彈丸大一枚甘遂末一錢匕白蜜三合水一升煮取八合溫頓服之病乃自下如不下更服取下為效

傷寒六七日結胃執實其脈沈緊心下痛按之正堅宜大陷胃湯

湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而渴日晡有小潮熱心胃大煩從心下至小腹堅滿痛不可近宜

大陷胃湯方

甘遂味一錢七

大黃切六

砒石升一

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓次內砒石一沸次內甘遂分再服一服得快利止後服

甘草瀉心湯傷寒中風醫反下之其人下痢日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿乾嘔心煩不能得安即見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆使之然也宜治之方

甘草兩四

黃芩

乾薑各三兩

黃連兩一

半夏升半

大棗十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓分服一升日三加人參

小丘山房兩乃

金卷三十一

八 喬氏世定刻行

生薑瀉心湯治傷寒發汗後胃中不和心下痞堅乾噦食臭腸下有水氣腹中雷鳴下痢者方

生薑兩四

甘草

人參

黃芩兩各

乾薑

黃連各一兩

半夏升半

大棗十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓分服一升日三

白虎湯治傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者方

石膏升一

知母六兩

甘草兩二

粳米合六

右四味以水一斗煮米熟去滓分服一升日三諸亡血

及虛家不可與白虎湯若立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月尚稟冷亦不可與之與之則嘔利腹痛傷寒無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜服白虎湯

傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證宜白虎湯

若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯

青蘗子圓治傷寒後結熱在內煩渴者方

青蘗子五兩 黃芩 桔萸根

苦參各一兩 黃蘗二兩 龍膽

梔子仁 黃連各三兩

右八味為末蜜丸如梧桐子大先食後服七九日不知稍加小丘山房 千金卷三十一 九 喬氏世定刻行

本云錫和為丸

太青湯治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱不除及下利不止斑出皆治之方

大青四兩 甘草 阿膠各二兩

豆豉升一

右四味以水八升煮取三升去滓煮三沸去豉內阿膠令烺頓服一升日三服欲盡復作常使有餘渴者當飲但除熱止吐下無毒深師治勞瘵肘後有赤石脂三兩朔治集驗同

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方

知母二兩 麻黃 甘草

芍藥 黃芩 桂心略一

右六味咬咀以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍飲之令胃中和則愈
江南諸師祕仲景要方不傳

灸法初得病或先頭痛身寒熱或瀉瀉欲守火或腰背強直面
日如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸心下三處第一
處去心下一寸名巨闕第三處去心下二寸名上管第三處
去心下三寸名胃管各灸五十壯然或人形大小不同恐寸
數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾
頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭名胃管又中屈半繩更分
為二分從胃管向上度一分即是上管又上度取一分即是
巨闕大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年灸之大小以
小丘山房

金匱卷三十一

喬氏世定刻行

意對是也若病者三四日以上宜先灸胃上二十壯以繩度
鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名
曰天聰又灸兩顳顛又灸兩風池又灸肝輸百壯餘處各二
十壯又灸太衝三十壯神驗

經其久備急千金要方卷之三十一

孫真人備急千金要方卷之三十二

磨二

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

傷寒方

傷寒雜治第一 論方

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參青葙艾梔子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢物不解也熱在身中既不時治治之又不苦酢等藥此如救火不以水也必不可得脫免也

又曰今諸療多用辛甘薑桂人參之屬此皆貴價難得常有此
行求之轉以失時而苦參青葙葶藶艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內執者不必
小丘山房

金方卷三十二

高氏世定刻行

按藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但稍與促其間無不解也

扁鵲曰病在腠理湯熨之所及病在血脉針石之所及病在骨髓無可奈何而凡醫治病或言且待使病成乃頓去之此為妄矣當預約東家中及所部曲具語解此意使有病者知之為要
治溫氣病欲死方

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則除諸毒病

服之覆取汗皆愈 張文仲及時後云治熱毒氣死破棺十金湯

苦參湯治熱病五六日已上方

苦參 三兩

黃芩 兩

生地黃 兩八

右三味咬咀以水八升煎取二升適寒溫服一升日再

凝雪湯治時行毒病七八日熱積聚胃中煩亂欲死起死人搗湯方

芫花一升以水三升煮取一升半漬故布薄膈上不過三薄熱即除當溫暖四肢護厥逆也

栝蒌湯治傷寒中風五六日已上但胃中煩乾嘔方

栝蒌實一枚 黃芩 甘草各三兩 生薑四兩

大棗十二枚 柴胡半斤

右六味咬咀以水一斗二升煮取五升絞去滓適寒溫服一

升日三

蘆根飲子治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食方

生蘆根切 青竹茹各一合 粳米三合 生薑三兩

小丘山房

金方卷三二二

二

喬氏世定刻行

右四味以水七升先煮千里鞋底一隻取五升澄清下藥煮

取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草三兩 生蘆根切一升 橘皮一兩 粳米三合

右四味咬咀以水五升煮取一升隨便稍飲不瘥更作取瘥

止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏 麥門冬 半夏各一升 竹葉一把

人參二兩

右五味咬咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一升米熟湯

成飲一升日三服一方加生薑五兩此方正是仲景竹葉湯方前卷汗後門中已有

此方仍火甘
草分兩不別

治熱毒攻手足赤腫焮熱疼腫痛欲脫方

煮馬屎若羊屎汁漬之日三度

又方濃煮虎杖根適寒温以漬手足令至踝上一尺止

又方稻穰灰汁漬之

又方取好酒煮若參以漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

漏蘆連翹湯治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹毒熱赤腫赤痛

生障醫方

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白朮

小丘山房

全愈卷三十一

三

喬氏世定刻行

升麻

甘草各一兩

枳實

大黃各三兩

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服相去如人行五里

又更服熱盛者可加芒消二兩

猪膽湯治傷寒五六日斑出方

猪膽

苦酒各三

鷄子一枚

右三味合煎三沸強者盡服之羸者須煎六七沸分為二服

汗出即愈

治人及六畜時氣熱病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之一莖是穰穰即不瘡瘡若黑者擣蒜

之

又方煮芸薑洗之

治熱病後䟽豆瘡方

黃連三兩以水二升煮之取八合頓服之

又方真波斯青黛大如棗水服之瘡

又方青木香二兩以水三升煮取一升頓服之愈

又方若赤黑發如疥大一作痰火者煎羊脂摩傅之

又方小豆屑鷄子白和而傅之

又方以婦人月水帛以拭之

又方小兒著取月水汁和水浴之

又方灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左女右

木香湯治瘡煩疼者方

青木香二兩 薰陸香

礬石

丁香一兩

小丘山房

全方卷三十一

四

喬氏世定刻行

麝香半兩

右五味吹咀以水四升煮取一升半再服熱毒盛者加犀

角一兩無犀角以升麻代之病輕者去礬石神驗

又方芒消和猪膽塗上勿動痂落無痕仍卧黃土末上良此病

小便澀有血者內壞瘡皆黑屬不出膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢合四 大猪膽一具

右二味合煎三沸服一合日五服之良

治䟽豆瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜備身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之拜數敷食之

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此方

牡蠣二兩半 石膏一兩六銖

右二味治下節酒服方寸七日三四亦可蜜丸如梧子大

用治大病瘥後小勞便鼻衄者

治傷寒熱病瘥中痛閉塞不通方

生烏扇一斤切 猪脂一斤

右二味合煎藥成去滓取如半鷄子大薄綿裹之內喉中

稍稍咽之取瘥

又方

小血心方

金匱卷三十二

五

喬氏世定刻行

升麻

芍藥

羚羊角各三兩

通草四兩

射干二兩

生蘆根切

右六味咬咀以水七升煮取二升半分作三服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴前方

石膏半斤 蜜升

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎取如錫

含如棗核許盡復含之大良

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗二十枚 烏梅十枚

右二味合擣蜜和含如杏核大咽其汁甚驗矣

禹餘糧湯傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯竟復

以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦治之方

禹餘糧 赤石脂各一

右二味以水六升煮取二升分三服若不止當利小便

治傷寒後下利膿血方

阿膠兩一 黃蘗兩二 黃連兩四 梔子十枚

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓內阿膠更煎令消

分為三服甲乙方無黃蘗

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蠶蟲在下部方

麝香 礬石 巴豆 附子

真珠 雄黃各半

小丘山房

上卷二十二

六 喬氏世定刻行

右六味治合取桑條如箭篠長三寸以綿纏頭二寸唾濡

綿展取藥著綿上內穀道中半日復易之日再神效

麻黃升麻湯治傷寒六七日其人不大下後脉沈遲手足厥逆下

部脉不至咽咳不利唾膿血泄痢不止為難治者方

麻黃 知母 萎蕤亦作菴藟 黃芩各三兩

升麻 芍藥 當歸 乾薑

石膏 茯苓 白朮 桂心

甘草 麥門冬各二兩

右十四味咬咀以水一斗先煮麻黃減三升去上沫次內

諸藥煮取三分服一升微取汗愈

治溫毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏

氣腹痛諸熱毒方

梔子故二七

豉升

薤白壹

右三味以水四升先煮梔子薤白令熟次內豉煮取二升
半分三服頻服取瘥

治病後虛腫方

豉伍

醇酒斗

右二味煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性覆取汗

治汗不止方

地黃三斤切以水一斗煮取三升分作三服

又方白朮葉作飲飲之

又方白朮方寸七以飲服之

小丘山房

千金卷三十二

七

喬氏世定刻行

治卒得汗不止方

以溫酒服牛羊脂愈

又方服屎亦止

治盜汗及汗無時方

以韭根四十九枚水二升煮一升頓服之為度

又方豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過三劑即止

又方死人席緣燒灰煮汁洗身瘥

止汗方

杜仲

牡蠣各等分

右二味治下篩臨夜臥以水服五錢七

又方

牡蠣

雷丸

麻黃根各三兩

乾薑

甘草

各一兩

米粉

二升

右六味治下篩隨汗處粉之

牡蠣散治卧即盜汗風虛頭痛方

牡蠣

白朮

防風

各三兩

右三味治下篩酒服方寸七日二止汗無出此方一切泄

汗服之三日皆愈

孫真人備急千金要方卷之三十二

小丘山房

全金卷三十二

八 喬氏世定刻行

宋朝奉即守太常少卿充秘閣校理林億等校正

傷寒方

勞復第二論 食忌

論曰凡熱病新瘥及大病之後食猪肉及羊血肥魚油膩等必當大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌菜黍餒哺鱸炙糞粟諸菓物脯脩及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可慎也

病新瘥後但得食糜粥少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與之也引曰轉久可漸食羊肉白糜若羹汁雉兔鹿肉

小丘山房

金方卷三十三

喬氏廿定刻行

不可食猪狗肉也新瘥後當靜卧慎勿早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得病已瘥未健比別輩敷視脉曰雖瘥尚虛未得復陽氣不足慎勿勞事餘勞尚可女勞則死當吐舌數寸其婦聞其夫瘥從百餘里來省之經宿交接中間三日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋正者疾愈後六十日已能行射獵以房室即吐涎而死及熱病房室名為陰陽易之病皆難治多死近者有一士大夫小得傷寒瘥已十餘日能乘馬行來自謂平復以房室即小腹急痛手足拘攣而死時病瘥後未滿五日食一切肉麵者病更發大困

時病瘥後新起飲酒及韭菜病更發

時病新瘥食生魚鮓下痢必不止

時病新瘥食生菜令顏色終身不平復

時病新汗解飲冷水者損心胞令人虛補乃不復

時病新瘥食生棗及羊肉者必膈上作熱蒸

時病新瘥食大羊等肉者必作骨中蒸熱

時病新瘥食魚肉與瓜生菜令人身熱一本作腫

時病新瘥食蒜鱸者病發必致大困

黃龍湯治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方仲景名小柴胡湯方

柴胡斤半

半夏斤半

黃芩三兩

人參二兩

甘草兩二

生薑兩四

大棗十二枚

小丘山房

金卷三二二

二

喬氏世定刻行

右七味咬咀以水一斗煮取五升去滓服五合日三不嘔而渴者去半夏加括萋根四兩

補大病後不足虛勞方萬病虛勞同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四升煎取一升如人體溫稍稍飲之不得過多十日服不絕

為佳

治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作方

梔子仁三枚

石膏五兩

香豉一升

鼠屎大者二十枚

右四味咬咀以水七升煮取三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復之方

取洗手足汁飲一合取頭中垢如棗核大吞一枚

枳實梔子湯治大病已後勞復者方

枳實三枚

梔子十四枚

豉一升
綿裹

右三味咬咀以酢漿七升先煎減三升次內枳實梔子煮

取二升次內豉煮五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食

者內大黃如博棗子五六枚

治病新瘥遇美飲食過多食復者方

取所食餘燒為末飲調服二錢七日以三服

治新瘥早起及食多勞復方

豉五合

鼠屎二十一枚
炙溼者

右二味以水二升煮取一升盡服之温卧令小汗愈崔氏加梔子

子七枚尤良肘後有麻子人肉一升加水一升亦可內枳實三枚葱白一虎口

小丘山房

千金卷三十三

三

喬氏世定刻行

治重病新瘥早起勞及飲食多致發欲死方

燒蠶甲末飲服方寸匕

治食大飽不消勞復脉實者方

豉一升

鼠屎二十枚

梔子七枚

大黃三兩

右四味咬咀以水六升煮取二升分三服微取汗應小鴨

溲者止不溲者復作

治勞復垂死方

暖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服即愈小男

兒亦得

麥門冬湯治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬兩

甘草二兩

京棗枚十

竹葉升一

右四味呖咀以水七升煮粳米一升令熟去米內諸藥煎取三分分三服不能服者綿滴湯內口中用之有效
治食勞方

麪二升煮取汁服之

又方杏仁五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

又方燒人屎灰水服方寸匕為度

欲令病人不復方

燒頭垢如梧桐子大吞服之

治傷寒瘧後一年心下停水不能食者方

生地黃伍

白朮斤

好麪斤

右三味合搗令相得曝乾下篩酒服方寸匕日三加至二七

小丘山房

金方卷三十三

四

喬氏世定刻行

論曰婦人溫病雖瘥未苦平復血脉未和尚有熱毒而與之交
接得病者名為陰陽之病其人身體重熱上衝胃頭重不能舉
眼中生眵職膜來作四肢一云膝膜拘急小腹絞痛手足拳皆即死其

亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胃頭重不欲舉百節解
離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著床不能
動搖起止仰人或引歲月方死醫者張苗說有婢得病瘥後數
日有六人犯之皆死

治婦人得病易丈夫丈夫得病易婦人方

取女人中裊近隱處燒服方寸匕三日小便即利陰頭

微腫此為愈矣女人病可取男裊一如此法

治交接勞復陰疝腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣服以覆男子立愈

令病人不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若米飲汁服之

治男子新病起房內復者方

取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治病後髮亂不可理通頭法

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之細將釵子領髮斯須並自通矣

百合第三論方

小丘山房

千金卷三十三

五

喬氏世定刻行

論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病已後不平復變成斯病其狀惡寒而嘔者病在上焦也二三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小澹者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其證以治之百合之為病令人意欲食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲卧復不得眠至朝口苦小便赤澀欲行復不能行諸藥不能治治之即劇吐利如有神靈所為也百合病身形如和其脉微數其候每溺時即頭覺痛者六十日乃愈百合病候之溺時頭不覺痛漸寒者四十日愈百合病候之溺時覺快然但覺頭眩者二十日愈百合病證其人或

未病而豫見其候者或已病四五日而出或一月二十日後見其候者治之喜誤也依證治之

論曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗為

逆也見在於陽而攻其陰則陽不能解也復下之其病不愈

云見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法解之見陽攻陰復發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為難逆其

治病難

百合知母湯治百合病已經發汗之後更發者之方

百合七枚

知母三兩

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明旦去水取

百合更以泉水二升煮取一升汁置之復取知母切以泉

水二升煮取一升汁合和百合汁中復煮取一升半再服

小丘山房

金卷三二三

六

喬氏世定刻行

不瘥更依法合用服

百合滑石代赭湯治百合病已經下之後更發者方

百合七枚

滑石三兩

代赭兩

右三味先以泉水漬百合一宿明旦去水更以泉水二升

煮百合取一升去滓又以水二升煮餘二味取一升內百

合汁如前法復煎取一升半分再服

百合雞子湯治百合病已經吐之後更發者方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升取

雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

百合地黃湯治百合病始不經發汗吐下其病如初者方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升半

內生地黃汁一升復煎取一升半分再服大便當去惡沫為也

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人身洗身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不瘥可用括萆根并牡蠣等分為散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱者方

百合根一升

滑石三升

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利利者止勿復服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下緊急

治百合病變腹中滿痛者方

小丘山房

金卷三十三

七

喬氏世定

但取百合根隨多少熬令黃色搗篩為散飲服方寸匕日三滿消痛止

孫真人備急千金要方卷之三十三

孫真人備急千金要方卷之三十四

磨四

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第四

方論

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起卧不安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡飲食不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者則聲喝也喝一作啞毒食下部者則乾咽也此由溫毒氣所為食於上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食於肛外者熏之并用雄黃三片稍置瓦餅中炭火燒向肛熏之并服湯也治狐惑湯方

黃連四兩

黃蘗四兩

小丘山房

金匱卷三十四

喬氏世定刻丁

右二味咬咀白酢漿一斗漬一宿煮取二升分為三服

赤小豆當歸散其人脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日眼赤如鳩眼得之七八日其四眦黃黑能食者膿已成也治之方

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當歸三兩為末漿水服方寸匕日三即愈

瀉心湯其病形不可攻不可灸因火為邪血散脉中傷脉尚可傷臟則劇并輪益腫黃汁出經合外爛肉腐為癰膿此為火疽醫所傷也夫脉數者不可灸因火為邪即為煩因虛逐實血走脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也應在瀉心瀉心湯無治下痢不止腹中幅堅而嘔心腸鳴者方

仲景名半夏瀉心湯要名甘草

心渴

半夏升

黃芩

人參

乾薑

甘草各三兩

黃連一兩

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升分服一升日三

傷寒發黃第五

論證 針灸圖

方

論曰黃有五種有黃汗黃疸癰疽酒疸女勞疸黃汗者身體四肢微腫脅滿不渴汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱以冷水洗之熱因留胃中食生黃瓜魚上所致若成黑疸者多死癰疽者食畢頭眩心忪怫鬱不安面發黃由失飢大食胃氣衝熏所致酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉常風入致女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接竟入水所致但依後方治之

小丘山房

金方卷三十四

二

喬氏世定刻行

黃汗之為病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染色正黃如蘗汁其脉自沉從何得之此病以汗出入水中浴水從汗孔入因而得之

黃蘗芍藥桂酒湯治黃汗方

黃蘗五兩

芍藥二兩

桂心三兩

右三味以水一升水七升合煎取三升飲一升當心煩也至六七日稍稍自除心煩者苦酒阻故也

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

枝黃耆湯治諸病黃疸宜利其小便假令脉浮當以汗解方

桂枝

芍藥

生薑

甘草

黃耆

大棗

右六味咬咀以水八升微火煎取三升去滓温服一升發微

汗須臾不汗者飲稀執粥以助湯若不汗更服湯

麻黃醇酒湯治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃三兩以醇酒五升煮取一升半盡服之温覆汗出即

愈冬月寒時用清酒春月宜用水

治黃疸方

瓜蒂

秫米

赤小豆

右三味治下節病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛縮鼻

小丘山房

二金卷三二四

二 喬氏世定刻行

須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則愈病輕者如一豆不瘥

間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無不死大慎之

療天行毒熱通貫臟腑沈伏骨髓之間或為黃疸

大黃圓治同前

大黃

葶藶子

右二味末蜜和丸如梧子大未服十九日三病瘥止

又方

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

麩衣

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三九日三不知加至

五九

茵陳湯治黃疸身體面目盡黃方

茵陳

黃連各三兩

黃芩二兩

大黃

甘草

人參各一斤

梔子二十枚

右七味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三亦酒疸酒癖

三黃散治同前

大黃

黃連

黃芩各四兩

右三味治下節先食服方寸七日三亦可為丸

五苓散治黃疸利小便方

猪苓

茯苓

澤瀉

白朮

桂心各三兩

右五味搗篩為散渴時水服方寸七極飲水即利小便及汗

小山房

金卷三十四

四

喬氏世定刻行

出愈此方與第九卷方相重以分兩不同故重出

秦椒散治黃疸飲少溺多方

秦椒六銖

瓜蒂半兩

右二味治下節水服方寸七日三

小半夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可除熱

熱除必噦方

半夏

生薑各半斤

右二味咬咀以水七升煮取一升五合分再服有人常積氣結而死其心上暖以此湯少許汁入口遂活

治黃疸方

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便

愈無小麥穠麥亦得用之

治黃疸變成黑疸醫所不能治者方

土瓜根搗汁一小升頓服日一平旦服至食時病從小便
出先須量病人力不得多服力衰則起不得

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃煮蘗汁衆醫不能瘡者

方

茵陳

梔子各四兩

黃芩

大黃

柴胡

升麻各三兩

龍膽二兩

右七味咬咀以水八升煮取二升七分合分三服若身體羸去

大黃加梔子五六兩生地黃一升延年錄無茵陳有梔子四兩括萎三兩芒消二兩近

效方加枳實二兩夫黃發已久變作桃皮色心下有堅嘔逆不下飲

小丘山房

金卷三二四

五

喬氏世定刻行

食小便極赤色少四肢逆冷脉深沈極微細遲者不宜服此

方得下必變哕也宜與大茵陳湯除大黃與生地黃五兩服

湯盡消息看脉小浮出形小見不甚沈微便可治也脉浮見

者黃當明不復作桃皮色心下自寬也大茵陳湯方次出後十一味者是

苦參散治人無漸忽然振寒發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大

便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯散餘熱不除久黃者宜

吐下方

苦參

黃連

瓜蒂

黃蘗

大黃各一兩

葶藶二兩

右六味治下節飲服方寸匕當大吐吐者日一服不吐日再

亦得下服五日知可消息不覺退更服之小折便消息之

治發黃方

茵陳

黃蘗

梔子

大黃各三兩

黃連

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服先服湯後服丸方

大黃兩五

茵陳

梔子各三兩

黃芩

黃蘗

黃連各二兩

右六味為末以蜜丸如梧子大白飲服二十九令微利

麻黃連翹赤小豆湯治傷寒瘀熱在裏身體必發黃方

麻黃

連翹

甘草各二兩

生薑三兩

大棗十二枚

杏仁三十枚

赤小豆升

生梓白皮切二升

右八味㕮咀以勞水一斗先煮麻黃去沫次內諸藥煎取三

小丘山房

千金方卷三二四

六 喬氏世定刻行

升分三服

茵陳湯治傷寒七八日內實瘀熱結身黃如橘小便不利腹微

脹滿宜下之方

茵陳六兩

大黃三兩

梔子四十枚

右三味㕮咀以水一斗二升先煮茵陳取五升去滓次內梔

子大黃煎取三升分服一升日三小便當利如皂莢沫狀色

正赤當腹減黃悉隨小便去也范注用燕穀煎小品方用石膏一斤

大黃黃蘗湯治發黃腹滿小便不利而赤自汗出此為表裏

實當下之方

大黃三兩

黃蘗

砒硝各四兩

梔子十五枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內芒消復煎取一升

茵陳圓治時行病急黃并瘡癘疫氣及瘰癧之方

茵陳

梔子

砒硝

杏仁各三

巴豆一兩

恒山

鼈甲各二兩

豉五兩

大黃五兩

右九味為末以錫為丸如梧子大飲服三九以吐利為佳不知加一九初覺體氣有異急服之即瘥神效

治急黃熱氣骨蒸兩目赤脈方

砒硝一兩

大黃半兩

生地黄汁合八

右三味合和服五合日二以利為度不須二服

治風疸小便或黃或白洒洒寒熱好卧不欲動方

小丘山房

全卷三十四

七 喬氏世定刻行

三月生艾

一束搗取銅器中煎如漆密封之

苦參

大黃

黃連

凝水石

括蔞根

葶藶各六

右七味六味為末以艾煎和丸如梧子大先食服五九日二可至二十九有熱加苦參湯加括蔞小便澀加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

濕疸之為病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如狎肝狀其小腹滿者急下之亦治一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石

滑石各五兩

右二味治下節以大麥粥汁服方寸匕日三先食服之便利如血者已當汗出瘥

寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脉浮為傷腎跗陽脉腎為傷脾風寒相薄食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡黃名曰穀疸

治勞疸穀疸九方

苦參兩三 龍膽一兩

右二味為末牛膽和為丸如梧子大先食以麥粥飲服五九

日三不知稍加之剛繁方加施子人三七枚以猪膽和為丸

夫酒疸其脉浮者先吐之沉弦者先下之夫人病酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜吐之方前苦參散七味者是酒

小丘山房

二卷三十四

八 喬氏世定刻行

疸必小便不利其候當心中熱足下熱是其證也夫酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如啖蒜齏狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故之

枳實五枚 大黃三兩 豆豉半升 梔子七枚
而不甚熱或乾嘔方
枳實大黃湯治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸心中懊懣

右四味咬咀以水六升煮取二升分三服心中熱痰懊懣皆

主之

凝水石散治肉疸飲少小便多如白泔色此病得之從酒方

凝水石 白石脂 枳萋根 桂心各三銖

菟絲子 知母各十銖

右六味治下篩麥粥飲服五分七日三服五日知十日瘥
茯苓圓治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者之方

茯苓

茵陳

乾薑各一兩

白朮熬

枳實各三

半夏

杏仁各十

甘遂六

蜀椒

當歸各十

右十味為末蜜和丸如梧子大空腹服三九日稍稍加以

小便利為度

千金翼加黃連一兩大黃十八銖名茵陳丸治黑疸身體闇黑小便澀

半夏湯治酒癰蔭胷心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小便赤

黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致方

半夏升一

生薑

黃芩

茵陳

當歸各兩

前胡

枳實

甘草

小丘山房

千金方卷三十四

九 喬氏世定刻行

大戟各二兩

茯苓

白朮各三兩

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分作三服

牛膽圓治酒疸身黃麴塵出方

牛膽一枚

芫花升一

芫花半升

瓜蒂三兩

大黃兩八

右五味四味咬咀以清酒一斗漬一宿煮減半去滓牛膽

微火煎冷可丸如大豆服一九日移六七尺不知復一九至

八九膈上吐膈下下或不吐而自愈

大茵陳湯治內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊數者大

發黃多是酒客勞熱食少胃中熱或溫毒內熱者故黃如金色

方

茵陳

黃蘗各一兩半

大黃

白朮各三兩

黃芩

甘草

茯苓

桔萎根

前胡

枳實各二兩

梔子各二十枚

右十一味，以水九升，煮取三升，分三服，得快下，消息二四日，更治之。

茵陳圓治氣淋，臚脹，腹大，身體面目悉黃，及酒疸，短氣，不得息。

方

茵陳

天門冬

梔子各四兩

大黃

桂心各三兩

通草

石膏各二兩

半夏半升

右八味，蒸大黃，通草，天門冬，半夏，梔子，曝令乾，合搗篩，蜜丸。

如大豆服，三九日，三忌生魚，以豆羹服，不得用酒，一方去石。

小丘山方

今卷三二四

喬氏世定刻行

膏內滑石二兩，不知加至十九。

黃家至日晡所發熱，而反惡寒，此為女勞得之，當勝脫急，小腹。

滿體盡黃，額上黑，足下熱，因作黑疸，其腹臚脹而滿，如欲作水。

狀，大便必黑，時溏泄，此女勞疸，非水也。腹滿者難治，消石礬石。

散治女勞疸方

消石

礬石各半兩

右二味，治下篩，大麥粥汁服，方寸匕，日三重，衣覆取汗，病隨。

大小便出，小便正黃，大便正黑。

黃疸之為病，日晡所發熱，惡寒，小腹急，身憊，黃額黑，大便溏黑。

足下熱，比為女勞，腹滿者難治，治之方。

滑石

石膏各半兩

右二味治下篩大麥粥汁服方寸七日三小便極利則瘥

針灸黃疸法

正面圖第一

寅門
舌下

上斷
脣裏

上腭
顛顛

俠人中
巨闕

俠承漿
上管

陰縫

寅門穴從鼻頭直入髮際度取通繩分為三斷繩取一分入髮

際當繩頭針是穴治馬黃黃疸等病

上斷裏穴正當人中及脣針三鏗治馬黃黃疸等病

上腭穴入口裏邊在上縫赤白脉是針三鏗治馬黃黃疸四時

等病

舌下穴俠舌兩邊針治黃疸等病

脣裏穴正當承漿裏邊通齒斷針三鏗治馬黃黃疸寒暑温疫

小丘山房

三金卷二十四

一一

喬氏世定刻行

等病

顛顛穴在肩眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治四時寒

暑所苦疽氣温病等

俠人中穴火針治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者

俠承漿穴去承漿兩邊各一寸治馬黃黃疸急疫等病

巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病

上管穴在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病

男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黃黃疸等病若女人玉門是穴

男女針灸無在

覆面圖第二

風府
肝輸

熱府
脾輸

肺輸
腎輸

心輸
腳後跟

風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸針之治頭中百病馬

黃黃疸等病

熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分針灸無在治馬黃

黃疸等病

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸五分灸主黃疸通

治百毒病

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

肺輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸五分

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸五分

腳後跟穴在肉後際針灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸毒等病

小丘山房

側面圖第三

耳中

錢孔

太衝

手太陽

脾石子頭

方卷三十四

十二

喬氏世定刻行

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃黃疸寒暑疫毒等病

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針灸治馬黃黃疸寒

暑溫疫等病頰兩邊同法手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃

疸

脾石子頭穴還取病人手自提臂從腕中太澤澤當文向上作淵一

夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病

錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸

太衝穴針灸隨便治馬黃黃溫疫毒等病

孫真人備急千金要方卷之三十四

